





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
50/D





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
50/D



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
50/D



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
50/D

50/


A. xix. f

pp 867-70 wanting
(Noted Nov '92)



E. BARCLAY-SMITH, M.D.

REPR BY STOKLEY, CAMBRIDGE



Lescaille. M.

46004

☞ **AETII MEDICI**
GRAECI CONTRACTAE EX VETE

RIBVS MEDICINÆ TETRABIBLOS, HOC EST QVA-
ternio, id est libri uniuersales quatuor, singuli quatuor sermones
complectētes, ut sint in summa quatuor sermonum
quaterniones, id est sermones xvi. per la-
num Cornarium Medicum Physi-
cum Latinè conscripti.



BASILEAE M D XLII



Cell

THE FIRST PART OF THE

ANATOMY OF THE HUMAN BODY

BY WILLIAM BISHOP

OF THE UNIVERSITY OF OXFORD

IN TWO VOLUMES

THE SECOND PART OF THE

ANATOMY OF THE HUMAN BODY

BY WILLIAM BISHOP

OF THE UNIVERSITY OF OXFORD

IN TWO VOLUMES

THE THIRD PART OF THE

ANATOMY OF THE HUMAN BODY

BY WILLIAM BISHOP

OF THE UNIVERSITY OF OXFORD

IN TWO VOLUMES

THE FOURTH PART OF THE

ANATOMY OF THE HUMAN BODY

BY WILLIAM BISHOP

OF THE UNIVERSITY OF OXFORD

IN TWO VOLUMES

THE FIFTH PART OF THE

ANATOMY OF THE HUMAN BODY

BY WILLIAM BISHOP

OF THE UNIVERSITY OF OXFORD

IN TWO VOLUMES

THE SIXTH PART OF THE

ANATOMY OF THE HUMAN BODY

BY WILLIAM BISHOP

OF THE UNIVERSITY OF OXFORD

IN TWO VOLUMES

THE SEVENTH PART OF THE

ANATOMY OF THE HUMAN BODY

BY WILLIAM BISHOP

OF THE UNIVERSITY OF OXFORD

IN TWO VOLUMES

THE EIGHTH PART OF THE

ANATOMY OF THE HUMAN BODY

BY WILLIAM BISHOP

OF THE UNIVERSITY OF OXFORD

IN TWO VOLUMES

AMPLISSIMIS AC PRVDENTISSIMIS HONESTIS

SIMIS Q. VIRIS SENATVI POPVLOQ.

imperialis urbis Francforden. Ianus

Cornarius medicus Phy-

licus S. D.



ET IV M medicum græcum iam decennium
quum uertendum suscepissem, multum ope/
rapretij mox ab initio facere, mihi uisus sum.
Tamen enim fragmentum tantum, ueneran/
dæ tamen illud uetustatis, mihi obtigisset, att/
mē ex eo ipso colligebā non uulgare aliquod
cōsiliū illi uiro fuisse, sed institutum penitus
optimum, & ab omnibus approbandum, to/
tam uidelicet medicinam in breues quasdam
summas contrahendi. Erat autem tum mihi, sicut plerisq; omnibus au/
tor ignotus, nisi quod Asulanorum apud Venetos familia, græci exem/
plaris editionem pollicita erat, ante Hippocratis & Galeni operum edi/
tionem. Itaq; etiamsi fragmentum illud meum sex sermonum, ab octa/
uo usq; ad decimum tertium, contemptibile uideri poterat, ut in publi/
cum ederetur: & incertū esset ad quot libros uniuersales, aut sermones
partiales, autor opus ipsum extendisset: tamen neuiquam supprimen/
dum ratus inuentum thesaurum (sic enim tum mihi placebam) sex illos
sermones in latinam linguam à me conuersos edidi. Neq; male succes/
sit. Nam nouum & incognitum opus studiosi benigne exceperunt, per
omnem adeò Europam, ut etiam Italiæ uisum sit, non paruum esse in/
commodum, totum illum autorem non ad latinos translatum extare.
præsertim quum totum græcum opus in aliquot exemplaribus in Ita/
lia superesset. Et tum sanè excitatus est quorundam magnorum & re/
ctis studijs bene uolentiū Heroum stimulus Baptista Montanus: non
incelebris apud Veronenses medicus, qui exemplarium illorum copia
confusus, & priores, & posteriores, quos ego non habueram sermones,
fragmento meæ translationis adiecit, & sic translationem meam suæ
apud Venetos editioni inseruit. Et quia candore quodam hoc à se fa/
ctum esse, in præfatione testatus est, ego uicissim illi hoc talionis uice re/
pendam

α

2

pendam

E P I S T O L A

pendam, quod studiosis cognoscendum propono, hac tenus translationem illius, unà cū mea lucem ferre potuisse. nam in posterū non erit, qui me iudice, uel meam priorē, uel illius conuersionem, per omnia sequi debeat. Discipulus est prioris posterior dies, Honestissimū est certamen, non solum alios, sed etiam seipsum superare. Proinde totum opus Aetij etiam nos adepti, illud denuō ex toto conuertendum suscepimus, non tantum quod uideam, dum exemplaria alia plus, alia minus, adscripta habent, unum aliquod certum sequendum esse: Sed etiam ut ne, amplius sit styli diuersorum interpretum, in uno opere pugna. Et hoc meum consiliū si Montano sequi uisum fuerit, adeo nō improbabo, ut ingentis candoris loco id habiturus sim, si etiam ipse totum Aetij opus ex sua interpretatione legendum edet. Quapropter meam operam non aliter studiosis approbare uolo, quā ut putent me nulla quā publici commodi causa commotum, huc progressum esse, & sincerē optimum medicum emendatissimum, ac optime Latinum factum (quātum eius per me fieri potuit) inuulgasse. Tantumq̃ abest ut in praesens eius translationem, propter meā editionem, superfluam uideri uelim, ut uehementer expetam etiam illum, totum opus de suo denuō publicare. Et nisi fallor, haec res non tam ad illius gloriam spectat, quā publicam studiosorum utilitatem: praesertim eorum qui Latinam linguam solum nouerunt. Continget enim ipsis ex utriusq̃ translationis collatione, ut ueram sententiam assequantur. Atq̃ utinam etiam hi qui ex Hispanis, altas de montibus umbras nobis utriusq̃ offundunt, & in alienis libris ingeniosi sunt, huc incumberent, ut similem, aut potiore, (qualem ostendant) operam praestarent: plenis buccis studium hominum collaudarem. Iam quod illos facere iuuat, nemini prodesse uideo. Et reuera in quatuor uersibus, si quando aliquid ē suo exemplari, uelut potiore citat ille, plures errores in conuertendo admittit, quā in integro sermone prioris editionis inueniuntur. Deinde leuissima quæq̃ & nullius momenti notat. Verum ubi nodus aliquis incidit, ibi transilit uelut angue conspecto, & nihil hic secat Tenedia ipsius bipennis. Sed huc progredi nolebam. Hoc uolebam, expetendum mihi uideri, ut & ex hispanis latina Aetij translatio extaret: quo sic studiosi medici uel auctam, uel decurtatam, aut etiam corruptam lectionem diuersorum graecorum exemplarium cognoscerent. Hispani suum in hac parte ducem, itemq̃ Itali suum haberent. Profecto mihi satis est, si Germanis meis mea & placent, & prosunt. Iam uero eiusmodi cauillationibus nihil proficitur, & in talibus annotationi

N V N C V P A T O R I A .

tationibus utcunque veri inueniendi studium prætexitur, tamen hæ sunt ipsissimæ maligni ac morbidi ingenij notæ. Facile est aliorum errores indicare. Sed te ipsum inculpabilem præstes, si quid simile tentes, aut etiam in his annotandis, hic opus hic labor est. Et cognosco pennas, ex corpore commentariorum meorum medicorum, in Galeni $\kappa\lambda\pi\pi\tau\varsigma$ libros conscriptorum, extractas, & sagittis illius adaptatas, ut uehementiore impetu in me ferrentur. Non enim non uidebam ipse quæ mihi in mea translatione displicerent. Verum ea, quia potioris aut alterius exemplaris copia deerat, interim ferri posse sperabam, donec clarescere à me ipso iudicarentur, id quod factum est mox in relatorum commentariorum editione, in quibus potissimos locos prioris meæ in Aetio translationis indicaui ac retractaui: Et iam amplius fiet, in huius repetitæ meæ translationis editione, quam ad duo exemplaria præuia à me conscriptam, & ad Galeni ac Pauli lectionem collatam, in omnibus sequendam puto. Neque curandum arbitror, si alicubi aliam exemplaria, plura uel pauciora habent, aut etiam ordine immutato. Hoc enim in eiusmodi autoribus peculiariter contingere potest, ut certi loci ab alijs atque alijs augeantur, aut imminuantur, dum quisque postea uel sibi approbata addit, aut superflua iudicata detrahit. Quod ipsum fortassis etiam ab ipsis iustis scriptorum autoribus aliquando fieri contingit. Hanc ipsam operam meam in urbe uestra, Viri Francforden. à me perfectam uobis inscriptam, ac dicatam esse uolui. Nam quum aliàs hoc inscribendi libros magnis principibus, ac urbibus munus, publice receptum sit, ego qui apud uos iam in quartum annum medicum physicum ago, neuiquam committere debui, ut ex scriptis meis non eximium aliquod specimen, quale sanè hoc Aetij à me Latine conscripti opus esse iudico, urbi uestræ peculiariter à me destinaretur, quo uestro grauissimo iudicio approbatum, maiore gratia ac autoritate in publicum exiret. Atque haud scio an post ullas alias imperij Romani urbes, uestra respublica numerari debeat, tot insignibus ornamentis præ cæteris clara. Primum enim quid præclarius urbi alicui contingere possit, quàm quod urbs uestra iam per multorum annorum successionem habet, aureæ etiam appellatæ bullæ sacramento roboratum? Quod uidelicet Romanus futurus rex in sola uestra urbe, excitis è sedibus suis Romani imperij electoribus, tanquam ad rem orbi terrarum imprimis, uelut etiam est, necessariam eligitur, proclamatur, & ex urbe orbi, Rex & imperator suus innotescit? Quod si priscos historicos omnes diligentissimos in hoc exquirendo, describendoque esse uidemus,

ut regum

E P I S T O L A

ut regum ac magnorum principum ortus, ubicunque tandem contigerunt, tanquam locis in quibus contigerunt clarioribus inde futuris, exacte prodant ac conscribant: Et hodie in annales principum referre mos est natales ipsorum locos: Quod monumentum satis amplum urbi uestrae statui potest: ad quam non unus aliquis magnus princeps, sed tam multi, tot uoluentibus annorum seculis, orbis imperatores, ueri ortus sui primordia referunt, maximè qui non fortuito, ac incerta nascendi sorte ipsis contigit, uerum septem sacramento adiuratis principibus, totius Germaniæ supremis, ob hoc Electoribus, imperij appellatis, eius gratia conuenientibus, & summa fide, incorruptissimis iudicijs, firmissimacque autoritate, noui regis Romani atque orbis domini futuri, imò clementissimi imperatoris, ortum ac natiuitatem, hoc est electionem, orbi uniuerso salutarem pronunciantibus. At uero ut maximum est hoc urbis uestrae, uiri Francforden. decus, sic non minus ornamentum ex nobilissimo emporio uobis accedit, quod omnium totius Germaniæ emporiorum maximum esse constat. Possint fortassis alijs alia quædam emporia, aut ob mercium quarundam pleniorum ubertatem, aut uiliorem annonam, aut perpetuum emporij statum, præferenda uideri. Verum ob mercium omnium æqualem apud uos copiam, mihi quidem nullum emporio uestro maius uidetur, præsertim quum duobus statis anni temporibus celebretur, quibus quisque & sua commode aduehere ac diuendere, & aliena comparare potest, non dubito quin maiore utrinque lucro, quàm si perpetuus emporij status apud uos extet. Quanquam si quis adeò extra statam duorum temporum oportunitatem uos adeat, reperire itidem possit, & emptorem & uenditorem, quarundam mercium ac ipso expetitarum. Quanta uero commoditatis res sit, talia emporia esse ac celebrari, uel inde palàm fit, quod egentissimi sunt populi, ad quos nihil peregrinarum mercium inuehitur, ut & hoc nomine insigniter celebris uestra urbs sit, quod hanc commoditatem ex se in uniuersam ferè Europam deriuat. Atque sint hæc quidem præcipua duo uestrae urbis præconia. Mihi uero neque hoc leuiter ad laudem uestram pertinere uidetur, quod mechanicarum artium opifices per omnem Germaniam, morum, consuetudinum & rituum, unicuique arti peculiarium præscripta ac rationes, ex uestra republica uelut optime instituta, aut primum petunt, aut si prius habent, ex uestris emendant ac confirmant. Quid uero an non prædicandum uel imprimis erat: quod artis gladiatoriae apud Græcos ac Romanos olim celeberrimæ, hodie uero ubique exoletæ ac interceptæ,
nulla

N V N C V P A T O R I A .

nulla totius orbis parte , tam insignia uestigia restant . Quum enim
 gymnastices partes pleræq; omnes hodie sublatae sint . Nam neq; in
 usu sunt tam frequentia & priscis adeò quotidiana balnea . Neq; defri-
 ctiones ex oleo quotidianas , aut ullas aliquas , ualitudinis conseruan-
 dae gratia , hodie corporibus adhibemus . Et palaestra ferè tota interci-
 dit , ut etiam strigmentorum ex balneis , & palestra ueteribus Medicis
 petitorum , aequae materia atq; usu careamus : gladiatoria ars apud uos
 non tantum praedarè exercetur , sed eam exercentibus etiam praemia
 constituta sunt , & in ea praecellentes , gladiatoriae artis magistri publi-
 cè creantur . At uero quàm utilis res sit humanis corporibus , imò etiam
 animis , gymnastice , cuius pars est & ipsa gladiatoria , uel maximè ab
 ipso omnium studiorum doctissimo Galeno , in libris salubrium , si-
 ue de sanitatis tutela declaratur . Quin idem ad Thrasibulum scri-
 bens dubitare audet , num ad medicinam , aut gymnasticen pertineat
 sanitatis tutela . Intantum uidelicet commodat apta corpus exercita-
 tio , ut non minima pars artis tutelaris sanitatis ipsa gymnastice existat .
 Atq; hoc sane modo , idem fuerit optimus medicus , qui optimus cor-
 poris exercitator , ad sanitatem uidelicet conseruandam , quem graeci
 significantissime , non medicum , sed ὑγιεινόν , hoc est sanitatis tutorem
 appellant . Quare minus mirū mihi uidetur , fuisse semper , & esse adhuc
 honoratissimam apud uos artem medicam curatiuam , quum uideam
 etiam superesse apud uos ferè solos , aut certe non alios quàm qui à uo-
 bis transsumpserunt , artem medicam sanitatis tutelarem . Haec enim
 duae maximae ac principalissimae , sunt partes medicinae , quarum altera
 ὑγιεινόν , altera θεραπευτικὴν μέτρον appellatur . Quanquam autem in
 hoc diligentia uestra omnibus admirationi sit , ut bonos apud uos Me-
 dicos semper habeatis , tamen nescio quo malo fato id fiat , ut uulgus
 aequae apud uos , uelut nunc ubiq; gentium , ferè pessimos sequatur ,
 hoc est ut ego puto sui simillimos . An autem hoc ex reipublice utilita-
 te sit , indiscriminatim quosuis ad medicinam publice exercendam ad-
 mittere , id quod apud uos uelut in libera urbe , omnibus liberum est ,
 ampliore consideratione opus habet . Illud certe magna laude pra-
 omnibus Germaniae urbibus facitis , quod tot medicos , quot nulla alia ,
 publico salario alitis . Par est , aut etiam amplius , studium uestrum in
 conseruandis bonarum literarum ac artium studijs , Nec desunt uobis
 praepceptores , uel maximis scholis pares . Quin & celeberrimos multos
 republica uestra habet Iuriconsultos , quibus omnibus tum in iure di-
 cendo , tum etiam priuatim quibusuis ad consulendum , publicis consti-

E P I S T O L A

tutis stipendijs utimini. Quod uero maximum est, pietatis studia, & renascentem uerę Christianę religionis cultum, tanta prouehitis moderatione, ut etiam ipsis uerę pietatis aduersarijs admirationi sitis, dum uident ac audiunt populum à uerbi ministris ac doctoribus placate edoceri, & sedatis animis populum de sacris concionibus, ad suas functiones obeundas abire, & à neutra parte tumultus cieri. Quę res summani magistratus prudētiam declarat. Vulgo dicitur, qualis princeps, talis populus. Sed egregie dixit poeta ille, Mobile mutatur semper cum principe uulgi. Quare amplissimi senatus imaginem, uel in ipso populo spectare apud uos licet. Sed heu cladem ingentem illam, ex quo magno illo reipublicę uestre princepe orbatu estis PHILIPPO Forstenbergero, in omnibus bonis studijs, ac uirtuosis actionibus uiro admirando. Cuius ego priuatus priuatim & amore, & admiratione, adhuc ita afficior, ut eius sine suspirijs nunquam, sæpissime etiam lachrymis obortis, mentionem facere possim. Quanto magis putandum est uos uestrum uulnus sentire, à quorum corpore ille relictus est. Erat uir eius ætatis ut recte immatura morte ereptus dici possit, sexagenario propior quàm quinquagenario. Sed corpus uegetu aderat, ac animus uiuidus, ingenium acre, iudicium exactum, mores mansueti, sermo suauis. Et in summa, natura ad benefaciendum omnibus, neminem lædendum nata, quod quo rarius est, eo maiorem laudem in magistratu meretur. Vtrāq; insuper callebat linguam, gręcā supra mediocritatem, latinā ut cum magnis professoribus certare potuisset, quod aliquot ipsius ad me scriptę epistolę testantur. Et quum tota uestra respublica ex eo penderet, & perpetuis senatus curis grauaretur, tamen quantum succisui temporis suffurari poterat, id totum conuertebat ad optimorum autorum lectionem. Et hoc tempore præter reliqua, totum Horum græcum perlegendum ac conferendum suscepit. Hac faciētem superioris ætatis inauditus Germanis æstus corripuit, & ardentissima febris abripuit, quam eodem tempore in me sæuientem summa difficultate ego uix à me reieci. At siue bonorum usum nobis non fauent inuida fata, uelut poetis quibusdam placuit, siue ostendit deus magis quàm tradit optimarum rerum fruitionem: profecto uestrum luctum, priuatus meus dolor proferre coegit, quo optimi ac sapientissimi uiri orbatus reuera reipublicę uestre immaturus, à me publice deplangeretur. Videor tamen mihi aliquanto leuius ferre illius ad meliorem uitam translocationem, quum considero qualia reipub. decora post se reliquit, generos suos, uirum omnibus bonis studijs fouendis ac prouehendis natum, Iu

N V N C V P A T O R I A .

tum, Iustinianum ab Holtzhufen. Et soceri uestigijs innitentes, ex uete-
ri familia ad Iuuenes appellata, Orthonem ac Danielelem. Nec desunt
alij egregij uobis uiri, qui certatim conentur, ut sincera pietas uigeat, &
literarum ac bonorum studiorum honos perftet ac conseruetur. Sed
quorsum tandem hæc omnia? Nimirum quum in urbe uestra uiuo tot
insignibus decoris celebri, ut uidear uirtutis uestre aliquam rationem
habuisse, dum & grauissimis iudicijs uestris approbatam hæc operam
meam uideri uolo, & uicissim meam erga uos uoluntatem declarare
cupio: quo utraq; re cognita, studiosi rerum medicarū hoc Aetij opus
à me latine conscriptum, alacrius excipiant, auidius perlegant, studiosi-
us sequantur, & medicando de humano genere bene mereantur. Quod
ubi continget, nō dubito quia intelligent hoc uestrū uiri Francfordē.
beneficium esse, quod tantum autorem, insignem medicum, in publi-
cum usum editum habent. Crede mihi quisquis es rerum medicarum
studiose, si totum Galenum contractum, si totum Oribasium explica-
tum, si Paulum ampliatum, si omnes ueterum speciales, tum per phar-
maca tum per chirurgiam aggressiones, ad omnes affectiones, in sum-
ma habere uoles, Aetium habes unde totum hoc petere, ac ferre potes.
Neq; refert an sit Aetius ille Hæresiarcha, aut alius quispiam Amide-
nus Opliciij comes, uelut quædam exemplaria præscriptum habent.
Certè Aetium hæresiarcham uarijs artibus instructum fuisse, & philo-
sophicis Aristotelicis rationationibus ingenium exercitatum habuisse,
D. Epiphanius abunde declarat, in opere contra Octoaginta hæreses,
quod item recens in latinam linguam trāstulimus, ut fieri potuerit, eum
etiam medicinam tractasse. Nam quod comitis dignitas recentior sit,
quàm ut Aetio hæresiarchæ competat, penitus falsum est. Habet enim
iam citatus à me D. Epiphanius, comitum appellationem ac dignita-
tem sub ipso Constantino Magno receptam. Et Iosephum quendam
è Iudæo Christianū factū, ea dignitate à Constantino Magno dona-
tū tradit. Potuit igitur fieri, ut aurifaber usq; ad perfectā etatē Aetius,
& postea ad Aristotelicæ philosophiæ studia progressus, & deinceps
à Georgio Alexandrino diaconus constitutus, tandem per principem
aliquem, Opliciij comes factus sit, & ut uir philosophiæ doctus, hoc o-
pus ex ueteribus Medicis collegerit. Sed nihil pronūcio, neq; quicquā
refert. Cæterū quod ad operis totius diuisionem attinet, manu scriptū
exemplar meum habuit τετραβιβλῶν inscriptionē, ante aliquot sermo-
nes partiales. Velut uerbi causa, ante nonū sermonē, Αἰχὴ τοῦ θ. λόγου
Αἰτίς, πρῶτος τῆς τετάρτης τετραβιβλῶν. Et ante sermonem xiiii. Αἰ-
χὴ τοῦ

E P I S T O L A

χρὶ τοῦ λόγου Αἰτίας, πρῶτος τῆς τετάρτης παραβίβλος. Quam rationem sequutus, totum opus in quatuor tetrabiblos, hoc est quaterniones uniuersales, singulos quatuor sermones siue libros partiales continentes distinxī, uelut autorem ipsum ab initio fecisse apparet. Porro quod superest precor, ut & uobis uiri Francforden. ex huius operis editione merita gloria, & studiosis lectionis ac imitationis fructus contingat. Mihi satis est, si in huius dramatis actu non penitus (quæ quorundam malignorum ingeniorum improbitas est) fuero ex scena ac theatro explosus. Valete. Francfordiæ, calend. Nouembribus, Anno Christi M. D. XLI.

AETII MEDICI GRAECI CONTRACTAE MEDICI

NAE TETRABIBLI PRIMAE SERMO PRIMVS,
PER IANVM CORNARIVM Medicum
Physicum latinè conscriptus.

De simplicibus pharmacis ex plantis, iuxta ordinem literarum græcarum:
Item de multorum oleorum præparatione.

DE SIMPLICIVM MEDICAMENTORVM
VIRIBVS.



DIFFERENTIAE particularum actionum in singulis pharmacis fiunt, ex eo quod singula ex ipsis ad tantam caliditatem aut frigiditatem, aut siccitatem, aut humiditatem, aut partium tenuitatem, aut earundem crassitudinem accedant. At uero ad quantam tandem accedant singula, enarrari non potest iuxta exactam sanè ueritatem. Sed nos tamen etiam hoc ipsum manifestis, & ad artis usum sufficientibus distinctionibus comprehendere tentauimus, unū quidem genus esse demonstrando, quod ad simile corporibus nostris temperamentū perueniat, ubi à caliditate quæ ipsis corporibus inest, transmutationis & alterationis principium quoddam assumptum sit. Alterum uero calidius fieri quàm pro nostro temperamento. Atq; huius quatuor ordines facere mihi uisum est. Primum qui adhuc ad sensum obscurus est, ut ratione deprehendere oporteat. Alterū ab eo secundum, qui iam ad sensum manifestus est. Tertium qui fortiter calfaciat, nondum tamen urat. Post hunc quartum & ultimum qui uisiorius sit. Sic & frigefacientium primum ordinem eorū quæ ratione indigent ad demonstrandum quod frigefaciant. Secundum eorum quæ sensibilibiter fragefaciunt. Tertium fortiter frigefacientium, nondum tamen mortificantium. Quartū mortificantium. Iuxta eandem proportionem etiam humectantium & siccantium. Fiat autem clarioris doctrine gratia harum distantiarum à temperamento ordo, ita ut frigidorum primus sit, in quo quis locauerit rosaceum oleum, aut ipsam rosam. Secundus ab eo sequens proximè, in quo rosæ succus. Deinde tertius & Quartus, donec ad frigidissima perueniamus, cicutam & papaueris succū, & mandragoram, & hyoscyamum. Rursus in calidis anethum & foenum græcum primo ordine ponamus. In secundo quæ secunda apparent: ita & tertia & quarta, donec ad uisoria deueniamus. Iuxta eundem modū in humectantibus ac siccantibus medicamentis, initio rursus à temperatis sumpto, ordines cōsequenter usq; ad summa faciemus. huiusmodi enim cognitio non parū ad medendi methodum confert. Conuenit porro præexercitatum esse in sensu gustus, & proprietatem unicuiusq; qualitatis saporum in memoria habere, uelut uerbi causa: Quum corpus aliquod linguae admotum uehementer siccet, & constringit, ipsamq; ad multam profunditatem exasperat, uelut pira syluestria immatura, & corna, ac similia: omne tale Acerbū nominatur, hoc est intense Austerum, Quæcunq; uero in contactu linguae, ipsam non con-

a stringunt,

stringunt, neque contrahunt, uelut adstringentia solent, sed contrarium facere uidentur, extergereque & eluere, talia omnia Salsa appellamus. Quae autem his ad haec amplius extergent simulque moleste exasperant, Amara uocantur. Quae uero mordent & cum ualida caliditate erodunt, Acria. Quae uero absque caliditate mordent, Acida dicuntur. Habentque praeterea uim fermentandi terram, si ad ipsam effundantur. Quaecumque autem uelut sublinunt & replent & sedant exasperatas & quasi erosas linguae partes, ipsas cum manifesta iucunditate contingentia, Dulcia nominantur. Si uero sine manifesta iucunditate id faciant, Pingua appellantur. Si quidem igitur Acrimoniam manifeste percipere uelis, in allio & caepis ac similibus frequenter degustatis ac diu commanducatis disces, ita ut affectus ex his sensum diligenter memoriae commendes. Si uero adstringendi uim palam percipere uoles, in Galla & Rhoë ac similibus assequere, si Amaritudinem, nitri ac fellis gustu, si Dulcedinem, sapae ac mellis. Praeterea siue qualitatis expers, siue qualitate ad gustum medium cognoscere uelis, aquam accipe, eiusque gustum diligenter in memoria retine, & maxime purissimae aquae, & nullam praedictarum qualitatuum respicientes, neque dulcedinem, neque acrimoniam, neque acorem, neque amaritudinem, insuperque neque multum calidae, neque nimium frigidae. Inde enim progressus, promptus ad obscurorum saporum cognitionem peruenies, & eorum quos ego mediocriter dulces, alij aquosos uocare malunt. qualis est harundinum uiridium & graminis succus, item tritici & ordeï, & aliorum multorum moderate dulcium. & qualis est aqua qualitatis penitus expers, inter caliditatem ac frigiditatem manifestam, mediam quantum eius fieri potest constitutionem habens, aut etiam paululum ad frigiditatem declinans. Quod si quid eiusmodi sapore praeditum, non liquidum sed siccam compagem habeat, id ipsum necesse est terreum esse, & citra mordacitatem siccare. Nominantur autem talia Emplastica Graecis, hoc est meatus obducentia. uelut est amyllum, & plurima ex metallicis diligenter lota, pomphilyx, cerussa, Cadmia, terra Cimolia, Samius Aster, & similia. Quaedam uero ex ipsis non solum terrea, sed etiam aquosa natura sunt. aliqua etiam aërem non modicum intra se habent, uiscosa quidem haec, & ob id meatus oblinentia. Duplex est enim medicamentorum meatus obducentium natura. Altera terrea exacte & sicca, altera uiscosa penitus, uerum mixta ex aqua & terra, & plerumque etiam aëre, uelut oleum dulce. At uero candidum oui simile quidem quodammodo est, uerum magis terreum quam oleum. Caseosum etiam in lacte meatus obducit, & pinguedo suis. Tauri equidem & hirci pinguedo siue adeps, acris & magis terrea quam suis pinguedo est. Asinis autem & galli calidior quidem & siccior quam suum est, sed tenuium partium, & nequaquam terrea. Itaque pinguedines si non acrimoniam aliquam habent, meatus obducunt, & magis sicciores, & amplius terreae. Talis est & Cera probe lota. Et talia quidem sunt medicamenta Emplastica appellata. Quae uero adstringunt terrea sunt, & crassarum partium compagis suae mole, frigida autem qualitate. At uero Arida tenuium partium corporibus sunt, frigida autem similiter ut adstringentia. Quaecumque autem in sapore terreas partes repraesentant, quae colliquatae & contrahunt & resiccant humectiores sensiles linguae partes, siquidem asperiora sunt, Acerba dicuntur; minus uero aspera, Austera, & recte talium saporum temperamentum Frigidum dicemus. Quandoquidem autem inaequaliter resiccant, hoc est enim exaspera

exasperare, fuerint utiq; omnino etiam terrea. Omne enim aquosum aqua-
liter permeat corpora, & diuulsum rursus facile unitur. Terreum uero diuella-
latur quidem, non tamen facile rursus coit. Et sanè si sensus proprietatem in
utraque affectione in memoriam reuocaueris, iisdem testimonium præbebis.
Etenim Acidorum saporum transitus, uelox est in sensilibus partibus: Acer-
borum autem, tardus. Et Acida per profundum corporum actionem suam ma-
gis ostendunt, Acerba uero in superficie. Cæterum ubi experiri uoles since-
ræ acerbatis actionem, si quidem eadem res gustanti tibi apparuerit acerba
simulq; mordens, hanc speciem me monente relinques, & acerbum absque
mordacitate requires, & quod neque acidum, neque dulce, neq; amarum
est, sed quantum eius maxime fieri potest, nullam omnino qualitatem &
uim adstrictioni habens. Superuacuum enim & uanum est, tale
pharmacum experiri. Incertum namq; est an ob adstrictionem, siue aliam
quandam ei permixtam qualitatem, siue per utrasque, circa corpus cui ad-
motum est, efficax fuerit. Chalcitis igitur & Misy, atramentum futorium, &
squama aris, fori, & Armeniacum pictorium, argentum uiuum, & innume-
ra alia adstringentia, simulq; mordentia, iuxta utrasque qualitates in singu-
la corpora quibus adhibentur agunt, & tamen impossibile sit docere palam,
num per adstrictionem, an per acrimoniam, urendi uim habeant. Nam si
intra corpus sumantur talia crassarum partium existentia, & uiribus magis
calida, & propterea temporis progressu in permutatione intra animalis cor-
pus ignescentia, ad candefacti igne lapidis aut ferri similitudinem exulcerant
& urunt uentris partes, & neque distribui in corpus possunt, ob grauitatem.
Præstabilius igitur est plura alia consequenter degustare, ac diligenter consi-
derare sinceram adstrictionem seorsim per se, quantum eius fieri potest, atque
ubi talem repperis, iam tandem ad iudicandum illud medicamentum iuxta
prædictam methodum progredere. Velut si gustanti tibi balaustium, aut gala-
lam, aut cytinum, aut hypocyrtidem, aut acaciam, aut rhoem, aut aliud quid
eiusmodi, appareat exacte acerbum esse, ita ut palam sit nullam aliam qua-
litatem habere, in eiusmodi iam expendere ac explorare adstrictionis actio-
nem oportet. Acerbum itaque corpus terreum est & frigidum. Resoluetur
autem necessario tripliciter, aut calefcens, aut humescens, aut utrumque si-
mul perpetiens. Si igitur calefcet solum, non euadet neque humidius, neque
mollius, sed durius existens dulcedinem acquirere: quemadmodum quercinæ
glandes, & præsertim quæ castaneæ nominantur. Si uero humescat solum, &
humiditas crassarum partium ac aquosa existat, austerum euadet. Nam Acre-
bum exolutum, austerum producit saporem. Omnis enim saporis uim aquo-
sa humiditas hebetat. Si uero humiditas tenuium partium & aërea accedat,
Acidum reddetur. Frigiditas enim tenuium partium existens, acidam qualita-
tem efficit. At uero si humescat simulq; calefcet, cum aquosa quidem humi-
ditate, in dulcedinem transibit, cum aërea uero in pinguitudinem. Etenim
arborum fructus qui natura iam facti dulces nobis apparent, acerbam primum
& siccam compagem habent, singuli iuxta arboris suæ naturam, progressu
uero temporis fiunt quidem humidiores, uerum aliqui aciditatem insuper ad
acerbam assument, quam paulatim deponentes, rursus dulces euadunt
maturitatem adepti. Quidam neque in arboribus, sed decerpti post tempus
aliquod dulcedinem acquirunt. Alij quidam neque media interueniente aci-
ditate,

ditate, sed statim ab acerbitate in dulcedinem transeunt, quemadmodum oleæ fructus. Cæterum calore maturi fiunt omnes, qui duplex natura existit, Alter proprius & singulis à natura insitus; Alter forinsecus à sole allatus. Atqui si ab initio quidem acerbiores sunt, maturi autem dulces fiunt, ex caliditate utique dulcedo, ex frigidity aciditas & acerbitas ipsis adest. Et sanè manifestum iam factum est, quod fructus ab initio acerbi existentes, progressu temporis partim dulcescunt, partim acefcunt, partim austeri fiunt: Aliqui uero semper acerbi permanent. Quidam etiam redduntur pingues. Quin & iuxta dictarum qualitatum mixturas, multiplicem habent uarietatem. Acerbi itaq; in finem usque permanent, ilicis, arbuti & corni fructus, & consimiles. quoniam frigidi & sicci, uelut ab initio erant, permanent, nullam aliam alterationem præterquam solius augmenti acquirentia. Acerbus autem simulq; dulcis est, myrti & piri syluestris & glandis fructus. Austerus tantum, uitis amineæ uua, & uinum, & quæ his similia, Austerus simulq; dulcis, palmæ fructus, & uinum Surrentinum, & quæcunque dulcedinem adstrictione permixtam habent. Dulce autem solum est Theræum & Scybelites, & Siræum, siue hepsēma quod nos sapam appellamus, & quæcunque alia his similia. Pinguis uero exacte tum fructus tum succus oleæ est: Imò etiam alij omnes ex quibus oleum paratur. Quemadmodum autem acerbus succus progressu temporis dulciior primùm, deinde etiam acrior & amarior euadit, & postremum penitus amarescit. Eodem modo etiam frigidus succus acidior statim fit, & si perfectè perfrigescat, citius adhuc acefcit: fructus quoque statim inter colligendum multa humiditate repleti, item qui aliàs aquam adsumpserunt, promptè ex leuissima occasione acidi fiunt. Si enim uua immatura acida est, matura uero dulcis, & maturum fieri fructibus omnibus ex solari caliditate contingit. Manifestum est imperfectiorem ac frigidiorē, acidum esse, perfectiorem uero & calidiorem, dulcem. Quum igitur uinum ex perfrigeratione acefcit, conspicuum est quod ad eundem rursus redit saporem, ex quo prodijt, uua immaturæ inquam. Distat tamen acetum ab uua immaturæ succo uiribus, in eo quod acetum acrimoniam quandam ex putredinosa caliditate adeptum est. Uua autem immaturæ succus non habet acquisitam caliditatem, & propterea neque aceti acredinem: Vnde etiam magis tenuium partium est acetum quàm uua immaturæ succus, uelut sensus quoque testatur. At uero acrimonia aceti frigidity aciditatis euincere non potest, uerum ad penetrandi celeritatem ipsi inseruit. Quanto enim citius meatus penetrat calidum quàm frigidum, tanto promptius acris sapor quàm acidus sensilium corporum meatus pertransit, ut acris uelut prauus iter struat, frigidus uero non ita longe post sequatur. Et propterea sanè sensus mixtus ac ægre explicabilis non permittit pronunciare, Acetum simpliciter frigidum esse. percipimus enim in ipso igneam quandam acrimoniam. Verum frigiditas ex sequenti aciditate destruit & extinguit euestigio acrimoniam, quare etiam multo maior sensus frigidity quàm caliditatis nobis contingit. Porro quidam æstatis tempore poscam bibentes palam refrigerantur, & sine siti permanent. Quandoquidem uero sitis dupliciter fit: Altera ex humiditatis inopia: Altera caliditatis redundantia. Eam quæ ex siccitate oboritur non sanat acetum. Eam uero quæ ex caliditate oborta est, sanat. Humectare enim non potest acetum per se, sed non ingenerose perfrigerat.

Igitur

Igitur neq̃ sitim ex sicca intemperie, neq̃ ex calida & sicca obortam, acetum potatum unquam sanare potest. Si uero concurrant aliquando simul humiditas cum caliditate, eiusmodi sanè sitis optima medela acetum erit, aliter sitientibus, tum in febribus ardentibus alijsq̃ omnibus adurentibus, tum in æstate ac calore uehementi, composita affectio est ex caliditate ac siccitate, ut merito compositam medelam requirant ex aceto & aqua: Acetum quidem ut nō insilrenue refrigerans, & partium tenuitate facile penetrans, Aquam uero ut quæ supra id quod refrigerat, & humidissima omnium existat. Nihil enim humidius aqua. Cæterum in ardore præcordiorum potior aceto est uuæ immaturæ succus forinsecus impositus, tum quod nullam habeat uiolentam & offendentem frigiditatem, tum quod neq̃ permixtam mordacem caliditatem. Qui enim ita affecti sunt, lenimento inuiolento opus habent, quod forinsecus nullam mordacem acrimoniam inducat. Vuæ itaq̃ immaturæ succus, non solū acidus est, sed etiam acerbus. Nam ut dictum est, omnes ferè arborum fructus circa primam generationem gustu acerbis sunt. Non autem acidū solum frigidum est, sed etiam acerbū ac austerum. Et si quis aliquando gustauit mala cydonia, aut myrti baccas, aut mespila, is sanè manifestè nouit alium esse sensum ab acidis in lingua nostra productum, alium ab acerbis aut austeris. Acerba enim intus protrudere partem uidentur, quam ex omni parte æqualiter contingunt, uelut exprimentia constringentiaq̃ ac contrahentia. Austera uero in profundum subire uidentur, & asperum quendam ac inæqualem sensum inducere, ita ut resiccando omnem sensilium partium humiditatem expellant. Quare alia est affectionum proprietates, non satis clare explicabilis, & in acerbis, & in austeris saporibus. Sed non puto tamen hominem esse qui non ex iam relatis incitatus intelligat quid dicam. Omne igitur corpus acerbum & ab alijs qualitatibus purum, omni experimento factū frigidum inueni. Omne autem dulce calidum est, & non immodice suā perexcellit caliditatem quæ in nobis existit: Sed quemadmodū calidæ aquæ contactu delectamur, & maxime ubi fuimus frigefacti, donec corporis partes à frigore congelatæ diffundantur, Excalfacit enim nos, & neq̃ dissoluens, neq̃ scindens partium continuitatem, iucundissima est & utilissima. Sic etiam omne dulce edulium, calidum quidem omnino est, non tamen ad tantam caliditatem peruenit ut offendat, sed intra terminos diffundendi & æquandi denylcendiq̃ ac molliendi manet. Omnia enim alimenta his quæ aluntur natura conuenientia & tota substantia familiaria existunt. Statim autem oportet & moderate calida esse hæc, iuxta corporum quæ aluntur proportionem. Et propterea eduliorum ac medicamentorum non una species omnibus hominibus conuenit. Vnusquisq̃ enim iuxta propriam substantiam simulq̃ affectionem, ab utrisq̃ tum utilitatem, tum uoluptatem percipit. Verum quum hæc ita habeant, Edulium sanè minus dulce, minus calidum est, magis dulce, tanto calidius est, quanto dulcius. Si uero modum caliditatis excedat, neq̃ dulce tale est, sed iam amarum apparet, uelut mel inueteratum, & quod diutius eorum est, & singula alia dulcia. Quæ enim temperamentis corporum quæ aluntur similia sunt, citra cocturam & præparationem, iam dulcia apparent. Quæ uero dissimilia, omnia iniucunda sunt prius quàm præparentur. Opus est autem calida castigare frigiditate, frigida uero calfacientium condimentorum mixtura, & igne. Eodem modo per humiditatem emendantur quæ terrea sunt & sicca, magis quàm cōuenit. Siccitate uero quæ plus humida & aquosa. Dulci igitur supra hoc quod calidum magis aut mi-

nus existit, necessario etiam humidum magis aut minus est. Quod uero uelut superassatum amarum euadit, simile calci & cineri, siccum & calidum necessario redditur. Et sane ob id omnia amara extergere solent, scindereque dissecare uiscofos ac crassos humores, quemadmodum cinis & nitrum. Quod autem amarus sapor sicci ac terrei temperamenti est, tum ex eo quod ægerrime omnium amara putrescunt, tum quod nequaquam uermes & alia animalia gignant, qualia uidelicet in radicibus & herbis & fructibus putrescentibus innasci solent, colligere datur. Nam in humidis corporibus maxime uermes & putredines gigni uidemus. Porro exacte Amara, uoco autem sic quæ nulla alia sensibili qualitate participant, omnia ferme animalia, non homines modo, in cibis auersantur, propterea quod omne animal humidum magis aut minus existat, Amara autem sicca sint ad cineris ac calcis similitudinem. Quemadmodum igitur exacte quidem Dulce nutrit, exacte autem Amarum non alit, sic quod inter hæc medium est nutrit quidem, sed minus quam dulce. Propinquus autem amaro est sapor falsus, nam & terrei utrique sunt & calidi, differunt tamen inter se non obscura differentia, quod amarus à caliditate & siccitate magis sit attenuatus & elaboratus ac quasi subactus. Sed & in salis generibus sic habet. Quæ enim dura sunt & densiora & magis terrea, qualia fere omnia fossilia existunt, minus calida ac tenuium partium sunt. Quæ uero friabilia ac laxa, magis tenuium partium & uiribus calidiora sunt, & aliqua ex ipsis subamara, medium quodammodo obtinentia inter salem & spumam nitri. Et sane quicquid falsum diutius calfeceris, statim amarum euadet. Atque sic etiam Asphaltidis stagni aqua, quam mare mortuum appellant, in cauo & calido loco contenta, & à sole exarsata, amara redditur. & ob id etiam æstate magis quam hyeme amara existit, & si hauriam eam in uase cauo ad solem exponas tempore æstiuo, cõfestim magis amara seipsa facta tibi apparebit. Quare in illa aqua neque animal innascitur, neque planta. Sed & quum flumina magna multumque piscosa in ipsam influant, & præsertim id quod prope Hierichuntem est, quod Iordanem appellant, nullus piscis oras fluminum superegreditur, & si quis captos stagno immittat, statim corrumpi ipsos uidebit. & propterea stagnum mortuum, siue mare mortuum appellant. Adeo exacte Amarum omnibus plantis & animalibus inimicum est, squallidumque ac siccum natura, uelut fuligo ex adustione factum. De Amarorum igitur saporum uiribus satis dixisse uidemur, dissectorios & extensorios ac attenuatorios ipsos esse declarantes, atque adeo calidos in tantum, ut nondum urant. Ad Acres iam sermonem conuertamus, eosque primum calidos exacte esse dicamus, deinde erosiuos & ustorios, crustamque inducentes & colliquatorios, forinsecus cuti impositos, si uero intra corpus assumantur, qui tota substantia quibusdam animalibus aduersantur, eos omnes putrefactorios esse, & insectorios illorum animalium, uelut cantharis & buprestis hominis. Qui uero secundum solius caliditatis excessum, siquidem crassiores sint & terrei, uelut Auripigmentum & Candaracha, ac similia, eos exulceratorios internarum partium pronunciamus. si uero tenuium partium sint, qualia familiaria nobis semina existunt, daucus uidelicet & anisum, ac similia, urinantientes & exudatorios, & simpliciter ac summatim loquendo, sectorios ac discussorios. Conferunt etiam quidam reiectionibus ex thorace, & menstruum fluxionibus. Ceterum acres sapores, non solum forti caliditate ab amaris differre uidentur, sed etiam in eo quod amari omnes non modo calidi sunt,

sunt, sed etiam sicci ad cineris similitudinē. At uero in acribus, quicquid non sunt amari, multa aliquando permixta est humiditas, & propterea non pauca acria nobis in ciborum usum ueniunt. Quando uero iam & de saporibus, quæ dici poterat relata sunt, reliquum utique fuerit & de uaporibus dicere. Plerique certe uapores similiter ut sapores nos afficiunt. Nam acida omnia ipsumque etiam acetum, & olfactum & gustum eodem modo excitant. Acria autem, uelut allium & cepa & con similia, non minus olfactum quam gustum stimulant & recitant. Eodem modo & in singulis alijs, similis ferme odoratus ac gustus sensus est, adeo ut quorundam corporum quæ nunquam gustauimus, ueluti stercoris, persuasum habeamus non scire qualitatē. & ob id neque omnino talium rerum gustum attentamus, quod olfactum ualde multum fidei habeamus. Quin & odorata edulia quæ cōputrefacta molestum odorem nobis afferunt, statim abijcimus, ne tentato quidem gustu. Et ferme in omnibus mutuo conspirant odoratus & gustus. Ad duas autem appellationes pleraque odorabilia reducimus odorata aut foetida nominantes. Odorata quidem iuxta proportionē dulcium ad linguā, foetida uero non dulcium. Videtur porro de corporibus non odoratis aut omnino parum quid uaporis desluere, aut multo minus quam pro molis symmetria, uelut in falsis & maxime acerbis. Crassarum enim partium & frigida est substantia acerbiorum, quare uerisimile est etiam quod defluit ab ipsis, modicum esse & crassum, & mole uelut terreum, ut neque cerebrum sua respiratione petere possit. Quare nihil certi ex odore coniectare licet de ipsorum temperamento, uelut ex gustu. Nam inodora crassarum partium substantiam habent, sed inde non manifestum est, quantum caliditatis aut frigiditatis possideant. Odorata autem tenuium partium aliquo modo sunt & calida, quantitas tamen tenuitatis aut caliditatis, non etiam ex odore indicatur, sed ex gustu. Quod uero nihil certi de temperamento indicent odorata, in causa est inæqualitas substantiæ ipsorum. Et propterea in Rosa ex odore coniecturā facere non possumus de omnibus in ipsa qualitatibus. In gustu uero omnes gustabilium corporum partes æqualiter linguæ obueniunt, mouentque singula sensum iuxta suam ipsarum naturā, nimirum Acerbum in ipsa, quod est terreum & crassarum partium ac frigidum, item Amarum, quod tenuium partium est ac frigidum. Et tertium in super Aquosum, necessariō frigidum, ut non sit certum uelut dictum est, de simplici pharmacorum uiribus omnibus ex odore coniectare. Amplius uero nihilo magis ex coloribus consicere possumus, de ipsis. In singulis enim coloribus inueniuntur & calida & frigida, & sicca & humida. Possibile tamen est in singulis generibus aut seminum, aut radicum, aut succorum, etiam ex colore indicationē quandam lumere temperamenti. Velut uerbi causa, cepa & scilla & uinum, quantum fuerint albiora, tanto minus sunt calida. subflaua uero & fulua, calidiora. Quin & triticum & cicera, & phaseoli, ac cicer, iridis quoque radix & asphodeli, & multorum aliorum, simile quiddam perpetiuntur. In singulis enim generibus in uniuersum quæ fulua & ruffa & flaua sunt, calidiora albis existunt. Quare si quid etiam inde de medicamentorum uiribus coniectare licet, etiam hoc auxilium habes. Optimū quidem igitur ut dictum, & sæpe demonstratum est, singulorum uires ab exacto experimento inuenire, neque enim in hoc falli potest. Priusquam tamen experimento uim cognoscas, gustus multum indicat, cui attestatur paululum etiam ipse odor. Horum autem omnium, quemadmodum etiam aliorum quorundam utilissimorum, in summa compendium cōtraham, postquam sanè speciatim quantum possibile fuit, uniuersales uires & uniuscuiusque

iusque actiones explicui. Quandoquidem uero medicamenta partim ex animalibus sunt, partim plantæ aut fructus, aut horum succi siue liquores existunt, partim uero ex metallicis sumuntur. Præstabilius mihi uisum est de plantis primum differere, non omnibus scilicet totius terrarum orbis, sed de quibus compertum per experientiam habemus, nam & plurimum ipsarum genus prouenit, facultateque potentissimum habetur (atque id iuxta ordinem literarum græcarum.) Deinde consequenter etiam de metallicis dicere, atque sic ad animalium partes peruenire.

Abrotonum.

Abrotonum calida & sicca uis præditum est, in tertio ordine & discessu à moderatis locatū, gustu multum amaro, qui sapor indicatus est terreæ substantiæ esse, & à largo calore attenuatus esse, ut non instrenuè calfaciat & siccet. Quare comma huius herbæ unā cum floribus in oleo coquitur, quo illito ante accessionem his qui rigore per circuitum repetente apprehenduntur, minus rigeant. Eiusdem decoctū potum aut per clysterē infusum, lumbricos occidit amplius quā absinthium. Modica autem participat acerbitate abrotonum, & ob id stomacho incōmodum est, Species habet duas marem & fœminam.

Abrotonum uisum.

Abrotonum uisum calidum & siccum uiribus est, magis quā cucurbita sicca uis, & anethi radix: illa enim ulceribus humidis & sine inflammatione perfectis conueniunt, & propterea maxime ulceribus præputij pudendi apta uidentur. Abrotani autem uis cinis omnibus ulceribus, mordax est, quare alopecij cōfert, oleo cicino, aut raphanino, aut sicyonio, aut lentiscino, aut ueteri dilutus.

Agnos, Vitex.

Huius arbuti folia, flores & semen tertio ordine calida & sicca sunt, & multū tenuium partium. Fructus in cibo assumitur, calfacitque manifestè, simulque capitis dolorem infert. Frictus minus caput tentat, sed modicum alimentū corpori sufficit, atque id siccans ac calfaciens, minime uero flatuosum. Et propterea etiam impetus uenereos inhihet. Vnde non solum in cibo ac potu acceptus ad castimoniam conferre creditus est, sed etiam substratus. Et ad hepar ac splenem indurata ac obturata, uiticis semen magis conuenit quā ruta.

Agrostis, Gramen.

Graminis radix moderatè frigida est & sicca, & ob id cruenta uulnera glutinat, ipsa herba imposita cataplasmatibus uice non fortiter frigefacit, uerum in medio humiditatis ac siccitatis consistit. Mordacitas & partium tenuitas in radice modica est, ut aliquando calculos conterere cognita sit, decoctum eius bibentibus. Semen uulgo nascentis debile est: Parnasiacæ autem urinā ciet, & fluxiones uentris ac stomachi siccant: Estque uis ipsius siccatoria, tenuium partium, & subacerba.

Anchusæ quatuor.

Non eiusdem facultatis omnes Anchusæ existunt. Quæ enim Onodea appellatur adstringentem simulque subamarā abunde radicem habet, ut etiam corpora densare, & moderate attenuare, extergereque ac abluere biliosos flosque humores possit: atque sic & ictericis & splenicis ac nephreticis utilis existit. Frigefacit etiam multum, unde cum polenta in cataplasmate imposita, erysipelatis medetur. Exterget autem non solum pota, sed etiam forinsecus imposita, & ob id uirilgines & lepras sanat cum aceto. Folia huius herbæ debiliora radice sunt, non tamen siccandi & adstringendi uis carent, unde & uentris profluuiū sanant cum uino pota.

pota. At uero Lycopfos appellata similiter erysipelatis conducit & radicē habet magis adstringentē quā onoclea. Onochilos autem quē etiam Alcibiadiū appellatur, uim habet magis medicatā, & morsis à uipera multum conducit in castaplasmatis imposita appensāq; & in cibo sumpta. Quarta parua est & ferē sine nomine, consimilis Alcibiadio, uerum plus amara & magis medicata, & propterea ad lumbricos latos apta, acetabuli mensura cū hyssopo & nasturtio pota.

Agaricum.

Agaricum uim habet calfactoriā & discussoriā & dissectoriā crassorum humorum, & obturationes in uisceribus repurgat, & ob id arquat morbum sanatur, in his qui ex hepatis obturatione eum morbum contraxerunt. Prodest & comitiali morbo laborantibus, & rigoribus per circuitum repentibus qui ex crassis & uiscosis humoribus sunt oborti. Prodest & commorsis aut punctis à bestiis quarum frigidum uenenum existit, forinsecus ad locum affectum impositum, itemq; potum hexagrij pondere, hoc est drachmæ unius ex uino. Est & purgatorium.

Ageraton.

Ageraton facultatis est discussoriæ, & leniter quodāmodo inflammationem arcentis.

Adianton.

Adianton siccatur, attenuatur, discutitur. Nam & alopecias densatur, & strumas & abscessus discutit, & calculos frangit in potu sumptum, & reiectionibus crassorum ac uiscosorum humorum ex pectore ac pulmone non parum confert, & fluxiones alui sistit. Medij temperamenti inter caliditatem & frigiditatem existit.

Aizoon, Semperuiuum.

Semperuiuum utrumque & paruum & magnum modicē siccatur, moderatē item adstringit. Verum non moderatē frigefacit: est enim tertij ordinis frigefacientium, & propterea ad erysipelata ac herpetas, & inflammationes ex fluxionibus conducit.

Aegilops.

Aegilops discutiendi uim habet. Itaque inflammationes induratas & ægilopsas ac alopecias mirabiliter sanat.

Aera, Lolium.

Lolium calfacit & siccatur efficaciter, ut propē ad acrium uim accedat, & magis quā iris, non est autem uelut illa tenuium partium, sed ab illa longē prauertitur, & propterea locauerit ipsam quis in principio tertij ordinis calfacientium, & in fine secundi siccantium.

Aegiros, Populus nigra.

Populi nigrae flores calida ut præditi sunt, in tertio discessus à temperatis ordine. In differentia autem siccandi & humectandi paululum à temperatis ad siccitatem populus secessit, & magis tenuium quā crassarū partium existit. Folia ferē floribus similem uim habent, sed ad omnia debiliora & inefficaciora. Resina etiā similem floribus uim possidet, & est adhuc aliquanto calidior. Semen magis tenuiū partium & siccatoriū est, quā resina & flores: calidum autem non adeo ualide.

Acacia.

Acacia tertij ordinis siccantiū est, & secundi frigefacientū, siquidem lota fuerit: illota enim primi est. Nam quum non sit similariū partium, partes quasdam dispersas habet tenues & calidas, quæ ab ipsa per loturam decedunt.

Acalyphe, siue Cnide, Vrtica.

Vrticæ folia & semen multum discussoriæ facultatis habent, citra uehementē calfaci-

calfactionē. Sanāt itaq; panos & parotidas, & crassos ac uiscosos humores ex pectore ac pulmone educunt. Habent autē & flatuosum quiddā, ut etiā impetū ad Venerē excitent, & præsertim semen si cum passo bibatur. Aluum subducit moderate, uelut extergendo ac titillando, non purgando. Gangrenosa itē & cancrofa, & omnino quæ siccari opus est, absq; mordacitate conuenienter sanat.

Acanthus, Melamphyllon, Pæderos.

Acanthus, quem alij Melamphyllum, alij Pæderota appellant, folia habet discussoria ui moderate prædita. Radicem uero siccatoriā & tenuium partium.

Acantha leuce, Spina alba, Leucacantha.

Spina alba, quam aliqui Leucacanthā uocant, radicem habet siccantē moderate & adstringentē. Quare & coeliacis & stomachicis prodest, & sanguinis reiectionem cohibet, & tumores laxos in cataplasmate imposita coercet: item dentium doloribus conducit, si quis decocto eius colluat. Semen tenuium partium & calidum est, unde in potu sumptum conuulsis medetur.

Acantha Aegyptia, Spina Aegyptia.

Spina ægyptia ex qua acacia præparatur, adstringendi ac siccandi uim habet, quare & fluxui muliebri prodest, & ulcera sedis insufflata ad cicatricē perducit.

Acorum.

Acori radix tertij ordinis calfacientium ac siccantium est, & tenuium partium compagem habet. Ciet itaq; urinas, & splenes iuuat induratos. Succus eius deterget & depurgat crassitudinem corniformis oculorum tunicae.

Aconitum, Pardalianches.

Aconitum, siue pardalianches, simile quidem est seridi syluestri, uerum putrefactoriam & uenenatā uim habet. Quare uitandum ne in cibo aut potu accipiat. Attamen ad erodendum ac putrefaciendū externas corporis partes, aut circa sedem utile est, & ad hanc rem cōmodior est radix eius. Dicitur herbe succus, pilorum exortum inhibere.

Acte, Sambucus. Ebulus, Chamæactæ.

Sambucus magna & arborea, quæ acte appellatur. itemq; humilis & herbacea, quæ Ebulus & Chamæactæ, ambæ siccantis facultatis sunt, glutinatoriaq; ac moderate discussoria. Decoctum radice in potu hydropicis prodest.

Halimon siue halmyris.

Halimi fruticis germina quidā comedunt, & recondita afferuant. Vim habet lactis & seminis generatiuā. In sapore falsum quid & adstringens habet, ex quo manifestum fit dissimilariū partium esse: plurima tamen eius substantiæ pars temperatē calida existit, cum humiditate imperfecta ac incocta, leniterq; flatuosa. Radicis drachma una ex aqua mulla pota, cōuulsa, rupta, ac tormina mitigat, & lac attrahit & auget.

Aloe.

Aloe tertij ordinis est medicamentorū siccantium, primi autem intensi, aut secundi exoluti calfacientiū. In gustu mediocriter adstringit, & fortiter amarescit. Subducit uentrē ex genere eorum medicamentorū existens, quæ stercoreū educiua appellantur. Est autem medicamentū stomacho cōmodum si quod aliud, & sinus glutinat. Sanat ulcera agrē cicatricē recipientia, maximē circa sedem & pudenda, propter uim siccandi citra mordacitatem: prodest etiam inflammacionibus earundem partium aqua diluta, & uulnera glutinat, iuxta eundem modum. Simili modo conuenit & ad inflammationes in ore, & naribus atque oculis, &

lis, & omnino repellere ac discutere solet, simulq; exterget paululum, quantum sanè puris ulceribus citra offensionem cōmodum existit. Oculis propterea iugi humore madentibus, maximè puerorum, præter opinionē medetur. Debet autem crassiore modo dilui, & oculorum angulis adhiberi.

Alysson.

Alysson aiunt esse Sideritim herbam appellatā, quæ iuxta vias nascitur ubiq; purpureum florem habens, & folia crassiora. Nomen inuenit ex eo, quod comæ moris à cane rabido mirabiliter succurrit. Vim habet moderatè siccantem & discussoriam. Habet etiam quiddam exterforium, quo uirilignes & maculas faciei à sole prouocatas depurgat.

Alfine.

Alfine siue Auricula muris, herbula similem habet uim helxinæ frigefaciens tē ac humectans. Est enim substantia eius aquosa frigida, quare etiam citra adstrictionem frigefacit. Ideoq; ad feruentes inflammationes conducit, & ad mediocria erysipelata.

Amaracum.

Amaracum calfacit non ingenerose, siccatur autem non uehementer. Verum in caliditate est tertij ordinis, in siccando secundi.

Ambrosia.

Ambrosia pro cataplasmate imposita, uim habet adstringentē & repulsoriā.

Ammium, Ammi.

Ammij semen maximè in usum uenit, calfactoriæ & siccantis facultatis in tertio ordine. Est & tenuium partium, & sapore subamarum ac acre, atque adeo urinam ciens, & discussorium est.

Amarantum.

Amarantum uim habet attenuandi ac dissicandi. Quare menses ducit comæ eius ex uino pota. Grumos etiā sanguinis liquare creditur, non in uentre modo, sed & in uesica, si cum uino mulso bibatur. Omnes autem in uniuersum fluxiones resiccat in potu accepta; uerum stomacho incōmoda est.

Amurca.

Amurca secundi ordinis est calfacientium ac siccantium intensi. Atque hinc sanè corporum temperamento siccorum ulcera sanat, reliquorum omnium exacerbat.

Ampeloprason, Porrum syluestre.

Ampeloprason uim inter allium & porrum mediam obtinet. Stomacho magis incōmodat q̃ satium. uiscosos quoq; humores amplius eo dissicat, & organa obturata ab obstructione liberat. Quapropter etiā urinas & menses sæpe mouit, ubi uiscosorum & crassorum humorum culpa fuerunt suppressa.

Ampelos leuce.

Ampelos leuce, quæ & bryonia, itemq; psilothrū appellat, & Latinis Vitis alba, germina habet quæ recens producta omnibus familiarem cibum exhibens uerno tempore, tanquam edulium stomacho commodum propter uim adstringendi. Habet autem subamaram & acrem leniter adstrictionem, quare etiam urinam ciens. Radix uero exterforia & siccatoria tenuiumq; partium facultate prædita est & moderatè calida, unde etiam lienes induratos eliquat, tum in potu accepta, tum forinsecus cum ficibus imposita. Item scabiem & lepras sanat. Vitis porro nigra, per omnia ei consimilis est, sed debilior.

Amyga

Amygdala.

Amygdala amara attenuatoriā uim palām præferunt, ut etiam maculas solares depurgent, & ad reiectiones ex pectore ac pulmone uiscorum & crassorum humorum plurimum conferant. Sed & obstructione liberant ac depurgant hepatis, splenem, colicam, ac rhenes. Laterum item dolorem sedant. Arbor quoque uniuersa similem uim habet, ut eius etiam radices coctas, maculis solaribus in cataplasmatibus modum imponentes, eas depurgent. At uero dulcia amygdala amariora sunt.

Ammoniacum.

Ammoniacum mollientis intensæ facultatis est, ut etiam articulorum callosas duritias dissoluat, & lienes induratos sanet, & strumas discutiat.

Amomum.

Amomum uiribus acro simile est, præterquam quod siccior est acro, magis autem concoctorium est amomum.

Anagallis.

Anagallis utraq; & quæ cæruleum, & quæ puniceum florem habet, absterforiam uim abunde habet, & præterea subcalidi ac attractorii quippiam, quo etiam aculeos ex corpore euellit, succus ipsarum caput per nares purgat, ob eandem causam, & in summa siccandi uim habent citra mordacitatē, unde & uulnera glutinant, & putrescentibus ulceribus auxiliantur.

Andrachne, Portulaca.

Portulaca in frigefaciendo tertij ordinis est, in humectando secundi. Modicā autem austeritatem complectitur, quapropter fluxiones repellit, maxime biliosas & calidas, earum qualitatem transmutans, alterans, & multum frigefaciens. Atque ea gratia etiam æstuosis febribus, ut si quid aliud commodat, super os uentris totaq; præcordia imposita. Sed etsi probe teratur, adiecto ouo crudo unā cum uittello ac candido, ammixtoq; modico rosaceo, aceti q; momento, euestigiō non uulgarem lenitudinem inducit in ardentibus febribus, si corpus uniuersum inde illinatur, imō penitus extinguit, ut neq; amplius ulla exacerbatio contingat. Dentium quoq; stuporis medela est. Succus eius similem uim habet, quare non solum foris secus impositus, sed etiā in potu sumptus perfrigerat. Quod ipsum contingit etiam, si quis totam herbam in cibo sumat. At uero propter uim subastringendi, etiā dysentericis commodum edulū est, & fluxui muliebri & sanguinis reiectioni; uerum ad hæc omnia multo efficacior est ipsius herbæ succus.

Anemonē.

Anemonē omnes acris & exterioriæ attractoriæq; ac uenarū oscula aperiētis facultatis sunt, unde radix quoq; cōmansa pituitam prouocat, & succus ex naribus purgat, & cicatrices in oculis attenuat. Quin & sordida ulcera Anemonæ purgant & lepras remouent, & appositæ menses prolestant, & lac attrahunt & argent.

Anethum.

Anethū calfacit in tantum ut aut secundi ordinis intensi, aut tertij exoluti esse deprehendat. Verū secundi ordinis principio est inter siccantia, aut primi sine. Si in oleo incoquatur, discussoriū est, & dolores sedat, & somnum inuitat, & crudos ac incoctos tumores concoquit. Vsum tertium ordinem calfacientiū ac siccantium obtinet, & propterea ulceribus humidis inspersum prodest, & maxime in pudendo. Nam in præputio etiam inueterata ad cicatricē perducit. Porro uiride humidius est ac minus calidū, utpote adhuc succulentū, quare magis concoctorium

coctorium est ac somnificum quam siccum, minus autem discussorium.

Anthemis, Chamæmelum.

Anthemis, quæ & Chamæmelum appellatur, calfacit ac siccatur in primo ordine. Est autem tenuium partium, & propterea discussoria & rarefactiua ac laxatoria ui prædita: siquidem igitur fuerit uiridis, in oleo ipsam incoquere oportet, non præsentem uidelicet oleo chamæmelino, in quo maceratus flos insolatus est. Si uero sicca fuerit, modico aceto præmadefacta, deinde in oleo cocta, comoda fit his in quibus nondum desijt materia ad caput afferri. Nam eam quæ iam adest, discutit, & alteram non attrahit, quæ comoditas nulli alteri medicamento contigit. Nechepson Aegyptius ipsum Chamæmeli florem purum in summo uigore colligere iubet, & in mortario tundere, ac probe conterere, ac pastillos medicos fingere, eosque in umbra diligentissime siccare ac reponere. Vfus autem tempore unum ex ipsis terere, oleo primario quod satis est affuso, indeque uniuersum corpus à capite usque ad pedes illinere, in omnibus febrientibus, ac agrum stragulis coopertum fouere: sudor enim inquit mouebitur bonus in his qui euasuri sunt, & à febre liberabuntur. Nam in plurimis experimento hoc cognitum est, & in peregrinationibus maxime congruum existit, ob circumferendi facilitatem. Præcipit etiam in potu pastillos exhibere febricitantibus sabæ quantitate ex aqua calida.

Anisum.

Anisi semen maxime in usu est, acre & subamarum existens, ut propè accedat ad caliditatem ustulorum. Est enim in tertio ordine calfacientium ac siccantium: ob id & urinam ciet, & discussorium est, & inflationes circa uentrem sedat.

Aparine, Philanthropos, Omphacocarpos.

Aparine quam alij philanthropon, alij omphacocarpon uocant, moderate extergit ac siccatur. Habet etiam quid tenuium partium.

Apios, Pirus.

Piri folia & ramuli austeri sunt, fructus dulcedinem quandam aquosam habet, ex quibus manifestum fit temperamentum inaequale iuxta partes existens. Quapropter in cibo quidem stomacho commodant, & sitim sedant: uerum in cataplasmatis imposita pira, siccant & mediocriter frigefaciunt, ut uulnus per ipsam conglutinatum esse sciam.

Achrades, Pira syluestria.

Quæ uero syluestria pira nominantur magis adstringunt & siccant, & ob id uulnera maiora glutinant, & in cataplasmatis imposita fluxiones reprimunt, quemadmodum in malorum tractatu absolutissime tradetur.

Aristolochia.

Aristolochiæ radix ad medicinam comodissima est, amara & subacris existens. Rotunda ex his maxime omnium tenuium est partium, & ad omnia efficacior: ideoque ubi crassus humor fortiter attenuandus est, rotundæ usus expetitur, atque inde adeo dolores ex obturatione, aut crudorum crassitie obortos curat, & infixam extrahit, & putrefactionibus medetur, & sordida ulcera purgat, & dentes ac gingiuas illustrat. Auxiliatur etiam anhelatoribus & singultientibus comitialibusque morbis ac podagricis, ex aqua pota, ruptisque ac conuulsis medicamentum, ut si quod aliud, commodum est. Ex reliquis duabus clematidis odoratiores est, ut etiam unguentarij eam in ungenta assument: uerum ad medendum minus ualet. Longa autem Aristolochia minus tenuium partium est quam rotunda, non tamen inefficax, sed exterforiam ac calidam uim habet, & ob id ulcera incarnat, & ad uteri foras commodior habetur.

b Aracus.

Aracus.

Aracorum semen simile est cicerculis & usu & uiribus, uerum durius quam cicerculae & propterea etiam acrius concoqui potest.

Arceuthos, Iuniperus.

Iuniperus calida est & sicca tertij ordinis in utroque genere. Fructus eius calidus quidem similiter est, sed in primo ordine siccatur.

Arnoglossum, Plantago.

Arnoglossum frigefacit ac siccatur in secundo ordine. Habet & austeri quippiam, quare fluxionibus & putrefactionibus ulceribusque malignis conuenit, atque ea gratia etiam ad dysenterias: nam sanguinis eruptionem compescit, & si quid perustum est frigefacit, & sinus glutinat. Est praeterea etiam aliorum ulcerum recentium ac ueterum curatrix. Citra mordacitatem enim siccatur, & frigiditatem possidet nondum stupefacientem. Semen eius itemque radix similem uim habent: uerum sicciorum & minus frigidam. Et semen quidem tenuissimarum partium est, radices uero crassiorum. Ipsa autem folia siccata, tenuiorum partium uim, sed minus frigidam acquirunt. Propterea radicibus etiam ad dentium dolores utimur, tum commanducantes, tum decocto ipsarum colluentes. Ceterum ad hepatis ac rhenum obturamenta & radicibus, & folijs, & multo magis semine utimur.

Aron.

Ari radix primi ordinis calfacientium ac siccantium est. Habet & uim exterforiam, sed non adeo fortiter uelut dracontion. Radices etiam in cibo acceptae humorum crassitiem moderate dissecant, ut etiam ad reiectiones sputorum ex pectore commodent. Verum dracontion in hos usus praestabilius est. Alias praeparatur ac editur eo quo dracontion modo seruescitur.

Artemisia.

Artemisiae ambae calfaciunt in secundo ordine, siccant autem uel in primo ordine intenso, uel secundi principio. Sunt autem moderate quoque tenuium partium, quare ad rhenum lapides moderate conueniunt, & ad uteri fetus.

Asarum.

Asari radices in usu sunt, acori radicibus uiribus consimiles, uerum magis intense, quare ex his quae de acoro diximus, etiam de asaro notionem sumere oportet.

Aspalathus.

Aspalathus ex dissimilaribus uiribus constat, acris & adstringentibus. Et acris quidem partibus sui calfacit, austeris uero frigefacit, utrisque siccatur, & propterea ad putrefactiones & fluxiones utilis existit. Ad putrescentes in ore gingiuae in uino cocta utiliter colluitur.

Asparagus, siue Aspharagus iuxta Athenienses.

Asparagus petreus siue Myacanthus, exterforiam uim habet, nec tamen ualide calfacit, nec frigefacit. Idcirco rhenes & iecur obstructione liberat, maxime radices herbae ac semen. Et sane etiam dentium doloribus medetur siccando citra calfactionem.

Aster Atticus, Bubonium.

Aster Atticus quem alij Bubonium appellant, quod non solum in cataplasmate impositus, sed etiam adalligatus bubonas ac inguinum tumores sanare credatur. Habet etiam quid discussorium, ut mixtarum uirium sit, uelut rosa, sed bubonium non ita adstringit.

Astaphis, Vua passa, Carica.

Vua passa satiuia coequectoria simulque adstringente & moderate discussoria uim habet.

habet: eadem enim est ratio uuarum passarum ad uuas, quæ est caricarum ad ficus. Et dulciores quidem calidiores sunt: Austeriores uero frigidiores, & adhuc magis acerbæ. Stomachum itaque roborant austeræ, & alium adstringunt, atque his amplius etiam acerbæ. Medium uero statum inter has dulces tenent, neque paulam exoluentes stomachum, neque alium subducentes. Vim tamen cōtemperandi humores semper habent dulces, itemque moderatè extergendi, unde paruos circa os uentriculi morsus obtundunt. Nam maiores morsus generosioribus morsibus opus habent. Præstant uuæ passæ pinguissimæ & tenui cortice prædiatæ. Cæterum uuæ passæ minus quàm caricæ alium subducunt ac extergunt: uerum stomacho commodiores quàm caricæ existunt.

Astaphis agria.

Staphis agria ualde acrem uim habet, ut fortiter pituitā de capite trahat ac extergeat. Quare & ad scabiem confert: Et uistoria quadam ui participat.

Asphodelus.

Asphodeli radix in usu est, uelut ari, & asari, ac dracontij. Vim habet extensoriam ac discussoriam. Vnde in uino albo uetere cocta, & uino calido meracocyathi mensura hausto, menses suppressos celerrimè ciet. Vtæ cinis calidior & siccantior, magisque tenuium partium ac discussorius euadit, & ob id etiam alopecias sanat.

Atractylis, Cnicus syluestris.

Atractylis, siue Cnicus syluestris, uel Androsanton, ut alij uocant, ex spinosorum plantarum genere est, & siccantis ac moderatè calidæ facultatis existit.

Atraphaxis, Atriplex.

Atriplex secundi ordinis est humectantium, primi frigefacientium, adstrictionis nihil habet, sed aquosa est uelut malua, & facillè uentrem permeat. Hortensium genus humectius & frigidius syluestri est. Quapropter inflammationibus ac furunculis incipientibus & augeſcentibus hortenses, uigentibus & declinantibus syluestres cōmodiores sunt. Semen extensoriā uim habet, unde ad morbum regium ex iecoris obstructione abortum utile existit.

Abinthium.

Abinthium calidum est primo ordine, siccum tertio. Succus eius multò calidior quàm herba est, participat & adstringendi ui non obscura, maxime Ponticum, quare extergit, roborat, siccant, & propterea biliosos uentriculi humores ad infernā excretionem deducit, & per urinas euacuat. Magis autem biliosum intra uenas humorem per urinas expurgat. Iccirco ubi pituita in uentre continetur, nihil conducit. Sic etiā si eadem circa pectus aut pulmonem hæreat. Adstrictoria enim facultas in ipso fortior est quàm amara. Quoniā uero acrimoniā quandam possidet, calidum amplius quàm frigidum existit.

Balanos myrepſica, Glans unguentaria, Myrobalanum.

Glans unguentaria quæ myrepſica balanos, & myrobalanon appellatur, extensoriam & incisoriā uim habet cum aliqua adstrictione, & propterea extensoriam ac adstringentem contrahentemque ac coactoriam habet actionem, quapropter & ad uaros & lentigines, maculasque solares, pruritum, lepram, scabiem, achoras & manantia capitis ulcera, ulcerosaque papularum eruptiones, & omnia crassi succi uitia conueniens est, maxime cum aceto. Cicatrices etiam illustrat. Facit quoque ad hepar induratum in cataplasmate imposita, & lienem consumit, præsertim si farina aliqua siccatoria ipsi commisceatur, uelut est soliacea ac eruiua. At uero cortex ualde efficax est, ut eius usus ubi uehementi ad-

b 2 stric-
tio-

strictione opus est requiratur. Si uero quis carnis eius drachmam unam bibat cum aqua mulsa, facile uomet. Saepe & per inferna aluum largè subducit. Vnde si hepar aut splenem purgare uoluerimus per huius medicamenti usum, in posca ipsum exhibemus. Stomacho enim incommodat. Verum aceto gaudet tum forinsecus impositum, tum per os acceptum.

Balanos siue Glans quercina.

De quercina glande in quercus tractatu commode dicemus.

Balsamum.

Balsamum calfacit & siccatur secundo ordine, est & tenuium partium. Liquor eius adhuc magis tenuium partium uim habet, non tamen adeo calidus est uelut quidam opinantur per partium subtilitatem decepti. Fructus eius consimilem iuxta genus facultatem obtinet, sed partium tenuitate ab illis praeuertitur.

Balaustium, Cytinus.

Balaustium syluestris mali punice flos est, uelut satiuæ Cytinus, gustum autem fortiter adstringit, & sanè siccantis ac frigefacientis facultatis est: quare si inter triginibus ac alijs ulceribus ipsum aridum tenuissime tritum insperferis, citissime uidebis ipsa cicatricem recipere citra mordacitatem. Idcirco non est medicus quispian qui non hoc pharmaco & in his qui sanguinem reiectant, ac dysentericis, uentrisque ac uteri fluxionibus utatur.

Batos, Rubus.

Rubi folia maxime tenera itemque germina mediocriter adstringunt, ut comansa oris ulcera cum alia, tum quæ aphthæ appellantur, curent. Imò & uulnēra glutinent. Fructus maturus moderatam quandam caliditatem habet. Immaturs frigidam terream substantiam possidet, & propterea acerbus & ualde siccatorius est. Siccatus autem reponi solet, & humido magis siccatorius euadit. Flos eandem uim quam fructus immaturus habet. Itaque ad dysenterias & uentris fluxiones ac debilitatem, & sanguinis sputum commodus est. Radix supra uim adstringendi, etiam tenuium partium substantiam habet, quare rhenum lapides atterit.

Batrachion, Ranunculus.

Batrachion quatuor speciales differentias habet, omnes autem fortiter acrem uim possident, ut cum dolore exulceret. Quare si quis moderatè utatur, scabies ac lepras excoriant, ungues item leprosos remouet, & stigmata siue notas incusfas discutit, & uerrucas ac myrmecias ex earum gente dictas, auferunt. Quin & alopecijs profunt modico tempore impositæ. Nam si diutius sinantur, non solum excoriāt, sed etiā crustā cuti inurunt, atque hæc quidem folia uiridia unā cum cauliculis imposita faciunt. Radix autē siccata sternutatoriū est medicamentum quomodo omnia alia fortiter siccantia. Sed & dentium dolores mitigat, simulque ipsos confringit.

Bdellium.

Bdellium Scythicum appellatū quod & nigrius & resinosis est, mollientē abunde & efficacem uim habet. Alterum Arabicū quod etiam pellucidius est, magis siccatur quā mollit. Vtuntur aliqui his, & maxime Arabico, ad ramices gutturis ac hernias aquosas, bronchocelas & hydrocelas Græci appellant, ieiuni hominis salua ad emplastrī compagem redigentes. Arabicum etiam calculos rhenum atterere uidetur, urinasque ciere in potu acceptum. Sed & crudorum flatuum insultus, & laterum dolores, ac rupta sanat.

Blitum.

Blitū olus est cibariū, temperamento humidū ac frigidū in secundo ordine locatū.

Bulbus

Bulbus.

Bulbus comestus frigidioris & crassioris uiscosiorisq; humoris genitor est, nam & agrè concoquitur, & inflat, ac uenerem stimulat. In cataplasmate impositus glutinat & siccatur. At uero qui uomitorius Bulbus dicitur, multo calidius temperamentum quam prædictus habet.

Buglossum.

Buglossum humidum & calidum temperamentum habet, unde uino iniectum laticiam facere potantibus uidetur. Conducit & tussientibus propter gutturis asperitatem, in aqua mulsa decoctum.

Buphthalmon.

Buphthalmon appellatū uidetur à floribus, qui figurā oculi bouis similitudinē referunt. Nam colore chamæmeli floribus quam simillimi existunt. Multo autē maiores ipsis sunt, & acriores, & propterea magis discussorij sunt, usque adeo ut etiam duritias sanent ad ceratum permixti.

Bunion, Arction, Pseudobunion.

Bunion quod quidā Arction appellant, calfactorij generis in tantum est, ut urinā cieat, & menses ducat. Sed & Pseudobunion similiter ipsi calidum est.

Brathy, Herba Sabina.

Herba Sabina calefacit & siccatur tertio ordine: est autem tenuium partium, & propterea discussoria, & mensium ductrix si quid aliud, & per urinas sanguinē trahit, & uiuentes foetus perimit, ac immortuos eicit. Conuenit putrefactis maxime malignis & inueteratis. Nam quæ diu durauere citra molestiam pharmaci uim tolerant. Quin & denigrata ac ualde sordida, cū melle expurgat, & carbunculos destruit. Quidam etiam duplum ipsius pro cinamomo coniiciunt.

Britannica.

Britannicæ folia adstringunt, & uulnera glutinant, suntq; similia folijs syluestris rumicis, præterquam quod nigriora & hirsutiora existunt. Succus foliorū similiter adstringit, quare quidam coctum ipsum reponunt, ut pharmacum ad putredines oris efficacissimum.

Bromus, Avena.

Bromos paulò frigidior temperamento præditus est, & adstrictionis non nihil habet, ut etiam uentris profluuijs commodet.

Bryon Thalassion, Muscus marinus.

Muscus marinus adstringit & frigefacit, unde in cataplasmatibus uicem impositus, ea quæ calida sunt manifestè perfrigerat, ac iuuat.

Bryon, Muscus arborum, Splanchnon, Hypnon.

Muscus arborum qui Bryon & Splanchnon ac Hypnon Græcis appellatur adstringit & frigefacit moderatè, ut propè ad temperata accedat. Quare & discutiendi ac emolliendi facultatis particeps est, maxime qui in cedrinis lignis reperitur.

Bryonia.

Dictum est de Bryonia, quum de uite alba nobis sermo esset.

Bubonium, siue Aster Atticus.

De Bubonio dictum est in secundæ appellationis elemento.

Gentiana.

Gentianæ radix efficax est, ubi opus est attenuare & depurgare, extergereq; ab obstructionibus liberare.

b 3 Gigarta,

Gigarta, Vinacea.

Vinacea sicca sunt in secundo ordine, frigida in primo. Acerba autem gustu sunt, proptereaque fluxidis ventris affectionibus plurimum profunt.

Gingidium.

Gingidiū ut gustu amaritudinis & adstrictionis particeps est, ita temperamento caliditatis & frigiditatis. Iuxta utranque autē qualitatem siccatorium est, imò etiā stomacho ualde cōmodum, ob adstrictionis non modicæ participationē. Euadit autem multò magis stomacho cōmodum, feruēfactū & ex aceto comestum. Caliditatem itaque non ualde manifestā obtinet, uerum in secundo ordine siccatur.

Glaucium.

Glaucium adstringit cum quadā iucunditate, sed & frigefacit manifestē adeo ut erysipelata non adeo fortia sanet.

Glechon, Pulegium.

Pulegium calfacit & attenuat uehementer, unde humoribus crassis ac uiscosis ex pectore ac pulmone reiectandis facilem uiam facit. Menses ciet cum uino albo coctum, ita ut uinum ipsum meracum bibatur. Forinsecus cataplasmatibus modo impositum, tum ischiadicis, tum alios perfrigeratos rubificat.

Glecos, Sordes balnearum.

Sordes balnearum moderatē emollit.

Glycyrrhizon, Radix dulcis.

Glycyrrhizī fruticis radicū succus maximē in usum uenit, dulcis existens cum modica quadā adstrictione, quapropter asperitates lenit non solum arteriæ, sed etiam scabiosæ uesicæ. Quandoquidem uero omne dulce moderatē, etiam humido temperamento præditum est, pro eius sanæ ratione, sitim quoque eximit.

Glycytide, Præonia, Pentorobos, Ephialtia.

Glycytiden etiā præoniā, & pentorobon, & ephialtiam nominant. Radix eius tenuium partium & siccatoria ac mediocriter calida est; habet enim uim adstringentem leniter, cum aliqua dulcedine. Quod si quis eam diutius mandet, etiam acrimoniā subamarā percipiet, iccirco sanè & menses mouet, magnitudine amygdali cōtusa cum aqua mulla pota. Expurgat quoque iecur obturatum, lienemque ac rhenes. Per adstrictionem autem fluxiones ventris sistit, in uino quopiam austeriorum generis cocta, & uino pota. In summa resiccandi uim fortiter possidet, ut non improbauerim id quod à multis rationabiliter creditum est, eam uidelicet etiam adalligatā puerorum morbum comitalem sanare. Aliquando enim puerulo octimestri comitali apprehenso, magnam radicis recentis partem de collo suspendimus, iussione facta ut perpetuò eā contineret appensam, & de cetero ex hoc facto puer perfectē sanus euasit, neque amplius apprehensus aut cōuulsus est.

Gnaphalium.

Gnaphalium adstringentis moderatē facultatis est, & propterea dysentericis ipsum cum uino aliquo austero potandum exhibent.

Gongylis, Rapum.

Rapi semen ad rem uenerēā stimulos addit, flatuosi spiritus generatiuum exiāstens, sic & radix ægrè concoctilis, & flatuosa, ac seminis gignitiua est, succum autem in corpus distribuit crassiorē. Quare si quis in nimio eius esu perduret, & maximē si ipsam non probè in uentriculo concoquat, humorē crudum appellatum congregabit, si uero crudior in coctura maneat, ægrè concoctilis & flatuosa & stomacho incommoda existit, quandoque etiam morsus circa uentrem

trem excitat, melior autem fit si bis coquatur, multa enim coctura opus habet. Porro ad uentris deiectionem neque conducit, neque officit.

Δ Damafonium, Alisma.

Damafonium etiam Alisma appellatur. Eius radicem experti sumus coctam in aqua, & aqua pota, calculos in renibus consistentes ac coactos confringere.

Daucus, Pastinaca, Staphylinus.

Daucus quem & staphylinum ac pastinacam appellant, duorum generum est: Alter sylvestris minus comestibilis quam satius, uerum in omnibus uehementior. Satius autem in cibi usum aptus est, sed alias imbecillior existit. facultatem habent acrem & calfactoriam, & propterea etiam attenuatoriam. Radix itaque possidet etiam flatulentum quippiam, & ob id Veneris stimulatium. Semen satius quidem habet item aliquid in se tenerem stimulare, sed sylvestris omnis flatus expers est, quare & urinam ciat, & menses mouet.

Daphne, Laurus.

Lauri arboris folia & fructus siccant & calfaciunt uehementer, & magis ipse fructus. Cortex radices minus quidem acris & calidius est, magis uero amarus, & aliquid adstrictionis habens. Idcirco & lapides atterit, & hepaticis conducit. Bibitur in uino odorato pondere obolorum trium.

Dictamnus, Pseudodictamnus.

Dictamnus magis tenuius partium est quam pulegium, in ceteris ipsi consimile. Quod uero Pseudodictamnus dicitur debilius est.

Dipsacos, Labrum Veneris.

Dipsaci radix secundi ordinis est siccantium. Habet etiam quid extensorium.

Dorycnion.

Dorycnii temperamento simile est papaueri & mandragorae, & alijs eodem modo frigefacientibus. parum itaque ex eo sumptum soporem inducit, amplius occidit.

Dolichi, Lobi, Smilax hortensis, Phaeoli.

Qui nunc ab omnibus Lobi nominantur, apud omnes ueteres dolichi & phaeoli appellabantur, & ab aliquibus smilax hortensis, nutriunt quidem non minus quam pisca, consimiliterque flatus expertes sunt, uerum iucunditate & in alui deiectione illis cedunt. Appellantur autem Lobi, hoc est, siliquae praeter alijs precipue, quoniam ex omni siliquarum genere quae indumento intactae sunt, haec sola una cum siliquis siue tegumentis suis ut plurimum comeduntur.

Dracontion.

Dracontion acritus est quam Aron, & amarius, & magis calorificum ac tenuius partium. Habet autem quandam breuem adstringendi uim, cum acrimonia & amaritudine permixtam, ut uel inde efficacissimum pharmacum existat. Nam radix uiscera & omnes crassos ac uiscosos humores expurgat, & malignorum ulcerum optimum medicamentum est. Depurgatque ac extergit generose cum alia extersione indigentia, tum uilignes cum aceto. folia autem ulceribus & uulneribus recentibus conueniunt, quantoque minus fuerint sicca, tanto magis glutinant. Quae enim sicciora sunt, acriora quam uulneribus conueniat existunt. Creditur etiam caseum a putredine asseruare forinsecus ipsi circumpositum. Semen autem radice fortius, caneros & polypos consumere creditur. Succus seminis oculorum albugines deterit.

Drys, Quercus.

Vniuersae quercus partes adstringentis qualitatis participes sunt. Amplius ad omnibus membranula quae sub cortice trunci reperitur, & quae sub cortice glan-

b 4 die

dis super fructus carnem inducta est. Quare & ad fluxum muliebre, sputa quoque sanguinis ac dysenterias & uentris fluxiones diuturnas, utilis esse creditur. Vtuntur autem ipsa decocta, Vehementius adhuc adstringit phagus & ilex. Ceterum folia ex omni quercus genere pro cataplasmate impolita, uulnera recentia glutinant, quemadmodum ego ruri expertus sum. Glandes quercinae comestae alimentum quidem abunde corpori suppeditant. Sed tardi transitus est id ipsum, & crassum ac aegre concoctile. Ex omni glandium genere optimae sunt Castaneae, quae & Lopina appellantur. Solae enim ex syluestrium fructuum genere, memorabile alimentum corpori sufficiunt. Sunt tamen etiam ipsae capiti graues, utpote dolorem eius inducentes, sed multo magis his supradictae.

E. Ebiscus, Althaea.

Ebiscus malua syluestris, est discussoria, laxatoria, inflammationem arcens, mitigatoria & concoctoria crudorum panorum ac tuberculorum. Radix eius itemque semen, reliqua similiter faciunt uelut herba. Verum facultatem magis tenuium partium, ampliusque siccatoriam & extensoriam ex se ostendunt, adeo ut etiam uiliginis deterant, & semen calculos renum confringat. Decoctum radice & ad dysenteriam & alui profluvium, & sanguinis reiectionem utile est, ut quae uim quandam adstringentem habet.

Ebenus.

Ebenus lignum est ex eorum numero quae in succum resoluuntur, uim habet calfactoriam, extensoriam, ac tenuium partium. Vnde & ea quae pupillis tenebras offundunt uitia, extergere creditur, & in alias oculares compositiones amiscetur, quae uidelicet ad ulcera uetera, & fluxiones, ac pustulas conueniunt.

Elaea, Olea.

Olea germina tantum frigiditatis quantum adstrictionis habent, fructus ex arte maturus moderate calidus est, immaturus adstringentior est & frigidior. Oliuae drupae pinguem succum habent, & modicum alimentum corpori praebent. Colymbades uero muriae innatantes, adstringentem succum habent, & stomachum corroborant, appetentiamque cibi excitant, & ad hoc commodissima sunt quae cum aceto sunt asservatae. Ex his enim quae ex aequo salubria sunt, id quod iucundius est facilius concoquitur.

Elaeon, Oleum.

Oleum ex oleae fructu expressum, quod etiam propriissime oleum appellatur, humectans & moderate calidum est. Tale est dulcissimum ex oliua maxime drupa factum, quale est sabinum. Est autem calidum moderate medi temperamenti, & magis discussorium quam quod ex crudis oliuis expressum est, quod omotribes & omphacinum appellatur. Nam hoc tanto frigidius est quanto plus adstrictionis habet. Oleum autem uetus, si quidem ex dulci oliua factum uetustatem contraxit, calidius est & magis discussorium. Si uero ex cruda, quousque sanum aliquid adstrictionis seruauerit, mixtae facultatis existit. Vbi uero adstrictionem penitus abiecerit, alteri assimilatur. Lucernarium autem a medio ac temperato, dulci inquam, in tantum ad calidiorem qualitatem progreditur, quantum omphacinum ad frigidiorum. Vtimur omphacino, capite calidiore facto. Dulci, sicciore facto & circumtenso. Lucernario, eodem frigefacto. Manifestum est autem quod omphacinum aliquando etiam frigidum adhibere oportet, reliqua semper calida. Atque hic quidem usus ad caput est. Ceterum si uniuersum corpus praeter naturam siccius reddatur, dulce oleum commodissime illinitur. Sed &

& si densatus sit ex adstrictione, aut frigiditate, aut mordacitate, aut acribus phar-
macis, aut humore, aut etiam pruritu, idem oleum omnium aptissimum est, ma-
xime cum exercitationibus aut etiam post exercitia. At uero stomacho & ie-
cori inflammatis maxime congruit omphacinum irrigatum, ob adstringendi sa-
cultatem, Reliquis partibus dulce magis prodest.

Oleum Cicinum.

Oleum Cicinon in Aegypto paratur, ex ricini arboris semine, quod croton
appellatur, sicut arbor ipsa cici, tuso & expresso, & oleo ex aqua calida electo.
Est autem tenuium partium ac discussorium, uelut oleum uetus. Exerit utiligi-
nes, maculas solares, lentigines, assiduo illitū. Cōsimile raphanino est, quo etiam
utilicer, cicino aut uetere non praesente.

Oleum seminis Lini.

Sed & ex lini semine oleum praeparatur, quomodo praedictū est. Et usus eius
iam est pro cicino. Nam cicinon non amplius affertur, sed hoc pro ipso afferūt.

Oleum raphaninum.

Raphaninum oleum in reliquis simile cicino est, uerum calidius.

Oleum populi nigrae.

Oleum ex nigra populo in aestate paratur, quum multa circa semen est resia-
na. Sumunt itaq; eius grana modiceq; confringunt, & ad pondere expensum
inde trientem, olei dulcis sextarium immittunt, & ad dies quadraginta insolant,
atq; ita excolatum reponunt. Est hoc oleum calfactorium, tenuium partium,
mollitorium, cum odore iucundo.

Oleum Amygdalinum.

Amygdalinum oleum ex amygdalis amaris fit, estq; tenuium partium, & ca-
lidius dulci uno gradu. Conuenit maxime auribus à crassis flatibus obturatis, &
ad auditus grauitatem, & sonitui ex frigiditate. Vermes quoq; aurium enecat.
Experientia enim nos docuit ipsum auribus maxime prodesse, reliquarum par-
tium comparatione.

Oleum nucum.

Nucis oleum similiter ut amygdalinum praeparatur, nucibus aut tuis & ex-
pressis, aut post contusionem in aquam feruentem coniectis. Commodum est
in eisdem quoq; usus: Insuperq; hoc priuatim habet, quod inaurantibus aut inu-
rentibus cōducit: Siccat enim & ad multum tempus inaurationes ac inustiones
continet & adseruat.

Oleum Myrobalaninum.

Oleum ex myrobalanis uim habet depurgandi maculas faciei, lentigines, ua-
ros, & omnem nigredinem: Sed & aluum purgat, prodest & aurium dolori, &
ad sonitus, cum adipe anserino instillatum, praeparatur ut amygdalinum, glan-
de ungentaria molita.

Oleum Laurinum.

Laurinum ex bacca lauri fit, quo modo iam dictū est. At uero mixtum hoc
modo praeparatur. Ad sextarios quinque oliuarum maturarum, baccarum lauri
pinguium & recentium sextarium unum adijcimus, atq; ita omnia simul con-
teruntur ac exprimuntur, uelut oleum aliās ex oliuis solet. Calidum uale-
de est & mollitorium quod purum ex solis lauri baccis factum est, quare ue-
hementer perfrigeratis quadam corporis parte conducit. Multum quoque sica-
cat, & propterea scabrosis, & asperae cuti, impetiginibusq; asperis, in balneo
illitum medetur, fugiendum est autem in impetigine inflammata, aut sca-
bie inflammata, & in temperaturis calidis ac biliosis. Humidis autem & pi-
uitosis conuenit, & omnibus articulis à frigore infestatis, Est & ischiadicis

ex coxendicibus laborantibus commodum. Occidit uermes & pediculos tum feros, tum mansuetos, itemq; lendes ac furfures capitis, & ophiafes ac alopecias. Vfus est in balneo ieiunis, ita ut postea cum ouo ac melle & fœni græci farina detergeatur. Cauendum ne capiti calido adhibeatur.

Oleum Sefaminum.

Sefaminum oleum ex sesamo fit contrito & in aquam iniecto. Viribus non longe abest ab oleo dulci. Caliditatem enim moderatam habet, & saporem omnino leuiter adstringentem: aptum est cibis, nam & saporis iucundi est, & facile concoquitur, & aluum subducit, forinsecus illitum uim obstructoriam meatuum habet, propter crassitudinem. Cæterum ad præparationem oleorum quæ odoris gratia fiunt, aptius est quàm oleum commune, propter durabilitatem, & quod non facile putrescat.

Oleum Lentiscinum.

Et hoc ex lentisci fructu præparatur eo quo in alijs dictum est modo. Paratur etiam uelut in laurino diximus, fructu lentisci oliu permixto. Vtile est purum & immixtum ori ex fluxionibus infestato, & gingiuis inflammatis, calidum in ore detentum, tum in balneo, tum citra balneum, repellit enim & roborat citra exasperationem. Mixtum autem magis mitigat, simulq; robur conferuat: Quare in iecoris ac stomachi fots ac rigationes commodè assumitur.

Oleum Oenanthinum.

Oenanthinum eadem efficacia est cum melino & rosaceo, præterquàm quod aluum non mollit. Componitur hoc modo. Oenanthem, hoc est uitis syluestris fructum florentem, accipe odorem & marcescere sine, ac in nouū uas unā cum omphacino oleo mitte, & ad dies x l. quotidie agita, ac excolato utere. Sit Oenanthis sextans, olei sextarius unus.

Oleum Melinum.

Melinum paratur ex malis cydonijs, fit etiam ex alijs malis, corium habentibus acerbis & odoratis, hoc modo. Adimitur pediculus ad exortum, & festuca ad fundum, & pars interior unā cum seminis granis, deinde secantur mala unā cum adhærente cuticula. Nam in ipsa & odoris gratia, & adstringendi uis continetur, fiunt autem parua frusta, quorum quadrans in olei omphacini sextarium inijcitur, & insolata ad dies x l. reponuntur. Vis melini olei magis ad frigiditatem nutat, non tamen ualde, propter mali uinositatem: Adstringit autem multum, uelut lentiscinum: Magis uero stomacho familiare est, propterea quod ex duplici materia nutritiua componatur, olei uidelicet ac mali. Quare consequens est ipsum stomacho inflammato ac debili cōpetere, irrigatum, & in episthematis impositum, ac potum. Commodius est rosaceo, propter mali familiaritatem. Nam stomacho robur addit, & insitos in uentriculo acres humores uehementius propellit. Inijcitur etiam per sedem, quibus cūm & crassa intestina ab acri bile uexantur. Cauendus est eius usus in affectionibus frigidis. In his enim magis conuenit, si absinthium habuerit simul incoctum.

Oleum Rosaceum.

Rosaceum oleum sic præparatur: Accipitur floris rosarum rubrarum exunguium, & per diem ac noctem siccatarum quadrans, olei omphacini sextarius unus: Rosi iniectis, os uasis occludere oportet, intrinsecus linteolo, forinsecus pellicula, propter imbres repentinos, & insolare ad dies x l. atq; ita excolatum reponere, uasis super tabulas locatis in domo temperata. Quidam alia quædam rosi adijciunt. Verum optima est præparatio ex solis rosi & oleo constans.

Alij

Alij non insolant, sed uas in puteum aquae frigidae ad dies XL. suspendunt. Conducit capiti calfacto ex sole, aut febris, aut alia quadam eiusmodi causa, humectat enim & mitigat, ac somnium inducit. Et in febris ex calfactis uisceribus, conuenit ceratum ex ipso paratum, lotum ex frigida aqua, in aestate saepe alterata, ita ut ceratum hoc uisceribus imponatur. praeparatur autem hoc modo. Accipitur cerae uncia una, rosacei quadrans: Cera liquefit cum modico rosaceo in duplici uase, & in aquam diffunditur, & manibus emollitur per aquam eluta, mox rursus, ac tertio liquatur, diffunditur aqua, & eluitur: Deinde reliquum rosacei additur, liquatur, tollitur, agitur, frige fit, & in mortarium inditur ac teritur, & aquae quantum expedierit instillatur, mox sublatum medicamentum in frigidam subinde permutatam reponitur. Si uero pro aqua acetum instillaueris in mortario ad ceratum, optimum medicamentum efficies ad erysipelata, carbunculos & herpetas. Habetur etiam hoc ceratum Sermoni quinto capite nonagesimo primo. Quin & potum optimum rosaceum cum aqua calida aut frigida, magnam utilitatem de se praebet his quibus stomachus ex acri bile, aut lumbricis, aut ascaridibus infestatur. Verum ad lumbricos maxime puerorum, melius facit sapa permixtum & potum, ita ut sapa ex uino coctura ad tertias redacta sit praeparata. Celerrime enim ipsos expellit. Infunditur etiam colo uexato ex praedictis causis, Cauendus usus eius est his, qui non multam caliditatem habent, & quorum corpus superfluis excrementis redundat.

Oleum Chamæmelinum.

Chamæmelinum oleum sic praeparatur. Olei dulcis sextarius Italicus unus, florum chamæmeli diem unum praesiccatorum sextans, in uas mittuntur, cuius osculum raro linteolo integitur, quo perspirationem habeat oleum, & sic per dies XL. insolantur. Etenim si non perfletur ac transpiret chamæmelinum oleum, odorem garo similem acquirit. Post insolationem seruare ipsum oportet excolatum, uase locato in tabulis in domo temperata. Usus eius est ad caput medicriter densatum ac dolens ex febris non ualde ardentibus. Rarefacit enim meatus, & uapores discutit, ac acrimoniae contemperat, & in summa magis mitigatorium est quam rosaceum, in febris non ualde calidis.

Oleum Anethinum.

Anethinum ex anethi coma fit adhuc uiuente, prius quam semen solidum reddatur & acre, inutile enim ad usum hunc fit floribus abiectis: Resecare autem mollia tantum germina, & unciae unius pondere expensa, ad sextarium Italicum unum olei dulcis injicere oportet, & osculum uasis probe obturare, & diebus XL. insolare. Calidius hoc est quam chamæmelinum. Itaque fatigatis in hyeme commode adhibetur, mollit enim & humectat. Utendum est eo & in febrientibus leniter a pituita, & omnino agrotantibus ex causis frigidis, maxime circa tendines ac musculos, conuenit.

Oleum Liliorum, Liliaceum, Sulinum, Lirinon.

Liliaceum siue Sulinum, aut Lirinon oleum, fit ex albis lili folijs exunguibust: & solum iniectis, citra ipsorum croceum filamentum, ad sextarium Italicum olei dulcissimi, pondere sextantis. Siccare autem etiam haec oportet in umbra per diem ac noctem: Deinde uasi injicere, & diligenter obturata insolare per triduum: Deinde excolare, & alium sextantem foliorum immittere, prioribus uidelicet uelut inutilibus eiectis. Ternis enim alterationibus folia injicere expedit, quare ubi rursus per triduum insolaueris, rursusque excolaueris, tertium sextantem liliorum immitte, similiterque per triduum insolabis, & sic excolatum in umbra repones. Si quis enim mox a principio sexuncem foliorum immittat,

putres

putrefacta oleū foetidum reddent. Cōmodum est affectionibus muliebribus. Soluit enim duritiās, & morsus ex acrimonia obtundit, & robur utero addit. In Suis testimonium præbent ipsi, quod prægnantibus facilem partum faciat: Sed & alijs illitum, lassitudines eximit fatigatis, & mollientibus medicamentis adiectū mollitorium est: Et in summa tepefactorium est, & mitigatorium ac rarefactorium, odoratumq̃, ac facilem partum procurat.

Oleum Telinum, siue ex fœno græco.

Oleum telinum ex fœno græco uim habet mollificandi. Commodum est ad furfuris, & achoris ulcuscula capitis manantia, depurgat & maculas solares, & faciem dealbat ac extergit & innouat, prodest & ad uteri duritiās ac abscessus, & ægre parientibus opitulatur, facit & ad sedis intestinorumq̃ inflammationes, Infusum soluit tenesmos, facit & ad perniones. Preparatur hoc modo. Fœni greci libræ quinq̃, olei sextarij octo, cyperi libræ duæ, calami odorati libra una, macerantur hæc in oleo ad dies septem ter quotidie agitata, deinde expressa ac excoleta reponuntur.

Oleum Narcissinum.

Ex albis Narcissi floribus fit oleum Narcissinū, noctem ac diem præsiccat, ita ut sextans ex ipsis in sextarium unum Italicum olei dulcis coniiciatur, & uas diligenter obturatum ad dies quatuor insoleatur. Oportet autem & hos alterare quemadmodum in lilio diximus, & reddetur oleum magis odoratum, præsertim si moderatè insoleatur. Nam si diutius insolaueris Narcissinum, aut etiam liliaceum, uel uiolatum, aut aliud quoddam eorum quæ non fortem & permanentem odorem habent, inoderatum euadet. Vim habet Narcissinum calidiorē anethino: Quare ad eadem conducit in reliquo corpore, capite excepto. Acris enim est Narcissini fragrantia.

Oleum Violatum.

Violatum oleū præparatur ex purpureis uiolæ floribus, itemq̃ ex albis, quadrante ex ipsis in olei sextarium Italicum dulcissimi coniecto, ac tertium alterato, ueluti in lilio prædictum est. Vis eius paulo calidior est quàm rosacei: Quare si quis æstare fatigatus & insolatus rosaceo careat, uiolaceo uti potest, maxime ex purpureis floribus præparato, ita ut in balneo ex eo illinatur. Nam supra hoc quod lassitudini medetur, etiam squallorem ac sitū animi, odore suo in mansuetudinem ac uoluptatem transmutat, & somnum imperturbatum inducit.

Iasmoileum.

Oleum apud Persas Iasme appellatum præparatur hoc modo. Candidorum nimirum uiolæ florum sextante in Italicum sextarium unum olei sesamini iniecto, ac alterato quemadmodum in lilio dictum est. Vfus eius in epulationibus apud Persas odoris gratia receptus est. Conducit uniuerso corpori à balneis, in corporibus calore ac laxitate indigentibus, Grauiorem autem odorem habet, ut multi non libenter ipsum tolerant.

Oleum Myrteum.

Fit & hoc folijs myrti uiridibus pondere sextantis, in olei omphacini sextariū Italicum unum iniectis, addita uini odorati adstringentis quarta sextarij parte. Coquuntur hæc ad lentam prunam, donec folia arefiant ac confringantur, & uinum consumatur. Deinde oleum purum excolatur, & uitreo uase excipitur, ac reponitur. Adstringit & frigefacit hoc oleum, amplius quàm lentiscinum ac melinum, & propterea irrigationibus stomachi & hepatis non cōpetit, sed neq̃ alia uiscera benigne tractat. Experientia plurima usum eius reperit in ceratis ac emplastris, per quæ densare ac repellendo adstringere oportet, Commodat
allabem

allabentibus fluxionibus, & humectis ulceribus cicatricem inducit. Cohibet pios capitis mulierum, & est odoratum.

Oleum Mastichinum.

Mastichinum oleum fit, mastiches uncia una, in olei ualde acerbi sextarium unum immissa. Coquitur autem in duplici uase. Calidum est moderate, & densandi ac obstruendi meatus ui prae ditum, si quidem partibus moderate firmari adstringiq; ac cal fieri indigentibus adhibeatur.

Oleum Stryacinum.

Stryacinum preparatur sic: Olei dulcis optimi sextarius unus, styracis pinguis sextans, coquuntur in duplici uase, donec styrax uim suam in oleum deponat. Paulo calidius hoc est quam anethinum. Verum ualde mollitorium, & propterea corpora indurata praecclare attenuat & emollit.

Oleum Sicyonium.

Sicyonium oleum sic preparatur. Olei dulcis sextarii decem, scynograci sextarius unus, libanotidis quadrans, polij quadrans, sampsuchi quadrans, tadaritriens, aristolochiae libra una, meliloti semissis, cucumeris syluestris radice librae duae, aquae quod satis est. Coquuntur haec uelut oportet, & excolata in usum uertuntur.

Oleum Metopium.

In Aegypto preparatur oleum Metopium appellatum, propter galbani ligatum, fit ex oleo omphacino & amygdalis amaris, cardamomo, iunco rotundo odorato, melle, uino, calamo odorato, carpobalsamo, galbano, & resina. Est calfacitorium: Venarum oscula aperit, attrahit, & purgat ulcera, facit ad musculos ac nervos concisos, facit ad hernias aquosas, & in summa uim mollitoriam habet.

Oleum Mendesium.

Mendesium oleum maxime emollit, & corpora laxat, & pus facit. Componitur ex oleo myrobalanino, & myrrha, casiaq; ac resina. Quidam spissandi gratia etiam cinamomum inspergunt.

Oleum Megaleum.

Quod Megaleum oleum appellatur, quondam preparabatur, nunc autem in usu non est, preparatur similiter ut amaracinum, nisi quod resinam recipit. & ad eadem efficax est.

Oleum Amaracinum.

Amaracinum oleum sic preparatur, herbae sabinae, ligni balsami, calami aromatici, floris iunci odorati, nardi celticae, costi, singulorum libras v. amomi, casiae, carpobalsami singulorum lib. i. i. i. myrrhae lib. i. Vini odorati sextarios v. Coquito uelut Nardinum. Vis eius calfactoria sicut nardini, non autem adeo corroborat, uerum magis tenuium partium est magisque mitigatorium ac lene, propterea quod opobalsamum non recipit. Mulieribus in uteri sinum injectum menses ducit. Estque omnino calidum, emollit, ac aperit ora uenarum. Commodat fistulis, & ramici aquoso post chirurgiam, facit ad crustas & ulcera efferata, facit ad urinae difficultatem circumlitum sedi, facit ad uteri inflammationes ac durities, & haemorrhoidum oscula aperit.

Oleum Cyprinum.

Cyprinum oleum recipit olei sextar. x x v. cyperi, helenij, iridis, singulorum libram unam, sampsuchi, hyssopi utriusque quadrantem, seminis uiticis quadrantem, saluiae quadrantem, floris cypri siue ligustri libram unam. Et hoc duabus cocturis coquitur. Nam reliqua omnes species uino odorato rigatae pridie, postea oleo infarctae coquuntur ad horas sex, sequenti die oleum excolatur, & affusa aqua pura tertia olei parte, flos cypri iniicitur, una cum tenerioribus ramulis non contusis, si uero siccus sit, cotusis, atque ita coquitur hora una. Calfacit cyprinum

c non

non instrenue, estq; tenuium partium, & ad uteros amplius perfrigeratos ualde commodum. Nam crassos in ipsis humores attenuat. Caterum ubi copia fuerit herbarum uiridium, *cyprinum* sic præparatur: Nimirum ex olei sextarijs xv. caperi, helenij, iridis, singulorum semisse, sampsuchi, hyssopi, saluiae, singulorum sextante, uiticis foliorum uiridium sextante. citri foliorum uiridium quincunce, chamælibani uiridis triente, lauri foliorum uiridium quincunce, cypriflorum dextante, opobalsami semisse.

Oleum Irinum.

Irinum oleum recipit iridis, aspalathi, cyperi, helenij, singulorum lib. v. opopanax semissem, quidam uero quadrantem, anchusæ sextantem. Olei sextarios xxx, aque sextarios xv. Contunduntur omnia crassius, & macerantur biduo, deinde coquuntur horis sex, deinde iniicitur opopanax uino præmaceratus ac tritus. Aliquando ad prædicta additur floris iunci odorati semissis, casiae quadrans, ligni balsami, nardi celticæ utriusq; semissis. Vis huius calfactoria est, sed non acris, propterea perfrigeratis partibus commodat roborandiq; ac molliendi uim quandam possidet.

Oleum Nardinum Cyzicenum.

Nardinum Cyzicenum quod in Alexandria præparauit talde commodum est, & recipit olei acerbi sextar. xii, italicos, aspalathi, cyperi, iridis Illyricæ, Seminis Cardamomi, aristolochiæ, casiae ligneæ, singulorum sexuncem, helenij, ligni balsami, floris iunci odorati, casiae, costi, singulorum semissem. amomi, folij malabathri, spicæ nardi, styracis, carpobalsami, singulorum quadrantem, opobalsami quadrantem, herbæ sabinæ unciam unam. Præparatur hoc modo. Aspalathus, cyperus, helenium, xylobalsamū, iridem, aristolochiam, decorticato & crassius cōtundito, ac triduo aqua calida macerato. Deinde affuso oleo coquito assidue agitando, & aquam paulatim instillando, prout prior cōsumitur, & ubi tres aut plures coxeris horas, cocta iam cocta pernoctare finito. Sequenti die extractis his quæ cocta sunt, & aqua ab oleo separata, rursus coquito alia aqua pura, ac modico uino affuso, & ubi ebullierint primum cardamomum adscito, deinde de florem iunci odorati, & casiam ligneam contusa, coquitoq; ad horas duas, ac rursus pernoctare finito. Tertia die similiter extractis his, & alia aqua rursus addita coquito, & quum efferbuerint, casiam, costum & reliqua singula seorsim contusa ac trita, seorsim inspergito, postremum autem spicam nardi, & folium malabathri, & styracem, in tenuissimas partes comminutū, & ubi eliquatus fuerit, statim ab igne tollito & opobalsamū addito, diligenterq; agitato, & operculo imposito ac probe uelatum ad biduum finito, atq; ita conchula excipito. Porro Secundarium sic præparatur. His quæ ex tertia coctura superfuerunt olei sextar. vi, adscito, & duabus horis ebullire finito, deinde casiae tenuissimæ tritæ sextantem, nardi celticæ sextantē, herbæ sabinæ drach. iiii, styracis unciam unam, opobalsami sextantem addito. Nardinum uim habet calfactoriam, roboratoriam, ac mitigatoriam. Quare stomacho perfrigerato, & inualido, item uentriculo atq; iecori eodem modo affectis commodissimum est. Infunditur per sedem quoq; in intestinis perfrigeratis. Item in uteros muliebres. Vfus est omnino præstantis & eximij.

Præcoctura Nardini.

Vini ueteris lib. xv. foliorum dendrolibani lib. i, rasdi lib. iiii, calamocrini lib. iiii, brullocyperis lib. iiii. Hæc omnia in præcocturam mitte, ferueant horis xii, & ubi euacuata fuerint in uas purū, & caccabus per spongiam deterfus, rursus infundis uini lib. xv, & illud oleum desuper.

Nardini præparatio alia.

Nardinum quod in Ecclesia præparatur. Tachis libram, cinamomi libram, caryo-

caryophyllorum libram, amomi libram, florum iunci odorati libram, calami aromatici libram, ligni aloës libram, nucum myristicarum libram, cachrij libram, xanto caryorum, hoc est, nucum flauarum libram, maceris libram, galangæ libram, balsami libram, carpobalsami libram, xylobalsami libram, myrobalani libram, folij indicij libram, casiae libram, ligni caryophylli libram, piperis longi libram, piperis albi libram, piperis communis libram, laseris chaldaici libram, nardi celticæ libram, thymiamatis libram, myrrhæ troglodyticæ libram, costi libram, musci libram, ambre libram, gomphiti libram, ladani libræ, terebinthinæ libram, uini odorati quod satis est.

Nardini alia præparatio.

In præcoctura uini ueteris lib. xv. foliorum dendrolibani libram. i. foliorum myrti lib. i. rasdi lib. iiii. calamocrini lib. iiii. brullocyperij lib. iiii. Hæc omnia in præcocturam mitte ut ebulliant horis xii. & ubi euacuata fuerint in uas purum, & caccabus per spongiam deterfus, rursus infundis uini lib. xv. & oleum illud desuper. Sit autem intrita siue intrimentum, cinamomi lib. iiii. galangæ semissis, caryophyllorum triens, spicæ quadrans, nucum flauarum quadrans, ladani puri quadrans, terebinthinæ uncia xvi. xyloaloës sextans, costi triens, laseris Bucellarij libræ quatuor, Thymiamatis regij quadrans. Hæc contusa & cribrata ac cum oleo præcocturæ unita coquito iuxta experimentum, ut neq; comburatur, neq; rursus defectuosa coctura fiat.

Alia Nardini præparatio, Ioæ Vngentarij.

Olei sextar. xii. aspalathi lib. iiii. xylobalsami lib. ii. costi quadrantem, casiae lignæ trientem, carpobalsami semissem, amomi trientem, styracis calamitæ sextantem, opobalsami sextantem.

Alia præparatio Nardini, Ioæ Vngentarij.

Costi sextantem, foliorum indicorū trientem, casiae semissem, myrrhæ semissem, ligni caryophylli semissem, carpobalsami trientem, spicæ nardi trientem, calami aromatici unciam unā, iridis sextantem, styracis pinguis dodrantem. croci drach. iiii. olei sextarios. vi.

Oleum Salcas.

Olei Salcæ præparatio quam in Alexandria parauit, optima est, & recipit, Aspalathi semissem, xylobalsami dodrantem, cyperi trientem, helenij, iridis utriusq; semissem, calami aromatici uncias xviii. floris iunci odorati sextantem & unciam dimidiū, styracis pinguis sextantem, nuces Indicas duas, folij uncias xviii. spicæ nardi unciam unam, caryophylli, arnabo, utriusq; sesquunciam, amomi quadrantem, casiae sextantem, costi unciam unam, myrrhæ unciam unam, hypni, xylocasiae utriusq; quadrantem. Olei sextar. x. Coquitur modo relato in nardino, ita ut in prima coctura iniiciatur xylobalsamū, iris, cyperus, helenium, xylocasia decorticata & crassius contusa, & aqua ad biduum aut triduum macerata. In secunda autē coctura iniicitur calamus, flos iunci odorati, hypnon, prærigata uino ueteri odorato. In tertia reliqua: fit & secundarium hoc modo. His quæ à tertia coctura superfuerunt adijciuntur olei sextarij sex, & quantum satis est coquuntur. Deinde iniicitur myrrhæ stactæ bonæ albæ quadrans, Siromatis, hoc est, aquæ opobalsami semissis, mastiches semissis, styracis boni uncia una. Utuntur oleo salcæ mulieres caput ex eo ungentes. Est autem relata præparatio longe optima.

Foliati siue malabathrini præparatio optima.

Foliatum oleum recipit aspalathi uncias xviii, ligni balsami lib. ii. cyperi lib. v. helenij lib. v. foliorum malabathri trientem, amomi semissem, xylocasiae trientem, myrrhæ trientem, costi dodrantem, styracis primarij lib. i. cassami siue carpobalsami semissem, calami aromatici lib. v. spicæ nardi sextantem, caryophylli

c 2 trientem

trientem, siromatis quæ est aquosa fex ac residentia opobalsami semissem arnabo semissem, cardamomi semissem, iridis libram unam, Olei sextarios x x, Vini odorati quod satis est. Coquitur uelut Nardinum.

Vngenta odorata quibus commodent.

Vngenta odorata frigidioribus capitibus magis cōueniunt, quàm moderatè calidis, atq; illis hyeme. Nam calidioribus non sunt apta. Si uero quis odoris gratia talibus uti uelit, rosacei parem modū ammiscabit, sic enim par pari ammixtū non amplius nociuū est. Quandoquidem uero multæ mulieres tam calida capita habent, ut nullum calidū oleum perferre queant, his consultū est solo omphacino uti, quandoq; uero etiam rosaceo. Quædam uero ex ipsis omnino nō utuntur oleo, propterea quod capita ipsarū cito humectent, & distillationibus obnoxia fiant, quas sanè ad ungentoriū illitionem cogere nō oportet. Nam hæc siccatione capitum opus habent, per commodas puluisculorum aridorum inspersiones, non humectatione per illitionem oleorum.

Olei Suffumigabilis præparatio.

Oleum quod suffumigabile appellatur sic præparatur. Vnguium aromaticorum magnorū quincuncem, thuris masculi, styracis primarij, bdellij puri, costi, singulorū quincuncem, olei boni dulcis sextar. v, hypni quod satis est. Costi in crassas partes secato, similiterq; styracem ac bdellium, deinde simul permixta in uas nouū testaceum ansis carens immittito, & osculum eius hypno integito, ac forinsecus ad hypnū aspalathi ligna, aut alicuius alterius odoratorū generis succulos addito ac obturato, ut nihil ex uase excidere queat. Deinde aliud testaceū uas ansis carens, & longi colli osculū habens accipito, ita ut osculo eius cōgruat quod prædictas species in se cōtinet, & in ipsum olei dulcis sextarios v. mitto, & effossa terra uas quod oleū habet usq; ad collum obruito, ut ne ignescat, mox alterum uas in caput resupinatū osculo eius quod oleum continet adaptabis, forinsecusq; totū circū circa luto oblines, similiterq; oscula utriusq; coaptata, & sic carislines, sequenti die carbones multos circūpones, integesq; ex ipsis undiquaq; totum uas ignemq; accendes ac uentilabis. Ignem aut accensum marcescere ac extinguī finito, ut paulatim candefactæ per osculū uasis species oleū suppositum ipsis suffumigent, qua gratia suffumigabile appellatur: Deinde postera die aperito oleumq; tollito ac seruato in uitreo uase, ac utitor. Hoc utitur mulieres quibus menses retinentur, illinentes ex eo pectinem & lumbos. Conuenit etiam his quæ nō pro ratione in partu purgantur similiter illitū. Vnde est etiam perfrigeratum pectus habentibus, & tenesimis infestantibus prodest, calidū lana conuoluta exceptū, & pectini ac lumbis impositum.

De Vngentis reliquis.

Ex his iam facile est etiam de alijs oleis iudicare, quæ Vngentorū quoq; cognominationem habent. Etenim iuxta naturam eorū quæ insciuntur, oleum alterabitur, quorū singulorum uim in hoc sermone deinceps condisces. Cæterū de reliquis remittentibus ac laxantibus ungentis, in sermone de medicamentorum cōpositione, post auxilia articularia dicetur, uelut est gleucinum & consimilia.

Elaphoboscon.

Elaphoboscon calidam & tenuium partium uim habet, ideoq; secundo ordine siccatur. Conuenit ad uenenatarum bestiarum plagas, & in potu, & in cibo.

Elenium siue Helenium.

Helenij radix maximè in usu est: Dici potest calida & sicca, non tamen exactè uelut piper, sed cū humiditate superflua, & propterea in linctus ac eclegmata, ad crassos & uiscosos humores ex pectore ac pulmone educendos, cōmodè miscet.

Elelisphas

Eleliphacos, Saluia.

Saluia calfactoriam uim euidenter habet, & leniter subadstringentem. Quisdam narrant suffita super prunas, menses immodicè fluidos mulieribus sistere, itemq; muliebrem fluxum, Agrippa autem inquit, saluiam herbam sacram leaenae praegnantibus uorant: Nam uitalem conceptum continet. Quare si succi eius heminam unam cum modico sale mulier bibat, quarta à puerperij purgamentis die, & uiro condormiat, infallibiliter concipiet. Aiunt quum in Copto Aegypti pestis grassaretur, eos qui superfuerunt in ea regione coëgisse mulieres & uxores suas, ad huius succi potentem adeò usum, & ad plurimam sobolem peruénisse. Orpheus aut inquit, Sanguinem spuentibus succi saluiae cyathos duos cum mellis uncia una dato, ieiunis in potu, & statim sistetur. Verù phthificis ac tabidis ait, catapotia praeparata hoc modo: Spicae nardi drach. ii, seminis saluiae tostae tussae ac cribratae drach. xlii, piperis drach. xii, excipe succo saluiae, & redige in catapotia, ac exhibe drachmam unam mane ieiunis, itemq; in uesperam, & aquam puram insuper bibendam.

Elleborus, Veratrum.

Veratrum album & nigrum exterioriae ac calidae facultatis sunt, quapropter & ad uiliginis & impetiginis pforasq; ac lepras cōueniunt. Et sanè uirga etià nigri in fistulam immissa callosam, in duobus aut tribus diebus callum cōtūmit. Ponantur autem in tertio ordine calfacientium ac siccantium, purgat nigrum humorem atræ bilis, magisq; per uentrem infernè. Albū uero per eundem superiorem, crassos ac uiscosos humores per uomitum expurgans, mouet autem & uentrem infernè.

Elxine, Muralium, Parthenium, Perdicum.

Hanc aliqui parthenium, alij perdicum, alij muralium siue herbam muralent appellat, uis eius est exterioria, & leniter adstringens cum subfrigida humiditate, unde omnes inflammationes sanat in principio ac augmento usq; ad uigorem, & maxime calidas. Sed & furunculis incipientibus imponitur: Et succus ipsius cum rosaceo ad aurium dolores modicè inflammatos conuenit. Quidam succum gargarizant ad tonsillas inflamas, Quidam medici etiam in tussi inueterata exhibuerunt, propter manifestam uim extergendi, facit & ad alopecias ac impetiginis ipsa herba per se assidue affricata. Aperit & hemorrhoidas sedis, & fistulas sanat, & sinus occludit, cum modico sale trita & cataplasmatibus modo imposita.

Elymos, Panicum, Meline.

Panicum graecis elymos & meline uocatur. Est aut simile milio forma ac facultate, parum nutrit & siccatur, & sanè uentris fluxiones sistit, quemadmodū etiam milium, si uero forinfecus in cataplasmate imponatur, siccatur & perfrigerat.

Empetrum siue Epipetrum, Prasoides.

Empetron solis purgationibus cōmodum esse uidetur, pituitam ac bilem ducens, Saporem habet salsum, ut etiam ad alia eo quis uti possit, ad quae uidelicet salae substantiae usus est. Appellatur etiam prasoides.

Epithymum.

Epithymum per omnia fortioiem thymo facultatem habet, siccans ac calfaciens in tertio ordine sine distantia à temperatis, purgat humorem atræ bilis,

Erebinthus, Cicer.

Cicer legumen est flatuosum, probè nutriendum, uentri cōmodum, urinā ciens, lac & semen generans, mensesq; ducens. Decoctū ipsius etiam calculos in renibus atterit: maxime nigri: Alterū ciceris genus orobiarum appellatū, uim habet adtractoriam, discussoriam, sectoriamq; ac exterioriam. Quare & lienem & iecur & rhenes expurgat, scabiemq; ac impetiginem exterit, Item parotidas ac tes-

stes induratos discutit, maligna quoque ulcera sanat cum melle.

Erpylos, Serpyllum, Zygis.

Serpyllum calfactoriam uim usque adeo habet, ut menses & urinas moueat. Est autem & gustu satis acre. Duæ eius species sunt, Altera hortensis sampsuchum odore referens; Altera syluestris quæ & zygis appellatur, non serpens, sed ramulos erectos, tenues, sarmentosos habens, folia ferme similia rutæ, subangusta & longiora, ac duriora, flores gustu acres, odoris iucundi; Radix autem inutilis est. Nascitur in petris, efficacior & calidior quam hortensis, itemque ad usum medicum accommodatior. Menses enim & urinas ciet pota. Prodest & ad tormina, conuulsa, rupta, hepatis inflammationes, & ad reptilia ac serpentes, tum in potu accepta, tum cataplasmatibus modo imposita. Mitigat & capitis dolorem cum aceto cocta, capite ex ea irrigato, rosaceo ammixto: Maxime autem in lethargicis ac phreniticis inueteratis congruit. Sedat & sanguinis sputum, drachmæ unius pondere cum aceto pota.

Erysimon, Irio.

Erysimi semen uelut sapore nasturtio simile est, sic etiam facultate ipsi adsimilatur, feruens & calfactorium existens. Quando uero usus eius in eclegmate expetitur, prestat ipsum aqua maceratum torrefacere. Commodat in eclegmatis ad crassum ac viscosorum humorum in pectore ac pulmone educationem ac per sputum expurgationem. Iuuat parotidas induratas, & duritias ueteres mammarum ac testium. Dioscorides ait in cataplasmate cum aqua aut melle impositum, etiam oculatis cancris mederi.

Erythrodanum, Rubia tinctorum.

Erythrodani radix rufa qua tinctorum utuntur, acerbior est & subamari saporis; unde & iecur & splenem purgat, & urinas crassas ac multas, aliquando etiam cruentas euacuat, itemque menses propellit. Moderatè quoque extergit ea quæ exteriori opus habent. Itaque uiliginibus albas extergit illita cum aceto. Quidam & in potu exhibent ipsam ischiadicis ac resolutis ex aqua mulla.

Euzomon, Eruca.

Eruca olus palam calfacit, sed & semen generare creditur, & impetus ad uenerem excitare. Capitis autem dolorem inducit, atque hoc magis si quis ipsam foliam edat: Quapropter cum lactucae folijs ipsum edere oportet.

Eupatorium.

Eupatorium tenuium partium uim habet, extensoriamque ac sectoriam, citra manifestam caliditatem. Quare obturationes iecoris expurgat. Est etiam modice adstrictionis particeps, per quam hepatis firmitatem addit.

Euphorbium.

Euphorbium ustoriam & tenuium partium uim habet, similiter ut alij succi.

Z.

Zea.

Zea media quodammodo est inter triticum & hordeum, ut ex illis cognobilis fiat.

Zingiberi.

Radix zingiberis fortiter quidem calfacit, sed non primo statim occurso uelut piper, propterea quod crassiorum partium uim, aquosamque ac excrementitiam substantiam possidet, ob quam etiam facile a teredinibus perforatur.

Zythus.

Zythus acrior est quam hordeum ex quo fit, & mali succi, nimirum ex putrefactione factus. Est autem & flatuosus.

Zyma fermentum.

Fermentum tenuium partium est moderatè calidum, & propterea citra molestiam ac mordacitatem, ex alto extrahit simulque discutit. Compositum est autem ex
contra

contrarijs facultatibus, aciditate frigida, & caliditate putredinosa, in superq̃ salis & farinae, iuxta utriusque naturam.

H Edyosimon, Menta, Minthe.

Mentam Græci hedyosimon, aliqui minthen odoratam appellant, uim habet calidam ut propè attingat tertium ordinem, uerum ex hortenſi cultu humiditas superflua particeps est, quapropter & ad uenerem moderatè stimulat, & ob hoc temperamentum etiam cum polenta in cataplasmata uenit, Caterū ob amaritudinem lumbricos necat, & decoctum eius per triduum cōsequenter potum, colicis ualde prodest. Acerbitas porro ipsius recens sanguinis sputū cohibet, si cum posca bibatur, Tenuium partium ut si qua alia herba existit.

Edysarum, Securidaca, Pelecinus.

Hedysarum etiam pelecinus dicitur, itemq̃ securidaca, & inuenitur fuluū aut pallidum colore semen ancipiti acie ad similitudinem securis. Amarum autem & subacerbum apparet, unde in potu stomacho cōmodum est, Expurgat uiscerum obturationes, id quod & totius fruticis ramuli faciunt.

Emerocalles.

Hemerocalles radicem habet similem lilij radici figura ac uiribus, quare similiter ut illa ambustis prodest, Nam discussoria leniter uim habet, simulq̃ repulſorium quiddam possidet.

Erigeron, Senecio.

Senecio uim habet mixtā, frigidam, simulq̃ moderatè discussoriā. Et propterea medicamentis sedis cōmodè miscetur, cohibet & sanguinis sputū succus potus, & lumbricos occidit, & hepaticis prodest, & inflammatis efficax cataplasma est.

Eryngium.

Eryngium caliditate aut parum quid à temperatis, aut omnino nihil abscedit, siccitatis autem tenuium partium non modicæ particeps est. Radix eius aqua feruefacta & ipsa aqua in potu sumpta, colicos sanat, cum aqua multa feruefacta, calculosos, urinæ stillicidium, eiusq̃ emittendæ difficultatē, & nephreticos curat, Bibendum est autem hoc eius decoctum per dies xvi, ieiunis, itemq̃ ad noctem dormituris. Si uero laues simul cum ipsa incoxeris, & potandum dederis, melius res procedet. Affirmauit mihi quispiā se ex assiduo eius usu, calculos per lotium eijcere desisse, quum antea frequentissimè eo uitio diuexaretur.

Thapsia.

Thapsia acris & fortiter calfacioria unā cum humiditate facultatis est. Itaque ex alto uiolenter attrahit, & attractum discutit. Verum longiore tempore opus suum perfecit, propterea quod superflua humiditate largiter redundet, ob quam etiam facile corrumpitur.

Thermus satiuus, Lupinus.

Lupinus edulcatus per cocturam, in cibo acceptus agrè concoquitur, & alimentum corpori præbet crassi succi, & crudos humores generat. Aluum autem neq̃ ducit, neq̃ sistit. At uero ut pharmacū, edulcatus quidem, uim obducendi meatus habet. Qui uero insitam à natura amaritudinē habet, exterſorius & discussorius existit. Occidit lumbricos cū melle delinctus, aut cū posca potus. Sed & decoctū ipsius lumbricos expellere solet potū, & per clysterē infusum. Farina quoq̃ eius forinsecus cum bubulo felle umbilico imposita idē præstat. Et sanè decocti fomentū foris ad motū utiliginib. prodest, & capitis ulcusculis manantibus, eruptionibus papularū, scabiei, gangrænīs, ulceribus malignis, partim extergendo, partim discutiendo, & citra mordacitatē siccādo. Expurgat etiā iecur & lienē cum ruta & pipere, iucunditatis gratia adiectis, Extrahit & menses, & foetus, cum

c 4 myrrh

myrrha ac melle appositus. Farina etiā lupinorum discussoria est. Non enim liuida tantum, sed & strumas & tubercula dura sanat, sed tunc in aceto, aut aceto mulso, aut posca eam coquere oportet, iuxta ægrorum uidelicet temperamenta, & affectus differentiam oportuno liquore inuento. Discutit & liuida farina ipsa, reliquaq; omnia quæ prius in decocto relata sunt. Quidam & ischiadicis in cataplasmatibus imponunt.

Thermus sylvestris, Lupinus erraticus.

Sylvestris Lupinus amarior & fortior est ad omnia satiuo, aliis in genere eandem uim possidens.

Thlaspi.

Thlaspios semen uim acrem adeo possidet, ut etiā internos abscessus potum rumpat, & menses ducat, & foetus perimat. Per sedē immissum coxendicū morbis prodest cruenta euacuando, & aliis quoq; purgatoriā uim habet supernè ac infernè humorum biliosorum, acetabuli mensura potum.

Thridax, Lactuca.

Lactuca humidū ac frigidum olus est, non tamen externè, sed iuxta fontanarum aquarum frigiditatē, quapropter ad inflammationes conuenit, & ad parua ac leuia erysipelata. Edulium est sitim sedans, & somnū concilians, maximè feruēfacta cum posca diluta sola comesta. Sed neq; inconcoctilis est uelut alia olera, neq; excretionem per aluum inhibet, neq; promouet, & propterea neq; mali succi sanguinem generat, non tamen perfectè boni succi. Semen potum seminis effluxum cohibet, unde & his quibus per somnum id effluit datur. Cæterum sylvestris lactucæ succus cum muliebri lacte illitus, argemata & inustiones, quæ oculorum ulcera sunt, itemq; caliginem depurgat.

Thymus.

Thymus incidit ac calfacit manifestè, ut tertij ordinis sit calfacientiū, & propterea urinas ac menses ducit, ac foetus detrahit, & uiscera purgat potu, adiuuat pectoris ac pulmonis excretiones. Atq; hæc quidē Galenus. Verū experimento sequentia cōstant. Arthriticis thymi sicci minutissimè triti drach. iiii. cū aceti mulsi hemina dimidia dato ieiunis: purgat enim bilem, & acres serosos humores, & quæ circa uesicā hærent. Ventre autem eleuato, quum intumescere iam incipit, drach. i. cum aquæ mulsæ hemina exhibeto ieiunis. Ad lumborū ac coxendicū dolorem laterisq; ac pectoris, & præcordiorū eleuationes ac inflationes, drach. iiii. cum aceti mulsi diluti hemina una dato ieiunis. Similiter & melancholicis & mente perturbatis, & timore percussis drach. iiii. dato cum aceti mulsi diluti hemina una. Lippientibus & in uehementi oculorum dolore similiter dabis ieiunis & ante coenā. In podagricis doloribus ita auctis ut moueri non possint ægri, similiter dato cum uino diluto. In testibus eleuatis similiter drach. iiii. ieiunis dato cum hemina uini una. Verū tamen à nigro thymo elleboro appellato penitus abstinendū est. Corruptoriā enim uim habet, & bilem generat. Vtere autem eo qui florem purpureum habet ex natura, & album quid amplius complectitur.

Thymbra, Satureia.

Satureia hortensia consimilè thymo uim habent, sed sunt multò debiliora.

I

Intybi.

Intybi lactucis consimilè uim habent, sed tamen iucunditate multum inferiores existunt: item ad reliqua omnia de lactucis relata minus efficaces sunt.

1208. Viscum.

Viscum ex plurima aërea & aquea substantia calida, minima autē terrea constituitur. Itaq; plus acrimoniæ in se habet, quàm amaritudinis. Quapropter humores

mores ex alto fortiter trahit, non tenues solum sed etiam crassiores, eosq; diffundit ac discutit. Est autem ex medicamentis non statim calfacientibus post primam impositionem, sed quæ tempore indigent, uelut etiam thapsia.

Ion, Viola.

Viola folia aquosam & subfrigidam substantiam prædominantem possident, propterea & per se & cum polenta in cataplasmate imposita, inflammationes calidas mitigant. Imponuntur & in ardore oris ventris, itemq; oculorum.

Ippuris, Equisetum.

Hippuris adstringentem cum amaritudine qualitatem habet, & propterea siccatoriam fortiter simulq; citra mordacitatem. Vulnura igitur maxima in cataplasmate imposita glutinat, etiam si nervi dissecti sint, itemq; hernici intestinorum. Sed & sanguinis sputum, & fluxum muliebrem, maxime rufum, insuperq; ad dysenterias aliasq; ventris fluxiones, generosum pharmacum existit herba ipsa cum aqua, aut uino pota. Quidam de ea produnt, uellicæ etiam aliquando ac tenuium intestinorum uulnera curasse. Succus eius sanguinis est naribus eruptiones iuuat, & foeda ventris uitia, cum uino aliquo austero potus, aut in febrilibus cum aqua.

Ifatis, Glastrum.

Ifatis sativa qua tinctorum utuntur, fortiter siccantis facultatis est, nondum mordentis, amaraq; simul ac adstringentis. Quapropter magna uulnera durorum corporum glutinat, etiam si in musculorum capitibus existat. Sanguinis eruptionibus utile cataplasma præbet, & tumores laxos mirabiliter discutit, simul ac contrahit, & aduersus omnia maligna ulcera efficaciter resistit, siue coputrescant, siue erodantur. Quod si pro agri natura ac uiribus fortior appareat, ad folia ipsius trita, aut panem, aut ordeaceam farinam, siue triticeam, aut etiam polentam ammiscere oportet, iuxta prædominantem in unoquoq; dispositionem ac affectionem.

Ifatis sylvestris.

Sylvestris Ifatis acre quid habet manifestum iam in gustu & actione, & propterea magis siccatoria quam sativa existens, aduersus humidas putrescentias fortius reluctatur. Verum ad alia prædicta deterior est: immodice enim & cum mordacitate hæc siccatur, irritatq; & inflammationes excitat. Ceterum fortitudinis facultatis suæ gratia, etiam splenicis utilis existit, quibus sativa non profuit.

Itea, Salix.

Salicis folijs uti quis potest ad uulnerum cruentorum glutinationem, imò & flores ipsius quo omnes Medici ferme utuntur ad emplastri siccantis compositionem. Est enim uis ipsorum siccatoria citra mordacitatem; habent autem & adstrictionis aliquid. Quidam succum ex ipsis exprimunt, eumq; pro pharmaco habent mordacitatis experte ac siccante, ad multa utili. Cortex quoq; arboris cõsimilem floribus ac folijs uim habet, præterquam quod siccior temperamento præditus est, quemadmodum omnes ferè cortices. Quidam hunc exurunt, & cinere utuntur ad ea quæ forti resiccatione indigent. Itaq; clauos ac callos, insuperq; uerrucas myrmecias appellatas, eo eximunt aceto acri subactis. Aliqui tempore floris corticem incidunt, succumq; quendam inde colligunt, quo utuntur ad uitia quæ pupillis te nebras obducunt: est enim medicamentum exterforium ac tenuium partium. Quare etiam ad alia multa eius usus assumi queat, quum tali facultate præstet.

K

Calaminthe.

Calaminthe tenuium partium substantiam habet, estq; calida & sicca tertio ordine: sicca per se ex aqua mulsa pota manifeste calfacit, & sudores ciet ac discutit, & siccatur totum corpus, quapropter aliqui ipsa usi sunt & ad rigores per circuitum repetentes.

coctia

cocta in oleo, & illito inde toto corpore cum frictione strennua, intra corpus uero assumunt uelut dictum est. Quin & coxendicis cataplasma est in ischiadicis generoso omnino auxilio: trahit enim ex alto ad superficiem, & totum articulum calefacit, & cutem manifeste adurit. Insuper & pota apposita menses efficaciter prouocat. Bonum est & in elephantiasi medicamentum non solum ob id quod tenues humores discutiat, sed & quod crassos attenuet & fortiter dissecet, qui sane hoc morbi genus generant. Sic & cicatrices nigras illustrat, & sugillata discutit. Praestat autem in talibus cocta in uino cataplasmatibus uice imponere, uiridem magis quam arefactam: siccata enim fortior euadit & promptius inurit. Est & cataplasma in moribus animalium uirus ei aculantium. At uero ob amaritudinem & ascaridas & lumbricos succus eius perimit tum potus, tum per sedem infusus, imò & uermes qui in auribus itemque ulceribus nasci solent. Prodest & anhelosis & ictericis extergendo ac expurgando iecoris obturationes. Ceterum ad omnia praedicta efficacior est montana. Orpheus ait succum eius cum pari rosaceo & cerussa tritum ad strigmentum crassitudinem ac illitum, ambustis mederi, & quod omnem opinionem superat, neque cicatricem apparere, & locum pilos producere. Si uero cum cimolia terra & aloë, paribus portionibus acceptis succus teratur, indeque frons ac tempora illinantur, capitis dolores euestigio sanantur.

Calamus aromaticus.

Calamus aromaticus modicam adstrictionem & quam minimam acrimoniam possidet, maxima autem pars eius substantiae terreae ac aëreae est, moderata caliditas ac frigiditatis. Vnde & urinam moderatè ciet, & compositionibus stomachicis ac hepaticis quae foris ipsis imponuntur ammiscetur, & in uteri foris utiliter assumitur, qui inflammationibus, aut mensium irritationis gratia adhibentur. Ponatur itaque secundo ordine calfacientium ac siccantium, magis tamè siccantium quam calfacientium.

Calamus Phragmites, Arundo Sepiaria.

Calami phragmitae radix exterforiam uim non modicam habet, minimè acrem, folia tamè uiridia moderatè perfrigerant, itemque non modicam exterforiam uim possident. Cortex eius uisus tenuium partium ac discussoriam uim abundè acquirit, & exterforium quid habet, ut calfaciat ac siccet tercio ordine, plus tamè siccans quam calfaciens.

Cannabis.

Cannabis semen aëgre concoquitur, dolorem capitis inducit, & malum succum gignit. Si uero torreatur etià sic caput tentat, multum calfaciendo, & uaporem calidum ac medicatum ad ipsum delegando. Ex eo uero quod siccum temperamento praeditum est & flatus expers, genitale semen extinguit.

Capnion, Fumus terrae.

Herba fumaría acrem simulque amarā habet qualitatem, neque omnino expers est acerbæ. Quapropter urinam multam biliosam promouet, & iecoris obturationes ac debilitates sanat. Succus eius uisum exacuit delachrymationem faciens. Ipsa herba arida trita aquae mulsae inspersa ac pota, uentrem mollit. Vino autem diluto similiter inspersa, stomachum corroborat. Dato confidenter & decoctum ipsius quomodocunque febrientibus.

Capparis.

Capparis radice cortex praedominantè habet amarā qualitatem, secundo loco acrem, & deinceps acerbam, ex quo palam fit ex diuersis ac pugnantibus uiribus ipsum compositum esse. Etenim extergere & expurgare ac incidere potest ob amaritudinem: calfacere autem & discutere ac attenuare per acrimoniam, contrahere uero ac costringere & cogere per acerbitatem. & propterea lienes induratos si quod aliud

aliud medicamentum curat, tum forinsecus cataplasmatibus convenientibus amixtus, tum intra corpus acceptus, siue coquatur in aceto ex aceto mulso ac similibus, siue aridus tritus ipsidem inspersus: euacuat enim aperte uiscosos ac crassos humores sic acceptus, non per urinas solum, sed etiam per uentrem. Sæpenumero uero & cruenta egerunt hi in quibus lien opem sentit, & coxendicū dolores minuuntur. Quin & menses ciet, & pituitā a capite per os detrahit, & malignis ulceribus inspersus minutissimè tritus cōmodum pharmacū est, utpote exstergere ipsa ualens & fortiter resiccare. Sed & dentium doloribus prodest cum uino coctus aut aceto. Strumas quoque & tumores duros discutit, si aptis ad hæc medicamentis permisceat. Folia porro & caulis itemque semen siue fructus, consimilem cortici uim habent, nisi quod debiliora existunt. Et sanè ego memini me aliquando folijs solis strumosam duritiem intra paucos dies discussisse. Ammiscetur autem ipsis aliquid quod uehementiā facultatis ipsorum obtundat. Nihil uero miri est si etiam aurium uermes succus enecat ob amaritudinem. At uero fructus in muria compositus, deinde lotus ac maceratus, donec omnem salis uim deponat, medicamentum est ad excitandum appetentiam prostratam, extergendumque ac subducendum uentris pituitam, & ad expurgandum obturationes lienis ac iecoris. Utendum est autem eo cum commodo liquore, aceti mulsi, aut aceti oleo permixti, præ omnibus alijs cibis.

Cardamum, Nasturtium.

Nasturtij semen uisoriā uim habet uelut sinapi, & propterea ischiadicis, & capitis dolores, & quicquid rubefactione opushabet id ipsum calfacit, quemadmodum sinapi. Ammiscetur cōmodè & medicamentis ad anhelosos destinatis, nimirum ut medicamentū crassos humores dissecare potens. Herba ipsa similè semini uim possidet, uerum imbecillior est. Quare comesta ualde calfacit. Capitis autem dolorē eadem inducit.

Cardamomum.

Cardamomum calidā facultatem abundè possidet, ut etiam exulceret in cataplasmate impositū, minus tamen quā nasturtiū. Habet & amaritudinis quiddam in sese, ob quam etiā lumbricos enecat, & scabiē fortiter exterit cum aceto.

Caroum.

Caroi semen siccatur & calfacit tertio ordine: acrem autem qualitatem moderate possidet, & propterea status leuat discutitque, & urinā ciet, non modo semen, sed tota planta.

Casia.

Casia calfacit ac siccatur tertio ordine, estque multū tenuium partium: in gustu autē plurimū acrimonię habet, paruaque quandā adstrictionē. Quare propter hæc omnia siccatur simulque discutit corporis superfluitates, et præterea robur organis addit. Cōmodatur & ad suppressos menses, ubi præ copia simulque crassitudine superfluitatum, sufficienter euacuari prohibentur.

Carya, Nux arbor, Nux iuglans siue Regia, Nux parua, Punica, Auellana. Nux arbor habet quidē tum in germinibus, tum in folijs aliquid adstringens, uerū insigniter & copiose in ipso nucis suæ cortice, & recenti & arido. Utuntur itaque ipso etiam tinctorum. Nos autem eundem exprimentes, succumque similiter ut mororū ac rubi, mororum cum melle coquentes, stomaticū preparamus oris uitij cōmodum medicamentū, quo etiam ad alia omnia utimur, ad quæ prædicti succi cōmodi existunt. Cæterum ipsius nucis nucleus qui in cibi usum uenit, oleosus est & tenuium partium, particeps est autem & adstringentis qualitatibus, sed modicæ & quæ temporis progressu euanescit, tota ipsius substantia in pinguem succum transeunte, qui oleo ueteri similis apparet, & propterea omnino tandem

tandem edi non potest. At uero uiridis adhuc & recens nucleus, neque adstringentem qualitatem manifestè possidet, neque oleosam. Vnde ad alui excretionem comodior est quam siccus, & maxime si cum garo, quemadmodum aliqui faciunt, accipiat. Sed & siccarum nucum in aqua maceratarum, uelut quidam facere solent, consimilis uis est ut uiridium. Concoquitur tamen melius nucis fructus, & stomacho comodior est, si cum caricis edatur. Aiunt si quis caricis cum nucibus ac ruta prae reliquis cibis comedat, eum non magnopere à lethalibus medicamentis laedi posse. Porro ex inueterata nuce oleum quoque exprimi potest, quod abunde discussorium existit, ut quidam eo etiam gangrenas & carbunculos ac ægilopas curent. At uero putamen eius aridumustum, tenuium partium siccatorumque & lene pharmacum euadit. Cæterum nux parua, quæ & Pontica, & Auellana appellatur, frigidior est & austerior, utpote, magis terrea existens. In cæteris regibus, siue iuglandi similis est. Capitis autem dolorem in cibo sumpta inducit.

Castania.

De Castania eiusque fructu dictum est in querci tractatione.

Cenchros, Milium.

Milium frigefacit primo ordine, siccatur aut tertio exoluto, aut secundo intento. Est & modice tenuium partium. Vnde comestum instar edulij, omnium ferme eduliorum frumentacei generis minimi nutrimenti est, sed & aluum exicat. Verum forinsecus impositum in marsupijs siue sacculis, fomentum est apertissimum his qui leni resiccatione opus habent.

Cedrus, Cedria, Septica.

Cedri species duæ sunt, utraque tertio calfacit ac siccatur. Cedria uero quæ ex ipsis fit, etiam quartum iam ordinem attingit. Est autem primi ordinis erodentium, septica greci appellant, multum calida ac tenuium partium existens, teneras sane carnes promptè simulque citra dolorem corrodit caliditas ipsius, per caliditatem quæ in corporibus est aucta, uerum in duris corporibus longiori tempore & uix tandem efficaciam suam ostendit. Vnde mortuorum corpora incorrupta conseruat, humiditates ipsorum superfluas depascens, solida autem corpora non attingens, propterea quod non tam fortem uim habet, uelut alia erosiua appellata. Nihil uero miri est si eiusmodi ui pollet, quod etiam pediculos, & lendes, & aurium uermes, & ascaridas in recto intestino enecare potest. Foetus insuper appositus uiuos quidem necat, mortuos autem eicit, quemadmodum etiam ipsum semen genitale, in coitu pudendo oblita, & propterea sic usurpata medicamentum conceptum impediens est nulli alteri posthabendum. Sed & dentium foraminibus instillata dolores quidem minuit, ipsos autem dentes confringit. Attenuat & oculorum cicatrices, & hebetem uisum ob crassitudinem humorum sanat. Quod uero pinguiissimum est ex ipsa & exactè oleosum, quod superextentis lanis dum coquitur colligitur, tenuiorum quidem partium est quam tota cedria, uerum minus acre ac mordax, quanquam non minus, sed magis etiam quam cedria efficax sit. Vnde & hoc idiotæ utuntur ad uulnera ouium in tonsura per forcipes illata, item ad scabiem, & ad ricinos. Cedri porro bacca & fructus cedrides grecis appellati, moderatiorem uim habent, ut etiam in cibi usum ueniant. Si quis tamen plures ex ipsis ingerat, & caput dolet, & excalefacit, & oris uentris morsum percipit.

Centaurea magna.

Centaureæ magnæ radix ex contrarijs uiribus composita est. Itaque in gustu acris simulque adstringens apparet, cum quadam dulcedine. In actione uero acrimonia caliditatis opera exercet, menses promouens, & foetus mortuos detrahens,

hens, & uiuentes corrumpēs, simulq; eiiciens. Adstrictio autem frigiditatis crassioris ac terrae opera designat, tum uulnera glutinando, tum sanguinem spuentes iuuando. Dare autem oportet ex ea drachm. ii. febricitantibus cum aqua, febre carentibus cum uino. At uero iuxta omnium qualitatum actionem & ruptus, & conuulsis, & spirandi difficultatibus, & inueteratae tussi conuenit: non enim euacuare solum in his oportet quod praeter naturam est, sed roborare etiam ac firmare expurgata. Succus ad eadem ad quae radix ualet. Quidam etiam eo pro lycio utuntur, illo non praesente.

Centaurea parua.

Centaureae paruae radix omnino inefficax est, ramuli uero & magis folia, & ipsorum flores in usum ueniunt. Dominatur in ipsis qualitas amara, parū quid adstrictionis possidens, & propterea fortiter siccatorium est pharmacū absq; mordacitate. Magna itaq; & recentia uulnera glutinat herba ipsa uiridi in cataplasmate imposita. Vetera uero & aegre cicatricem recipientia, ad cicatricem perducit simili modo adhibita. Quin & sicca glutinatorijs ac siccatorijs compositionibus miscetur, quae sinus ac fistulas curare solent. Sed & ueteres duritias mollire creditur, & maligna ulcera sanare. Miscet & eis quae fluidas affectiones sanant. Decoctū herbae quidam ischiadicis infundunt per sedem, uelut quod biliosum & crassum humorem ducat. Nam & purgat, & sanē ubi uehementer operationem suam exercebit, cruenta euacuat, & magis prodest. Succus eius consimilem uim habet, hoc est, siccatoriā & exterforiam, & tum alia praedicta probē efficere solet, tum cū melle oculis sublinitur, & appositus menses ac foetus educit. Quidam ipsum bibendum dant in affectis neruis, uelut euacuantem ac citra molestiam siccantem infarctā. Ceterum & ad hepatis obturationes bonum pharmacum est. Bonum & lieni indurato, forinsecus impositus, neq; minus si quis bibere uelit. Herba ipsa exsuccanda est circa summum uigorem, & flore praegnans. Datur succi cochleariū unum cum aqua calida, & sale modico, ac pauculo acetato, & purgat generose humorem atrae bilis. Coma eius contusa & cum melle coctō, aut sapa in collyria formata, fistulas circumscribit, & callos eximit, collyrijs in fistulas immixtis. Corymbi eius tussis ac cribrati cochlearij mensura ischiadicis dantur ieiunis cum aqua calida, ad triduum aut plures etiā dies. Eius certe pharmaci efficacia magno miraculo saepe fuit. Et ad polypodas in naribus excrecentes idem medicamentum siccum inspergitur.

Cerasus.

Cerasus fructum fert moderatē adstringentem cum dulcedine: matura itaque cerasa & dulcia magis per intestina subeunt, minus uero stomacho commo-
dant, immatura & austeriora uice uersa. Gummi arboris uino potum calculosis prodesse quidam tradiderunt.

Ceratonía, Siliqua.

Siliqua arbor siccatoriā & adstrictoriā uim habet, quemadmodum etiam fructus eius, ceratía Græcis, nobis siliquae appellatae, particeps est autem & alicuius dulcedinis. Siliquae aliquam cum cerasis similitudinem habent. Virides enim & humidae aluum magis subducunt. Siccæ magis sistunt.

Cestron, Betonica, Psychotrophon.

Betonica cestron & psychotrophon appellatū, uim habet sectoriā uelut gustus indicat: amara enim & acris herba existit, uelut etiam particularis actio ostendit. Nam & rhenum calculos confringit, & pulmonem ac pectus & iecur purgat ac extergit, & menses mouet, & comitiali morbo prodest, & ruptis ac conuulsis
d medetur

medetur. Acidum item ructum sedat, & ischiadicis conducit pota.

Cicis, Galla, Omphacitis.

Galla quæ omphacitis uocatur, abundè acerbū pharmacū est, substantiæ terreae frigide plurimę particeps, ob quam & siccatur, & fluxiones repellit, & cogit ac adstringit laxas ac inualidas partes. omnibus etiā fluidis affectionibus resistit. Po- natur autem in tertio ordine siccantium, in secundo uero frigefacientium. Altera galla flaua laxa ac magna siccatur quidem, sed tanto minus, quanto minus acerbę qualitatis particeps est. Cocta itaq; per se ac trita, & in cataplasmate adhibita inflammationū sedis ac prolapsus eiusdem insigne auxilium est. Coquere autem oportet si moderata adstrictione opus est in aqua, si uehementi in uino, maxime austero. Gallæ uim supprimendi sanguinis habent, & manifestum satis est quod caliditatem & acrimoniam ex ustura acquirunt, & magis tenuium partium quàm non ustæ euadunt, itemq; siccatoriæ amplius. Oportet autem candefactas super prunas, aceto aut uino extinguere.

Cera.

Cera in medio quodammodo est calfacientium, frigefacientium, humectantium ac siccantium, habet & crassarū partium quid & meatus obturatorium, quapropter nō solum siccatur, sed & per accidens humectare uidetur perspirationes prohibendo. Vnde & materia est aliorum pharmacorum. Ipsa autem per se ex concoctoriorū debiliū numero fuerit, quæ forinsecus imponuntur. Habet enim parum ex discussoria ac calida facultate, cuius quāplurimæ mel ipsum particeps existit.

Ciborium.

Viridem fabarum Aegyptiarum fructum ciborium appellant. Quare in fabarum tractatione, etiam de hoc considerandum est.

Cinara.

Cinara mali succi edulium est, maxime ubi durior euaserit. Nam & biliosum humorem in sese tunc uberiores colligit, & totam substantiā lignosiores habet. Quare ex hac quidē humor atræ bilis generatur. Ex succo uero ipsius tenuis & amaræ bilis humor producit. Præstat igitur præcoctā ipsam in cibo absumere.

Cicis arboris fructus, Ricinus, Croton.

Cicis arboris fructus, quem aliqui crotonem ac ricinū appellant, quiq; purgandi uim habet, exterioria ac discussoria facultate præditus est, folia eius imbecilliora sunt. Oleum quod ex fructu fit, calidius & magis tenuium partium est quàm commune, & propterea etiam discussorium.

Cisthos siue Cistharus.

Cisthos frutex adeo adstrictorius est, ut & folia ipsius in cataplasmate imposita uulnera glutinent. Flores efficaciores sunt, ut cum uino poti dysenterias, & uentris imbecillitatē, ac fluxiones, & humiditates sanent, in cataplasmate autem impositi putrefactis ulceribus conducunt, propter generosam siccandi uim ferē in secundo ordine. Ipsius fruticis frigiditas tepidæ quoque qualitatis particeps est. Cæterum quæ hypocisthis appellatur, multo magis quàm folia adstringit, estq; efficax pharmacum ad omnes fluidas affectiones, uelut sanguinis reiectionem, fluxum muliebrem, coeliacas & dysentericas affectiones. Sed & corroborare partes solet, & à plurima humiditate exolutis firmitatem addit, atq; sic sanē & stomachicis & hepaticis conducit. Firmat enim ac roborat non instrennuē, epithematis aut antidotis aptis ammixta.

Cisthus siue Ladanum.

Cisthus hic in calidioribus regionib; nascit, nō genere alius ab his qui in alijs locis

cis nascuntur, sed à regione præcipuâ quandam propriam discussoriâ qualitatem adeptus est deposita frigiditate. In reliquis igitur conlimilis est præcedenti. Verum ex ipso fit ladanum medicamentum calidum primo ordine iam completo, ut etiam secundum attingat, particeps est autem & adstrictionis cuiusdam modicæ, & tenuium partium substantiam habet, & propterea moderatè emollit, & similiter discutit itemque concoquit. Itaque non mirum est uteri affectibus hoc præcipue convenire, propterea quod aliquid adstringens habet, per quod etiam defluos capillos retinet. Nam & vitiatos humores iuxta pilorum radices attenuat ac consumit, & meatus quibus impacti erant adstringendi vi cogit & constringit.

Cissos, Hedera.

Ex contrariis facultatibus hedera componitur: habet enim quid substantię adstrictoriæ, quam frigidam ac terream dicimus. Habet & quid acris, quam calidam esse gustus testatur, sed & aquosæ substantię tepidæ uiridis particeps est. Viridia itaque folia cum uino cocta, etiam magna uulnera glutinant, & maligna ulcera sanant. Vlcerationes quoque ex igne cicatrice includunt. Cum aceto autem cocta folia splenicis opitulantur. Flores eius fortiores quodammodo sunt, ut cum ceasarato triti ambusta curent. Succus ipsius per nares purgat, & antiquas aurium fluxiones sanat, & ulcera uetera tum aurium, tum narium ad cicatricem perducit. Si uero acrior appareat, rosaceo aut oleo dulci temperetur. Lachryma hedere pediculos necat, & pilis nudat, in tantum calidam uim habens, ut etiam leniter urat. Prodest etiam lachryma calculosis in potu.

Cnicus.

Cnici semine ad purgationes tantum utimur. Est autem tertij ordinis calfacientium, si quis forinsecus admoto ipso uti uelit.

Coccus enidius, Granum enidium.

Cnidius coccus purgatoriâ uim habet, estque facultatis acris & ustoriæ.

Coccus tinctorius, Granum tinctorium.

Coccus tinctorius adstringentem simulque amarâ qualitatem habet, & per utramque leniter siccatur, & ob id ad magna uulnera conducit, & ad fauciatis nervos, cum aceto aut aceto mulso tritus.

Coccymelea, Prunus.

Pruni fructus recens magis aluum subducit, siccatus minus. Sunt autem damascena pruna magis adstringentia, Hispana dulciora, & propterea magis aluum ducunt. In folijs autem manifesta quædam adstrictio apparet, unde decocta utiliter gargarissantur in inflammationibus gurgulionis ac tonsillarum. Cæterum syluestrium prunorum fructus adstrictorius est & uentrem sistit. Et in Asia sanæ hæc planta prunus nominatur. Gummi omnis pruni cum uino potum lapides frangere quidam produnt, uerum cum aceto impetigines puerorum exterit.

Colocasion, siue Manzanion.

Colocasij radicis similis uis est rapis ac cepis, uiscosum autem corpus ipsius est. Unde extensoriæ facultatis particeps est, & uentri in cibo sumpta commodatur.

Colocynthe, Cucurbita.

Cucurbita humidi & frigidi temperamenti est, utroque secundo ordine. Unde & ramentorum eius succus auribus inflammatis & dolentibus conuenit cum rosaceo. Sic & tota in cataplasmate imposita, calidas inflammationes mediocriter refrigerat. In cibo accepta nimia humectatione corpus implet, & sitim eximit, & alimentum humidum ac frigidum, & propterea etiam modicum corpori præbet. Concoquitur autem non male, ubi non prius fuerit corrupta, id quod accidit

ipsi propter malam præparationē, & ubi vitiosus humor in uentre fuerit coaceruatus. Imò si etiā diutius in uentre moretur, quemadmodū reliqua quoq; humida edulia. Gaudet origani conditura propter aquosam in ipsa qualitatē. Omnia enim huius generis acris aut acidis, aut austeris, aut salis saporibus miscere oportet, si modo neq; insurauiter sumi debeant, neq; sumentes nauseabundos efficere.

Comarus, Arbutus, Memæcylon.

Arbuti fructus memæcylon appellatur, estq; stomacho incōmodus, & capitis dolorē inducit, arbor ipsa simul cum fructu acerbam qualitatem possidet.

Commi, Gummi.

Gummi uim habet siccatoriam, meatus obducit, & asperitates sanat.

Conia stacte, Lixiuum.

Quod uelut ablutio est materierum ad cinerem redactarū, conia stacte Græcis, nobis lixiuum uocatur. Ex omnibus autem maximè exterioriū est & siccan di uipræditum, quod ex cinere ficulneo & tithymallis fit, ut ferè uim erosiuā sortiatur. Verum ob substantiam tenuium partium circa dolorem urit.

Conyza.

Conyza & maior & minor cōsimilis temperamenti ac facultatis existunt, gustui acris & amaræ apparentes. Calfaciunt & siccant euidenter, ut utriusq; qualitatē tertio ordine locentur. Decoctæ itaque in oleo, rigoribus per circuitum repetentibus salutarē uel edulam præbent. Quidam flores ipsarum unā cum folijs terentes cum uino bibendos exhibent, ad menses ciendos ac foetus eiiciens dos. Est & tertium conyze genus, in humectioribus locis proueniens, magis scetidum & imbecillius.

Corianum, Coriandrum.

Corianon item corion appellatur, & ex contrarijs facultatibus compositum est, multum habens substantiæ amaræ, quæ tenuium partium est & terrea, nec parum aqueæ humiditatis tepida uipræditæ. Habet & parum quid adstrictioris, ex quibus omnibus multifariā efficax est facere ea quæ Dioscorides prodidit, uerum non ob solam frigiditatem.

Colla, Glutinum.

Glutinum quod ex similagine aut polline ad libros conficiunt, facultatem habet meatus obducentem & concoctoriā. At uero de taurino glutine ac simili in sermone de animalibus agitur.

Coronopodium, Pes cornicis.

Coronopodij radix in cibo accepta coelacis opitulari creditur.

Costus.

Costus modicæ amaritudinis, plurimæ uero acrimoniæ ac calidæ qualitatis particeps est, ut etiam exulceret. Vnde ex ipso cum oleo perfricant corpus ante accensionem in rigoribus per circuitum redeuntibus. Alij idem & in resolutionis ac ischiadicis faciunt, & omnino in his quibus aut partem aliquam calfacere uolumus, aut humorem aliquem ex alto ad cutem adtrahere, usus eius compertit. Ob eandem causam & urinam ciēt, & menses ducit, & ruptis ac conuulsis, & laterum doloribus confert. Verum ob amaritudinem, etiam latum lumbricum necare creditur, & ad solares maculas ipso utuntur, cum aqua aut melle. Inest præterea ipsius temperamento flatuosa quædam humiditas, ob quam & uenerem stimulat cum uino mulso potus.

Coryledon, Umbilicus ueneris.

Coryledon mixtam uim habet, humidā & frigidā, & quandā obscure subadstringens

stringentem & modicè amarā. Vnde frige facit, & repellit, & extergit, & discutit. Inflammationes itaq; erysipelatas, & erysipelata inflammata sanat, & in stomachi ardore cōmodum cataplasma existit. Creduntur folia cum radice comesta lapides atterere, & urinā ciere.

Crambe, Brassica.

Brassica comestilis siccatoriam uim habet, & in cibo accepta, & forinsecus imposita, non tamen manifestè acrem, sed ut uulnera glutinet, & maligna ulcera sanat, & inflammationes curet iam induratas ac ægrè solubiles, eiusdemq; generis erysipelata. Sed & epinyctidas ac herpetas sanat. Habet & quid extensorium, per quod etiam lepras exterit. Succus itaque ipsius quid purgatorium habet, corpus autem eius alui excretionem cohibet, eaq; gratia in quibus humectum uentrem siccare uolumus, moderatè ipsam coquimus, & priore aqua diffusa, statim in alteram calidam præparatam immittimus ac feruefacimus. Non oportet enim neque aërem, neque frigidam aquam contingere quod bis coquitur. Neque enim exactè flaccidum fit, etiam si diutissimè coquas. Itaque in aliam calidam immixtam coquimus donec flaccida fiat, Nam si uentris subducendi gratia sumitur, non ualde discoquitur. Siccatur igitur brassica quemadmodum lentiscula, & propterea uisum hebetat, & atræ bilis humorem generat. At uero asparagus brassicæ minus siccatur, & magis urinam ciere. Semen autem potum lumbricos enecat, & maculas solares ac lentigines, & quæcunque alia moderata extersione opus habentia exterit. Cauliculi eius usui cinerem efficiunt fortiter siccantem, ut & ustoria facultatis particeps sit. Quapropter eo cum ueteri adipe amixto, quidam ad ueteres laterum dolores, & sicubi eiusmodi alius dolor infestet, utuntur. Fortiter enim discussorium medicamentum efficitur. Brassica porro syluestris siccior & calidior multò est quàm satiuia, quemadmodum omnia alia ferme syluestria satiuis fortitudine præstant. Vnde neq; citra offensionem intra corpus sumuntur. Discutit autem & extergit uehementius quàm satiuia. Cæterum marina brassica ultra hoc quod uentrem emollit, subsalsum nimirum ac subamarum saporem habens, cōmoda quoq; fuerit ad externos corporis usus, ad quos sanè eiusmodi qualitates conueniunt.

Chrethmon.

Chrethmon salsum quodammodo in gustu est, unà cum modica amaritudine, propterea & uis ipsius extensoria simulq; siccatoria existit. Vtraque tamen facultate amaris cedit.

Criothæ, Ordeum.

Ordeum primi ordinis est siccantium ac frige facientium, habet & modicum quid extensorium, & paulò magis siccatur quàm fabarum farina à cortice depurgata. In reliquis omnibus forinsecò usu consimilia existunt. Verum in cibo acceptum ordeum, hoc amplius fabis habet, quod in coctura flatuositatem deponit, fabæ autem quomodocunq; coquatur flatuositas permanet. Crassioris enim substantiæ faba est quàm ordeum, & propterea etià magis quàm ordeum nutrit. Ordeum uero succum generat tenuem & extensorium quid habent. Nihil igitur calfacit corpus quomodocunq; tandem præparet. Verum humectat & siccatur diuersimodè præparatum. Etenim polenta ex ordeo tosto facta, manifestè apparet siccare. Pitisanæ uero humectat, quum uelut cōuenit præparat. Panes autem ordeacei omnes minus nutriunt quàm triticej, & magis uentrem subeunt quàm illi. Cæterum polenta ex ordeo tosta facta magis quàm ordeum siccatur, & modicum alimentum corpori sufficit quomodocunq; coquatur. Eadè ex uino Aminæo austero pota alui siccatur. At uero maza: uocant autè sic polentam ordeaceam liquore aliquo subactam, uelut sa-

d 3 pa, aut

pa, aut melle, aut alio quopiam, quæ etiam cruda comeditur, quomodocunque præparetur, minus quam panes ordeacei concoquitur, & uentrem magis flatu implet, & si diutius ipso moretur, turbationem efficit. Quum enim ordeum ex natura non parum furfuris habeat, torrefactum ordeum idipsum fursuraceum & siccus, & magis difficulter confringi potens habet, imò & id quod utile ex ipso in corporis alimentum cedit, siccus euadit. Quicquid igitur fursuraceum & durum in ipso est, quemadmodum forinsecus apparet quod aqua non dissoluatur, eodem modo neque in uentre dissoluitur maceratum, sed permanet inconfectum uelut est acceptum. Quum igitur neque concoquatur neque in uenas distribuatur, per uentrem secedit, & præsertim quum extergendi uim ex ordeo habeat: magis autem secedit inferne sæpius subacta ac trita. Si uero & mel assumpserit, adhuc citius subit. Porro quod crimon Græci uocant, crassiorque farina tum tritici, tum zeæ existit, magis alit quam polenta, sed ægrius concoquitur. Vocatur ex ea forbitio puls, & quæ ex zeæ sit uentrem lenius aliquanto sistit, magisque si torreatur,

Crinon, Lilium.

Lilij flos temperamentum mixtum habet, ex substantia quadam tenuium partium terrea, ex qua etiam in gustu amaritudinem offert, & quadam aquosa temperata, unde & oleum ex ipso lenis tum discussoria, tum mollientis facultatis existit, & ad uteri duritias aptum. Radix etiam ac folia per se trita, siccant & extergunt ac moderate discutunt. Est enim radix primi ordinis extersiuorum, qua gratia & ambustis conducit. Radicem itaque assatam, deinde rosaceo tritam ambustis imponunt usque ad cicatricis inductionem. Nam & alias omnia ulcera optime cicatrice includit. Sed & uterum emollit, & menses promouet. Folia quoque præcocta usque ad cicatricem inductionem imponunt, non ambustis solum, sed etiam ulceribus. Reposimus aliquando & foliorum succum coctum cum aceto & melle ad liquidioris mellis copagem, ita ut succi partes quinque sumantur, mellis autem & acetum utriusque pars una, sitque commodum pharmacum ad omnia uehementi resiccatione indigentia citra mordacitatem, uelut sunt uulnera magna, & maxime quæ circa capitis musculos fiunt, item ulcera inueterata, fluidaque ac ægre recipientia cicatricem.

Crocodilion.

Crocodilij semen acre est, & aromaticum, urinam ciens, & menses ducens, ut & calidæ facultatis sit discussoriaque ac siccatoria. Succus caulis & seminis consimilem uim habet, & nephreticis prodest. Radix expuitiones e pectore fortiter adiuvat. Estque minus acris quam semen, uerum non minus amara. Sanguinem quoque per nares ducit.

Crocus.

Crocus habet quidem aliquid modice adstrictorium, quod terreum frigidum esse ostensum est. Dominatur autem in ipso calfacitoria uis ac qualitas, ut ex tota substantia sua secundi ordinis sit calfacientium, primi siccantium, & propterea etiam concoctorium quid habet, quod modica illa adstrictione adiuuatur.

Crommyon, Ceba.

Ceba quarti ordinis est calfacientium, substantia ipsius magis crassarum partium existit. Unde & hæmorrhoidas apperit apposita, & cum aceto illita in sole utilitæ gines extert, & alopecij affricata citius quam alcyonium pilos prouocat, comestita calfacit corpus acrimonia sua, & crassos ac uiscosos humores attenuat. Inflat autem uentrem propter crassarum partium substantiam.

Cyamus, Faba.

Faba frigefaciendo ac calefaciendo medium temperamentum propinquissime accedit,
caro

caro eius modice cuiusdam extensoriae facultatis particeps est, quemadmodum corio adstrictoriae. Quapropter aliqui medici fabam integram cum corio suo in posca decoctam, dysentericis & coeliacis ac uomentibus exhibent. Est autem edulij ratione, si quod aliud, agre concoctile & flatuosum, etiam si quam diutissime coquatur, & quomodocumque praeparetur, ad excreationes tamen pectoris ac pulmonis commodum: Et uiridis quidem faba comesta, magis aluum subit, uerum minus quam arida ingesta nutrit. Torrefactae tamen fabae flatuosum deponunt, sed agrius concoquuntur, & tardius commeant, & crassum succum generant. Pharmaci autem loco faba forinsecus imposita, citra molestiam siccatur: Et sane ad podagricos saepe ea usi sumus cocta ex aqua, deinde adipe suillo ammixto. Ad neruos uero contusos & ad ulcera, farinam eius imposuimus aceto mulso, aut uino mulso coctam, rosaceo etiam addito, si inflammatio adesset. polenta uero addita, ad inflammatos iam ex plaga. Est & testium ac mammaru utile cataplasma: Solet enim has partes inflamas modice perfrigerare, maxime ubi lacte in ipsis in casei speciem coagulato ubera fuerint inflammata. Nam lac ab eiusmodi cataplasmate extinguitur: Quemadmodum etiam puerorum pubes, farina fabaceae cataplasmatibus modo intacta, diutissime impubis permanet.

Cyclaminus.

Cyclaminus uariam uim habet: Nam & extergit, & dissecat, & uenaru oscula aperit, & attrahit, & discutit: Succus enim ipsius hemorrhoidas aperit, & alui irritat uolenter, appositus. Sic & tubercula, & strumas, & alias duritias discutit, compositionibus discussorijs ammixtus. conuenit & suffusus oculis cum melle subtilis, & praeterea per nares purgat. Adeo autem forti ui praeclatus est, ut etiam imo uentri illitus, aluum subducatur & foetus corrumpat, sed & in pessi forma appositus similiter fortis perimit. Tota radix succo imbecillior est. Est tamen etiam ipsa uehemens: Nam & pota & apposita menses ciet, & ictericis confert, non uiscus solum ipsum uidelicet iecur expurgans, sed bilem in toto corpore per sudores euacuans. Quare ab eius potu adiuuare omnibus modis oportet sudorum excretionem, corpore cotesio ac uberius calfactio. Copiam eius drachmas tres, aut summum quatuor excedere non oportet, ex passo aut aqua multa. Exterget & cutem, quapropter maculas solares, & alopecias ac similia sanat. prodest & indurato lieni tum recens, tum sicca in cataplasmate imposita. Quidam aridam radicem etiam anhelatoribus exhibent. Eadem arida tusa & per tenuissimum cribrum excreta, una cum caryophyllis, ita ut radice sit uncia una, caryophyllorum grana x x i. naribus insufflata, crassos & uiscosos humores a capite purgat, unde antiquos capitis dolores sanat, & morbo comitiali magnopere opitulatur.

Cyminum.

Cymini semine praecipue utimur. Est autem facultatis calfactoriae, urinam ciet, & flatus dissipat, tertij ordinis calfacientium existens.

Cyparissus, Cupressus.

Cupressi folia & germina pilulaeque recentes ac tenerae, magna uulnera in duris corporibus glutinant, ex quo manifestum est quod siccatoriam uim habent, absque manifesta acrimonia ac caliditate. Plurimam autem habet amaritudinem, & multo ampliore acerbitate uniuersa planta. Tantum uero est in ipsa caliditas, quantum satis est ad deducendam acerbitate in altum, citra calfactionis aut mordacitatis inductionem. quapropter humiditates in profundo, in humectis putredinosisque affectionibus consistentes, citra molestiam simulque secure depascit, altera

non amplius attracta. Atque sic herniosis confert in cataplasmate imposita. Siccat enim & robur addit corporibus ex humiditate laxis, mergente se nimirum in altum ut adstringendi, quum deducatur per ammixtam ipsi moderatam caliditatem. Utuntur ipsa quidam & ad carbunculos ac herpetas polenta ammixta.

Cyperus, Iuncus quadratus.

Cyperi radices maxime in usum veniunt calfacientes ac siccantes citra mordacitatem: Vnde & ulcera ob nimiam humiditatem agere recipientia cicatricem, mirabiliter sanant. Habent enim quid adstringitorium, & propterea oris ulcerationibus commodant. Habent & vim quandam sectoriam, qua & calculosi profunt, & urinas ac menses cient.

Cypros, Ligustrum.

Ligustri arboris folia & uirgulta ac flores in usum veniunt, mixtae facultatis ac temperamenti existentia. Habent enim quid discussorium ex aquosa substantia moderatè calida: Habent & quid adstringitorium, ex terrea frigida. Vnde decoctum fotu ambustis prodest. Commodat & ignitis inflammationibus ac carbunculis, citra molestiam ac mordacitatem siccans. Sed & commanducata ulceribus oris sponte productis, & maxime ignitas aphthas referentibus conducunt. Folia siccata in umbra tusaque ac cribrata, mox in aqua ad calidum cinerem cocta, modico rhoë culinario insperso, & aceti momento, bonum cataplasma praebent in podagricis ac chiragricis, in ipsis maximis inflammationibus imposita. Nam & inflammationes sedat, & fluxiones repellit, & quod iam in locis continetur discutit per meatus occultos, quemadmodum per sudorem. Laedit tamen hoc cataplasma colorem, & maxime ungues. Quapropter praelineare locos oportet, liqui do rosaceo cerato. Ipsum autem cataplasma integendum est ricini folijs, aut carpasii, si adsint.

Cytisum.

Cytisi folia discussoriae sunt facultatis ammixta tepida aquosa, quemadmodum folia maluae.

Conion, Cicuta.

Quod cicuta extrenue frigidam vim habeat, omnes norunt, & propterea ex summa illa frigefactione etiam enecat ac occidit.

Coni fructus, Nux pinea, Cocalus, Strobilus.

Coni fructus, quem & Cocalum, & Strobilum, ac pineam nucem appellant, integer quidem uiridis, amaritudinem quandam & acrimoniam cum humiditate habet, & propterea pectore suppuratis commodus est, itemque alijs quibuscumque ex pectore ac pulmone facilis scretus ac per tussim reiectio expetitur. Nucleus eius qui in cibi usum venit, alimentum praebet agre concoctile, ualidum, ac multi succi, propter oleositatem. Verum medicamenti loco asperitates leuigat, maxime ubi aqua maceratus omnem suam acrimoniam deposuerit.

Cancani radix.

Cancani radix vim habet moderatè siccatoriam citra mordacitatem, substantiam autem crassam partium meatus obducentem. Vnde uino macerata uelut tragacantha, & delineta, arteriae asperitates sanat. Nihilominus si quis ipsam manducet, succus praeterfluens arteriae prodest, similiter ut glycyrrhizes succus.

Caucalis.

Caucalim aliqui daucum syluestrem uocant. Est autem similis ipsi & gustu & uiribus, calfacit enim uelut ille, & siccatur, & urinam ciet, & muria codita reponitur.

Carpesium.

Carpesium simile est ei quod phu appellatur, & gustu & uiribus, uerum amplius tenuium partium existit, quapropter & magis quam illud extergit uiscerum

rum obturationes, & urinas mouet, & rhenes expurgat calculosos. Non tamen in tantum tenuium partium est ut pro cinamomo in usum assumi possit, si cinamomum haberi nequeat, quemadmodum Quintus fecit. Praestat quidem igitur Ponticum Laërico, non tamen etiam hoc ipsum uiribus cinamomo par est, sed etiam ab optima calia non modico intervallo relinquitur. Viraque appellatio à quibusdam Pamphiliæ montibus est, in quibus plurimum prouenit.

Λ.

Lathyri, Cicerculæ.

Cicerculæ consimilem ochris & phaselis substantiam habent, itemque similem succum, sed compage crassiorem, & propterea aliquo modo magis hæc quam illi alunt.

Lathyrus.

Lathyridem tithymalli speciem esse quidam aiunt, Semen eius purgatoriam uim habet.

Lapsana.

Lapsana in cibo accepta mali succi est, in cataplasmate imposita exterforium quid ac discussorium habet.

Lapathum, Rumex, Oxylapathum.

Lapathum moderate discussoriam uim habet, & sanè caliditatis particeps est. Rhenum calculos radix eius confringit, & scabiem ac corporis asperitates sanat ex aceto cocta & affricata. At uero Oxylapathum mixtam uim possidet. Habet enim in repulsoariam unā cum discussoria facultatem. Semen ipsorum manifeste adstringit, unde & dysenterias & alui profluvia sanat, præsertim oxylapathi. Cæterum Hippolapathum in paludibus nascitur, eadem ui præditum, uerum imbecilliore. Syluestris porro lapathi radix, quā mylen appellant, ex aceto cocta siue uino, dentes corroborat, eorumque dolores sedat, si eo decocto calido colluantur.

Limonium, siue Cynoglossum.

Limonij semen austerum existens cum uino exhibent coeliacis, & dysentericis, & hæmoptoicis, conducit & ad fluxum muliebrem.

Lichen siue muscus petrarum.

Lichen petrarum exterforiæ simulque frigefacientis moderate facultatis est, & siccantis iuxta utramque facultatem. Sanat impetiginem cognominem sibi apud Græcos morbum.

Lentopodium siue Leontopetalon.

Leontopodij radice maxime utimur, discussoria & calfactoria ac siccatoria, in tertio ordine.

Lepidium.

Lepidium quarti ordinis est calfacientium.

Leucoion.

Leucoij uniuersus frutex exterforiam & tenuium partium uim habet, maxime tamen flores præsertim sicciore. Quare & cicatrices oculorum crassas attenuant, & decoctum ipsorum menses ac secundas promouet, & foetus immortuos expellit. Nam & uiuum perimit foetum in potu acceptum. Quod si quis uehementiam facultatis ipsius multæ aquæ mixtura aut aliquo alio eiusmodi liquore mitiget, habebit & ad inflammationes commodum medicamentum. Sic & decoctum ipsius si non meracum fuerit, fomento uteri inflammationes sanat, & maxime diuturnitate induratas. Idem cum cerato ulcera ægre cicatricem recipientia curat. Semen ipsdem uiribus prædictum commodissimum est potum duarum drachmarum pondere, aut appositum cum melle, ad ciendos menses, & foetus uiuos quidem corrumpit, mortuos autem ejicit. Radices cum aceto in cataplasmate impositæ, lienes induratos sanant, itemque induratas inflammationes.

Leuce,

Leuce, populus alba.

Populus alba arbor temperamentum mixtum habet, ex substantia aquosa tepida, & terrea attenuata. Vnde & exterioriam uim habet. Gustu autem subamarum existit.

Libanotus, Thus.

Thus calfacit ordine secundo, siccatur primo. Habet & quid adstrictorium, quod in albo uix percipere est. Cortex ipsius uim adstringendi manifeste habet, ob quam etiam præclare siccatur, ut secundi ordinis siccantium completi existat. Est & crassarum partium & minime acrimoniae particeps. Ob has igitur qualitates ac uires, usus eius frequens est medicis, in hæmoptoicis ac stomachicis, proflus uisq; alui, coeliacisq; ac dysentericis, non solum his quæ extrinsecus imponuntur, sed & quæ intra corpus sumuntur ipsum ammiscuentibus. Fit ex eo & fuligo hoc modo. Granum thuris singulatim forcipe apprehensum & à lucerna accensum, in uas fictile cauum nouum imposito, deinde æneum operculum concauum probe detersum superposito, suppositis tamen ad uirumq; operculi labrum lapillis quatuor digitorum altitudinis, ut locus sit alterum supponendi granum, prius quam penitus extinguatur, donec sufficiens fuligo fuerit collecta. Caterum externa operculi ænei pars assidue per spongiam ex aqua frigida extergeatur, ita enim omnis fuligo adhærebit, operculo nimirum non ualde concafacto. Derafa itaq; priore fuligine per pinnam, idem facias, quousq; collibuerit. Sed & exusti Thuris cinerem priuatim colliges. Melior est autem fuligo. Vim habet mitigatoriam inflammationum in oculis, sedat fluxiones, repurgat ulcera, replet concaua, sistit carcinomata. Eodem modo parantur fuligines & ex myrrha, & ex styrace. Conueniunt ad eadem omnes. Quin & aliarum lachrymarum fuliginem eodem modo colligere licebit.

Libanotides.

Libanotides omnes similem uim habent mollitoriam ac discussoriam. Succus autem & radices & herbae melle ammixto, hebetudinibus oculorum medetur ex humorum crassitudine obortis. Sunt enim libanotides participes exterioriae ac incisoriae facultatis.

Lignys, fuligo.

Omnis fuligo siccatur, quapropter & substantiam terream habet, & reliquias ignis à materia exusta, sed has tamen tempore modico. Tota autem natura ipsius siccatoria est, terrea & tenuium partium. Partiales eius differentiae sunt iuxta materiam exustam, prout ea ipsa calidior aut frigidior aut mordacitatis expers existit. Thuris porro fuligine utuntur ocularibus compositionibus ammixta, maxime his quæ ulceribus conferunt. Nam & hæc expurgat ipsaq; carne explet. Terrebinthinae quoq; ac myrrhae fuligo similiter ut thuris nihil offendit. Verum styracis his fortior est, atq; adhuc magis quæ ex pice liquida fit, quam superat adhuc cedriae fuligo. Utuntur autem & acrioribus, & in palpebris glabris, & angulis oculorum corosis, oculisq; humectis absq; inflammatione.

Ligusticum.

Ligustici radix & semen ex calfacientium ordine sunt in tantum ut & menses moueant, & urinas propellant, flatusq; discutiant.

Lini semen.

Semen lini comestum flatuosum est, etiam si sit torrefactum, ita recrementosa humiditate plenum est. Est autem calidum in primo ordine, humiditatis ac frigiditatis in medio consistens. Stomacho incommodat & ægre concoquitur, particeps est tamen facultatis ciendi urinam, & torrefactum uentrem aliquatenus sistit.

Lobi.

Lobi.

De lobis scriptum à nobis est quum de dolichis ageremus.

Linozostis, Mercurialis.

Mercuriali utuntur omnes ad uentris purgationes, ueruntamen si quis eius usum in cataplasmatibus experiri uelit, reperiet eam multum discussoriam. Et semen huius nondum siccatum experientia docet, tubercula & eminentias in corpore, uulgo Carphidia dicta, dissipare, si quis ipsa diligentius semine eo confricet.

Lonchitis.

Lonchitidis triangulare semen hastæ simile habentis, radix urinam ciet. Eius uero quæ scolopendrio similis est, folia uiridia uulneribus glutinâdis cōducunt. Sicca eadem ex aceto pota, lienes induratos sanant.

Lycium, Pyxanthos.

Lycium siue pyxanthos spinosa est planta, ex qua quod Lycium appellant fit, quo ad sugillata utimur, & ad sedis ac oris inflammationes ac ulcerationes, herpetosq; ac putrefactiones, & ulcera maligna, & intertrigines ac paronychias qui sunt unguium abscessus. Habet enim uim siccandi ex secundo ordine, aliâs ex diuersi generis substantijs compositum: Altera tenuium partium, ac discussoria & calida: Altera terrea frigida, ex qua & moderatam adstrictionem habet. Quapropter & ad diuersos effectus hoc medicamento utuntur, ut exterforio quidem, adfumentes ad ea quæ pupillis tenebras offundunt, ut adstrictorio uero, coeliacis & dysentericis ac fluxui muliebri exhibentes. Cæterum indicum Lycinum ad omnia commodius existit.

Lysimachium.

Lysimachium prædominantem habet qualitatem adstrictoriam, per quam & uulnera glutinat, & eruptiones sanguinis narium cōpescit inaspera, sed & aliâs sanguinis eruptiones supprimit tum ipsa, tum succus ipsius adhuc amplius. Quare & potus & infusus dysenterias ac sanguinis reiectionem, & fluxum muliebrem sanat.

Lotus, Trifolium.

Lotus satius, quem aliqui trifoliū uocant, moderate extergendi uim habet, itemq; siccandi, uerum in coniugatione caliditatis ac frigiditatis temperatus est. At uero syluestris lotus in Aphrica plurimus prouenit. Semen eius secūdi ordinis est calfacientium. Habet & quid exterforium. Semen autem Aegyptij etiam ad panificium accipitur.

Lotus arbor.

Lotus arbor adstrictoriæ qualitatis non multæ particeps est. Est autem tenuium partium ac siccatoria. Ramentum itaq; lignorum eius, & ad fluxum muliebrem, & dysenterias, ac coeliacas affectiones conducit. Coquitur aliquando in aqua, aliquando in uino, prout usus postulat, & non solum infunditur, sed etiam bibitur. Atqui & defluos pilos cohibet moderate adstringendo ac siccando.

M.

Macer.

Macer cortex est qui ex India affertur, adstringens cum modica acrimonia, quapropter & siccatur. Est & tenuium partium, propter odorem, & propterea coeliatis ac dysentericis compositionibus ammiscetur, in tertio ordine siccantium locatus, iuxta caloris & frigiditatis differentiam nihil insigniter præstans.

Malabathri folium.

Folium malabathri spicæ nardi consimilem uim habet.

Malache, malua.

Malua syluestris leniter discussoriæ, & paululum mollitoriæ facultatis particeps est. Satiua pro eo quod aquosa humiditate participat, etiam uiribus debilior

debilior existit. Subit autem uentrem non solum ob humiditatem, sed & ob uiscositatem, maxime ubi cum oleo & garo accipitur, uino modico cibi tempore irrorato. Semen ipsorum tanto fortius est, quanto siccus. Quin & Dendromache appellata huius generis est, sed magis quam praedicta discussoria. Nominatur autem & Aldiara.

Mandragoras.

Mandragoras praedominantem frigidam uim habet, ut tertij sit perfrigerantium ordinis, particeps est tamen & modicae caliditatis ac humiditatis in malis suis. Vnde & soporatoriam uim haec possident. Radicis cortex fortissimus existens, non solum frigefacit, sed etiam siccatur. Reliquum internum debile existit.

Marathrum, fœniculum.

Fœniculum fortiter calfacit, ut ex tertio ordine censeretur possit. Siccatur ordine primo, & propterea etiam lac generat, & suffulsi oculis iuxta eandem rationem opitulatur. Ciet & urinas & menses ducit.

Mastiche.

Mastiche alba & chia, ex contrarijs quodammodo facultatibus composita est, adstringente & molliente. Quapropter & stomachi, & uentris, & intestinorum ac hepatis inflammationibus conuenit, secundo ordine calfaciens ac siccans. Nigra mastiche quae Aegyptia appellatur, magis exsiccatur quam illa, & minus adstringit, unde & commodior est quodam modo ad ea quae fortiore discussione opus habent.

Melanthium, Nigella.

Melanthium calfacit ac siccatur tertio ordine, apparet & in eo partium tenuitas. Sic itaque & destillationes sanat, calidum linteolo illigatum naribus admotum, ut assidue odor eius nares percellat, Sed & potum flatus uel maxime discutit. Occidit & lumbricos, non modo comestum, sed etiam foris uentri impositum, ob amaritudinem, Lepras & clauos ac uerrucas myrmecias, hoc est, fornicarias dictas abolet, & menses promouet ob crassitudinem & uiscositatem humorum suppressos, prodest & alopecij usum, & cum oleo tritum, ac illitum. Sic etiam recta ceruice spirantibus. Et in summa ubi dissecare & extergere ac siccare calfacereque opus est, commodissimum medicamentum existit.

Melilotum.

Melilotum mixtas uires habet, Nam & adstringit, sed & discutit & concoquit. Amplius enim de calida substantia quam de frigida in se complectitur.

Mel.

Mel calfacit ac siccatur secundo ordine. Est autem simplicis quam maxime tum facultatis, tum temperamenti, exterforiae uidelicet appellatae. Estque maxime tenuium partium, praesertim quod provenit ubi thymus plurimus nascitur. Quum autem tenuium partium sit, necessario etiam quid acre possidet, per quod uentrem ad excretionem impellit. Diximus autem quod extergit, haec itaque extensoria uis si ipsi adimatur, magis ad urinam ciendam commodum reddetur, itemque ad alimentum distributionem ac nutritionem accommodatius. Adimi autem optime potest, aqua plurima ammixta, & cocto melle, donec spumare desierit, ita ut spuma assidue auferatur. Aqua uero mulsa non cocta uentrem subit antequam concoquatur. Itaque senibus & frigidis corporis temperaturis mel commodum est. Verum in aetate uigente constitutis ac calidis, in bilem transit ante concoctionem. Mel porro coctum per se, minus acre ac mordax euadit, unde & magis nutrit, & ad sinus glutinandos commodissimum existit.

Melisso.

Melissophyllum.

Melissophyllum marrubio uiribus simile est, sed multo tamen ipso inferius, & ob id neq; usus eius ualde expetitur: Quā enim ubiq; marrubium abundet, superuacaneum est melissophyllo uti. Si tamen non adlit marrubium, pro ipso succedere potest in eisdē usus, ut tamen efficaciae eius mancae memores simus.

Mecon, Papauer, Thylacitis, Rhoeas.

Papauer omne perfrigerantem uim habet: Sed hortensis, thylacitidis græcis appellata, semen moderatē somniferum est. Verum Rhoeadis semen fortius frigefacit: Quare citra lationem eo quis non utitur. Syluestris autem semen nigrū existens, medicatum iam est multum frigefaciens, maxime Thebani, Sed & succus fortiter perfrigerat, usq; ad stuporem & mortificationem. Est enim quarti & extremi ordinis perfrigerantium.

Mecon ceratitis, Papauer cornutum, Paralium.

Papauer cornutum græcis etiam paralium uocatur, quoniam ferē circa mare nascitur. Vim habet secloriam & extensoriam. Quare radix eius cocta in aqua ad dimidias, hepaticis affectionibus prodest, folia & flores sordida italde & maligna ulcera iuuat. Sed ab ipsorū usu recedendū est, ubi ulcera fuerint depurata. Nam usq; adeo extergere solent, ut & depura carne aliquid eliquent ac cōsumant, & ob id etiam crustas ulcerū tollunt.

Mespilum.

Mespili arboris fructus acerbis est, & uentrem plurimum supprimit.

Melea persice, Malus persica.

Malus persica & folijs & ramis amaram qualitatem prædominantem habet, quare & lumbricos occidunt trita umbilico imposita, & aliās discussorium medicamentum existunt. Fructus eius persicū appellatum, humidioris & frigidioris est temperamenti. Caro eius comesta facile corrumpitur, & omnino uitiosa est. Quare non oportet ipsa uelut aliqui faciūt, à reliquo cibo ingerere. Corruptur enim & uentri innatāt. Porro uniuersalis huius regulæ perpetuò memorem esse oportet: Quod quæcunq; mali succi sunt, humida autem & lubrica, & quæ facile aluo secedere possunt, ea prius quā alia comedere oportet. Sic enim & ipsa cito subeunt, illisq; uiam præstruunt. Quæ uero postrema sumuntur, etiam alia simul corrumpunt.

Melea Armeniace, Malus Armeniaca.

Armeniaca mali fructum præcocia appellant. Est autem humidus ac frigidus hic fructus secundo ordine, ubi sanè fuerit maturus, à persico in hoc differt, ipsoq; præstat, quod non similiter in uentre corrumpitur, neq; acefcit. Multis uero & iucundior apparet, & propterea stomacho accommodatior.

Malus medica, siue citrea.

Mali medicae fructus ab omnibus citriū appellatur. Id in semine acidam qualitatem & uim siccatoriam prædominantem habet, ut tertij ordinis sit siccantium ac perfrigerantium. At uero in cortice habet quidem siccatoriam uim in secundo ordine, nō tamen frigidam qualitatem, propter aromaticitatem. Caro ipsius crassi succi est & frigida, ob duritiem; semen autem penitus edi non potest, neq; quod acidum esse diximus, neq; eius nucleus qui reuera semen existit, amaram qualitatem, & discussoriam ac siccatoriam uim in secundo ordine habens, Sed & folia siccandi ac discutiendi facultatem habent.

Mala omnia.

Cæterum in alijs malis magna est differentia. Quæcunq; enim adstringunt, frigidum ac terreum succum habent: Quæ uero acida apparent, frigidum quidem,

c sed

sed tenuium partium habent, mediæ autem temperaturæ sunt dulcia, ad caliditatem repentia, Austerorum igitur malorum usus est, quum aut ob intemperiem calidam aut humiditatem multam, uenter debilis est. Acerborum uero, ubi eadem multum fuerint aucta, nam adstringentia quantum in ipsis est, supprimunt infernas excretiones, Acida autem ciunt, Quum igitur suspicio fuerit crassum humorem in uentre collectum esse, non ualde frigidum, hæc exhibebis, Nam & hunc diffecant & infernè subducunt, & propterea excrementa humectant, Vbi uero purum repperint uentriculum, ipsum amplius supprimunt.

Meon.

Meiradices in usu sunt in tertio ordine calfacientes, Siccant in secundo, humiditatem retrimenticiam in sese complexæ, Urinas itaq; ciunt, & menses prouocant potu: Amplius acceptæ capitis dolorem inducunt, & propter humiditatem, flatus.

Morus, Mora, Sycamina, Sycomora.

Mori arboris fructus, sicamina & sycomora frequenter à plerisque græcis uocantur, siquidem igitur matura & ante reliquum cibum in uentriculum purum ingerantur, celerrimè per intestina secedunt, & alijs cibis uiam præstruunt. Verum post cibum acceptæ, aut uitiatum humorem in uentre reperientia, celerrimè corrumpuntur, & peregrinam quandam, quæ dici commodè non possit corruptionem inducunt, similiter ut cucurbitæ & pepones, ubi non fuerint concocti. Tempus usus moris est itidem ut peponibus & cucumeribus, ubi sicum & calidum fuerit uentriculi corpus, & ex necessitate etiam hepatis. Tunc enim solummodo omnibus huiusmodi utiliter quis utet, & ubi quis longo itinere aut multo ardore fuerit defatigatus. Tunc enim profunt squallorem corporis rigantia, & moderatè perfrigerantia. Mora immatura sole siccata diligenter ac reposita, commodum adstrictorium medicamentum exhibent, ut etiam dysenterias fiant, & affectiones coeliacas, & alias fluidas, Tunduntur autem & obsonijs miscentur, quemadmodum Rhois fructus, Bibuntur etiam cum aqua & uino. Cæterum cortex radicis arboris purgatoriam uim habet cum quadam amaritudine. Quare & latum lumbricum occidit seruatus cum uino, eoque calido meracopoto cyathi mensura, & diu suppressos menses prouocat.

Mycetes, fungi.

Fungi frigidum ac humidum abundè edulium sunt, unde & prope ad uenetratricem uim accedunt, & sanè quidam ex ipsis occidunt.

Myosotis, Auricula muris.

Muris auricula siccatur ordine secundo, nullam manifestam qualitatem habens, Succus eius cyathi mensura cum zytho potus, lumbricum latum efficaciter expellit.

Myrica, Tamarix.

Myrica incisoriæ & extensoriæ uim abundè possidet, citra manifestam siccationem. habet & quid adstrictoriæ, & ob has facultates lienibus induratis conducit, radicibus aut ramulis aut folijs cum aceto aut uino coctis, fructus & cortex non modicæ adstrictionis participes sunt, simulq; extergent, & tenuium partium existunt. Vtæ myricæ cinis siccandi uim acquirit.

Myrsine, Myrtus.

Ex contrarijs hæc planta composita est substantijs, prædominatur tamen in ipsa terreum frigidum. Habet & quid tenuium partium calidum, unde fortiter siccatur, & omnes partes ipsius restringendi uim habent, tum forinsecus corpori impositæ, tum intrâ assumptæ.

Moly, Ruta syluestris, Harmala, Befasa.

Moly aliqui rutam syluestrem uocant, aliqui harmala. Syri Befasa. Vis eius tenuium partium & calida est tertio ordine, Vnde & secatur & discutitur crassos, & uiscosos.

& uiscosos humores & urinam promouet. Qui ruri habitant utuntur eo in diu-
turno capitis dolore, aqua coquentes, & caput inde rigantes. Similiter & ad reli-
quas corporis partes perfrigeratas.

N. Nardostachy, Nardi spica.

Nardi spica primo ordine calfacit, siccatur secundo completo. Composita est
ex substantia multum adstringente, & acri calida non multa, & quadam modis-
ca subamara. Quare & ad iecur & ad stomachum merito conducit, pota & fo-
rinsus imposita. Vrinam cit quoque, & stomachi morsus sanat, & fluxiones uen-
tris ac intestinorum resiccatur, item capitis & pectoris, fortior est indica, nigrior
quam syriaca existens.

Nardus Celtica.

Celtica nardus consimilem in genere uim cum praedictis habet, sed ad omnia
debilior est, praeterquam ad urinas ciendas. Est enim calidior illis, sed minus ad-
stringit.

Narthex, Ferula.

Ferula semen attenuat & calfacit. Interna eius pars, medulla appellata, adstrin-
gentis cuiusdam qualitatis particeps est, ob quam haemoptoicis & coeliacis pro-
dest.

Napy, Sinapi.

Sinapi calfacit ac siccatur quarto ordine. Optimum est Aegyptium aut syria-
cum, & quod mole minus est, & minus cruentum coloratum.

Narcissus.

Narcissi radix siccatoriam in tantum uim habet, ut uulnera magna glutinet,
etiam si tendines sint concisi. Habet & quid exterforium ac attractorium.

Nerium, Rhododaphne.

Nerium aut Rhododaphne frutex est omnibus notus, qui si forinsus corpo-
ri in cataplasmate imponatur, discussoriam uim habet: Si uero intra corpus su-
matur, perniciosus & uenenatus non solum hominibus, sed & plurimis pecori-
bus existit.

Nymphæa.

Nymphææ radix & semen uim habent siccatoriam leuem: Itaque & uentris
fluxiones, & seminis per somnum effluxum, aut si etiam alias immodice fera-
tur, sistunt. Profunt & dysentericis. Caterum Nymphæa quæ albam radicem
habet, uehementioris facultatis est, ut & muliebrem fluxum sanat. Bibitur &
ipsa & quæ nigram radicem habet, in uino nigro austero. Possident & quid ex-
terforiæ facultatis, unde & utiligines sanant aqua rigatae, & alopecias cum liqui-
da pice, praestat ad hæc quæ nigram radicem habet, ad reliqua quæ albam.

Ξ. Xanthium, Lappa, Phasganion, Philantropos, Choëradolethron.

Xanthium, quidam phasganium, quidam philanthropon, alij choëradole-
thron appellant. Semen eius discussoriam uim habet. Decoctum corticis radia-
cis potum lienes consumit, & dentes motos firmat eiusdem decoctum ex uino
collutum.

Xiphion, Gladiolus.

Gladioli radix praesertim superior, uim attractoriam, discussoriam, atque
adeo siccatoriam habet.

O.

Oenos, Vinum.

Vinum ex secundo ordine est calfacientium, Antiquum ualde, ex tertio, quem-
admodum nouum mustum, ex primo. Eadem proportio est siccitatis ad calidita-
tem. Quandoquidem uero plurimas in uino differentias reperimus, distinquen-
dum est de ipsis quam breuissimis id fieri potest. Rufa itaque & crassa ex omnia-
bus ad sanguinem generandum commodissima sunt, ut quæ parua egeant in
sanguinem transmutatione. Deinceps nigra simulque dulcia ac crassa. Deinde colo-

re quidem rufa aut nigra, compage uero crassa & habentia simul adstringentem qualitatem. His minus ualent alba, simulq; crassa, ac acerba, ad nutritionem: Minime uero omnium alunt colore alba, compage tenuia, & quodam modo aquae similia. Concoquuntur autem in uentriculo & magis distribuuntur dulcia quam austera, utpote calidiora ui praedita, sed & uentrem magis subducunt. Caterum ualde crassa, & tardius concoquuntur, & tardius in corpus distribuuntur, ubi autem uentriculum robustum nacta fuerint, ut probe concoquantur, amplius nutrimentum corpori praebent. Manifestum est autem quod & aluum sistunt, & urinae ciendae incommoda existunt, in quibusdam crassum succum generantia. Quaedam ex ipsis etiam iecur & lienem ac rhenes obturant, atq; inde aliqui in aquam inter cutem incidunt, aliqui e calculo laborant ex nimio ipsorum usu, & praesertim senes. Optimum uinum est, & sanis, & ex morbo se recolligentibus commodissimum, quod colore rufum, compage tenue, & leniter subadstringens existit.

Oxos, Acetum.

Acetum mixtas substantias frigidam & calidam, utramq; tenuium partium habet, praedominatur tamen in ipso frigida substantia, quemadmodum in principio huius libri praediximus. Est autem medicamentum abunde siccatorium, ut tertij ordinis sit completi, ubi sane forte extiterit.

Opos, Lafer, Succus Cyrenaicus.

Lafer siue succus Cyrenaicus, omnibus alijs calidior & magis tenuium partium existit, & ob id etiam magis discussorius. Verum tamen & alij calidi sunt ac flatuosi, hoc est Medicus & syriacus, quem I asor appellant.

Origanum.

Origani herbae tres sunt species, omnes incisoriae & attenuatoriae, siccantisq; ac calfacientis facultatis in tertio ordine. Tragoriganus aut aliquid adstrictorium assumplit.

Oxythoenos, Iuncus acutus.

De iunco acuto dicitur in schoeni, hoc est, iunci mentione.

Orobis, Eruum.

Eruum siccatur secundo ordine intenso, calfacit primo. Quantum aut amari tudinis particeps est, tantum siccatur, & extergit, & obstructione liberat. Amplius sumptum sanguinem per urinam expellit.

Orobanche.

Orobanche frigidi ac sicci temperamenti in primo ordine est.

Oryza.

Oryza habet quid adstrictorium, quapropter uentrem supprimit. Et est edulium aegre concoctile.

Orchis cynos, Testiculus canis.

Orchis herba, quae cynos orchis, hoc est canis testiculus dicitur, duplicem radicem bulbosam habet, humidam & calidam, quapropter etiam sapore dulcis est, & maior quidem radix ob multam humiditatem, ad uenerem stimulat pota. Minor uero ad siccitatem repens impetus ueneris compescit.

Orchis altera.

Orchis altera, quam serapiada uocant, siccior prioris uim habet, quare ad uenerem non similiter comoda est. Laxos aut tumores in cataplasmate discutit, & ulcera fordida purgat, & herpetas sanat. Sicca uero & putrefactis & malignis ulceribus medetur. Nam & subadstringens quid habet, per quod aluum supprimit cum uino pota.

Osyris.

Osyridis herbae ex qua scopae fiunt, amara est qualitas. Verum uis obturatione liberans, unde & malignas circa iecur obstructions resoluit,

¶. Pancra-

P.

Pancration.

Pancratij radix & sapore & uiribus Scillæ similis est: Quare aliqui etiam utuntur ipsa, scilla non præsentē, uerum multo debilior existit.

Paliurus.

Paliuri folia & radix adstringentem non obscurē uim possident, quapropter & fluidum ventrem sistunt. Discussoriam autem in tantum habent, ut & tubercula curent, quæ sanæ non ualde inflammata ac calida existunt, fructus incisionis facultatis eiusq; est particeps, ut uesicæ calculos & confringat, & expurget, & reiectionibus ex pectore ac pulmone auxilietur.

Panax Hercules, Opopanax.

Panaces Herculeum est, ex quo Opopanax appellatus sit, qui succus calidus est & discussorius in tertio ordine, siccus in secundo. Cortex radices siccæ & calfacit, sed minus quàm succus, exterget tamen, & propterea ad ossa denudata, & ulcera maligna conducit. Exterget enim & siccet, & carne replet citra mordacitatem. Semen calidum existens menses ducit.

Pentaphyllon, Quinquefolium, Mercurij herba.

Quinquefolium, quæ mercurij herba dicitur, radicem habet siccantem in tertio ordine, minime uero acrem. quapropter multi usus est & tenuibus partibus præditum.

Peplion.

Peplij semen in usu est: Ducit bilem unā cum pituita, flatu quoq; discutit uelut Hippocrates scribit.

Pepon.

Pepon maturus substantiæ tenuioris est: Immaturus crassioris, absterforia aut & incisoria facultate participat. Vnde & urinam cient, & corpus illustrius reddunt, præsertim si quis semen siccet, deinde tuso & cribrato pro smegmate utatur, ad maculas solares, & faciei lentigines, ac uirilgines in superficie hærentes. Dominatur in ipsis humida & frigida temperatura, suntq; secundi ordinis in utraque. semen & radix sicca secundi ordinis initio consistunt. Vis exterforia amplior est in radice quàm carne. Caro comesta unā cum extersione & urinas cient, & infernè secedit magis quàm cucurbitæ, at uero semen magis exterget, ut etiam calculosis rhenibus conducatur. Cæterum uitosum succum in corpore gignit pepo, magisq; si non probè concoquatur. Tunc enim cholericos quibus & supernè & infernè bilis prorūpit, efficere solet. Nam & prius quàm corrumpatur ad uomitum aptus est, si amplius edatur, & si quis non ab eius esu boni succi edulium ingerat, omnino uomet.

Piper.

Piper recens pullulans, longum est, quapropter & humidius existit. Quod uero uelut fructus immaturus est, album piper est, acrius nigro existens. Nigrum enim uelut superassatum iam & superresiccatum est. Vtrumq; autem fortiter calfacit ac siccet.

Peristereon, Verbenaca, Veneris herba, Sacra herba.

Verbenaca, quam peristereona, & ueneris herbam, ac sacram herbam appellant, capitis dolorem egregiè tollit, inquit Archigenes, coronæ modo impolita, trita quoq; cum aceto & rosaceo illita, & cocta cum oleo, indeq; rigato capite, omnem ueterem capitis dolorem sanat, & defluos capillos cohibet. Decoctū radices calidum ore retentum, dentium dolorem sedat, & motos dentes firmat, & oris ulcera sanat. Cæterū ad colicos radicem crassius tufam ex aqua ad dimidias coquito, & ad dies quinque potui dato. Constat hoc experimento. At uero calculosis & incipienti Elephantiafi, decoctum similiter dato ex aqua mulsa. Vtere

e 3 similiter

similiter & ad comitalem morbum, & ad febres quotidianas ac quartanas. Verum ad podagricos & Ischiadicos in uino decoctam exhibebis. Radice exsiccata fistulae optime colluuntur, maxime mori succo & melle ammixto. Eadem radix usta itemque sicca inspersa, fistulas sanat. Quin & melle cocto excepta, fistulae collyrii modo inditur, & praeter opinionem opitulatur.

Persea.

Persea folia adstringentis facultatis moderate participia sunt, ut & partibus e quibus sanguis erumpit, commodè imponi possint. Eadem arida tria pruritus sedant afflicta.

Perdicias.

Perdicias relata est in quinto elemento, ubi Elxinen ipsam appellauimus.

Paxonia.

Paxonia relata est in tertio elemento, ubi glycyfiden ipsam appellauimus.

Petroselinum.

Petroselini semen maxime in usu est. Herba ipsa imbecillior existit. Semen calidum est & siccum tertio ordine, & incidendi ui praeditum. Itaque menses ciet & urinas ubertim, insuperque flatus discutit.

Peucedanum.

Peucedani radice maxime utuntur, liquoremque ac succo eius. Omnia eandem uim habent, fortior est autem succus multum calfaciens ac discutiens. Unde & neruorum affectionibus conuenit, & morbis pulmonis ac pectoris, ex crassitudine aut uiscositate humorum obortis, tum intra corpus sumptus, tum odoratur. Quo modo & lienes induratos sanat. Radicis usus ad eadem competit, sed & ossium squamas celerime disparat, & sicca malignis ulceribus inspersa optime medetur, purgat enim & incarnat, & usque ad cicatricem perducit, calefaciens quidem ordine secundo, siccans autem tertii initio.

Peganum, Ruta.

Ruta syluestris quarti ordinis est calfacientium ac siccantium, satiuia tertii. Estque non solum acris, sed & amara, unde & uim secundi ac discutiendi crassos & uiscosos humores habet, & per urinas euacuat. Et sane tenuium quoque partium est, & flatus discutit, & ob id inflationibus conducit, & uenereos impetus suppressit, ac praeclare siccatur, nam inter medicamenta fortiter siccantia censetur. Rufus haec uerba prodit: Syluestris ruta uis ignea est & ulceratoria, maxime uesicae. Quapropter etiam qui podagricum pharmacum bibunt, ex ruta syluestri constans, male affectam uesicam acquirunt, quicunque tamen hoc medicamentum sustinuerint, manifesta opem ferunt. Nam ad arthriticos praecipue commodum est. Quod si de satiuia ruta quid ammiscueris, securius erit, quanquam & ipsa satiuia uesicae incommodet, sed minus quam syluestris. Utimur syluestri in quibus perfrigeratum quid res fouere uolumus, prodest & hydropi flatuoso, & ei qui subtercus appellatur. prodest & morsus à uipera aut mure araneo, & magis si praegnans mus araneus morderit, & praesertim animalia subiugalia. Est & forte medicamentum ad papaueris succum potum, & ad aconitum cum uino. Satiua ruta rigores per circuitum repententes mitigat pota ante accessiones, mitigat & colicos dolores potum & infusum, itemque uteri strangulatus. Visum acuit in cibo sumpta, & propterea pictores assidue eam degustantes, acutius cernunt. Quin & melle mixtus succus ipsius, medicamentum euadit uisum exacuens. Auxiliatur & urinae difficultati cocta ex oleo, indeque uesica fota, neque est aliud medicamentum quod huic hac parte praetuleris. Caeterum in lumborum dolore & spirandi difficultate, data ex aqua multa confestim opitulatur. In lethargicis pota & infusa per clysterem, ualde commodat. Sed & tritam cum rosaceo & aceto capiti ipsorum illinere oportet.

Soluit

Soluit & coxendicum dolores pota, & in cataplasmate imposita, & infusa per sedem. In cataplasmate imposita podagricis genua inflata habentibus, citò auxilium, & dolores mox lenit. Crustas etiam carbunculorum citò disparat, in cataplasmate imposita cum melle aut uvis passis.

Pix.

Pix arida siccatur & calfacit secundo ordine, plus autem siccatur quam calfacit. Liquida contra plus calfacit quam siccatur. Habet & quid tenuium partium, quo & anhelosus, & suppuratis pectore opitulatur. Satis est delinxisse cyathi unius mensuram melis amixto. Habet utraq; & exterforium quiddam, & concoctorium, ac discussorium. Quare & scabros ungues extrahunt addita cera, & impetigines exterunt. Concoquunt & duros ac crudos tumores omnes cataplasmatibus amixtis. Ad omnia hæc præstat liquida. Sicca ad hæc deterior est, sed ad uulnera glutinanda accommodatior. Fuligo ex liquida pice sic paratur. In lucernam nouam funiculo infusa etiam ellychnio, liquidam picem mittes, incensamq; ac fictili uase operam, uelut in thure dictum est, fines, & priore consumpto liquore, alium infundes, donec fuliginem sufficienter collegeris. Vfus est ad palpebras ornandas, & ubi pilos producere oportet, & ad oculos imbecillos ac lachrymosos & ulcerosos.

Pistacia.

Pistacii fructus substantiam tenuium partium habet, quæ & subamarum quiddam & aromaticum in se complectitur. Quapropter obturata expedit & expurgat, præsertim circa iecur, imò & pectus & pulmonem.

Pityides, Nux pinea, Nux picea.

Pityides appellantur fructus pinorum, quidam etiam picearum sic appellant. Sunt autem mixtæ facultatis, nimirum & adstringentis, & acrimoniam quandam cum amaritudine possidentes. Vnde & reiectionibus ex pectore ac pulmone conferunt.

Pini cortex.

Pini cortex prædominantem uim adstrictoriam habet, in tantum ut intertrigines inspersus optime sanetur, & ambusta ad cicatricem perducatur, & alium fluidum superprimat si potest. Sed & piceæ cortex huic similis est, uerum uiribus debilior. Vtriusque arboris folia uim glutinandi uulnera habent. Fuligo porro ex his ad palpebras defluuia, & humectos ac erosos oculorum angulos, itemq; lachrymosos utilis est.

Platanus.

Platanus humidior ac frigidior substantia non multum à moderatis abscedit. Vnde & folia uiridia trita in cataplasmate imposita, inflammationibus quæ adhuc generantur non obscure opitulantur. Cortex eius & pilulæ siccioris uim habent. Quare cortex quidem aceto coctus, ad dentium dolores adhibetur. Pilulæ uero cum adipe, ad ulcera ambustorum. Quidam corticem exurunt, & medicamentum exterforium efficiunt, quod cum aqua quiddam sanat lepras. Ipso autem cinere per se insperso, ulcera uetera & ob nimiam humiditatem sordida curantur.

Polygonum.

Polygonum habet quidem & adstrictorium quiddam. Dominatur autem in ipso aquosa frigiditas, ut secundi ordinis sit completi, aut tertij incipientis inter frigefacientia. Vnde & stomacho exusto prodest, foris in cataplasmate imposito, quemadmodum & calidis inflammationibus. Fluxiones enim repellit. Quare & herpeti commodum pharmacum est, & ulcerum omnium, maxime inflammatorum & fluidorum, item quæ in auribus sunt, nam pus resiccatur. Sistit & fluxum muliebrem, & dysenterias, ac sanguinis reiectionem. Ad omnia uero masculinum ualidius est & præstantius.

Polemonium, Philetæron, Chiliodynamon.

Polemonium alijs philetæron, alijs chiliodynamon uocant, tenuium partium & siccatoriam uim habet. Quare quidam radicem ipsius cum uino ischiadicis, & dysentericis, & ad induratum lienem bibendam præbent.

Polium.

Polium amarū est & mediocriter acre, itaq; omnia uiscera obturatione liberat, & menses ac urinas ciet, & uiride quidē glutinat uulnera, siccum autē maligna ulcera sanat, Præsertim minus poliū, quo & ad antidotos utimur. Nam & amarior est, & acrius quā maius, ut tertij ordinis sit siccantiū, secundi completi calfacientium.

Potamogeton.

Potamogeton adstringit & frigefacit, similiter ut polypodium, Verum crassarum partium substantiam quā polygonum habet.

Polypodium.

Polypodium dulcem simulq; austeram qualitatem prædominantē abet, ut uim habeat multum siccantem citra mordacitatem.

Prasion, Marrubium.

Marrubium calfacit secundo ordine completo, siccatur tertio completo. Iecur & lienem obturatione liberat, pectusq; ac pulmonem expurgat, & menses prouocat, & ictericos per nares purgat, Facit & ad aurium dolores iam inueteratos, In cataplasmate impositum extergit & discutit.

Prasum, Porrum.

Porri acrem uim possident uelut cepæ, & iuxta proportionem calfaciunt corpus, & crassos in ipso humores attenuant, & uiscosos secant. Ciet & urinam & sanguinem expurgat. Optimus usus est ipsorū bis coctorum. Nam sic comesta acrimoniam exuunt, & succi uitium non amplius habent. Abstinentum est autem a frequenti usu omnium acriorū, & præsertim si is qui accipiat natura biliosior existat. Solis enim his qui pituitosum humorem, aut crudum, aut crassum, aut uiscosum coaceruarunt, hæc edulia commoda existunt.

Propolis.

Propolis exterioriā uim non ualidā habet, attractoriā autem satis ualentē. Est enim substantiæ tenuiū partiū, & calfacit secundo ordine cōpleto, aut tertij initio.

Ptelea, Vlmus.

Vlmifolijs aliquando uulnus recens glutinauimus: adstringunt enim & extergent. Cortex eius amarior est, & magis adstringit, quare & lepram sanat cum aceto. Radices eandem uim habent, unde quidam decocto earum fracturas fouent ad callum recipiendum.

Pteris, Filix.

Filicis radix in usum uenit: occidit enim lumbricos latos quatuor drachmarū pondere in aqua mulsa pota. Fœtus quoq; uiuos quidem enecat, mortuos uero expellit, sed & ulceribus inspersa, ea citra mordacitatem siccatur.

Pyrethrum.

Pyrethri radix maximē in usu est, uisoriā uim habens, per quam dentium perfrigatorum dolores lenit, affricatur & cum oleo in rigoribus per circuitū repetentibus, ante accessionem, Stupefactis etiam ac resolutis conducit.

Pyri, Triticum, Amylum.

Triticum extra impositū primi ordinis est calfacientiū, & tamen neq; siccare manifestē neq; humectare potest. Quod ex ipso sit amyllum, frigidius & siccius ipso euadit, Amylum ideo dictum quod sine mola fiat, Panis triticeus cataplasma discus-

discussoriam uim habet, nimirum quum sal & fermentum panis assumpserit. Habet enim fermentum uim attractoriam ex alto, simulque discussoriam.

P

Rhamus.

Rhamus secundo ordine siccatur, frigidat primo completo, aut secundi initio; unde & herpetas sanat, & erysipelata non ualde calida.

Rhapbanus.

Rhapbanus calfacit tertio ordine, siccatur secundo. Discussoria uim habet adeo ut sugillata diuturna, aliaque liuescens sanetur cataplasmatibus modo impositis, uerum ut obsonium magis quam alimentum, attenuantis facultatis est simulque calfacit. Quare merito mirari subit illos qui a coena ipsos crudos edunt, bonae coctionis ergo. Etenim ipsi magnum eius rei experimentum se fecisse iactant, uerum nemo citra laesionem ipsos imitatus est.

Rheon Ponticum, Rha.

Rheon ponticum aliqui rha appellant, mixtam autem facultatem habet, adstringentem & calfacientem, & tenuium partium. Unde & rupta, & conuulsa, & erecta ceruice spiratione emendat potum. Haemoptoicis item ac coeliacis & dysentericis prodest. Impetigines quoque & liuescens per sanat, cum aceto illitum.

Resinae omnes.

Omnes resinae siccant & calfaciunt. Differunt inter se secundum quod magis aut minus habent acrimoniam in sapore, & calidae facultatis, & simili modo iuxta alias qualitates, quod aliarum magis, aliarum minus participes existunt. Omnibus autem praefertur lentiscina, mastiche appellata, propterea quod parum ad strictionis possidet, ut & stomachi & uentris ac hepatis debilitati conducatur, in superque & citra molestiam siccet. Est autem maxime tenuium partium, minusque acris. Inter reliquas terebinthina principatum obtinet, non similiter ut mastiche adstringens, sed discutit magis quam mastiche, & extergit in tantum, ut & scabiem deterat, & ex alto attrahat, magis quam ceterae resinae, quod etiam magis tenuium partium existat. Habet & quid mollitorium amplius quam mastiche. Aliae porro omnes resinae acriores hac sunt, pro maioris ac minoris acrimoniae ratione. Siccissima omnium resinarum est sicca pinus resina, quam priuatim pinus physema appellant.

Resinae quomodo urantur.

Vritur omnis resina liquida in quadruplici uase, liquoris infundendi respectu. Oportet enim resinae quidem congiuum unum, duos uero pluuiialis aquae in cacabum diffundere, & ad prunas leniter coquere, assidue agitando, donec resina odorem perdat, friabilisque fiat, & penitus exarescat, ut etiam digitis confringi possit, quod ubi contigit, refrigerata in fictili uase repones. Fit autem hoc modo excelenter alba. Oportet tamen urendam resinam prius excolare, & sordes ab ipsa separare. Vrantur & citra aquam, primum quidem eliquatae ac colatae, deinde coctae ad prunas per totum diem, assidue agitando, & ubi penitus exspirarint tolluntur, ac reponuntur uelut dictum est. Excipit ex resina etiam fuligo, ueluti in thure praedictum est, & confert ad calliblephara, quae ornandis palpebris deferunt, & ad lachrymosos oculos, & corrosos ipsorum angulos, & glabras oculorum genas. Tota refacta uero resina utilis est ad odorata malagmata itemque acopa appellata.

Rosae.

Rosarum facultas ex aquosa calida, duabus alijs qualitibus ammixta, adstringenti uidelicet & amara, composita est. Flos ipsarum adhuc magis quam rosae adstringentior est, & propterea etiam siccandi ui praeditus.

Rhodae

Rhododaphne.

De rhododaphne diximus, ubi nerion ipsam appellauimus.

Rhoa, malum punicum.

Omne malum punicum adstringentis facultatis particeps est, non tamen ut ea omnino prædominetur: sunt enim aliqua ex ipsis acida, quædam dulcia, quædam austera. Quare ex his quæ in malorum tractatu diximus, etiã de his cõiectare licet. Succum autem uberiorẽ habent quàm mala aut pira, saporemq; insuper iucundiorẽ quàm illa habent, & aliquando ad plures affectiones quàm illa cõmodant; cum aliàs, tum si quando stomachus ob uitiorum humorum redundantiam morsum percipit, quo sanẽ tẽpore succus ipsorum cum polenta exhiberi debet, uelut Hippocrates in foemina cardinalis gusa faciendũ præcepit, quæ uidelicet oris uentris morsum & dolorẽ percipiebat. Acini puniceorum magis adstringunt quàm succus, magis quoq; siccant, his uero amplius adhuc cortices, Quibus consimile uim etiã cytini possident.

Rhus.

Rhois folium adstringit & siccant, hoc coriarum tinctores utuntur. Medicis fructus & succus magis in usum ueniunt, multum austera qualitate habentes. Siccant enim ordine tertio, perfrigerant secundo.

Rhypos, Sordes, Patos.

Sordes à statuis gymnasiarum discussoria est & mollitoria crudorum tuberculorum. Quæ uero in palæstris colligitur, patosq; Græcis appellatur, optimum medicamentum est inflammatarum mammarum. Nam & feruorem extinguit, & influentia reprimat, & contentum discutit.

Σ

Sagapenum.

Sagapenum succus est calidus & tenuium partium, uelut reliqui succi. Habet & quid exteriorum, per quod cicatrices in oculis depurgat & attenuat. Quin & suffusionibus & hebetudini uisus, ex humorum crassitudine obortis cõmodum pharmacum existit.

Sampfuchum.

Sampfuchum tenuium partium ac discussoria uim habet; siccant enim & calfacit tertio ordine.

Saprotes xylon, Caries lignorum.

Caries ac putredo lignorum, maxime eorum quæ adstrictionis simulq; exteriorum participia sunt, uelut est ulmus, humida ulcera optime purgat ac replet.

Sarcocolla.

Sarcocolla lachryma est arboris persicæ, mixtis uiribus prædita, ex substantia quadam meatu obducente, & modica quadam amara. Vnde leuiter siccant, & sic uulnere glutinat.

Satyrion.

Satyrion quidam etiam trifolium uocant, humidum est & calidi temperamenti, quapropter & gustantibus dulce apparet. Superfluum tamen & flatuosum humiditatem possidet, & propterea ad uenerem stimulat. Quod etiam radix herbe facere solet. Quidam tradunt etiam opisthotonum, hoc est, neruorum retrorsum distentionem per ipsam sanare è uino austero potam.

Selinon, Apium.

Apium in tantum calidum est, ut & urinas & menses cieat. Flatus quoq; discutit, & magis ipso semine.

Seris, Cichorium, Picris.

Seris siue cichorium subamarum olus est, & magis utiq; syluestre, quod propterea picris Græcis appellatur. Est autem syluestris, frigida ac sicca temperaturæ primo ordine. Satira magis frigefacit quàm syluestris, uerum ob multam humiditatis mixturam, siccandi uim perdit. Vtraque autem adstringentis qualitatis particeps est, quemadmodum & chondrilla. Nam & hæc seridis species existit.

Seseli.

Sefeli.

Sefelis & radix & semen in tantum calfaciunt, ut urinæ ciendæ sufficiant. Est autem tenuium partiū, ut & morbo comitali, & spirationi quæ recta ceruice fit, conducatur.

Sefamum.

Sefamū non modicā uiscositatē & pinguetudinē in se habet, unde & meatus obducit & mollit, & moderatē calidum est. Eandē uim habet & oleum ex ipso.

Sideritis.

Sideritis habet quidem quid exterforium, sed maior pars ipsius humida est, & moderatē frigida, estq; modicæ cuiusdā adstrictionis particeps, unde & inflammationes arcet, & glutinandi uim habet.

Sicya, Cucumeres.

Cucumeres satiui urinā cient, uelut etiā pepones, sed minus quā illi, propterea quod & substantia ipsorū minus humida quā illorū existat, & ob id neq; ita facile corrumpunt in uentre uelut pepones. Quidā ipsos cōcoquūt familiaritate quadā naturæ ad ipsos, & ubi in hoc cōfili securē eos ingesserint, ignorant quod tēporis progressu uisiosum & moderatē crassum succū, ex ipsorū elu in uenis coaceruarūt, qui sanē succus ubi putrescere inceperit, febres malignas inducit. Quapropter ab omnibus malī succi edulijs abstinere consultū esset, etiā si aliqui facile ipsa cōcoquant.

Sicyos agrios, Cucumis syluestris, Elateriū.

Cucumeris syluestris seminis succus siue liquor, qui elateriū appellat, imō etiā radices & foliorū succus, utiles sunt ad medendū. Elateriū itaq; menses ciet, & foetus appositū perdit. Summē enī amarū est, & modicē calidum, ut secundi ordinis sit calfacientiū, & ob id etiā discussoriā uim habet. Itaq; & angina laborantes quidā ex ipso illinunt. Infunditur & ictericis in nares cum lacte muliebri, atq; hoc modo etiā capitis dolores sanat. Caterū succus radices & foliorū imbecillior est quā seminis. Sed & ipsa radix consimilem uim habet. Nam & extergit, & discutit, & mollit. Verum cortex ipsius maiori siccatoria ui præditus est.

Silphium.

Silphij calidissimus quidē succus est, sed & folia, & caulis, & radix generose calfaciunt. Suntq; omnia flatuosioris & aëreæ substantiæ, & propterea etiam agrē concoquunt. Forinsecus tamen imposita efficaciora sunt, & maximē omnīū succus, adractoriam uim habens, corporis item molem consumens ac colliquans.

Sinon.

Sinon calidi & subamari saporis est, unde & urinā ciet, & concoctorius existit, & menses prolicit, & obturationes uiscerum expedit.

Sion.

Sion in quantum aromaticū saporē habet, in tantum calfacientis & siccantis facultatis particeps est. Discutit autē, & urinā ciet, & calculos rhenū atterit, & menses ducit.

Sisymbrium.

Sisymbrium tenuium partium & discussoriā, calfactoriāq; ac siccatoriā uim tertio ordine habet. Semen quoq; ipsius tenuium partiū & calidū est. Quare quidam id cum uino singultientibus & torminosis bibendum præbent.

Scandix.

Scandix syluestre olus est cōsimile gingidīo, subacre & subamarū, ut in siccatō ac calfaciendo tertij ordinis sit exsoluti. Urinā etiā ciet, & uiscera obturatione liberat.

Scilla.

Scilla incisoriā uim abundē possidet, non tamen fortiter calidam, sed in secundo ordine calfacientium.

Scolymus.

Scolymus, Carduus.

Cardui radix multam urinā foetidam ducit, si uino decoctā quis bibat, & propterea alarū & totius corporis foetores sanat, Calida est tertij ordinis initio, sicca secundo.

Scordion.

Scordiū ex multiformi facultate constat, Nam & amarū quid & acerbū & acre habet, Expurgat itaq; simulq; calfacit uiscera, & menses & urinas mouet, & uulsa & rupta ac laterū dolores ex obturatione factos sanat potum, Viride cataplasmatismis modo impositū, uulnera magna glutinat, Aridum inspersum, sordida repurgat, & maligna ad cicatricem perducit.

Scorodon, Allium.

Allium calfacit ac siccatur quarto ordine, In cibo sumptum flatus dissipat, & sitim extinguit, & crassos uiscososq; humores secundo obturatione liberat, Habet & quid medicatum & mali succi, quod abijcit aqua coctum, Fugiendus est eius assiduus usus, praesertim in calidioribus habitudinibus.

Smyrna, Myrrha.

Myrrha secundi ordinis est calfacientium ac siccantium. Inpersa capitis uulneribus, ea glutinare potest, Amaritudinis autem non modicæ particeps est, per quam & lumbricos, & foetus occidit ac eiicit, Habet & quid extensorium, unde & ocularibus compositionibus additur, quæ ad ulcera & cicatrices crassas compositæ sunt, Miscetur & in anhelosorum ac tussientium auxilia, item in arteriacas compositiones; non enim exasperat arteriam.

Smyrniū, Hippofelinon.

Smyrniū, aliq; hippofelinon uocant, ex eodem genere est cum apio & petroselino, uerum semen nigrum & multo maius habet, & est apio ualentius, petroselino imbecillius, calfacit ac siccatur ordine tertio, menses ducit, & urinas ciet.

Sonchus, Cicerbita.

Sonchus uiridis adhuc & tener, uelut alia syluestria olera, comeditur. Compositur ex aquosa & terrea substantia, utrisq; frigidis, & adstrictionis quid habet, Manifeste itaque perfrigerat, tum stomacho cataplasmatismis uice impositus, tum in cibo acceptus.

Spartum, Genista.

Sparti quo uites apud nos ligant, & fructus, & uirgarum succus adtractionem uim non instrenuam possident.

Stacte.

Stacte appellatur recentis myrrhæ pinguitudo, si cum aqua modica tundatur, & per organum exprimatur, Est autem ualde odorata & preciosa, & per se unguentum, quod stacte appellatur. Probatur quæ nihil olei admixtum habet, & modica sui parte multam uim calfactoriam possidet, ad proportionem myrrhæ & unguentorum calfacientium.

Staphylinus, Pastinaca, Daucus.

Pastinaca satiuā imbecillior est, syluestris quam & daucum appellant, ad omnia fortior, urinas mouet, & menses prouocat, Habet & quid extensoriū in sese.

Stoechas.

Stoechas amarā & adstringentis qualitatibus particeps est, Est & tenuium partiū ex odoris argumento, Itaque & obturatione liberare, & attenuare, & roborare, tum uiscera omnia, tum totum corporis habitum potest.

Struthium, Herba lanaria.

Struthij radix in usu est, calida & sicca quarto ordine existens. Est autem extensoria

terforia & irritatoria, propterea quæ sternutamenta mouet.

Syrax.

Syrax mollit, calfacit, cōcoquit. Quapropter & tusses, & destillationes, & grauedines ac rauedines sanat, mensesque promouet potus & appositus. Fuligo ex ipso fit uelut ex thure, quæ eandem quoque uim habet.

Staphyle, Vua.

Vua magis quam omnes temporarij & subcaniculares fructus, horæi Græcis appellati, nutrit, & maximè ubi probè fuerit concocta. Minus autem nutriunt uuæ quam ficus, & quod in ipsis præcipuū est citò secedūt. Quare si quando retineantur, satis multum offendunt. Neque enim probè cōcoquuntur retentæ, sed & iuxta distributionē in hepar ac uenas, crudum succum generant, qui non faciliè in sanguinē transmutantur, tum propter externā cuticulam, tum propter uinacea, quorū substantia sicca & adstrictoria existit. Quapropter rectè faciunt qui hæc ipsa uelut inutilia expuunt, & omnem internā carnem unā cum succo exsugūt, & sanè uenter his magis subit. Reponuntur autem uuæ in hyemē uarijs modis. Alij in olla cōponunt, olla uidelicet diligenter operta, & operculo pice oblito, ut nullatenus perspirent aut perflentur. Atque talis uua exsolutū uentrē firmat, & ciborum appetentiā excitat, non tamen aluo secedit, & uberius ingesta, caput tentat. Sed adhuc magis capitis dolorē inducit quæ in musto seruatur. Pensilis autē caput nihil omnino lædit, uentrem uero neque sistit, neque promouet. Similiter neque infirmam appetentiā excitat, neque firmam exsoluit. Vuæ quidē igitur dulces calidiorem succum habent. Quapropter sitim inducunt, & uentrem subducunt, præsertim ubi humectiores fuerint, nam inter calfacientiā ac perfrigerantiā medio modo habent. At uero acidæ & austæræ, & quæ cuticulā crassiorē habent, non solum prædicta uitia habent, sed & concoctionē in uentre & distributionē ac nutritionē impediūt. Caterū in summa de escarijs fructibus id nosse oportet: Humidos, humidū & tenue alimentū corpori præbere, & quod uniuersum corpus transeat ac citò penetret, facileque & per urinā & per cutem euacuetur. Cōtrā solidorū compage fructuū, alimentū quod corpori accedit crassum est, & transitus tardiores, præsertim ubi crassum aut uiscosum aut adstringentē succum in se habuerint.

Syca, Ficus.

Quod non solum autumnales, sed etiā temporarij ac æstiuī & subcaniculares fructus, horæi Græcis appellati, cōmune habent, id & ficubus adest, nam neque ipsæ succi malitiā effugere potuerunt. Verum hoc cōmodi ficubus inest, quod faciliè per uentrem transeant, & totum corpus penetrent. Nam & uim extersoriam memorabilem habent, & nephritici ex ipsarum esu multa arenosa excernunt. Alimentum autem præbent corpori non solidum, sed laxum, & ipsum uentriculum flatu implent. Verum ob transitus celeritatem, flatus illi non durant, & ea gratia minus quam reliqui fructus nocent. Et sanè ficus exactè matura ferè nihil noxi habet. Ficus uero sicca calidiorem uim possident secundi ordinis initio. Habent & quid tenuium partium, quod ad multa conducit. Illud tamen mali ex nimio ipsarum esu accedit, quod non ualde bonum sanguinem caricæ gignant. Vnde & pediculorum copia ad earum esum consequitur. Si uero uitiosus succus iam tum in uentre contineatur, caricæ comestæ extremè lædunt, augent autem humorum maliciā in uentrē corruptæ, & infernè non secedentes. Vim habent attenuantem & incisoriam, ob quam etiā uentrem ad excretionem incitant, & rhenes expurgant. Iecori & lienī inflammatis quidem noxiæ sunt, quemadmodum etiā uirides ficus, iuxta communem rationem omnium
f dulcium

dulcium, iisdem uero obturatis aut induratis, cum thymo aut pulegio, aut thymbra, aut calamintha, aut origano, aut pipere, aut zingibere, multo ante reliquum cibum tempore intercedente medici præbent. Qui uero cum aliquo crassiore edulio ficus edunt, itemq; caricas, non paruam læsionem incurrunt. Ficus siccae duos tumores concoquunt ac discutunt, ob partium tenuitatem, si in cataplasmate imponantur. Decoctum quoque ipsarum consimilem uim habet. Cæterum ubi concoquere uelis, triticeam farinam ammiscebis, ubi discutere, ordeaceam. Et pinguiore quidem carica, tumores concoquunt. acriori uero sapore præditi extergent ac discutunt. At uero mellitum ex ipsarum in aqua coctura paratur, uim melli similem habet.

Symphytum petraum.

Symphytū petraū ex cōtrarijs facultatibus constat; habet enim quid incisoriū, quo pus in pectore ac pulmone contentū expurgat. Habet & quid adstrictoriū, quod ad sanguinis reiectiones auxiliatur. Verum ob humiditatē, cōmanducatū sitim extinguit, & arteriæ asperitates lenit. At uero ob omnes prædictas facultates, etiā intestinorū hernijs imponitur, & ad conuulsa, ac rupta cum aceto mulso bñtur.

Sycomora.

Sycomororū fructus forma ficubus similis est, sed acrimoniā nullam possidet, modicæ dulcedinis particeps, humectior & frigidior quodāmodo ui sua existēs, uelut mora. Et sanē in medio mororū ac ficuū meritō locatur, unde etiā nomen habet.

Schinus, Lentiscus.

Lentiscus arbutū ex substantia aquea leniter calida, & terrea frigida nō multa compositum est, propter quā etiā moderatē adstringit. Siccat igitur tertij ordinis initio, iuxta caliditatem uero & frigiditatem temperatum est. Similem uim in omnibus suis partibus possidet. unde & per se, & cum alijs medicamentis bibitur, ad coeliacas affectiones, & dysenterias, & sanguinis sputa, & sanguinis ex utero eruptiones, prolapsæ quoque sedi ac utero præcipitato commodat, prope modum uelut hypocyitis.

Schoeni siue iunci rotundi odorati flos.

Iunci odorati flos calfacit moderatē, & adstringit moderatius, particeps est & tenuiū partiū facultatis, unde & menses ciet, & urinas ducit, in fomētis, & potu, & cataplasmatibus adhibitus, prodest & hepatis & uentris ac stomachi inflammationibus.

Schoenoslea, Iuncus leuis, Oxychoenus, Holoschoenus.

Iunci leuis altera species oxythoenos, id est, acutus iuncus, altera holoschoenos, hoc est, tota iuncea appellatur. Gracilior quidē & durior est iuncus acutus, crassior autem holoschoenus, & laxior. Huius fructus somnum inducit. Iunci acuti species duæ sunt, altera sterilis, & medicinæ inutilis; Altera fructifera, cuius item fructus somnum conciliat, sed minus superiore. hæc & capitis dolorē inducit. Vtræq; species torrefacta ex uino pota, fluxiones uentris siccat, & fluxū muliebrem rufum sistit. Et propterea temperamentū ipsarum terreū leniter frigidū esse indicatur, & aqueū leniter calidū, quapropter inferna siccat, & leniter ad caput decurrens perfrigerat, atq; sic somnolentos eos qui utuntur facit.

T

Terebinthus.

Terebinthi folia, cortex & fructus, habent quid adstrictorium, sed & calfaciūt ordine secundo. Fructus est propinquus tertio ordine siccantium. Quapropter & urinam ciet, & lienī prodest.

Teulon, Beta.

Beta nitrosam quandam uim possidet, qua extergit & discutit, & per nares expur-

expurgat. Cocta nitrosum & acre deponit, & ad discussoriā leniter facultatem, uis arcēdi inflammationes ipsi accedit. Alba extersioni ac discussioni efficacior. Nam nigra adstrictionis particeps est, & magis in radice. Quum autem exterforium succum habeat, etiam uentrem ad excretionē excitat, & stomachum quandoque mordet, praesertim illis quibus subtiliore sensu praeditus est, & propterea incommodum stomacho edulium est, si uberius ingeratur. Praestantior autem est quam malua ad hepatis obturationes, atque id magis ubi cum sinapi, aut aceto edatur, quomodo comesta etiam splenicis conducit.

Tephra. Cinis omnis.

Lignorum exustorum aut aliarum materierum reliquiae, cinis appellantur. Constat ex contrariis substantiis & qualitatibus. Habet enim in se quiddam terreum, & quid fuliginosum. Fuliginosa itaque partes tenuium partium sunt, & ubi cinis aqua maceratur & excolatur, simul decedunt. Quod autem relinquitur terreum, debile ac lene euadit, ut quod calidam uim in aquam deposuit. Porro non omnis cinis eandem uim exacte habet, sed iuxta uisae materiae differentiam uariant. Nam ex lignis acerbis, uelut quercinis & similibus, non parum adstrictionis habet in terra sui parte, unde & sanguinis eruptiones cohibet. Caterum ficulneus cinis multum acrimoniae ac uisoriae facultatis in fuliginosa sui parte possidet; in terrestri uero parte uim extensoriam. Consimilis huic est & cinis ex tithymallis. Est autem & titanus, hoc est, calx cineris species, magis tenuium partium existens, quam is qui ex lignis reliquus est. Calx itaque aqua exacte ter aut quater lota, & aqua diffusa, medicamentum euadit siccatorium citra mordacitatem. Quod si eadem aqua marina lauatur, discussoriam uim acquirit.

Telis, Foenum graecum.

Foenum graecum calidum est ex secundo ordine, siccum ex primo, participat & extensoria facultate, & propterea feruentes inflammationes exacerbat, minus calidas & induratas discutit. In cibi usum uariis modis uenit, sed caput tentat amplius sumptum, praesertim absque pane ingestum, quibusdam etiam stomachum subuertit. Succus decocti foenograeci, cum modico melle acceptus, omnes uisiosos humores intestinorum commodè subducit. Sed parum omnino mellis ammisceri debet, ne mordax existat. Caterum in uetustis pectoris doloribus citra febrem, palmulas pingues simul cum foeno graeco decoquere oportet, & expressum succum ammixto melle rursus decoquere ad prunas donec moderate crassefcat, atque ita eo uti multo tempore ante reliquum cibum intercedente. Vitandus tamen eius usus est in his qui caput laesioni obnoxium habet, Nam & palmulae ipsae caput tentant.

Tithymalli, Galactides, Characias.

Tithymalli omnes, qui & galactides appellantur, acrem & calidam uim habent praedominantem. Inest ipsis & amaritudo. Fortissimus igitur est succus, deinceps fructus & folia, particeps est & radix praedictarum facultatum, sed non ex aequo. Ipsa quidem igitur cum aceto cocta, dentium dolores & maxime erosorum sedat, succus quarti ordinis est calfacientium, qui iam uisiorius existit. Quapropter illi succi pilos denudant, sed uehemens ipsorum uis oleo ammixto mitigatur, & si frequenter id fiat, radices pilorum exusta penitus extirpantur, & corpus glabrum redditur. Eodem modo & uerrucas, ac thymos ex eadem uerrucarum gente appellatos tollunt. Impetiginē quoque ac scabiē exterunt. Cortex radice eius qui priuatim Characias appellatur, in umbra siccatus, tusus & cribratus, generose purgat potus. Oportet autē quatuor scrupulorum pondus à uespera in uino dulci

f 2 macera

macerare, & manē excolatū uinū per panniculum tepefactū potandū exhibere;
 Tragacanthus.

Tragacanthus succus est plantæ spinosæ, similem gummi uim habens, quæ & meatus obducit, & acrimoniam obtundit, & sanē siccatur quoque similiter illi.

Tribulus.

Tribulus ex moderata humida, & frigida ac sicca substantia constat. Cæterum in terrestri terrea frigiditas prædominatur, ob quā & magis adstringit. In aqua tili uero aquositas, & propterea feruentibus inflammationibus cōueniunt. Terrestribus fructus rhenum calculos atterit potus.

Triphyllon, Trifolium.

Trifolium Græci asphaltion ē bituminis odore appellant, estque calidæ ac siccæ facultatis in tertio ordine ueluti bitumen, & propterea potum laterum dolores ex obturatione obortos sedat, & urinam ac menses ciet.

Trychnon, Solanum.

Trychnon aliqui adiecto ad caput uocis litera σ strychnon appellant, & hortense quidē adstringit & frigefacit ordine secundo. Quod uero halicacabon appellatur in foliorū facultate simile est hortensi, uerum fructus eius urinā ciet. At uero cortex somniferi appellati de radice detractus, frigefacit similiter ut papaueris succus, ut tertij sit ordinis perfrigerantium. Fructus etiam huius urinam ciet, sed si plures quā duodecim corymbi fumantur, furorem inducit.

Y

Yacinthus, Hyacinthus.

Hyacinthi radix bulbiformis primi ordinis est siccantiū, secundi perfrigerantium. Creditur pueros diu impuberes adseruare, si cum uino in cataplasmate imponatur. Semen moderatē adstringit & exterget, unde ictericis datur ex uino. Siccatur ordine tertio, uerum caliditatis & frigiditatis in medio consistit.

Ydna, Tubera.

Tubera terreā substantiā prædominantē possident, modica tenuiū partiū amixta.

Ydropiper, Hydropiper.

Hydropiper herbula est in aqua nascens, & folijs & ramulis mentē similis, maior tamen, gustu acris uelut piper, semina fert parua iuxta singula folia, herba calida quidem est, sed non quantum piper. Viridis imposita fugillata & duritias sanat. Vtuntur quidam ipsa unā cum semine pro condimento piperis loco.

Yoscyamus, Hyoscyamus.

Hyoscyamus cōmodissimus est ad medicinas, qui florem & semen album habet tertij ordinis perfrigerantium existens: Reliqui uenenati sunt.

Ypericon, Hypericum.

Hypericum calfacit ac siccatur, substantiā tenuium partium habens, ut & urinas & menses prouocet. Ad hæc uero non modo semen, sed etiā folium conducit. Viride in cataplasmate impositum, ulcera ad cicatricem perducere potest, præsertim ambustorū. Siccum tritum inspersum, humore flaccida & putredinosa ulcera sanat. Quidam etiam ischiadicis ipsum bibendum præbent.

Yssopus, Hyssopus.

Hyssopus calfacit ac siccatur ordine tertio. Estque tenuium partium substantiæ.

Phaci, Lentesc.

Lentes non ualidē adstringunt, in caliditatis autem & frigiditatis medio consistunt. Siccant ordine secundo. Itaque corpus ipsarum siccatur ac sistit uentrem. Decoctum autem promouet. Quapropter ubi sistendi uentris gratia sumuntur, prima aqua diffunditur.

Phacos

PRIMAE SERMO I.

Phacos palustris, Lens stagnorum.

Palustris lens humidi & frigidi temperamentū est, ex secundo ordine.

Phaseli.

Phaseli itemq; ochri, mediā quodāmodo edulia sunt, inter ea quæ boni sunt aut mali succi, facileq; cōcoquuntur autē agrē, tardēq; cōmeant aut citō, flatus expertia aut infantia, parum nutrientia aut multum.

Phlomos, Verbasum.

Verbasum tres species habet, quarum radix acerbā est, unde & fluidis affectionibus auxiliatur. Quidam decocto eius dentes in dolore colluunt. Folia omnium discussoria & extensoria uim habent. Tertiæ usus est ad lucernarum lumina, quæ propriē thryallis appellatur.

Phoenix, Palma.

Palma arbor adstringentis qualitatis particeps est in omnibus suis partibus: ramorum succus austerus est, similiter quod cerebrum uocatur, quod in cibi usum uenit, fructus ipsius maximē dulcis, nō modica caliditate participat, escarius & multi usus, tum forinsecus adhibitus, tum intra corpus sumptus, ubi roborare, & siccare, & constringere ac densare, & obturare opus est. Omnes palmulæ agrē concoquuntur, & capitis dolorē inducunt amplius comestæ. Quidam ab earum esu morsum percipiunt in ore uentris, qui sanē etiam magis capite dolent. Succus qui ex ipsis in corpus distribuitur, crassus penitus est. Habet & uiscosum quiddam, ubi pinguis palmula fuerit. Quando autem crasso & uiscoso succo dulcedo permixta fuerit, iecur celerrimē ab ipsis obturatur. Si uero aut inflammatum fuerit iecur, aut induratum, ab ipsarum esu extremē læditur. Consequenter autem cum iocinore etiam lien obturatur, ac læditur. Cæterum multo magis lædunt palmulæ uirides etiam paulo uberius ingestæ. nam & flatu uentrē implent, & crudis humoribus, & qui elitarunt rigoribus agrē calefcensibus corripuntur. Porro germen tenerum quod Elaten, uocant, uim eandem cum cerebro habet. Quod uelut tegmen & uelamen ipsius est, adstrictoriū quia dem est, uerum magis prædictis siccatur. Est autem & radix arboris siccatoriae citra mordacitatem facultatis, & modicē adstrictoria.

Phu, Nardum creticum.

Phu radix nardo similem uim habet, debilior tamen ad alia est, uerum urinam magis ciet.

Phycos, Alga, Fucus.

Fucus siue alga, muscus est marinus, qui uiridis exemptus frigefacit & siccatur ordine secundo, habet & quid adstringens moderatē.

x

Chalbana, Galbanum.

Galbanum succus est ferulaceæ plantæ, mollitoria & discussoria uim habens. Calfacit ordine tertio, siccatur secundo.

Chamædrys, Trixago.

Chamædrys amarā qualitatem prædominantē habet, est & aliquo modo acris, unde & lienem colliquat, & urinas & menses mouet, & crassos humores secatur, & uiscerum obturationes expurgat. Tertiij ordinis est calfacientiū ac siccantiū. Decoctū ipsius diutius coctū, & assiduē potū, febre quartana correptos liberat.

Chamelæa.

Chamelæa amarā qualitatem prædominantē habet. Quapropter & fordida ualde ulcera, & quæ maximas crustas habent, cum melle repurgare potest. Est & pota expurgantium numero.

f 3 Chamæa

Chamaeleuce.

Chamaeleuce calidam uim habet ordine tertio, siccam primo. Vnde suffusa super per carbones manifeste opitulatur aegre spirantibus, si per infundibulum fumum inde hauriant.

Chamaeleon.

Chamaeleonis nigri radix uenenosum quid habet, unde eius usus forinsecus receptus est ad scabiem & impetiginem, ac uiriliginem, & in summa ad ea quae extinctione opus habent. Particeps est & mollitoriae ac discussoriae facultatis. Siccat autem ordine tertio, calcit secundo completo. At uero albi chamaeleonis radix pota ex uino austero, acetabuli mensura, latum lumbricum expellit. Dant ipsam & hydropicis.

Chamaepitys.

Chamaepitys tertij ordinis est siccantium, secundi calfacientium. Quum autem plurimum amara sit, exterget uiscera magis quam calcit, unde in regio morbo exhibetur, & omnino quibus secur facile obturatur, commodum medicamentum existit. Ducit & menses pota & cum melle apposita, Ciet quoque urinam. Quidam ischiadicis ipsam praebent coctam in aqua mulla, herba ipsa uiridis magna uulnera glutinare potest, & putredinosa ulcera sanare, & mammarum duritias discutere.

Chelidonium magnum.

Chelidonium magnum exteriora & calidam uim abunde possidet, succus eius uisum exacuit, his quibus crassum quid quod discuti oporteat, circa pupillam colligitur. Quidam radice usi sunt in morbo regio ex iecinoris obstructione oborto, ex uino albo dantes cum aniso.

Chelidonium paruum.

Chelidonium paruum maiore acrius est, unde in cataplasmate impositum cutem exulcerat, & ungues leprosos exterit, succus eius per nares fortiter purgat: est enim quarti ordinis calfacientium ac siccantium. Maius tertij in utrisque.

Chondrilla.

De chondrilla diximus quum de seride ageremus: est enim seridis species.

v

Psyllium.

Psyllij semen maxime in usu est. Secundi ordinis est frigescentium. Verum in siccando & humectando medium locum occupat.

Ω

Ocimum Basilicon, id est, regale.

Ocimum secundi ordinis est calfacientium, habet & humiditatem superfluum, unde neque utile est ipsum intra corpus sumere, uerum forinsecus in cataplasmate impositum ad discutiendum ac concoquendum commodat. Deco-

ctum ipsius lippientibus ob crassioris materiae copiam, calidum pro fomento adhibitum, magnopere prodest, praesertim pueris.

AETII TETRABIBLI PRIMAE, SERMONIS

PRIMI, FINIS.

INDEX

INDEX EORVM QVAE IN SECUNDO SER

mone Aëtij continentur.

| | | | |
|--|-----------------|--|--------------|
| De terræ differentijs. | Caput i | Sal ustus. | Cap. xliiij |
| Quomodo terrā lauare oportet. | | Salis flos. | Cap. xlv |
| Cap. | ij | Salis spuma. | Cap. xlvj |
| Quas medelas agrorum terra præstet. | | Armeniacum pictorum. | Cap. xlvij |
| De terra Lemnia, Cap. iij | (Cap. iij) | Auripigmentum. | Cap. xlvij |
| Rubrica. | Cap. v | Bitumen. | Cap. xlix |
| Terra Samia. | Cap. vi | Aphronitrum & litri spuma. | Cap. l |
| Terra Selinusia & Chia. | Cap. vii | Gypsum. | Cap. li |
| Cimolia terra. | Cap. viij | Diphryges. | Cap. lij |
| Terra Ampelitis. | Cap. ix | Diaphanes, lapis specularis. | Cap. liij |
| Terra Cretica. | Cap. x | Sulphur. | Cap. liij |
| De omni terra usta. | Cap. xi | Aerugo rasa. | Cap. ly |
| De bolo Armeniæ. | Cap. xij | Aerugo uermiculata. | Cap. lyi |
| Lapis hæmatites. | Cap. xij | Cadmia. | Cap. lvij |
| Lapis schistos, galactites, melitites. | | Cyanus. | Cap. lvij |
| Cap. xiiij | (dibus, Cap. xv | Squama æris ac ferri. | Cap. lix |
| Communis doctrina de omnibus lapi | | Argenti spuma. | Cap. lix |
| Leucographeis aut moroxus, Cap. xvi | | Litrum. | Cap. lxi |
| Galactites. | Cap. xvij | Melanteria. | Cap. lxij |
| Thyites lapis. | Cap. xvij | Atramentum scriptorium. | Cap. lxij |
| Tecolithos. | Cap. xix | Misy, Sori, & chalcitis. | Cap. lxiiij |
| Pyrites. | Cap. xx | Molybdæna. | Cap. lxv |
| Lapis Phrygius. | Cap. xxi | Plumbum. | Cap. lxvi |
| Lapis Ageratus. | Cap. xxij | Pompholyx. | Cap. lxvij |
| Lapis Alius, & flos ipsius. | Cap. xxij | Rhoidarij preparatio. | Cap. lxvij |
| Gagates. | Cap. xxiiij | Sandaracha. | Cap. lxix |
| Magnetes lapis. | Cap. xxv | Sandyx quæ & Syricum. | Cap. lxx |
| Smiris, pumex, testæ clibanij. | Ca. xxvi | Scoria. | Cap. lxxi |
| Lapides in spongijs. | Cap. xxvij | Stibium. | Cap. lxxij |
| Ostracites, geodes, Naxiæ cotis retri- | | Spongia. | Cap. lxxij |
| mentum. | Cap. xxvij | Alumen. | Cap. lxxiiij |
| Ophites lapis. | Cap. xxix | Calx. | Cap. lxxv |
| Hieracites lapis & Indicus. | Cap. xxx | Eucus. | Cap. lxxvi |
| Vitrum. | Cap. xxxi | Atramentum sutorium. | Cap. lxxvij |
| Lapis ætites. | Cap. xxxij | Chalcitis. | Cap. lxxvij |
| Alabandicus lapis. | Cap. xxxij | Aes ustum. | Cap. lxxix |
| Electrum siue succinum seu lyncuriū. | | Aeris flos. | Cap. lxxx |
| Cap. | xxxiiij | Chrysocolia. | Cap. lxxxj |
| Iaspis uiridis. | Cap. xxxv | Cerussa. | Cap. lxxxij |
| Iaspis subuiridis. | Cap. xxxvi | Pforicum. | Cap. lxxxij |
| Iaspachates. | Cap. xxxvij | De materia medica ex animalibus, Ca. | |
| Sapphirus lapis. | Cap. xxxvij | De sanguine, Cap. lxxxv | (lxxxiiij |
| Smaragdus lapis. | Cap. xxxix | De lacte. | Cap. lxxxvi |
| De metallicis & quæ ex aqua generan | | De lactis differentia. | Cap. lxxxvij |
| Adarces. | Cap. xli | De lactis differentia ab animalium ha- | |
| Alcyonia. | Cap. xli | bitu. | Cap. lxxxvij |
| Sal. | Cap. xliij | | f 4 De |

| | | |
|---|----------------------------|-------------------------------------|
| De lactis differentia à tēporibus anni. | animalium. | Cap. cxxvij |
| Cap. | lxxxix | De syluestrium animalium carne. |
| De lactis differentia à pabulo. | Cap. xc | Cap. |
| De lactis differentia ab ætate. | Cap. xci | De uolucrū animalū carne. |
| Quibus lac conueniat. | Cap. xcij | Cap. cxxx |
| De modo, tempore, ac mēſura utendi | lactis. | De anseribus & ſtruthocamelis. |
| Cap. xcij | Cap. xcij | Cap. cxxxi |
| Quibus lac noceat. | Cap. xciiij | De gruibus. |
| De lactis coctura. | Cap. xcvi | Cap. cxxxij |
| De ſero lactis. | Cap. xcvi | De partium uolucrū animalium diſſe- |
| De his quæ iucunditatis gratia cum la- | cte coquuntur. | rentia. |
| Cap. xcviij | Cap. xcviij | Cap. cxxxiiij |
| De lacte acido. | Cap. xcviij | De ouis. |
| De primario lacte. | Cap. xcix | Cap. cxxxiiij |
| De lacte concocto. | Cap. c | Ouorū uis medicamētaria. |
| De caſeo. | Cap. ci | Ca. cxxxv |
| Pharmacū ex caſeo uetere ad calloſas | concretiones podagricorū. | De alimēto ex animalib. aquaticis. |
| Cap. cij | Cap. cij | Ca. cxxxvi |
| De efficacia recentis caſei foris adhibi- | ti. | De cephalo. |
| Cap. cij | Cap. cij | Cap. cxxxviij |
| De butyro. | Cap. ciij | De lupo. |
| De coagulo. | Cap. cv | Cap. cxxxix |
| De felle. | Cap. cvi | De trigla ſeu mulo. |
| De ſudore. | Cap. cvij | Cap. cxl |
| De urinis. | Cap. cvij | De piſcibus petroſis. |
| De ſaliua. | Cap. cix | Cap. cxli |
| De ſtercore. | Cap. cx | De gobio. |
| Cap. cx | Cap. cx | Cap. cxli |
| De ſtercore canino. | Cap. cx | De piſcibus mollis carnis. |
| Cap. cx | Cap. cx | Cap. cxliij |
| De ſtercore humano. | Cap. cxij | De piſcibus duræ carnis. |
| Cap. cxij | Cap. cxij | Cap. cxliij |
| De ſtercore lupino. | Cap. cxij | De piſcibus teſta inteſtis. |
| Cap. cxij | Cap. cxij | Cap. cxliij |
| De ſtercore caprino. | Cap. cxiiij | De cruſtatis. |
| Cap. cxiiij | Cap. cxiiij | Cap. cxlv |
| De ſtercore bubulo. | Cap. cxv | De piſcibus mollibus. |
| Cap. cxv | Cap. cxv | Cap. cxlvi |
| De ſtercore ouillo. | Cap. cxvi | De piſcibus chartilagineis. |
| Cap. cxvi | Cap. cxvi | Cap. cxlvij |
| De ſtercore columbino. | Cap. cxviij | De echinis marinis. |
| Cap. cxviij | Cap. cxviij | Cap. cxlvij |
| De gallinaceo ſtercore. | Cap. cxviij | De ſalfamentis omniū animalium pe- |
| Cap. cxviij | Cap. cxviij | deſtrium, uolucrum & aquaticorum |
| De ſtercore anſeris, accipitris, ciconiæ | & terreſtrium crocodilorū. | Cap. cxlix |
| Ca. cxix | Ca. cxix | Cap. cxli |
| Sordes ouium ex qua œſypus. | Ca. cxx | De garo. |
| Ca. cxx | Ca. cxx | Cap. cxli |
| De carnibus. | Cap. cxxi | De muria. |
| Cap. cxxi | Cap. cxxi | Cap. cxli |
| De extremis terreſtriū animalium par- | tibus. | De adipe pinguedineq; ac ſeuo. |
| Cap. cxxij | Cap. cxxij | Cap. cxliij |
| De glandulis. | Cap. cxxij | De medulla. |
| Cap. cxxij | Cap. cxxij | Cap. cxliij |
| De teſtibus. | Cap. cxxiiij | De pulmone. |
| Cap. cxxiiij | Cap. cxxiiij | Cap. cxliij |
| De rhenibus. | Cap. cxxv | De capitibus. |
| Cap. cxxv | Cap. cxxv | Cap. cxlv |
| De cerebro. | Cap. cxxvi | De cornibus. |
| Cap. cxxvi | Cap. cxxvi | Cap. cxli |
| De terreſtrium animalium uiſceribus. | Cap. cxxviij | De unguibus. |
| Cap. cxxviij | Cap. cxxviij | Cap. cxliij |
| De aluo, inteſtinis ac utero terreſtrium | animalium. | De impetigine in pedibus equorum. |
| Cap. cxxviij | Cap. cxxviij | Cap. cxliij |
| De aluo, inteſtinis ac utero terreſtrium | animalium. | Cap. cxliij |
| Cap. cxxviij | Cap. cxxviij | De lanis ſuccidis & puris & uſtis. |
| Cap. cxxviij | Cap. cxxviij | Cap. cxli |
| De aluo, inteſtinis ac utero terreſtrium | animalium. | Cap. cxli |
| Cap. cxxviij | Cap. cxxviij | De pilis uſtis. |
| Cap. cxxviij | Cap. cxxviij | Cap. cxli |
| De aluo, inteſtinis ac utero terreſtrium | animalium. | De oſſibus uſtis. |
| Cap. cxxviij | Cap. cxxviij | Cap. cxli |
| De aluo, inteſtinis ac utero terreſtrium | animalium. | De pellibus & corijs. |
| Cap. cxxviij | Cap. cxxviij | Cap. cxliij |
| De aluo, inteſtinis ac utero terreſtrium | animalium. | De uentriculo mergi. |
| Cap. cxxviij | Cap. cxxviij | Cap. cxliij |
| De aluo, inteſtinis ac utero terreſtrium | animalium. | De uulpibus. |
| Cap. cxxviij | Cap. cxxviij | Cap. cxliij |
| De aluo, inteſtinis ac utero terreſtrium | animalium. | De aranearum telis. |
| Cap. cxxviij | Cap. cxxviij | Cap. cxlv |
| De aluo, inteſtinis ac utero terreſtrium | animalium. | De ranis. |
| Cap. cxxviij | Cap. cxxviij | Cap. cxlvi |
| De aluo, inteſtinis ac utero terreſtrium | animalium. | De muſtela. |
| Cap. cxxviij | Cap. cxxviij | Cap. cxlvij |
| De aluo, inteſtinis ac utero terreſtrium | animalium. | De |
| Cap. cxxviij | Cap. cxxviij | De |

| | | | |
|--|-----------------|--|----------------|
| De terræ intestinis. | Cap. clxviij | Quæ secundo ordine siccant. | Cap. ccxi |
| De dracone marino. | Cap. clxix | Quæ tertio ordine siccant. | Cap. ccxij |
| De uipera. | Cap. clxx | Quæ quarto ordine siccant. | Cap. ccxiiij |
| De herinacio marino. | Cap. clxxi | Quæ media sunt inter siccantia ac humectantia. | Cap. ccxiiij |
| De herinaceo terrestri. | Cap. clxxij | Quæ primo ordine humectant. | Cap. ccxy |
| De hippocampis marinis. | Cap. clxxiiij | Quæ secundo ordine humectant. | Cap. ccxyi |
| De cantharidibus. | Cap. clxxv | Quæ aquosam frigiditatem habent. | Cap. ccxyij |
| De cancris fluuiatilibus. | Cap. clxxvi | Quæ tenuium partium sint. | Cap. ccxyiiij |
| De carabo siue locusta. | Cap. clxxvij | Quæ crassarum partium sint. | Cap. ccxix |
| De testibus castoris. | Cap. clxxviiij | Corroborantia. | Cap. ccxx |
| De canis fluuiatilis testib. | Cap. clxxix | Concoctoria. | Cap. ccxxi |
| De canis terrestris catulo. | Cap. clxxx | Suppuratoria. | Cap. ccxxiiij |
| De cygni pullo. | Cap. clxxxi | Mollientia. | Cap. ccxxiiij |
| De buccinorum testis ustis. | Cap. clxxxij | Quæ indurant. | Cap. ccxxiiij |
| De galerita uolucres. | Cap. clxxxij | Exterforia. | Cap. ccxxv |
| De cochlea terrestri. | Cap. clxxxiiij | Quæ uasorum oscula aperiant. | Cap. ccxxvi |
| De menulis. | Cap. clxxxv | Rarefacientia cutem. | Cap. ccxxvij |
| De torpedine. | Cap. clxxxvi | Densantia cutem. | Cap. ccxxvij |
| De asello marino. | Cap. clxxxvij | Corrodentia. | Cap. ccxxix |
| De ostriorum testis. | Cap. clxxxviiij | Reprimentia eminentias. | Cap. ccxxx |
| De purpurarum testis. | Cap. clxxxviiij | Cicatricem inducentia. | Cap. ccxxx |
| De squatina marina. | Cap. clxxxix | Exulcerantia in superficie. | Cap. ccxxxiiij |
| De sepiâ. | Cap. cxc | Vistoria. | Cap. ccxxxiiij |
| De scinco. | Cap. cxci | Attrahentia. | Cap. ccxxxiiij |
| De tellinis. | Cap. cxciij | Discussoria. | Cap. ccxxxv |
| De cicada. | Cap. cxciij | Adstringentia. | Cap. ccxxxvi |
| De hyana. | Cap. cxciij | Quæ semen generant ac prouocant in cibis ac medicamentorum, & medicamentis cibarijs. | Cap. ccxxxviij |
| De harundinibus. | Cap. cxci | Quæ semen inhi-beant. | Cap. ccxxxviij |
| De electione optimorum medicamento- rum. | Cap. cxci | De alimentorum uiribus. | Cap. ccxxxix |
| Ex Orbasio. quæ sint media inter calfacientia ac frigefacientia. | Cap. cxciij | Attenuatoria alimenta. | Cap. ccxl |
| Quæ moderate calfaciunt. | Cap. cxciij | Crassi succi alimenta. | Cap. ccxli |
| Quæ calfaciunt primo ordine. | Cap. cxciij | Media inter attenuatoria & crassefacientia. | Cap. ccxliij |
| Quæ calfaciunt secundo ordine. | Cap. cxciij | Quæ viscosum sanguinem generant. | Cap. ccxliij |
| Calfactoria tertij ordinis. | Cap. cci | Quæ crudum humorem generant. | Cap. ccxliij |
| Calfactoria quarti ordinis. | Cap. cciij | Quæ frigidum humorem generant. | Cap. ccxliij |
| Quæ frigefaciunt. | Cap. cciij | Quæ atrabiliarium succum generant. | Cap. ccxliij |
| Quæ frigefaciunt primo ordine. | Cap. cciij | | |
| Quæ frigefaciunt secundo ordine. | Cap. cciij | | |
| Frigefactoria tertij ordinis. | Cap. ccvi | | |
| Frigefactoria quarti ordinis. | Cap. ccviij | | |
| Quæ siccant citra mordacitatem. | Cap. ccviij | | |
| Quæ simpliciter siccant. | Cap. ccix | | |
| Quæ primo ordine siccant. | Cap. ccx | | |

| | | | |
|--|---------------|--|---------------|
| Quæ biliosum humorem generant. | Cap. | Flatiosa. | Cap. cclix |
| Quæ superfluitatibus redundat. | Cap. cclxvii | Quæ extergent, secant, obturatione liberant. | Cap. cclx |
| Quæ superfluitatibus careant. | Cap. cclxviii | Quæ obturant. | Cap. cclxi |
| Quæ superfluitatibus careant. | Cap. cclxix | Quæ tardi transitus sunt. | Cap. cclxii |
| Multum nutriunt. | Cap. ccl | Quæ facile corrumpuntur. | Cap. cclxiii |
| Quæ parum nutriunt. | Cap. ccli | Quæ difficulter corrumpuntur. | Cap. cclxiv |
| Quæ boni succi sunt. | Cap. cclii | | |
| Quæ mali succi sunt. | Cap. ccliii | Quæ uentrem subducunt. | Cap. cclxv |
| Quæ facilia concocti sunt. | Cap. ccliiii | Quæ uentrem supprimunt. | Cap. cclxvi |
| Quæ ægre concoquantur. | Cap. cclv | Quæ calfaciunt. | Cap. cclxvii |
| Quæ stomacho commodant eumque corroborant. | Cap. cclvi | Quæ frigefaciunt. | Cap. cclxviii |
| Quæ stomacho incommoda sunt. | Cap. cclvii | Quæ siccant. | Cap. cclxix |
| Flatus expertia. | Cap. cclviii | Quæ humectant. | Cap. cclxx |
| | | Quæ caput lædunt. | Cap. cclxxi |

AETII MEDICI GRAECI CONTRA

CTAE MEDICINAE TETRABIBLI PRIMAE

Sermo secundus.

Quaecumque sunt plantarum partes, & fructus, & succi, & liquores, superiore sermone relatus est. Nunc uero de reliquis medicamentis, terræ uidelicet speciebus, & metallicis iuxta propositum agemus; Deinceps etiam de animalibus.

DE TERRAE DIFFERENTIIS,

CAP. I.



TERRA omnes homines familiari usurpatione illam substantiam solum nominat, quæ liquore subacta, lutum euadit. Nam quæ inter metalla reperitur, non liquefcit, dico autem liquefcere, per totam substantiâ in humorem resolui, madefieri autem in superficie, rigari tantum humore ad corporum profunditatem non penetrante. Omnis terra uim siccandi habet, quoniam corpus ipsius natura durum existit, & ubi penitus nullam igneæ substantiæ mixturam habuerit, leuissimè citra omnem mordacitatem siccatur. Conducit ipsi ad hoc præstandum lotura. Itaque quædam lotura non habent opus, quædam iterum atque iterum lauari expetunt. Quod si circa sensum gustus fueris exercitatus, ipse iudex esse potes, num lauari oporteat, siue non, id quod ex acrimonia aut adstrictione deprehendes. Quandoquidem uero impossibile est inuenire substantiam penitus immixtam ac simplicem, amplius considerare ipsam mixturam oportet, ex his quæ accidunt ipsi, iuxta leuitatis ac grauitatis, itemque saporis differentias. Siquidem enim adstringens apparuerit, tanto magis particeps est frigiditatis, quanto plus habuerit adstrictionis. Si uero acrimoniam præ se tulerit, tantum habet caliditatis quantum acrimoniæ. Et leuis quidem terra fit, quum per omnem suam temperaturam, aëreæ substantiæ multæ particeps est. Contra grauis, quanto fuerit grauior, tanto magis sincera terra existit. Calida quidem igitur terra calfacit, frigida & adstringens, perfrigerat & repellit. Quæ uero

uero exterforium quid possidet citra manifestam caliditatem, leniter siccet. Quæ autem glutinositatem ampliore habet, non exterget, sed glutinositas substantiam meatibus obducendis aptiorem efficit, ut extergere non possit, ubi nulla alia acrimonia uiscositati affuerit, uelut in ouo uidere est. Porro necessarium est neque hoc ignorare, sed eius per omnem materiam quæ in medicum usum uenit meminisse, etenim plurimi opinantur, omnia uis frigidiore se ipsis euadere, quidam uice uersa calorem in uis augeri putant. Vtriq; autem errant. Acræ quidem igitur omnia uis, multum de calore suo perdunt. Quæ uero talia non sunt, uis caliditatem acquirunt. Nullum autem uisum penitus frigidum euadit, relinquitur enim in ipsis uelut igniculus quidam tenuium partium, atq; hoc est quod per loturam uis deponunt, quo per aquam decedente, quod reliquum est uis, substantia terrea frigida fit, quæ citra mordacitatem siccare potest. Aqua uero in qua medicamentum lotum est, calidam uisum tenuium partium acquisiuit. His itaq; declaratis, tempestiuum iam est dicere, quo modo omnem terram non uisum lauare oporteat, si quidem lotura indigeat: Nam quædam uelut dictum est, lotura non egent.

Quomodo terram lauare oportet.

Cap. II.

Omnis terra hoc modo lauatur. Aqua primum subigitur, quæ nullam medicamentariam qualitatem præferat, deinde ubi lutum desedit, aqua superflans diffunditur, postea reliquum à subsidentibus inferne calculosis ac arenosis repurgatur.

Quas medelas agrorum terra præstet.

Cap. III

Agrorum terra quæ colitur, omnis quæ pinguis est, utilis est ad curationem omnium partium resiccatione indigentium. Quare & in Alexandria & Aegypto ipsa utuntur. In Alexandria itaq; uidi hydropicos & lienosos aliquos terræ Aegyptiacæ luto uti. Multi uero etiã furas, & femora, & cubitos, & brachia, dorsumq; ac latera & pectus, eius terræ luto illinentes, opem senserunt. Quin & ueteres inflammationes & laxos tumores hoc luto sanat. Et sanè noui quosdam toto corporis habitu aquosos, ex immodica hæmorrhoidum euacuatione redditos, inde manifestè auxilium sensisse. Quidam etiã diuturnos dolores iuxta partem aliquam firmatos, hoc luto perfectè sanarunt. Atq; hæc quidè Galenus. Verrè Strato de terra sic scribit. Ad uetustū capitis dolorē, sordes balnearū aut aquæ calidæ, cum terra nigra lota misceto, ac utitor. Aut terram cū decocto capitem rosarū subigito ac utitor. Aut testam amphoræ acetariæ tritam terræ addito, cū lauri decocto. Aut elibani testam cum nigra terra cōmittito, affuso sampsuchi decocto. Ceterū ad pustulas ex corpore erumpentes scabiosas ac impetiginosas, terram nigram cum amygdalarū aut lupinorum amarorū decocto subigito, ac utitor. Aut amphoram aceti cū rutæ decocto eluito, eoq; terram subigito, ac utitor similiter. Aut glebulas salis quæ in fundo amphorarū gari reperiunt trito, ac terræ ammisceto, & utere uelut efficaci. Aut columbinū simū terræ misceto, & cū halicacabi decocto subigito ac utitor. At uero ad tussim uetustam unā cū uitato corporis habitu, terram ossium uitulinorū decocto subigito, & pectus illinito. Aut amphoram mellariam eluito, & terram subigito ac utitor. Potes & cumini, & nigellæ, ac sampsuchi decocto similiter terram subigere ac uti. Porro ad lienosos, cinerem samentitiæ, & grumos fecis uini cum terra subigito, ac utitor. Aut foliorum capparis decocto subigito. Aut recrementum argenti leuissimè tritum, cū luto permisce ac utere. Aut decocto herbæ serapiadis tritescularis subigito ac utitor. Ad hydropicos aut testas amphoræ muriaræ inuere

inueteratas terito, ac terræ ammixtis utitor. Aut suillæ carnis siue utulinæ garum ammisceto, ac similiter utitor. Aut sampsuchum aqua marina coquito, eoq; terram subigito ac utitor. Aut salsamentum cum lupinorum amarorum decocto conterito, terræq; ammisceto ac utitor. Aut alumen ustum, & pulcgij usti cinerem, cum luto committito, & cum aceto mulso subigito ac utitor. Aut bubulum fimum siccum tritum terræ ammisceto, & aceto mulso subactis utitor. Ad Ischiadicos, & omnes neruofarum partium perfrictiones, sampsuchum uitulinorum ossium decocto coquito, eoq; terram albam subigito ac utitor. Aut anguillam cum sale & nitro coquito, & decocto terram subigito ac utitor. Aut sordes strigmentitias cum calce uiua terræ ammisceto ac utitor. Aut porri siue allij decocto terræ subigito ac utitor. Aut costum, caliam, iunæ cum odoratum, aspalathum, xylobalsamum, & sampsuchum confusa, in aqua & oleo coquito, lutoq; permisceto ac utitor. Aut caprarū fimum ac bubulum, simul cum sorde cerati raphanini terito, ac ad terram ammixtis utitor. Ad podagram, à capite usq; ad inguina ex prædictis æger integatur, ab inguine autem infra usq; ad digitos pedum & ungues, ex subscriptis. Vituli pedes posteriores unâ cum ungulis exurito, terito ac terræ misceto, & utitor. Aut lapidem leucographidem cum aqua in qua ferrū sæpius extinctum est terito, & aluminis unciam unam addito, ac cum terra subigito & utitor. Aut decocto foliorum cypri, id est ligustri terram subige ac utere. Aut gallas donec flaccescant coquito, & terram eo decocto subigito ac utitor. Aliud. Aluminis liquidī unciam unam, aluminis scissi unciam unam, gummi sexuncem, cæruſsæ dodrantem, melantheriæ quincuncem, misyos sexuncem, foliorum salicis dodrantem, olei myrtei aut cicini uncias $\times \times \text{IIII}$, aceti sexuncem, terito simul ac tū terra subactis utitor. Aliud. Acaciæ, atramenti futorij, utriusq; drach, II , aceto trita siccato, & ad terram ammixtis utitor. Aliud. Aluminis, spumæ argenti, misyos assati, singulorum drach, IIII , excipe cerato myrteo liquido, & cū terra subige ac utere. Aliud. Cerusæ, spumæ argenti, utriusq; drach, $\times \times \text{IIII}$, olei myrtei drach, $\times \times \times \text{IIII}$, aquæ quod satis est subigito cum terra ac utitor. Aliud, quo curatus est præses Philinus, Succī mororum, aluminis scissi, ligustri, uiticis, gallarum, croci, fructus myricæ, iuris, singulorum sexuncem, Omnia simul tenuissimè trita reponito. Vsu expetente necessario aqua dilutis ac cum terra subactis utitor. Cæterum lauari non oportet, sed persicorum immaturorum decocto perfundi ac foueri. Atq; hæc quidem de agrorum terra sufficiunt.

De terra Lemnia, Sigillum Lemnium, Sphragis Lemnia. Cap. IIII .

Lemniam terram, quam & lemnium sigillum, siue sphragidem uocant, præparatam accipere est, semel lotam in patrio loco, ut altera lotura non habeat opus. Verum aliàs alio liquore dissoluta, diuersimode operatur. Et sanè in malis gnis ac putredinosis ulceribus semper feliciter & magno fructu, lemnia terra usus sum. Vsus est pro magnitudine malicie ulceris. Quod enim ualde foetidū est, humectumq; ac sordidum & inueteratum, lemniam requirit acerrimo aceto dissolutam ad lutosam compagem. Vīno autem diluta, recentia uulnera glutinat, pora ad sanguinis reiectiones conducit, & ad lethalia medicamenta, & ad morsus uenenatorum animalium. Infusa quoq; per clysterem cum plantaginis succo, dysentericis magnopere auxiliatur, præablotis uidelicet ulceribus muria infusa. Datur iisdem & sanguinem spuētibus in potu cum posca.

Miltos, Rubrica. Cap. V .

Rubrica siue miltos uim habet adstringendi, meatus obducendi, resiccandi, quæ

quapropter etiam emplastris ammiscetur ac pastillis siue trochiscis siccantibus ac adstringentibus. Siftit aluum cum ouis in sartagine frictis accepta, itemq; infusa. Lumbricos etiam pota detrahit, primas omnium habet Sinopica appellata, uerum in Cappadocia nascens, densa existens & grauis, & colore iocineris, uni color, & quae diluta in multum succum diffunditur.

Terra samia.

Cap. VI

Samia terra non lauitur. Vtimur autem altera eius specie frequentius, quam sanè samiam Asterem siue stellam uocant, quae ad sanguinis sputum facit pota, & undecumq; feratur idem, & pota & apposita. Vtimur & ad exulcerationes dysentericas & nomas serpendo depascentes, infundentes eam cum plantaginis succo, maxime in ulceribus quae inflammatio praecipitavit, & acriora pharmaca non sustinent, & in corporibus molli carne praeditis. Mitigat enim humectiores praesertim & laxiores partes. Vnde in mammarum ac testium inflammationibus adhibetur, trita cum aqua, rosaceo tanto adiecto, ut pharmacum exarescere non sinat. Bonum est hoc modo praeparatum medicamentum etiam ad alias inflammationes calidas, & ad inguinum abscessus incipientes, ac fluxiones podagricas, & in summa ubi moderate frigefacere unaq; mitigare uolumus, ut ex hoc adeo manifestè appareat, samiae terrae uim moderate frigefactoriam esse. Est enim aërea & glutinosa, praestat autem stella samia, terrae samiae, eo quod glutinositatem & uim obducendi meatus ampliorem possidet.

Terra Selinusia & Chia.

Cap. VII

Selinusia & Chia terra exterioriam uim ualde moderate habent. Quapropter aliquae foeminae ad faciem his utuntur. Verum cum leui siccatione ac extersione, neq; caliditatis neq; frigiditatis manifestè participes sunt, & propterea ad ulcera in superficie corporum commodè existunt, qualia sunt ambustorum. Ceterum quae substantiam meatuum ualde obducitoriam habent, non extergent, prohibet enim hoc ipsum glutinositas.

Cimolia terra.

Cap. VIII

Cimolia terra mixtae facultatis est, habet enim uim frigefactoriam & repulsoriam, habet & modicam discussoriam. Lota discussoriam deponit. Verum iuxta naturam eorum quae ipsi armmiscuntur, manifestè utramq; uim demonstrat. Nam repulsorij ac frigefacientibus permixta, lutum quod inde fit perfrigerans ac repulsorium efficit, discussorij, discussorium, atq; ita ambustis conducit aceto subacta & illita. Memineris tamen commune hoc in omni leui terra esse. Omnes enim ambustis profunt euestigio ex posca illita, bullas exurgere prohibentes.

Terra Ampelitis, Pharmacitis.

Cap. IX

Ampelitis terra etiam pharmacitis appellatur, eo quod efficacior alijs uim possidet, & quod agricolae uere appetente ipsam diluant, ex eaq; radices uitium quae germen emisunt illinant, ut animalcula uitibus noxia eas non contingant. Ex eo uero quod cnipas vermiculos perimat, satis indicat quantum medicamentariae facultatis possideat. At uero lenitatem & uim mitigatoriam non habet, sed magis siccet. Quapropter & mixtam his medicamentis reperies ipsam, quorum scopus est siccare quippiam ac discutere.

Terra Cretica siue Creta.

Cap. X

Cretica terra similis quodam modo est samiae & consimilibus. Sed ualde debilis est, multum aërositatis habens, quapropter etiam uim extergendi citra mordacitatem magis habet, per quam etiam argentum exterit ac depurat.

De omni terra ulla.

Cap. XI

Quandoquidem uero quidam medici terram urunt, neq; id male excogitant.

g tum

tum in usum ulcerum quę leniter resiccati oportet. Nosse expedit quod ustu terra tenuiorū partium & acrior euadit, ut ad discussoriam facultatem delabatur. Si uero usta lauetur, acrimoniam quidem in aquam deponit, uerum partium tenuitatem ex ustura cōseruans, magis siccatoria fit. Quapropter quum omnis terra non usta ulceribus commoda sit, ea quę post usturam lota est, magis adhuc ad ulcera ægre carnem ac cicatricem recipientia conducit.

De bolo Armeniæ.

Cap. XII

Data nobis est in hac magna peste etiam alia quædam terra ex Armenia Capadociæ contermina, maximè siccatoriam uim habens, colore pallida. Qui dabit ipsam, lapidem appellabat. Est autem friabilis, uelut calx & stella samia, non tamen similiter stellæ leuis. Nam & magis densa est, minus ærea. quapropter qui negligentius inspiciunt, imagine lapidis offertur. Valde autem siccatur, tum in dysentericis, tum in fluxionibus uentris. Insuperq; sanguinis sputo, & destillationi, & putredinosis oris ulceribus conducit, maximè autem defluxionibus à capite ad pectus prodest. Quare etiam his qui ob eam causam ægre spirant ualde auxiliatur, nec non his qui tabe laborant. sic enim resiccat ulcus, ut ne tussiant quidem amplius. Carterum si fortè quis à malo liberatus, per licentiores diætam reciditum sentiat, is itidem ex Armeniæ bolo opem sentiet, præsertim difficili anhelitu iam diuturno. Porro in magna hac peste omnes qui de hoc phar-maco biberunt, celerrimè sanati sunt, quibus uero nihil profuit, omnes mortui sunt, neq; ab alio quopiam opem senserunt, ex quo palàm cōstat, quod solis his qui incurabiles erant non profuit. Bibitur cum uino substantia tenui, medio-criter diluto, si febre penitus careat homo, aut parum febricitet, sin ualde, cum aquato penitus. sed neq; sunt adeò uehementer feruida pestilentes febres. At uero quid attinet dicere quantam uim habeat hæc Armeniaca bolus siue gleba in ulceribus siccatione indigentibus? Appellatur autem illorum lingua uerna cula zarinaca, Syrorum uero zarnacha, mons in quo nascitur, iuxta urbem est appellatam Bagana, Ager in quo mons est, nominatur Agaraces.

Lapis Hæmatites.

Cap. XIII

Hæmatites à coloris similitudine nominatus est, affricus enim ad cotem, uel in pila tritus, sanguinolentum succum remittit, tantæ autem frigiditatis pariceps est, quantæ adstrictionis. merito itaq; ausi sunt medici hæmatiten lapidem ocularibus cōpositionibus addere. Ego uero etiam solo per se usus sum ad aspretudines palpebrarum, si unâ cum inflammatione essent oborta, per ouicandidum diluto, aut potius per fœnogræci decoctum, si uero citra inflammationem, per aquam. Initium semper faciendum est à moderatè liquido per specillum infuso, deinde ubi æger ferre uim eius potest, crassitudinem augere oportet, & postremum ita crassum facere medicamentum, ut specilli nucleo subdito palpebræ illinere possis, aut euerse affricare. Idem lapis ad cotem tritus ac potus, sanguinis sputo omnibusq; ulceribus conducit. Aridus autem tritus & ad puluillum reductus, reprimat carnem excrecentem, nemo autem ipso per se utitur. ego uero ad ea quæ dixi usus sum, uiribus ipsius ex saporis qualitate cognitis. Quin & ipsa ulcera oculorum ad cicatricem perducit per se solus tritus, uelut paulò ante dixi, siue infundatur, siue sublinatur. Nam & hoc ipsum experimento cognoui.

Lapis schistos, galactites, melitites.

Cap. XIII

Consimilem hæmatitæ, sed debiliore uim schistos, hoc est, scissilis appellatus lapis habet. Ad cotem tritus colorem pallidum reddit. Ab eo consequens est Galactites, lactis colorem dilutus reddens. melitites aut caliditatis cuiusdam particeps est.

est. Nam à similitudine saporis mellis nomen inuenit. Singuli itaq; hi paululum ab hæmatitæ uiribus descuerunt, & ad oculos similiter in usum ueniunt, sed leniores existunt. Leniora autem medicamenta semper sunt inflammatis partibus accommodatiora, uerum debiliora quàm ut depulsa inflammatione ad perfectam sanitatem perducere queant.

Communis doctrina de omnibus lapidibus.

Cap. xv

Quum communis sit omnibus lapidibus uis siccandi, quicunq; ex ipsis aut in succu resoluti, aut aliàs triti, nullam manifestam gustui qualitatem exhibent, eos putandū est debilissimos esse & leuissimos, & mordacitatis penitus expertes. Qui uero manifestā qualitatem gustantibus offerūt, iuxta qualitatis proportionem etiam uim habent, si quidem enim adstrinxerint, ad reprimendum, & constringendum spissandumq; ac cogendum commodi erunt, si uero momorderint, ad calcaciendum & discutiendum ac colliquandum ualebunt. Inter hos medijs sunt qui solummodo extergent, citra adstrictionem ac mordacitatem.

Leucographis aut moroxus.

Cap. xvi

Ex lapidum qui in succum resoluuntur numero est & qui in Aegypto nascitur, quo utuntur ad lintea illustranda, quem alij moroxū, alij Leucographidem uocant. Nam quum subuiridis appareat hic, si ad cotem affricetur, aut asperius pallium, locum inalbat. Expers est aut omnium qualitatum magis quàm prædicti, nō adstrictionem, neq; extersionem, neq; mordacitatem in gustu exhibens. Vnde hoc tantum ipsi adest, quod citra mordacitatem siccet, & propterea ceras to ipsum ammiscent, & ad ulcera cicatrice includenda utuntur in corporibus mollibus, miscent eundem & ocularibus compositionibus. Quanto uero mollior est & qualitatum magis expers, tanto moderatior & mitior existit.

Galactites.

Cap. xvii

Galactites quoq; consimilem prædicto colorem subuiridem habens, lacteum succu remittit. Est autem albior leucographide. Mulieres lacte multo implet, si à balneo tritum lapidem cū aqua aut uino dulci bibant. Miscetur & ocularibus cōpositionibus. Tradunt eundem dentientium puerorū collo adalligatum, facilem dentium exortum efficere.

Thyites lapis.

Cap. xviii

Omnibus relatis lapidibus fortiolem uim habet, lapis qui ex Aethiopia apporatur subuiridis aliquo modo uelut iaspis, nominatus thyites. Dilutus hic succum reddit lactei coloris, saporis mordacis, & propterea solum ad repurganda & extergenda ea quæ pupillis tenebras citra inflammationem offundunt, conducit, ex quo numero sunt & recentes oculorum cicatrices, quas attenuare solet, extergit & pterygium, oculorum uitium Vnguem latinis appellatum, si nō ualde durum existat.

Tecolithos quem Syriacum appellant.

Cap. xix

Est & alius lapis fortis facultatis in Syria Palestina nascens, colore albus, figura concinnus, lineas habens uelut à torno exsculptas, appellatur Iudaicus & tecolithos. Confringit calculos in rhenibus natos, dilutus in cote, & ex aqua calida potus. Verū in uesicæ lapidibus nihil eximij præstat. Nechepson tradit hæc uerba: Tecolithum lapidem cū aqua terito ad sordium strigementiorum tenuium crassitudinem, & derasis circa uesicam ac pubem pilis illinito, & confringet ac liquefaciet calculos in uesica. Vnde & cantilena orta est:

Salue pelagus Arabia,

Cladum medelam proferens

Insigniter, tecolithum,

§ 2

Idem

Idem oleo myrteo dilut us, podagricis commodè illinitur.

Pyrites.

Cap. xx

Est & pyrites ex lapidum numero qui fortem uim habent, colore argento similis, cuius usus est discussorio emplastro ammixti, adijcitur ipsi etiam schistus, hoc pharmacum saepe pus, saepe & grumosas concretiones, in medijs muscolum regionibus cōsistentes discussit. Oportet autem lapides qui in usum uertuntur omnes leuissimos facere, ac conterere cōsimiliter ut eos qui in oculares compositiones miscentur.

Lapis phrygius.

Cap. xxii

Phrygius lapis fortiter siccatur, habens quid adstrictionis simulq; mordacitatis, unde & repellit ac discutit. Ego autem uiso semper usus sum, ad putredinosa qui dem ulcera aut per se, aut cum aceto, aut posca, aut uino mulso. Ad oculos uero siccum ex ipso facio medicamentum, de quo in opere ubi de compositione medicamentorum dicitur, agam.

Lapis Ageratus.

Cap. xxiii

Lapis Ageratus quo coriarij utuntur, gurgulionem inflammatum euidenter sanat.

Lapis Assius, & flos ipsius.

Cap. xxiiii

Est & lapis Assius in Assio nascens, unde & nomen inuenit, tofacei coloris ac compagis, friabilisq; ac laxus. Innutritur autem in ipso quippiam simile tenuissimo pollini, qui parietibus molendinorum inheret, quod petrae Assiae florem appellant. Est aut tenuium partium, ut humore flaccidas carnes eliquet ac resiccet, citra fortem mordacitatem, habet & quid salum in sapore, ut coniectare liceat generationem ipsius salum esse, rore quodam ex mari petrae insidente, qui postea à sole siccetur & obarescat. Similem flori uim habet & petra in qua nascitur, sed efficacia debiliorem.

Gagates.

Cap. xxv

Estq; alius quidam lapis colore niger, qui igni admotus, bituminis odorem de se praeberet. Hunc tradunt reperiri in Lycia circa fluuium Gagen, unde etiam Gagates appellatur. Ceterum ego crustaceos & planos lapides nigros, debilem flammam generantes igni admotos, ex Cana Syria attuli propè Hierichuntē, qui nati erant in uertice mortuum mare ambiente, ad partem eius orientalem, ubi & bitumen prouenit, unde & odorem huiusmodi acquisierunt. Vixi sum autem his ad inflationes genuum diurnas & aegrè sanabiles, compositionibus ad hoc accidens experimento cognitis ipsos ammiscens, & sanè uisi sunt mihi uim illarū longè efficacissimam reddidisse. Ammiscui eosdem & emplastro Barbaro appellato, & euasit pharmacum manifestè amplius siccatorium, ut & sinus committeret ac contraheret, nō solum cruenta uulnera glutinaret, ad quae barbarum emplastrum maximè cōmodum esse creditur. Aiunt Gagaten aqua coctum, & cum aqua potum, lumbricos expellere, adalligatum aut capitis dolores inueteratos sedare. Accelerat partū mulieribus aegrè parientibus, si parturientis manu contineatur. Admiranda uis gagatae igni admoti & accensi, deinde uino extincti existit. Nam uinum hoc cardiacis in potu datum, statim ipsos leuat, & sudore cōpresso, & pulsu excitato. Alij in puluillū cōterunt gagatem lapidem, & per dies septem cum uino colicis exhibent, & penitus malum tollunt, datur in diem drachma una. Quin & poculum ex ipso suffumigant, ex quo cū uino bibendus datur. Idem praestat efficaciter bitumen quoq; potum, fugat serpentes ac reptiles bestias suffitus gagates, & menses ac secundas detrahunt, deprahendit item ac arguit comitiales morbos, strumas quoq; dissoluit tritus, commodis ad ipsas medicamentis ammixtus, sanat & sedis affectiones, quā leuissimè tritus, & uuarum acerbarum succo ad tertias decoctus. Quo modo etiam alias omnes corporis fluxiones compescere potest.

Magne

Magnetes lapis.

Cap. xxv

Magnetes lapis qui & Heraclius appellatur, cōsimilem hematitæ uim habet. participat & adtractoria facultate. Tradunt detentum manu chiragricorum ac podagricorum, dolores ipsorum sedare, æque & conuulsis opitulatur.

Smiris, pumex, testa clibanī, & similia.

Cap. xxvi

Smiris extensoriam uim habet, Dentes itaq; mundos facit si ex ea confricentur, uelut experientia cognouimus. Et pumex extensoriam uim habet uelut smiris. Et figulina testa eadem uī præstat, maximè clibanorum. Cæterum smiris etiam acre quippiam habet, & propterea ustorijs ac siccatorijs compositionibus miscetur. Item eis quæ curant humore flaccidas gingiuas. Sed & pumex affricus dentes illustrat, nō solum extergendo, sed etiam per asperitatem. Vstus aut pumex nihilo inferior est smiride, ad eisdē usus. Lotus idem post usturam, caua ulcera optimè carne replet. At uero clibanorum testa, unā cum extergendi facultatē & siccatoriam possidet. Quapropter emplastra ephestias & magos, ex hac testa composita, optimè cicatricem ulceribus inducunt.

Lapides in spongijs.

Cap. xxvii

Lapides qui in spongijs reperiuntur uim atterendi habent, non tamen adeo ualidam ut uesicæ lapides cōfringere possint, uerū rhenū calculos cōminuunt.

Ostracites, Geodes, Naxiæ cotis retrimentum.

Cap. xxviii

Ostracitem lapidem quosdam laudare audio, uelut qui multam siccatoriam uim habeat ex adstrictione & acrimonia permixtam, quemadmodum & cum qui Geodes appellatur, ita ut pupillas depurget, & mammarum ac testium inflammationes sanet aqua dilutus. Naxiæ tamen cotis retrimentum frigefactoriam uim habet, ut etiam podagris opituletur, cum cerato rosaceo adhibitum.

Ophites lapis.

Cap. xxix

Ophites lapis usti extergendi ac atterendi & confringendi uim habet. Quare potus ex uino albo ac tenui, lapides uesicæ confringit. Ad alligatus ad uiperæ morsus conducit.

Hieracites lapis & Indicus.

Cap. xxx

Hieracites & Indicus lapis hæmorrhoidas resiccant dextro scemori adalligatus, cuius rei & nos periculum fecimus. Diogenes autem de lapidibus libro sic ait: Lapis hieracites subuiridis est ad nigredinem uergens, & alijs coloribus respersus, ut uariis existat. Vim aut habet hæmorrhoidas resiccantem dextro ægri scemori adalligatus. Probatio uerū hæc est. Vbi habueris ipsum in manibus, melale manus inunge, & muscæ non appropinquabunt tibi lapidem ferenti. At uero Indicus colore subfuluus est, tritus aut purpureum colore succum remittit, & neq; densus neq; rarus est, & cū uino potus hæmoptoicis prodest. Qui uero ex albidis coloris est & cineris imaginē repræsentat, etiā alias sanguinis eruptiones sistit.

Vitrum.

Cap. xxxi

Vitrum tenuissimè tritum, ex uino albo tenui potum, uesicæ calculos potenter confringit.

Lapis Aëtites.

Cap. xxxii

Aëtites lapis agitatus sonitum edit, uelut ex altero lapide prægnans. foetus uuluarum lubricarum retinet sinistro brachio adalligatus. Verum tempore partus adimendus est de brachio & scemori adalligandus, parietq; prægnans citra dolo rem. Fures depræhendit, si quis ipsum in panem qui comedit imponat, nam qui furtum fecit, commansa deuorare nequibit. Tradunt etiam simul cum edulis coctum fures arguere. Neq; enim poterit fur deuorare quæ cum ipso cocta sunt. Tritus aut & cerato cyprino aut gleucino exceptus, aut alio quopiam calfaciente,

faciente, magnopere prodest arthriticis ac paralyticis.

Alabandicus siue Alabandinus lapis.

Cap. XXXIII

Alabandicus coloris subnigricantis est fuluo ammixto, pellucet quasi segmentis quibusdam aut fissuris discriminatus. Tritus hic superficiem pilorum alborum nigram efficit.

Electrum siue siccinum, seu lyncurium.

Cap. XXXIII

Electrum quod & succinum, & lyncurium appellant, potum dysenterias sanat, & stomachicis opitulatur. Chryseletrum quoque cum mastiche potum doloribus stomachi medetur.

Iaspis uiridis.

Cap. XXXV

Viridis iaspis proprietate quadam, uelut alia quadam, auxiliatur stomacho & ori uentris pro amuleto appensus. Quidam & anulis ipsum includunt, & draconem radios habentem in ipso sculpunt, quemadmodum Nechipso rex scripsit. Huius itaque lapidis etiam ego experimentum ingens habeo, & sane catenulam ex talibus lapidibus concinnatam de collo suspendi, ea commensuratione ac modo ut lapides os uentris contingant. Cognoui autem nihil minus ualere ac prodesse eos qui sculpturam non haberent, quam Nechipso tradidit.

Iaspis subuiridis.

Cap. XXXVI

Iaspis subuiridis adalligatus, stomachi dolores sedat, & paralyticas resolutiones ac dolores mitigat. Qui uero capnias appellatur, hoc est fumosus, turbulentum ualde habens colorem, magna tutela aegre parientes mulieres asseruat. Sed & hydropicis adalligatus commodat, & maxima uulnera ab inflammationibus asseruat, eosque qui uulnerantur dolore liberat itidem adalligatus.

Iaspachates.

Cap. XXXVII

Iaspachates ex iaspide smaragdeo, & achate compositus est. Vim habet leniendae sitis, & hydropicis auxiliatur, hepaticisque ac peripneumoniacis & pleuriticis potus, corpus quoque floridum ac speciosum facit.

Sapphirus lapis.

Cap. XXXVIII

Sapphirus cum lacte tritus potus, omnes internas ulcerationes sanat, & sudores sedat. Externas ulcerationes omnes idem cum lacte illitus curat, fissuras quoque linguae aridus tritus inspersus sanat. In summa siccatoriam uim habet.

Smaragdus lapis.

Cap. XXXIX

Smaragdus assatus & tritus cum melle Attico permixtus, oculorum hebetudines sanat. Cum melle uero & gummi illitus, elephantiasi laborantibus utilissimus est, idem quoque potus ab eo malo in totum liberat, sistit & sanguinem undecumque feratur.

De metallicis, & quae ex aqua generantur.

Cap. XL

Metallica appellare mos est medicis ea quorum generatio in metallis est, siue sponte naturae, siue per fornacem producantur, insuperque tertij generis quae rursus ex illis ipsis homines suo ingenio faciunt, uelut est cerussa, ærugo, sandix, & similia. Itaque consequenter de omnibus iuxta literarum graecarum ordinem trademus.

A.

Adarces.

Cap. XLI

Adarces accerrimus ac calidissimus est. Quapropter hebetantibus uim ipsius miscetur, & sic multi usus sit, affectionibus calidioribus indigentibus forinsecus ad motus.

Alcyonia.

Cap. XLII

Alcyonia omnia extergent, ac discutunt, habentque acrem qualitatem aliqua magis, aliqua minus. Quod ex hoc genere Asperum appellatur, externam superficiem leuem habet, & internam substantiam asperam, estque calidissimum omnium Alcyoniorum, ut etiam pilos exurere possit. Quapropter ad lepras, uicis

ligis

ligines, scabies ac impetigines, alijs mitioribus medicamentis utimur. Nā Asperum Alcyonium non solum exterget ac depurgat cutem, sed etiam excoriat ac ulcerat. Quod uero Miletium uocatur, figura uermi simile, purpurei coloris, & compage substantiæ molli, omnium tenuissimum est. Quare ustum alopecias sanat, cum uino fuluo ac tenui illitum.

Ales, Sal.

Cap. XLIII

Sal omnis & fossilis & marinus, eandem in genere uim habet. Differentia in eo est quod ex terra effossi substantia magis sit coacta, quapropter crassitudo partium, & uis adstringendi, in his maior existit. Fossilis generis optimus est Ammoniacus & Cappadocius. At uero marino specie similis est qui in quibusdam stagnis generatur. Omnis tamen sal in cōmuni calfacit, discutit, adstringit, siccatur, cogit ac densat substantiam corporum quibus adhibentur. Nam quicquid est in corporibus humiditatis id ipsum depascitur, & quod reliquum est solidæ substantiæ uel adstrictoria spissat. Vnde & siccant, & incorrupta adseruant, quæ ob superfluum humiditatem putrescere solent.

Sal uetus.

Cap. XLIII

Sal uetus discussoriā uim magis habet quā non uetus, quanto sanè tenuius corpus ex uetustate acquirit. Non tamen similiter ut non uetusta cogere ac densare solidam substantiam ualet.

Salis flos.

Cap. XLV

Salis flos compage quidem liquidus est, colore uero croceus, partium tenuitate uetus salem superat, & acrem qualitatem ac uim multum discussoriā habet. Coligitur sub gestum caniculæ. Est enim uelut flos quidam talibus aquis superflans.

Salis spuma.

Cap. XLVI

Salis spuma spumosa quidam flosculus salis est, uicinis petris adherens, multo autem tenuiorum partium naturam habet quā ipse sal, quare & attenuare & discutere multo magis potest, uerum quod reliquum est substantiæ densare uelut sal non potest.

Armeniacum pictorum.

Cap. XLVII

Armeniacum quo pictores utuntur ex Armenia apportatur, unde quoque bolus Armeniæ, de quo dictum est, affertur. Vim habet Armeniacum extensoriam cum modica acrimonia & paucissima adstrictione. Itaque quum tale sit ocularibus medicamentis ammiscetur. Quin & ipsum per se terunt in tenuissimum puluillum, utunturque sicco ad augmentum pilorum in supercilijs, ubi ob quandam humorum acrimoniam aliqui ipsorum excidunt, aliqui uero non augescunt, sed ob alimenti inopiam marcescunt. Nam acrimonia consumpta, partem ad naturalem habitum reducit. Etenim uitioso humore consumpto, natura ad proprias actiones redit, quum nihil sit amplius quod ei impedimento sit. Nechepsus de eo sic tradit: Armenium quo pictores utuntur, duodecima drachmæ parte melancholicis & crassum sanguinem habentibus dato. Datur & pueris pectoris morbo infectis, reuomunt enim, nam uomitorium existit. Datur & morbo sacro obnoxijis, ac furiosis, hoc modo: Centaurij fasciculos manipulares tres in aquæ marinæ heminis tribus coquito, donec una supersit, & cum excolato decocto Armuthi lapidis quem Græci Armenium uocant, tertiam drachmæ partem terito, ac confidenter exhibeto. Nihil enim periculi est. Itaque nosse operæ precium est quod Armenium penitus reuomitur, nihil memorabile sursum efferens, sed & infernè modicum quid paulatim, & in pluribus secessibus effert.

Arsenicum, Auripigmentum.

Cap. XLVIII.

Arsenicum ustoriam uim habet tum ustum, tum non ustum. Manifestum est autem quod ustum tenuiorum partium euadit.

Asphaltus, Bitumen.

Cap. XLIX.

Bitumen ex numero eorum est quæ in aqua marina aut consimili generatur. Optimum est quod in mortuo mari iuxta Hierichuntem provenit. Vis est omni bitumini siccatoria ac calfactoria, ordine secundo. Merito itaque ad cruenta uulnera glutinanda adhibetur, itemq; ad alia quæ siccari expetunt cum moderata calfactione. Quapropter in tenesmi ad egerendum irritamentis, in quibus pituita crassa infarta est ut ægrè auelli queat, ipsius utimur & suffitu. Similiter & ad dysentericos ex tali causa intestinis ulceratis. Potum bitumen nucis ponticæ aut fabæ magnitudine cum uino tritum, cardiacis qui animo linquuntur magnopere euestigio prodest. Maxime autem foeminis & pueris & corporibus mollibus conducit. Eodẽ modo datum & quartana citius liberat. Experimẽto constat uis eius potius ex aqua, in his qui à rabioso cane morfi sunt: preferuat enim eos ne in timore aquæ delabantur, & eos qui iam inciderunt conseruat.

Aphronitrum, & Litri spuma.

Cap. L.

Aphronitrum, hoc est, nitri spuma, & litri spuma inter se differunt, quod litri spuma medicamentum est magis siccatorium, aspectu farinæ triticæ simile. Nam alba quoque existit. Aphronitrum autem non farinosum neque dissolutum, sed compactum est. Differt autem à sale aphronitrum, in quantum unum solum prædominantem saporem manifeste in ipso uidere est, amaram uidelicet, qui discussoriam uim habet, denfatoriam uero non habet, quemadmodum sal possidet. Aphronitrum itaque extersoriam uim habet ut non solum sordes depurget, sed pruritum quoq; sanat. At uero litri spuma eandẽ uim quam litrum habet, sed tenuiorum partium existit.

r Gypsum.

Cap. LI.

Gypsum unà cum siccatoria facultate, uim quoq; obducendi meatus assumptum, lapidescit enim aqua maceratum, quapropter puluillo farinæ triticæ molendini parietibus adherenti mixtum, & oui candido subactum, ac pilis leporinis exceptum, sanguinis eruptiones præclare sistit.

Δ

Diphryges.

Cap. LII.

Diphryges mixtam facultatem adstringentẽ cum acrimonia habet. Quapropter & malignorum ulcerum bonum medicamentum est, & ad putredinosam oris ulcera, tum per se, tum cum melle despumato. Item ad anginã, maxime ubi iam per adstringentia humorum influxus fuerit repressus. Quin & gurgulione resectio, ipso solo mox usq; ad cicatricem inductam sæpe usus sum, utpote pharmaco omnia ulcera exacte cicatrice includente.

Diaphanes, Lapis specularis.

Cap. LIII.

Diaphanes siue lapis specularis appellatus, ustus tritus fistulosis ulceribus inspersus celerrime incarnat.

Θ

Theion, Sulphur.

Cap. LIIII.

Sulphur omne uim adtractoriã habet, temperamento calidum, substantia tenuium partium existens, ut & ad multa uenenum eiuculantia animalia resistat. Ego autẽ & ad pastinacæ marinæ & draconis morsus ac ictus eo sæpe usus sum, arido uulnere insperso, aliquando etiam salina ammixa, aliquando oleo uetere, aut melle, aut terebinthina. Sed & scabies ac lepras & impetigines sæpe cum co curauĩ addita terebinthina. Deterit enim tales affectus, nec materiam in alium repellit, quemadmodum multa medicamenta faciunt.

I Ios

I Ios xystos, Aerugo rafa.

Cap. LV.

Aerugo rafa acrem qualitatem habet, discutitq; ac consumit & liquefacit omnem carnem. Quod si ad multam ceram ammiscetur extensorium & cicatricem inducens pharmacum.

Aerugo uermiculata.

Cap. LVI.

Aeruginem uermiculatam ita facies. In pilam cyprii aeris, quæ & pistillum æreum habeat, aceti albi acris dimidiam heminā infundito, & in sole terito donec strigmentitiam spissitudinem acquirat. Deinde aluminis rotundi drach. i. & fossilis pellucidi albiq; ac solidi drach. i. addito, aut si hoc non adsit, nitri tantundem, & postea ad solem sub caniculæ æstum terito, donec colore æruginosum compage uero strigmentosum euadat, atque sic ad uermicularem figuram effingito, ac reponito. Efficacior sit ærugo, si aceti partem unam, urinæ ueteris duas contriueris.

K Cadmia.

Cap. LVII.

Cadmia optima est botryitis. Vim habet omnis cadmia siccatoriā participans & extensoria. In caliditatis ac frigiditatis differentia moderata est. Vsta uero & lota medicamentū siccans & extergens citra mordacitatem euadit, ad ulcera explenda tum oculorum, tum totius corporis commodum.

Cyanus.

Cap. LVIII.

Cyanus acrem & discussoriā ac demolientem consumentemq; carnem uim habet, participat & adstrictoria.

A Lepis, Squama aeris ac ferri.

Cap. LIX.

Squama alia aeris est, quæ sanè helitis uocatur, alia ferri. Helitis itaq; in siccando primas habet, utpote tenuiorū partiū, & quæ aliquid æruginis assumpsit, uerum ferri squama maiore adstringendi ui participat, atq; ea adhuc amplius ferri stomomatis appellati, hoc est, chalybis, siue in aciem efformati. Quapropter hæ ambæ ad maligna ulcera meliores quàm squama aeris existunt. Aeris autē squama consumit & eliquat carnes. Omnes uero squamæ multum mordaces sunt.

Lythargyros, Argenti spuma.

Cap. LX.

Argenti spuma moderatè liccat, quemadmodū alia omnia consimilia, calfacit quoq; partimq; perfrigerat, ac extergit, atque hæc omnia moderatè facit. Quapropter uelut materia sæpe ipsa utimur, eamq; alijs ammiscemus, quemadmodum etiam cera uelut materia quadam utimur.

Litrum.

Cap. LXI.

Litrum inter aphronitrum & salem mediam uim habet. Vstum autem ad spumæ litri substantiam propè accedit. Siccat itaque & discutit, & si quidem intra corpus sumat, secat & attenuat crassos ac uiscosos humores, multò magis quàm sal. Aphronitrum autem nisi magna urgente necessitate, nemo deuorarit, ut quod stomacho incommodum existat. Et tamen ruralis quidam in strangulatu fungorum ipso utebatur magno suæcessu.

M Melanteria.

Cap. LXII.

Melanteria medicamentū adstringens est, simulq; tenuium partium, ferè omnium maxime pharmacorum quæ adstringunt.

Melan, Atramentum scriptorium.

Cap. LXIII.

Atramentum scriptorium abundè siccatur aqua dilutum, aut potius posca, & ambustis euelligio illitum prodest.

Misy, Sori, & Chalcitis.

Cap. LXIII.

Iuxta cypri metallum in Solorū montibus, magna quædā domus erat in monte esse.

te effossa, iuxta cuius dextram parietem, ad ingredientes uero sinistrū, introitus erat ad ipsum metallum, in quo quasdam uidi plurimā extentas uelut zonas alternatim positas tres numero, infimā quidē foreos, supra ipsum chalcitidis, deinde misyos. Et progressu sanē temporis chalcitis paulatim transmutatur in misy, & diutiori adhuc tempore potest etiam fori in chalcitidem permutari. Quare nihil miri est, tria hæc eiusdem generis uim habere, & tenuitate ac crassitudine partium tantum differre. Crassissimarum enim partium inter ipsa est fori, tenuissimarum misy. Mediam uero inter ambo uim chalcitis possidet. Vsta hæc tenuiorum partium fiunt, sed minus adstringunt.

Molybdæna, Plumbago.

Cap. LXV.

Molybdæna siue plumbago similem argenti spumæ uim habet, ad frigiditatem uergentem, sed neq̃ exterforiæ facultatis particeps est.

Molybdos, Plumbum.

Cap. LXVI.

Plumbum uim habet frigefactoriam, nam liquidam substantiā possidet à frigiditate coactā. Vnde & mole & pondere augescit plumbum, in domibus subterraneis turbidum aërem habentibus repositum. Itaq̃ si pilam plumbeam unā cum pistillo plumbeo paraueris, & in ipsam uinum tenue, & oleum rosaceū, aut myreum, aut melinum infuderis, & ad solem siue ignem triueris, ut succū quendam plumbum remittat. Optimum pharmacum habebis, si eo succo ad sedis inflammationes ulceratas, aut pudendorum, aut testium, aut mammarum uteris. Item ad omnes influxiones quæ inguinibus, aut pedibus, aut alijs articulis incumbunt. Est & mirabile medicamentum ad maligna & cancrōsa ulcera. Ad multos usus idem cōmodum erit, si ex adstringentibus ac perfrigerantibus succum aliquem addideris, uelut est seridis, cotyledonis, semperuiui, portulacæ, psyllij, uuæ acerbæ. Quæcunq̃ uero ex his succū non facili remittūt, uelut portulaca, his aliorū succū ammiscere oportet, uelut uuæ acerbæ. Lamina porro ex plumbo facta & lumbis imposita, ueneris impetus colibet in his qui exercitare se uolunt. At uero ustum & lotum plumbū, ad maligna ulcera, & chironia, & cancrōsa, optimum pharmacum est cicatricem inducens tum per se, tum alijs ammixtū.

ῥ Pompholyx.

Cap. LXVII.

Pompholyx lota ferē omnium primas obtinet quæ citra mordacitatem siccant. Vnde ad cancrōsa ulcera commoda est, & alia omnia maligna, & corrosas dentium gingiuas.

ῑ Rhoidarij præparatio.

Cap. LXVIII.

Rhoidariū uariē præparatur. Optimus modus hic est. Rhun olus accipito, & in aqua macerato, & lapidē cupholithon appellatū terito, rhois cremore affuso, siccari finito. Deinde anchusæ radicē cum oleo coquito donec oleum ruffescat, & ex oleo parū addito ac terito, & ad dies x v, siccari finito, & tunc rursus ex cremore rhois affundito ac siccari finito. Deinde in uas testaceū mitto, obturato ac alitato, & erit bonū rhoidariū. Cæterū cupholithos à Cæsarea Palestinæ affertur. Qui cupholitho carent, calce uiua ad medicamentum præparandum utuntur.

ζ Sandaracha.

Cap. LXIX.

Sandaracha uistoriam uim habet uelut arsenicum, unde in compositiones discussorias & exterforias ipsam ammiscunt.

Sandyx quæ & Syricum.

Cap. LXX.

De Sandyce siue Syrico ubi de cerussa agemus dicitur.

Scoria.

Cap. LXXI.

Scoria omnis multum siccatur, si itaq̃ ferri scoriam siue recrementum quàm leuissimē

uissimè contriueris in acerrimo aceto, & postea coxeris, pharmacū maximè siccatorium ad inueteratas aurium purulentias habebis. At uero argenti scoria ap- pellatur helcysina, itidem siccandi uim habens.

Stibium.

Cap. LXXII.

Stibium ultra siccatoriam uim omnibus metallicis cōmunem, habet & adstri- toriam facultatem, Quapropter & ocularibus medicamentis ammiscetur.

Spongia.

Cap. LXXIII.

Spongia pice liquida ac bitumine imbuta & uista, acrem & discussoriam uim habet, sanguinemq; sistit, spongia noua aqua frigida aut posca, aut uino made- facta, pro corporum uidelicet differentia, uulnera cruenta glutinat, uelut alia ad hanc rem idonea medicamenta.

Stryteria, Alumen.

Cap. LXXIII.

Alumen omne uehementissimā adstringendi uim habet. Scissile omniū ma- ximè subtilium partium est. Deinde rotundum. Crassarum partium est liquidū, itemq; crustaceum ac laterarium, placitin & plintitin Græci appellant.

T

Titanos, Calx.

Cap. LXXV.

Calx uisua uehementer urit, ut crustam inducat. Extincta euestigio quidem & ipsa crustam infligit, uerum post unam aut alterā diem, & minus urit, & minus crustam inducit, & progressu temporis penitus crustam non infligit. Calfacit ta- men adhuc & carnes consumit. Si uero lauetur, mordacitatē deponit, & lixiuū facit: ipsa uero citra mordacitatē siccatur, & si bis aut ter, aut pluries lauetur penitus lenis euadit, & generose citra mordacitatem siccatur.

Phycos, Fucus.

Cap. LXXVI.

De fūco referam ubi de cerussa tractabo.

X

Chalcanthus, Atramentum sutorium.

Cap. LXXVII.

De hoc pharmaco merito mirari licet, quomodo fortissimæ adstrictioni ca- liditas non ignaua in ipso mixta sit. Quare manifestum est quod omnium ma- ximè humiditas carnes siccare potest, humiditatem calore consumens, adstrictio- ne uero densans ac spissans substantiam. Fit & hoc in Cypro prope locum ubi misy, chalcitis, ac fori reperiuntur, ut ex his intelligi possit, aquam pluuialem per collem illum excolatam, omnem illam terram circumluere ac abluere. Vidi au- tem hanc paulatim coaceruari quotidie in lacu quodam, & erat sanè tepida ac ul- ridis, chalcitidem & æruginē odore repræsentans. Quidam autem ipsam exhau- rientes aquam, in urnas quadrangulares fictiles transfundūt, in quibus plurimis diebus coacta ac densata chalcanthus fit. Verum temporis progressu etiam chal- canthus in chalcitidem transit.

Chalcitis.

Cap. LXXVIII.

De chalcitide iam diximus ubi de misy egimus. Nunc satis est illud tantū dice- re, quod adstrictoriā & acrem uim mixtim habet. Prædominat autem acris, uehe- mens adeo existens, ut & carnē inurat, & crustā inducat. Vsta chalcitis mordet quidem minus, sed non minus siccatur. Deponit & adstrictionis non nihil. Quare penitus melior est uista chalcitis quā non uista, tenuiorū partium uelut alia uista euadens, acrimoniā autem non adsumens. Nam quæ natura acris sunt, uista mi- tiora fiunt; reliqua acriora. Lota insuper chalcitis adhuc lenior euadit.

Chalcos, Aes ustum.

Cap. LXXIX.

Aes ustum habet quiddam acre in se, sed & adstrictionis particeps est. Et pro- pterea si lauetur optimum pharmacū est ad ulcera cicatrice includenda. Verum ante uisuram, in his qui duras carnes habent usus eius assumitur.

Chalcu,

Chalcu anthos, Aeris flos.

Cap. LXXX.

Aeris flos tenuiorum partium uim habet quàm æs ustum, & squama æris, participat & exterioria uim, unde ad magnas asperitudines palpebrarum conducit, sycofes Græci appellant.

Chrysocolla.

Cap. LXXXI.

Chrysocolla ex eorū numero est quæ carnes eliquant, non tamen fortiter mordet, discussoria utique satis est & siccatoria, quidam eam solam ita appellant quæ inter metalla reperitur. Verum præstat arte parata, in pila ænea æris rubri, pistillo quoque similiter æreo, urina pueri impubis addita, ita ut diutius in sole calido teratur. Nam quod inter terendum resoluitur, id siccatum commodissimum medicamentum fit ulceribus malignis, tum per se, tum idoneis ad eandem rem pharmacis ammixtum.

Pŷmmithium, Cerussa

Cap. LXXXII.

Cerussa ex plumbo acri aceto dissoluto paratur, & tamen neque acris neque mordax est, neque discussoria, sed & meatus obducit, & perfrigerat. Vista autem pura cerussa, in id quod Syricum appellatur transit, medici sandycem nominant. Et uista quidem cerussa tenuiorum partium euadit, non tamen calfactoria. At uero fucus frigiditatem cerussæ seruans, partium subtilitatem insuper assumptus, ut per ipsam in altum corporum penetrare queat.

Pŷoricum.

Cap. LXXXIII.

Pŷoricum fit dupla chalcide ad argenti spumam ammixta, ita ut hæc primum acerrimo aceto terantur, deinde in ollam nouam indantur, quæ media æstate per dies quadraginta in sterquilinio defoditur. Hoc medicamentum magis siccatorium, & minus mordax fit quàm chalcitis, palam est autem quod & tenuiorum partium euadit.

De materia medica ex animalibus.

Cap. LXXXIII.

Plantarum materia explicata, non omni uidelicet per totum terrarum orbem, sed quantæ nos experientiam habemus. Imò & terrea & lapidea materia medica enumerata, superest adhuc materiam ex animalibus persequi, siue ea in aqua, siue in terra uitam degant. Quemadmodum autem in plantarum materia, etiam de succis qui ex ipsis sunt mentionem fecimus, sic etiam nunc non solum solidarum in animantibus partium uim trademus, sed etiam in ipsis contentorum, uelut sanguinis, bilis, urinae, stercoris, & similia, relictis tamen abominandis ac detestandis, & quibusdam lege prohibitis, de quibus cum alij quidam, tum Xenocrates scripsit, uelut est homines comedere, urinas bibere, ac menses muliebres, & similia. Imò relictis quoque medicamentis certa morborum genera inducentibus, itemque compositionibus uenenosorum pharmacorum. Qui enim talia scribunt non minori sed maiori odio digni sunt, quàm qui perpetrantur, quanto maior iniuria est cum multis malum aliquod quàm unum solum perpetrare. Et cum actore quidem flagitiosarum speculationum experientia comoritur; Scribentium uero malefactorum immortalis est, arma malicie improbis suppeditans. Dicemus itaque nos de commodis hominibus rebus, quarum experientiam habemus, et sanè primum humorum in animalibus mentionem faciemus.

De sanguine.

Cap. LXXXV.

Columbinum sanguinem solent hi qui ossa capitis fracta perforant, crassæ membranæ infundere, quod si columbinus non adsit, palumbi aut turturis sanguine uti licebit. Quidam & ad sugillatos oculos eodem utuntur calido instillato de res
cens

recens mactato animali, aut de uenis alarū dissectis, Ego uero sexcentos uidi ossibus capitis perforatos, & nihil laesos ex rosacei usu, citra sanguinē columbinum: Sunt autē & sugillatorū oculorū medicamina multa ex collyriorū genere, & maxime Damocratis ex myrrha, item quod ex thure constat, & quod ex croco, Sed & fenigraci succus in hunc usum potior est sanguine columbino. At uero caprinum sanguinē quidā hydropicis pharmaci loco dederūt, & ad uentris fluxiones aut dysenterias eodē assato usi sunt. Hircinū quoq; sanguinē aliqui siccātū, & alijs ad hanc rem cōmodis ammixtū, calculosis exhibent. Itaq; licebit ruri de genti & alijs auxilijs carenti, etiā hunc in usum uertere, nam experiētia periculo uacat. Quin & hœdinus sanguis in usum uenit, de quo Xenocrates sic scripsit: Hœdinus sanguis spuentibus sanguinē ualdē cōmodus est. Oportet autem nondum congelato dimidiā hemina mensura, aceti acerrimi tantundē ammiscere, deinde seruēfactū in tres partes diuidere, & singulis diebus partem unam absorbendam præbere. Vespertilionū porrō & ranarum ac ricinorū sanguinem pilos extirpare falsum reperi, quum experientia id explorarē. Quemadmodū etiam aliorum animalū sanguinis uanas promissiones cōperi, & partim experiri ne tentauī quidem, quum pharmaca haberem aptiora & parabiliora ad singulos affectus, cauebam autem simul ne præstigiatoris opīonem incurrerem.

De Lacte, ex Rufo & Galeno. Cap. LXXXVI.

Duplex lactis utilitas est, altera ut alimentū, altera ut medicamento, saluberrimū lac est purum ac syncerum, neque amaritudinis, neque aciditatis, neque fædeditatis, neque acrimoniæ, neque graueolentiæ particeps, sed ut ita dixerim, odoratum, aut odoris expers, aut si quidem modicē odoratum fuerit, palām est quod & gustantibus dulce erit, utpote modicæ dulcedinis particeps. Primum autem differentias ipsius considerare oportet.

De Lactis differentia. Cap. LXXXVII.

Quantum natura inter se distant uacca & equa, ac alia animalia, tantum & lac ipsorum inter se differt. Bubulum enim crassissimū est ac pinguisimū, commodeq; nutrit ac partes subit. Liquidissimū autem & tenuissimū ac minimē pingue camelinum est, & uentrem minus subit, quamuis multū feri habeat. Sed uice uersa equinum magis aluo secedit, similiter & asininum, quod minimum pinguis succi possidet. Quapropter etiā rarō in uentre in caseum mutatur. Caprinum moderatā compagem habet, & ad purgandū debilius bubulo est, de cætero æquē cōmodum & multum nutriens. Ouillum hoc crassius est, uerum uitis ligines albas sub cute inducere solet, si quis assidue ipso utatur. Suillū crassissimum est, ut neque coagulo opus sit ad id coagulandum, & serum modicum se cernat, & in coctura celerimē coeat. Quare nec adalui excretionem cōmodum est, & uentriculo nauseam mouet.

De lactis differentia ab animalium habitu. Cap. LXXXVIII.

Manifestum est autem quod omne sanum animal melius lac quā morbidū præbet. At uero morbos animalium ex tenuitate cutis deprehendere licet, & piliraritate, tuberculis, impetigine, scabie & inedia, Nigriora quoque in brutis ferre in totum fortiora sunt. Quod & carnes ipsorum testantur, utpote iucundiores, Alba contrā imbecilliora.

De lactis differentia à temporibus anni. Cap. LXXXIX.

Iuxta anni tempora liquidissimū & tenuissimū est lac uernum, hoc est, post partum: spissatur autem temporis progressū, ut mediā æstate siccius ac crassius reddatur. Laudatur æstiuum ut concoctū facilius, & iucundi odoris.

h Delas

De lactis differentia à pabulo.

Cap. XC

Quin & circa pabulū plurima differentia in lacte reperitur, Nam aliās aliā herbam animalia depascunt, & uiridis quidem herba, & iuxta aquas nascens, liquidiū & modicū lac suggerit, Durior uero & montana, apta est ad boni ac multi lactis generationē. Omnia pabula adstringentia, acerbū & aluum sistens lac præbent, Acrīa uero & præsertim purgantia, uelut est scammoniū, & ueratrū, & thymalli, uentrem turbans lac exhibent, Cytisus autem pingue ac dulce.

De lactis differentia ab ætate.

Cap. XCI.

Animalium in uigore ætatis consistentium lac optimum est, iuniorum liuidius, seniorum siccius.

Quibus lac conueniat.

Cap. XCII

Ex omnibus ferè edulij optimū lac optimi succi est ac alimentū ex contrarijs substantijs ac facultatibus compositū, subducente ac sistente aluū, obturante ac attenuante. Et sanè ubi qualitas ipsius nihil contrariū uentis naturæ habuerit, & uiscerū ipsius exitus ob uasorū amplitudinē spaciosi fuerint, utilitas ex lacte consequetur, & nihil mali ille ex eo experiet. Vtilitates autem lactis etiam ueteres medici recensuerūt. Ventris moderatā subductionem, succi bonitatē, & alimoniā, & quod concoctum probè carnem meliorem reddit, & mordaces succos expurgat. Vnde in urinæ difficultate, & acri egestionē alui, non solum bibere cōducit, sed etiam infernè per clysterē infundere. Ad acres enim & mordaces fluxiones cōmodissimum est, nō solum abluens ipsas de partibus infestatis, atq; hoc per exterforiā humiditatē, quam in serosa sui parte cōplectitur, sed etiā crassitie ac pinguedine sua corporibus oblitum ac inductum, non sinit influxum acrem nudis ipsis allabi. Ad pulmonis itaq; ac intestinorū ulcera, item rhenum, uesicæ ac ueteri, & ad papularum eruptiones, ac furunculos, & alias cutis asperitudines, conuenientissimum est in potu. Item ad eos qui cantharidas hauserunt, aut buprestin, & in summa ad medicamenta erodentia ac exulcerantia, & ad hyoscyamū uelut peculiare remediū est. Non statim resipiscere affectos facit. Cæterū in gutturis exulcerationibus, quæ cum ob alias multas causas, tum ex anginis fiunt, & his qui ephemerum sumplerunt, lac gargarizare conducit. Idem potum magnopere prodest alimentum non sentientibus, & siccioribus, ac qui ægrè uires recolligunt. Cōmodum est & ad oculorū fluxiones acres, & ad oculos suffragillatos. Quin & se insecus palpebris impositū lippientium, ubi dormire uolent, cum rosaceo & oui candido, inflammationes ipsorum concoquit. Eodē modo utimur & ubi sedis ulcera mitigare uolumus, propter acres serosos humores ac inflammationes dolore affecta, similiterq; ad pudendorū ulcera, & in summa ad omnia lenimento opus habentia, ob inflammationē, aut mordacitatē, aut ulceris malignitatē. Quapropter & cancerosis adhibet ulceribus in medicamenta dolorem eximentia ammixtū, qualia maximè sunt quæ ex pompholyge fiunt. In uersum igitur mitigatoriū est lac, leuem naturā habens, atq; multo magis, ubi serosi humoris maior pars per cocturam, aut aliam artem fuerit consumpta.

De modo, tempore, ac mensura utendi lactis.

Cap. XCIII.

Omnis qui lac bibere uolet, à reliquis cibis ac potibus abstineat, donec concoctum sit ac secesserit: si enim ante eius cōcoctionē, alium cibū quis sumat, necessarium est & ipsum lac corrumpi, simulq; corrumpi & cibū qui superingestus est. Præstat autem mane bibere recens mulctū, & tunc plures labores detrahare, quiete ac sensim ambulare, & interim cessare citra somni admissionē. Qui enim hoc modo se gesserit, potū lac excernet, idq; inutilia secū educet. Opus est enim si quid aliud,

aliud, primū acceptū secedere, quo facto aliud bibere, principio igit̃ secedit aluo cōmodē purgans, non totā corporis molē, sed quæ in aluo & intestinis sunt partibusq̃ vicinis. Post hæc iam in uenas defertur optimeq̃ nutrit, & non amplius secedit, sed uentrem sistit. Mensurā sumendi definire omnibus, impossibile est, quemadmodū in alijs quoq̃ edulij, satis est igitur quantū faciliē quisq̃ ferat, Cæterum ad mordaces humores & maxime infartos, cū modico melle bibere conducit, nam sic & utilius & magis exterforiū est, & citius aluo secedit, ammiscenda est & sapa & uinū dulce. Ita enim cōmodius stomacho euadit, Quod si salem accipiat, magis etiam aluo secedit, sed iniucundius existit.

Quibus lac noceat.

Cap. XCIII

Lac quod plurimū seri habet, periculo maxime uacat, etiā si quis semper ipso utatur, quod uero modicū serosi humoris, non parū autem caseosæ crassitudinis habet, non securi usus omnibus est, qui frequenter id sumūt. Rhenes enim lædit qui apti sunt ad calculorū generationē, obturationes quoq̃ & affectiones circa hepar efficit, in his qui promptē affici possunt. Eiusmodi sunt quibus angusti siænes sunt uasorum transluentiu alimentum ex sima hepatis parte in gibbosam. Sed neq̃ capiti cōmodum est, nisi quis ipsum ualdē ualidū habeat. Quemadmodum neq̃ præcordijs quæ faciliē inflantur plerisq̃, omnibus enim in uentre inflatur, ut paucissimi sint qui non hoc perpetiant. Assiduus quoq̃ eius usus dentes lædit, unā cum circumscisa carne gingiuarū. Hanc enim humore flaccidā efficit, dentes uero putredini & erosioni obnoxios facit, id quod crassiori lacti maxime inest. Nam asininum lac propterea quod ualdē tenue existit, non solum nō lædit dentes, sed etiam ipsis cōmodat, propter uim extergendi. Oportet itaq̃ ab esu lactis, uino mulso aqua diluto dentes colluere: ita enim omne caseosum dentibus ac gingiuis infartū extergetur. Cæterū qui caput non faciliē læsioni expositu habent, cōmodius est uino mulso meraco citra aquæ mixturā os colluere.

De lactis coctura.

Cap. XCV

Si quis præcocto lacte serum consumpserit, omnino uentrem non subducit, dant autem hoc ipsum his quibus uenter ac intestina ab acribus superfluitatibus mordentur, & qui ieiunū intestinū biliosis fluxionibus infestati habent, & dysentericis. Modus præparandi duplex: Aut enim diutius cocto lacte serum insumitur, aut silicib. iniectis, sed quod per silices iniectos sit, crassius præparat, & propterea uiciosius euadit cum alijs, tum quod cinis ex ignitis lapidibus lacti commiscetur. Habet autem tale lac aliquid commoditatis in putredinosis ulceribus, quare his exhibere oportet lac per silices præparatum, reliquis coctum. Coctura fit ad ignem assidue agitando ne dirimatur, & si quid ollæ labro adhæserit, etiam id spongia munda auferre oportet. Nam sæpe hoc ipsum lacti ammixtum totum corrumpit. Porro per silices sic præparatur. Lac præcoquitur donec plurima humiditas consumatur, deinde lapides silices igniti in lac mittunt, quot omnino suffecerint ad serum consumendum. Nec minus, imò magis idem efficiunt laminæ ferri ignitæ lacti immerse. Est enim ferrum adstrictoriæ facultatis particeps, & proinde plures cylindros ferreos parauit, qui uerum ad finem additum habent, ut hac quasi ansa faciliē quis ferrum ignitum tollere queat panniculis detentum, uelut in cauterijs facere solemus. Lactamen hoc modo præparatum faciliē in uentre casei figuram accipit. quapropter securius est aquā affundere, quemadmodum Medici non pauci faciunt, ubi serum primum consumptum est, rursus aquam puram affundentes: non enim humiditatem seri fugiūt, sed acrimoniam per quam uentrem subducit.

h 2

De sero

De sero lactis, Ex Galeno.

Cap. xcvi

Serum lactis extersoriā uelut uim habens, subducendi uentris gratia assumitur, tum in potu, tum per clysterem immissum. Nam acrimoniam intestinorum citra mordacitatē abluīt & extergit. Potest & pro aqua cōmodissimē assumi ad ulcera acri sanie infestata eluenda. Quin & medicamenta discussoria ad sugillata liuoresq; ac nigredines, ex corpore melius eluunt per serum quā per aquā. Sic quoq; eodem ad contusa suffusa ac liuefacta utimur, cōmodis ad hęc pharacis ipsū ammiscētes. Serum autem sic pręparare oportet. Lac in ollam funditur, sed non ouillum neq; furillum, utrunq; enim ineptū est ad serum detrahendum, coquiturq; igne concitatore, & assidue ac æqualiter mouetur, & ubi efferbuerit, a motu cessat, & ubi adhuc amplius efferbuerit, aqua frigida in promptu sit in profundiore quodam uasculo sita, in quam olla in qua lac coquitur immittitur: statim enim sedatur. Sedato autem seruire, rursus coquitur, & ubi efferuescit, acetum mulsū aut aqua mulsā bis aut ter irroratur, quo facto caseus statim a sero disparatur, serum itaque mox per panniculum excolatur. Vbi igitur crassas & pituitosas superfluitates abundare suspicatus fueris, acetum mulsū irrorabis, ubi acres & biliosas, aquam mulsam. Quin & immisso in ollam, postquam lac bis aut ter efferbuerit, uase frigidissimā aquā habente, fissuram ac secretionem facimus. Utendum est sero ad debiles & cibos auersantes. Oportet autem sero quod primum bibitur salem ammiscere, ubi uero purgare coeperit citra salem dato, atq; hoc per interualla quædam facito, donec satis æger purgatus fuerit. Copiam iuxta uires expendere oportet, neq; tamen magnopere deliqueris etiā si quid amplius prębueris. In summa autem copia sit seri potus herminarum quinq;. Et modus quidē parandi seri talis est. Cares autē sic pręparat. Cnici semen contundunt, eoq; lac coagulant, & ualidū serum efficiunt. Deinde excolant, & salē aut aquā marinā addunt rursusq; coquūt ac exhibent. Fortiter itaq; hoc purgat, sed omnīū iucundissimē bibitur. Omnino autē longæ cocturæ medicatius serum efficiunt. Et his quidē qui fortī euacuatione indigent, thymi drachmas tres aut quatuor unā cum sero dabis in prima potione, si uero adhuc amplius purgare uelis, epithymi tusi ac cribrati drachmas tres dabis. Vitare tamen medicamenta oportet in quibus non magnū est id quod molestat. Ceterū simplicius pręparato sero uti oportet in corporibus mollibus, & in quibus euacuare & eluere solum ea quæ in uentre ac intestinis hærent uolumus, & in quibus intestinū exulceratur a quibuscunq; uulgaribus purgatorijs medicamentis, & in quibus bilis pura uentrem infestat in quibus inanes uentrem ad egerendū stimulat cupiditates, & in quibus periculum est renes aut uescicam aut uterum exulcerari, & in macilentis ac tenuibus, purgatione tamē egentib. Maximē omnium autem sero uti oportet in his qui imbecillum stomachum habēt, & tamen purgatione indigent. His omnibus exhibendum est serum, neque sale, neque alio quopiam medicato ammixto. Sed & puero, & mulieri, & seni, hoc serum citra omne periculum exhibetur, & in caniculæ aestibus intrepidē datur, quamquam tunc temporis alia medicamenta suspecta sint. At uero fortiori sero uti quis potest, & ad corpora & ad uitia uehementioribus medicamentis egentia. Præsertim ad inueteratas papulas, & uaros liuidos & uiriatos sub cute humores, uelut lepras & similia. Item ad ulcera uetera & efferata, & ad ulceræ capitis manantia, ac similia. Ad oculos quoque assidua fluxione uexatos, & ad scabiem palpebrarum, & maculas solares in facie, potest & quis eo in longis febrium circuitibus uti, & in quibus periculum ut ex morbis in aquam
inter

inter cutem delabantur, Atque hæc quidem de sero sufficiunt.

De his quæ iucunditatis gratia cū lacte coquunt, Ex Gal. Cap. xcvi

Lac cum aliquo crassi succi edulio diutius coctū, flatuositate deponit, & magis nutrit, & alui fluxionibus, & tenuibus ex capite in pectus destillationib, conuenit, sed & in hoc considerandū est, ne clām nobis alia quēdā uiscera lædat. Quorundā enim natura ab hoc abhorret, & aliās periculo eiusmodi edulia nō uacant. Nam & iecur obturant, & calculos in rhenibus generāt. Quæ autē cum lacte coquantur hæc sunt: Amylū, similago, alica, tragus, oryza, lagana, placentaq; & panes quidā, neq; probē assati, neq; probē preparati, neq; fermenti, neq; salis participes.

De lacte acido. Ex Galeno.

Cap. xcvi

Lac acidū oxygala appellatū, dentes quidē nō lēdit qui naturali modo habent. Qui uero frigidiores aut debiliores sunt, uelut ab alijs frigidis, sic etiā ab hoc læduntur. Aliquādo autē & dentū stupor inde oboritur. Et uenter quidē frigidus, non probē concoquit lac acidū, qui uero moderatē habet, agrē quidē sed tamen concoquit. Qui uero calidiores æquo sunt uentres, supra hoc quod nihil læduntur, etiā cōmodi nonnihil ex eiusmodi eduljjs percipiunt. Atq; tales uentres etiā per niuē circumdatā perfrigeratū oxygala citra molestiā ferunt, nisi pectus frigidū fuerit, aut caput aut alia particula. Neq; enim calidā & acrē feri qualitātē oxygala habet, neq; pinguem & calidam butyri. Sed solum in ipso reliquum est caseosum, unde frigidum est & crassi succi, & crudos humores generat, & in frigidioribus uentriculis etiā calculos in rhenibus gignit.

De primario lacte.

Cap. xcix

Primariū lac appellatur quod statim à partu multum est, id calido cinere modicē calfactū, citra coagulum statim coagulatur. Veteres Pyriaton hoc uocabāt, alij pyriephthon, comeditur hoc ipsum cum melle. Melle enim non addito, ægrius concoquitur, & crassioris succi est, & tardius transit.

De lacte concreto. Ex Galeno.

Cap. c

Quidā lac etiā concretū exhibent, per coagulū uidelicet coactū, & sero ablato, melleq; addito. Quidā uero etiā feri plurimā partem absorbent, & cōtingit sanē his uentrem magis aut minus subducī, pro absorpti feroli humoris quantitate.

De caseo. Galeni.

Cap. ci

Casei omnes mali sunt, excepto oxygalactino qui ex acido lacte fit: nullū enim laudare possum, omnes agrē concoquunt, acidū ructum generant, & flatu uentrem implent, improbē aluo secedunt, pituitā & æstum uentri inducentes. Nam in præparatione ab immisso coagulo acrimoniā assumunt, & omnem humorē deponūt, præsertim inueterati, qui & acriores fiunt, & seipsis calidiores & æstuosiores, sitimq; amplius inducentes, & ægrius concoctiles, & peioris succi euadūt. Quapropter illud cōmodi quod crassi succi edulia attenuantibus medicamentis ammixta attrahunt & acquirunt, neq; caseus obtinet citra detrimentū. Maius enim ex succi malitia & æstiosa humiditate damnum accedit, quā utilitas ex crassitudine attenuata emergat. Itaq; fugiendus maximē talis caseus qui penitus nihil boni in se habet. At uero recens caseus appellatus oxygalactinus, omnī optimus censendus est. Nam & in cibo iucundissimus est, & stomacho innoxius præ omnibus alijs caseis existit, minus agrē concoquit, & minus egrē transit, neq; uero ualde crassi succi est, quo crimine in cōmune omnes casei sunt infames. Inter reliquos porro caseos recēs melior uetere est, & mollis duriorē, & rarus ac laxus ualde denso & coacto, & qui præcellentē dulcedinem habet salso præstat, & qui moderatē falsus est, potior est eo qui plurimum salis, aut penitus nullum salem

h 3

accepit,

accepit, iucundus iniucundo, assatus crudo præfertur, Caseus coctus multò solior est, sunt tamen omnes mali.

Pharmacum ex caseo uetere ad callosas concretiones podagricorum, Galeni. Cap. CII

Quum arthriticus in sella ad me delatus esset, qui callosas durities in articulis haberet, statim in mentem uenit mihi ut pernā suillam ueterē salsam coquerem, eiusq; decocto caseū uetustissimū rigarē subigeremq; ac in pila probè unirē, & duritiēbus callosis imponerē, quo factō spōte rupta cute citra sectionē, quotidie callorū particule emergebāt, & quū cōmoditatē homo ille experiret, talē de cetero sibi parās caseū adseruabat, & inueterato utebat, atq; sic in eius ulu perseverabat. Quin & alios similiter affectos ex amicis suis medicamēti eius uim edocebat.

De efficacia recentis casei foris adhibiti. Galeni. Cap. CIII

Recens & humidus caseus magnopere auxiliari uidei his qui spumā argenti hauserūt, si quis ipsum in cibo accipiat. Potest & uulnera cruenta simpliciora glutinare in cataplasmate impositus, superimpositis folijs uitis, aut lactuca, aut betę. Caseus autem oxygalactinus etiā magna uulnera glutinat, nam & discussoria ui participat. De butyro, Galeni. Cap. CIIII

Butyrum ex pinguiissima lactis præsertim bubuli parte fit, concoctioria autem uim habet, modica quoq; discussoria participans. Has uires tamen in medijs inter mollitiē ac duritiē corporibus exercet. Nam ubi hæc fuerint inflammata concoquit ac faciliē discutit. Quare parotidas aurium, & bubonas inguinū abscessus, ipso solo sæpe perfectē sanauimus, puerilibus corporib; ac muliebribus affectis. Durorum enim penitus corporum tumores præter naturales butyrum discutere non ualet. Idem reiectionibus ex pulmone, in pulmonis ac lateris affectionibus magnificē confert cum melle datum, easq; concoquit. Si itaq; solum delinatur per se, magis concoquit, minus educit. Si uero unā cum melle & amygdalis amaris, magis sursum educit, minus concoquit.

De coagulo, Galeni. Cap. CV

Coagulū omne acrē & attenuatoriā uim discussoriāq; & siccatoriā habet. Optimū coagulum est leporinum, dissoluit omne coagulum cum aptis ad hanc rem medicamentis potum, sanguinē in uentre in grumos concretū. Cætera quę de coagulo à multis prodita sunt, superuacaneum adscribere existimo.

De felle, Galeni. Cap. CVI

Humorē qui in uesica bilis susceptrice coaceruatur, nunc fel ac bilem nomino, non quam atram, sed quam flauam appellant. Et est sanē humor hic omnium animalis humorū calidissimus. Differentiæ sunt in ipso plurimæ, tum iuxta naturā animalium tum iuxta uictum. Nam pallidior colore bilis moderatē calida est, subalbida uero in quantum colorem exolutū habet, tantò caliditate inferior est. Flaua autem tantò calidior quā pallida est, quanto crassior & flauior existit. Etenim flaua fit ex pallida amplius calfacta. Si uero adhuc amplius superincalescat, ad atriores colorem transmutatur, qui aliquando æruginosus fit, aliquando cæruleus, interdum etiam ad isatidis colorem transit. Itaq; & tu colorem bilis expendes, ubi pharmacum præparas in quod fel recipitur. Fit & bilis differentia circa corpus utentium ipsa, prout subtili aut hebetē sensu præditum est. Et suillū quidem fel omnium aquosissimū est, & propterea debilissimū, exceptis agrestibus. Utuntur autē felle suis domesticę ad ulcera aurium, non cōtemnendo pharmacum, quo & tu uti poteris, si non aliud cōpositum adfuerit. Fel ouillum paulò acrius suillo est, atq; eo adhuc magis caprinū. Consimile huic est ursinum & bubulum.

bulum, Taurorum his fortius est, sed inferius hyenarum felle. Callyonimi piscis & scorpij marini ac testudinis fel hoc etiam superant. Est & uolucrum animalium fel omne acrius ac siccius quam in quadrupedibus. Ex uolucris gallinarum ac perdicum fel in usum medicum praestat. Accipitrum & aquilarum fel multum acre est & corrosiuum. Has itaque ubi noueris fellis differentias, sciuerisque quae affectiones magis, quae minus liccatione opus habent, uix contingere potest ut circa curationem aberres.

De Sudore.

Cap. CVII

De sudoribus aliqui superuacanea conscripserunt, quae per aliam materiam parabiliorem fieri possunt. Ammifcetur autem sudor eorum qui in palaestris exercentur, substrato pulueri, atque hoc paton graeci uocant. Estque pharmacum discusforium, itaque inflammatis mammis auxilium efficacius est solus is patos impositus. Si uero aridior est, cyprino aut eo non praesente, rosaceo emollire ipsum. Hoc pharmaci illitum lac in uberibus redundans extinguit. Et ego sane aliquando ipso in inguinum abscessu usus sum, & breui tumorem sedatum uidi.

De Vrinis.

Cap. CVIII

Vrina hominis fere omnium aliarum debilissima est, excepta suilla porcorum domesticorum castratorum. Vim habet extergendi hominis urina, si quod aliud urinae genus, quod satis indicant fullones. Vnde & medici ad scabies ac lepras adhibent, ulceraque multa humiditate fordeatque ac spurcicia plena, ea perfundunt, idque multo magis si quid putredinosum habuerint. Manantia item capitis ulcera & porriginem eadem fouentes curant. Nos autem abominati sumus talia facere, quum alia pharmaca sint ad manum. Ceterum ulcera in digitis pedum praefertim ex offensione, ubi non fuerint inflammata, etiam ego saepe urina curavi, & sane iter facientibus ac peregre proficiscentibus linamentum urina tinctum in ulcus imposui, deinde forinfecus linamentum circumdedi, & quoties me ire uellent, urinam ad digitum demittere praeci, & non soluere priusquam exaete curati essent. Permissi & ruri degentibus non praesente medico ulcera urina perfundere, ubi in partibus infernis essent a pectore usque ad summos pedes. At uero bibere urinam, in difficili spiratione quae erecta ceruice contingit, quemadmodum aliqui prodiderunt, non est necesse, quum sint plurima alia pharmaca, quae huic malo opitulantur. Et sane quidam etiam pota urina ab affectu non conualuit.

De Saliva.

Cap. CIX

Salivae vires diuersas esse nosse oportet, tum iuxta animalium species, tum prout singula ex his sana sunt aut morbida, prout comederunt aut ieiunia sunt, potaruntque aut non potauerunt. quemadmodum enim urinae & fel & sudores, sic & salivae, debiles quidem sunt eorum quae cibum & potum sumpserunt, fortes autem & actus eorum qui sitim nimiam itemque famem tolerarunt. Medium locum occupant eorum quae probe quidem concoxerunt, nondum autem cibum aut potum ingesserunt. Hac itaque saliva postremum relata, nutrices infantium imperigines curant, madefacto ex ea paruo digito, deinde loco perfrictio, atque hoc assidue faciunt. Sed & triticum quidam rurales manducant, & furunculis imponunt, qui sic ex salivae uiribus discutiuntur & cito concoquuntur. At uero iuxta omnem suam substantiam saliva siue sputum hominis reptilium uenenatorum generi maxime contraria est. Ego enim citra omnem incantationem, ex solo ieiuni sputo, scorpium pereuntem uidi.

De stercore.

Cap. CX

Stercus summam discutiendi uim habet. Humanum ob foetorem abominamur. Verum boum, caprarū, ac canum, ubi ossa comederint, neq̃ foetidum est, & magna experientia commendatum non nobis solum, sed multis ueteribus medicis existit. Ego itaq̃ mirandam uim humani itemq̃ canini stercoreis experimento cognoui.

De stercore canino.

Cap. CXI

Dicendum autem primū de canino stercore, quo frequenter quidam ex praceptoribus nostris utebatur, dabat autem cani ossa tantum biduo comedere, tertia die excretum stercus accipiebat siccabat ac reponebat, & usus tempore terebat. Utebatur autem ad anginas alijs huic malo commodis pharmacis id ammiscendo. Dysentericis idem aridum tritum in lac per silices coctum inspergebat, & praebebat multos ita fallens. Hos itaq̃ duos canini stercoreis usus multa experientia, uelut mirabilis medicamenti, didicerat. Sed & in malignissimis ulceribus parum de eo stercore addebat in pharmaca aliās ad eiusmodi ulcera cōmoda, & palām fortius seipso redditum pharmacum uidebatur. Quin & si quid discuti ac siccari opus esset, etiam illis medicamenti ammiscibat.

De stercore humano.

Cap. CXII

Stercoris humani eiusmodi experimentum habeo. Quidam faucibus assidue inflammatis uehementer uexabatur, ut periculum suffocationis ipsi immineret. & sanē uenam secare propter periculum cogeatur. Huic quidam obuīam factus promisit se pharmacum daturum experimento constans, & uocari se iubebat ante uenae sectionem, si rursus fauces essent inflammatae. Itaq̃ accersitus, & illito pharmaco quodam, celeriter hominem sanauit. Erat autem pharmacū stercus pueri aridum, quod cum melle Attico illinebat. Nutriebat autem puerum cuius stercus accepturus erat, uelut idem ille medicus docebat, lupinorum esu, eorum uidelicet qui in frequenti cibi usu sunt, cum optimo pane. Dabat & uinum bibendum uetus. Omnia haec moderata mole, ut probē cōcoquere puer posset. Tertia die excretum pueri stercus sumebat, siccabat, ac utebatur uelut de canino stercore praedictum est.

De stercore lupino.

Cap. CXIII

Lupinum stercus quidam colicis bibendum dabat, non solum in exacerbationibus, sed etiam in interuallis, si quidem citra inflammationem affecti erant. uidiq̃ quosdam non amplius morbo hoc correptos, & correptos etiam non ita fortiter afflictos, neq̃ frequenter. Sumebat autem & ille albius luporum stercus, quod ab ossium esu excreuerant. Sumebat autem non quod in terram cecidisset, nam in fruticibus ac floridis herbis hoc stercus saepe reperitur. Miratus sum porro de ipso, quod etiam adalligatum saepe prodesset. Inuenitur & in ipso quid ex ossibus deuorati animalis quod manducationē effugit, itemq̃ concoctionem, quod ipsum etiam tundens ac conterens colicis bibendum dabat, sale & piper aut tale quippiam ammiscens odoris commendandi gratia. Dabat autem cum uino substantia tenui, aliquādo cum aqua. Quod uero lumbis aegri ex stercore adalligaretur, id ligamentum habere iubebat ex lana agni à lupo descripti, aut si id haberi nō posset, ex corio ceruino, & sanē tum lorum quod lumbis circumdaretur, tum id in quo stercus inuolueretur, ac contineretur ex eo parare iubebat. Nos autem in ollulam argenteam stercoreis lupini fabae magnitudinem inieciimus, & quibusdam experimenti gratia appendimus, & ammirati sumus quum uideremus manifestam opem inde eos consequi.

De

De stercore caprino.

Cap. CXIII

Stercoris caprini usus frequentissimus est, acrem & discussoriam uim habet, induratis tumoribus conuenit, non lienis tantum, sed aliarum partium. Itaque ego in genuum tumore inueterato & agrè solubili, ipso usus sum ex posca, cataplasmate parato ex ordeacea farina stercorem ammixto & qui curabatur homo mirificè sanatus est, erat autè ruralis. Nam mollibus corporibus pharmacum acrius est. Equidemustum tenuiorum partium redditur, quare ad alopecias committitur, & omnia quæ extergentibus indigent medicamentis, uelut lepras, impetigines, & similia. Quin & cataplasmatibus ad parotidas & inguinum abscessus ammixtum, discussorium existit, medicus certè quidem ruralis ipso ad uiperarum morsus, multoque magis aliarum bestiarum utebatur cum aceto, & ualde multos seruauit. Idem ille etiam eiusdem stercore pilulas ictericis ex uino bibendas dabat, & ad muliebrem fluxum cum thure apponebat.

De stercore bubulo.

Cap. CXV

Bouum stercore exigua habent inter se pro pabuli ratione differentiam. Nam & ipsa siccandi uim habent, possident & attractoriam. Medicus quidam rei medicamentariæ expertus hydropicos stercore bubulo oblitos ad solem exponebat, & multis opitulatus est. Accipiebat autem humidum adhuc uere quum boues herbam depascunt, & exsiccatum reponebat. Utebatur eodem & ad strumas, & ad omnes induratos tumores cum cataplasmatibus modo imponebat.

De stercore ouillo.

Cap. CXVI

Idem medicus & ouillo stercore utebatur ad uerrucas, & specialiter myrmecias appellatas, thymos item uocatos, & clauos, aceto autem id diluebat. Sed & ambustorum ulcera ad cicatricem eodem perducebat, rosaceo cerato ammixto.

De stercore columbino.

Cap. CXVII

Columbarum foris uictum querentium stercore, uelut calfactorio pharmaco, ego ipse sæpe ad multa utor cum nasturtij semine, quod leuissimè tritum pro sinapi admisceo, in ueteribus affectionibus rubificatione opus habentibus, qualis est, coxendicum morbus, hemicrania, cephalæa, uertigo, & inueterati dolores iuxta spurias costas, aut scapulas, aut tendines, aut lumbos. Item rhenum, pedum & articularum, ubi callosæ concretiones nondum fuerint coactæ.

De gallinaceo stercore.

Cap. CXVIII

Gallarum stercore usus sum etiam ipse, ad eos quibus strangulationis periculum ex esu fungorum imminabat, inspergebam autem ipsum tritum cyathis tribus aut quatuor poscæ aut aceti mulsi, & breui conspicuam opem senserunt. Paulò post enim pituitosum crassissimum humorem euomebant, à quo perfectè suffocationis accidens conqueuit. Medicus qui me hoc remedij docebat, etiam inueterato colico dolori id ipsum stercore ex uino mulso dabat. Quidam & in angina bibendum præbent, est autè gallinaceum stercore debilius columbino, sed & hoc ex gallinis in agris uictum querentibus, & non inclusis, accipere oportet.

De stercore anseris, accipitris, ciconiæ, & terrestrii crocod. Cap. CXIX
Stercus anseris, accipitris, ciconiarum, & reliquorum de quibus quidam delirantes scripserunt, ipso experimento cognitum est inutile esse. terrestrii uero crocodilorum etiam agrè parabilis est.

Sordes ouium ex qua oesypus.

Cap. CXX

Sordes quæ ouium lanis innutritur, ex qua oesypum fit, concoctoriam uim si militer ut butyrum habet, & parum quid de discussoria. Oesypus uelut Dioscorides tradit sic præparatur: Sumito lanas sordidas ex alis ouium tortas, crispas, & molles, & calida aqua eluito, omni sordibus ipsarum expressa, deinde ipsam loturam

in

in craterem amplioris mittito, & alia feruente aqua affusa conturbato, ita ut poculo uel alio simili uase haurias, & ex alto uiolenter illidas donec spumescat. Deinde aquam marinam, uel si illa non praesente, irrorato, & desidere finito, atque ubi perfrigeratum fuerit id quod superstat cochula tollito, & in aliud uas mittito. & affusa modica frigida aqua manibus subigito. Deinde diffusa aqua, aliam calidam affundito, & similiter ut prius conturbato, & aquam maris uel frigidam irrorato, & desidere finito, atque ubi perfrigeratum fuerit, rursus id quod superstat cochula tollito, & similiter manibus subigito. Rursusque tertio calidam aquam affundito, & idem uelut praedictum est facito, donec candidus & pinguis oesypus reddatur, & nihil impurum habeat, atque ita fictili inditum ad dies aliquot in solem exponito ac aduersato. Sed & omnia praedicta ad solem aestium facito. Sic enim commodior reddetur, & albus, nihilque duri ac contorti habens. Quemadmodum qui cerato, aut adipe adulteratur. Facit ad ulcera sedis & uuluarum cum meliloto ac butyro, item ad plurima alia. Oesypusustus fuliginem ex se reddit commodissimam ad erosos ac scabros oculorum angulos, & ad palpebras callosas & pilorum defluuio laborantes. Vritur autem in testa noua, donec in cinerem reductus omnem pinguitudinem depofuerit. Testa ipsa carbonibus imponitur, deinde exustum colligitur, teritur, & ad praedictos usus adhibetur.

De carnibus, ex Galeno.

Cap. cxxi

Non omnes animalium carnes hominem alunt, sed aliquae etiam sunt lethales. Quaedam uero non solum ut cibus, sed etiam ut auxiliare medicamen assumuntur. Et ex his quae alunt non omnes eandem uim habent. Omnium quidem igitur eduliorum caro suilla maxime alit, boni succi est, & melius omnibus concoquitur, cum aliis, tum ob similitudinem ad homines. Carnes bubulae non modicum & ipsae alimentum praebent, neque facile transpirans, sanguinem tamen crassiorem quam conuenit generant, & si quis natura atrabiliarium habuerit temperamentum, affectu quopiam melancholico corripitur, ex frequenti bubulae carnis esu. Tales affectus sunt, cancer, elephas, impetigo, scabies, febris quartana, & quae priuatim uocatur melancholia. Sed & lien quibusdam ex eius succo intumuit, unde deprauatus corporis habitus & hydropilis saepe insequitur. Siccioris enim & multo calidioris temperamenti est bos quam porcus. Ceterum uitulorum carnes concoctu faciliores habent quam perfecti boues, sunt enim temperamenti humidioris. Sic etiam hœdi capris praestant. Et capra quidem minus sicco temperamento praedita est quam bos, sed homini ac sui comparata multum euariet. Humidissimam autem & pituitosam carnem agni habent, uerum ouilla caro magis superfluitatibus redundat & prioris succi est. Mali succi est caprina, cum acrimonia, hircina autem pessima est & ad boni succi generationem, & ad concoctionem. Deinceps est Arietina, deinde taurina. In omnibus autem his castratorum melior est. Vetusorum pessima est concoctu, succo & alimento. Quare & fures quamuis humidum temperamentum habeant, senescentes fibrosam, & duram ac aridam, & propterea aegre concoctilem carnem habent. Leporina quoque caro crassiorem sanguinem generat, sed melioris succi quam bubula aut ouilla. Mali succi est & ceruina, duraque ac aegre concoctilis. At uero asinorum syluestrium caro: Nam & hanc quidam comedunt, uelut domesticorum asinorum in Alexandria: crassissimi succi est & aegerrime concoquitur, & stomacho incommodat. Insuperque esu iniucunda est, quemadmodum etiam equina & camelina, nam & horum animalium carne, tum animam, tum corpus, asinini ac camelini homines uescuntur. Quidam etiam ursinas carnes edunt, & quae his adhuc deteriores sunt.

sunt, leoninas ac pantherinas. Quid uero attinet dicere de canibus, quorum castulos pingues, plerique homines edunt? Horum omnium animalium carnes siccissimae natura sunt, & acre alimentum corpori apponunt. Et pro modo praeparationum etiam magis aut minus nutriunt, & magis aut minus concoquuntur. Nam quae assatae aut in sartagine frictae comeduntur, siccius alimentum corpori sufficiunt. Quae coctae, humidius. Quae uero conditae sumuntur, medium inter utraque locum obtinent. Sed & harum ipsarum non parua differentia est iuxta conditurae modum. Quapropter ubi siccicare corpus uoles, sicciorum temperatura animalium carnem dabis, ubi calfacere, calidiorum, frigidiorum item & humectiorum similiter conuenienti proportionem exhibebis.

De extremis terrestrium animalium partibus. Cap. CXXII

Hac itaque in summa de terrestrium animalium carne dixisse satis est. Verum de alijs partibus consequenter quam uim habeant discere. Extremas partes appetant in familiari usu homines, rostra, pedes, & aures, nam haec minime pinguedinem habent, minime item carnosam naturam, praedominatur autem in his nervosa & coriacea species. Suntque haec partes multo motu magis exercitatae, & propterea etiam uiscosiores. Merito itaque paucius nutrimentum corpori praebent, & ob uiscositatem facilius aluo secedunt. Praestant autem pedes suilli rostro, quemadmodum hoc auribus. Lingua laxioris & exanguioris carnis substantiam habet. Venter uero adhuc laxior & exanguior est quam lingua, & propterea etiam friabilior, & concoctu facilius, citra adiacentium intestinorum ammixtionem.

De glandulis. Cap. CXXIII

Omnes glandulae hoc commune habent, quod iucundae & tenerae edentibus appareant. Mammarum uero glandulae quum lac habuerint, etiam illius dulcedinis nobis quid representant, maxime in suis. Alimentum ex ipsis probe concoctis, ad carnium naturam propere accedit. Si uero defectuose concoquantur, crudum siue pituitosum humorem generant, & humidae quidem glandulae pituitosum, sicciae crudum producent.

De testibus. Cap. CXXIII

Ex glandulosis corporibus sunt etiam testes. Suilli itaque & ouilli & hircini comesti aegre concoquuntur & malum succum gignunt, propter uirositatem quae in ipsis existit. Quanto autem suilla caro alijs melior est, tanto testes probe concocti magis alunt. De caetero soli gallorum testes per omnia optimi & iucundissimi sunt, & bonum alimentum corpori sufficiunt, praesertim saginatorum.

De rhenibus. Cap. CXXV

Rhenes palam est mali succi esse, ac aegre concoqui, quando etiam in gustu urinae qualitatem nobis representant.

De cerebro. Cap. CXXVI

Pituitosius edulium cerebrum est, crassiusque succi ac tardi transitus, & aegre concoquitur, maxime uero stomacho incommodum est omne cerebrum. Quidam autem mollicie eius decepti infirmis ipsum exhibent, quum sit praeter alia etiam nauosum. itaque potius ubi uomere aliquem uolueris ab accepto cibo, cerebrum ipsi pinguius conditum postremum exhibebis. Verum uitabis ne cibum auersantibus praebas. A uero cum calefacientibus ac incisuius medicamentis praeparatum, melius seipso euadit.

De terrestrium animalium uisceribus. Cap. CXXVII

Iecur omnium animalium crassi succi est, difficilis concoctionis, ac tardi transitus, praestat ex ipsis non solum ad uoluptatem, sed ad alia quoque porcinum, eosum uidelicet porcorum qui sicibus aridis sunt saginati, quod iecur propterea

gracis

græcis fycotum, hoc est ficatū appellatur. Lien mali succi esse creditur, ut qui atrabiliarium sanguinem generet. Pulmo utroq; facilius concoquitur, quanto etiam rarior est. Verum multo minus quam iecur alit. Alimentum igitur quod corpori inde accedit pituitosius est, propter cartilagineum asperę arteriæ corpus in ipso situm. At uero cor ægrè concoquitur ac tardi transitus est, si uero concoquatur probè, alimentum non modicum neq; mali succi corpori exhibet.

De aluo, intestinis, ac utero terrestrium animalium. Cap. cxxviii

Aluus & uterus & intestina, in terrestribus animalibus, duriora carnibus sunt, propterea etiam si probè concoquantur, non exquisitum & inculpatum, sed frigidiorum ac crudiorum sanguinem gignunt.

De syluestrium animalium carne.

Cap. cxxix

Omniū animalium per montes ac syluas uictum quærentium caro durior est, & paucissimæ pinguitudinis particeps, quapropter alimentum minus excrementitium ex ipsis quàm ex domesticis animalibus corpori accedit.

De uolucrum animalium carne.

Cap. cxxx

Omne uolucrum animantium genus minus alimenti corpori suppeditat, si terrestribus, & maxime suis comparatur, facilius tamen concoctum uolucrum caro est, maxime perdicis, & attagenæ, columbæ, gallinæq; ac galli. Verum turdorum, & merularum, & paruorū passerulorum, item eorum qui in turribus degunt, durior est, atq; his adhuc amplius turturis, & palumbi, & anatis. Galli namq; carni similis est phasianorum, quantum ad concoctionem & alimentum attinet, sed iucunditate cibi præcellit. His durior est & ægrè concoctilis magis ac fibrosior pauonis. In commune autem in omnibus uolucris animantibus, uelut etiam in quadrupedibus, id nosse oportet: Quod caro crescentium adhuc multo melior est quàm decrecentium. In uigore consistentium medium locum obtinet. Mala item est caro uetustorum, & infantium adhuc siue paruulorum, nam hæc mucosa, & humida & excrementis redundans est, & facile aluo secedit. Vetustorum autem dura, & sicca & neruosa est, & propterea concoctioni resistit. Atq; huius memineris in uniuersum de omnibus animalibus. Neq; uero parua differentia est eorum quæ in stagnis, aut paludibus siue palustribus locis degunt, ad ea quæ per montes ac siccos locos uictum quærun. Etenim iuxta locorum proportionem, carnes animalium aut sicca, & superfluitatibus carentes, & concoctæ faciles, aut contra humidæ & superfluo excremento refertæ & ægrè concoctiles redduntur.

De anseribus & struthocamelis.

Cap. cxxxi

Harum caro excrementitia est, & difficilior concoquitur quàm prædictarum uolucrum, non tamen alas prædictis priores habent.

De gruibus.

Cap. cxxxii

Gruum caro tota dura est & fibrosa, alæ uero adhuc carne ipsarum duriores existunt.

De partium uolucrum animalium differentia. Cap. cxxxiii

Viscera in auiibus eandem proportionem habent ad carnes, quam in pedestribus habere dictum est. Intestina uero omnium ferme ad esum inepta sunt. Ventres uero efiles sunt & bene nutriunt. Quidam ipsorum etiam in cibo iucundi sunt, uelut anserinus, deinde gallinaceus. Aliqui falsò collaudant struthocame li uentriculum, uelut pharmacum concoctorium. Alij multo magis prædicant præferuntq; huic mergi uentrem. Verum neq; ipsi facile concoquuntur, neque aliorum ciborum concoctionem uelut pharmacum adiuuant. Alæ in iuuentibus ac pinguibus uolucris optimæ, in macilentis contra ac uetustis pessimæ existunt.

existunt. Testes optimi gallorum praesertim saginatorum, atque adhuc magis eorum qui ex seroso lacte cibos sumunt. Sunt enim boni succi, probeque nutriunt, ac facile concoquuntur. Ceterum alui excretionem neque proritant, neque inhibent. Cerebrum porro in uolucrum genere longe praestantius est quam in pedibus, quanto sane etiam siccus est, praesertim auicularum montanarum.

De ouis.

Cap. CXXIII

Oua gallinarum & phasianorum meliora sunt, deteriora anserum & struthionum camelorum. Optima ad corporis alimoniam sunt tremula appellata. Sorbilia minus nutriunt, sed facilius aluo secedunt, leuigant autem faucium asperitudines ex clamore, aut humoris acrimonia obortas, nam affectus partibus oblinuntur & adherent uelut cataplasma quoddam, & substantiae totius lenitate asperitatem curant. Eadem ratione etiam stomachi ac uentris & uesicae asperitates sanant.

Ouum in aceto coctum & comestum, uentris fluxiones resiccat, quod si ammiscueris ipsi quid ex medicamentis ad dysenteriam uel coeliacam affectionem commodis, deinde ad prunas in sartagine frixeris, & in cibo praebueris, non parum aegris opitulaberis. Commoda ad hanc rem medicamenta sunt, uuae acerbæ succus, & rhus inspersus, & cinis cochlearum integrè ustarum, uinacea quoque uuarum, & myrti baccæ, ac similia. Oua cocta aegre concoquuntur, tardi transitus sunt, & alimentum crassum corpori praebent. His autem adhuc magis tardi transitus sunt, crassiorisque succi, in calido cinere assata, Fricata pessimum ad omnia alimentum praebent, nam in concoctione in nidorem transeunt, & crassum humorem gignunt uitiosumque ac excrementicium, coctis & assatis meliora sunt quæ densata, uel ut alij malunt, suffocata appellantur, cum oleo & garo, & uino modico subacta, & in duplici uase ad moderatè densam compagem cocta. Quæ enim amplius spissantur, coctis & assatis similia euadunt. Idem facere oportet & in ouis quæ patinis infunduntur, nam dum adhuc succulenta sunt patinam ab igne tolles.

Quorum uis medicamentaria.

Cap. CXXXV

In coeliacis ac dysentericis affectionibus, ouum prædicto modo datum, commodum pharmaceuticum existit. Candidum & tenue in recentibus ouis leuissimum, & omnis mordacitatis expers medicamentum est, non solum oculis adhibitum, sed etiam alijs omnibus partibus leuibus pharmacis indigentibus, uelut sunt sedis & pudendorum ulcera, omniaque maligna, si ad ea quæ citra mordacitatem ficcare illa solent ammisceat, qualis est pompholyx, & similia. Vitellus eandem facultatem habet, & propterea lenibus ceratis additur, ouis præcoctis aut assatis. Quanto autem sicciora fiunt, tantum de leniendi ui perdunt. Testæ ouorum ustaræ medicamentum sanguinem sistens euadunt.

De alimento ex animalibus aquaticis.

Cap. CXXXVI

Animalium in aqua degentium & genera multa, & species differentiaque plurimæ existunt. Hoc loco referuntur, uelut in superioribus fecimus, ea saltem quæ ad usum medicum & ad sanitatem conseruandam assumuntur. In uniuersum igitur illud scire oportet, quod optima caro est piscium in puro mari degentium, magisque ubi locus is uentorum procellis agitur, & neque terrea, neque leuia litorea aquam ambiant, sed arenosa aut aspera & lapidea. Si uero etiam ad aquilonares uentos loci conuersi sint multo melius est, manifestum est autem mare mari præstare, in eo quod aliud perfectè purum est, aliud magnos & multos fluctus excipit. Nam pisces qui in eiusmodi mari degunt, quanto meliores sunt palustribus, tanto deteriores sunt his qui purum mare incolunt, nam & si qui in protecto & tranquillo mari degunt, peiorem carnem habent. At uero in stagnanti

i mari

mari uiuentium piscium caro, medium inter fluuiatiles & marinos locum obtinet. Recrementicia uerè & multum mucosa est caro eorum qui in limosa ac fordidâ aqua degunt, hac adhuc deterior est caro in stagnis degentium. Si uero & parua sint stagna, neq; magnos fluuios suscipiant, neque fontes habeant neque effluxum largum, multo sanè deteriores piscium carnes sunt. Si uero in totum nihil aquæ defluat, sed stagnum perpetuò stans sit, omnino deterrimæ. ceterum in paludibus & cœnosis locis degentium extreme uitiosa caro est. Porro ex fluuiatilibus meliores sunt, qui eiusmodi flumina incolunt, quorum uelox est & multus fluxus, nam stagnantium fluminum pisces carnem habent cōcoctu difficilem, & bonum alimentum quàm paucissimum habent. pessimi autem sunt qui in ostijs fluminum degunt, quæ sterquilinâ, aut balineas, aut culinas, & uersitium ac linteorum sordes expurgant, & si quæ alia sunt retrimenta urbis quam præterlabuntur, & quæ in ipsa flumina expurgantur, maximè si populosa urbs existat. Ceterum & iuxta nutrimentum pisces meliores & deteriores fiunt. Quidam enim herba & optimis radicibus abundant, & propterea meliores sunt. Quidam & limosam herbam & radices mali succi edunt, & aliqui in fluminibus magnam urbem præterlabentibus degentes, stercora hominum & quosdam consimiles cibos uorant, atq; hi omnium pessimi, uelut dixi, existunt. & si paulò ampliori tempore mortui permanserint, euestigio computrescunt, ac pessimè olent. Suntq; hi omnes esu iniucundi, & ægrè concoquuntur, & bonum alimentum paucissimum habent, sed non modicam recrementitiâ superfluitatem, & uitiosum succum in corporibus eorum coaceruant qui ipsi quotidie uescuntur.

De cephalo siue mugilæ.

Cap. cxxxvii

Cephalus maximè omnium piscium utrisque aquis utitur, fluuiatilibus & marinis. Qui igitur in mari uersatur, paruas & multas spinas nō habet, iucundiorq; est, & pinguitudine carens ipsius caro. Verum in fluminibus degentes cephalis, spinis repleti sunt, & pinguem saporem habent, esuq; & concoctu deteriores sunt, stomacho incommoant, mali succi & uirosi existunt. At uero sale inueteratus cephalus melior seipso euadit.

De Lupo.

Cap. cxxxviii

Lupus ex pelagiorum piscium numero est, hoc est eorū qui in profundo mari degunt, huius itaq; caro, uelut reliquorum pelagiorum piscium, tenuiorem sanguinem generat. Si uero ad flumina ascendat, cephalo similis euadit.

De trigla siue mulo.

Cap. cxxxix

Ex pelagijs piscibus est & Mulus. Aestinationem apud homines reperit, tanquam excellenter iucundus in cibo sit, habet autem duriorem omnibus pelagijs generis carnem, non pinguem, & friabilem, & propterea magis quàm alij pisces nutrit, ubi probè concoquatur. Quidam iecur eius & caput, uoluptatis gratia magnificiunt. At uero muli qui carcinadas: animalcula sunt hæc, ualde minutis cancris similia, colore fulua, uorant, foetidi sunt, & iniucundi, ægreq; concoctiles ac mali succi. Cognoscuntur hi ex odore & sapore, sed & quis uentrem ipsorum discerpat, carcinadas in ipso inueniet. Quod si quis in frequenti mulorum marinorum esu perseveret, hebetudinem uisus incurrer.

De piscibus petrosi.

Cap. cxl

Petrosos & saxatiles appellant pisces, degentes ubi petrae sunt & littora saxosa. In hoc genere optimus censetur uoluptatis gratia scarus, deinde merula &

& turdi, & postea iulides, phucæq; ac perca. Alimentum ex his non modo concoctu facile est, sed & saluberrimum, sanguinem generans cōpage mediocrem.

De Gobio.

Cap. CCLI

Gobius littoralis piscis est, semper parvus manens, sicut etiam alij plures, optimus est & ad uoluptatem & concoctionem, distributionemq; in corpus ac humoris boni generationem, qui circa arenosa ac petrosa littora capitur. Qui uero in fluuiorum ostijs, aut stagnis degit, neq; similiter iucundus est, neq; boni succi, neq; concoctu facilis. Si uero aqua uitiosa sit, etiam in ipsa pessimus gobius euadit. Si iure albo decoctus sit donec flaccidus fiat, ius ipsius potum aluum subducit. Assatus citra salem comestus, promptitudinem egerendi inanem sanat.

De piscibus mollis carnis.

Cap. CXLII

Ex piscium mollis carnis numero sunt, aselli muræq; buglossæ ac passeris, & ex his aliqui in fluminibus & stagnis degūt, aliqui in mari. Et propterea aliquando iocundi, & probe nutriendi reperiuntur, aliquando uitiosi & mali succi.

De piscibus duræ carnis.

Cap. CXLIII

Ex duræ carnis piscibus sunt dracones, cuculi, scorpij, orphi, glauci, congridi, pagri, amæ, & parui thunni ac pelarnides, ægrius concoquuntur quàm pisces mollis carnis, & crassum humorem generant, & propterea fortiore uentre indigent ad concoctionem.

De piscibus testa intectis.

Cap. CXLIII

Buccina & purpura & reliqua ostrea ac chama, ostracoderma, hoc est, testa intecta appellantur, his omnibus commune est, falsum saporem & qui uentrem nostrum molliat, in propria carne habere. Verum in unoquoque genere magis aut minus talis actio inest. Nam ostrea siue concha inter alia mollissimam carnem habent & magis uentrem subducūt, & quidam ipsa citra cocturam edunt. At uero parua chama, & purpura, buccinaq; ac murices & similia, duram & ægrius cōcoctilem carnem habent, & minus quàm illa uentrē subeunt. Quem admodum autem ægrè concoctilem carnem habent ostracoderma duræ carnis, hic etiam ægrè corruptilem habent. Quapropter exhiberi ipsa solent saepe his qui ex humorum prauitate cibum in uentre corrumpunt, coquunt autem ipsa, & aqua iterum atque iterum diffusa, donec falsa qualitas deponatur. Sic præparata etiam uentrem sistunt. Si uero coquas & primam aquam diffundas, deinde sale aut magis garo condias, & ius bibendum præbeas, alius bibentis multum subducetur.

De crustatis siue molli testa intectis.

Cap. CXLV

Gammari, paguri, cancri, locustæ, & squillæ, & quæcunq; alia crusta intecta, tenuem quidem habent ambientem testam, uerum duram, minus superiobus falsum saporem habent, habent tamen, eumq; non modicum. Omnia autem carnis duræ sunt, ægrè concoquuntur, & multi alimenti, præcocta uidelicet. Horum caro uelut etiam ostreorum uentrem sistit, ubi præcocta falsum humorem in aquam deposuerit. Sed & hæc ægrè corruptilem carnem habent, similiter ut duræ carnis ostracoderma.

De piscibus mollibus.

Cap. CXLVI

Molles appellantur pisces, neq; squamas habentes, neq; cutem asperam aut testaceā, sed mollem. Suntq; tales polypi, sepia, loligines, & qui his similes sunt. Habent autem carnem duram, ægrè concoquuntur, & falsum humorem modicum in se continent. Si tamen concoquantur, alimentum non modicum corpori præbent, Plurimum autem crudum humorem hi ipsi gignunt.

i 2 De

De piscibus chartilagineis.

Cap. CXLVII

Asperam & nocte splendidam cutem hoc genus piscium habet. quapropter aliqui à grecis selachia appellata uolūt, quod selas, hoc est, splendorem emittant. Mollem in se carnem habent torpedo & pastinaca, aluo moderatè subeunt, & non ægrè concoquuntur, & moderatè quoq; alunt.

De Echinis marinis.

Cap. CXLVIII

Echinos siue herinaceos marinos, quidam ex uino mulso præsumunt & garo, subducendi uentris gratia, sed & patinas ex ipsis præparant. Referuntur autem inter edulia modici alimenti, & quæ mediam facultatem inter spissantia & attenuantia humores habent.

De Salsamentis omnium animalium, pedestrium, uolucrum, & aquaticorum.

Cap. CXLIX

Non modica differentia salsarum carniū est, prout quædam ex ipsis saliantur. Nam adeo immutantur, ut saepe animalis temperamento humidi caro salita longè siccior euadat, quàm caro animalis natura sicci non salita. Aptæ itaq; ad salsuram sunt animalium corpora, quæ duras simulq; superfluitate redundantes carnes habent. Quæ uero aut ualde mollem, aut ualde durum, aut siccum & superfluitatū expertem corporis habitum habent, ad salsuram ineptæ sunt. Quem admodum enim sicca corpora salita corijs similia euadunt, sic ualde humida dissoluantur, & salis familiaritate colliquescunt. Itaq; manifestum est, quod dura & neruosa, & uelut pelliculosa ac coriacea omnia, salita ægrè concoquuntur, quæ uero ad salsuram idonea sunt, tenuium partium fiunt, & comesta crassos ac glutinosos humores attenuant, Cæterum uetera salsamenta omnia uitiosa sunt.

De garo.

Cap. CL

Garum uim habet multum calidam & siccam, Et propterea quidam medici usi sunt ipso ad putredinosa ulcera. Quin & dysentericis & ischiadicis per clysterem infundunt.

De muria.

Cap. CLI

Muria salsorum piscium, similiter ut garum, putredinosis ulceribus conuenit, & ad ischiadas ac dysenterias per clysterem infusum. Acrimonia enim sua humores coxendicem infestantes attrahit, & per intestina euacuat. In dysentericis autem putredinosa ulcera abluunt & siccant. Maximè uero filurorum salitorum & manularum muria ad talia medici usi sunt, & nos ad putredinosa oris ulcera adhibuimus. At uero oliuarum colymbadum muria frequenter in dysentericis utimur. præmittimusq; eam hora una antea quàm crustifica infusa immittamus, ad ulcera uidelicet præmundanda.

De adipe pinguedineq; ac seuo.

Cap. CLII

Omnis pinguedinis uis est humana corpora humectandi ac calfaciendi. Verum singulæ inter se differunt, prout magis aut minus eas uires habent. Differt pinguedo à seuo crassitudine. Quapropter animalia tota natura magis terrea, seuum habent, uelut humectiora pinguedinem. Et propterea adeps siue pinguedo facile liquefit ab igne, non facile autem congelatur. Seuum contrà non liquefit facile, & liquefactum celerrimè congelatur, & multo durius adipe apparet. Humidissima omnium ferme animalium pinguedo est suilla, magis molliens ac concoquens oleo, quare cataplasmatibus inflammationum ammiscetur. Cæterum his qui in recto intestino aut colo morsum percipiunt, item in dysentericis & egerendi cupiditate inani, caprinū seuum magis iniicimus, non quod acrimoniam obtundat, sed quod congelatur ob crassiciem. Nam suillus adeps defluit uelut oleū. At uero anserinus adeps suillo quidem calidior est, & ualde tenuium

tenuum partium, & propterea infundimus ipsum his qui in alto corporum morsum sentiunt. Nam partium tenuitate tota corpora penetrat, & omnibus mordentibus serosis humoribus ammiscetur, & mordacitatem hebetat. Medium inter suillum & anserinum locum obtinet gallinaceum ac gallorum. Porro taurorum seuum multo calidius & siccus est pinguedine suilla. Vitulinum inferius taurino est caliditate & siccitate. Similiter hoedinum inferius est caprino ac hircino. Rursus hircinum inferius est leonino. Maxime enim discussorium est leoninum, & tenuissimarum partium ferme praeter omnium quadrupedum seuo, unde tumoribus inueteratis induratis, & contractis articulis adhibitum, ualidissimam uim discutiendi habet. Taurinum medium locum obtinet inter suillum ac leoninum, & propterea utriusque medicamentorum generi miscetur, tum his quae induratis medentur, tum quae inflammata concoquunt, quale est tetrapharmacum & Regium appellatum. Quidam uiperarum adipem in principio suffusionum conuenire tradunt. Verum ursinum alopecij prodesse uerescriferunt. Quidam piscium pinguedinem collaudant ad suffusiones & aurium dolores, aiuntque omnium piscium adipem ad hec pollere. Omnis adeps ueterascens calidior ac tenuiorum partium euadit, & ob id etiam magis discussorius, id quod omnibus ueterascentibus contingit, quae non putredo praecipuarit. Summa autem huius sermonis in commune haec est, cuius meminisse oportet. Nempe iuxta animalium temperaturam, semper differentias adipis ac seui in ipsis fieri. Item iuxta differentiam generis. Nam masculum semper siccus & calidus est foeminino, mas autem castratus similis est foeminae. Ita etiam omne iuuenile animal foeminae assimilatur. Sic autem & syluestrae calidius est & siccus domesticus.

De medulla.

Cap. CLIII

Omnis medulla uim dura & indurata corpora emolliendi habet, siue musculi, siue tendines, siue ligamenta, siue uiscera, hoc modo sint affecta. Optimam autem semper expertus sum esse ceruinam, deinde uitulinam, taurorum & hircorum acrior est magisque siccatoria, & propterea duricias in scirrhum induratas dissoluere nequit. Caterum methodum reliquarum differentiarum, ex his quae de adipe relata sunt, coniectare potes.

De pulmone.

Cap. CLIIII

Pulmo agninus & porcinus usti ac triti impositi, attritus calciamentorum sanant. Vulpis pulmo siccatus & tritus paulatim potus, anhelosos sanare creditur.

De capitibus.

Cap. CLV

Capita mænularum salutarum urebat quidam, utebaturque ad rimas sedis, & putrescentes gingiuas, & ad gurgulionem induratum. Vis ipsorum siccatoria est non ualde acris, alius quidam caput integrum leporis urebat, & utebatur ad alopecias cum adipe ursino. Viperarum capita usta in olla ad cinerem, deinde trita cum decocto lupinorum amarorum crassissimo, & temporibus illita, fluxum oculorum diuturnum sistunt. Cinis ipsorum per se leuissime tritus, & ut aridum collyrium adhibitus, hebetem uisum magnopere corrigit.

De cornibus.

Cap. CLVI

Cornibus cerui ac caprae usti saepe usi sumus ad illustrandos dentes, gingiuas quoque flaccidas adstringunt. Aiunt cerui cornu si post usturam lauetur, dysenteriam ac sanguinis sputum, & coeliacas affectiones sanare. Ictericis quoque utiliter praebetur. Datur omnibus duorum cochleariorum mensura. Vstum & lotum collyrijs ocularibus ad fluxiones oculorum destinatis ammiscetur. Est autem horum

horum collyriorū uis siccatoria. Capræ cornu ad pruritus facere aiunt, itemq̃ ad scabiem ulcera, affricum. De unguibus. Cap. CLVII

Quidam ungues caprarum urunt, deinde cinerem aceto subigunt, & alopecij illinunt. Sunt aut̃ attenuatoriæ facultatis. Alij suum unguem urunt, & cinerem colicis in potu præbent. Aliqui asinorum ungulas uistas, comitalem morbum sanare aiunt, si assidue bibantur. Eisdem oleo subactas, strumas discutere. Cinerem quoq̃ earundem cum muliebri lacte probe tritum, & in collyria redactum, oculorum cicatrices detergere, si cum lacte item illinatur.

De impetigine in pedibus equorum. Cap. CLVIII

Impetiginem equorum aceto tritam ac potam, comitalem morbum curare aiunt. Aliqui & ad omnis reptilis bestię morsum eadem uti iubent.

De lanis succidis, & puris & uistis. Cap. CLIX

Lanæ sordidæ ac succidæ appellatæ, utiliter adhibentur ad contusas aut quomodo cunq̃ percussas partes, fomentis excipiendis aptæ, quanquam nō desit & ipsis sua utilitas, ob fordium efficaciam. Quomodo aut̃ ex his cœlypum parare oporteat, iam dictum est in hoc sermone secundo, ubi de ouium sorde tractauimus. Lanæ lotæ ad suscipiendas fomentorū humiditates materia apta existit. Eadem uistæ uim habent acrem & calidam, cum quadam partium tenuitate, ut etiam humectas in ulceribus carnes celerrimè confument. Conijciuntur & in pharmaca siccatoria. Vruntur in fictile nouū missæ, operculo addito multa foramina habente.

De pilis uistis. Cap. CLX

Pili uisti consimilem lanis uistis, calfactoriam ac siccatoriam uim habent.

De ossibus uistis. Cap. CLXI

Ossa uista omnia discussoriam & siccatoriam uim habent. Quidam tamen de hominum ossibus id maximè prædicant. Talum utiq̃ suillum uistum, deinde potum, inflationes ac tormina sanare prodiderūt. Et noui sanè ego quendam nostrorum hominū, qui ossa uista potanda dabat, ignorantibus bibentibus quid potarent, ne abominarentur, atq̃ sic in multis & morbum comitalem ac articulare curabat.

De pellibus & corijs. Cap. CLXII

Pellis ouilla recens exoriata, flagris cæsis circumdata, manifestè auxiliatur præ omnibus alijs auxilijs, ut in una die ac nocte ipsos curet, concoquit enim & discutit subcruenta. Hyænæ pellem quidam domi repositam adseruant, & usu expetente ipsam à rabioso cane commorsis circumdant. Nam proprietate quadam prohibet ne commorsus in aquæ timorem delabatur, sed & iam illapsis auxiliatur. Coria uetera maximè solearum uista, cinere ipsorum trito insperso, attritus calceamentorū nō inflammatos sanant. Nam inflammatos exacerbant.

De uentriculo mergi. Cap. CLXIII

Mergi uentrem torrefactum & sali modico ammixtum, crudis bonam cōcoctionem facere tradunt.

De uulpibus. Cap. CLXIII

Quidam uulpes uiuas in oleo coquunt, eoq̃ articulares morbos sanant. Solia enim oleo calido replent, atq̃ sic arthriticos totos insidere faciunt, & diutius immorari iubent. Maximè autem discussorium fit hoc oleum, ut ad superficiem trahat in alto corporum contenta, isthicq̃ dolores facientia, aut ob substantiæ crassitudinem, aut ob frigiditatem, aut uehementem acrimoniam, aut ob flatuosum spiritū egressum non habentem. Ex hoc enim non solum tumores in articulis ipsorum, sed etiam totū corpus repletionē affectū euacuari cōtingit, & propterea maxima utilitas inde cōsequitur, nimirum quā causæ in articulis contentæ discutiantur, & nihil amplius affectis partibus influat, toto corpore à superfluitatibus

tatibus liberato. At uero si quis improba diæta utatur, affectio redire solet, non tamen ita uehementer uelut antea. Nam & antea quum illæsum ab eo affectu esset corpus, uitiosa diæta malum id induxit. Idem facit & hyæna tota oleo uelut uulpes cocta.

De araneorum telis.

Cap. CLXV

Araneorum telis quidam scripserunt ulcera in superficie ab inflammatione adseruare.

De ranis.

Cap. CLXVI

Ranæ palustres coctæ, & modico sale ac oleo modico conditæ, magnâ medicinam afferunt à reptilibus uenenatis cômorsis, si ius ipsum in potu sumatur. Aliud. Rana in oleo cocta, & oleo pro fomêto admoto, diuturni tendinû dolores sedantur. Idê oleû articularê morbû mitigat, & duritias emollit. Ranæ usta cinis membranę cerebri fauciatæ, aut uenæ raptæ inspersus, sanguinis eruptionem sistit.

De mustela.

Cap. CLXVII

Mustelam arefactâ & potâ, morbum sacrû curare aiunt. Si tota uiua uratur in olla, cinis eius strumas sanat cum melle, aut terebinthina, aut butyro impositus.

De terræ intestinis.

Cap. CLXVIII

Terræ intestina trita & neruis dissectis imposita, euestigiò mirabiliter auxiliatur, omnê quocq; ferri aut lapidis aut alterius rei plagam glutinant, præsertim in neruosis & agrè glutinum admittentibus partibus, aut naribus, aut auribus, & similibus. Oportet autem ea leuigare cum terra in qua reperiuntur, si non acrem aut fâsam habeat qualitâtê. Terræ intestina pota numero quinque aut septem, cum passo urinam cient, & omne genus lumbricorû eiſciunt eodem modo pota, aut quocunq; uelis. Verû latum lumbricû expellunt cum aceto mulso pota. Sed & morbum regium egrè curabilê per urinas expurgant, similiter cum passo septem numero pota, aut etiâ per se, & cum myrrha troglodytide magnitudinis ciceris. Vtere cõfidenter. At uero in rosaceo cocta, aurium dolores sanant, oleo calido infuso. Oportet autê terrę intestinorû drachmas VI, esse, & rosaceli libram unam. Dentium quocq; dolores idem oleum sedat, propinquo dolenti denti auri calidum instillatum. Eadem super prunas suffusa dentium dolores sedant, agro per infundibulum fumum suscipiente ad dolentê dentem. Molares quocq; quos tollere oportet, citra forcipem tollunt usta trita, circum dolentê dentem inspersa, prius tamen dentê exactè circûscarificare cõuenit. Cinis eorundem in testa exustorum leuissimè tritus, & ut collyrium aridum admotus, incipientibus suffusio nibus magnificè opitulatur. Auxilia: ur idem palbebris in pilos eluxuriantibus, præeulsis antea superfluis pilis, deinde insperso cinere in loca ipsorû per specillum. Prohibet enim pilorû præter naturâ regenerationê. Septê autê terræ intestinalis trita, ex uino mulso ad plures dies pota, calculos in uelica cõfringunt, & paulatim emingere faciunt. Rumpunt & internos abscessus, & ad excretionê. deducunt septê aut nouê pota pro uiribus, trita in aque cyathis tribus. Si uero quis ipsa trita in melle reposita asseruet optimû auxiliû ad percussos à scorpio habebit. Neruorum nodos quos ganglia uocamus, eadê per se trita in cataplasmate imposita dissoluit. Itê mammarû abscessus per se cataplasmatibus uice imposita: suppurant enim attrahuntq; & rumpunt, & ad cicatricê perducunt. Profunt & erysipelatis usta trita cum aceto illitæ. Podagrarû inflamationes soluunt trita cum melle, ad cerati crassitudinê, locis illita & tertia die soluta, locis rosaceo antea sublitis. Sed & rosaceo cerato trita excepta, optimè pedû dolores mitigant. Ceterû in capite nō sinunt leucas, uirilgines albas altius insidentes nasci, si fuerint cõsuetis medicamentis præ-

adstricta, & pili postea ex ipsis tritis cum urina pueri illinantur. Oportet autē in testa prius exurere ipsa, & sic in urinā uti. Dato & hydropicis septem cum uino mulso, uerum exulceratę uesicę aut rhenibus, septem item dato trita cum sapa diluta. Strumas porrō paulatim minuit, uira locis adalligata tot numero in panniculum illigata, quot strumę existunt. Sedant omnē capitis dolorē & hemicrania tria temporibus illita. Subterranea autem sunt hęc terreę intestina, prodeuntia igitur & ad solem conspicua, tempestates ac pluuias significant.

De dracone marino.

Cap. CLXIX

Draconis marini squamas urito, & tenerrimē tritum cinerem sublimito, & turbatos ac hebetes oculos sanabis, item eos quibus animalcula uelut culices, prę oculis uolitare uidentur.

De uipera.

Cap. CLXX

Viperę caro comesta palam calfacit ac siccatur, oportet autē capite & cauda amputatis ipsam excoriare, & omnia interanea eximere, aquaę triplici carnē eluere, deinde in aqua uelut anguillā coquere, addito marrubio, & anetho modico, paucoq; oleo, atq; ubi iam cocta fuerit, moderato sale condire, & edenda, prębere, itemq; ius absorbendū. Quod autem uiperę carnes sic comestę purgent per cutem totum corpus, ex his cognoscere licet, quę quum adhuc iuuenis essem expertus sum. Homo quidā elephantiasi correptus abominabilis erat & graueolens, Itaq; casa prope uicū extructa in ipsa degebat. Metebant autē in uicino messorum quibus uinum in amphora apportabatur. Vbi ergo tempus bibendi adesset, messorum uinum in craterē effundebant, atq; sic mortuā uipera simul excidebat. Itaq; plenum humanitatis opus se facturos rati, uinum agrotanti elephantia co largiuntur: melius enim esse iudicabant ipsum mori, quā talem uiuere uitam. Verum is epoto uino mirabili modo sanatus est. Etenim uniuerso eius tumescens cuticula, uelut ostreorū testorium decedebat, & quantū eius reliqui fieret, satis molle apparebat, uelut in locustis ac cancris uidere est, ubi testā exuerūt. Quin & in alijs plurimis consimiliter accidisse, ueteres memorię prodiderūt. Et nos multos ex uiperis curatos uidimus, unde etiam theriacę ipsas miscemus.

De herinaceo marino.

Cap. CLXXI

Herinaceus marinus comestus superiori uentriculo conducit, & cibos auersantibus, appetentiam excitat. Urinam laxat idem uesicam expurgans, unaq; alium leniter emollit.

De herinaceo terrestri.

Cap. CLXXII

Herinacei terrestris caro siccata & paulatim pota, elephantiasis auxiliat, & uitiato corporis habitu pręditis, cōuulsisq; ac nephreticis, insuperq; aqua subtercutem laborantibus; habet enim uim discussoria ac siccatoria. Sed & iecur ipsius sole siccātū ac potum, elephantiasis opitulat. Ceterū utriusq; herinacei terrestris ac marini ustorū cinis exterforius est ac discussorius, & carnē cōsumit. Quapropter & ulcerū superexcrecentē carnē demolit ac cōpescit, et sordida ulcera expurgat. Verū herinacei terrestris usti cinis pice liquida exceptus alopecias sanat. Eiusdē cinis potus cū uino mulso calculosos rhenes sanat, & aquā intercutē. Bibis cineris cochlearij dimidij mensura. Omnē urinę difficultatē ex quacūq; causa obortam, soluit herinaceus, si intestina ac interanea ipsius suffiant, egro undiquaq; cooperto: celerrimē enim sic malū soluit. Ad hanc rē interanea inueterata esse oportet, & sicca asseruata: quibus nō pręsentib, caro aut pellis sicca suffiendā est. Multā urinā cient interanea sicca trita pota, quantū tribus digitis apprehendi potest, ex uino. Eiusdē caput uistū, & cum adipe ursino illitū, non modō alopecias perficit

perfanat, sed etiam pilos ex cicatricibus producit. Corium autem ustum itidem cum adipe, maxime urfino illitum, similiter alopecias sanat. Totus porro terrestris herinaceus uiuus in oleo ad mollem ac lentum ignem coctus diutiusculè, oleum ex ipso coxendicum dolores ueteres, illitu sanare facit. Fit ex ipso & pilosthrum pilis denudandis hoc modo. Herinaceū uiuum in ollam densissimū operculum habentē, & duodecim sextarios capientē mitto, & ad ipsum olei sextarios sex tantum affundito, & ollæ osculū diligenter gypso oblinito, ut nullatenus transpirare possit, deinde ad dies XL, ad solē sub caniculæ aestibus exponito. Postea apertā tudicula noua diligenter agitato, & mox excolato per panniculū, utitōr. Illinatur ex eo locus in sole, & diu confricetur donec exsudent, postea aqua dulci affusa proluet. Cauendū autem ne alios locos cōtingat, quos depilare nolis.

De Hippocampis marinis.

Cap. CLXXIII

Hippocampi marini & aslati comesti, & morfui impositi, à cane rabioso comorfos sanant. Verum cum aceto mulso & melle ipsos conterere oportet.

De cantharidibus.

Cap. CLXXIII

Cantharidum magnificum experimentum habemus ad scabros ungues. Extrahunt enim ipsos cōmodis medicamentis ammixtē. Miscentur autem alijs erodentibus compositionibus, & excoriatorijs leproforum. Quidam ex præceptoribus nostris in pharmacum urinam ciens parum de cantharidibus addebat, reiectis alijs ac pedibus. Ad hos usus commodiores sunt, uelut ego expertus sum, quæ in tritico reperiuntur, & uirgulas transuersales melini coloris in alis habent. Magis autem adhuc idoneæ sient, si uiuas ipsas in uas fictile mittas. Deinde osculo uasis rarum linteolum obducas, deinde acetum in olla feruefacias, & uas cantharidū inuersum supra ollam detineas, ita ut uaporem ab aceto elatum, per linteolum cantharides excipiant, donec emoriantur.

De cancris fluuiatilibus.

Cap. CLXXV

Cancros fluuiatiles crudos tritos & lacti mixtos in potu præbe, & omnis reptilis morsum curabis, & præsertim scorpij plagæ medeberis. & cum qui potolepore marino iam perit, statim restitues. Manifestum autem est, quod internam eius carnem cum lacte terere oporteat. Similiter exhibitū auxiliantur etiam phthisicis contabescentibus. Itemq; iure albo cocti & comesti, absorpto insuper iuscullo. Ceterum cinis cremati cancri similiter ut alia uista siccant. Verum quadātius substantiæ proprietate, ad rabiosi canis morsum efficax est, tum solus, tum multò amplius gentiana & thure additis, ita ut sit thuris pars una, gentianæ quinque, cineris cancrorum partes decem. Vsi sumus autem uistis aliquando quidem alio modo, serè tamen quomodo præceptor noster utebatur. Patinam habebat is ex ære rubro, in quam uiuos cancros missos urebat, lignis uitis maxime subiectis, donec ad cinerem redigerentur, ut commodè teri possent. Atque sic habebat semper præparatum domi suæ pharmacū. Vrebat autem ipsos cancros mense Augusto sub caniculæ aestibus luna decima octaua. Ex eo uero quotiā die à rabido cane commorſis dabat usque ad quadragesimum diem cochlearium satīs amplum in aquam inspergens. Si autem non à principio, sed post aliquot dies à morſu commorſi curam suscipiebat, bina cochlearia quotidie dabat, ut quadraginta dierum exhibitio expleretur. Vtebatur uero & ad uulnus ipsum medicamento ex brutia pice, in quod recipiebat picis libram I, aceti acerrimi sextarium I, opopanacis quadrantem. Porro cinere cancri fluuiatilis uisti melle addito, plantas pedum à frigore ruptas, & digitorum rimas sanabis. Eodem etiam maligna & cancerosa ulcera curabis.

De carac

De carabo siue locusta.

Cap. CLXXVI

Locustæ testam ustam ac tritam cum meraco bibendam dato, & alui inferum fluxum compelles. Expurgat eadem & calculosos rhenes, multam arenosam urinam deducens.

De testibus castoris.

Cap. CLXXVII

Castoris testes castorium appellant, celebrè & multi usus medicamentum, hic in uniuersum uim eius referemus, ad quam si quis respiciat, particulares usus sibi ipsi exquirere poterit. Calfacit itaque & siccatur, estq; multum tenuium partium medicamentum, siue quis humido corpori adhibeat egente siccatione, siue frigiditate indigo caliditatis, siue his qui ex repletione conuelliuntur, ubi ea quæ præter naturam in neruis continentur euacuare oportet, magnam quidem utilitatem ex se ostendit, & nulli parti ullum aliquod detrimentum affricat, præsertim si homo non uehementi aliqua febre laboret. Eadem ratione & tremulis ob crassum ac uiscosorum humorum multitudinem, commodissimum est potum, utile est & singultui, ex humorum frigidorum ac uiscosorum copia osculo uentris, infarta oborto. Si uero ex siccitate, aut immodica euacuatione, aut acrium humorum mordacitate, singultus aut conuulsio oriantur, castorij usum uelut infestissimum fugere oportet. Sed & febrientibus non adeo calida febris, sed ut ita dixerim tepida, uelut in altiore sopore, ac lethargo fieri solet, ualde multis castorium exhibuimus cum pipere, utriusq; cochliarium ex aqua mulsa, & nemo ex ipsis ulla parte læsus est. At uero in lethargicis ac alti soporis febribus, castorium rosaceo dilutum capiti imposuimus ac ceruici. Ad suppressos autem menses ob copiam ac crassitatem sanguinis, sanguine à talo moderatè detracto, cochliarium castorij cum pulegio aut calamintha exhibui, cognouiq; medicamentum ipsum purgationem menstruam ciere. Eijcit & secundas detentas, & morantes, similiter cum aqua mulsa potum. Inflatos uentres & torminosos propter crassum ac flatuosum spiritum conclusum, ex posca potum sanat. Datur & orthopnoicis recta ceruice spirantibus, cum aceto mulso aut posca. Sufficit & in carbonibus, hianter ægro & uaporem excipiente.

De canis fluuiatilis testibus.

Cap. CLXXVIII

Canis fluuiatilis testes ad eadem commodi ad quæ castoris testiculi existunt, sunt tamen debiliores, eiusdem canis pellis ad calceamentum redacta, pedum ac neruorum morbum egregiè mitigat.

De canis terrestris catulo.

Cap. CLXXIX

Catulus canis terrestris probè saginatus iuxta ægrum acceliuatus, siue stomacho, siue alia interna parte ægrotet, morbum eximit ac sanat, affectu in ipsum transeunte. Aiunt eundem mortuum diligenter sepeliri oportere.

De cygni pullo.

Cap. CLXXX

Cygni pullus tener in oleo coctus, neruis affectis præter omnem opinionem medetur.

De buccinorum testis uistis.

Cap. CLXXXI

Buccinorum testis uistis uim multum siccatoriā habent, unde commodis medicamentis ammixta inflammatione in duritias discutit. Consimile uim habet purpurarum ac ostreorum testæ.

De galerita uolucris.

Cap. CLXXXII

Corydalus Græcis appellatur, & Latinis galerita, uolucris animal paruū, quod sæpe iuxta uias uidemus. id simpliciter iure coctum ac comestum colicis prodest. Oportet autem assidue & frequenter id edere, unā cum iure. Nam utilitatem ex ipso sæpe expertus sum. Habet autem eminentiam quandam in capite uelut cristam, ex primis sponte naturæ productam.

De co

De cochlea terrestri.

Cap. CLXXXIII

Cochlea terrestris duram carnem habet, & propterea comesta ægrè concoquitur. Verū iusculum ipsius coctæ ex aqua & anetho, oleoq; ac garo, alio secedit si poterit. Si uero prima & secunda aqua in qua coquitur diffusa, in tertia coxaris donec exactè flaccescat, & in fluxione uentris exhibebis, uentrem sistet. At uero cochlearū humiditas sola per se citra carnem accepta, uocant autē eam ipsam cochleæ mucum, & thuri ammixta, aut aloæ, aut myrrhæ, aut aliquibus ex his, aut omnibus, donec cerati crassitudinem habeat, pharmacum euadit glutinatoriū, & submucosis aurium tumores probè siccant. Glutinat item ac siccant oculorū fluxiones fronti impositū. Quum itaq; multum eius mucī colligere uoles, carnem ipsarum stilo perforato, non modicam enim humiditatē emittunt, præsertim si non ante multos dies captæ fuerint. Hæc autē humiditas palpebrarū pilos reglutinat. Ego autē aliquando in agro cuidā neruos sauciato unā cum tendinis cōtusione, carnem cochlearum imposui cum farinæ polline qui molendinis adhaeret tritam, & citra inflammationē uulnus glutinatū est. Erat autē homo duræ carnis. Quod si ad manum sint, præstat ammiscere in talibus myrrham aut thus aut resinam frictam leuissimè tritam. Caterum caro ipsa in pila prius contusa, deinde trita & imposita, omnes partes superfluam humiditatē habentes siccant, ut etiā hydropicis prodest. Sed & unā cum testis suis tritæ cochleæ uentri uniuerso hydropicorum imponuntur, & super articulorum tumores in arthriticis, & appositio quidem ipsarum difficulter auferri potest, uerum multum siccant, & sanè si nendæ sunt donec sua sponte decendant. Idem facere expedit & in tumoribus ægrè solubilibus ex plaga, aut contusione factis in auribus. Nam omnes hos exactat, etiam si uiscosum & crassum in alto contineatur. Integræ porro cochleæ unā cum testis uisæ, galla omphacitide ac pipere ammixtis, magnopere profunt dysenterijs, in quibus ulcera nondum sunt putredinosa. Oportet autē esse piperis partem unam, gallæ duas, quatuor cineris cochlearū. Quæ omnia exactè leuigata ac mixta, repolita seruabis, & usu expetente cochlearij plenī mensuram obsonijs insperges, aut cum aqua calida aut uino bibendam dabis. Citra uero ullam admixtionem ipse cinis cochlearū uisæ siccandi uim habet, cui & quidam caliditatis propter uisuram inest.

De Manulis.

Cap. CLXXXIII

Manulæ salæ caput uisum, excrecentes in ulceribus carnes, maximè in dentium gingiuis, reprimunt inspersum, & callos eximit, quos clauos uocāt, & extuberrantes sedis eminentias tabefacit ac consumit.

De torpedine.

Cap. CLXXXV

Torpedo uiua apposita, diuturnum capitis dolorem depellit, & prolabantem sedem intrò pellit. Mortua uero aut omnino non, aut modicè hæc facit.

De asello marino.

Cap. CLXXXVI

Asellus marinus aqua coctus cū anetho, & modico sale conditus, oleoq; pauco, omnem interaneorū morbum sanat, maximè alui ab acribus humoribus infestatæ.

De ostreorum testis.

Cap. CLXXXVII

Ostreorū testæ omnes leuissimè tritæ & ad puluillū redactæ, ulcerib. malignis cōueniunt, & præsertim in ulcerib. corrodentib. labiorū optimū pharmacū sunt, citra mordacitatē ad cicatricē perducentes: participes enim sunt facultatis adstringentis, per quā duræ ac terrea existūt. Eam autē per uisurā amittūt. Exdē cū acetō aut posca aut uino mulso tritæ, putredinosis cōmodè fiunt, pro habitu uidelicet ægroti, conueniente humore ammixto. Quod si uratur ostreorum testis, testium

nuorum partium euadit quàm buccinorū testa. nam & minus durum est ipsarum corpus. Si uero lauetur hic cinis, cōmodus sit ad humectiora ulcera explenda & ad cicatricem perducenda. Atq; ego sanè ostreorum testa hoc modo præparata semper utor, ad cavitates ac fluxiones diurnas & agrè carnem recipientes, etiam si fistulosæ essent ac profundæ. Circūpono autem eam forinsecus cum adipe suillo uetere, & in ipsum sinum quid indo ex his quæ talia carne replere solent, quale est pellucidus lapis, specularis appellatus. Quin & dentes ostreorū testa illustrat, uelut etiam buccinorum, & purpurarū, non solum ui exterioria, sed etiam substantiæ aspritudine. Quapropter non est necesse ad hanc rem ipsas ualde leuigare, eadem lotæ ac tenuissime tritæ humore flaccida ulcera exsiccant.

De purpurarum testis.

Cap. CLXXXVIII

Purpurarum testæ cum aceto potæ lienes tumentes sanant. Suffitæ uero uteri strangulatus curant, & secundas morantes detrahunt. Vstarum cinis ad eadem facit ad quæ buccinorum adhibetur.

De squatina marina.

Cap. CLXXXIX

Squatinam marinam uistam crassioribus corporibus in balineo inspergito.

De Sepia.

Cap. CXC

Sepia suffocata in aceto, si cum oleo acetum bibendum dederis, eum qui hipocampi marini uenenum sumpsit seruabis. Testa sepiæ exterioriam & siccatoriam uim habet, estq; tenuium partium. Quapropter uista utimur ad uittilignes, maculas solares ac lentigines, & scabiem. Sed & sale ammoniaco ammixto, oculorum ungues exterit. Eadem non uista, dentes illustrat, & affricta oculorum cicatrices deterit, & ulcera in ipsis siccant. Magnas quoque palpebrarum aspretudines, sycoses Græcis dictas, consumit.

De Scinco.

Cap. CXCI

Scinci circa rhenes partes, ad lentiginem pudendorū ciendam bibuntur. Neque aliud magis contrarium huic facultati destruendæ uidetur, quàm lactucae semen ex aqua potum. Quidam etiam lenticulæ decoctum cum melle potum, lentiginem sedare tradunt.

De Tellinis.

Cap. CXCI

Tellinarum salinarum uistarum cinis cum cedria adhibitus, superfluos palpebrarum pilos renasci prohibet.

De cicada.

Cap. CXCI

Cicadis siccis quidam utuntur in colicis affectionibus, cum pari numero granorum piperis, exhibentq; aut tres, aut quinque, aut septem, tum in interuallis, tum in exacerbationibus. Alij tostas in uesicæ dolore, ac calculosis, edendas præbent.

De hyena.

Cap. CXCI

Hyena uiua in oleo cocta, uelut de uulpe dictum est, oleum discussorium efficit, arthriticis utilissimum. Vsus fiat uelut de uulpe iudicauimus.

De hirundinibus.

Cap. CXCV

Hirundinū uistarum cinis cum melle illitus, anginam sanat, & omnino omnes affectiones quæ in faucibus ac gurgulione cum tumoribus fiunt. Quidam & ad acuendum uisum cinere utuntur, collyrij sicci modo adhibentes.

De electione optimorum medicamentorum.

Cap. CXCVI

Agaricum præstat quod strias rectas habet.

Acaciam eligito fuluam & odoratam.

Aloem elige puram, non lapidosam, ualde splendidam, densam, subflauā, friabilem, hepatis colore, facile liquecentem, odoratam, amaritudinis intensæ. Nisi graues

gra uero & ualde dura reprobatur.

Amomū elige recens & albū aut subruſſum, nō coactū, ſed ſolutū & diſſuſum, ſemine, plenū, ſimili racemulis, ualde graue & odoratū, non carioſum, acre & guſtu mordax, eolore ſimplex nō uariū. Adulterāt quidā id amomide ſimili exiſtēte. Semper autē fragmēta reprobanda ſunt, electis ramis perfectis ab una radice.

Ammoniācū thymiāma eligendū eſt nō lignoſum, granis thus referens, purū, denſum, nihil ſordium habens, caſtorei odorem præ ſe ferens, guſtu amarum.

Aſpalathus bonus eſt grauis, & poſt decorticationem ſubruber aut purpurā referens, denſus, odoratus, ſaporis amari.

Abſinthium melius eſt quod in Ponto & Cappadocia naſcitur.

Bitumen optimū eſt purpurei coloris, ſplendidum, intenti ac grauis odoris.

Nigrum autem uitioſum eſt. Nam pice ammixta adulteratur.

Bdeſſium præſtat guſtu amarū, colore glutinis, pingue in altum & facilē moſſari potens, non lignoſum, non ſordidum, iucundi odoris in ſuffitu, & unguī ſimile aromatico, onychi appellato.

Elleborū nigrum eligito probē coaltum, tenuem habentē medullam, acrem guſtu ac feruidum, talis eſt qui in Helicone prouenit ac Parnaſo & Anticyra.

Elleborū album elige moderatē extenſū, & albū fragilem & ac carnoſum, non acuminatū & iunceum, aut puluerulentā lanuginem remittentē dum frangitur, quicq̃ medullā tenuē habeat, guſtu feruido non ualdē neq̃ acruatim, ſaliuā attrahentem: qui enim talis non eſt ſuffocatorius exiſtit. Primas obtinet Cyrenaicus.

Euphorbium eligo pellucidum & acre.

Viſcū optimū eſt recens, caloris praſſini intrinſecus, foris ſubſtauū, nihil aſperum aut furfuraceū habēs, colligitur ex quercu, maloq̃ ac pyro, & alijs arborib.

Gluten piſciū bonū eſt non glaucū, ſubcrallum, non ſcabrū, facile liqueſcens.

Calamus aromaticus bonus eſt ſuluus, denſis geniculis, & qui in multas ſciſſuras & ſegmenta aſſuſe frangitur, fiſtula telis aranearum repleta, ſubalbidus, in manducando uiſcoſus, adſtringens, & ſubacris.

Cardamomū optimū eſt quod ex Armenia aſſertur. Elige quod ægrē frangitur, plenum & concluſum.

Calliā elige ſuluam, boni coloris, corallium referentem, arciam ualde, longam, crallam, fiſtulis plenam, guſtu mordacem, & adſtringentem cum quodam aromatico feruore, uinum redolentem, uerum purpurea & cralla zigir appellata, roſam odore referens, ad medicum uſum maximē apta eſt.

Cera optima eſt ſubpinguis, odorata, pura, pontica.

Glutinum quod aliqui xylocallam uocant, optimū eſt Rhodianum, eſtq̃ album & pellucidum. Nigrum uero deterius eſt.

Gummi elige uermiculatū, uitriforme, pellucidum, non lignoſum, ab eo proximum eſt album, reſinoſum uero ac ſordidum inutile eſt.

Coſtus optimus eſt Arabicus, albus exiſtens ac leuis, plurimum habens & iucundum odorē, ſecundum locum obtinet Indicus denſus exiſtens ac leuis & niger uelut ferula. Tertius eſt Syriacus coloris buxei, odore nares percellens. Optimus eſt recens, albus, plenus ex toto, denſus, ſiccus, teredinem non ſentiens, guſtu mordax ac feruidus. Quidam adulterāt ipſum helenij radicem ammiſcentes, facilis eſt cognitio. Nam heleniū linguam nō ſeruefacit, neq̃ odorem intentum & nares percellentem exhibet.

Crocus optimus corycius eſt, recens ac boni coloris, parū albedinis in capreolo habens, oblongus, integer, probē coaltus, plenus, nō friabilis, non pinguis, &

k

tamen

tamen in attritu digitos facile tingens, non cariosus, impetuosus odoris, & acris. Qui enim talis non est, aut uetustus est, aut maceratus. Quo uero facile teri possit, in sole ac fictili nouo siccare oportet.

Crocomagnum sic preparatur: Croci drach. centum, rosarum siccarum drach. quin-
quaginta, amyli drach. L. myrrhæ troglodytica, gummi utriusque drach. L. u. no-
odorato terito, & pastillos formato, eisque in umbra siccatis, utitor.

Cyperus radix optima est quæ grauissima & densa ac plena, ægrè friabilis, aspe-
ra, odorata, cum quadam acrimonia.

Thus primas obtinet masculum, rotundum, non sectum, album, & ubi incisum
est intus pingue. Adulteratur resina pinus aut gummi, facilis est cognitio.

Thuris cortex præstat crassus ac pinguis, odoratus, non scaber aut pelliculis re-
fertus: adulteratur cortice strobili aut pini ammixto, deprehenditur id igne: alij enim
cortices suffiti fumum edunt. Verum hic ardet odore iucundo uelut thus.

Malabathri folium bonum est recens, in nigrore subalbidum, non friabile, integrum, o-
dore nares percellens, & dum diluit odoratum, nardum sapore non falsuginem referens,
quod uero in tenues partes cotusum cariosum odorem repræsentat, uitiosum est.

Medulla optima est ceruina, deinde uitulina, post taurina. Bona est quæ æstate
accidente ad autumnum colligitur: alij enim temporibus cruenta uestigia in ipsa re
periuntur, curatur ad repositionem, recens mollitus aqua affusa, deinde per linteum
excolatur, rursusque lauatur, donec aqua pura fiat, postea in duplici uase liquatur, for-
dibus innatantibus penna ablatis, postquam autem congelata fuerit, in fictili nouo re-
ponitur, dearsa diligenter fece quæ post liquefactionem & excolationem subidet.

Panacis radices meliores sunt siccae & albæ, extentæ, & incorrosæ, gustu ferui-
dæ, & aromaticæ. Succus panacis commodus est gustu amarissimus, forinsecus uir-
ididis, intrinsecus albus, pinguis, citò solubilis, grauis odoris, & gustu calfaciens.

Myrrha primaria est Troglodytica, subuirdidis & pellucida, odorata, acris, quæ
uero colore picea est, inutilis existit.

Stacte myrrha bona est odorata, leuis, oleum admixtum non habens.

Styrax præfertur flauus & pinguis, resinofus, grumos habens subalbidus, ual-
de odoratus, & dum mollitur humiditatem melleam remittens.

Tragacantha optima est pellucida & leuis, tenuissima & pura, subalbida.

Hyoscyamo utendum est eo qui albos flores producit.

Galbanum optimum est thuriforme, grumosum, purum, non lignosum, quod &
ex semine quid ammixtum habet, odore graue, & neque summè liquidum, neque ualde
siccum.

Gagates lapis præfertur qui facile accenditur, & odorem bis-
aminosum repræsentat.

Melanteria optima est sulphurei coloris, le-
uis, æqualis, pura, & contactu aquæ citò nigrescens.

Pompholyx optima est Cypria, & quæ aceto subacta æris odorem refert, col-
orem autem picis. Est autem & coenosi saporis, & carbonibus ignitis imposita, ar-
det colorem æreum repræsentans.

Ex Oribasij libris ad Eustathium & Eunapium, de simplicium
pharmacorum facultatibus.

Quæ media sunt inter calfacientia ac frigefacientia. Cap. cxcvii

Adiantum, asparagus myacanthinos, muscus qui & splanchnon dicitur, glycyrrhi-
zæ succus, oleum dulcissimum, cera, faba, lycium, lotus siue trifolium, citri cortex, si-
licis radix, nucleus nucis pineæ, lentiscus, lens, terra chia & samia, cadmia, spuma
argenti.

Quæ moderate calfaciunt.

Cap. cxcviii

Vitidis folia & semine, urticæ semine & folia, amygdala dulcia, anagallides ambe-
auracy.

atracylis, glycyrrhizæ radix, oleæ radix, & fructus maturus, fermentum, eryngium, resinae omnes, cicerbita sicca, iunci odorati flos, palmæ fructus, cochlearum cinis, cynocrambe, batrachij herba & radix, pulegium, lauri folia, et magis baccæ, minus autem radicis cortex, dictamnium, pseudodictamnium, salvia, erysimum, lanæ ustæ, bryoniæ radix, aristolochiæ radix, asphodeli radix, daucus, chamædaphne, dracunculi radix, oleum raphaninum, cicerum species tres, uiscum, caucalis, ligusticū, ferulæ semen, sagapenum, satyrion, apium, sion, sinon, styrax, hydropiper, hypericum, sal, sanguis, fel, urina, salia, sulphur, uiperarum carnes, adeps, salforum piscium muria.

Quæ calfaciunt primo ordine.

Cap. cxcix

Aloë, chamæmelon, agaricum, absinthium, ladanum, lini semen, malabathri folium, spica nardī, nardus celtica, uinum nouum, serum lactis, caseus, ficus sicca.

Quæ calfaciunt secundo ordine.

Cap. cc

Amurca, anethum siccum, sed uiride minus, artemisia, balsamum, elaphoboscum, calamus aromaticus, crocus, thus, mastiche chia, mel, uinū, pix, melisso phyllum, marrubium, propolis, cucumeris syluestris succus, scandix, scilla, cardui radix, myrrha, terebinthi cortex foliaq; ac fructus, foenum graecum, chamæleontis utriusq; radix, chamæpitys, ocymum.

Calfactoria tertij ordinis.

Cap. cci

Abrotonum præsertim ustum, lolium, populi nigrae flores & resina, acorus, amomum, amaracum, ammiū, anethum ustum, anisum, iuniperus, asari radix, sabina herba, ueratrum utrunq; epithymum, menta, calaminthe, thymbra, harundinis uallatoriæ cortex ustus, caroum, calia, cedrus utraq; cnici semen, conyzæ, cuminum, thuris fuligo, foeniculum, melanthium, mei radices, moly siue ruta syluestris, aut besafa, rhododaphne, uinum uetus, origanum omne, opopanax, petroselinum, ruta, sinyrnium, hyssopus, galbanum, chamædrys, raphanus, sampsuchus.

Calfactoria quarti ordinis.

Cap. ccii

Adarce, ampeloprasen, euphorbium, oleum cedrinum, costus, cepa, lepidium, sinapi, allium, struthij radix, tithymallorum succi, & omnia uistoria ui prædita.

Quæ frigefaciunt.

Cap. cciii

Gramen moderatè, auricula muris, citra adstrictionem, pira in cataplasmate imposita moderatè frigefaciunt, balauitium, rubi folia & germina & fructus uiridis ac flos ipse, Avena moderatè, muscus marinus, glaucum moderatè, dorycnion ualde frigefacit, harundinis sepiaariæ folia moderatè, cicuta summè, lichen in petris nascēs, papauer omne, mali fructus, oleæ fructus & folia, oleum myrteum, sesaminum, balaninum, helxine siue perdicias moderatè, panicum, uiolæ folia & succus, mali persici & citrij caro, fungi multum frigefaciunt, item omphacij succus, amyllum moderatè, rosaceum mediocriter, sordes ex palæstra, cicerbita non sicca, tribulus uterque, ramorum palmæ succus. Samia tera moderatè, cimolia terra, naxiæ cotis detritum siue retrimentum, plumbago mediocriter, plumbum, cerussa, sandyx, caseus mollis recens coactus moderatè perfrigerat.

Quæ frigefaciunt primo ordine.

Cap. cciiii

Acacia illota, atriplex citra adstrictionem, uinacea, milium, ordeum, platanus, thamnus, seris.

Quæ frigefaciunt secundo ordine.

Cap. ccv

Acacia lota, plantago, blitum, galla, omphacitis, cucurbita, cucumis, pepo, folium hortenſe, lens paluſtris, alga uiridis, circa prærupta maris littora collecta, pſyllij ſemen.

Frigefactoria tertij ordinis.

Cap. ccvi

Semperuium utrunq; portulaca, mandragoras, citrij pars acida, polygonum, potamogeton, hyoſcyamus qui & florem & ſemen album habet.

Frigefactoria quarti ordinis.

Cap. ccvii

Succus papaueris, cicuta.

Quæ ſiccant citra mordacitatem.

Cap. ccviii

Viticæ ſemen & folia, amurca, anagallis utraq; auena, plantago, oleum dulce infulſum lotum, fermentum attrahit ex alto ac diſcutit. Lupinus amarus, hippuris fortiter, iſatis, ſalicis flos & folia cum quadam adſtrictione. Quidā & ſuccum ex iſtis faciunt, & pharmacum habent citra mordacitatem ſiccans ad multa cōmodum. Verum multo amplioris uſus eſt pharmacū ſiccans et adſtringēs, nucis cortex uſtus, ſimulq; tenuiū partium exiſtit, milium, centauriū tenue fortiter ſiccatur, ceraſi gummi, liſium, faba, forinſecus impoſita, cupreſſi folia ac reliquæ partes, cyperi radix, nucis pineæ nuclei aqua macerati, nympheæ radix, ſiſtium ſiue ſapa, quinquefolij radix, polypodiū, myrrha, ſarcocolla, ſtoebe, tragacantha, terra omnis, cadmia, aſiæ petræ flos humore flaccidas carnes conſumit, pompholyx ſæpe uſta, calx ſtrennuē, oui candidum ac tenue, eadem uis & uittellorum eſt.

Quæ ſimpliciter ſiccant.

Cap. ccix

Viticis folia & ſemen, graminis radix moderate, adiantum, ſemperuium utrunque, amarantum fluxiones ſiſtit potum, bryoniæ radix, anagryi folia ſicca, pira in cataplaſmate impoſita moderate, ariſtolochia, aſparagus myacanthinus, aſphodeli radix, & magis cinis, balauſtium ualde, ruborū fructus immaturus, quercus partes omnes, phagi ſimiliter, bulbis in cataplaſmate, eryngium, iſatis, ſalicis corticis cinis uehementer, cannabis ſemen, pæoniæ radix, lauri folia uehementer, & magis bacca, oleum cyprinum, laurinum, panicum in cataplaſmate impoſitū, naſturtiū, caucaliſ, paſtinaca ſylueſtris ſiue daucus, lixiuiū, præſertim ex cinere ficulneo, braſſica, caules autem eiufdem cinerē fortiter ſiccantem faciunt, crethmum, liſij folia & radix, omphacium, platani cortex & plulæ moderate, polypodium, amyllum, ſal, nitrum, gypſum præcipue uſtum, cadmia omnis, omnia metallica & lapidea ac terrea, teſta clibanorum, coagulum omne, ſtercus, anſerum tamē & accipitrum inutile eſt propter multam acrimoniam, ſordes, ſiue ſtrigmenta, carnes uiperarum, capita mænularum ſalarum, cornu cerui ac capræ, caſtorium, oſſa uſta fortiter, capilli uſti, ſepiæ teſta, lanæ uſta, cancrorum cinis, garum abunde, muria.

Quæ primo ordine ſiccant.

Cap. ccx

Chamaemelum, iuniperi bacca, caroum, ordeum, polenta, crocus, thus, ſoeniculum, rhododaphne, uinum nouum, cucumeris & peponis ſemen, & radix ſicca, ſœnum græcum.

Quæ ſecundo ordine ſiccant.

Cap. ccxi

Loliū, amaracus, bitumen, anethum, baſamū, uinacea, gingidium, elaphoſcum, calamus aromaticus, thuris cortex, et folia arboris, itemq; ſemen, meū, maſtiche, mel, ſpica nardi, nardus celtica, uinum, eruum, opopanax, pix, rhamnus, raphanus, ſcandix, cardui radix, myrrha, lentifcus, terebinthi fructus et folia, lentes, alga humida & uiridis, malabathri folium, galbanum.

Quæ

Quæ tertio ordine siccant.

Cap. CCXII

Abrotonū præsertim ustum, acacia, acorus, aloë, ammium, anethum ustum, anisi semen, iuniperus, asarum, absinthium, herba sabina, ueratrum, epithymū, thymbra, calamintha, harundinis sepiariæ cortex uustus, caroum, casia, cedrus, conyza, thuris fuligo, nigella, citrij semen, uinum satis uetustum, acetum, origanum, quinquefolij radix, petroselinum, smyrnium, ruta hortensis, marrubium, rhus, sampsuchus, seriphium, hyssopus, chamædrys, chamæleontis uiridisq; radix, chamæpitys.

Quæ quarto ordine siccant.

Cap. CCXIII

Ampeloprason, oleum cedrinum, sinapi, ruta sylvestris, allium.

Quæ media sunt inter siccantia & humectantia.

Cap. CCXIII

Graminis radices in cataplasmate impostæ, oleum dulcissimum.

Quæ primo ordine humectant.

Cap. CCXV

Auricula muris, buglossum, succus glycyrrhizæ, lactuca moderatè, uiolæ folia moderatè, mali perlicæ fructus, fungi, rosaceum, satyrium, stratiotes fluuiatilis.

Quæ secundo ordine humectent.

Cap. CCXVI

Portulaca, atriplex, blitum, cucurbita, mali armeniæ fructus, cucumis, pepo, lens palustris.

Quæ aquosam frigiditatem habent.

Cap. CCXVII

Acacia, auricula muris, portulaca, plantago, atriplex, rubi folia, blitū, muscus marinus, glauciū, dorycnis, uiscum, salix, cucurbita, cotyledon, cicuta, picea arbor, malua satiuua, papauer, mala præcocia, fungi, platanus, polygonum, potamogeton, sideritis, cucumis cibaricus, holoschoenus, cicerbita, tribulus, lenticula palustris, psyllij semen, plumbum.

Quæ tenuium partium sint.

Cap. CCXVIII

Abrotonum ustum, uirga, scandix, populi nigrae flores & folia, urticae semen & folia, amomum, acorus, asari radix, bryoniæ radix, chamæmelon, aparine, aristolochia, plantago sicca, asphodeli radix, præsertim usta, balsamum, herba sabina, sinapi, rubi radix, glycyrrhizæ radix, oleum uetus, oleum cicinum, elaphoboscum, euphorbium, fermentum, salicis succus, calamintha, calamus aromaticus, harundinis sepiariæ cortex uustus, casia, carpesion, milium, oleum cedrinum, pruni gummi, mastiche, nigella, succus cyrenæicus, opobalsamum, ruta, pistacij fructus, propolis, terebinthus, rosaceū oleum, sagapenum, sampsuchus, seselis, cucumeris semen, ficus aridæ moderatè, flos iunci odorati, cinis, calx, salis flos, hyssopus, sal, alcyonium melleum, nitrum, auripigmentū ustum, gypsum ustum, sulphur, cadmia, pumex uustus, lixiuium, asiae petrae flos, melantheria, misy, æs ustum, chryso colla, sandix, fucus, adeps leonis ac pardi, itemq; hyænæ ualde, castorium, sepiæ testa usta, lanæ usta.

Quæ crassarum partium sint.

Cap. CCXIX

Plantaginis radix, balaustris, uinaacea, zingiber, cucumis, cepe, squame omnes, fori, alumen.

Corroborantia.

Cap. CCXX

Casia, galla omphacitis, stœchas, palmæ fructus, absinthium, mastiche.

Concoctoria.

Cap. CCXXI

Amomum, uua passa, cera, ladanum, glutinum librarium, crocus, thus, pix, mastiche Aegyptia, rosaceum oleum, myrrha, styrax, galbanum, alica, adeps suillus & uitulinus, butyrum, œsypus.

Suppuratoria.

Cap. CCXXII

Aqua temperata effusæ fomentū, aqua & oleū temperata, farina triticea, panis.

k 3

nls.

nis, alica, adeps porcinus & uitulinus, butyrum, thus, pix, resina.

Mollientia.

Cap. CCXXII.

Quæcunq; calfaciunt non tamen uehementer, simulq; nō uehementer siccant: sunt autē talia, serum caprinū, adeps gallinaceus, & porcinus, serum taurinū & hircinū, medulla ceruina, uitulina, ammoniacū thymiana, styrax, galbanū, bdellium, oleum sicyonium, oleum liliorum, oleum dulcissimū, chamæmelū, althææ radix, cucumeris syluestris radix, maluæ syluestris folia, mastiche chia, & Aegyptia, terebinthina, resina colophonina, opopanax, sordes statuarum in gymnasijs, sordes palæstrarum, butyrum, cælypus.

Quæ indurant.

Cap. CCXXIII.

Semperuiū, portulaca, psyllium, lens palustris, solanum. Indurantur autem corpora & partes aut ob siccitatem, aut ob plenitudinē, aut ob congelationē. Si quidē igitur ob siccitatē pars dura fiat, humectare omni modo ipsam oportet. Si uero ob plenitudinē, euacure eam ipsam oportet. Si uero ob congelationē fuerit indurata, congelationē moderatē calfacientib; dissoluere oportet. Nam congelatio ex frigore est, quæ autem uehementer calfaciunt, magis congelant.

Exterforia.

Cap. CCXXV.

Stercus caprinum ustum & non ustum, omnes testē, testa intestinū, sepiæ testa, herinacei terrestres ac marini cinis, serum lactis, bryoniæ radix, mel, amygdala dulcia esui apta, & ipsorū arbor, anagallis utraq; anemonæ omnes, plantaginis folia, maximē arida, aristolochia, aron, asparagus myacanthinus, staphis agrestis, asphodeli radix, atriplicis semen, absinthij siccus, bulbus impositus, ueratū utrunque, helxine, siue perdicias, salicis semen, calami sepiarij radix trita moderate, fabæ caro, lapsana in cataplasmate imposita, lichen petrarum, leucosij partes omnes, platani radice cortex, marrubium, meum, propolis moderate, ulmi folia, & cortex ac radix, puissana, terebinthina amplius quā mastiche, sagapenū moderate, cucumeres, peponis partes omnes, cucumeris syluestris radix, beta, thymallus, phu, chamæpitys, alcyonia omnia, terra chia & samia moderate, simiaris abundē, cornu cerui, & capræ ustum, & quæcunq; inueneris nitrosa & amara, ea omnia meatus expurgare possunt. Quæ uero tenuium partium sunt dulcia extergent moderate ulcerum sordes, & totius cuticulæ, uelut sunt fabæ, eruum, ordeum, lupinus, & similia.

Quæ uasorum oscula aperiant.

Cap. CCXXVI.

Quæ oscula uasorum aperiant, calida sunt non ualde, & crassarū partium: quæ enim uehementer calfaciunt, urunt & crustam inducunt. anemonæ omnes, cepa, allium, sel taurinum, irini & amaracini olei siue unguentū fex.

Rarefacientia cutem.

Cap. CCXXVII.

Rarefactoria sunt quæ moderate & citra molestiam calfaciunt, nequaquā uero siccant. Chamæmelon, althæa, cucumeris syluestris radix, costus, libanotides, nitrum, abrotonum, oleum uetus.

Densantia cutem.

Cap. CCXXVIII.

Aqua frigida, semperuiū, portulaca, tribulus uiridis, psyllium, lenticula palustris, mandragoræ mala, & summatim omnia quæ frigefaciunt non siccantia.

Corrodentia.

Cap. CCXXIX.

Auripigmentum, sandaracha, chrysocolia, cantharides, erucæ pinus, cedria, ueratrum nigrum.

Reprimentia eminentias.

Cap. CCXXX.

Elaterium, cucumeris syluestris radix, ochra, mandragoras, alia petræ flos, ostrea

ostreorum testæ, herinaceus uterq; ustus unâ cum testis suis, hæmatites lapis sic-
cus uritus & ad puluillum redactus, faba, squama æris, chryso colla.

Cicatricem inducentia.

Cap. CCXXXI

Quæcunq; adstringunt & siccant, alumen, galla omphacitis, æs ustum, præfer-
tim lotum, mali corium aridum, recrementum plumbi, spuma argenti, helcysma
id est, argenti recrementum, plumbum ustum, testa interiorum omnium testæ,
uitrum, pumex præsertim ustus, & uino extinctus, specularis lapis ustus, ceru-
sa, pompholyx, spodium lotum, chryso colla, stibium ustum, diphryges, sarco-
colla, omnia prædicta si ulceribus insperferis, ipsa cicatrice includes. Verum
cum mordacitate cicatricem inducit atramentum sutorium ustum, cadmia, squa-
ma æris ac ferri, præsertim stomomatis, ærugo, calx usta & lota.

Exulcerantia in superficie.

Cap. CCXXXII

Rubi canini folia, betæ radix, allium, pulegium, hyssopum, origanum, sepia
testæ, asphodeli radix, semen lini, & salsa, & acria, & amara.

Vistoria.

Cap. CCXXXIII

Cantharis, diphryges, sex aceti usta, anemona puniceum florem habens, ala-
lium, cinis, præsertim ficulnus, nitrum assatum, æs ustum, alumen, buccino-
rum testæ usta, menularum capita, auripigmentum, staphis agrestis, granum
cnidium, sinapi, pyrethrum, calx non extincta urit, extincta crustam inducit.

Attrahentia.

Cap. CCXXXIV

Anemonæ omnes, anagallis utraq; dictamnus, cicer, thapsia, cydaminos,
narcissi radix, propolis fortiter, fermentum, stercus omne, sagapenum, suc-
cus cyrenaicus & medicus, silphij succus & radix, sparti quo aucupes utun-
tur, & semen, & uirgarum succus generose, terebinthina magis quam aliæ
resinæ, sulphur, stercus bubulum, præsertim si eruo boues pascantur, ca-
laminthe in cataplasmate impolita, costus contritus cum oleo, fortiter autem
attrahit uiscum.

Discussoria.

Cap. CCXXXV

Abrotonum, agaricum, adiantum, ægilops, urticae semen & folia, sambu-
cus, ebulus, chamæmelon, anisi semen, aristolochiæ radix, asphodeli radix præ-
sertim usta, atriplex, bulbus, herba sabina, muscus qui splanchnon & hypnon
græcis appellatur, daucus, althæa, oleum dulce, oleum uetus, oleum rapha-
ninum & cicinum, thapsia, calami sepiarij cortex ustus abunde discutit, brassi-
cæ folia, lilij folia & radix, ladanum, mercurialis, malua sylvestris, mel mali per-
sice folia, & germina, rhododaphnæ, grossi ficus, ficus sylvestris, mastiche chia,
opobalsamum, succus cyrenaicus uehementissimè, paliuri folia & radix, ruta,
pix, marrubium, terebinthina, rosaceum oleum moderatè, sordes à statuis, sor-
des palæstrarum, quæ patos græcis dicitur, sampfuchum, cucumeris sylvestris
radix, myrrha, caricæ aciores amplius quam grossi, beta citra calfactionem, for-
tior est autem alba, galbanum, sal præsertim ustus, salis flos, nitrum, halcyonia
omnia, terra samia, hyoscyamus, caseus tener ex acido lacte moderatè, buty-
rum, coagulum omne, stercus omne ualde, oesypus moderatè, carnes uiperarum
fortiter, adeps præsertim leoninus, ossa usta eorundem leonum, & om-
nium aliorum cinis.

Adstringentia.

Cap. CCXXXVI

Oleaster, piraster, lentiscus, apium, semperuium, papauer, cy-
tusus, aloë, urtica, uinacea, pira, crocus, althæa, terebinthus glans, hyo-
scyamus,

k 4

scyamus, hederæ, nymphæa, palmæ, oui vitellus assatus, paliurus, hippuris, sanguis concretus, ligustrum, cœnanthe, brassica bis cocta, coagulum leporinum, spongia usta, rhamnus, sunt & multa alia adstringentia, quæ omnibus nota existunt.

Quæ semen generant ac prouocant in cibis ac medicamentis,

& cibis medicamentarijs.

Cap. CCXXXVII

Ex edulijis omnia quæ amplius nutriunt & inflant, item medicamenta omnia flatuosa & calida. Itaque bulbi & cicer, & nuces pineæ, fabæq; ac ficus, edulia sunt multum semen generantia. Scincus autem, & satyrion, ac similia, medicamenta sunt, Edulia aut simulq; medicamenta sunt, lini semen, eruca, & horminum.

Quæ semen inhibeant.

Cap. CCXXXVIII

Semen inhibent omnia quæ frigefaciunt edulia ac medicamenta, itemq; quæ crassefaciunt & condensant, uelut lactuca, cucurbitæ, blitum, atriplex, cucurbita, mora, melopepones. Quæ uero siccant, ne ab initio quidem generari semen permittunt, etiamsi calfactoriam naturam habeant, uelut est ruta. Si uero calida non fuerint, multo magis siccant, & semen generari non sinunt, uelut nymphææ radix.

De alimentorum uiribus.

Cap. CCXXXIX

Sanitatis studiosum si quid aliud, alimentorum uires nosse oportet, itaque ea quæ attenuatoriam uim habent, angustos transitus obturatione liberant, & uiscosa infarta expurgant, ac crassa secant. Verum qui in ipsorum esu perseuerant, serosas & biliolas superfluitates congregant, & si quis adhuc amplius perseueret, atrabiliarium sanguinem reddet. Quare ab assiduo ipsorum usu abstinere oportet, præsertim eorum quæ temperamentum biliosum habent. Solis enim his qui pituitam & crudum humorem uiscosumq; ac crassum coacervauerunt, talia conueniunt. At uero crassefaciente ui prædita, multum alunt, & si in uentre ac iecore probè concoquantur, sanguinem boni succi generant, licet nem autem & iecur obturant. Ex his uero quædam crassi tantum succi sunt, uelut lenticula: Quædam uero uiscosi, ut malua, quædam crassum simulq; uiscosum succum possident, uelut est caro testis intertorum. Securius itaque est diæta & uictus attenuatorius ad sanitatis conseruationem, præ crassefaciente. uerum quum modicè alat, firmitatem non addit corporibus neque robur, & oportet aliquando etiam multum nutrientia moderatè assumere, ubi firmitatem acquirere uoles. Cæterum citra periculum crassa diæta uti possunt, qui exercitijs dediti sunt, & qui dormiunt, quantum uolunt. Omnes autem qui ante ciborum acceptionem exerceri non possunt, alimenta crassi succi uident, maximum enim ad sanitatis conseruationem malum, perpetuum ocium existit, quæ admodum contra moderatus motus maximum bonum. Omnium porro eduliorum optima sunt, quæ inter attenuantia ac crassefacientia medium locum obtinent, & sanguinem substantia ac compage moderatum generant. Itaque tale alimentum corporibus nostris conueniens est, nocuum uero crassi succi, & propterea semper fugiendum. Quin & alimentorum uarietatem fugere oportet, præsertim si ex contrarijs uiribus ac facultatibus constiterint, itaque enim assumpta probè concoquantur.

Attenuatoria alimenta.

Cap. CCXL

Allium, cepe, nasturtium, porrum, sinapi, piper, smyrnium, pyrethrum, origanum,

ganum, calamintha, hyssopus, sisymbrium, pulegium, thymus, satureia uiridis accepta, sicca enim medicamentum est. Ab his proxima sunt eruca, sion, apium, petroselinum, ocymum, raphanus, brassica, beta, foeniculum, coriandrum, ruta, anethum, ligusticum, cuminum, capparis et terebinthi fructus, carui semen, anisi, dauci, & omnium odoratorum & acrium ac palam calidorum semina, uerum fortiter attenuat rutae semine, ac cannabis, ut medicamenta de cetero existant. Ex cerealibus seminibus attenuanti diatae solum ordeum conuenit, deinde panes clibano cocti triticei, a reliquis abstinentum, praeterquam si quis per longius interuallum pisum, aut lentem gustare uelit: plurimum autem eduliorum usum pro attenuantis uictus ratione suppeditant pisces petrosi & montanae uolucres paruae, in uniuersum enim omnia exercitata meliora sunt in exercitatis, & sicciore uictu utentia, et purum ac tenuem aërem inspirantia, & ex piscibus qui mollem simulque friabilem carnem habent reliquis praestant. Nam qui duram aut uiscosam habent, ab his penitus abstinentum est. Habes autem notas carnis omnis animalis, friabilitatem ac molliciem, & quibus sane utraque affuerit, ad satietatem edere licet: quibus altera tantum, edere quidem expedierit aliquando, sed uitanda satietas est. Neque gallinas prohibeo si quis exercitio utatur, neque columbas, neque turtures, maxime si in agro degant, ac montanis locis. Oportet autem non recens macatas, sed unam minimum diem seruatas a macatione edere, non solum turtures et gallinas, sed etiam perdices, & omnia quae moderate duram carnem habet. Sed & falsi pisces abunde attenuant, & crassos ac uiscosos humores secant, eligendi sunt autem & ex his qui mollem carnem habent. Nam cetacei generis uitandi sunt. Praestat & plurima edulia aceto & aceto mulso preparata accipere, et sale prius condire quantum eius fieri potest. Neque laesionem incurret, qui fructus pomorum aluum mollientes acceperit. Verum tarde transeuntes deteriores sunt, & magis si duri fuerint. Quare ex his ne gustare quidem oportet, praeter eos qui repositioni apti sunt, uelut pira & mala, & uuarum non pauca genera: molliores autem magis edere expedierit, qui uero ualde austeri & acerbissimi, ad hanc diatam inepti existunt. Omnium maxime autem aptae sunt caricae, & nuces, & pistacia, & amygdale subamarae. Ceterum oliuas neque laudo, neque uitupero. Verum ex dulcibus non solum edulij, sed etiam potionibus, mel fere solum exacte tenuem succum generat: Vina quoque tenuia & alba crassos humores secant, & per urinas expurgant. Utilissimum uero ad extenuantem uictum est acetum mulsum.

Crassi succi alimenta.

Cap. CCXLI

Panes furnacei, & siliginei, & non probe preparati, placenta ex mulso & similagine, itemque liba, & omnis placenta non fermentata ex tritico, & quaecunque eius generis inde parantur. Sunt etiam similago, ac alica, satis crassi succi, amyllum uero moderate. Sunt & dolichi crassi succi, & lupini, & interna lentis caro, nam cortex exteriorum quid possidet, itemque fabae frictae, & pisces molles appellati, loligines, sepiæ, polypodes, & cetacei generis, ex quo sunt & thunni, moderatiores autem ipsis sunt pelamides. Multum crassi succi sunt ostrea, & buccina, purpuræque ac chamae, patellae, pectines, pinnae, & omnia testacea, anguilla inter ac cochleae, bubulae carnes, caprinae, ceruinae, leporinae, fusi, hepar, rhene, testes moderate, lac coctum, casei omnes, uerum recentes & ex acido lacte minus, oxygala, protogala quod et pyriopto uocatur, oua ad perfectam concre-

concretionem cocta & magis adhuc assata, atq; amplius etiam nū fricta in saragine, palmæ, castaneæ, bulbi, rapa, fungi, tubera, nuces pineæ, conī ac strobili appellati, ficus non probè matura, citrij caro, cucumeres præsertim uberius ingesti, mala nondum matura, uina dulcia quoq; sanguinem crassum generant, & his amplius sapa, & uinum nouum, uinaq; crassa ac nigra.

Media inter attenuatoria et crassefacientia.

Cap. CCXLII

Panes optimè præparati, carnes gallinarum, phasianorum, perdicum, columbarum, attagenarum, & paruarum auicularum omnium, optima edulia sunt. Insuper piscium petras ac littora et altum pelagus in collentium, gobiorum, murænarum, buglossorum, & omnium consimilium, qui neque uiscositatē neq; graueolentiā in cibo repræsentant. Item ficus, pepones, et ex syluestribus oleribus seris, id quod commune pluribus genus existit, singulorum aut speciales appellationes sunt apud Atticos, uelut lactuca, chondrile, gingidium, & alia infinita syluestria olera quæ seridis nomine ueniunt. Eius generis est & asparagus palustris, itemq; myacanthinus, & chamædaphnes, ac bryoniæ. Vinum item fuluum simulq; dulce ac pellucidum, quale est ariusium, & lesbium, & dulce falernum, ac imolites. Hæc enim bonum & moderatè crassum sanguinem generant.

Quæ uiscosum sanguinem generant.

Cap. CCXLIII

Triticum graue, densum, & in alto flauum, uiscosum succum generat: leue autem & rarum & intrinsecus album, minus uiscosum humorem generat. Est & similago itemq; halica satis uiscosa. Item tendines, præsertim in musculorum extremitatibus, aponeuroses græcis appellati, & partes circa labra, & lingua, suilla quoque caro, & agnina, sesami item, semen & palmulæ pinguiore.

Quæ crudum humorem generant.

Cap. CCXLIII

Palmulæ uirides uescentes crudis humoribus implent, & rapa, & testa insectorum caro, si diutius cocta salsum humorem depofuerit, & pisces molles appellati, uelut sepiæ, polypi, & alia huius generis: item cetaceum genus in mari, quapropter antea salsa hæc in usum cibi ueniunt. Talia sunt & intestina, & uentres, & uulua quadrupedum, & acidum lac, lupini, uua in uentre retenta.

Quæ frigidum humorem generant.

Cap. CCXLV

Qui se cucumeribus ualde explent, frigidum humorem coaceruant. Insuper & qui uentres ac intestina & uuluas quadrupedum animalium ingerunt, et lac acidum, & mala nondum matura.

Quæ attrabiliarium succum generant.

Cap. CCXLVI

Carnes bubulæ, caprinæ, & magis taurorum ac hircorum, et adhuc amplius ouium ac leporum, ac suum syluestrium, carnes item salæ quadrupedum animalium. Ex marinis piscibus thunni, balænæ, & omnia cetacei generis, cochleæ, brassicæ, arborum germina, muria, & acida muria condita, uelut lentisci & rebinthi. Item cinaræ caro, & lens edulium est maxime atram bilem gignens, & post hanc furfuracei panes, & qui ex typha ac alijs uitiosis seminibus fiunt, et casei antiqui, & uina crassa ac nigra.

Quæ biliosum humorem generant.

Cap. CCXLVII

Siliquæ, item cinaræ succus amaram bilem gignit, præstat itaq; ipsam feruescam in cibo sumere. Mel quoq; facile in bilem transit. Omnes quoq; dulcis saporis succi, materiam flauæ bilis præbent, itemq; dulcia uina.

Quæ

Quæ superfluitatibus redundant.

Cap. CCXLVIII.

Palumbes, anseres, pisces, exceptis petrosis, uiscera omnia, medulla, spina dorsalis, cerebrum, auiculæ palustres & stagnorum, cicer, faba uirides, faba Aegyptia, porcelli recens nati, ouilla caro, & omnium iuniorum animalium, & ociose uiuentium, pisces fluuiatiles & palustres, & qui in limosa aqua degunt, item omnia cetacei generis in mari.

Quæ superfluitatibus careant.

Cap. CCXLIX

Colla animalium, caudæ, alæ, syluestrium animalium caro, & eorum quæ siccis locis degunt.

Multum nutriente.

Cap. CCL

Suum domesticorum carnes ex omnibus edulij optimè alunt, cerebrum bubulum, testes, cor, medulla spinalis, itemque reliquæ, anserum alæ, & magis gallinarum, omnium uolucrum uentres, cochleæ præsertim ter coctæ. Ex testa intestinis quæ duras carnes habent, uelut purpuræ, buccina, & similia, gammari, paraguri, cancri, locustæ, squillæ, & consimilia. Item molles appellati pisces, uelut polypi, sepiæ, loligines, & consimiles, ex cartilagineis, torpedo & pastinaca moderate, squatina uero magis. nulli & gobij minus. Lac crassius quidem magis, liquidius minus. Ex panibus siligineus maximè alit, deinde similagineus, tertio loco est cui fursures non decesserunt, triticum coctum, siligo, alica, fabæ carnis habitum non adstrictum & densum faciunt, sed laxiorem. cicer magis nutrit, phaseli & ochrimagis foenogracum, dolichi quos lobos uocant græci non pisces minus nutriunt, castaneæ, lens, palmulæ dulces, uua passæ dulces, ac pingues, rapa, bulbi maximè alunt & præsertim bis cocti. Mel despumatum & ad distributionem & ad nutritionem aptum est, uinum omne nutrit quod crassum est. Rubra itaque & crassa ac adstringentia, magis alunt, minus uero his alba simulque crassa & austera. Omnium minime alba & tenuia, omnia item crassi succi si probè concoquantur, ualde alunt.

Quæ parum nutriunt.

Cap. CCLI

Extremæ animalium partes, uulua, uenter, intestina, caudæ, aures, pinguedo, adeps, omne uolucrum genus minus alit, terrestrium generi comparatum, caro quoque animalium annosorum minus alit quam augescens. Piscium esus sanguinem tenuiorem generat. Ex testa intestinis quæ mollem carnem habent, uelut ostrea minus alunt, panes ordeacei, polenta ordeacea, panes fursuracei & sordidi omnes ac loti, amyllum, maza ex polenta ordeacea, auenæ, milium, eoque magis panicum, oryza, fabæ uirides, semen papaueris, mora, amygdala, pistacia, pruna, persica, armentaca, præcocia, oliuæ maximè drupæ, nuces auellanae, & magis adhuc regiae, serica, corna, pruna syluestria, mora rubi, capparis & magis sale condita, terebinthi summitates, brassicæ, betæ, raphanus, sinapi, asparagi omnes, pastinaca, daucus, carus, cepa, allium, porrum crudum quidem nullum penitus alimentum præbet, his uero aut ter coctum paucissimum, punica mala, pira, cucurbitæ, uua passæ austera & non pingues. Porro media quodam modo sint inter parum nutrientia, phaseli, ochri, cicerculæ. ficus autem non similiter ut reliqui fructus parum nutriunt, uerum laxam carnem faciunt. Uua uero minus quam ficus laxam & humectam carnem alunt.

Quæ boni succi sunt.

Cap. CCLII

Optimi succi est optimum lac ferè inter omnia quæ in cibo accipimus. optimum aut lac est animalium bonæ habitudinis, statim ubi mulctum fuerit calidum adhuc

adhuc potum. Oua tremētia & forbilia gallinarum ac phasianorum. uolucres & pisces fermē omnes boni succi sunt, exceptis his qui in paludibus ac stagnis & fluminibus limosis ac turbidis degūt. Verū odore & gustu cognobiles fiunt. Nam foetidi & insuantes ac mucosi sunt, propterea quod in uitiosa aqua degūt. Carnes autem quadrupedum animalium si probē concoquantur, optimum sanguinem generant, maxime si bono succo prędita sint, uelut est suillum genus, at uero omnes circa labia partes, aliaq; extremitates, & alæ uolucrum, intestinaq; & uulvę ac caudę, minus boni succi sunt quā carnes, glandulę autem probē concoctę, similiter ut caro boni succi sunt. Cor non est mali succi, pedes suilli meliores sunt quā rostrum & aures, syluestrium quoq; animalium carnes meliorem succum quā domesticorum habent. panis purus probē pręparatus boni succi est, alica item, & pisana probē pręparata, fabę, castanę non habent malum succum, ficus maturę, & uua matura itemq; pensilis repręhendi non merentur. caricę statim quidem in corpus digestę ac distributę, boni succi sunt, uerū si in uentriculo morentur mali succi fiunt, & pediculos generant. si uero cum nucibus edantur, bonum edulium existunt. Ceterum si quis ficus & caricę assidue in cibo sumat, non parum lædetur. Lactuca ut olus sanguinem bonum gignit, & ab ea intubi. Vina odorata boni succi sunt, sed omnium optimi succi est salernum dulce & tmolites.

Quę mali succi sunt.

Cap. CCLIII

Ab omnibus mali succi edulij abstinentū censeo, etiam si facile concoquantur. Latenter enim diutiori tempore uitiosus humor in uenis ex ipsis congregatur, qui leuissima putrefactionis occasione arrepta, malignas febres gignit. Est autem maxime uitiosi succi caro ouilla ac caprina, pessima uero hircina, deinde arietina, postea taurina. In omnibus his pręstant castratorum carnes. Seniorum aut animalium pessimę sunt. Caro leporina crassiolem quidem sanguinem generat, uerum meliorem ad succi bonitatem quā bubula & ouilla, nihilominus tamen & ipsa mali succi est, itemq; ceruina. rhenes & testes perfectorum animalium mali succi sunt, exceptis gallis. Item cerebrum & medulla spinalis, exceptis gallis, lien, oua in sartagine fricta, casei ueteres, boleti, amanitę, foenogracum, lens, auena, cicer non est boni succi. olyra uero tanto deterior est tritico, quanto melior est quā tipha & auena. panicū, milium, & similia non sunt boni succi. dracones, callionymi, scorpij, trachuri, mulli, orphi, glauci, zygenę, cōgri, phagri, & quęcunq; alia cetacei generis in mari animalia, omnia mali succi sunt. Item omnes fructus subcaniculares mali succi sunt, mala nondum matura, pira prius quā concoquantur, persica, mala punica, mespila, corna, pruna syluestria, siliquę, & terebinthi fructus, cinara pręsertim ubi dura fuerit, cucumeres, pepones, cucurbita his quidem melior est, sed & ipsa in uentre corrupta factis mali succi euadit, ficus & caricę minus quā alij subcaniculares fructus malum succum habent, uerum his qui in ipsarum esu perseuerant, non ualde bonum sanguinem gignunt, unde & pediculorum copia ex ipsis consequitur. Ex oleribus nullum boni succi est. in medio boni ac mali succi sunt lactuca, intubi, malua, blitum, atriplex. Radices plantarum olerum generis mali succi sunt quęcunq; acres, uelut ceparum, porrorum, alliorum, raphanorum, & dauci. Medio loco sunt raporū & cari appellati radices. Ocymum pessimi succi est, rapum crudum, brassica, bulbi nō probē cocti. At uero allium & cepę ac porrum bis cocta humoris malignitatem deponunt. Ceterum extreme mali succi sunt oluscula quę syluestria appellant. Vina crassa simulq; foetida & iniucunda ac austera mali

mali succi sunt, quale est bithynū quod in magnis dolijs apportatur, nam quod in paruis affertur, neq; boni succi neq; mali existit.

Quæ facilia concoctu sunt.

Cap. CCLIIII

Panes bene præparati, pisces petrosi omnes, gobio, torpedo, pestinaca, si uolucrum generi comparentur, uolucrum caro terrestrium generi cōparata concoctu facilius est, præsertim perdicis, attagenæ, columbæ & phasianorum, alæ anserum, magisq; gallinarum, & in summa præstant alæ saginatorum & iuniorum, pessimæ autem sunt gracilium & seniorum, iecur anserum sero lactis saginatorum, itemq; testes gallorum similiter nutritorum facilius concoquuntur. Canes suillæ concoctu idoneæ sunt, in uigore ætatis consistentibus & laborantibus porcorū uigorosorum, reliquis eorum qui adhuc crescunt. Vituli meliores concoctu sunt quàm boues perfecti, & hœdi quàm capræ. In uniuersum autem omnium adhuc augescientium caro facilius concoctu est quàm decrescientium, & animalium in siccis locis degentium facilius cōcoquitur quàm aliorū. Nux regia magis cōcoquitur quàm auellana, bulbi bis cocti melius cōcoquuntur, oua tremmentia & sorbilia, lactuæ, intubi, mulua, cucurbita cocta, si nō corrūpatur, uina dulcia facilius quàm austera. Facilius aut concoctu est quicquid unicuiq; iucundum est.

Quæ ægrè concoquuntur.

Cap. CCLV

Caro caprina, bubula, ceruina, pessimè aut concoquitur hircina, deinde arietina, postea taurina. pessima est & seniorum animalium caro. sues quæ senes fibrosam & siccam, & propterea ægrè concoctilem carnem habent. Ventriculus ægrè concoquitur, item intestina, uulua, cor, iecur, aures, caudæ, rhenes, cerebrum, medulla spinalis, & perfectorum animalium testes, anseres, exceptis alis, palumborum & sturnorum ac merularum & paruorum uolucrum caro durior est, atq; his magis turturis antiqui, & anatis, ægrius tamen adhuc cōcoquitur & fibrosior his est pauonis & otidum caro. uentriculi quoq; uolucrum omnium ægrè concoquuntur, propter substantiæ duritiā. falso enim quidam laudant uentrem struthocameli ac mergi. Cochleæ item & lac acidum, caseus uetus, recens autem & maximè ex acido lacte melior est, purpurarum caro ac buccinarum, aliorumq; testa interiorum duram carnem habentium, gammari, locustæ, cancri, paguri, squillæ, & omnia huiusmodi, polypi, sapie, loligines, & omnia molli cute prædita, raia, leuiraia, squatina, dracones, cuculi, callionymi, scorpij, trachuri, oua cocta, fricta, triticum coctum, polenta, tipha, auena, fabæ, dolichi, phaseli, cicerula, cicer, oryza, lupini, panicum, milium, & quæcunq; huiusmodi, lens, sesamum, castaneæ, mala, pira nondum matura, ficus non matura, uua acidæ & austera, palmulæ omnes, siliquæ, ocymum, rapum crudius, bulbi crudiore, pastinaca, daucus, carus, & omnes olerum radices, ipsaq; olera uniuersa, excepta lactuca & intubis. uina crassa & noua ægrè concoquuntur, uerum multo magis concoctioni resistit aqua.

Quæ stomacho commodant eumq; roborant.

Cap. CCLVI

Palmulæ austerae, mala cydonia, oliuæ muria condita, aptiores tamen sunt aceto compositæ uua passæ austera, uua in uinaceis reposita, nux regia hac parte auellana præstat, multoq; magis si cum caricis sumatur, gingidium scandiaci simile, est ualde stomacho cōmodum, tum crudum, tum coctum comestum; longiorem autem cocturam non sustinet: cinara, sinapi, raphanus, rapum, nasturtium, asparagus palustris, chamædaphnes, oxyacanthæ & bryoniæ, bulbus appetentiam cibi excitat, itemq; capparis sale condita, citrij pars externa corroborat stomachum medicamenti loco sumpta. Vinum austereum os uentris roborat

borat itemq; uentrem ipsum praesertim calida intemperie affectum.

Quae stomacho incommoda sunt.

Cap. CCLVI

Beta stomacho incommoda est, adeo ut & morsum inducat si uberius comedatur, ocymum, rapum crudius, blitum, atriplex, si non cum aceto ac oleo & garo sumantur, foenum graecum stomachum subuertit, itemq; sesamum. Lac frigidum habentibus uentrem acescit, calidum habentibus in nidorem transit. Merito itaq; nocuum est febricitantibus, & si quis amplius cum melle sumat, uomitum ciet, pepon non probe concoctus, cholicos, id est bilem supernè ac inferè eijcientes facere solet. Similiter & melopepon, omne cerebrum stomacho incommodum est, & nauseosum, uelut etiam ossium medulla. Vinum nigrum & austerum facile acescit, & uomitum concitat. Item crassum & nouum.

Flatus expertia.

Cap. CCLVII

Cuminum, ligusticum, uiticis semen, cannabis semen, fabae frictae, bulbi diutius atq; iterum cocti & ex oleo cum aceto comesti. mel quod in coctura omnem spumam deposuit, flatus discindunt panes ordeacei. Media porro inter flatus expertia ac flatuosa, sunt pisa, phaseli, ochri, cicerculae.

Flatuosa.

Cap. CCLIX

Cicer, lupini, panicum, milium, & huiusmodi, fabae, lobi siue dolichi, minus tamen fabis, maza ex polenta, succi omnes, praecipue cyrenaeicus, silphij succus ac radix, ficuum flatus modico tempore durat, propterea quod facile aluo subeant. quae uero exactè maturae sunt, propemodum nihil offendunt, similiter ut caricae, palmulae uirides flatuosa sunt, rapum crudius, lac facile in uentre inflatur, bulbi crudiores, mel non perfectè coctum, uina dulcia flatu tarde transeunt, tem generant, item dulcia simulq; austera, mustum itidem, hoc est uinum nouum.

Quae extergent, secant, obturatione liberant.

Cap. CCLX

Pisana extergit, itemq; foenum graecum, melopepon, uuae passae dulces, fabae, cicer, magisq; nigrum, capparitis satis tenuium partium est, & extergit, & expurgat ac obturatione liberat, maxime ex aceto mulso aut ex oleo & aceto, praereliquis omnibus cibis comesta, beta succus extergit, & magis ubi cum sinapi & aceto comedatur, bulbi attenuatoriam uim habent & obturationes aperientem, cepae, allia & porri attenuant & secant crassos ac uiscosos humores, serum quoque lactis humorum crassiciem attenuat, ficus extergent, quapropter multa arenosa de renibus expurgant, Caricae attenuant ac secant & renes expurgant, amygdalae extergent & attenuant, purgantq; uiscera, & humorum per sputum reiectiones ex pectore ac pulmone expeditiores faciunt, pistatia robori ac sanitati iocineris conducunt, & ad purgationem humorum id obturantium iuxta exitus ipsius, raphanus attenuatoriam uim habet. Mel tenuissimarum partium est, maxime quod ex calidis ac siccis plantis natum est, quapropter etiam aqua mulsa ad sputorum educationem commodat. Acetum multum non pernitus uiscosa ac crassa facile educit, & uiscera citra molestiam expurgat. Valde autem commodat his qui crassum humorem in pectore ac pulmone coaceruarunt, Vina tenuia ac uetera cum acrimonia ad idem conferunt. At uero aquosum, hoc est album & tenuissimum aptum est ad humorum ex pulmone educationem, roborat enim & humores humectiores reddit ac moderatè scindit. Vinum dulce in morbis acutis rescindendis uiribus accommodatum est, uelut in peripneumonia & pleuritide, concoctione morbi iam facta.

Quae obturant.

Cap. CCLXI

Lac modicum seri habens, & multum de caseo, non satis tuti usus est, si quis in

in eius esu perseveret. Nam lædit rhenes, qui aliàs ad calculorum generationem aptitudinem habent, & iocineris obturationes facit his qui eas pati aliàs solent. Caricæ hepatis ac spleni inflammato nociuæ, uelut etiã ficus, omnia quoq; dulcia splenem ac iecur lædunt. Aptæ mullæ incommoda est his quibus uiscera indurata, aut laxo tumore occupata, aut inflammata in tumorem eleuata sunt. Palmulæ pingues obturant, & præsertim crudæ, omnia item liborum genera, & ex simlagine præparata, obturant & splenem augent, & calculos in rhenibus generant. Similiter & triticea farina cum lacte. Alica quoq; inepta his qui iecur obturationi obnoxium habent, & rhenes calculo generando aptos. Vinum dulce obturat, & uiscera auget siue inflat.

Quæ tardi transitus sunt.

Cap. CCLXII

Omnia liborū ac placentarum genera ex simlagine facta, transitus tardi sunt, fabæ frictæ, panes puri, lens cortice detracta, cerebrum, medulla spinalis, iecur, cor, triticum coctum, oua assata, fricta, lupini, phaseli, pisa, scsamum, mala, pira nondū matura, filiquæ, uina dulcia, & magis austerius & nigrū, citra dulcorem, item omne crassum ac nouum. Aqua autem adhuc tardius transit.

Quæ facile corrumpuntur.

Cap. CCLXIII

Perfica, armeniaca, præcocia, & omnes subcanticulares fructus, qui humidum temperamentum habent, in uentriculo corrumpi solent, ubi non probè & citò aluū subierint. Omnia porro mali succi, humida autem & lubrica, ac facile subire potentia, præ alijs edere oportet. Sic enim & ipsa citò subeunt, & alia deducunt. Si uero postremum accipiantur, etiã alia simul corrumpunt.

Quæ difficulter corrumpuntur.

Cap. CCLXIII

Chamulæ paruæ, purpuræ, buccina, & quæcūq; testa intacta duram carnem habent, dantur corrumpentibus cibum præ humorum uitiatione, ita ut bis aut ter aqua optima coquantur, semper in aliam puram feruentem translata, ubi prior falsa reddita fuerit. Sed & gammari ac paguri cancriq; ac locustæ, & squillæ, & quæcūq; eius generis, carnem habent ægrè corruptilem, similiter ut testa intacta duræ carnis.

Quæ uentrem subducunt.

Cap. CCLXV

Lenticula, brassica, ex marinis testa intacta, & cochleæ compositam naturam habent ex contrarijs facultatibus. Ipsum enim solidū uniuscuiusq; corpus, transitus tardus est, & uentrem sistit, uerum humiditas ad excretionem irritat. Si quis igitur lenticulam aut brassicam, aut aliud quid ex prædictis coquat, deinde decoctum ipsum oleo & garo ac pipere condiat, & postea cui uelit bibendum præbeat, palam conspiciet ex ea potione uentrem subduci. Sed & herinaceorū marinorum ac conchularum omnium, itemq; gallorum ueterum iuscula uentrem subducunt. At uero si brassicam aluū subducere uelimus, cacabo in quo cocta fuerit propè posito statim extractam, in oleum ac garum mittimus. Neq; enim ualde ipsam coquere oportet. Panes furfuracei uentrem subducunt, scæni græci succus coctus cum melle acceptus, commodus est ad subducendum omnes uitiosos humores in intestinis contentos. sed modicum esse oportet mel quod ammiscetur, ne morsum stomacho infligat. Oliuæ salis subducūt præ reliquis cibis comestæ. Lac quo liquidius est, eo magis subducit, crassum, minus. Serum uero lactis ualde emollit uentrem. Inijciendum est ad ipsum mellis optimi tantum quantū satis est ad cōdiendum solum modo, ne stomachus subuertatur. Iuxta eandem rationem & salem indere oportet, ne gustus offendatur. Anismalium ualde iuuenum carnes facilius alio secedunt, similiter & cartilagine piscium.

1 2 scium

scitū generis torpedo & pastinaca moderatē secedūt, beta quoq; moderatē subit, & recens caseus cum melle, atriplex, cucurbita, pepones, melopepones, ficus, carica, uuae passae dulces, praesertim humidae, mora ante reliquum cibum sumpta, nux adhuc uiridis, ad excretionem commoda est, imò etiam sicca, aqua praemacerata, & pruna sicca similiter aqua, aut aqua mulsa praemacerata edantur, etenim plus mellis habentia uentrem multum molliunt, etiam si quis sola ipsa comedat, sed multò amplius si aquam mulsam insuper subiiciat, uentris subductioni conferent, ceterum à sumptione talium, uinum dulce bibere oportet, & pauco tempore interiecto prandere. Porro mora, cerasa, praecocia, persica & omnia humecta, & aquosa, & in totum quaecunque nullam fortem qualitatem gustui aut olfactui offerunt, ea mediæ quodammodo facultatis inter subducenda ac supprimenda aluum existunt. Mel solum non coctum si quis delingat, probè aluum ducit, aqua mulsa item parum aut omnino nihil cocta aluum subit, uinum dulce confert ad uentris excretionem, Mustum aluum emollit ac subducit.

Quae uentrem supprimunt.

Cap. CCLXVI

Palmulae austerae, uuae passae austerae, mora rubi, pruna syluestria, poma adstringendi uel praedita, pira, mala punica, similiter gammari, paguri, cancri, locustae, squillae, & quaecunque alia eiusmodi molli testa intestorum, minus quia dem quam testa intacta uentrem supprimunt, uerum habent etiam haec ipsa salum in se humorem, quem ubi in aquam deposuerint, uentrem sistunt uelut ostreorum & testa intestorum caro. Lenticula item & brassica bis coctae uentrem sistunt, & ubi humectam aluum siccare uelimus, quum iam moderatē cocta esse uidetur brassica, prima aqua diffusa, aliam calidam statim affundimus, deinde rursus in illa ipsa coquimus, donec flaccida fiat. Oportet autem neque aërem, neque aquam frigidam attingere quod bis coquitur, non enim amplius exacte flaccescit, etiam si diutissime postea coquatur. Ceterum lenticula decorticata fortem adstrictoriam uim perdit, & non similiter siccatur uentris humida dirates. Si tamen ipsam bis coquas, prioremque aquam diffundas, deinde parum salis aut gari addas, & aliquid ex sistentibus uentrem immittas, ita ut gustus non laedatur, iucundissimum simulque utilissimum pharmacum simulque edulium efficies. Polenta ex uino austero pota uentrem siccatur, oryza sistit, panicum item & milium, carnes leporum, uinum austerrimum, & nigrum citra dulcedinem, & album ac austerrimum, & fuluum ac austerrimum.

Quae calfaciunt.

Cap. CCLXVII

Triticum coctum, & panes ex illis, tipha, auena, foenogracum, palmulae dulces, mala dulcia moderatē, sesamum, uuae dulces, quapropter & sitim inducunt, uuae passae dulces magis mediocriter, apium, smyrnium, eruca, raphanus, rapum, sinapi, nasturtium, pyrethrum, pastinaca, caros, allium, caepa, porrum, caseus uetus, uinum dulce, moderatē calidum est, & propterea sitim inducit. Fuluum uero calidius est nigro, flauum calidissimum est extremè, deinde fuluum, deinde rufum, postea dulce, postremo album omnium minimè calfacit. Vinum uetustissimum multum calidum existit.

Quae frigefaciunt.

Cap. CCLXVIII

Ordeum iuxta omnes utendi modos, milium, panicum, tubera, cucurbita cocta, pepones, melopepones, cucumeres, pruna, mora, uuae austerae & acidae, uuae passae austerae, mala adstringentia, & acida ac teneriora, & pira eiusmodi, & mala punica adstringentia, palmulae frigidum succum habent, lactuca, intuba mediocrius, portulaca

portulata, papaveris semen, aqua, uinum aquosum non manifestè calfacit, ideo etiam febrientibus citra periculum datur, uinum album & austerum minime ut uinum calfacit, uinum uero album simulq; austerum, & crassum ac nouum sensibilibus frigefacit, frigefacit autem & acetum, nam tenuium partium existit, quapropter nervos amplius quam alia frigefacientia laedit. Media porro quodammodo inter calfacientia ac frigefaciētia sunt, panes loti, amyli, uuae uinosae.

Quae siccant.

Cap. CCLXIX

Lenticula, brassica, polenta, uiticis semen, eruum bis coctum & aqua saepius edulcatum, praestat autem album, sed & assatum aut frictum siccus alimentum corpori praebet, item quod simpliciter garum & uinum habet, siccus est non habente, maxima autem est differentia & seminum, & olerum, & plantarum omnium plus aut minus siccantium, iuxta eorum quae ipsis adiunguntur uires.

Quae humectant.

Cap. CCLXX

Pissana, cucurbita cocta, pepones, melopepones, cucurbitae, nuces uirides, pruna, mora, sycomora, lactuca, intuba, malua uero & blitum ac atriplex aquosissima olera sunt, fabae uirides humectant, & cicer, aqua calida humectat & calfacit, frigida humectat & frigefacit.

Quae caput laedunt.

Cap. CCLXXI

Palmulae omnes, eruca, foenum graecum, mora rubi, uinum quoque fuluum capitis dolorem inducit, & mentem tentat magis quam nigrum. Austerum etiam & odoratum caput tentat, aquosum uero neque capitis dolorem inducit, neque nervos laedit. Vinum autem modicum aquae mixturam ferens, capitis dolorem ex humoribus in uentre ortum sedat, lac non est commodum capiti, nisi

quis ualde forte ipsum habeat, cremor uuarum quem fecem dicunt,

dolorem capitis inducit. item uua ipsa in uinaceis reposita.

SECUNDI SERMONIS PRIMAE TETRABIBLI AETII, FINIS.

I 3 INDEX

INDEX EORVM QVAE IN TERTIO AETII
Sermone continentur.

| | | | |
|---|---------|---------------------------------------|---------|
| D e frictione preparatiua, Caput i | | Mercurialis. | xlviij |
| De exercitationibus. | ij | Cucumis sylvestris. | xlvi |
| De exercitationum speciebus. | iiij | Styrax. | xlvi |
| De frictionum speciebus. | iiij | Thymus. | xlviij |
| De uociferatione. | v | Cyclaminus. | xlviij |
| De gestatione. | vi | Scordium. | xlvi |
| De equitatione. | vij | Chamaepitys. | li |
| De re Venera. | viiij | Bdellium. | li |
| De insolatione. | ix | Aquam dulcentia. | liij |
| De uenae sectionae. | x | Squama aris. | liij |
| De euacuationis mensura. | xi | Euphorbium. | liiij |
| Quales uenae secandae. | xij | Chamelaea. | lv |
| Quomodo uena secanda est. | xiiij | Sanguinem purgantia. | lvi |
| De magnitudine sectionis. | xiiij | Methodus componendi purgantia phar | |
| De figura sectionis. | xv | maca. | lvij |
| Quod sit oportuno tempus. | xvi | Vini purgantis bilem preparatio. | lvij |
| De repetita detractioe. | xvij | Vinum pituitam ducens. | lix |
| De arteriarum sectione. | xviij | Vinum melancholicis commodum. | lx |
| Medicamentum sistens sanguinem ar | | Vinum polypodites. | lxi |
| teriarum. | xix | Vinum mulsum stercus exigens. | lxij |
| De cucurbitarum usu. | xx | Vinum mulsum flauam bilem ducens. | |
| De scarificatione. | xxi | lxiiij | |
| De sanguisugis. | xxij | Vinum mulsum pituitam ducens. | lxiiij |
| De purgatione. | xxiiij | Vinum mulsum atram bilem euacuans. | |
| Bilem flauam purgantia. | xxiiij | lxv | |
| Scammonia. | xxv | Conditum ad flauam bilem. | lxvi |
| Peplium. | xxvi | Conditum pituitosis. | lxviij |
| Veratrum nigrum. | xxvij | Conditum melancholicis. | lxviij |
| Bilem atram purgantia. | xxviij | Abinthati preparatio flatus & sterco | |
| Epithymum. | xxix | cora euacuans. | lxix |
| Polypodium. | xxx | Abinthatum flauam bilem ducens. | |
| Pulegium, tragoriganum, leucanthe | | lxx | |
| mon, alysson. | xxxi | Abinthatum ad pituitosos. | lxxi |
| Armenium. | xxxiij | Rosatum flauam bilem ducens. | lxxij |
| Centaurium minus. | xxxiij | Rosatum pituitam, & ferosum ac atrae | |
| Pituitam ducentia. | xxxiij | bilis humorem euacuans. | lxxiiij |
| Colocynthis. | xxxv | Mellis rosacei purgatorij preparatio. | |
| Tithymalus. | xxxvi | lxxiiij | |
| Isium. | xxxviij | Aceti purgatorij preparatio. | lxxv |
| Elaterium. | xxxviij | Aceti mulsi purgatorij preparatio. | |
| Granum cnidium. | xxxix | lxxvi | |
| Agaricum. | xl | Acetum mulsum purgans omnes uitia | |
| Cnici semen. | xli | tos humores. | lxxviij |
| Lathyrus. | xlj | Acetum mulsum quod colicis ac nea | |
| Aristolochiae clematidis semen. | xlj | phriticis per sedē infunditur. | lxxviij |
| | | Acetum | |

| | | | |
|--|----------|---|---------|
| Acetum mulsū amarum. | lxxix | Cura excessus purgationis. | cxviiij |
| Posca uentrem molliens. | lxxx | De uomitu. | cxix |
| Alia posca ualde clara. | lxxxi | Præparatio raphanorum cum ueratro albo. | cxx |
| Gari purgatorij præparatio. | lxxxij | Quibus dandum sit ueratrum. | cxxi |
| Mellis emollientis præparatio. | lxxxiiij | Quid ueratrum facere possit. | cxxij |
| Garum aquosum. | lxxxiiij | Quod multi accepto ueratro nihil quidem uomuerunt, nihil tamen minus quam purgati utilitatem perceperunt. | cxxiiij |
| Garum uinosum purgatorium. | lxxxv | Qui sint apti ad ueratrum. | cxxiiij |
| Garum acetosum purgatoriū. | lxxxvi | Tēpora uniuersalia ac particularia ad sumendum ueratrum apta. | cxxv |
| Iuscula emollientia. | lxxxviij | Veratri probati notæ. | cxxvi |
| Lac purgatorium. | lxxxviij | Victus ratio ueratro purgandorum. | cxxviij |
| Oliuæ purgatoria. | lxxxix | Differentiæ exhibitionis ueratri. | cxxviij |
| Oxyporia purgatoria. | xc | De cremore ueratri. | cxxix |
| Oxyporium ex palmulis. | xcj | De ueratri decocto. | cxix |
| Purgatorium ex cotoneis malis. | xcij | De ramentis ueratri, item de cōtuso ac cribrato. | cxix |
| Purgatorium ex citrio. | xciiij | Quæ præparare oportet exhibitionis tempore. | cxix |
| Purgatorium ex foeniculo. | xciiij | Quomodo post potum curandi sint. | cxix |
| Aliud ualde stomacho gratum. | xcv | De purgationis excessu. | cxix |
| Purgatorium ex foeniculo quod parari solet ad atram bilem. | xcvi | Epithemata purgatoria. | cxix |
| Purgatorium atræ bilis. | xcviij | Compositio olei siue ungenti purgatorij. | cxix |
| Aliud purgans atram ac flauam bilem. | xcviij | De localibus euacuationibus. | cxix |
| Pastillus flauam bilem purgans. | xcix | Quæ oculos purgant & lachrymas prouocant. | cxix |
| Buccella purgatoria. | c | Quæ aures purgant. | cxix |
| Aloëdaria citra molestiam purgantia. | ci | Quæ per nares purgant. | cxix |
| Pharmacum pituitam ducens. | cij | Quæ humiditatem ex ore trahunt. | cxix |
| Purgatorium atræ bilis. | ciiij | Quæ lac generant ac mouent. | cxix |
| Bilis & pituitæ, & atræ bilis ac reliquorum humorum commune purgatorium. | ciiij | Pulmonem ac pectus purgantia. | cxix |
| Aloëdaria emollientia ex rosaceo mele. | cv | De suffitionibus. | cxix |
| Aloëdarium ex Philagrío. | cvi | Quæ tenuia intestina euacuant. | cxix |
| Aloëdarium Oribasij. | cvij | Quæ sima hepatis purgant. | cxix |
| Sal purgatorius. | cviiij | Quæ gibba hepatis purgant. | cxix |
| Purgatorium pituitam ducens. | cix | Splenem euacuantia. | cxix |
| Purgatorium aquam ducens. | cx | Rhenes purgantia. | cxix |
| De hieris. | cxj | Vesicam purgantia. | cxix |
| Purgatorium citra molestiā purgans. | cxij | Quæ glandi induntur ad urinas prolestandas. | cxix |
| Hiera Galeni. | cxiiij | Lapides in rhenibus ac uesica euacuantia. | cxix |
| Hiera Archigenis. | cxiiij | | cxix |
| Hiera Ruffi. | cxv | | cxix |
| Hiera Iusti. | cxvi | | cxix |
| Quomodo auxiliari oportet his qui pharmacum biberunt, & non purgantur. | cxviij | | cxix |

| | | | |
|---|---------|---------------------------------------|-----------|
| Vterum euacuantiā | clij | De spongiæ usu. | clxx |
| Quæ in potu sumpta menses ducunt. | | De asperlionibus. | clxxi |
| cliiij | | De irrigationibus. | clxxij |
| Quæ stercora euacuant. | clv | De infessionibus. | clxxiij |
| Lumbricos educentiā. | clvi | De humectationibus. | clxxiiij |
| Sudores excludentiā. | clvij | De fomentis, perfusione, cataplasma- | |
| Quæ euacuant ac corrumpunt pedi- | | tis, ac cucurbitis. | clxxv |
| culos omnis generis circa superficiē | | De cataplasmate ex fermento. | clxxvi |
| corporis. | clviij | De cataplasmate ex pane. | clxxvij |
| De infusionibus sedis. | clix | De cataplasmate ex tursuribus. | clxxviij |
| De glandibus. | clx | De cataplasmate ex ficibus. | clxxix |
| De tomentis siue floccis. | clxi | De dropace ac picatione. | clxxx |
| De aëre. | clxij | De sinapismo. | clxxxcl |
| De uentis. | clxiiij | Quod caprarum simi pilulæ cum ace- | |
| De accessione ac significatione stella- | | to impostæ, priuatim coxendicum | |
| rum. | clxiiij | morbo conueniunt. | clxxxij |
| De aquis. | clxv | Quæ sint aliæ rubificantia. | clxxxiiij |
| De balneis. | clxvi | De iberide, siue cardamine, quæ etiam | |
| De balneis naturalibus. | clxviij | lepidium uocatur. | clxxxiiij |
| De frigida lotionē. | clxviij | De euocantibus ex alto auxilijs. | |
| De infessu solij ex oleo. | clxix | clxxxv | |

AETII MEDICI GRAECI CONTRA CTAE MEDICINAE, TETRABIBLI PRIMAE, SERMO TERTIVS.

De his quæ per clysterem infunduntur, euacuantur, & exhibentur. Et de aëre, uentis, locis, aquis, rubificationibus, sinapismis, ac similibus.

DE FRICTIONE PRAEPARATIVA.

Cap. I



INTE exercitationem corpus calfacere oportet, frictionis tum per linthea, tum per oleū, usu, fricandumq; est corpus nudis manibus donec probè caleseat, & molliatur, ruborq; floridus efflorescat, & confrieta particula in molem eleuetur.

De exercitationibus.

Cap. II

Exercitatio est motus uehemens. Vehementiæ autem terminus est respirationis alteratio ad celeritatem ac densitatem. Exercitatio ipsa partes instrumentales præparat, ut non faciliè affectionibus impetantur, & ad actiones obeundas robustiores reddit, & alimenti attractionem fortiolem, & nutritionem meliorem, propter excitatum calorem facit. Sed & sensibiles itemq; obscuros meatus propter fortem spiritus motū expurgat. Quandoquidē igitur distributioni alimenti opitulatur, oportet sanè neq; humorū crudorum, neq; ciborum inconcoctorū copiam, neq; in uentre, neq; in intestinis cōtineri: periculū est enim ne ad omnes animalis partes deducantur antequā probè concoquantur. Manifestū igitur est etiam ante cibos exercitari corpora oportere. Opportunitatis nota ex bonitate coloris urinarum sumitur. Aquosa enim urina, humorem ex uentre

uentre in corpus digestum ac distributum, incoctum esse significat. Fulua uero & biliosa iam dudum perfectam concoctionē notat. At uero moderatē pallida, signum est concoctionis nuper factae. Tunc itaq; ad exercitia prodeundum est, uentris ac uelicae excremento prius deposito.

De exercitationum speciebus.

Cap. III

Cōmune est omnibus exercitationibus, caloris innati corporibus augmentū. Ceterum singulatim robusta exercitatio, hoc est, uiolenta, musculos ac nervos ualidiores reddit. Tales sunt, fodere, onus maximum leuare, & aut in loco permanere, aut paululum progredi & uelut deambulare. Huius generis est & per funem manibus apprehensum repere ac ascendere, & plurima alia eiusmodi. At uero ueloces exercitationes, citra contentionem & uiolentiam, cursus sunt, & summarum manuum luctae ac exercitia, & parua pila. Ceterum robustis exercitationibus uelut uehementibus uti quis potest, si celeres motus addat. Insuper exercitiorum aliqua lumbos aut manus aut crura magis exercent, aliqua spiritum, aut pectus, aut pulmonem solum. Exercendum est autem donec corpus in molem eleuetur, & floridum euadat, motusq; expediti ac aequales & ualidi existant. In hoc autem corpore etiam sudorem conspicias calidum uapores permixtum. Cessandum uero tunc primum ubi quid ex praedictis fuerit alteratum, uelut si corporis moles contrahi uideatur, statim quiescendum est. Similiter etiam si coloris floriditas contabescat. Quin & si motuum uigor remitti uideatur, statim cessandum est, & si circa sudorem mutatio aliqua apparuerit iuxta multitudinem siue qualitatem. Si enim paucior aut frigidior prodeat, euestigio desinendum est, oleumq; affundendum indeq; corpus recurandum, moxq; frictione recursoria, quae post exercitationem adhiberi solet, utendum quemadmodum praedictis in usu habent.

De frictionum speciebus.

Cap. IIII

Frictio dura corpora cōstringit, mollis soluit. Quare quae supra modum exoluta sunt corpora, frictione dura, quae contra adstricta, molli fricanda sunt. Si uero aequaliter habeant, palam est quod neque molliter neque dure, sed quantum eius fieri potest, utroq; excessu uitato. Frictio multa gracilitatem inducit, pauca uice uersa, media mediocritatem.

De uociferatione.

Cap. V

Vociferatio exercitatio est pectoris & uocalium instrumentorum, insuperq; caloris naturalis purgans, attenuans ac roborans, & corporis partes solidas & robustas reddens, ut non facile affectionibus impetantur. Utendum est uociferatione in anhelosis, & recta ceruice spirantibus, tabidisq; ac doloribus diuturnis pectoris ac dorso, & in pectoris abscessibus post rupturam, & ad raucam uocem ex plurima humiditate factam, & in febribus quartanis. Nam concretum humorem convenientissimè excutit, & stomachi humiditatem, quam priuatim quartana febris inducere solet, expellit. Conuenit etiam stomachicis praesertim assidue uomentibus, & acidum ructantibus. At uero capitis affectionibus incommodissima uociferatio existit. Ceterum qui uociferatione usurus est, aluo prius exonerata, & infernis partibus sensim confectis, lotaq; facie placide perfusa, & ubi mox a somno se moderatē loquendo & deambulando praeparauerit, ita tandem ad uociferationem progredi. In ipsa autem uociferatione concinnitas, & uocis bonitas, ac iucunditas, nihil contulerint ad sanitatem. Verum grauiorum uocum sonus utilis existit, quare in hoc se exercere oportet. Sic enim plurimus aer in respiratione attractus, pectus

pectus distendit, & alium ac totius corporis meatus dilatat ac dispartit, unde in uociferationibus, & concitatis lectionibus redundantium humorum excretiones contingunt, & his quidem qui concitatus legunt, magis & per sudores, qui uero mitius uocem intendunt, per occultam transpirationem. Nam tota corporis moles in lectionibus ac uociferationibus intenditur. Contingit item propter attenuationem ex motu factam, multa sputa resoluta, mucumque ac pituitam excerni. Porro his qui propter frigiditatem caliditate opus habent, quod nam commodius auxilium afferri queat quam actio per respirationem? Oportet itaque saepe legere, & uniuersum corpus relaxare, fusaque carne, ad corporis rarefactionem, alperam arteriam, & alios spiritus exitus commodè distendere, & grauiissimas uoces concinnè sonare. Utendum autem uocis actionibus neque temerè, neque inconsideratè, sed neque prauis ac corruptis humoribus corpore repletò, neque in magnis ac manifestis cruditatibus ad uocis exercitium progrediendum, ne amplior distributio corruptorum humorum aut uaporum in corpus fiat.

De gestatione.

Cap. VI

Reliquae quidem exercitationes in motu corporis sitae sunt, gestatio uero mixta est ex motu & dispositione quieti simili, quum plurimae corporis partes quiescere uideantur, uniuersum uero gestationis tractu moueatur. Atque hinc adeo utilissima simulque lenissima exercitatio est gestatio, ut quae neque lassitudinem corporibus inducat, ipsaque consimiliter uelut magna exercitia moueat. Omnis autem gestatio insitum calorem uentilare & excitare potest, & materiae multitudinem dispergere, habitumque corroborare, & actiones stupidas suscitare. Differentiae gestationis multae sunt, uerum peculiariae haec sunt. Prima quidem in lecto, eoque aut pensili, aut fulcra mobilia iuxta angulares pedes habente. Altera in lectica, quae & ipsa duplex est, ita ut qui gestantur uel desideant uel decumbant. Tertia in curru. Quarta in nauigio. Ponenda etiam equitatio est inter gestationis partes. Itaque gestatione in lecto utendum in febricitantibus, aut diuturno morbo decumbentibus, in quo corpora consumpta se erigere non ita ualent. Item in his qui uires recolligere à febrili afflictione iam incipiunt, & in his qui ueratrū sumpserunt. Utendum & phreniticis. Nam spiritus perturbationem placide lenit, & ad somnum illicit. Utendum & in lethargicis, & appetentia ciborum desiecta. At uero in lectica siue ferculo decumbentes gestamus, febrilem lethargicam aut semitertianam, aut quotidianam correptos. Item hydropicos, stupore attonito percussos, resolutos, nephriticos, podagricos. Desidentes autem in lectica gestamus, eos in quibus febris exactè remisit. Caterum gestatio in curru consessorum quiddam habet, & diuturnos morbos commouet. Est autem & in hac alia uehementior, alia mitior. Mitiore itaque utendum in capitis affectionibus, & his quibus intestina fluxione laborant. Vehementiore, in affectionibus pettoris ac stomachi, & in tumoribus laxis, hydropicisque ac stupore attonito percussis. Verum vertiginosos & dimidia capitis parte affectos, auersos ab itinere retrorsum desidere in curru oportet, eosque leniter mouere. Etenim multos nouimus hoc modo curatos, qui nullo alio auxilio indiguerunt. Sed tamen sedem aliquanto supiniorem ipsis esse oportet. Porro gestatio in nauigio si iuxta terram fiat, & in mari tranquillo, hydropicis conuenit, & elephantiasi laborantibus, syderatis, tumidis. Estomachum quidem ab initio subuertit, paulò autem postea in adfuetudinem uenit. Verum gestatio per pelagus uehementissima est, & mutationes plurimas ac maximas facit. Nimirum quum anima mixtos affe-

effectus habeat, ex tristitia, & spe, timoreque ac periculo, modò gaudentibus & lætis, modò in agone existentibus nauigantibus. Omnia autem hæc composita sufficientem uim habent omnem ueterem morbum exigendi & corpore excludendi. Quin & mixtura ex quiete ac motu corporis, si quid aliud, probè corpus nutrit.

De equitatione.

Cap. VII

Equitationis usus modicus est in ægrotis: neque enim multam utilitatem opus ipsum præbet. Nam si leniter impellatur equus, nihil aliud quàm lassitudinem facit, maximè inguinum, iuxta crurum explicationem ac dependentiam. Si uero agitur equus, uniuersum corpus dolorose concutitur. Et tamen etiam hic modus aliquid utilitatis habet in ualentibus. Supra enim alia exercitia, & spiritum & corpus, & maximè stomachum firmat, sensusque purgat & acutiores reddit. Verum pectori pessimum est hoc exercitium. Cæterum in omni gestatione omniq; exercitatione, curandum est maximè, ut in salubri loco fiant, & in aëre puro, nec solum de alijs exercitijs hoc accipiendum est, sed etiam de nauigatione.

De re uenerea. Ex Rufo.

Cap. VIII

Naturale opus coitus est, nullum autem ex naturalibus operibus nociuum est. Verum iuxta immodicum & assiduum usum, itemque iuxta tempus non conueniens assumptus, noxius euadit. Multò autem magis nociuus sit assiduus usus, his qui neruos, aut pectus, aut rhenes, aut lumbos, coxendicesque ac pedes, imbecilles habent. Cuius rei coniecturam hinc facere licet, quod omne hominis robur in coitus usu debilius redditur. Robur autem, est insitus in nobis calor. Vnde sanè concoctiones coeuntibus non integræ contingunt, & pallidi fiunt, & neque exactè uident, neque ut oportet audiunt, neque alios sensus integros possident. Quin & obliuiosi tales & tremuli existunt, & articulis maximè coxendicum dolent, & alij ex ipsis rhenum, alij uesicæ morbos incurrunt. Quibusdam etiam oris graueolentia, & dentium dolores, & gurgulionum inflammationes oboriuntur. Et usi sunt iam uiri multi qui ex multa uenere sanguinem exspuerunt, partim ob uiolentam spiritus compressionem ac intensionem, partim ob uenarum ac arteriarum quæ ex pulmone ad testiculos deferuntur cõmunionem. Cæterum foemina ex coitu sanguinè non spuit, cum propter reliquã corporis humiditatè, tum quod in mixtione minus laboris perfert, imò etiam propter consuetas infernas purgationes, quare si contingat etiam foeminam spuere sanguinè, magnam ex purgationibus medelã acquirit. Itaque propter iam relatas causas medici boni iubent uenere abstinere, siue adsit quis ex prædictis morbis, siue timeatur, ob naturalem corporis debilitatè, atque hæcenus quidè offensiones & cõsensus coitus, quantũ uires nostrę tulerũt, paucis retulimus. Restat ut etiã utilitates recenseamus, neque enim penitus inutiles & omnibus nociue res uenereæ existunt, si & usus, tempus, & modũ, & sanam utentis constitutionè inspicere uelis. Utilitates ex coitu hæ sunt: Repletionè euacuare, & leuius rededere uniuersum corpus, idemque ad augmentum promouere, & uiribus efficere. Duris habitudinibus ex longioribus interuallis usus eius cõmodat: mollit enim organa, & meatus dilatat, & pituitam expurgat, & impeditam rationis uim explicat, & maximas iras remittit. Quapropter & atra bile percitis, subtristibusque hominum consortia fugientibus, uelut magna quædam medela, commodissimus existit, sed & iuxta alium modum furiosos, ad sanio rem mentem reducit, & quosdam comitiali morbo præhenso sanat, & capitis grauitatè ac dolorem

ad uir

ad uigorem ac integritatem permutat. Hippocrates summam morbis à pituita rem ueneream optimam esse pronunciauit. Multi quoque ex morbis alimentis non sentientes, ex usu ipsarum refectioni sunt, alij bene spirantes ex aere spirantibus euaserunt, alij cibos auersantes, appetentiam edendi assequuti sunt, quidam à frequentibus seminis per somnum effusionibus liberati sunt. Naturæ ad ueneream appositæ sunt calidiores & humidiores, nam eius usum plus quam alia ferre possunt: minimè autem sicca & frigida. Est & uigentium natura ad eam accommodata, senum uero nequaquam. Ex temporibus uer aptum est, ineptus autumnus & æstas, sed neque hyems commoda est propter frigiditatem. Et sanè diæta quoque calidior & humidior ad coitum idonea est, contra siccans & frigefaciens inutilis. Humida enim diæte etiam impotenti ad coeundum commodant. Oportet igitur humidum & calidum esse uictum, cui accedere debet labor moderatus, & cibus boni succi. Vinum itaque sit colore fuluum, substantia tenue, panes puri furnacei recentes, carnes hœdorum, agnorum, & porcorum. Ex uolucris gallinæ, attagenæ, perdices, anseres, anates. Ex piscibus polypi, & molli carne præditi. Olerum horminum, irio, eruca, rapum bis coctum & flaccidum factum, hæc enim medicamenti loco exhibentur. Leguminum faba, cicer, ochri, phaseli, pisa, dolichi, nam & flatu corpus implent, & luculenter alunt. Magnopere etiam optimam uiam laudo, quod ad hanc uictus rationem attinet: humectat enim & sanguine ac spiritu corpus replet. Cæterum qui uenere uti uolet, recentes repletiones uitabit, cruditates item ac ebrietates similiterque famem. Malum est enim repleto corpore coire, item à gymnasijs & à balneis. Vitandæ lassitudines, & prægressi uomitus, & alui profluvia recentia, nam inueterata aliquando per uenerem resiccantur. Commodissimum coeundi tempus est à cibo non nimium ingesto, nam & ad robur conducit, & frigiditates euenire solita minus fiunt. Et si quidè à prandio quis ad uenerem incitetur, quiescere oportet donec cibus desideat. Si uero à cœna, necesse est paululum antea dormire. Porro uehementes impetus ad cupiditates ad uenerem non probo, sed eis resistere suadeo, præsertim si cui morbus sit qui ex uenere facile offensionem perceperit.

De insolatione, & arenæ aggestione, ac alijs uaporatorijs formis.
mentis. Ex Antylo. Cap. IX

Quidam se ad solem exponunt, partim non uncti, alij etiam uncti, & alij desidentes, aut decumbentes, alij stantes & deambulantes aut currentes. Ex decumbentibus aliqui in strato, aliqui super corio, alij in arena, aut sale decumbunt. Solaris itaque insolutio citra unctionem, moderatè adhibita, perspirationem occultam auget, & sudores elicit, aluum autem sistit, & carnem conseruat, pinguitudinem uero abolet, & tumores laxos cum alijs, tum maximè hydropicorum deprimit. Spiritum autem densiorem ac uelociorem reddit, & propterea anhelos & recta ceruicibus spirantes exacerbat. uerum capiti diuturna frigiditate laboranti commodat. nam & firmum & ægritudinibus minus obnoxium efficit. Oportet tamen in his aluum præuacuare. Inimica est enim insolutio capiti, euacuatione infernè non præmissa. At uero insolutio cum unctione, eadem similiter potest. Verum corpus magis siccatur, uelut unguine aslatum, quapropter & superficiem magis densat. Cæterum per occultam transpirationem hæc minus discutit, nimirum ad ceteri similitudinem densans carnem. Qui uero desidentes aut stantes insolantur, uehementius quam deambulantes & magis quam currentes inurantur. Decumbentes autem in strato, non magnopere iuuantur, sed capite magis replentur. Qui super corio se soli exponunt, magnam utilitatem consequuntur, præsertim si cui hydropis

hydropici & ischiadici, nephritici, resoluti, elephantiasi laborantes, intumescen-
tes circa refectionem, coeliaci, & qui circa uelica ueterem morbum habent: itemque
syderati, foeminae quoque quae ab utero strangulantur, & adhuc amplius quae alba
uteri fluxione infestantur. Oportet autem magnū esse corium, & oleo perunctū,
& super tenuem arenam cribratā extentum, & ubi praecalcatus est corium, tum
demum aegrum super id decumbere, capite cum crudo linteo uelato. Permanen-
dum est autē diutius in eadē decubitus figura, & postquā corpus multū fuerit
seruefactū, uertere iubendū ac deuoluendū, & postea rursus in alterū latus reuol-
uendum, ac quiescendū, atque hoc ipsum saepius facere oportet. Idem modus etiā
in arena adhibetur, loco affluē permutato. oportet autem ministrū adesse, qui
calentissimā arenā colligat, & corpori defossi ac obruti superingerat. Si quidē igi-
tur mare affuerit, utendū est eius arena. Nam & leuior & magis resiccans huius
arenae fomentatio ac feruor est, quā eius quae per corium contingit. Si uero flu-
uialis arena fuerit, praestat corio uti. Nam & arena fluuiatilis, & aer humectior
est ex euaporationibus. Quod si salis copia adsit, multo praestabilius est tenui sale
substrato hominem decumbere. Oportet autem altitudinem esse non minorem
tribus palmis paruis; si enim non fuerit altus sal, caliditas ipsius faciliē diffatur, ut-
pote quae ex alto emersum ac progressum non habeat.

De uenae sectione. Ex Galeno.

Cap. x

A similaribus corporis partibus primas actiones perfici, alibi demonstratū est,
itemque per instrumentales, secundas. Itaque humores in corpore contenti conside-
randi sunt, quam tandem utilitatē aut cladem partibus afferant, per quas corpus
actiones suas facit. At uero plenitudo colligi dupliciter dicitur. Aut enim uirium
respectu plenitudinem dicimus, aut respectu capacitatis uasorum humores conti-
nentium. Quemadmodū enim is qui onus gestat, nō statim ut grauatur & labo-
rat, iam etiam concidit & uincitur ab ipso onere, iuxta eundē modum ubi uires
a plenitudine grauantur, possibile est ipsas diu resistere, & nondū hominē agro-
tare, ubi uero quis diutius negligatur, uires concidunt. His itaque magnopere pro-
dest uenae sectio priusquā uires uincantur. Sed & plenitudine ac copia sanguinis
in corpore non existente, uenae sectio utilis fit, inflammatione incipiente ob pra-
gressam plagam; aut ob particulē debilitatem, humoribus ex corpore acruatim
in ipsam congregatis. Aliquando enim sanguis acruatim ad particulam quan-
dam irruens, aut stupefacit eam, ut actio ipsius corrumpatur, aut memorabilem
cladem inducit, uelut in syderationibus cōtingere uidemus, quandoque uero etiā
ipsum uas perrumpit, uelut in sanguinis sputo contingit. Conandū itaque est ut re-
dundantē sanguinē euacuemus quā citissime, priusquā magnum aliquod ma-
lum circa aliquā corporis partem operetur. Quin & magni alicuius morbi timō-
re uenā secamus. Atque ego sanē multos podagricos annis tribus aut quatuor in-
festatos ex interuallis, aut purgato redundante humore in principio ueris, aut san-
guine detractio curauī, nam & podagricis & arthriticis, comitialibusque ac atrabi-
liarijs morbis, item sanguinē spuētibus, uertiginosis, & his qui frequenter angi-
na arripiuntur, peripneumonijs, pleuriticis, lippitudinibus uehementibus, & in-
summa his qui magnos morbos frequenter incidunt, uenae sectionē omnib. au-
xilij potiorē pronuncio. Cōsideranda porro ueniunt in omni uenae sectione, ple-
nitudinis quantitas ac qualitas, morbi magnitudo siue praesens sit, siue timeat, a-
tas uigoroſa, & praeter his omnib. uirū robur aut debilitas, deinde naturalis habitus
totius corporis, hora ac tēpus anni, regio, praesens ambientis cōstitutio, praegres-
sus uictus & diēta, copia ciborum & potus, & maximē an multū nutrientes cibos

m homo

homo ingesserit, & an consueta exercitia reliquerit, & an consueta excretionē suppressa sint. At uero aggraunte & infestante plenitudine, non omnino sanguis detrahendus est: Aliquando enim crudus quidam humor in corporibus coaceruatus est, quapropter diligenti animaduersione opus est, quantopere uires ualidae sint, & quantopere humor ipse perfrigeratus est, quod ipsum ex urinis & alijs signis cognoscēs. Nam in eiusmodi affectionibus praexolutae uires, in uenae sectione extremē concidere solent, ut refocillari amplius non possint, quod ubi contingit, periculum non paruum cōsequitur, praesertim incidente febre, in constitutione aestiua, stomacho malē affecto, aut corpore uniuerso molli & temperamenti humidi ex natura existente. Exoluuntur enim tales & celeritatem in animi deliquiū collabuntur, etiā si non magna febris in ipsos irruat. Sed & si hyems fuerit, aut regio frigida, & natura hominis frigidior, minimē uenae sectionem admitteremus: tales enim hoc modo dispositos moderatis frictionibus, & unctionibus moderatē calfacientibus, & potionibus incisoria ui praeditis sanamus.

De euacuationis mensura.

Cap. xi

Magnitudo morbi & uirium robur principales scopi sunt incidendae uenae, qui ubi aucti fuerint, maiorem euacuationem fieri oportere indicant, sicut contra ubi non fuerint aucti, euacuationis quantitatem imminuere oportet, in quantum uires imminutae sunt, itemque morbi magnitudo. Cōsequenter autem simul consideranda est hominis natura. Nam eos qui moderatē graciles sunt & magnas uenas habent, multumque sanguinis, largius euacuabis. qui uero uenas angustiores habent, & corpore albi & carne teneri sunt, parce. Sanguinem enim modicum hi habent, & faciliē humores ipsis transpirant. Iuxta eandem rationē, neque pueris uenam secabis, usque ad quatuor & decem annorum aetatem, imō neque senibus, praesertim uiribus debilibus existentibus. Quod si uires fuerint fortes, & necessitas urgeat, etiā septuagenarijs uenam secabis.

Quales uenae secandae.

Cap. xii

Reuulsionis gratia semper uenas in directum secabis in his à quibus sanguis erumpit. Nimirum ut sanguine è dextro nare fluente, uenam dextrae manus secas: è sinistro uero, sinistrae. Quod si splen patiatur, uenam inter anularē & paruum digiti manus seca, aut in cubito internā. Sed & in pleuriticis uenā è directo affectu lateris seca. Grauiissimos item oculorum dolores mirabiliter mitigat, uenā è directo affectu oculi seca in cubito, quae humeralis appellatur. Nam interiores uenae sectae, utilitatē praebent in partibus infra collum affectis. Externae uero faciei & capiti: Mediae utrisque. Si autē in uenae sectione error contingat, in media quidem uena nervus subiacens diducitur. In interna uero, arteria substrata. Et uitandum est ne hanc secemus citra magnam necessitatem. Nam minoris periculi est humeralem secare. Et saepe facta in hac fissura magna, neque inflammationes sequutae sunt, neque dolores. Quare hanc confidenter secare licet. Internam uero cum multo metu. Vitandum item ut ne tentemus mediam. Quemadmodū autem praedictae partes ex uenarum cubiti sectione opem sentiunt, ita inferiores his, hoc est, coxa, & uterus ac uelica, ex uenarum poplitae ac talorum sectione. Rhenae autem utrinque opem ferunt, & ex cubiti & ex infernarum uenarum sectione. Scio autem coxendicum affectionem in una die sanatam, per euacuationē à cruribus, quae sanē non propter frigiditatem, sed uasis coxae sanguine impletis facta erat. Oportet autem in omnibus inflammationibus incipientibus, reuulsorie facere uenae sectionem, uelut pede inflammato ex manu. Verum in affectibus diuturnis, maximē quidē ex ipsis affectis partibus, sin minus, ex propinquis.

Quomodo

Quomodo uena secanda est. Ex Antylo.

Cap. XIII

Punctum quidē uenae incisionē facimus, ubi uasa fuerint obscura: Caesim uero ubi fuerint manifesta, ita ut firmemus manum in obscurioribus, & his qui ad ictum flectere solent cubitū. Oportet autē non totum uas diducere. Nam dum labia ipsius evertunt, fluxus nō fit cum eiaculatione. Neq; uero infernā uasis partem ad radiū diuidere oportet, sed supernā ad brachij exortum tendentē. Supernae enim secta, speciosa sanguinis eiaculatio contingit. Et ad hanc cōmoda est supernae partis uenae sectio, quoniam ē uase quis aberrare non potest.

De magnitudine sectionis. Ex Antylo.

Cap. XIII

In his qui acruata euacuatione opus habent, magna fissura facienda est, itemq; in quibus crassitiem sanguinis contineri coniectabimus. In quibus uero reuellere & auertere uolumus lationē sanguinis, uelut in reiectantibus, sanguinē, aut quibus de naribus aut alia quadam parte sanguis erumpit, parua uulnuscula incutimus. Non enim indigent euacuatione (quum euacuentur ab affectione) sed retractione ac reuulsionē. Oportet igit in his permittere ut sanguis fluat multo tempore per uenā. Paruis item fissuris utendū est in phreniticis aut mente motis, aut aliis delirantibus, quo cita cōglutinatio uulnusculi fiat: contingit enim ut deliri saepe latenter uinculū manus soluant, & si quidē contigerit magnā esse fissuram, sequitur periculū ex sanguinis eruptione. In parua uero, etiam grumus uulneris osculo insidens, sanguinis eruptionem prohibere poterit. Insuper & paruis fissuris utendum est in paruis uasis, magnis uero in maioribus. Nam si in magnis uasis paruum uulnusculum fiat, necessariō grumi collecti fluxum sanguinis impediunt.

De figura sectionis. Antyli.

Cap. XV

Sectionis figurae tres sunt: transuersa, recta, non pungens sed findens uenam in directum, & inter has media, quae appellatur obliqua. Transuersa igitur utendum est in quibus detractionem omnino non repetere uolumus: Curuato enim cubito oscula fissurae componuntur. Et cōmoda est haec figura, ubi magnam fissuram facere uouerimus. Obliqua uero figura utilis est in quibus detraçtio repetenda est. Et eo quod à uase nō aberramus dum sic secamus. Sed & sanguinis eiaculatio ex obliqua fissura pulchrior aspectu est uidentibus, dum uelut obtorquetur & obuoluitur sanguis in saltu. Oblonga uero in directum figura cōmoda est in his quibus non solum eadem die sectionem reiteramus, sed etiam post unam aut duos dies. Incuruato enim cubito disparantur oscula fissurae. Cōmoda est item in directū fissura his in quibus praeuaticatio labiorum fissura fieri solet. At in hac figura minus speciosa sanguinis eiaculatio contingit.

Quod sit oportunum uenae secandae tempus. Galeni.

Cap. XVI

In omni diei ac noctis hora, necessitate urgente, uenam secabis: ita ut scopum habeas in his qui febriunt, exacerbationis declinationē: In his uero qui aut propter lippitudinem, aut aliud quid eiusmodi absq; febre, uenae sectione indigent, magnitudinem doloris aut inflammationis. Qua enim hora uideris dolorē mitigari uenam secabis. At uero si nihil tale urgeat, melius est mane uenam secare, non statim ubi à somno surrexeris, sed ubi uigilaueris ad horam unam. Sed & quosdam praelauare praestat & praedeambulare. In quibus uero praeseruauionis gratia uenā secamus, licet etiam ab actu consuetarū operationū uenā incidere.

De repetita detractione. Galeni.

Cap. XVII

In quibus simpliciter euacuare uolumus, eadem die iterata detraçtio fiat. In quibus autem reuellere, praestat ut post duos dies fiat, Et in quibus quidem opus

m 2

est mul-

est multa euacuatione, vires autem non sunt fortes, in his euacuationem referuare oportet, & prima detractioe defectuosiore facta, rursus iteratò detrahare, aut si uoles tertium. Quum uero feruentis sanguinis multitudo febrem acutissimam incenderit, uelut in synochis, siue continentibus ibi aceruata euacuatione opus est. Et oportet tentare ut euacuemus usque ad animi deliquium, uirium robore ex pullibus considerato. In aliquibus enim noui sex libras statim esse detractas. Fluente itaque sanguine attendere oportet semper pulsuum tractui, ut ne citra animaduersionem, pro deliquio animi mortem inducas.

De arteriarum sectione. Galeni.

Cap. xviii

Arterias secant medici in temporibus quidē, ob oculorū fluxiones, quū calidē & flatuosa fuerint. Eas uero quæ sunt retro aures, in uertiginosis, & his maximē qui ex diuturnis morbis capitis calidis ac flatuosis laborant. Iam uero & ob alias plurimas affectiones circa caput consistentes diuturnas, quidā secant arterias retro aures. Verum aliqui arteriarū sectiones uerentur, propter sanguinis retinendā difficultatē, & quod dum fissura in cicatricē abit, dilatatio uasis ipsius arteriæ fit, quæ aneurysma Græcis dicitur, & inter tumorum genera recensetur.

Medicamentum sistens sanguinem arteriarum.

Cap. xix

Quum igitur sanguinis eruptio ex incisa arteria consequatur, oportet hanc hamulis attractam totam transversim dissecare. Deinde aloē & mannam thuris terere, & ouorum albumine subigere, & tenellis pilis leporinis medicamentū excipere, & fissuræ imponere. Dicitur autem de hoc amplius, in loco de sanguinis eruptione, inter uulneraria medicamenta.

De cucurbitularum usu. Ex Antylo.

Cap. xx

Neq; in morborū principiis, neq; in corporib; repletis, cucurbitis utemur, sed quū euacuati fuerint totū, & non amplius influxerit parti cui cucurbitæ sunt adhæbendæ & opus fuerit mouere ac excutere & attrahere relicta in parte inutilē fluxionē. Cauendū est autē ne cucurbitā prope mamas affigamus. Nam illabentes in cucurbitas māmē & tumescētes, non facillē sinūt illas tolli. Tunc uero spongij ex calida expressis cucurbitas circū dare oportet: sic enim remittere solēt. Si uero nō sic remiserint, cucurbitæ perforandæ sunt. Illud porro nosse expedit, quod nō solū localis uenę sectio detrimētō est, antequā uniuersum corpus euacuat, per affectas partes sanguinē detrahēs, sed etiā cucurbita. Et uenæ quidē sectio minus est periculosa: pro ratione enim allationis materiæ, etiā sanguinis excretionē facit. Cucurbita uero tum impetu affixionis uiolenter materiā attrahens, tum multum locū occupans, & tamen neq; uasis sensibillē fissurā faciens, attrahit quidem memorabilē materiā, non euacuat autē pro ratione attractæ. Et præcordijs quidē intempestiuē affixa, præsertim in continentibus febribus aut semitertianis, & maximē si etiā mens ægri fuerit turbata, & sensus sit obtusus, strangulatus & mortē eadem die inducit. Capiti uero intempestiuē admota, lethargos, & corporis ac mentis stuporem, & oculos prociduos facit. Quibus autem contigerit ut hæc effugiant, hi omnino in diuturnum capitis affectum huic incidunt.

De scarificatione. Ex Galeno.

Cap. xxi

Venā secare sæpe in anno nō arbitror cōmodum esse: simul enim cū sanguine multus uitalis spiritus excernitur. Quum autē hic frequentius cōsumatur, & tota corporis moles perfrigeratur, & omnia naturalia opera deteriora fiunt. Probo igitur ut ab ignobilioribus partibus, uelut sunt crura, per scarificationem detractio fiat. Optimum autem est hoc auxilium ad conseruationē sanitatis, & ad eandem recuperandam, si fuerit præuaricata. Prodest autem scarificatio etiam oculis diuturna

diuturna fluxione affectis, & alijs capitis affectionibus, itemq; thoracis, & anginae. Oportet aut in unoquoq; membro factas sanguinis in-pilla-iones, post uniuersalem corporis euacuationem, soluere per localem scarificationem.

De sanguifugis Galeni.

Cap. XXXII

Sanguifugas capras una die seruare oportet, easq; pauco sanguine alere, usus aut tempore pars cui admoenda sunt nitro preparet, & aqua dulcissima exacte abluta. Postea e fomento sanguis illinatur, Atq; sic accipiunt sanguifugae ac mitantur in aqua paruâ, & fuliginē ipsarum per spongiâ deterfa sic admouebis: inhaerentes enim non cessant trahere, donec salem aut nitru aut cinerem ori ipsaru inspergamus. Postquam uero exciderint, fouendi sunt loci per spongiâ. Et si sanguis erumpat, gallam ustam, aut linteum ustum, aut spongiam liquida pice imbutam ac ustam, insperge, & supernè chartam aceto madidam impone.

De purgatione, Ex Antylo.

Cap. XXXIII

Eos qui sana habent corpora purgare difficile est, Nā & uertiginosi ac uolubiles sunt ac torquent, purgatioq; difficulter ipsis procedit. Et ad hec cito exoluuntur tales dum purgant. Quū igitur purgare uolueris, præattenuare oportet ac secare crassos ac uiscosos humores & meatus aperire, per quos humores transferuntur ac trahunt a purgatorijs medicamentis. Et serosos quidē ac tenues humores in principio morborū euacuare oportet: In crassis uero ac uiscosis cōcoctio expectanda est, qualis est pituita, & bilis atra. Sed & in omnib, diuturnis morbis semper concoctionē expectare cōuenit. In acutis uero quū cōmotę fuerint materię, etiā in principio pharmacū exhibe, & tamē cū multa cautione. Nam quū humores sunt in motu, lationeq; ac fluxu, timor est ne quod ex uiscerib, natura debile existens materiā cōmotam excipiat, & præsertim thorax. At in una aliqua parte firmatos humores, uelut in uiscerū inflammatione cōtingit, medicamentis aggredi nō oportet, priusquā cōcoquant; quicunq; enim inflāmata in principijs per medicamenta soluere conantur, inquit Hippocrates, a distento quidē & inflāmato nō auferunt quicquā: nihil enim remittit cruda affectio, uerū sana & morbo restentia cōsumunt: dum enim debile fit corpus, morbus dominat, quum aut morbus dominat, perniciēs adest. Proinde materię remouenda gratia utimur purgatorijs medicamentis in cephalęa, uertigine, hemicrania, comitiali, anhelatione, erectæ ceruicis spiratione, coxendice, arthritide, podagra, nephritide, & in affectionibus uelicæ ac uteri diuturnis. Similiter aut etiā ubi fluxus assidue infestauerit aures, aut nares, aut oculos, aut os, aut stomachū, aut totā superficiē: & neq; resiccat ab alijs auxilijs, neq; aliter sisti poterit: solet enim purgatio per aluū fluxiones cohibere. Et in hoc ordine locari potest etiā humoris atræ bilis purgatio, quæ hæmorrhoidarū suppressarū gratia assumi post uenæ sectionē. At antiquæ affectionis emouenda ac expurganda gratia, utimur purgatorijs in resolutione, sideratione, alimentū nō sentientibus, torpore, sopore, grauitate perseverante in quacunq; corporis parte. Ceterū ob corporis tēperamentū transmutandū, utimur purgatorijs in diuturnis febribus, nimirū quotidianis ac quartanis, insania, atra bile, mentis excessu, malo habitu corporis, his qui alimentū non sentiūt propter uitiosum humorē. Insuperq; in elephantia, scabie, lepra, pustulis, morbo pediculari, & in ulceribus spōraneis ac grauib, & affectionib, fluidis. At uero quo circūsus & infestans humor educat, utimur purgatorijs, in aqua inter cutē, & regio morbo. Et hoc loco sunt etiā uētris fluxiones, in quibus purgatoria assumimus: aliquando enim acris & inutilis humor uentris tunicis insidens aut intestinorū, similiter uelut acres glandulæ aut infusiones per anū, irritat intestina, & simul ipsa stimulat, &

lat, & promptitudinē efficit ad excretionē, simulq; per acredinē suā ex circūferen-
tia corporis ac totius molis humorē attrahit. In his igitur consentaneū est purgato-
rijs uti, quo talis humor ex corpore expellatur, & uenter ac intestina pura fiāt. In
summa utendū est purgatorijs medicamētis, in his quibus uires ualide sunt, & uo-
luntas prōpta est, & qui stomachū robustū habēt, & multā inutīlē materiā in cor-
pore colligūt. At pingues & pregraciles ad purgationē inepti sunt. Insuper & qui
multo sanguīne abundāt, & qui assidue animo linquunt, & egrē reuocant, & qui
citō uomūt ex omni occasione. Pueri itē ac senes, & mulieres quibus menses uas-
lidē purgant. Et qui ualde purū habent corpus. Et qui certā habēt uictus rationē.
Et quibus alius est natura adstricta. Et qui dysenteria & coeliaca affectione faci-
lē corripunt. Omnes hi ad purgationē inepti sunt. Incipiendū est autē à bilē pura-
gantibus. Bilem flauam purgantia. Aloē. Cap. xxiiii

Aloē totum quidem corpus non purgat, uerum sitam in stomacho & uentre
ac intestinis bilem, citra molestiam educit, ac placidē unā cum subiectis excres-
centis. Datur itaq; his quibus caput affligitur, propter assiduas fientes ad ipsum
de stomacho euaporationes. Excindit enim inutilium uaporum allationē. Dan-
da est & lippientibus, propter eandem causam, & his qui ob bilis augmentum
sitiunt, quibus lingua & os faciliē resiccatur: & qui circa stomachum ardorem,
aut nauseam, aut molestiam aliquam euerforiam percipiunt. Præbetur & his qui
præter rationem pallidiores facti sunt, & in quibus superfluitates educatione in-
digent, & clyster adhiberi non potest ob aliquam causam. Dantur autem aloēs
drachmē ii, cum aqua mulsā. Commoda est etiam si quis ipsam quotidie sumat,
aut à coena, aut mane ante cibum potus. Tritam itaque aloē corticis citrii suc-
co excipe, aut si is desit, succo brassicæ utere. Habeant autem hinc formatae pilu-
lae ciceris magnitudinē. Et dato tria aut quinque quotidie ei qui opus habet.
Potes & cum terebinthina ipsam efformare, & cum melle cocto. Oportet autem
in deglutendo, aut postea absorbere aquam mulsam. Purgatoria equidem me-
dicamenta omnem causam ex corpore extrahunt, instar cucurbitæ, principalis-
bus partibus inhaerentia, ipsaq; per uentrem euacuantia.

Scammonia.

Cap. xxv

Scammonia flauam bilem maximē educit. Inducit autem stomachi dolorem,
& graue olet, ac iniucunda est, & ualde siticulosa. Quā enim omnia purgatoria
stomachū infestent, aloē excepta, scammonia plus omnibus illi molesta est. Vi-
tanda igitur est his qui debilem stomachum habent, & febricitantibus: quum es-
nim leuissima sit, faciliē abripitur in corpus, & omnem in ipso immunditiam com-
mouet, prohibetur autem à febrili calore, ut ne superfluitates ad excretionē du-
cat. Danda igitur est his qui bonum stomachum habent, & non feбриunt, atque
non faciliē uomunt, & non faciliē animo linquuntur. Dantur ex ea scrupuli duo
plus minus, pro uirium ratione. Ammiscetur ipsi sal, & thymi coma, aut pule-
gium. In his uero qui ferre possunt, præstat aloē miscere. Datur & per se cum
melle, aut pitisanæ succo, si clanculum exhibere uolumus.

Peplium.

Cap. xxvi

Peplij semen, aliquando uero & ramulos simul, in umbra siccata, tusa ac cri-
brata dato, scrupulorum quatuor pondere, in aqua mulsā, adstillato modico
aceto. Nam post flauam bilem, etiam nigram & pituitā ducit. Et flatus dissipat,
quemadmodū etiā Hippocrates alicubi dicit. Maximē igitur conuenit flatuosis
affectionibus, quæ sanē atram bilem laceffunt & auspicantur. Cōuenit etiā sple-
nis inflationibus diuturnis, uteri item ac colicis, & laxis abdominis tumoribus.

Veratrum

Veratrum nigrum.

Cap. xxviii

Veratrum nigrū atram & flauam bilem ex toto corpore trahens, infernè expurgat, nō tamen cum ulla difficultate. Quapropter etiam febrilentibus per circuitum & diu, ipsum exhibemus. Datur & furiosis, & hemicranicis, ac diuturno capitis dolore afflictis. Maximè uero idoneum est uisceribus, & utero & uellicæ, si purgatorio medicamento opus habent. Maxima uero ipsius uis est, priuatim educere si quid corruptoriū sanguini fuerit ammixtū. Vnde etiam in diuturno regio morbo cōmodum est, & ad asperitates cutis, uelut sunt lepræ, impetigines, & similia. Est & elephantiasi utile. Dantur ex eo scrupuli tres plus minus, ita ut tenuia circa radices lignula paululū in aqua madefiant, deinde auferatur cortex, et sicceetur in umbra tundaturq; ac cribretur. Datur cum passo aut aceto mulso. Condimenti porro gratia addere oportet ipsi, petroselini & dauci parum. Si uero efficacius purgare uolueris, milce & de scammonia parum.

Bilem atram purgantia.

Cap. xxviii

Atram bilem ducentibus utendum est præcipuè in melancholicis atra bile uexatis, stomachicis, his quæ faciliè irritantur, iracundis, homines auersantibus, secessum querentibus, & his qui in refectione uirium, purgatione opus habens, & in habitibus obaridis & parum musculosis, & præsertim in autumno feruente.

Epithymum.

Cap. xxix

Epithymum atram bilem infernè purgat. Dantur ex ipso contuso ac cribrato perfectis scrupuli xii, cum passo & aceto mulso ac modico sale. Confert affectionibus flatuosis & hypochondriacis præcordiorū, & quibus iecur grauatur, & difficulter spirantibus. Similiter autem uelut epithymū purgat flos in stoebe enascens, & flos qui in thymbra nascitur, atq; epithymbron appellatur, uerum uterq; uiribus debilior est. Polypodium.

Cap. xxx

Polypodium bilem maximè nigram ducit & pituitam. Dantur radices purgatæ scrup. vi, affusa aqua mulsa diluta. Potest & super balsamentum deradi, ac comedi ante prandium. Purgat etiam mediocriter ac citra molestiam, radix cocta in iure gallinaceo, & in ptiiāna.

Pulegium, Tragoriganum, Leucanthemum, Alysson.

Cap. xxxi

Pulegium ducit atram bilem acetabuli mensura potum in aqua mulsa. Similiter & tragoriganum, & parthenium, quod & leucanthemum uocatur. Dantur singulorū scrupuli sex. Sed & alysson similiter purgatiuum est. Danturq; etiam ipsius scrupuli sex. Præstat autem hæc dare cum aceto, & modico sale, ex aqua, ita ut arida trita potui inspergantur.

Armenium.

Cap. xxxii

Armenium quo pictores utuntur purgat atram bilem, & quicquid crassi ac uisco si sanguini ammixtū est. Datur melancholicis, & elephantiasi laborantibus, ac cōsimilibus, & in rheum affectionibus, & anhelosis. Dantur ex eo scrupuli plus minus quatuor.

Centarium minus.

Cap. xxxiii

Centarium minus crassissimam bilem purgat & mucum. Quare cōuenienter datur splenicis & coxendicū morbo affectis. Bibitur eius decoctum, ubi coctum fuerit in aqua. Sint aut centaurij scrup. vi, aquæ mensura hæminæ. coquantur ad medietatem.

Pituitam ducentia.

Cap. xxxiiii

Pituitam ducentium usus est in habitibus frigidioribus, ætatibus item ac morbis frigidioribus, uelut sunt resoluti, siderati, & qui laxis tumoribus tument. Et in his qui multa & crassa emungunt, & qui ex coxendicum morbo a pituita infestantur, & in aqua inter cutem.

m 4 Colocynthis

Colocynthis.

Cap. xxxv

Colocynthis purgat pituitam & bilem & muscosa. Vnde neruorū neruoforumq; corporū purgatiua est. Datur igitur conuenienter in omnibus capitis affectionibus, & in erecta ceruice spirantibus ac similibus. Et in coxend. cū morbo, & arthriticis. Et ad diuturnas renū ac uelicæ affectiones. Est & alijs morbis cōmoda, qui ægrè excuti possunt, & indurata affectionem habent. Dantur ex medulla eius scrup. i. i. in aquæ mulsæ cyathis duobus. In debilioribus scrupulus i. Eligenda est alba & tenera medulla. Nam aridior & nigra mala est. Tunc datur aut & teratur diligenter, & cribretur saepe. Et usus tempore leuigetur ualde bene in mortario cum aqua mulla. Solet enim tale quiddam pati. Nam tussa priusquam madefit, tenuissima apparet, ubi uero in aquā multam iniecta fuerit ac macerata, intumescit adeo ut uix cribratam esse credas. Itaq; tumida ipsius partes aliquando inhaerent uentri aut stomacho, & praesertim in uolucris intesti norū, propter molliciem: & quā acres sint natura ac mordaces, adhaerentes ulcerant intestina, & affectiones neruorū per cōsensum inferunt, torminaq; ac cōtractiones. Quare multa animaduersione opus est, ut leuissimā ipsam faciamus cū aqua mulla. Quod si mitius purgare uolueris, sumito colocynthidem iuste magnitudinis, eamq; aperito supernè, & semen totū eximito. Deinde quicquid romenti speciem praese fert in ipsa, rursus citra semen in ipsam indito, & repletam ipsam sapa aut uino dulci ueteri, per diē ac noctē macerari finito. Deinde excolatū per pannū uinum calefactū bibendū dato. Purgat optimè & morbum regiū, & eos qui pustulas liuidas circa cutē habent. Tithymalus, Ca. xxxvi

Tithymalus pituitam & bilem ducit. Dantur ipsius ramuli uirides accepti, & in testaceo quopiam uase parū fricti, deinde triti. Miscentur aut ex ipsis scrupuli quatuor aut tres cum polenta in aqua, & bibuntur. Nam aridiores ramuli impotentiores sunt. At uero tithymali characitæ radicem accipe & siccato in umbra. Deinde usus tempore corticē detrahito, tundito ac cribrato, & quatuor scrupulorū pondus in uinū dulce uetus mittito, & per diem ac noctem macerari finito, & excolatū per pannū uinum calefactū bibendum dato. purgat maximè, ut aliqui in omnibus ipso utantur uelut quopiam arcano. Bene & citra molestiā purgat etiam succus tithymali circa aquas in humidis locis ac syluis nascētis, exceptus sale, aut pane arido trito, ita ut ex hoc nucis auellanae magnitudo detur cū frigida aqua. At succus tithymali à quibusdā datur, aut cū caricis, aut cū polenta, guttae quatuor aut quinque. Verū ualde exulcerat linguā, & partes circū circa sitas, & potus multū calorem in uentre facit. Ilium, Cap. xxxvii

Ilij corticem siccato, tundito, ac cribrato: & ex eo scrupulos v. aut vi, dato, macerans uelut dictū est in passo & excolans, ac passum ipsum exhibens. Purgat aut magis pituitam. Quā diu uero uolueris ferri uentrem, ne ablues annū aqua, sed linteo deterge. Quum autem satis purgatum te putaueris, laua anum aqua frigida, & manum ac pedum extremitates aque impone, & sistetur fluxus.

Elaterium.

Cap. xxxviii

Elaterium purgat pituitam & bilem. Dato obolos tres cum lacte recens multo heminae unius mensura. At obolus habet siliquas tres.

Granum cnidium.

Cap. xxxix

Granū cnidium purgat magis aquosa ac serosa. Purgat etiam pituitam & bilem moderatè. Est aut feruens & acutissimū. Dantur ex eo grana triginta. Si uero mitius purgare uoles, dato grana uiginti, aut quindecim. Dato aut inter nam granorū partem tritam cū polenta, & uino immixtam bibere iubeto, à potu uero

uero parum olei rosacei aut melini absorbere oportet, ne fauces exurantur. Præstat autem terere & efformare catapotia cum cocto melle.

Agaricum.

Cap. XL

Agaricum purgat pituitam & bilem, sed non acutè. Dantur drachmæ duæ cum aqua mulsa aut aceto mulso. Est autem stomacho incômodum, eo quod leue sit, & in ipso supernatet.

Cnici semen.

Cap. XLI

Cnici semen purgat pituitam, non tamen fortiter. Huius seminis drach. v. tritas mitte in ius gallinæ aut pitisanæ, & excolatum bibendū præbe. Quidam internam cnici partem drachmæ pondere accipiunt, & terunt cum amygdalis & aniso, & cum melle cocto catapotia formant ac exhibent arquato affectis. Et conueniens quidem, sed leuius est hoc.

Lathyris.

Cap. XLII

Lathyris pituitam magis ducit. Danda sunt eius grana xv. maiora, aut uti g'n de minoribus. Et qui quidem efficacius purgari debent, his præcipiendū est ut manducent. Qui uero non ualida neq; multa euacuatione opus habent, integra deuorent, maximè si uitiosum stomachum habet is qui accipit.

Aristolochiæ clematidis semen.

Cap. XLIII

Aristolochiæ clematidis semen siccum tritum duarum drachmarum pondere bibitur, & purgat pituitam ac bilem. Est autem stomacho gratum.

Mercurialis.

Cap. XLIII

Si mercurialis tenera folia cocta comederis, abunde stercus expellunt. Si uero decoctum uino mixtum biberis, moderatè stercus educit.

Cucumis syluestris.

Cap. XLV

Cucumeris syluestris radice cortex, duorum obolorum, hoc est, siliquarum sex pondere, potus cū aqua mulsa, ducit pituitam multā citra molestiam, ita ut neq; stomachum lædat.

Syrax.

Cap. XLVI

Syrax pinguis flauus datur drachmarum duarum pondere, cum æquo pondere terebinthinæ in pilulas coactus. Ducit pituitam multam citra molestiam.

Thymus.

Cap. XLVII

Thymi cacumina tusa trita dato cum posca, & modico sale, ad drachmarum quatuor aut trium pondus, purgat enim citra molestiam & abunde pituitam ac bilem.

Cyclaminos.

Cap. XLVIII

Cyclamini radice leuissimæ tritæ drachmæ tres aut quatuor pro uiribus cum aqua mulsa potæ, purgant pituitam & bilem. Maximè uero per sudorem purgant. Quare qui bibit reclinari debet, & corpus integumentis ponere & sudorū exclusionem iuuare.

Scordium.

Cap. XLIX

Scordium tenuissimè tritum, duarum drachmarū pondere ex aqua mulsa potum, ducit pituitam.

Chamæpitys.

Cap. L

Chamæpityos drachmæ duæ tritæ, & cum ficibus aut cocto melle in catapotia coactæ & exhibitæ, multam pituitam ducunt.

Bdellium.

Cap. LI

Bdellium arabicum pellucidum & flauum, drachmarum duarum pondere tritum potum cum aqua mulsa, purgat pituitam.

Aquam ducentia.

Cap. LI

Aquam ducentibus utendū est, & in hydropicis qui ex ascite intercute aqua laborant, & in foeminis qui diuturno albo fluxu uexantur, & ad fluida ulcera.

Squama.

Squama æris.

Cap. LIII

Squama æris aquam purgat. Datur drachma una & dimidia cū aqua mulsa. Non solum autem aquam ducit, sed etiam pituitam. Ducit porro aquam etiam aliqua ex relatis, uelut granum cnidium, & cnicus. At cucumeris syluestris radix conuenientissima est hydropicis, minimeq; molestiam affert.

Euphorbium.

Cap. LIIII

Euphorbium ducit quidem pituitam, magis uero aquam. Est autem acutissimum inter ea quæ ego noui & feruentissimum. Vnde & colicis datur, & his qui frigidiores uentres habent. Reliquos fortiter turbat, & ualidam sitim inducit. Miscetis cum ipso aliqua odorata semina, dans ex eo obolos tres cum aqua mulsa. Præstat autem cum melle cocto in catapotia ipsum efformare.

Chamelæa.

Cap. LV

Chamelæa cocta in aqua mulsa & pota, aquosa magis ducit. Purgat autem etiam pituitam & bilem. Immittantur ex ea drachmæ quæq; in duas heminas, aquæ, & fiat coctura ad dimidias. In fine cocturæ mellis moderata portio addatur, & modica facta coctura, coletur ac bibendum præbeatur. Aliqui cōtusæ tritæ chamelææ drachmas duas cū duplo comæ absinthij cōmittunt, & cū melle formata catapotia præbent.

Sanguinem purgantia.

Cap. LVI

Sanguinem purgat, porri capitati succus, mercurialis, uiola alba, malua syluestris, saluia. Methodus componendi purgantia pharmaca. Cap. LVII

Quæ quidem per se purgare possunt simplicia pharmaca, talia sunt uelut iam expressimus ac præscripsimus. Non fuerit autem difficile etiam mixturas ipso rum facere, his qui ex iam prædictis singulorum uires didicerunt. Si quis enim ex relatis duo miscere uelit, dimidium pondus de dosi singulorum accipere oportet: Si uero tria, tertiam iusti ponderis partem: Si uero plura, iuxta eandem proportionem. Facimus aut ipsorum mixturas, ubi non fuerit unus humor qui infestatur, uelut pituita, aut bilis, aut aqua, sed omnia simul. Et si quidem putauerimus æqualiter redundare humores, æqualiter ipsa miscemus in compositione. Vbi uero unus plus alijs redundarit, amplius ammiscemus de his quæ talem humorem euacuare possunt. Primum igitur uolo ea mollientia pharmaca aluum subducentia subiungere, quæ in cibo sumuntur. In cibo enim medicamentum optimum est, inquit Hippocrates: quo etiam sanis naturaliter adstrictam aluum habentibus, hæc speculatio utilis fiat. Fortassis autem & his qui se ex morbo res colligunt. Insuperq; his qui ex diuturno morbo ægrotant, hæc pharmaca auxiliaria fient, si unum aut alterum simplex pharmacum iucundis edulij fuerit ammixtum, aut ad uentrem molliendum, aut si etiam redundantem humorem paulatim & latenter euacuare uolumus. Incipiamus igitur à potionibus propomatibus appellatis. Vini purgantis bilem præparatio. Ex Theone. Cap. LVIII

Calisæ unc. i. scammonij unc. i. Vini sextar. v. Hæc tenuissimè trita linteolo illigantur, & hoc exacte constrictum in uinum suspendatur, ac sinatur ad dies quinque. Deinde ex hoc uino dato ante cibum potionem perfectam, cum aqua calida. Creditur bilem purgare.

Vinum pituitam ducens.

Cap. LIX

Lathyridum purgatorum unc. i. spicæ nardi drach. iii. Vini sextar. v. præparata uelut prædictum est, & utere. Creditur pituitam leuare.

Vinum melancholicis commodum.

Cap. LX

Polypodij unc. i. tusam, cribratam, & linteo illigatam in uini sextarios. v. suspendito, & ad dies septem finito macerari, Et dato potionem uelut dictum est.

Aliud

Aliud uinum polypodites.

Cap. LXI

Vini dulcissimi sextar. VI, mastiches sextantem, epithymi drach. IIII, radicum polypodij non ueterum derafarum lib. II, radices polypodij purgatas tunde in crassiores partes, & coque cū passo, immisso etiam epithymo ac mastiche. Quū autem ad tertias redactū fuerit, aufer ab igne & frigesieri sine, & ad excolatum spicæ nardi contusæ ac cribratæ scrupulos. III, insperge. præstat autem hanc in mortario cōnure, deinde sicilibus paruis picatis excipere, & osculo uasorum oblito adseruare. Dabis autem in prandio potionem magnam inter medios cibos, aqua calida temperatam. Est hoc iucundissimum & efficax. Preparatur hoc in Babylone Phœnices, laudaturq; ac quoquo uersus nauibus aduehitur.

Vinum mulsum stercus exigens.

Cap. LXII

Vini sextarios V, mellis sextar. I, mastiches quadrantem, Mastichen tritam & linteo illigatam in uino mulso suspende, & ad dies septem macerari sine. Et dato ante cibum potionem unam calida aqua temperatam, Optime hoc stercus educit, & stomacho commodum est, Euacuat etiam pituitam.

Vinum mulsum flauam bilem ducens.

Cap. LXIII

Scammonia drach. I, spicæ nardi drach. I, tusa cribrata & linteo illigata, in uini sextarijs V, macerato, & mellis sexta. I, & utitor.

Vinum mulsum pituitam ducens.

Cap. LXIII

Cnici seminis purgati drach. IIII, & uini sextar. V, & mellis sextar. I, accipito, Et enicum in crassas partes cōtusum ac linteo illigatum macerato, utitorq; uel dictum est.

Vinum mulsum atram bilem euacuans.

Cap. LXV

Polypodij drach. II, Vini sextar. V, mellis sextar. I, tunde, cribra, macera, & utere.

Conditum ad flauam bilem.

Cap. LXVI

Piperis drach. III, scammonia unc. I, seminis apij drach. I, uini sextar. V, mellis sextar. I, terito species per se primum, deinde etiam cum melle. Et postea uinum adde, & sine ad dies quinq; & utere.

Conditum pituitosis.

Cap. LXVII

Lathyridum unc. I, piperis unc. I, seminis anisi, apij, singulorum unc. I, Vini sextar. V, mellis sextar. I, præpara uelut dictum est, & utere.

Conditum melancholicis.

Cap. LXVIII

Polypodij unc. I, piperis unc. I, seminis apij drach. I, Vini sextar. V, mellis sextar. I, præpara uelut dictum est & utere.

Absinthati præparatio flatus & stercora euacuans.

Cap. LXIX

Ligustici drach. I, S. cumini drach. I, spicæ nardi scrup. II, floris iunci odorati scrup. VI, mastiches scrup. VI, Vini sextar. V, mellis sextar. I, tusa ac cribrata terito cum melle, & uinum ammisce, excipe & utere post dies quinq; ante prandium.

Absinthatum flauam bilem ducens.

Cap. LXX

Costi drach. I, mastiches drach. IIII, rosarum siccarum drach. II, spicæ nardi drach. II, floris iunci odorati drach. I, aloës unc. I, scammonia unc. I, mellis sextar. I, uini sextar. V, præpara & utere uelut dictum est.

Absinthatum ad pituitosos.

Cap. LXXI

Mastiches drach. IIII, costi drach. IIII, folij indici drach. I, spicæ nardi drach. I, floris iunci odorati drach. I, calisæ drach. I, polypodij unc. I, mellis sextar. I, lathyridum purgatorum unc. I, Vini sextar. V, præpara & utere uelut dictum est.

Rosatum flauam bilem ducens.

Cap. LXXII

Rosarum exunguium recentiu lib. I, uini ueteris sexta. VI, mellis sextar. I, Rosa ad diem unam præficcatæ mittuntur in uinū, & macerantur per dies nouem. Deinde

Deinde uinum excolatur & adijcitur melli prius trito cum scammonia unc. i. oportet autem tundere ac cribrare scammoniam, atq; sic leuigare cum melle. Postea uero condatur in uasa. quae exacte cooperta suspendes in puteum aquae frigidae, & sines per dies septem aut nouem. Deinde extrahe & alios triginta dies sine, & sic propomate utere.

Rosatum pituitam & serosum ac atrae bilis humorem euacuans.

Cap. LXXIII

Si praecedens descriptio acceperit grani cnidij unc. i. absq; scammonia, euacuat serosum humorem & pituitam. Si lathyrida solum, pituitam euacuat, Si epithymum solum, atrae bilis humorem expurgat.

Mellis rosacei purgatorij preparatio.

Cap. LXXIII

Mellis lib. i. succi rosarum lib. i. mastiches drach. ii. piperis drach. ii. zingiberis drach. ii. scammoniae scrup. viii. coquito mel cum rosarum succo ad compagem mellis liquidioris. Deinde insperge scammoniam & mastichen leuissimè trita, & parum coque, & ablata ab igne cum reliquis in mortario unito & seponito, & dato cochliariū. Euacuat flauam bilem. Quidam uero simpliciore preparationem facere uolentes, praemacerant modica aqua scammoniam, deinde seruefaciunt, & detracto superstante ipsius concremento excolant, & leuigatam ad mel rosaceum adijciunt, & simul coquunt, uelut dictum est. Si uero lathyridum unc. i. acceperit praedicta preparatio mellis rosacei, absq; scammonia, purgat pituitam. Si uero polypodij acceperit unc. i. atrae bilis humorem euacuat. Verum efficacior fit, si pro polypodio epithymum acceperit.

Aceti purgatorij preparatio.

Cap. LXXV

Scammoniae unc. i. acetis sextarios. v. terito simul, & finito ad dies quinque, & dato ad intinctus cum cibo cochliarium. i. aut. ii. purgat flauam bilem. Si uero pro scammonia, inieceris lathyridum unc. i. purgat pituitam. Si uero epithymi unc. i. inieceris, euacuat atrae bilis humorem.

Aceti mulsi purgatorij preparatio.

Cap. LXXVI

Mellis despumati sextar. i. acetis acerrimi sextar. i. coquito simul usq; ad mellis compagem, deinde adijce epipetri triti ac cribrati unc. i. utere ad intinctus: aut cum aqua dato bibere cochliaria. ii. circa horam tertiam ieiunis. Euacuat bilem. si uero non affuerit epipetrum, scammoniae inijce unc. i. Aliud acetum mulsum. Mellis despumati sextar. i. acetis sextar. i. coquito simul ad compagem. Deinde inijce cnici internam partem purgatam & tritam pondere unc. i. & sine ad dies quinque & utere ut uoles. purgat pituitam. Aliud. Mellis & acetis singulorum sextar. i. coquito, & thymi leuissimè triti unc. i. addito, & finito per diem, ac utitor. euacuat atrae bilis humorem. Omnia uero quae praedictis acetis mulsi preparationibus inijciuntur, linteolo illigata macerentur.

Acetum mulsum purgans omnes uitiatos humores.

Cap. LXXVII

Comae hyssopi sesquiunciam, origani unc. i. pulegij sesquiunciam, marrubij unc. i. epithymi, seminis cnici, cacuminum thymi, agarici, singulorum unc. i. polypodij sextantem, scammoniae unc. i. scrupul. vi. acetis sequisextariū, aquae sextar. i. mellis lib. ii. sapae sexuncem. Herbas praemaceratas aceto & aqua ad tertias decoquito & excolato, & mel addito, ac rursus coquito ad bonam compagem. Et scammoniam, epithymum, agaricum, trita ac tenuissimo cribro excrescita, in mortario ammisceto. Et ubi moderatè purgare uolueris scrupulos x. exhibeto. medio uere modo scrup. xx. At uero fortibus perfectam dosim exhibere potes, unciam i. Quidam etiā alypiadis unciam i. addunt. Aliud flatus euacuans.

cuans. Aceti sextar. i. mellis sextar. i. baccarū iuniperi drach. iiii. piperis unc. i. zingiberis unc. i. petroselinī drach. iiii. seminis apij, ammiij, ligustici, anisi, epithymi, lingulorum drach. iiii. cumini drach. ii. seminis anethi drach. ii. polypodij unc. i. prępara & utere uelut prędictum est. Conuenit colicis.

Acetum mulsum quod colicis ac nephriticis per sedem infunditur.

Cap. LXXVIII

Centaurij unc. i. alypiadis recentis sextantem, rutę uiridis sextantē, marrubij, agarici, calię, iridis, hyssopi, pulegij, singulorum drach. iiii. scillę unc. i. acetī sextar. iiii. mellis sextar. i. omnia aceto macerata ad tertias coquito & colato, & adiecto melle ad mellis liquidioris compagem coquito. Deinde scammonię tenuissimę tritę unc. i. spicę nardi unc. i. purgatorij medicamēti ex foeniculo unc. i. inspergito, & unitis utitor hoc modo. ubi pręeuaris colicū per clysterē stercore educentem, accipe acetī mulsi cochliariū, & dissolue cū succo pitulę, & infunde. Vtere similiter & in nephriticis pituitosioribus. Euacuat pituitam citra molestiam & sanat.

Acetum mulsum amarum. Cap. LXXIX

Foeniculi uiridis unā cum radicibus fasciculum i. apij cum radicibus, rutę uiridis singulorum fasciculum unum, acetī sextar. ii. & dimidium, hoc est libras v. mellis sesquilibram. Coquito herbas cum aceto ad tertias & excolato, & mel ad acetum indito, & coquito donec mellis liquidioris cōpagem habuerit. Deinde aloēs primarię unc. i. in mortario terito ac cribrato, & ad ipsam paulatim acetum mulsum addito, unito, excipito ac utitor: exhibetur ex eo cochliarium unum, ita ut ab ipso absorbeat aqua calida. Caput egregiē purgat. Est autē & stomacho gratum. Acetum mulsum uentrem emolliens, Prosomilitę, Pulegij, origani, thymbrę syluestris, polypodij, singulorū unc. i. radicū apij drach. iiii. radicū anethi scrup. vi. agarici, epithymi, scammonię, singul. unc. i. mellis sextar. i. acetī sextar. i. macerato species & coquito uelut acetum mulsum. Vbi uero deuenit ad bonam cōpagem, tollito ab igne, & adijce scammoniam, epithimum, & agaricum. Et dato quadrantem cum aqua calida.

Posca aluum emolliens.

Cap. LXXX

Cymini quadrantem, hyssopi sesquiunciam, ammiij sesquiunciam, pulegij sesquiunciam, petroselinī drachm. iiii. cacuminum thymi drach. iiii. zingiberis unc. i. seminis cnici unc. i. piperis drach. iiii. epithymi drach. iiii. salis capadocici dodrantem, Tundito & cribrato, & aridum seruato, Vfus tempore dato cochliarium i. ex posca.

Alia posca ualde clara.

Cap. LXXXI.

Cumini quadrantem, pulegij sesquiunciam, foeniculi sextantem, seminis apij sextantem, anisi sextantem scrup. vii. scammonię trientem, epithymi quadrantem, salis communis bessēm aut libram i. Tundito, cribrato, & dato cochliā, i. ex posca, purgat imperuerse.

Gari purgatorij pręparatio.

Cap. LXXXII.

Scammonię drach. iiii. piperis grana l. gari nigri quadrantē, misce, utere ad intinctus, aut quomodo uolueris, purgat bilem. Aliud, Cnici grana xx. piperis grana l. gari quadrantem. Internam cnici partem tritam unito ac utitor, purgat pituitam. Si uero pro cnico adieceris lathyridas, efficacius facies. Si uero polypodij drach. iiii. inieceris, atrę bilis humorem euacuat. Efficacius autem euadit, si pro polypodio, epithymi drach. iiii. aut tres inieceris.

Mellis emollientis pręparatio.

Cap. LXXXIII.

Foeniculi uiridis manipulū i. aque sextar. iiii. coquito ad tertias, colato, & adiecto mellis lib. i. & coquito ad cōpagem mellis, & dato ex eo cochliaria, iiii. purgat

n gaf

gat bilem flauam. Si uero pro foeniculo, seminis cnici internam partem adieceris uncia i. pondere, purgat pituitam. Si uero polypodium aut epithymum eodem pondere simul coques, purgat atræ bilis humorem.

Garum aquosum.

Cap. LXXXIII

Gari unc. i. piperis grana L. seminis apij obolum i. hoc est siliquas IIII, mellis cochlea. i. aquæ quadrantem, scammonia scrup. i. s. aut II. Reliquis coctis & ab igne ablatis ammisceto scammoniam, & dato ante cibū. Si uero pro scammonia, seminis cnici granorum uiginti internam partem adieceris, purgat pituitam. Si uero polypodij drach. IIII, adieceris, purgat atræ bilis humorem.

Garum uinosum purgatorium.

Cap. LXXXV

Gari conchulas. II. uini conchulam. i. piperis grana XX. ligustici scrup. i. scammonia scrup. i. mellis parū, utere, Purgat bilem. Si uero cnici granorum XX, internam partem inieceris pro scammonia, purgat pituitam. Si polypodij drach. IIII, atram bilem.

Garum acetosum purgatorium. Cap. LXXXVI

Seminis apij drach. i. piperis grana L. cumini obol. i. succi cyrenaici siue laseris tantundem, scammonia scrup. i. gari unc. i. aceti quadrantem, utere purgat bilem. Si uero pro scammonia, cnici granorum uiginti internam partem adieceris, purgat pituitam. Si uero polypodij drach. IIII, atræ bilis humorem euacuat.

Iuscula emollientia.

Cap. LXXXVII

Aquæ sextar. i. olei conchulam. i. gari parū, salis pauxillum, anethi modicum omnia donec succulenta fiant coquito. Deinde granorū cnici XX, internam partem indito, & dato. Euacuat pituitam. Si uero polypodij drach. IIII, contusas ac cribratas insperferis iusculo perdicis aut phasian, purgat atræ bilis humorem. At uero scammoniam non probo in iuscula coiectam, eo quod experimento compererim inidoneam esse.

Lac purgatorium.

Cap. LXXXVIII

Lactis asinini aut caprini heminam i. scammonia scrup. II, misceto ac exhibeto. purgat bilem. Si uero cnici granorū XX, internam partem inieceris, euacuat pituitam. At uero polypodium aut epithymū non probo ut lacti miscantur, eo quod tingant lac, & non potest hoc latere accipientem. Plerique enim ob timiditatem purgari non uolunt.

Oliuæ purgatoria.

Cap. LXXXIX

Piperis drach. i. epithymi drach. II, silphij drach. i. mentę uiridis drach. i. comæ pulegij drach. i. cymini drach. i. rutæ drach. i. scammonia unc. i. palmularū pinguium sextantem, mellis sextar. i. aceti sextarij dimidium, oliuas muria conditas CXX, numero, omnia prædicta per se tenuissimè terito, & deinde cū aceto multo. Postea oliuas singulas ter lancinatas inijcito, & finito ad paucos dies ac utitur, dato in cibo oliuas tres, & iusculi cochliarium i. aut II, pro uiribus.

Oxyporiæ purgatoria.

Cap. XC

Si ad concoctorium medicamentum quod ex malis cotoneis parari solet, cochlearij unius mensura acceptū, ammiscueris scammonia scrup. II, flauā bilem citra molestiā euacuabis. Si uero lathyridū grana XX, addideris, purgat pituitam. Si polypodij aut epithymi drach. IIII, addideris, purgat atram bilē. Similiter aut si quoque diospolitico concoctorio pharmaco uteris, idē efficies, & maxime in quibus pituita in thorace residet. Si uero ad concoctoriū ex calamintha pharmacū ammiscueris medicamenta purgantia, euacuabis omnē circa cutē corporis uitiosum humorem, lepras, impetigines, & similia.

Oxyporiū ex palmulis. Ca. XCI

Zingiberis, piperis, cumini, petroselini, singulorū unc. i. scammonie infermento assatæ ac tenuissimè tritæ unc. i. s. palmularū pinguiū carnis trientem, foliorū rutæ unc. i. mellis lib. i. aceti sextar. i. Coquito mel & acetum & palmulas, donec reliqua

reliqua fiat tertia aceti pars. Deinde rutam cū palmulis terito, & arida leuissimē trita inspergito ac unito, & paulatim acetum mulfum coctum addito, unito ac utitor, uelut admirando & multa experientia cognito pharmaco. Perfecta dos sunt cochliā. II. ad adstrictam aluū, dum adhuc in uigore est medicamentum. Si uero nō ualde fuerit aluus adstricta, pro mensura illius adstrictionis exhibendum est pharmacum, aliquando cochliarium I. s. aliquando I. solum. Subducit egregiē flauam bilem. Quapropter & in morbo regio utiliter exhibetur, & tertianarijs, ubi concoctio bona in urinis apparuerit, purgat etiam pituitam moderate. Vtere confidenter in omni tempore uelut imperuerso ac minimē curioso. Ego uero etiam his qui absq; rigore febricitant dedi, postquā apparuit concoctio in urinis, & cōfestim sanati sunt. In quibus autem atram bilem purgare uolueris, adde ad prædictam dosim, epithymi scrup. I. aut pro uiribus. Si uero pituita multa insidet, adijce agarici aut isij scrup. I. purgat enim moderate pituitā.

Purgatorium ex cotoneis malis.

Cap. XCII

Malorum cotoneorum maturorum, magnorum, odoratorū, fermento oblitorum & assatorū, carnis purgatæ trientem, mellis despumati quincuncem, piperis drach. II. scammoniae drach. V. singula per se terito & unito, ac exhibeto cochliar. I.

Purgatorium ex citrio. Oribasij.

Cap. XCIII

Purgat hoc caput, facit ad stomachicos, coeliacos, & qui non possunt forte purgatorū ferre propter imbecillitatem. Vnde etiam pueris citra noxā datur. Est enim stomacho cōmodum. Citrij corticis ac carnis lib. I. aquæ sextar. I. s. mellis sextarij dimidiū, piperis unc. I. scammoniae unc. I. Citriū in tenues partes secato, & cum aqua ad tertias coquito, deinde colato, & mel ad decoctū adijcito ac coquito ad bonam compagem, & reliquias coctorū citriorum terito, ipsiq; arida tenuissimē trita inspergito, & ubi simul triueris, coctam aquam illam mulfam adijcito, & unitis utitor, cochliar. I. exhibens.

Purgatorium ex fœniculo ualde bonum.

Cap. XCIII

Epithymi, zingiberis, piperis, scammoniae, singulorum unc. I. fœniculi uiridis, rutæ uiridis, apij radicum uiridium, singulorum quadrantem, aquæ sextar. III. mellis libras. III. decocto ad tertias redacto adijce mel, & coque ad bonam compagem. Deinde insperge arida, & exhibe cochliar. I. magnum.

Aliud ualde stomacho gratum.

Cap. XCV

Fœniculi, cumini, pulegij, apij, singulorum manipulum, aquæ sextar. III. coquito ad tertias, & colato, & tantundem mellis addito, & coquito ad mellis compagem, & inspergito in mortario scammoniae leuissimē trita unc. I. piperis unc. I. micasthes trita drach. III. unito datoq; cochliare. I. Conuenit flatuosis.

Purgatorium ex fœniculo quod parari solet ad atram bilem. Ca. XCVI
Scammoniae sextantem, zingiberis, piperis singulorū unc. I. petroselinī scrup. XII. corticis ueratri nigri scrup. VI. epithymi unc. I. mellis libras. III. succi fœniculi lib. III. Coquito succum cum melle ad mellis cōpagem, & affundito paulatim & arida tusa ac cribrata in mortario, & unitis utitor. Datur ex eo cochliā. I.

Purgatorium atræ bilis. Oribasij.

Cap. XCVII

Aquæ sextar. III. mellis dodrantē, epithymi unc. I. Epithymū tufum ac cribratum inspergito, ubi illa simul ad tertias decoxeris. Dato bibendū pro uiribus. Mihi uero uidetur quarta pars exhibenda esse, his aut qui bono habitu præditi sunt, dimidiū.

Aliud purgans atram ac flauam bilem. Cap. XCVIII

Scammoniae, epithymi, singulorū sesquiunciam, petroselinī, zingiberis, mentæ, singulorum drach. II. excipe melle, & exhibe nucis ponticæ magnitudine.

n 2 Pastillus

Pastillus flauam bilem purgans.

Cap. XCIX

Piperis, mastiches, n cum pinearum, passularum enucleatarum, singulorum grana x, cumini grana x v, scammoniae scrup. ii, plus minus, mellis parum, trita simul dato, uelut pastillum. Huius dosi una est, purgat citra molestiam.

Buccella purgatoria.

Cap. C

Fermenti ex similagine libras ii, scammoniae unc. i, seminis foeniculi, cumini, folij malabathri, singulorum siliquas iii, piperis grana xxxiii, salis communis parum, olei & gari cochlia, ii, arida contundito ac cribrato, & cum fermento molito, & facias panes paruos duplam latitudinem miliarefij habentes. Torreto in clibanus, & exhibeo perfectam dosim sextantem ex hoc pane edendam, quocumque quis uoluerit modo, saltem ut ieiunus utatur. Est enim maxime alienum ab omni molestia, purgat bilem.

Aloedaria citra molestiam purgantia. Cap. CI

Aloes quadrantem, agarici unc. ii, scammoniae unc. i, bdellij drach. iii, gummi uermiculati sextantem, excipe succo brassicae, in his uero qui humore flaccidum stomachum habent, succo carnis citrij, & forma pilulas ciceris magni magnitudine, & dato perfectis septem ieiunis. Si uero uoles, etiam ante coenam, & post coenam. Si autem mollire uolueris, tria dabis ex his catapotia. Aliud sine molestia purgans. Scammoniae sextantem, bdellij unc. i, aloes drach. iii, gummi drach. iii, & cum succo brassicae fac catapotia ciceris magnitudine, & exhibe post coenam, si mollire uolueris, tria: Si uero purgare, septem ut plurimum, aut quinque.

Pharmacum pituitam ducens. Oribasij.

Cap. CII

Baccarum lauri recentium sextantem, euphorbij unc. i, mellis quod satis est, ut eclegmatis formam habeat. Datur cochliarij dimidium. Redundantibus humoribus plus datum plus profuit. Vtere uelut optimo. Aliud pituitam euacuans. Seminis anisi, piperis, cassiae, medullae colocynthidis, singulorum drach. iii, grani cnidij, seminis cnici, singulorum drach. iii, mellis quod satis est, ut eclegma fiat, dato perfectis cochlia, i, s. Aliud. Anisi, apij, ammiij, piperis, grani cnidij, seminis cnici, lathyridum, singulorum drach. iii, cassiae drach. ii, mellis despumati quod satis est. Perfecta dosi sunt cochlia, ii.

Purgatorium atrae bilis, Philagrii.

Cap. CIII

Zingiberis drach. i, seminis apij drach. i, succi cyrenaici, piperis, ligustici, singulorum drach. i, epithymi drach. iii, excipe melle ut eclegma fiat, & exhibe cochlia, ii. Aliud. Epithymi, agerici, aloes, singulorum drach. iii, corticis ueratri nigri drach. i, hyssopi, iridis, absinthij succi, singulorum drach. iii, bdellij, gummi, utriusque drach. i. Si uero non affuerit absinthij succus, adijce comae tantundem, & excipe melle, & dato pro uiribus. Euacuat atrae bilis humorem, itemque pituitam.

Bilis & pituitae, & atrae bilis, ac reliquorum humorum, coe purgatorium. Ca. CIIII

Lathyridum, medullae colocynthidis, foliorum chamaelae siccorum, scammoniae, epithymi, polypodij, anisi, singulorum drach. x, cacuminum thymi, piperis, mastiches, carpobalsami, cassiae, seminis apij, chamaepityos siccae, singulorum drach. v, absinthij succi aut comae drach. v, mellis quod satis est ad eclegma. Dato cochliar. i, aut plus pro uiribus. Vtere autem hoc non in omnibus, sed in quibus coniectaueris omnes humores aequaliter in corpore redundare.

Aloedaria emollientia ex rosaceo melle, Philagrii.

Cap. CV

Aloes sex uncem, costi, spicanardi, carpobalsami, floris iunci odorati, singulorum unc. i, cassiae unc. i, agarici drach. iii, croci drach. iii, s. comae centaurij scrup. iii, mellis sextantem, succi rosarum trientem, epithymi unc. i, rhei scrup. viii, asari scrup. iii, ligni balsami scrup. v, mastiches scrup. v, excipe melle rosaceo, & dato pro

pro uiribus. Aliud ex rosaceo melle, molliens uentrem sine omni molestia, Vt re uero ipso ad articulos, & maxime coxendici dolores, itemq; lumborum, Aperit etiam iecoris obstructions. Ilij scrup. VIII, agarici drach. IIII, aloës sextantem, spicæ nardi scrup. VIII, floris iunci odorati scrup. VIII, croci scrup. IIII, calisæ scrup. XVI, costi scrup. VIII, carpobalsami scrup. VIII, mellis rosacei quadrantē & scrup. VIII, terito & formato catapotia cū melle rosaceo, & quinque exhibeto, post coenā quotidie si uoles, aut alternis diebus, aut prout uisum fuerit. Exterget enim stomachum & articulos, præcipue uero purgat pituitam. Est autem cōsuetudo morē prandendū ac coenandum. Aliud bilem & pituitam ducens. Absinthij comestusæ ac cribratæ, aloës tenuissimē tritæ, utriusq; unc. I, excipe succo tithymalli, maxime myrsinitæ, & efformato catapotia phaseli magnitudine, & data III, tantū.

Aloëdarium, ex Philagrío.

Cap. CVI

Purgat hoc bilem & pituitā. Colocynthis medullæ, aloës, scammonia, singulorum drach. V, succi aut comæ absinthij drach. V, excipe succo brassicæ, & fac catapotia, Ciceris magnitudine, & exhibe perfectis XXXI. Aliud, & ipsum multo experimento cognitum. Euacuat aut tres humores. Aloës, epithymi, scammonia, singul. drach. I, colocynthis, agarici utriusq; drach. I, excipe succo brassicæ, Et dato catapotia XV. Aliud quod in Tyro preparatur. Scammonia sextantem, aloës drach. I, mastiches, bdellij, piperis, absinthij, singulorum drach. I, excipe succo medijs citrij ac corticis, & fac catapotia. Et dato septem aut nouē, Si uero uoles probè purgare, habeant catapotia exhibēda pondere scrup. IIII, s, & amplius.

Aloëdarium Oribasij.

Cap. CVII

Conuenit hoc maxime lippientibus. Euacuat aut magis bilem flauā & atram. Scammonia unc. I, corticis ueratri nigri unc. I, salis ammoniaci drach. I, radicis pappi drach. II, piperis, pulegij, utriusq; drach. I, efformato cū aqua pilulas fabis grecis similes. Et dato ex eis septē mediā dosim, ita ut habeāt septē, drachmā unā & obolos duos. Aliud, Oribasij. Aloës sextantē, spicæ nardi, asari, mastiches, croci, xylobalsami, singul. drach. V, calisæ drach. XII, epithymi drach. XII, formato catapotia erui magnitudine, cū decocto pulegij. Et dato XXXI. Hoc quartanarios sanat. Possunt etiā cū melle cocto efformari.

Sal purgatorius. Ca. CVIII

Salis ammoniaci sexuncem, silphij drach. II, seminis apij drach. II, zingiberis drach. I, piperis drach. III, folij indici, spicæ nardi, pulegij, singul. drach. I, scammonia unc. I. Datur cochliariū unū. Euacuat bilem. Aliud. Salis ammoniaci sexuncem, seminis apij drach. I, zingiberis drach. II, piperis drach. III, spicæ nardi drach. I, pulegij scrup. III, s, folij scrup. I, lathyridū unc. I, dato cochliarium. Euacuat pituitam. Aliud. Salis ammoniaci sexuncem, zingiberis drach. III, piperis drach. II, anisi, seminis apij, utriusq; drach. I, folij scrup. I, epithymi unc. I, dato cochliarium. Euacuat atræ bilis humorem. Sal subducens & euacuans circūsitam in ventre ac intestinis pituitam, & reliquos humores. Purgat moderatē etiā bilem. Cōuenientiss. est arthriticis, uertiginosis. hoc usus est quidam stomachicus, & frequenter ex comitali morbo cadere solitus, & ingētes gratias egit. A morbis uero præseruat familiariter ipso utentes. Petroselinij drach. III, mastiches scrup. III, zingiberis drach. III, piperis, euphorbij, utriusq; scrup. VI, salis ammoniaci drach. XV, scammonia drach. VI. Datur cochliarij dimidiū in prandio, cū carnibus uolucris aut gallinæ, aut piscis, ad intinctus. Sit aut pondus scrup. IIII, s. Si uero efficacius purgare uoles, dato ieiuno mane cū succo ptisanæ, aut cū aqua mulsa, scrup. VI, fortioribus etiā VII, dare potes. Debilioribus uero scrup. III, aut IIII, s.

Aliud purgatorium purgans citra periculū non euertens stomachum. Datur

in omni tempore, & omni ætati, & pueris. Educit sterqus & omnem materiam corruptam à capite usq; ad ungues. Remouet furfures & reliquas circa caput nascentes pustulas. Facit ad uertiginem, lippientes. Medetur omnibus circa cutem pustulis. Sanat tertianam, quartanam, quotidianam, in interuallis exacerbationem datum, ubi concoctio bona in urinis apparuerit. Bilem aut præcipue euacuat. Habet hoc modo. Zingiberis, petroselini, epithymi, silphij, ammiij, seminis apiij, cumini, ligustici, piperis, singulorum drach. iiii. scammonia quadrantem & uncia dimidium, talis ammoniaci tostis septuncem, Torreto salem ac tundo cum reliquis. Scammoniam uero tritam cribratam unito in mortario, & dato scrup. i. x. cū succo ptisanæ aut aqua mulsa meraciore. Aliud confimile, acutius experimento constans, imperuerium, euacuat magis bilem. Ammiij scrup. vi. seminis apiij scrup. iiii. piperis, petroselini, epithymi, cumini, singulorū scrup. iiii. s. scammonia unc. i. salis cōmunis quincuncem, salis ammoniaci trientem, datur cochliarium cum ptisana. Aliud experimento constans ualde bonum. Epithymi scrup. xviii. cacuminum thymi scrup. vii. s. salis ammoniaci scrup. viii. piperis scrup. ii. cumini Aethiopici, anisi, utriusq; scrup. ii. mastiches scrup. xii. confusa trita adseruato. Vtus aut tempore scammonia scrup. ii. sumito ac terito cum modico melle, & adijcito aridi triti adseruati medicamenti scrup. ii. tantum, & unito ac dato cum ptisanæ succo aut aqua mulsa.

Purgatorium pituitam ducens, Diogenis.

Cap. cix

Euphorbij, piperis, salis ammoniaci, singulorū unc. i. terito & redigito in puluillum, & dato in ouo sorbili cochliarij dimidium, hoc purgat pituitam solum. Dosis perfecta sunt scrup. iiii. s. Aliud flauam bilem purgans. Scammonia unc. i. costi, spicæ nardi, utriusq; scrup. iiii. s. radicis rubia leuissimè trita scrup. ii. perfecta dosis sunt scrup. iiii. Media, ii. minima i. Aliud atram bilem euacuans. Scammonia in malo assata drach. v. costi, spicæ nardi, utriusque scrup. iiii. s. caryophylli scrup. i. s. radicis rubia scrup. ii. epithymi scrup. ii. perfecta dosis scrup. vi. media, iiii. s. minima, iii.

Purgatorium aquam ducens, Oribasij.

Cap. cx

Ducit hoc item pituitam, piperis, seminis rutæ, scobis siue ramentorū eboris, euphorbij, æquales partes, Dantur scrup. iiii. cū aqua mulsa aut cōdito, facit & ad colicos & hydropicos. Aliud aquam ducens. Petroselini, anisi, cacuminū thymi, singulorū drach. iiii. foliorū chamelææ siccorū drach. x. mellis quod satis est ut eclegma fiat. Dato perfectā dosim cochliar. iiii. s. Si uero efficacius facere uoles, ammisce prædictis squamæ æris drach. vi. Et dato perfectam dosim cochliar. iiii.

De Hieris.

Cap. cx i

Hiera Logadij. Medullæ colocynthidis sextantem & uncia dimidiū, scille assata, agarici, ammoniaci thymiamatis, thymi, scammonia, singul. drach. xx. corticis ueratri nigri, hyperici, utriusq; drach. x. epithymi, bdellij, polypodij sicci, aloës, chamædryos, marrubij, calia, singulorū unc. i. myrrhæ troglodyticæ, piperis albi, longi, nigri, cinamomi, croci, apopanacis, sagapeni, castorij, petroselini, aristolochia longæ, singul. drach. iiii. excipe melle. Dosis perfecta sunt drach. iiii. media iiii. minima ii. adijce ad dosim dū exhibiturus es salis tenuissimè triti cochliarij dimidium.

Purgatorium citra molestiam purgans.

Cap. cxii

Facit ad ischiadicos, & qui per circuitū diuturnè uexant. Medullæ colocynthidis unc. i. nitrī sextantē, terito probè, & dato robustis drach. i. cū aquæ mulsa portione magna ieiunis. Debilibus uero siliquas nouè. Vtere cōfidenter. Aliud exitiū. Ad principia insanie, melancholicis, paralyticis, ischiadicis, uertiginosis, comitiali

mitiali morbo laborantibus, alopecij, capitis doloribus. Veratri nigri, scāmō-
nig, utriusq; drach. V III, salis ammoniaci drach. I III, gūmi drach. I, efformato cata-
potia ciceris magnitudine cū succo brassicæ, & dato perfectis scrup. V. Media do-
sis sunt scrup. I III, Minima, I III, his qui ualde debiles sunt. Est hæc descriptio Ori-
basij, caput LXXVII, desunt aut huic species tres. Purgatoriū medicamentū,
Profomilitæ, epithymi quadrantē, isij unc. I, agarici drach. I II, euphorbij drach.
VI, spicæ nardi, folij, costi, piperis, singulorum drach. XXX, caryophylli scrup. VI.
Dantur ex hoc scrup. VI. cum aqua mulsa. Si uero bilem flauam repereris cum
alijs duobus humoribus redundantem, adde ad hanc dosim usus tempore etiam
scammonia, quantū satis esse iudicaueris pro uiribus. Habet autem hæc dosis, isij
siliquas quinq;, epithymi scrup. I, s, agarici siliquas II, s, euphorbij siliquas III.

Hiera Galeni.

Cap. CXIII.

Medullæ colocynthis sextantem & uncia dimidium, chamædryos, agarici,
scilla assata, ammoniaci thymiamatis, scammonia, corticis ueratri nigri, stœcha-
dis, hyperici, singulorum sextantem, epithymi, euphorbij, utriusq; drach. VIII.
polypodij sicci, bdellij, aloës, marrubij, casia, singulorum sextantem, myrrhae tro-
godyticæ, sagapeni, croci, aristolochiæ longæ, piperis albi, longi, cōmunis, cinæ-
momij, opopanax, castorij, petroselinij, singulorū drach. I III, M. lis quod satis
est. Dato perfectam dosim drach. I III, Mediam I III, Minimā II, cum aqua mulsa
& salis tenuissimē triti cochliario dimidio. Maxima porro est uis utilitas: pur-
gat enim ex profundo uarios humores excellenter, ita ut neq; exolutionē, neq;
tribulationē, neq; debilitatē, neq; inappetentiā, neq; aliā angustia agro accipien-
ti exhibeat. Sed potius facit sperantes & hilares & robustos efficit, ut mirabilis sit
ipsius excellētia. Sanat itaq; hemicranicas affectiones, uertigines, comitiale mor-
bum, insaniam, melancholiam, lethargū & similia, hebetudinē uisus, grauitatē audis-
tus, uocē interceptā, anhelosos, stomachicos, affectiones antiquas, splenicos, ne-
phríticos, colicos, ischiadicōs, arthriticos, podagricos. Ducit menses, Cōuenit tre-
mulis, & resolutis, impetiginē ferā, & omnes circa cutē corporis nascētes pustulas,
& elephantiāsim, & febres diurnas per circuitū repetētes sanat, & omnia maligna
ulcera.

Hiera Archigenis, exēpla ad Marsum de atra bile. Ca. CXIII
Medullæ colocynthis sextantē & uncia dimidium, chamædryos, agarici, marru-
bij, stœchadis, sing. drach. X, opopanax unc. I, sagapeni, un. I, petroselinij, aristo-
lochiæ rotundæ, piperis albi, sing. drach. V, cinamomij, spicæ nardi, myrrhæ troglo-
dyticæ, polij, croci, sing. drach. I III, excipe melle despumato, ut habeat strigmen-
titia crassitudinē, & reponē in uitreo uase, perfecta dosis sunt drach. I II. (In alio
exēplari adduntur scrup. III.) cū aqua mulsa adiecto salis cochliario paruo. Quā
enim sordibus inquinatus & male affectus fuerit æger, strenuā cōstitutionē indu-
cit, non solū ob multitudinē corū quæ per aluū subducunt, sed etiā quod priua-
tim bilem atrā imminuit. Pleuritidi itaq; primū præparata est, & flatuosis affectio-
nibus cōuenientissima est, & facit spirationē facit, & impedimētis nutrimenti ad-
uersatur, & colorē cutis depurgat, sanguinē quidem defecans, malē uero arden-
tem spiritū lucidius accendens. Sed nō est propolitiū nobis encomiū dicere eius,
quæ non frustra hiera, id est, sacra appellata: longū enim sermonē res ea requirat.
Ad melancholicas aut affectiones nō est aliud pharmacū quod huic cōparari me-
reatur. Et noui multos per assiduū eius usum nullo alio opus habuisse, etiā si nullā
omnino bilē excreuissent: nō enim qui nigrā excernūt bilē soli melancholici uo-
cantur, sed qui etiā ita habēt in solidis mēbris talis cōstitutionis structurā. Sed & pan-
niculorū siue mēbranarū cerebri malos habitus ualde bene exterit: unde morbi

n 4 comitia

comitiale & insanias inde orientes mirabiliter remouere uidetur. Ego reperi hanc descriptionem in medicamentario libro de Rhoma mihi allato ualde laudatam ad insanos, melancholicos, ischiadicos paralyticos, uertiginosos, comitiale morbum, alopecias. Non habebat autem opopanaca, neq; piper, neq; pulegiū.

Hiera Antiochi. Chamædryos, agarici, medullæ colocynthidis, stoechas dis, singulorum drach. x. opopanacis, sagapeni, petroselinī, aristolochiæ, piperis albi, singulorum drach. v. cinamomi, spicæ nardi, myrrhæ troglitidis, croci, folij, singulorum drachm. iiii. Mellis quod satis est. Facit ad melancholias, insanias, morbum comitiale, & omnes feculentum sanguinem habentes.

Hiera Rufi, ad melancholias.

Cap. cxv

Medullæ colocynthidis sextantē & uncia dimidiū, chamæpityos drach. x, chamædryos drach. x, casie drach. v. agarici, marrubij, utriusq; drach. x. opopanacis un. i. sagapeni, petroselinī, aristolochiæ rotundæ, piperis albi, sing. drach. v. cinamomi, spicæ nardi, croci, myrrhæ troglitidis, polij, sing. drach. iiii. Excipe melle, & exhibe drach. iiii. perfectā dosim cū aqua mulsā, & sale. Habet aliquid ad intelligentiā utile, eo quod à capite plurima ducit. Vnde uertiginosis, & capitis grauitati, & glaucomatis fieri minātibus, comitali morbo, paralyticis affectionibus, hoc pharmacū priuatim adhibere soleo, & si opus fuerit memoriā reuocare. At melancholico non parua nec uulgaris utilitas ex ipso contingit. Quare saepe per ipsum purgandus est. Etenim alia medicamēta alibi aliter præparant, & ad alios quosdā morbos magis apta sunt. Si uero quis ad aurā bilē uti uoluerit, hoc utile existit. Utatur aut singulis diebus ex hac antidoto fabæ magnitudine, nō purgationis gratia: magnopere enim cōfert ad cōcoctiones, & flatu discutit. Videat porro mihi conducibile esse, ut ob strenuas purgationes malū seminis drach. ii. bibant.

Hiera Iusti, faciens ad eadē uelut relata.

Cap. cxvi

Epithymi trientē & uncia dimidiū, marrubij, stoechadis, chamædryos, corticis ueratri nigri, scammonia, agarici, piperis albi, cōmunis, longi, scille assatę, singulorum sextantem, medullæ colocynthidis, euphorbij, aloës, croci, gentianæ, seminis petroselinī, ammoniaci thymiamatis, sagapeni, singulorum unc. i. opopanacis, polij, cinamomi, casia, myrrhæ troglodyticę, spicæ nardi, floris iunci odorati, pulegij, singulorū drach. iiii. aristolochiæ longę, & rotundæ, utriusq; drach. ii. mellis despumati quod satis est. Perfecta dosis drach. iiii. s. cum aqua mulsā & salis tenuissimē triti cochleario uno.

Quomodo auxiliari oportet his qui pharmacum biberunt,

& non purgantur.

Cap. cxvii

Si uero quis potio pharmaco non purgeat, aquā mulsam meraciore assidue absorbendā dato, & nitri parū in aqua liquefacti. Optimū autē cognoui multo experimento mastichen, ut dentur eius scr. xii. leuissimē trita cū aqua tepidiore. Optimū est & glandē ano indere, ex sale, nitro, ac melle. Et malū aliquando manducatum effecit quod debuit: corroboratū enim os uentris, superfluitates inferre protrudit. Ob quot causas non exercuit uenter purgatorio dato? Ob quinque causas. Aut propter naturā aegri proprietatē, aut ob dati pharmaci paucitatem, aut propter sterco durum impactū in quibusdam intestinis, aut quod natura impetum per urinas fecit, aut propter errorem, pars quidem purgantis, ad hoc ut nihil lædat corpus, alimentum sit animalis: pars uero in pharmacum uenenosum eueritur. At uero Hippocrates de purgationis excessu sic dicit: Quū purgationis excessus hominē arripuerit, statim in balneū ipsum inducito, uinumq; bibendū & ante balneū & post dato, suluū colore, & album subflantia.

Et mea

Et mea experientia cōperit hoc praestantissimū omnium, quare ne cōtempseris,
Cura excessus purgationis, Oribasij. Cap. CXVIII

In his qui nimīū purgantur, potū cōtrahere oportet, & somnū procurare, dan-
dum est aut uinum austerū paulatim, cum aqua fontana, Bonū est & crassiorē po-
lentā torrere ac potui inspergere. Aut parū de calice papaueris, & galleg parū. Fa-
cit etiā probē lentis decorticatā farina cum aceto & beta nigra cocta, rhoē adie-
cto aut parum de calice papaueris. Cōducunt & pira sicca expressa, & mala coto-
nea. Si uero adhuc perseverat lationis impetus, utendū est efficaciorib, ad coeli-
cos descriptis. In his uero qui faciliē uomunt, aquā tepidā multam bibendā dato,
& uomere iubeto, digito aut penna immissa. Atq; hoc facies bis & ter cōsequen-
ter. Deinde oleum melinū & uinum calefacito, & in hoc lintēū tinctū uentri ad-
moueto, & post modicū interstitiū antidoti theriaces sabae magnitudinē cum ui-
no bibendū dato. De uomitu, Rufi. Cap. CXIX

Quandoquidē in uolentis uomitibus sepe absurda quā dā sequi solent, operae
pretium fuerit prius modos referre, quomodo quis faciliē uomat. Nam pituitam
mouet uomitus, & caput leuat: & eum qui auidius cibum ingessit, aut plus uini
hausit, laedi prohibet. Auxiliatur autē purgatio per uomitus nimio corporis mo-
li. Opitulat̃ item excellenter gracilibus. Omnes autem fluidas affectiones uomit-
us sanare solet, uelut ulcerationē rhenum, uellicae, & ani, & aliarum partium, ele-
phantiasim, caneros, malos corporis habitus, articularū affectiones. Cōuenit &
hydropicis, maximē aqua inter cutē laborantibus, regio item in orbo, & comitali
in his quibus à stomacho initū affectionis accepit. Nam his qui in capite affecti
sunt comitali morbo, incongruus est uomitus. Cōducit item tremulis, resolutis,
siderationibus, spirationib, erecta ceruice, melancholijs, impetiginosis. Cōtrarij
uero sunt uomitus sanguinis reiectioni, strangulatib, uteri, naturis nauseabundis,
animi deliquijs, his qui à suffocatione assidue uexant̃, & qui ex qualibet occasio-
ne caput dolent, & qui suffusionē suspectā habent, & in summa omnib, oculorū
affectionibus. Sint autē uomitoria nō acerba & arida, sed partim dulciora, par-
tim aciora. Videat̃ aut inter hec raphanus probari, & eruca, & fassamentū uetus,
origanū uiride, cepe & porrum. Coadiuuat uomitus etiā ptisana adiecto modicō
co melle, & pingues carnes. Attamen nō oportet praedicta aut huiusmodi deco-
quere, & succos ipsorū solos accipere. Verum totā molem deuorare. Neq; uero
circa manducationē diu immorari oportet, si quis uomere uelit, sint tamē omnia
ex coctura emollita. Manifestū est aut ex uinis quoq; dulciora esse eligenda: haec
enim magis in uentre supernatāt. Et calidā potu utendū est. Oportet & amygdala
las melle tinctas edere, & placentas gustare, & cucumeris semen maceratū cum
melle offerre. Sed & cucumeris satiui ac peponis radix trita cū melle uomitū mo-
uet, & Celticae radix trita septē drachmarū pondere in aqua mulsa ac pota fortis-
ter sursum purgat, ut aliquando etiam excessus purgationis cōsequatur. Qui ue-
ro fortioribus uti uolunt, narcissi bulbū in aqua coquunt, & cum decocto qui-
dem temperant uinum. Ipsum aut bulbū edunt coctū, cum oleo & modico sale.
Mouet etiā uomitū ungentū irinū, & plus adhuc cyprinū, si quis illitis ex his digi-
tis irriter. Citra molestiā mouet uomitum etiam hyslopi decoctū, & thymi, & cni-
ci semen tritū cum sesamo, ac cum aqua mulsa plurima potū. Et nasturtij semen.
Similiter oleum sesaminum, raphaninū, narcissinū, Daphnoidis folia uiridia tria
comesta. Optimū est & hoc, raphani decoctū & caricarū cremorē simul misce-
to, tepefacito, & bibendum dato. Pleraq; igitur & curiosiora uomitoria repro-
banda sunt. Dandi uero sunt raphani ieiunis qui in ediam tulerunt, & à cena
prius

prius uomuerunt. Sint autem raphani ualde acres, & secantur in tenues laminas, macerentur autem hæc frustula à uespera in aceto & melle. Edat autem uomiturus ex his magnam copiam, & assidue superingerat acetum mulsum. Deinde ad horas duas lentè obambulet, & plurima aqua tepida hausta uomat, per digiti aut pennæ irritamentum.

Præparatio raphanorū cum ueratro albo.

Cap. cxx

Præparantur etiā alio modo raphani ad diurnas affectiones, & fortiore exagitatione indigentes. Veratri enim albi & optimi festucarū drach. vi, in raphanis figuntur, ita ut raphani prius harundine compungantur, & deinde festucæ ueratri in foramina immittantur. Hæ festucæ ubi totam noctem in raphanis manserint, sequenti die eximuntur, uel ipsarū in raphanis relicta. Postea uero raphanos cōscindere oportet & in aceto mulso macerare, & similiter edēdos exhibere. Diligēter aut cōsiderandū est, ne quid ex cortice ueratri in raphanis permaneat.

Quibus dandum sit ueratrum, & quibus non. Ex Antylo

ac Posidonio.

Cap. cxxi

Ipsū ueratrum dandum est his qui diurno ac forti morbo laborant, & qui in alijs auxilijs spem non habent. Dandum est hydropicis, elephantiosis, malo habitū præditis, resolutis multo tempore, comitialib. & melancholicis, arthriticisq; ac podagricis. At enumerare in quibus affectionibus probetur ueratrum, non facile est propter multitudinem. Præstat itaq; dicere qui morbi à ueratro legantur. Incommodum est itaq; ueratrum, sanguinis reiectioni, spirationi erecta ceruicæ strangulationē minanti, & in suffusione imminente, capitisq; affectibus qui ex interuallis uiolentos dolores inducunt, cum rubore faciei & uasorum distentione; & in uteri strangulationibus, & his qui assidue animo linquantur.

Quid ueratrum facere possit.

Cap. cxxii

Veratrum potest corpora transmutare ac permutare, temperaturam ipsorum recentiore ac robustiore efficiens.

Quod multi accepto ueratro nihil quidē uomuerunt, nihil tamen minus quā purgati utilitatē perceperunt.

Cap. cxxiii

Multi accepto ueratro ipsoq; cōcocto, omnino quidem non sunt purgati, utilitatem uero non minorem perceperunt quā hi qui purgati fuerant.

Qui sint magis apti ad ueratrum.

Cap. cxxiiii

Viri aptiores sunt ad ueratrum mulieribus, & ex ipsis uiris hi qui fortiorem habitum possident. At mulierosi, & habitu ualde pingues, aut graciles, aut thoracē non carnosum habentes, & longam ac angustam ceruicem habētes inepti sunt. Pueri quoque ac senes inepti sunt; & qui ualde frigidam temperaturam habent, & qui sana corpora habent, & multo sanguine abundant, inepti sunt. Item diffisculter uomentes & pusillanimes.

Tēpora uniuersalia ac particularia ad ueratrum sumendū apta.

Cap. cxxv

Tempus uernum aptissimū est ad sumendum ueratrum. Deinde autumnus. Aestas incōgrua est, & nimirū hyems quoq; nisi ualde magna urgeat necessitas. Et tunc hyeme quidē qui ualde calidū temperamentū habent aptiores sunt. Aestate uero senes. Constitutio idonea est serena & calida & insolata. At in morbis in quibus interualla sunt, dandum est in interuallis. In alijs, quādoq; contigerit. In quartanis uero & intestinis fluxione uexatis, in ipsis accessionibus.

Veratri probati notæ.

Cap. cxxvi

Optimum est ueratrum quod ab una radice plures festucas siue surculos habet, eosq; paruos & extentos, & non rugosos, & nō in acutū desinentes, neq; caudā muris

mutis referentes. Intus uero ualde albos, foris autem pallidiores, profundam medullam habentes, friabiles, qui non flectuntur ob mollitiē, sed frangunt transuersum instar caulis, & qui in fractura fumosum quid continent ac remittunt, atque hoc purum. Nam si puluerulentum id fuerit, uetustate ueratri indicat. Bonum porro ueratrum mansum primum dulcedinis indicationem de se praebet, deinde modice acrimoniae, postea feruorem fortem inducit in ore, & saluam multam ducit, & stomachum euerit. Oportet autem uere colligere ueratrum radice adhuc praegnante.

Victus ratio ueratro purgandorum.

Cap. CXXXVII

Victus ratio accuratissima constituenda est his qui ueratro purgandi sunt. Attenuatis enim corporibus non citra periculum exhibet. Diebus tribus antea abstineant a carnibus, aut reliquis crassi succi edulsi ac potibus. Assuefaciant autem seipsos ad uomitum, & ter aut quater prius uomant a coena, & aluus subducatur. Oportet autem declarata antea domesticis anxietate certaminis futura, sic ad hoc auxilium procedere.

Differentiae exhibitionis ueratri.

Cap. CXXXVIII

Datur diuersimode ueratrum. Alij enim decoctum ueratri dant, alij cremorem, alij ipsam eius substantiam. Et alij forpice in ramenta consecuta exhibent. Alij tustum & cribratum. In ramenta igitur consecuta cito incipit purgare, post horas in totum duas, bilem & pituitam educens citra multam lacerationem. Et ipsum simul uomitu reiectum, in quatuor aut quinque horis purgationem sedat. At in puluillum redactum ualde tarde operatur, ut post quatuor aut quinque horas saepe incipiat. Verum omnes species bilis & pituitae educit, & ad periculum contractionis & nimiae purgationis deducit. Ad longum etiam tempus producit purgationem, sed utilitatem multiplicem exhibet.

De cremore ueratri.

Cap. CXXXIX

Cremor in quo maceratum est ueratrum datur senibus & pueris, & his quibus habitus defluxit, & qui morbum facile solubile habent. Datur & his qui elephantiasim futuram timeant. Oportet autem drachm. v. ramentorum, in aquae pluvialis hemina dimidia macerare ad triduum, deinde colare & calfacere, atque exhibere totum cremorem.

De ueratri decocto.

Cap. CXXXX

Decoctum ueratri dandum est tum praedictis, & qui illis adhuc sunt robustiores, in sanientibusque ac atra bile percitis. Preparatur hoc modo. Veratri librā i. concisam in aquae pluvialis sextar. ii. macerato ad triduum. Deinde ad prunas mitiores coquito ad tertias. Postea colato & adijcito ad decoctum, mellis despumati primarium lib. ii. & coquito usque ad mellis copagem, & cochlearium magnum delingendum dato. Licet etiam aqua calida miscere, & dare cum sorbitione quadam, hoc neque conuulsiones, neque contractiones, neque nimiam purgationem facit. Exercitium autem est uolenti ad ipsum ueratrum transire, ut etiam confidenter ramenta eius consecuta accipiat.

De ramentis ueratri, item de contuso ac cribrato.

Cap. CXXXXI

Ceterum his qui maiori molimine ac exagitatione opus habent, fortioribusque ac confidentioribus, & facile uomentibus ramenta concisa danda sunt. At uero his qui adhuc audientiores sunt, aut etiam consuetudinem habent, contusum & tenuissimo cribro excretum dabis. Ramenta uero sic exhibe. Accipe festucas, conscinde forpice ad polentae aut fursurum magnitudinem, deinde puluillum linteum exerge, & detractis omnibus tenuibus, particulis, ut ne stragulet, dato timidioribus, quidem cum ptisanæ aut aliae succo, ubi partem decoxeris, fortioribus uero cum aqua calida, aut aqua mulsa, ita ut cogas ipsos insuper sorbere aquam mulsam puram, aut aquam, ut ne relinquatur quid in faucibus aut stomacho. Dosis perfectissima fortibus, de ramentis concisis, sunt drachm. ii. s. de puluere crassiore, drachma una & oboli ii. de puluillo drach. i. & oboli ii. Contundimus autem crassiorē eius farinam in mortario, & per

angust

angustissimum cribrum excernimus, & tenuissimū auferentes, id quod crassius est exhibemus cum succo alicæ, aut mazæ ex polenta factæ. Tenuem uero puluillum tundimus, & exactè cribramus. Et postea cum cocto melle solidissimo in catapotia coactum ac efformatum exhibemus.

Quæ præparare oportet exhibitionis tempore. Cap. cxxxii

Præparantur porro ipsis ad opem ferendam lancinationibus, animi deliquis, & conuulsionibus hæc. Aqua calida & frigida, decoctum hyssopi, mel, ruta, pulegium, acetum, mala, panis calidus, uinum, pullus gallinaceus coctus, oleū comæ mune & sicyonium, sal, galbanum, castorium, cremor ueratri, oleum cyprinum, aut irinum, aut narcissinum, pennæ, sternutatorium, cucurbitulæ diuersæ, lectica siue ferculum, lectus stratum molle habens, clyster.

Quomodo post potum curandi sint.

Cap. cxxxiii

Si quidem faciliè purgentur postquam biberunt medicamentū, dabimus ipsis aquam frigidā absorbendā aut colluendā. Deinde odoramentū quoddā corrosborans. Et iubebimus ipsos sedere aut reclinari, & in quiete manere ad horas duas, ut ne citius quā oportet pharmacū reuomatur. Postea iubebimus ipsos moueri. Prima perceptio caloris circa stomachū & fauces contingit: Deinde salua multa in os colligitur: Postea partē alimentī & pharmaci cum pituita uomūt, deinde pituitā & bilem cum pharmaco: Mox purā bilem. Sæpe uero etiā uenter infernè subducit, quando sanè etiā tolerabilior purgatio contingit. Singultuū leuiter, & facies rubicunda est. Si uero faciliè procedit purgatio, & facies bonū colorem habebit, & singultus cessabit. His uero qui circa mediā purgationē singultiunt, aquā mulsam dabimus, aut decoctū rutæ, & aquā tepidā in potu. Deinde purgatos lauabimus, & alimentū stomacho gratū exhibebimus. Perseuerāte uero purgatione, oportet dare aquā mulsam calidā absorbendā in qua decocta est ruta, aut aquā cū oleo. Penna quoq; cyprino aut irino oleo, aut aliquo simili tinta irritent, & lecto pensili reclinati cōmoueant. Si uero ualde uexent à strangulatione, cremoris ueratri cyathos tres offeremus. Nam ex qualitate adiuuat purgationē. Quod si neq; sic strangulationis periculū leniat, acerrima infusione per clysterē euacuabimus. Dabimus ipsis etiā galbani obolos iii, deuorandos, nō ut uomitū cōcitemus, sed ut strangulationē sedemus. Aut sternutatoriū forte admouebimus, assiduè per lectū pensilē agitantes, & pennarū immissione irritantes. Vbi uero incipiūt purgari mitigandus est singultus, uelut antea dictū est. Si uero uiolentus fuerit singultus, sternutatio utemur, & cucurbitis per totam spinam, & maximè circa magna scapularū uerticula, detrahentes ipsas ad spinā, perseverantes enim cucurbitæ sæpe corrigūt stomachū contractū & uelut contortū à singultu. Ligabimus etiā extremas partes, & fouebimus immissas in aquā calidā. At uero succedentes in quibusdā cōtractiones, crurū maximè & manū: (solent enim pleriq; hæc accidere) leniemus fortiter illinendo, fouendoq; ac calfaciendo & fricando extrema & musculos in suris. Sit autē oleū sicyoniū, aut quoddā ex molelientibus & lassitudinē ac dolorē eximentibus, acopis appellatis. Sed & castoriū ungento ammiscemus, & in potu exhibebimus. Maximè uero prodest contra cētis balneū si affuerit. Sin minus, in scaphā aut in folium immitemus, ita ut oleo multo dulci totū corpus, maximè uero contractas partes illinamus. Sit autē aqua probe temperata, ut in ipsa diutius manere possit. Porro ubi cessauit cōuulsio ac purgatio, statim nutrire oportet, panem exhibendo uino diluto madefactū, aut in omphacomeliti, his qui ualde sunt euacuati. Si uero caloris sensus circa stomachum post cibum contigerit, ipsum omphacomeli aqua calida temperatū bibendum

bendum dabimus. Aliquando uero etiam cum frigida mixtū secunda die dabis. Cibi uero postea boni succi omnes sint, & uinum tenue ac ualde uetus.

De purgationis excessu.

Cap. cxxxiiii

Nimias purgationes sistemus aquæ calidæ potu, & extremarū partium ligatura, & frictione uehementi, & cucurbitis ad præcordia & dorsum affixis. At absinthij potus egregiè suppressit uomitū. Si uero adhuc perseverarit, utemur somniferis dolore sedantibus. Nam talia resiccandi uis prædita purgationes sistunt. Et somnus excretionem sistendi uim habet. Succedit tamē somnus sua sponte probè purgatis per ueratrū, multus & profundus, si non periculū imminet. Quibus sanè in tantū cōcedere oportet, quantū somno tenentur. Si uero sudores immodici consequant, sedabimus ipsos corporis uentilatione, & spongiæ ex frigida aqua aut posca expressæ deterfione. Vtemur etiā puluillorū adstringentū & meatus obducentium inspersione, & reliqua cura in cardiacis referenda.

Epithemata purgatoria.

Cap. cxxxv

Medullæ colocynthidis, seminis erucæ, rutæ syluestris, elaterij, grani cnidij, laethridum purgatarum, galbani, cere, nitri rubri, singulorū drach. iiii. opopanax drach. ii. terebinthinæ drach. vi. Tunditur hoc pharmacū adiecto paulatim felle taurino, quantū satis est. Et si quidē super umbilicū positū fuerit usq; ad pubem, inferiorē aluū mouet. Si uero super uentrē, superiorē purgat per uomitū.

Aliud. Nitri rubri, seminis securidacæ, medullæ colocynthidis, fellis taurini, staphidis syluestris, stercoreis columbini, radices cucumeris syluestris, scille, mercurialis, singulorū æquales portiones, tundito, cribrato, & felle excipito ac melle sufficienti, & ubi ad malagmatis formā redegeris utitor. Aliud quod pollicem sanguinis per nares educationē, si fronti imponat. Vbi uero sistere uolueris, inquit, sanguinē, ablato ipso locum diligenter deterges per spongiā ex posca aut frigida aqua expressam. Si uero imo uentri impositū fuerit quadrangulāri nouem digitorum figura, ciet menses & foetus curripit. Imponit & rhenibus in exacerbationibus. Cōpositio hæc est. Cere, galbani, euphorbij, radices lanariæ herbe, sing. unc. i. talorum ceruinorū ustorum drach. iiii. succi absinthij drach. iiii. terebinthinæ liquidæ, drach. iiii. Sicca trita cribrata, rursus terito cum felle uitulino, ad strigmentitū crassitiē, & liquida ac eliquata affundito, & unito ac utitor, inquit, uelut admirando. Aliud emplastrū purgatoriū, quo utor, Chezananze appellatū. Hoc impositū umbilico, mouet inferiorē uentrē, thoraci uero & stomacho impositū uomitū ciet, donec splenū cui illitū est tollatur. Menses autē foeminarū ducit, & foetus corrumpit imo uentri & lumbis impositū. Cōpositio hæc est. Grani cnidij drach. iiii. lapidis assij drach. x. ueratri albi drach. iiii. adipis caprini drachmas v. elaterij drach. iiii. succi tithymali drach. iiii. amurcæ drach. xii. fellis taurini drach. ii. spumæ nitri drach. v. farinæ lupinorū amarorū sextantiē, comæ absinthij drach. ii. Reliqua tundito ac cribrato, deinde fel tritum adijcito, mox amurcā, & postea adipem liquefactū affundito, & unitis utitor. Aliud umbilicarium. Et hoc uomitū ciet uentri impositū. Et menses ducit nō ob uasorū conclusionem suppressos, foetusq; corrumpit, imo uentri ac lumbis impositū. Absinthij, succi radices cyclamini, artemisiæ, elaterij, singulorū drach. vi. medullæ colocynthidis drach. x. radices cucumeris syluestris, farinæ lupinorū, chelidonij, seminis uiolæ albæ, singulorū drach. vi. opopanax drach. ii. cere drach. c. terebinthinæ drach. l. cyprini drach. l. aut quantū satis est. Impositū autem ubi aluū cōmouit, mox ipsum tollere oportet. Aliud, facit & ad colicos. Nitri scrup. i. x. terebinthinæ scrup. vi. elaterij scrup. iiii. staphidis syluestris scrup. i. s. castorij, seminis

o rosinae

rosmarini, sampsuchi, baccarū lauri, grani cnidij, lupinorū siccorū, medullæ colo-
cynthidis, singulorū sesquiunciā, scammonia unc. i. fellis taurini unc. i. cera sex-
tantē, adipis anserini quadrantē. Aliud, Cucumeris syluestris succū, & cyclami-
ni succū, paribus portionib. cū melle misceto, & hæc exactē unīto in sole aut ca-
do cinere, & utitor illinens ab umbilico usq; ad pubē. Aliud, Elaterij drach. iiii.
colocynthidis drach. i. scāmonia, squame aris, radicis cucumeris syluestris, sing.
drach. i. lathyridū drach. i. aut pro ipsis succi thymali tantundē. Tundito, cribra-
to ac terito cū oleo plurimū salis habēte, & hapsum lanæ magnū facito, ipsumq;
pharmaco imbutū imposito ubi uolueris, umbilico inquam, aut uentri, aut imo
uentri & lumbis. Aliud, Mespilorū exēptis nucleis scrup. x viii. scammonia
scrup. xii. attramētū sutorij scrup. xvi. sagapeni scrup. xx xii. lathyridū scrup.
xii. colocynthidis seminis scrup. xii. Trita excipe oleo & utere.

Compositio olei siue ungenti purgatorij.

Cap. cxxxvii

Fellis taurini sextantē, elaterij unc. i. grani cnidij uiridis trientē, lupinorū uiria-
dium succi sextantem, euphorbij unc. i. medullæ colocynthidis unc. i. adipis uul-
pini recentis sextantē, adipis uiperæ sesquiunciā, stercoris muris drach. iiii. succi
præonia drach. iiii. castorij drach. iiii. olei cyprini sexuncē, olei ueteris lib. i. ari-
da tundito ac cribrato per tenuissimū cribellū. Adipes autem præmollito in mor-
tario, præsertim uulpinū: fibris enim refertū est, deinde ad lentas prunas liquefas-
cito cum oleo, & ipsis reliqua omnia inspergito, & parū ad prunas coquito ac se-
ponito in stanneo uase, diligenter operto ut ne transpiret, & deponito in domo
superiore non humecta ad dies xxx. Et postea utere in omnibus & ad omnem
affectionē: Citra molestiam enim purgat. Sanat autem cum reliquis etiā men-
tis percussione. Mensura quæ in usum assumitur ut plurimū est cochliariorū duo-
rum, in quibusdam etiā unum solum. Iuncto enim umbilico perfectā feci eu-
acuationem. Si uero immodicē feratur uenter, & uoles suppressere, spongiā uino
tepidō imbutam ac expressam adhibe, & sistetur. Aliud epithema. Hoc umbi-
lico imponitur, & splenem purgat. Veratri nigri quadrantem, ueratri albi triens-
tem, ammoniaci thymiamatis, nitri, utriusq; trientem, scammonia sextantē, pipe-
ris grana xxx. contusa cribrata excipe terebinthina ut malagmatis formā in-
duant. Et ubi præfricaueris locū ac somēto præparaueris, formato quadrangulāri
quinque digitorū figura spleniū, & imposito. At pectini impositū, foetus corruptus
pit. Epithema sanguinē ducens, ut hæmorrhoidas irriter, & menses muliebres.
Elaterij, myrrhæ, galbani, farinae ordeaceæ, sing. drach. iiii. foliorum rutæ uiridis
drach. ii. fellis taurini quod satis est, singula seorsim tenuissimē terito, deinde unī-
to, & fellis quod satis est affundito. Vfus uero tēpore locū sub umbilico, & partes
circū circa sitas illinito. Aliquando etiā lumbos, Ducit menses & hæmorrhoidas.

De localibus euacuationibus.

Cap. cxxxviii

Et de his quidē quæ superfluitates quæ in toto corpore sunt, purgare possunt,
sufficiunt relata. Tempus est autem transeundi ad locales euacuationes. Verū il-
lud meminisse te uolo per totam tractationē, ut primum totū corpus purges, &
a superfluitatibus liberes per prædicta purgatoria medicamenta. Et postea per lo-
calia auxilia uolueris partium affectiones curare, in magna mala immiseris agro-
tum. Ampliorem enim materiam ad debiles locos attrahes.

Quæ oculos purgant & lachrymas prouocant. Cap. cxxxviii

Lachrymas prouocantibus utemur ad oculos diu resiccatos, & palpebras sca-
bras ac pruriginosas, Extergētib; uero & repurgantibus ad hebetem uisum &
suffusio

suffusionis principiū. Prouocat autem lachrymas & extergent omnia hæc: mel, oleum uetus, ricinum, amygdalinū, ex nucibus regijs, ē sœno græco, lentiscinum, laurinum, anethinum, fulinum, nardinum, opoballamū. Ex succis autem oculos purgant, succus uuæ acerbæ, lactucæ syluestris, lyciū, radicis acori succus. Itē chamædryos, centaurij, chelidonij, ocymij, ceparū, rutę hortensis ac syluestris, quæ etiā besafa appellatur, item mali punici succus, fœniculi, utriusq; anagallidis, marrubij, trifolij, ueratri albi, & anemones. Ex liquoribus uero spissis, myrrha, sagapenum, opopanax, cyrenaicus, & Medicus, ammoniacū thymiana, galbanum, thus: ex animantibus, testudinis terrestres sanguis, hepatis caprini cruor, itemq; siluri. Sed & siluri fel, & hyænæ, capræ, gallinæ, perdicis, uulturis, ursi, scæri, callyonymi, & coracini. Ex adipibus, uiperæ adeps, gallinarū, piscium fluuiatilium, castoris testes. Ex cineribus, hirundinū pulli exulti, lacertæ ustæ, cornu ceruiustum. Ex metallicis, lapis hæmatites, & scissilis, æsustum, atramentum sutorium, chalcitis, misy, alumen omne, squama æris, rubrica, lapis phrygius, iaspis, magnes, moroxus qui & leucographis appellatur, lapis galactites. Ex plantis, cortex thuris, ericæ fructus, & quæ eiusdem generis sunt.

Quæ aures purgant.

Cap. cxxxix

Mel, uinū mulsum, uinū dulce, oleū nucū regiarū, amygdalinū per se, & cū anserino adipe, irinū cū aceto, myrrha cū alumine, acetoq; ac aqua: spuma nitri cū melle & aceto, alumē cū aceto, senecta serpentis cū aceto, fel bubulū, suillū, & omne fel pisciū, betæ succus, foliorū capparis succus, corticis raphani succus, mercurialis succus, bdelliū, galbanū, castoriū, casia, ueratrū albū & nigrū, herba lanaria, capparis folia cū oleo cocta, acetiū mulsum, nitrū cum aqua calida infusum. Cæterum ex prædictis quedā ad pruritus, quedā ad ulcera, quedā ad ea quæ in meatū inciderunt, aliqua ad sordis duritiē, item ad sonitus, & grauē auditū ac surditates cōmoda sunt. Capitis item doloribus antiquis, & morbo comitali hæc profunt.

Quæ per nares purgant.

Cap. cxl

Per nares purgat caput, radicis betæ succus, elateriū, anagallidis cæruleū florē habentis succus, oleū irinū, amygdalinū, cyclamini radicis succus, & ipsa arida trieta insufflata, piper, nitrū, atramentū sutoriū, mel, thlaspi, ueratrū album euphorbium, herba lanaria, castorium, calamītha, melanthium, iris, marrubiū, anemone. Hæc uero manibus admouentur, propter diuturnas capitis affectiones, & ad morbum comitalem, & oculos arquato morbo infestatos. Item ad obtusum auditum ac uisum, & ad narium obstructiones antiquas, & in læso olfactu, & ad eos qui caninam conuulsionem passi sunt.

Quæ humiditatem ex ore trahunt.

Cap. cxli

Lentiscus & ipsius folia, & quod ab ipsa resinaceū defluit, mastiche appellatū, cum staphide syluestri, piper, granum cnidium, sinapi cum aceto mulso, ac nitro gargarisatū multam pituitā euacuat: rumicis radix cum aceto cocta, pyrethrum, capparis cortex, tæda, mel, oryganū, thymus, pulegiū, hyssopū, thus cum melle, alumen, chalcitis, misy, myricæ fructus, terebinthina cum melle, omphaciū succus cū silphio, cyrenaicus succus, casia, & omnia quæ ori illini solent. Cæterū quæ ualde efficacia sunt, in diuturnis affectionibus, assumēda sunt, ore prius ex oleo coluto, ut ne acrimonia impediatur usum. Adhibenda uero sunt hæc omnibus diuturnis capitis affectionibus, & hebetundini uisus, & grauē auditui citra dolorē. Ad linguę itē ac gustus resolutiones, ad parotidas, anguinās, pustulas capitis aut faciei, ad caninā conuulsionē. At uero recurationis gratia, adhibenda est postea aqua calida, sapa, aqua mulsā, lac micarum, panis cremor, aut pitisanæ succus.

o 2 Quæ

Quæ lac generant ac mouent.

Cap. CXLII

Generat ac mouet lac in potu accepta, pitisana cū foeniculo cocta præsertim uiridi, sin minus, cū semine. Sed & ipsum foeniculū per se comestū, & anethū, sesamum, anisum, semē lini, cuminū, milij farina cocta, tritici decoctū, eruca uiridis, cucumeris semē; foris aut illita uberibus prouocat & mouent lac, intestina terræ, nigella, fel tauri, ordeī macerati succus, portulacæ succus, adeps inferinus, cera, sulphur, recrementum ferri. Hæc adhibentur in his quibus lac deficit.

Pulmonem ac pectus purgantia.

Cap. CXLIII

Semē urticæ, dauci, apij, thymus, semē raphani, in potu ac cibo accepta, itē sina pi, sesamū, nasturtiū, erysimū, cardamomū, cucumeris semē, nigella, piper, ruta, poliū, marrubiū, baccæ lauri, casia, aron, dracunculus, bulbus, cepe, alliū, costus, amomū, spica nardi, sulphur, styrax, galbanū, terebinthina, myrrha, opopanax, scilla, origanū, pulegiū, hyssopū, abrotonū, bryoniæ radix, amygdalæ amara, caricæ, uix passæ, nuce pincæ, maximè recētes, mel, sapa, uinū dulce, castoriū, farina erui, picearū nuclei, ammoniacū, bdelliū, thus, silphiū, & succus eris, aristolochia, baccæ iuniperi, stœchas, porrū capitātū, cū pitisana coctū in cibo acceptū, ouū recens absorptū, butyrū per se, & cum melle, glycyrrhizæ succus & ipsa radix. His utendū est ad anhelosos & erecta ceruice spirantes, & ad ueterem tussim. Pleraq̃ uero ex ipsis etiā pthificis & suppuratum pectus habentibus conueniunt, propter educationē eorum quæ in thorace collecta sunt, & ad ulcerū repurgatiōē.

De suffitionibus.

Cap. CXLIII

Suffitus nō cōmodi sunt omnibus affectionib. circa thoracē cōsistentibus: neq̃ enim in sanguinis sputo idonei sunt, quā per acrimoniā eorū quæ suffiunt ualē rursus aperiant; neq̃ his qui siccū morbū circa thoracē habent; uerū solis anhelosis & erecta ceruice spirantibus, & quibus thorax ob copiā frigidorū humorū infestat. Utendū autē est suffitionib. toto corpore euacuato. Collocandus est homo, & ubi uestibus cōtactus fuerit, iubendus est crura disparare, & deorsum nuere, ut facies prope genua existat, atq̃ ita os aperire, quo suffimēto inter crura posito, sumum ore suscipiat. Præstat tamē per infundibulū fumū suscipere. Sunt autē suffimenta hæc, Castoriū suffitū humidā & frigidā affectionē pulmonis ac cerebrifanat. Similiter aristolochia, bitumē, sandaracha, ladanū, loliū, paleæ antiquæ, funiculus uetus marina aqua maceratus, terebinthina, chamaeleuce, calaminthe, styrax, mastiche, thus, erysimū, leporis stercus ac pilī, dorcadis stercus, cucumeris syluestris radix, centauriū, foeniculi semē. At nos habemus suffumigiū per experientiam cognitū, quatuor specierū, nimirū styracis, terebinthinæ, sandarachæ, mastiches, æqualibus portionib. cōmixtis. Hoc fidē reperit quod anhelosās, & suppuratas, & pleuriticās affectiones sanet, itemq̃ tussim, quemadmodū & quæ prædicta sunt.

Quæ tenuia intestina euacuant.

Cap. CXLV

Tenuia intestina purgat fructus tithymalli, & semē ipsius quantū guttē quinque caricis aut palmulis excepte, atriplicis semē, brassicæ succus, cicerū decoctū, thymbra & polypodij decoctū, pulegiū decoctū, uiticis folia, thymi decoctū, chamapitys, butyrū recens assidue delinctū, chanæ ualde coctæ ac comestæ, iusculo insus per absorptio, oleū omphacinū potatū, rosaceū itē ac ricinū. Agaricū cū aqua mulsā, sed hoc cū molestia purgat: est enim stomacho incōmodū, eo quod leue sit, & stomacho innatet, aloë cum aqua frigida, aut aqua mulsā, aut lactosa siue lactei teporis pota, itēq̃ cocto melle excepta ac deuorata, citra molestia purgat, styrax terebinthina exceptus ac deuoratus, absinthiū & abrotonū similiter. At uero tenuiū intestinorū purgatio recētes obturationes, & crudorū humorū generatio nes, &

nes, & lumbricos rotundos curat. His uero purgatis, etiam uesicæ bilem suscipien-
tis meatus, qui ieiuno intestino inferit, propriâ actione minime impediēte perfici-
cit. Quin & inflationes & tormina uertiginosa ac uoluulosa horū purgatio per-
sanat.

Quæ sima hepatis purgant.

Cap. CXLVI

Polypodiū, mercurialis cocta comesta, lathyrides cū aceto mulso, chamelæa cū
ablinthio & aqua mulsā pota, brassicæ succus, cyclamini radix, lactis ferū, helio-
tropij, scorpiuri appellati succus, galli ueteris iusculum. Hæc auxiliantur diutur-
nis inflammationibus circa sima hepatis. Nam incipientibus profunt mitiora.

Quæ gibba hepatis purgant.

Cap. CXLVII

Amomi decoctū, flos iunci odorati, acori radix, gentiana cū aqua, agaricū cum
uino mulso. Est autē stomacho incōmodū, radice lauri cortex cum uino, rheon
Ponticum, glycyrrhizæ succus, amygdalæ amaræ præsertim, ablinthij coma, ani-
sum, sceniculi semē, spica nardi, radice quinquefolij succus, uiticis semē, dauci se-
men, petroselinū, cētaurij decoctū, pæoniæ fructus, selamū torrefactū, lauri, pala-
mularū ossa usta, symphyton, polygonū, erigeron, smyrniū, hipposelinū, anagala-
lis ceruleū habens florē, fumaria siue chelidonia quæ in sepibus nascit, securidacæ
semen, cornu cerui uisū, mentæ succus & decoctū, calamintha, costus, scēnū græ-
cum modicē frictū, bacanū, opobalsamū, radice myrti syluestris cortex, orde cre-
mor, lupini, phu, asariū, meon, pix. Hæc sanāt diuturnos circa gibba hepatis mor-
bos, siue cū tumore aliquo sint, siue sola intēperatura adsit cum dolore, siue obtu-
ratio.

Splenem euacuantia.

Cap. CXLVIII

Veratrum nigrum, epithymum, polypodium, scolopendrium, pæoniæ radix,
chamedrys decoctum, item chamæpityos, centaurij præsertim minoris, pulegij
decoctum, capparis cortex, colocynthidis cremor potus, mercurialis comesta, &
decoctum ipsius potum, lathyrides cum aceto mulso potæ, chamelæa, aqua ma-
rina calida pota, ericæ fructus cum petroselino, uiticis semen. Hæc omnia splenē
purgantia, etiam hepar ab obturatione liberant, & malos habitus, & hepaticas ac
splenicās, morbiq; regij & aquæ inter cutem affectiones generari prohibent.

Rhenes purgantia.

Cap. CXLIX

Omnia incisoria ui prædita, plantaginis radix & folia & semē, arida trita pota,
asparagus myacanthinus, pæoniæ radix, cicerū nigrorū decoctū, amygdalæ præ-
sertim amaræ, eryngij radice decoctū, damasoniū, adiantū, apij semen, scenicu-
li, dauci, petroselini, ammi, enisi, ligustici, asari decoctum, meon, phu, flos iunci
odorati, seseli, acori radix, gramen, uitis lachryma & cortex, sanguis hirci aridus.
Auxiliantur autem hæc pota post remissum inflammationū uigorem: dissoluunt
enim duos tumores qui fieri parant, & lapides generari prohibent.

Velicam purgantia.

Cap. CL

Vrinas à uesica ducit, acori decoctum potum, itemq; asari, oleum amaraci-
num, amygdalæ amaræ cum passo potæ, radice althææ decoctum, adianti de-
coctum, hæmatites lapis tritus cum uino potus, gallinarum stercus siccum, an-
chusæ decoctum, abrotani, anisi semen, sanguis hirci aridus, atriplicis semen, ara-
temisæ decoctum, aristolochiæ decoctum, sabinæ leuissimē tritæ drachma una
cum aqua mulsā, in non febrientibus cum uino, balsami semē, glandis decoctū,
bdellium, apij semē, bryoniæ radix, glycyrrhizæ succus, pulegium, pæoniæ fru-
ctus, dictamnū, dracunculus, abietis decoctū, rubiæ decoctum, serpyllum, eryn-
gij radix, heliotropiū, senecio, menta, saluia, foliorum oleæ decoctum. Hæc non
sinunt lapidum generationē in uesica fieri. Et crassities ac ferulentas subside-
ntias. Insuperq; scabiosas & ulcerosas affectiones sanare solent.

o 3 Quæ

Quæ glandi indantur ad prolectandas urinas.

Cap. CLI

Postquā uero repleta fuerit uesica urina, & contrahi nō poterit, neq; urinā ex primere, in glandē hęc indere solemus, nitrū aqua dilutū, muriā, fel, cyclaminū.

Lapides in rhenibus ac uesica euacuantia.

Cap. CLII

Hęc lapides frangunt, cardamomū cum cortice radice lauri potum, cyperus, oleum amygdalinum, paliuri semē, bdellium, foeniculi radix, libanotis, myrti syl- uestris folia, ceraforum fructus, prunorum succus, amygdalæ amaræ, rumicis ra- dices decoctum, seminis althææ decoctum, triboli uiridis decoctū, adianti deco- ctum, uitis lachryma, apri uesica sicca, lithospermon, tecolithos, betonica, saxifra- ga, lapides in spongijs, electrum.

Vterum euacuantia.

Cap. CLIII

Sanguinē ab utero ducunt iniecta & apposita hęc, Casia cum myrrha, calami aromatici decoctū, oleū amaracinū, uiola alba, thymi ac thymbre decoctum, cen- taurij radix, & ipsum centauriū, opopanax, uiticis semen, amygdalæ amaræ, nus- cum regiarū nuclei uisti cum uino appositū, decoctum absinthij, itemq; succus, sampsuchus, fefeli, galbanū, lilij radix, chamæpitys, artemisię decoctū, dictamnū, conyza foemina, rubiæ radix, urticæ semen cum myrrha, elateriū, ueratu nigrū, lupinorum decoctū, raphani cortex, herba lanaria, adeps cerui recens, adeps an- seris, resina terebinthina, fel taurinū cum mastiche, muscus qui & splanchnū & hypnon dicitur, cyperus, unguentū irinū, succus cyclaminij, anchusa, quinque- foliū, cuminū, sisymbriū, heleniū, saluia, heliotropiū, mercurialis, granū cnidium, uua exēptis granis, scenū grecū, sesamū, nucleusbaccarū lauri, amygdali amaræ ra- dix, cochleæ parue, lanæ succidę, celsypū, lactucæ syluestris succus, porrū, ceparū succus, calaminthę folia. Tot quidē sunt quæ in pessos, hoc est, talorū formas ex- cipiuntur, iniiciunturq; ac apponuntur. Vitadus tamen est assiduus usus eorum quæ inter ipsa sunt acriora. Solent enim ulcerationes inducere.

Quæ in potu sumpta menses ducunt.

Cap. CLIIII

At uero in potu accepta sanguinem ab utero ducunt pleraq; quidem ex præ- dictis, & omnia quoq; urinam cientia. Sed & erysimū & asarum cum aqua mula- sa, calamus aromaticus, alumen, castoriū, cicerū decoctū cum pipere & ruta. radi- cis asphodeli decoctū in uino elixatæ, itē pulegiū in uino cocti, radices eryngij de- coctum, abrotoni semen, origani, thymi, thymbre, rutæ decoctū, foeniculi deco- ctum, crethmon, cuminū, sinapi, marrubij semen, & succus & decoctum, smyr- nium, sion, oreoselinon, dauci semen, thlaspi, nigella, uiolæ albę semen, carpobal- samum, pęonię semen, bacce lauri, myrrha, cardamomū, cyclaminus, sagapenū, galbanū, semen foeniculi, spica nardi, mercurialis, costus, styrax, centaurij magni radix, sabina, iris, aristolochia, bryoniarū flos & succus, radices rumicis decoctū, artemisia, dictamnū. Singula ex his cocta cum utno, aut trita & pota, sangui- nem ducere creduntur. Conueniunt autem hęc his in quibus purgationes im- pediuntur, uel guttatim purgantur, aut oclusio uteri adest. Auxiliantur autē & declinationibus, & recursibus sursum uersus & strangulationibus uteri.

Quæ stercora euacuant.

Cap. CLV

Stercora euacuāt styrax deuoratus, mastiche cū aqua frigida trita pota, scrupu- lorum xii. pondere, aloës drach. i. terebinthine cochliariū, sinapi, alliū cum oleo & garo seruefactū, ficus cum nitro, cnici seminis medulla. Omnia uero prædicta ad tenuia intestina commoda, etiā magna intestina purgant.

Lumbricos educentia.

Cap. CLVI

Lumbricos rotundos & latos & ascaridas expurgant ea quæ de tenuib. relata sunt,

sunt, in potu accepta. Proprie uero expellit ipsos, auriculæ muris succus cū mel-
le potus, aut cū zytho, utriusq; cyathi mensura. Senecio in cibo acceptus, santo
nicū cū fico comestū, abrotoni decoctū, intestina terræ trita cocta cū passo pota.
Sudores excludentia. Cap. CLVII

In potu accepta sudores excludunt, cum inū, baccae lauri, anisum, uirga serpi-
lū, calamintha, polium, raphani cortex comestus, costus, sisymbriū, dictamnū,
artemisiā, cardamomū, libanotis, mel, lac bubulum, casia, iunci odorati decoctū,
succus cyrenæicus ciceris magnitudine deuoratus in frigidioribus morbis, cha-
mædrys, castorium cum aqua mulsa, centaurij magni radix, radicis capparis cor-
tex, ligusticum, petroselinum, nigella. Hæc aliquando cum uino, aliquando
cum uino mulso bibuntur, & sudores mouere creduntur. Sed & pistacia come-
sta sudores citra molestiam cient. At uero forinsecus illita sudores mouent, ni-
trum cum oleo, ungentū irinum, anethinū, chamæmelinū, laurinū, raphaninū,
sycioninū, myrobalaninū, althæa, costus, balsamū, aristolochia, casia, calamus aro-
maticus, libanotis, singula cum oleo cocta. Suffita uero sudores mouent, casto-
riū cum pulegio, semen balsami, bdellium, uiticis semen, utendū est his ad mor-
bū regium, & ad eos qui ob frigiditatem, aut cutis adstrictionem, non sudant.

Quæ euacuant & corrumpunt pediculos omnis generis circa cor-
poris superficiem. Cap. CLVIII

Sandaracha, aristolochia, staphis syluestris, sulphur uiuū, cinamomum, cala-
mus aromaticus, casia, pyrethrum, cinis quercinus, cucumeris syluestris radix.
De infusionibus sedis. Cap. CLIX

Plurima mala quæ in perniciem animalis generantur, propinat uentris sup-
pressio. Sequitur enim ad ipsam uentris adstrictionem, capitis grauitas & uer-
tigo, eversio stomachi, lacinatio uomitoria, nausæ & ac prostratus appetitus,
oris ficitas & amaritudo, ructus iniucundi, ac uirosi, spiritus graueolens, somni
suspensi, ac iniucundi, inflationes, tormina, uoluuli. Generat item plenitudinis,
& articulares, podagricosq; ac coxendicum morbos, omniq; auget, & malig-
nora ac diuturniora mala efficit. Aliquando uero etiam perniciofa ac lethalia.
Contingit aut infusionum per sedem usus etiam in alijs affectionibus, quarū ex
parte mentionem faciam. Ex infusionibus igitur quæ iniiciuntur, aliæ simpli-
ces sunt & teneræ, aliæ acres, aliæ uero alium usum ac uim habent. Ex simplici-
bus igitur, aqua calida ipsa per seipsam facit, eliciendorum stercoreū gratia, in cō-
tinuis febribus, malignisq; ac æstuosis, & in his qui ex longa imbecillitate uires
recolligūt, in quibus difficiles secessus fiunt. Calidiorem autem immitimus, in-
flat enim tepida. Verum aqua & oleo utimur in detentione duriorū stercoreū,
& in his qui ulcerosum ac mordacem sensum circa intestina habent. Vitare ta-
men aquā & oleū oportet, ubi capitis grauitas fuerit, aut stomachus subuertitur,
aut prostratus appetitus obtinuerit. Rosaceum aut pro oleo cum aqua inie-
ciū, aptū est in æstuosis febribus, & feruoribus excellentibus circa media, & ma-
ximè circa colum. Caput aut cōplet, & minus lubricū est quā aqua & oleum.
Immittendū est aut rosaceū quarta aquæ parte. At uero cū ouo & prisanæ succo
iniicimus rosaceum in æstuosissimis febribus, aut ubi mordacitas circa intestina
adest. Chamæmelinū uero oleū, & ouū luteū ac candidū, cū prisanæ succo infun-
dimus ad noctē, in ardentibus febribus, iubentes ipsum cōtinere per totā noctē.
Nam & somnū iucundū inducit, & causas febris sequenti die secū educit. Butyrū
uero cū aqua injectū morsus & tormina mitigat. Modicū aut esse oportet in his
butyrū. Facit & ad eos in quibus propter inflammationem intestini recti detinētur
o 4 sterco

stercora, & in sordidis ulcerationibus circa intestinū. At scōnigræci decoctum ex aqua citra pinguedinem infundatur in febribus ex pituita accensis, & in molibus ac mulierolis corporibus, & in intestinorū morfu. Caput autē abundē complet. Quapropter non utendū est eo, nisi caput à læsione fuerit alienū. Maluæ autem decoctū cōuenit in torminibus ac moribus, & præsertim si durum subest stercus. Seminis lini uero decoctū in corporibus ac morbis siccis cōuenit. Vtile est & moribus, & nauseabundis, & ualde sitientibus. Caput autē cōplet quādem, non similiter autē uelut scōnigræcum. Pūsanæ uero succus stercora dura dissoluere potest, & intestina extergere, & morsus mitigare. Alicæ succus morsus quidem mitigat, maximē uero conuenit cardiacis, & qui ex animi deliquio exoluuntur. Nam ad hoc quod nutrit, etiam uires reficit infusus. Insuper quā luciditatem subiectis stercoribus exhibet. Furfurū succus febribus siccis, & doloribus colicis, & intestinorū ulcerationibus cōmodus est. Exterget enim absque morfu. Portulacæ succus febribus accōmodatissimus est, in moribus ac feruoribus, tum alijs, tum in quibus propter durorū ac acrium stercorū excretionem, anus aut intestinū rectū læsum, ignis sacri affectionem incurrit. Verū in his misescere ad succū oportet & ouum, & rosaceū. Sed & per se succus portulacæ cōmodus est, ubi sacri ignis ardor in profundo circa intestina consistit. Lac iniicitur, ulceratione & inflāmatione circa intestina consistente, itemque in rhenibus & uelica atque utero. Serum lactis infusum, egregiē stercus educit, & omnes superfluitates in intestinis repertas expellit. Exterget etiam sordidiora intestinorū ulcera: Verū citra coagulum paretur. Oleum per se immissum calidū, cōmodum est inflammatis intestinis. Idoneū est etiam in extremē senibus, in quibus stercus induratur. Aqua mulsa cōuenit infusa in mitioribus febribus, & in mulierolis corporibus, & in decrepitis, quibus intestinū rectū aut cōlum perfrigescitū est. Rutæ decoctū, item anethi, & cumini cum oleo, dissoluit flatum, quapropter colicis immittitur. Oportet autē in his esse duas partes decocti, & unam olei. Fœnigræci succus butyro & terebinthina ammixtis, ita ut sit de utrisque quarta pars succi, maximē mitigat tormina, siue cōcussiones circa intestina. Nam & diu intus manet citra mordacitatem, & superfluitates educit citra turbationem. Vti lissimus est etiam ad uteri morsus. At pūsanæ succo miscetur butyrum & melis ualde parū, & fit cōmodus in detentis stercoribus propter intestinorum ulcerationem, & in sordidis intestinorū ulceribus. Rutaceum oleum cum butyro & terebinthina, utiliter infunditur in colicis doloribus. Aliquando uero picis liquidæ drach. iiii, aut bituminis drach. iiii, cum rutaceo oleo terentes infundimus, & sedat dolores, & pituitā euacuat citra molestiam. Aliquādo uero lanas sordidas in uino dulci coquimus & excolamus, atque hoc ipsum oleo rutaceo amixtum infundimus, & coli dolores sedat, ita ut sint uini mensuræ tres, olei uero duæ. Si uero nervorū ex quibus testes pendent, aut uelice dolor affuerit, etiam petroselinum leuissimē tritum rutaceo oleo inspergatur. In doloribus uero abscessuum, aut doloribus ulcerosis in intestinis, butyrū cū manna thuris immittimus, aut medullā cerui aut uituli cū oleo. Vbi uero frigidi fuerint morbi, & dolores lenti, galbanū cū butyro iniicimus, ut sit galbani drach. una, butyri sexunx. Aut styracis oboli tres cū butyro. Cæterū acribus infusis utimur in ischiadicis, lethargicis, erecta ceruicē spirantibus, & frigidis morbis, et ad eos qui lethale phar macū acceperūt, & in his quæ propter frigiditatem, aut cōcretionem in grumos, occidunt. Proinde in frigefactis toto corpore, syderatis, ischiadicisque ac nephriticis, castorij obol. iiii, tritos cū oleo immittimus addito modicō sale. Verū pro sale

fale nitru addimus, quū bis aut ter promptitudinem ad excernendū facere uolumus. Sal etenim aceruatim quidē mordet, nō perseverat aut diu ipse morsus. At nitrum caput male afficit ac replet, & stomachū evertit, quale nihil salī adest. Efficacia aut sunt ad paulo antē relatos, garū ā siluro, marina aqua, muria, decoctū centaureæ, colocynthidis, aristolochiæ, cucumeris sylvestris radices, agarici, thymi, chamæpityos, seminis rosmarini. Hæc enim & sanguinē ducunt, & hoc ipso affectiones leuant.

De glandibus.

Cap. CLX

Glandibus subdititijs utimur, aliquādo ob ægrotū imbecillitatē, qui infusis uti nō possunt. Aliquando propterea quod stercora sint apud intestinū rectū, & infuso nō habeant opus; præsertim in febribus uehementibus ac ardentibus, & materia sursum repentē habentibus, in quibus nocius est infusionū usus. Nam in his absq; omni molestia educitur superfluitates insitæ, per glādes subditas. Cōmodæ sunt etiam omnibus frigidis capitis affectionibus, altiore somno pressis ac deliris. Cōtingit etiā ipsorū usus sæpe in his quibus nō excernitur id quod per clysterē immissum est. Præparatur aut diuersimode glandulæ ipsæ. Nā & ex melle cocto, & fale tosto, & nitro præparatur. Et ex cumino & ruta nitroq; ac melle cocto, in quibus inflatio magis infestat. Sed & thymus tritus cocto melle excipitur. Et cyclaminus trita cū melle. Et absinthiū, aut abrotonū, aut lupinorū farina cū melle. Hæc aut glandula ad lumbricos cōmoda est. Aut hyssopū & tragoriā ganū & epithymū cū melle. Hæc in stomachi subuersione utilis est. Aut granū enidiū cū resina sicca siue melle cocto. Aut pyrethriū cū resina sicca. Aut sinapi cū sicca resina. Aut centaureiū cū pice & cera. Hæc cōmodæ sunt in partiū resolutione. Aut bitumen, radices panacis parū, hyssopū, galbanū, & resina sicca. Vtilis est hæc glās ad resolutos toto corpore, & propterea facultatē excernendi debilem habet. Facit & in resolutione intestini recti. Facit ad ascaridas. Potest aut pro melle resina sicca in usum assumi, aut pix, aut hieus pinguislima trita, aut uua passa exemptis granis, aut sapo. Optima uero glācula fit ex folijs mercurialis uirgibus tritis ac efformatis & siccatis. In infantibus aut etiam grumus salis inditur, cepaq; ac porri capitātū.

De tomentis siue floccis.

Cap. CLXI

Sæpe etiā opus est aliquid subdere, in his qui scissuras aut cōdylomata in ano habent, dilantant aut hæc ā glandiū duricie. Vnde cogimur tomentis pro illis uti. Materia uero horū sunt omnia antē relata, quæ trita cū melle, & tomēto siue flocco excepta ano induntur.

De Aëre, Galeni.

Cap. CLXII

Bonus est aër in omni tempore qui exactē purus est. Talis aut fuerit is qui nō ex stagnorū aut palustriū locorū euaporatione turbatur, neq; ex barathro quorūdam uenosam aurā cōcipit. Velut uerbi gratia, si ex quibusdā cloacis magnam ciuitatē expurgantibus cōturbatur, malus est. At uero & qui nebulosus est, non est bonus. Quemadmodū etiā qui in regione caua undiq; altis montibus includitur, malus est & æstuosus ac strangulatorius. Qui uero in montibus altisq; regionibus est, & nullam aurā suscipit, salubrior est, cōmodus erecta ceruice spirantibus & tabidis, & omnibus thoracis ac capitis affectionibus. At qui in humilibus regionibus purus est, cōmodus est animo deliquētibus ac senibus. Marinus uero hydropicis & fluidis affectionibus, & præsertim frigidiorib. utilis est, & neruis per consensum affectis, & prostratæ appetitiæ. Qui uero in petrosis locis est, hyeme quidē grauis est, frigidus enim est, æstate uero æstuosus est. Malus est etiā qui ex metallis exhalat. Qui uero ex argillosis, stomachū exoluit. At ex locis terræ fuluæ, magis priore siccatur. Optimus aut est ex terra nigra. Sed & circa anni tēpora, mutationes aëris fiūt, Et uerno quidem tēpore humidus et calidus est aër.

Æstate

Aestate uero siccus & calidus, Autūno frigidus & siccus, hyeme frigidus & humidus. Rursus autē in singulis temporibus tres differentiæ sūt, prima, media, & ultima. Media itaq; sincerissimū temporis temperamentū habent. Prima uero & ultima à uicino tempore imminuuntur. Sed & luna secundū mensem quatuor differentiās in aëre operat. Primus igitur septenarius à nouilunio usq; ad septimā diem, similis est ueri, humidus & calidus existens. Secundus uero septenarius usq; ad pleniluniū, aestati similis est. Tertius sextenarius decrescente luna, autumnō. Quartus & ultimus, hyemi. Sed & singulis diebus differentiæ aëris fiunt. Matutinū enim tēpus humidū est & calidum, uelut uer: Quapropter etiā corpora tum sanorū, tum ægrotorū remittuntur, ut etiā febrientibus hoc tēpus facillimē tolere tur. At mediū diei, aestati assimilatur. Crepusculū autūno, uespera hyemi. Quin & noctis prima pars ueri assimilatur, media aestati, & reliqua consequenter.

De Ventis, Adamantiū Sophistæ.

Cap. CLXIII

Quandoquidē uero ex terrę exhalationib; uēti generant, etiā de his paucis tractandū est. Ventos quidē parturit terra, parit autē fuliginosas exhalationes. Nā caliditas humiditati inuoluta, sicciores exhalationes, & uelut fuliginosas faciēs, uentos generat. Siccā autē exhalationē nunc accipe ad cōparationem aliorū, uelut si uinū siccus dicamus. Vniuersales uēti duodecim sunt numero, Orientales tres, eurus, subfolanus, cæcias. Occidentales tres, aphricus, fauonius, thrascias. Vnus autē meridionalis appellatus auster, & unus septentrionalis boreas: ut sint relati octo, alij uero quatuor inter relatos mediū sunt, & ab angulis mundi excitantur. Inter oriētes & meridiē, Euroauster, Inter meridiē & occidentē, Aphrico auster. Inter orientē & septentrionem, Aquilo. Inter septentrionē & occidentē, Argeestes, siue circius: ut sint omnes uniuersales XXII. Alij uero qui uernaculi sunt singulis regionibus, spurij existūt. At uero aliæ exhalationes ex terra fientes, humidiore his sunt quę uentos generāt. Si quidē igitur modica & tenuis fuerit exhalatio, uapor nubilofus generatur. Si uero amplior & crassior, caliginosus. Si uero adhuc crassior, tenebricosus. Plurima uero ac crassissima humiditate exhalante, uapor diffundit in ambientē roscidus. Ex his quatuor exhalationibus cōcretis rores & imbres sūt ac deferunt: cōgelatis uero pruina, & niues, & grādines, pro frigoris qualitate ac quātitate. Nulla uero harū uentū generare solet, quā segnes sint & impetu careāt. Et humida quidē exhalatio quę uapor appellat, rores & imbres facit. Siccior autē facit uētos, & est sicca humidę cōtraria. Quomodo uero sæpe simul imber & uētus sit, dicimus, q̃a ex alio atq; alio loco afferunt. Quū enim ex diuersis latitudine locis cōtrarię exhalationes sūt, tūc & pluit & flatus fit. Cur autē aliquādo post pluuiā uenti sūt, aliquādo post uentos pluuiā sequit, dicimus. Quoniā caliditas in terra nō habet in illo tēpore humorē quē accēdat, & propterea manet ociosa, ubi uero arripit pluuiālē humiditatē, efflorescit: & per materiæ incensionē fuliginē excitās uentos efficit, qui iā sanē cōsumpta pluuiā nube, manēt in serenitate spirātes, aut impellūt id quod ipsos genuit. Pluuiā itaq; hoc modo uētos generat. Vētus autē pluuias hoc modo generat. Ostēdimus quod cōmunis est caliditas utrisq; exhalationibus. Verū humiditas quātitate diuersa est. Quū igitur multa fuerit caliditas, larga uero humiditas, tūc appropinquantē humiditas in superficie exurit, & fuliginē simul ac uapores facit. Transpirās autē caliditas ex multa humiditate paulatim imminuit, & nō amplius humiditatem exurit, sed diffundit, & uapores pro fuligine facit. Atq; sic succedit imber post. Et sæpe ad multos dies obtrinet pluuiā calido exoluto, & nō amplius materiā exurere potente. Cur autē multi & assidui borales ac anniuersarij uenti in aestate sūt? Quoniā sol

sol sub boreali polo plurimam reperiens humiditatem, partim in niuē, partim in aquis cōgelatis, & hanc paulatim eliquans, diuidit quidem in fluuiorū ac stagnorum generationem, effundit autē & fontes in terra, Et propterea multas exhalationes efficit, quas in flammam exurēs, unā cū caliditatibus multo tempore in terra occultatis, fuliginosas ipsas reddit, & quod exurit ad uenti diuturni fluxū paulatim redigit. In cōmuni igitur omnis uentus longiorem aëris fruitionē exhibet corporibus, uiolento motu aërem inducēs. Porro locales uenti similes sunt locis ex quibus spirant, à salubribus locis, salubres, à morboſis, morboſi. Quare ex relatis de aëre, etiam de his coniectare oportet. Quo uero in summa dicamus, omnes locales uenti uniuersalibus morboſiores sunt. Nā corpora inæqualiter afficiūt, neq; totum aërem cōmouentes, neq; per totū diem spirantes. Maxime enim locales uenti circa matutinū solū tempus spirāt, quos nautæ Apogeos, uelut è terra eleuatos appellant. At ex uniuersalibus uentis hi qui à meridie spirant Austri appellati, calidū temperamentū habentes semper, ferme etiā humidifunt. Transmutatur autem ad tempora anni, & sunt calidi ac sicci. Et propterea uarios morbos generant. Boreales uero frigido sunt temperamento, & ideo omnium uentorum saluberrimi, & præsertim in calidioribus ac carnosissimis corporibus. At uenti orientales uehementissimi sunt, & morbos à siccitate cōtingentes efficiūt. Occidentales autē humidifunt ac lenes, & corporibus nostris magis familiares.

De acceſſione ac ſignificatione ſtellarum. Cap. CLXIII

Quandoquidem etiā ſtellæ in cœlo orientes iuxta tempora à deo ipsis ordinata, & ſimiliter occidentes, aëra mutant, ut cōtingat ex hoc etiam uentos aliās aliter ſpirare: Neceſſarium duxi hic tempora indicare, in quibus earū quæ palam aërem alterāt, ortus & occaſus fiunt. Nam ſanctorū corpora, & multo magis ægrotorum iuxta aëris ſtatū alterantur. Menſe Martio qui Dyſtros græcis eſt, equus mane oritur decima nona die. Menſe martio die XXIII, æquinoc̃ium uerum eſt, & maxima aëris turbatio. Menſe aprilī hoc eſt Xanthico, prima die in tempeſta nocte pleiades apparent. Menſis april. XXI, pleiades ueſperi occultantur. Menſis april. XXI, pleiades cum ſolis ortu oriuntur, & eſt maxima circa aërem turbatio. Menſis aprilis XXVII, orion ueſperi occultatur. Menſis maijſio, hoc eſt Maio, prima die hyades ſimul cū ſolis ortu oriuntur. Menſis maij quarta, lyra ueſperi oritur, & Aër multū alteratur. Menſis maij ſexta, Capra mane oritur, & ualde alteratur aër. Menſis maij ſeptima, pleiades mane apparent, & aër ſedari incipit. Menſis maij XXI, hyades mane apparēt, & aër ualde alteraſ, pridie aut nudiuſtertius eius diei. Menſis maij XXIII, capra ueſperi occultatur, & nudiuſtertius eius diei aër mouetur. Menſis Iunij ſecunda, aquila ueſperi oritur. Eiuſdem ſexta arcturus occidit. Nona delphin ueſperi oritur. Vigefima quinta orion mane oriri incipit. Sunt autē ſolſtitia æſtiua, & aër tribus diebus antea ualde alteraſ. Menſis Iulij tertia orion totus oritur. Decima quarta procyon, ſiue canicula mane oritur. Decima nona canis oritur, & cōtingit maxima aëris turbatio, aliquando etiam nudiuſtertius eius diei. Vigefima quinta aquila mane occidit. Menſis Auguſti decima quinta lyra mane occidit decima nona delphin mane occidit. Et eſt mutatio æſtatis ad frigiditatē. Vigefima octa ua uindemiator mane oritur, & malus nauis occidit. Et eſt finis dierū poſt exortū canis. Menſis ſeptembris ſeptima capra ueſperi oritur. Decima ſep̃ima arcturus oritur, & alterat ſequenti die aërem. Decima nona ſpica mane oritur. Alteratur aër duobus diebus antea. Vigefima quinta æquinoc̃ium fit autumnale, & eſt maxima aëris turbatio tribus antea diebus. Quare cauendum eſt

ne

ne uenam secemus, neq; purgemus, neq; aliàs corpus uehementi motu moueamus, à decima quinta septembris usq; ad uigesimam quartam eiusdem mensis. Mensis octobris sexta corona mane oritur, & est uehemens aëris mutatio. Septima hœdi uesperis oriuntur. Decima septima hyades uespere oriuntur, & magna fit aëris turbatio. Vigesima tertia una cū solis ortu pleiades occidunt. Et cōiungit pridie maxima aëris turbatio. Mensis nouembris sexta pleiades mane occidunt, & incipit aër sedari. Vndecima lyra mane oritur. Vigesima prima hyades mane occidunt, & sequenti die turbatio fit circa aërem. Vigesima septima orion oriuntur, & corona occidit. Mensis decembris prima, canis mane occidit. Obseruatum est autē à multis, quod si tempestuosa fuerit hæc dies, perseverat plerūq; turbatio aëris ad dies xxxvii. Si uero serena fuerit, per tot dies serenitatem fore significat. Decima hœdi mane occidunt. Vndecima capra mane occidit, & perturbatio aëris fit posttridie. Vigesima tertia solstitium est hybernū. Mensis ianuarij quarta delphin oritur. Quinta Aquila uespere occidit, & fit turbatio uehemens post duos dies. Vigesima quinta illustris stella in leone occidit. Mensis februarij sexta fauonius spirat. Vigesima secunda malus nauis uesperis occidit, & est turbatio aëris magna. Vigesima quinta Arcturus uesperis oritur. Vigesima sexta hirundines uolant & apparent.

De Aquis ex Rufo.

Cap. clxv

Aquarū potabiliū quinque sunt uniuersales differentiæ, pluuia, fontana, puteana, fluuialis, stagnina. Ex his apparet aqua pluuia leuissima & facillimè mutabilis, & in alijs affectionibus potu optima, si statim excipiat ac coletur. Verū febribus & his qui bilem supernè ac infernè reddūt, & regio morbo incōmoda est. Mutatur enim facillè & in bilem transit. Idonea uero est ocularijs medicamentis, ad fluxus aut ulcera destinatis. At his quæ uisum acutiorem reddunt inepta est. Itemq; ad metallicorū pharmacorū loturā. Adstringit enim amplius quàm fontana. Quare neq; extergit, neq; cōcoquit, neq; madescit, & excretiones impedit. Diuturnior autē acerbior fit, & difficilior transit, & ægrius secernit, tardius item cōcoquitur ac digerit. Generat autē destillationes præsertim si frigida bibatur. Fontanæ uero aquæ, quarū fontes ad septentrionē erūpunt ex petris stillantes solē auersum habēt, incoctiles ac tardī transitus sunt, & tarde calefiūt, ac frigesciunt. Quarū uero fontes ad orientes erūpunt, & per meatū quendam aut terrā purā excolantur, calefiuntq; ac frigesciūt citissimè, hæc optimæ sunt, nisi ex cloacis quibusdam uitiiū ipsis accedat. At puteana frigida est, terrea, difficulter excernitur, ægrè digerit, & propterea æstuoso stomacho aut uentri cōmodior est quàm fontana. Fluuiiales autē aquæ & stagninæ omnes malæ sunt, Nisi aqua excepta, hæc enim omnibus uirtutibus exornata est. Nam & in potu iucūda est, & moderato tēpore in aluo morat, sitimq; extinguit, & si quis frigidā bibat, minimè molestat, & ad cōcoctionem ac digestionē utilis est. Vnde concinnū, & robustū, & bene coloratū corpus facit. At aliorū fluuiorū aqua ægrè cōcoquitur, siccatur, & siticulosa est, & præsertim si uitiosas aliquas regiones pertransit. Meliores autē sunt fluuij, qui per fontes perpetuos fluunt, & alijs fluuijs non miscentur. Stagnina uero aqua, propter coenofam circumferentiam, limosa & grauis est: & propter stationē ac immobilitatem, uelut mortua & putrefacta. Quare nunquā alia præsentē aqua, exhibenda est hæc debilibus. Porro iuxta terram quoq; ac regiones, plurimæ aquarū differentiæ fiunt. Verū ut in summa dicā, quæ gustui congrua est, & cui inhabitatorū experiētia testimoniū præbet, optima censenda est. Nā quæ cito calefcit ac frigescit, & facillè carnes ac alia omnia coquit, ea etiā cibos in

in ventre concoquit. Quaecumque uero aquae adstrictionem, aut salsedinem, aut nitrositatem, aut crassitiam, aut aliud quid in gustu detegunt, malae sunt. Item quae graueolent, & quae concretionem superstantem habent, & subdentiā foetidam ac solidam, & quae instar lapillorum aereis uasis adherent, & quae hircudines nutriunt, aut talia quaedam praua animalia: & stantes, & palustres, & quae sunt in metallis auri & argenti, aut aluminis, aut sulphuris, aut similibus. Et quibus radices insitae sunt, incommoda sunt. Et quibus uicinae sunt calidae aquae siue spontaneae erumpentes, omnes tales malae sunt. Optimum igitur fuerit talem aquam praecoquere in fictilibus uasis, & frigefacere, & rursus calfactam bibere. Caterum in peregrinationibus aut exercitu, fossae consequenter faciendae sunt, ab altissimis locis ad decliues, & per has ducenda est aqua, ita ut in totas fossas terra dulcis ac pinguis mittatur, ex qua fictilia fiunt. Semper enim in fossis relinquitur aquae malitia. In summa omnis aqua tarde transit, aegre concoquitur, & flatuosa est, & praesertim frigida destillationem facit. Si uero ab acceptis in cibo oleribus quis aquam bibat, maius est periculum, ne homo tenuia capitis ulcuscula, & scabiem, et lepras, pustulas, impetigines, furfures, putrida ulcera, herpetas, satyriases, aut ex his aliqua incurrat, & ad hoc urinas mordaces talesque etiam egestionem habeat, & praesertim si nitrosa fuerit aqua. Incommoda est etiam thoraci, arteriae ulcerate, nitrosa aqua, thenibus item ac uescicis & omnibus ulceribus. Emendant autem nitrosam aquam, cibi hebetantes ac uinum. Crassam uero, secantes & attenuantes, uelut sunt allia & similia. Aluminosam, uinum tenuissimum, omnia urinam cientia, & omnia excretionem impellentia. Videtur porro aqua conuenire capitis doloribus, hebeti uisui: comitali morbo, articulari morbo, tremulis, resolutis, per se, & cum melle pota. Commodior est autem his quae ab utero strangulantur, & qui bilem generant nigram siue flauam, a quibus os uentris roditur & robusto uentri, ac intestino ieiuno, & iuuenibus exudantibus carnosus, & omnibus pinguibus, & nimium purgatis, & ex uulnere sanguinem fundentibus, aut ex naribus, aut alio loco. Commodat & astuosa febris tempestiue data. Conuenit etiam his qui assidue in somnis semen effundunt, & qui alias seminis profluvio laborant, in potu accepta: quanquam prodest etiam in ipsa natate, ex eaque perfundi conuenit mulieribus e fluxu, aut pica laborantibus. Conuenit singulis, & oris graueolentiam habentibus frigida pota. Tepida uero conuenit morbo comitali, capitis doloribus, lippientibus, gingiuis dentium corrosis, dentibus perforatis, gingiuarum abscessui, & gingiuis cruentis, faucibus ulceratis, tonsillarum morbis, fluxioni capitis, atrae bilis feruori, bili supernae ac infernae erumpenti in principio, et uomentibus in febris biliosa. Conuenit etiam tepida aqua quum frigida impedimentum fuerit, & his qui ulcera habent circa septum transversum, & sanguinem spuuntibus, & rupturis in succingente costas membrana. At uero calida aqua conuenit, ubi oportet excretionem praeparare, & ubi quid attenuare, & ubi diffundere, aut liquefacere, aut molliare, aut eluere, aut concoquere, aut discutere uolumus. In uniuersum igitur calida pota haec potest. Particulatim uero, mucum ducit, & sreatum adiuuat, & dolorem omnem mitigat, & praesertim in precordiis ac intestinis, ructum mouet, & flatum prouocat, urinam ac secessum ducit. Bona est etiam ad concoctionem, ac digestionem, & nutritionem, atque augmentum. Menses ducit, nervis & conuulsionibus idonea est. Pleuritidi item ac peripneumoniae & anginae. An uero nutriat, aut non nutriat, & an sit alimentum uehiculum, non est propositum

o hic

hic quærere. Quod uero dicere necessarium est, hoc est, quod sine aqua alimen-
tum concoqui non potest: Sicut neque citra aquam quicquam commodè coqui
potest. Cæterum aqua lixiuij pota splenicis prodest, Et si quis panem cum ta-
li aqua præparatum ipsis præbeat, multum prodest.

De Balneis. Ex Galeno.

Cap. CLXVI

huius generis balneum

Balnea quædam sunt dulcia, quædam qualitatis exortia, quædam qualitatē
aliquam habent, Et quæ aliam quandam qualitatem habent, partim ex nostro
studio uim habent, partim naturalem uim per se possident. Primum igitur de
dulcibus dicendum est, quandoquidem horum usus frequentior existit. Dulciū
itaque aquarum uis humida & calda est, siquidem fuerint temperatæ. Si uero te-
pidæ fuerint, humida & frigida. Si uero calidiores aquo factæ fuerint, calida
quidem ipsarum uis est, non autem similiter humida. Inhorrescere enim co-
gunt corpora, & meatus ipsorum densari, ut neque extrinseca humiditate fru-
antur, neque ex internis superfluitatibus quid euacuetur. At enim à tempera-
tis incipiendum est. Temperatæ itaque semper humectant per seipsas ac calefa-
ciunt. Contingit autem ipsas aliquando aut discutere humiditates ex corporis
quibusdam partibus, aut mollere, aut concoquere, aut corroborare uirtutem,
aut dissoluere. Ad hæc tamen etiam quantitas ipsarum non parum confert.
Commoda uero sunt talia balnea, dulcia inquam et temperata, in febribus sic-
cis & humoris exortibus, & præsertim in immodicè sitientibus, & in forti in-
solatione, & in pustulis scabiosis. Oportet autem & aërem balnei humidum ef-
ficere pauimento & parietibus atque conspersis. At uero calida ex nostra indu-
stria parantur balnea, quum frigiditatem infestantem sedere uolumus, aut las-
situdinis affectum, aut cōuulsionem, aut dolorē mitigare. Fiant autem calida,
calfactiōis quibusdā aquæ immixtis, uelut pulegio, origano, hyssopo, thymo,
thymbra, saluia, folijs lauri, pyrethro, chamapity, panacis radice, rosamarinis se-
mine, & similibus. Balneis autem discussorijs utimur, aut habitum corporis gra-
uissimè reddere uolentes, uelut in pinguibus, & ex affectiōe tumefactis, aut toto
corpore, aut aliqua parte, uelut abdomine, testibus, pedibus, uelut in hydropi-
cis contingit. Utimur etiam in fluidis ulceribus, propter subiectam in toto cor-
pore multitudinem, aut uaricibus ulceri subiectis. Fiant autem discussoria
balnea, iniectis aquæ talibus quibusdam, qualia sunt, sal, nitrum, aqua marina
calefacta, & mel aquæ ammixtū, aut staphis syluestris cocta cū aqua ex cinere
ficulneo aut uitis percolata. Item baccae iuniperi cum eadem aqua coctæ, & sul-
phur eadem aqua elutum, adarce & alunem cum eadem coctum. At uero
mollibus, & lenibus balneis utimur, in inflammatione ac duritiæ quadam par-
tium. Talia autem sunt malua in aqua cocta, tum hortensi, tum syluestri, &
semine lini, & scenigræci, & meliloti. In fluidis autem inflammationibus, plan-
tago aut polygonum aquæ incoquitur, aut malicorium, aut rubi folia. In con-
uulsionibus autem inflammationē minantibus, utimur his quæ iam relata sunt
in inflammationibus absque fluxionibus. Maxime uero prodest his aqua & ole-
um, in quibus malua, scenum græcum ac semen lini sunt incocta. Si uero duri-
tia est citra inflammationem, prædictis discussorijs utemur.

De balneis naturalibus. Archigenis.

Cap. CLXVII

Ex balneis naturalibus quædam sunt nitrosa, quædam salia, quædam alu-
minosa, aliqua bituminosa, aliqua sulphurenta, aliqua ferri, aliqua æris quali-
tatem habent. Quædam uero ex his composita sunt. Horum autem omnium uis
est siccare. Aliqua uero unà cum hoc quod siccant, etiam sternuē calfaciunt.

Quædam

Quaedam unà cum siccando etiam adstringunt, uelut aluminosa, ex parte uero etiam falsa, & quæ aeris qualitatem habent. Omnia autem sunt commoda humidis & frigidis præter naturam corporibus, & talibus morbis diuturnis, Quapropter conueniunt morbo articulari, podagræ, resolutionibus, nephritidi, anhelosis, fracturis calli inductione egentibus, ulceribus fluidis, inflammationibus diuturnis & iam induratis. Et nitrosa quidem ac falsa capiti conueniunt, & thoraci fluxionibus uexato, & stomacho humido, & hydropicis, & tumoribus omnibus. Aluminosa uero, sanguinis reiectioni, stomacho uomenti, & his qui immodice ab hæmorrhoidibus euacuantur, & foeminis quæ inordinatè purgantur, aut nimium purgantur, & quæ citra manifestam causam frequenter abortiunt. Profunt & his qui immodicè exudant, & tardè concoquunt, & tumoribus furarum, Commodant etiam uaricibus. At sulphurenta & nervos molliunt, & tenefini dolores mitigant. Verum stomachum exoluunt ac subuertunt. Purgant autem cutem & propterea conferunt utilitati albe ac nigrae, lepræ, scabiei, impetigini, & ulceribus antiquis, articulorum fluxionibus, spleni indurato, hepaticis ac utero, resolutis, coxendicum morbo, & pruritui. Bituminosa uero caput replent, & sensuum instrumenta lædunt. Perseueranter autem calfaciunt, & cum tempore molliunt, & præsertim partes circa uterum & uesicam accolum. Quæ uero aeris qualitatem habent, ori & tonsillis, & uix, atq; oculis excellenter comodant. Ferri uero qualitate prædita stomacho & spleni conuenientissima sunt. Porro quæ mixtâ qualitatem habent, iuxta dominium mixtorum operantur. Oportet autem ingressus ad naturalia calida balnea citra turbationem facere, quo uis ipsorum remisso corpori allabens immergatur. Nam qui perturbati ingrediuntur, eorum corpus horrescens densatur, & non suscipit ab aqua qualitatem. Cæterum bituminosis & sulphurentis aquis salientibus, caput supponere non oportet, facile enim inde læditur.

De frigida lotionē. Ex Galeno. Cap. CLXVIII

Frigida balnea conueniunt inculpate sanis. Corroborant enim totum corpus, & cutem duram ac densam efficiunt. Optimum est autem hoc præsidium contra læsionē ab externis. Non autem dico conferre frigide lotionem his qui uulgari uictu temerè utuntur, sed solum his qui exactè uiuunt, et laboribus ac cibis cōuenientibus utuntur. Sint autem neq; ex uenere, neq; aliâs lassati, neq; crudi, neq; prius uomuisse debent, neq; uentre malè affecti esse, neq; uigilasse. Alioqui periculosus fuerit eius usus. Oportet autē insuetos ad frigida lotionem paulatim adsuafacere: Et primum quidē in estate ipsius usum auspicari, & primum non in sinceram frigidam ingredi, sed quæ superficiem habet exolutum. Deinde ubi paulatim per totam hyemem adfuerit quis, ita ad frigidam accedere. Sit autem dies in qua auspicatur, à uentis tranquilla, & quàm maxime pro illo tempore calida, et in meridie initium faciat. Qui uero frigida usus est sit ætate circa quintum & uicesimum annum, sit animi alacris & ualde uirilis. Et primum fricet corpus linteis diutius frictione duriore: Deinde per oleum fricetur cōsuetum, postea exerceatur, atq; ita in frigidam descendat, non lentè, sed cōsertim insiliens, quo in uno tempore omnibus corporis partibus aqua circumfundatur. Nam quæ paulatim appropinquat, horrorem inducit. Sit autem aqua uelut dictum est, neq; tepida, neq; purè frigida. Postquam autem egressus fuerit ex aqua, à pluribus per oleum fricetur, donec cutis incalescat. Et postea cibos plures quàm solet ingerat: Nam plures appetunt à frigida lotionē & melius cōcoquunt, & minus sitiunt. Quare etiā paucior potus ipsis dādus est.

De infessu in solium ex oleo, Galeni.

Cap. CLXIX

Infessus in solium ex oleo, conveniunt diuturnis cum frigore febribus, & lassatis, & dolentibus nervos ossibus incumbentes, & convulsis, & urinæ sup-
pressæ. Oportet autem quintam olei partem ad ignem calfacere: Reliquum
vero in solium immittere. Satis autem calidum fit, quod in parva solia bal-
neorum immittitur. Quinta vero pars ad reliquum calfacta adijciatur, atque
sic æger inducatur.

De spongiæ usu, Archigenis.

Cap. CLXX

Spongiæ usum assumimus in alijs quidem partibus, aut ad sordes incumbē-
tes detergendas, aut ad saniem, aut sanguinem, aut pus, aut ipsa medicamenta,
aut ut corpora à mordacitate aut pruritu vexata mitigemus. Verum in facie,
ut spiritum renouemus ac resuscitemus, uelut in his qui animo linquuntur aqua
adhibemus æstate quidam frigidam, hyeme uero lactosam siue lactei teporis.
In ægrotis autem cautè hoc faciendum est, non in principio, neq; in augmento
exacerbationis, sed in uigore ac declinatione. In principijs enim impetuum
refocillamus per odoramenta. Vult autem Archigenes in febris ardētis excel-
su iuxta ipsum uigorē, ut nō solū facie spōgiā adhibeamus, sed etiā pectori.

De aspersiōibus.

Cap. CLXXI

Sed & aspersiōes faciei assumimus in ægrotis, ob prædictas causas. Et est
te quidem in ardentissimis febribus frigidam adhibemus, hyeme uero calidio-
rem. Verum in simplicioribus febribus, & in stomachi subuersione, etiam po-
scam aspergimus. Cauendum autem ne diutius immoremur, & præsertim in
his qui caput quod facile læditur habent. Nam delationis in soporem grauiorē
ac periculosa frigiditatis initium præbet. Utimur etiam aspersiōibus in oculis
fluxione infestatis, ocymi decoctū uelut efficacissimum adhibentes, et ramulo
rum pinastrorum contusorum decoctum. Subijciatur autem mento spongia
sicca, ut ne defluat aqua ad pectus.

De irrigationibus.

Cap. CLXXII

Irrigationibus utimur ubi ob aliquam circūstantiam balneum adhibere pro-
hibemur. Et in uigilijs in febribus, & ad delirantes ipsis utimur, uelut est deco-
ctum chamæmeli, aliquando etiam calicum papaueris. Quin & decoctis in
oleo calicibus papaueris, caput irrigamus, & statim iucundus somnus sequi-
tur. Archigenes autem præceptorem suum Agathinum ex uigilijs deliran-
tem, confestim à delirio ac uigilijs liberauit, capite eius multo calido oleo ir-
rigato. At in conuulsionibus caninis oleo sicyonio calido, aut aliquo consi-
mili caput perfundendum est. Item in his quibus nerui fortiter sunt afflicti. Si
uero frigiditas & tremor ad afflictionem neruorum consequatur etiam casto-
rium ad sicyonium ammiscendum est. Podagricos uero marrubio in aqua aut
uino cocto irrigamus.

De infessionibus.

Cap. CLXXIII

Infessiones assumimus in partibus inflammatis, aut ob balnei penuriam, aut
propter uirium debilitatem, aut ob aliud quoddam impedimentum. In inflam-
matis igitur rhenibus, utimur decocto scængræci, maluæ horrēsis ac syluestris,
seminis lini. In calculosis uero, iisdem propter inflammationē, & artemisiæ de-
cocto, ac rosamarinī, & petroselinī, ac spicæ nardī. Iisdem etiam utendum est in
uesica, adiecta etiam ruta. Ad uterū uero, artemisiæ decocto, saluiæq; ac lau-
ri, & similitum. Ad colum autem, sinonis & panacis decocto, & lauri ac simi-
lium. Ad sedem, meliloti, calicum papaueris & rosarū decocto. Ad fluxiōes
autem

autem uteri & hæmorrhoidas ani, plantaginis decoctum conuenit, & polygonij, malicorij, rosarum, ruborum, ac similitum. Ad uulnera uero conuulsionem denuntiantia, aqua & oleum. Omnes igitur illincēdi sunt, & inducendi usq; ad inum umbilicum. Oportet autem & partes quæ non madefiunt, prius inungere, & præsertim caput, & tegere ut ne repleatur.

De humectationibus.

Cap. CLXXXIII

Humectatio differt ab irrigatione, eo quod perseverantem ex adhibito auxilio habet utilitatem: Nam aut lanam aut linteum humectantes imponimus partibus affectis post perfusionem siue humectationē. Habēt igitur minorem uim quam cataplasmata. Utimur aut ipsi ad caput, quod nō probē ad cataplasmata dispositū est, et ad eos qui ob debilitatē ferre nō possunt cataplasmatū grauiatē, & ad præcordia inflāmata, circa morborū principia, quū intempestiuus sit tunc cataplasmatum usus. Utimur etiam ad fracturas ac contusiones necessitate expetente, quando emplastica pharmaca assumere non possumus.

De fomentis, perfusione, cataplasmatibus ac cucurbitis.

Ex Galeno.

Cap. CLXXXV

Fomenta cutem rarefacere solent, & facile transpirabilem efficere, & sanguinem in inflammationibus attenuare ac discutere, toto nimirum corpore tunc superfluitatibus carente. Nam superfluitas quæ redundat in quibusdam per omnem cutem, plus ad calefientem partem trahetur quam discutietur. Quapropter ante fomenta totum corpus euacuare oportet. Humida itaq; fomenta inflammationibus conueniūt à biliosioribus humoribus factis. Sicca uero his quæ à tenui & aquoso sanguine productæ sunt. Et leuia quidem fomenta mordacibus humoribus conueniunt. Mordacia uero & attenuantia, crassius ac uiscosis. At uero calfacere præcordia cataplasmatibus aut irrigationibus, non semper tutum est. Sed in illis solum ægrotis, in quibus nulla superfluitas in toto corpore oberrat. Alijs omnibus extremum malum est. Contingit autem in plenitudinis morbis, ut diuites magis quam pauperes male curentur. Pleriq; enim ipsorum præ delicijs non sustinent uenæ sectionem, & quidem quum magis quam pauperes plenitudinis affectionibus corripiantur, ut qui etiam magis impleantur et ociosius uiuāt. At qui curant ipsos medici, eo quod relictum est maximum auxilium, arbitrantur se aliorum usu expleturos esse quantum debet. Et sanè ipsi etiā ægri putantes quietū uictū, negligentia esse, & quodcumq; tandē facere, curationē esse, cogūt medicos quotidie aliquid præcordijs adhibere, cōsentientibus sanè etiā medicis in hoc ipsum, ut semper aliquid facere uideantur. Hinc enim sperant se plus lucri facturos esse. Atq; sic ipsi efficiūt inflammationes per ea quæ faciūt, semper aliquid præcordijs adhibentes. Proinde contingit in illo tempore inflammationes incipere in diuitibus, in quo iam in pauperibus morbus est propē solutionem. Vena enim secta in principio præsertim cōtinentis febris, & pauperes, & serui diuitum pleriq; in quinta die iudicati sunt, aliqui uero in septima. At uero diuites, plenitudinē & superfluitates plures quam serui & pauperes habentes, & uenæ sectionis auxiliū transgressi, et postea quotidie per calidū oleū foti, & laxatorijs cataplasmatibus intecti, inflāmationē quandam conflatā habent; aut circa hepar, aut uentrē, aut alia uiscera, aliqui in quarta die, aliqui in quinta, aut omnino in sexta. Vidisti autem etiam tu qui eodem tempore dum fomentum adhiberetur difficulter spirauit, omni superfluitate ad præcordia attracta à caliditate. Hic itaque mortuus est, & alij innumeri quotidie moriuntur, quū cataplasmata instar cucurbitæ adtrahant.

p 3 ad uiscera

ad uiscera superfluitates ex toto corpore. Quidam uero etiam ipsa cucurbita uſi ſunt in præcordijs, hoc unum etiam illi cogitantes, ut uiderentur aliquid ſemper facere circa ægrotum. In principijs igitur dum adhuc feruntur fluxiones ad affectum locum, melius eſt repellere ac reprimere, non attrahere ad ipſum. Commoda autem ſunt in principijs adſtringentia cum oleo adhibita: quæ ſimul & firmitatē addūt partibus affectis, ut ne facile affluētes ſuperfluitates ſuſcipiant, & ſimul iam in ipſis contentarū tenuitatē intus reprimunt. Poſtquā uero latius quieuerit repulſoria auxilia, & denſitas ex adſtrictione inducta partibus affectis, continet ſuperfluitates, tunc iam tempus eſt laxare, quo contentæ ſuperfluitates euacuentur: præſertim uero ubi ad hepar aut uentrem impetum fecerint ſuperfluitates moderatē adſtringentibus uti conuenit in principio. Valde enim principales ſunt hæ partes. Imò ubi etiam tempus iam fuerit diſcutiendi firmatas, tunc quoque partes hæ adſtrictione opus habent. Quare decocto in oleo abſinthio irrigabimus. In quibus autem fortiore adſtrictione opus eſt, omphacinum ſit oleum, in quo decoquitur abſinthium. In penuria uero abſinthij, melinum aut maſtichinum aut lentiſcinum ad hoc ſufficiet. Si uero minor fuerit febris, etiam nardinum unguentum addatur. Si uero declinatio febris non ualde mitis fuerit, à nardo cauere oportet, uti uero melino. Quo non præſente, rofaceum ad nardinum miſcendum eſt. Similiter etiam cataplaſmata composita uim habeant, ex laxatoria ac tenui, & ex amara ac adſtringente. Quod ſi colume fuerit affectum, aut alia inteſtina tenuia, aut muſculi præcordiorum, aut pellicula aluum & inteſtina amplactens, nequaquam miſcenda ſunt adſtringentia. quemadmodum neque ſi ueſica aut uterus, quum uelut dictum eſt, neque influxerit quid amplius, neque ſuperfluitas fuerit in toto corpore. At uero rhenes & thorax in medio relatorum ſunt: Neque enim multa adſtrictione in his opus eſt, neque tamen exoluere conducit. Splene uero inflammato, in principijs adſtringentia miſcenda ſunt. Euacuato uero corpore, etiam diſcutientia. Quin & ſi cucurbitis opus fuerit, præuacuato toto corpore utemur ipſis, non in principio affectionum.

De cataplaſmate ex fermento. Ex Lyco. Cap. CLXXVI

Hoc cataplaſma diſfundere ac eliquare cōpacta ualde poteſt, & aculeos infixos extrahere, & tumores induratos mollire. Oportet autem fermentum diſſoluere in oleo ſufficienti, atque ſic imponere. Quod ſi uehementius efficere uolueris, nitrum modicum admiſce: Si uero etiam aceto diſſolueris fermentum, & rurfus coctum per cocturam ſpiſſaueris, conuenientiſſimum erit ad induratos tumores in ſplene ac hepate. Si uero thymum & pulegium, aut abſinthium, aut abrotonum fermento miſcueris, optimum efficies pharmacum.

De cataplaſmate ex pane. Cap. CLXXVII

Cataplaſma ex pane efficaciffimum eſt ad omnes inflammationes. Multis autem modis paratur. Nam & frigida aqua madefactis, & tritis, & adiecto modo dico rofaceo, & coriandri ſucco, commodum ſit cataplaſma inflammationibus ignis ſacri. Aut pro aqua, ex aceto paratur, atque ſic magis conducit igni ſacro. Verum ſi pro oleo, butyrum addatur, commodum ſit cataplaſma ad inflammationes ægre concoctiles. Paratur etiam ſic. Panis multa aqua diſſoluitur, ut ſucci ſpiſſitudinem habeat, & huic miſceatur oleum aut butyrum. Deinde coquitur ad compagem. Hoc præſtantiſſimum omnium eſt ad uulnerum inflammationes, & ut citius ſuppurentur. Hoc utimur ubi neruus aut neruoſum quid intus contuſum fuerit. Ego uero etiam picis liquida parum

rum ammisceo, et utile cataplasma expertus sum, Hoc & podagricis inflammationibus idoneum est.

Alia præparatio panis cum melle. Pridiani panis medullam manibus cōterimus, & ubi uelut similago dispersa fuerit, mel in olla calefacimus, & sic tritū panem inspergimus, ac coquimus ad moderatam compagem, deinde oleum moderatum adiicimus, & unita imponimus. Hoc cataplasma cōmodum est inflammationibus præcordiorum. Præstat autem parum aquæ melli ammisce re. Sic enim in coctura diffunditur. Farinæ quoq; triticeæ cataplasma eadem ferme facere potest, & eodem modo præparatur.

De cataplasmate ex furfuribus.

Cap. CLXXVIII

Furfures in mortario tundimus ac cribramus ut tenuissimi fiant, & utimur ipsis ad tumorem induratum in omni corporis loco consistentem, & præsertim in hepate aut splene. Oportet autem ipsos præparare cū aceto mulso. Aut ammoniacum thymia cum aceto mulso terimus, & furfures ammiscemus & cataplasma imponimus, atq; adhibemus lenticulata uasā uaporatoria aqua calida plena, ut ne frigefiat cataplasma. Aliquando uero ad testes inflamos utilissimū est hoc cataplasma. Verum ad hos sine aceto paretur, cum aqua mulsa uidelicet. Commodum est hoc cataplasma etiam furunculis, & alijs duris tumoribus ac tuberculis. Verum ad uenenum iaculantes bestias, furfures aceto imbuti commodius cataplasma efficiunt.

De cataplasmate ex ficibus.

Cap. CLXXIX

Ficus pingues exactissime contuduntur, ut nihil inalteratum in ipsis appareat. Deinde unguenti irini parum additur, & cataplasma imponitur. Facit autem ad duricias neruorum, & ad articulos contractos, aut plus iusto laxatos: & ad duos tumores, præsertim hepatis ac splenis. Vbi uero ad relatum cataplasma niri parum additum fuerit, rumpit abscessus & aculeos extrahit: Si uero ad ficus ita paratas ammiscueris pulegium, aut origanum, aut thymum, aut absinthij comam tenuissimè cribratam, hydropicis confert. Sed & sic coquantur ficus probè, et deinde cum decocto terantur, & ordeacea aut triticea farina ammiscetur, & rursus coctura fiat ad compagem, commodum fit cataplasma abscessibus qui non facile maturi fiunt. Si uero uoles pinguitudinem adijcere, aut butyrum ammiscere, aut rutæ folia trita, dolores intestinorum à flatu factos sedabis. Misceatur autem similiter & cuminum, & oleum.

De dropace & picatione, Archigenis.

Cap. CLXXX

Dropax à quibusdam etiā Picatio appellatur, diuturnis aut maxime morbis conuenit. Omnino autem & ante sinapismum assumitur, ut corpus ad sinapi præparetur, & post sinapismum, ut reliquæ affectionis excindantur. Simplicissimus itaq; dropax est qui picatione uocatur. Pix arida cum ualde modico oleo liquatur, deinde calida adhuc cuti illinitur, & præralis locis agglutinatur, & priusquam perfecte frigefiat auellitur. Et rursus calefacto emplasmate ad ignem agglutinatur, & similiter priusquam frigefiat auellitur: atque hoc sæpe repetitur. Vtilissimus est assidue uomentibus & crudis ac non concoquentibus, & coeliacis affectionibus, & reliquis partibus alimentum nō sentientibus.

At uero ad hunc communem dropacem, calfaciendi gratia adiicitur piper, pyrethrum, semen rosmarini, bitumē. Si uero siccare opus fuerit, sulphur uiuū, sal, cinis farmentorum. Sin lancinare, limnestis, quæ & adarce uocatur, adiicitur, aut euphorbium. Singula autem hæc trita liquefactis insperguntur. Est aut

p 4 dropax

dropax qui à multis in usum assumitur & Gallus appellatur, hic. Colophoniam thus redolentis, & resinae sordidae lignosae quae in dolis affertur, resinae à nauibus deraeae, quam graeci aliqui apochyma uocant, picis siccae, singulorum lib. .i. s. picis liquidae brutiae lib. .ii. cerae lib. .iiii. nitri lib. .i. bituminis, gabani, adarces, pirethri, ueratri albi, piperis, singulorum trientem, sulphuris uiui quadrantem, castorij, ammoniaci thymiamatis, staphidis syluestris singulorum sextantem. olei sicyani lib. .i. opobalsami sexuncem.

Alius dropax optimus & probatus. Picis, cerae, colophoniam, singulorum lib. .i. nitri sexuncem, bituminis quadrantem, sulphuris uiui sesquiunciam, piperis, euphorbij, adarces, singulorum unciam, .i. Cantharidum drach. .iiii. olei cyprini trientem. Vtere. Oportet autem uelut praedictum est, dropacem calidum illinere, crassitudinem habentem pro ratione uirium aegri, praeratis pilulis in locis quibus adhibetur. Eos uere qui robusti dropace utuntur, etiam lauare conuenit incumbente dropace, & si fieri potest, etiam exerceri. At dropax conferit auulsus, remissum spiritum firmare potest, & ad superficiem reuocare, & propriorum operum commune facere.

De sinapismo. Archigenis.

Cap. CLXXXI

Cataplasma ex sinapi, sinapismum uocare omnes solent. Est autem efficacissimum auxilium. Verum in acutis morbis non ualde probatur, paucis exceptis. Nam in solis seignioribus ac pigrioribus, & in acutis affectionibus immeris, sinapi utimur. At in diuturnis ferme omnibus, postquam reliqua auxilia nihil profuerunt, sinapismus efficacissimus reperitur. Quandoquidem igitur in omnibus fere diuturnis conuenit, praestat ut dicamus in quibus non utendum est ipso. Itaque in ulceratione pulmonis sinapismus non assumitur, neque in alia in profundo exulceratione. Efferantur enim ulcera & exacerbantur, ob acrimoniam. Sed neque in exulcerata cutis superficie, neque in cartilaginosis partibus, uelut sunt aures, aut nasus summus. Exuruntur enim ab ipso, & nigrescunt partes quae ualde sunt ex carnes. At reliquae partes corporis itemque affectiones, hoc auxilio gaudent, praecipue uero caput, in diuturnis capitis totius itemque alterius partis doloribus, & in uertiginibus, comitalique morbo ac infania. Sed & thoraci commodus est in erecta ceruicis spiratione, anhelationibus, tussi diuturna. In destillatione uero caput unà cum thorace sinapismo integendum est. Stomachus autem & intestina in omnibus diuturnis affectionibus, & maxime prostrato appetitu, & in rhenum affectionibus ac liboribus, & in spinæ colicis ac uesticae resolutionibus. Quin & omnes resolutae ac frigefactae partes hoc auxilio gaudent. Commodum est & arthriticis & ischiadicis ac podagricis. Inditur & in intestinum rectum glans ex sinapi, ubi illud fuerit resolutum, & post morsum ablata glande, infunditur aqua mulsa. Modus autem praeparandi hic est.

Sinapismi praeparatio.

Caricas pingues in aqua tepida pridie macerare oportet, sequenti autem die fortiter expressas probe conterere, deinde acre sinapi acceptum perfeterere, & inter terendum paulatim de caricarum cremore affundere, quo facilius teri possit, non tamen aquosum fiat. Deinde utrumque per se in massas redige, & inter se misce prout usus postulat. Si quidem fortiter sinapissare uoles, duas sinapi partes ad unam caricarum. Si uero mediocriter utriusque parem portionem. Sin mitius, tertiam partem sinapis, & duas caricarum. Caterum in corporibus molli sensu praeditis, & in quibus circa

circa superficiem est affectio, panem pro caricis ad sinapi ammiscere oportet.

Sed et hoc noscendum est: Si in aceto maceretur sinapi inefficacius redditur: Acetum enim sinapis uim discutit. At ubi tenue factum est cataplasma, in omnibus praedictis infarciatur in linteam, & locis adhibeatur. Temporis porro longitudinem in omnibus decernere impossibile est. Quare frequenter leuandum est cataplasma, et caro considerata an exacte rubefacta est. Et hoc maxime facere oportet in partibus habetiores sensu praeditis. In quibus uero celeriter operari ipsum uolumus, locus spongijs ex calida expressis fouendus est incumbente adhuc cataplasmate, hoc est, super linteam spongiae adhibenda sunt. Post sufficientem usum, in balneum ducendus est aeger, & in calidum solium ponendus, & pars iterum perfundenda citra inunctionem. Post balneum uero rosaceo illinimus locum. At in uehementi dolore aut etiam ulceratione, hapso lanae aqua & rosaceo imbuta integendus est, & imponenda est malua cocta trita cum pane. Post sedatum dolorem utendum est cerato rosaceo cum cerusa: In quibus uero balneum adhiberi non potest, in his per reliquum corpus spongiarum ex calida aqua expressarum fomento utendum est. Verum in capitis & praesertim frigidis affectionibus, olei calidi perfusione locus mitigandus est.

Quod caprarum fimi pilulae cum aceto impositae priuatim coxendicum morbo conueniunt.

Cap. CLXXXII

Caprarum fimi pilulae in aceto tritae, sinapismi usum exhibent. Priuatim uero ischiadicis, hoc est coxendicum affectione laborantibus conuenit hoc cataplasma, ut quod longe efficacius sinapismo in ipsis compertum est.

Quae sint alia rubificantia.

Cap. CLXXXIII

Rubificat nasturtij semen, & calefacit uelut sinapi. Similiter helenij radix, & syluestrium columbarum finus, quo ualde frequenter utor. Sed & cum nasturtij semine confuso ac cribrato, pro sinapi illo utor, in ischiade, hemicrania, uertigine, capitis dolore antiquo, in doloribus diuturnis laterum, humerorum, tendinum, lumborum, Et ad haec in nephriticis ac colicis affectionibus, & arthriticis ac podagricis, quum nondum pori ac durities callosae fuerint coactae.

Quin & scilla confusa in mortario, consimilem sinapi uim habet in cataplasmate imposita. Verum ad modicum tempus imponatur, nam diutius immorans locum exulcerat. Utendum est ipsa priuatim ad erecta ceruice spirantes thoraci imposita. Item in resolutione, quando non solum motus, sed & sensus tactus defecit. Post haec autem mitigandae sunt partes, uelut in sinapismo praedictum est. Priuatim uero scillae morsus mitigat perfusio olei, praesertim rosacei.

Delberide siue Cardamine, quae & Lepidium

uocatur.

Cap. CLXXXIII

Ex his uero quae ualde utiliter rubificant, est & iberis, quae etiam cardamine uocatur, de qua Galenus in tractatione de ischiade plurima scripsit. Sed & Archigenes ipsa usus est in splenicis ac coxendicibus. Verum in epistola ad Aristonem Archigenes sic scribit de ipsa: Vellem autem te uti etiam radice eius herbae quae nunc hic Iberis appellatur. Habet autem folia uelut nasturtium, uere flori dora, caulem longitudine cubitali ampliore aut minorem. Et nascitur quidem in incultis locis: Aestate uero lacteum florere producit, tuncque efficacissima est. Radices nasturtii odore referunt. Radices igitur accipe praedicto tempore, ipsasque diligenter tunde, aegre enim contereri possunt: & adipis suilli inueterati tantum adijce

adijce quo emplastri formæ cataplasma fiat, quod non minus horis quatuor impositum habe: Deinde in calidum balneum citra inunctionem ingressus, post modicam corporis exudationem, in solio mordaciore morare. Egressus autem uino et oleo multo perfusus ac deterfus, coxendicem lanis puris intege. Atq; hic quidem est sinapisini modus. Verum utilitates spe maiores habet, eo quod medicatiorem uim possidet, & cum minore mordacitate curet.

De euocantibus ex alto auxilijs. Galeni.

Cap. CLXXXV

In omnibus diuturnis affectionibus, quum nihil profecerint ulla auxilia, euocantem ex alto curationem, metasyncriticam à Methodicis appellatam, hoc est, quæ meatuum miscellæ corporis statum præter naturam habentem transmutat, facere plerique solent. Ego uero ubi intemperies quædam humida & frigida in affectis partibus est, aut obtusus aut stupidus sensus, adhibeo ipsiis pharmaca ex sinapi, aut thapsia, & similibus confecta. At siccis & calidis affectionibus ea non adhibeo.

AETII TERTII SERMONIS, PRIMÆ
TETRABIBLI FINIS.

INDEX EORVM QVÆ IN QVARTO AETII
Sermonē continentur.

| | | | |
|---|---------|---|---------------------|
| De sanitate tuenda. | Caput i | capitis ulcuscula. | xxj |
| Quomodo infans recens natus sanus cognoscitur. | ii | Ad ulcus Melicerida à mellei humoris similitudine dictū, quod & dulce appellat, et Syriacè Sanalia. | xxij |
| De infantis educatione. | iiij | Ad sedem infantium procidentē. | xxiiij |
| De nutricis electione. | iiij | Ad fœmorum intertrigines. | xxv |
| Probatio lactis. | v | Ad procidentes puerorum umbilicos. | xxvi |
| Victus nutricis. | vi | Ad hispídos pueros. | xxvij |
| Ad stercentes infantes. | vij | Quādo ablaetandi sunt infantes. | xxviij |
| Ad uocem infantium interceptam. | vij | Victus ratio post ablaetationem puerorum, & aliarum ætatum. | xxix |
| De dentitione. | x | Victus senum ratio. | xxx |
| Ad inflammationes oculorum. | x | Victus ratio eorum qui in ocio degunt. | xxxj |
| Ad albugines puerorum. | xi | De carniū subuersione. | xxxij |
| Ad inflammationes ac humiditates aurium. | xij | Quō graciles renutrire oportet. | xxxiiij |
| De inflammatione Siriasi græcis appellata. | xiiij | Quō q̄s partes atenua, sanarit. | xxxiiij |
| Ut exudet puer in febre. | xiiij | De lassitudinibus à gymnasijs, aut ex itinere obortis. | xxxv |
| De aphtha ulcere oris ardente. | xv | De lassitudine ulcerosa. | xxxvi |
| Ad deuoratas spinas aut festucas eximendas. | xvi | De lassitudine tensiua. | xxxviij |
| Ad assiduas sternutationes infantium, et ad grauedines. | xviij | De lassitudine inflammatiua, & ad ossa pertingente. | xxxviij (tē, xxxix) |
| Ad tussēs puerorum. | xviij | De lassitudine ob siccitatē ac gracilita. | xl |
| Ad alui infantium profluuium. | xix | De lassatis ex uenere. | xli |
| Ad aluum suppressam. | xx | De lassitudinibus spontaneis. | xli |
| De pustulis puerorum. | xxi | | |
| Ad capitis ulcera, & achores tenuia | | | |

De lassitu

| | |
|--|---|
| De lassitudine ulcerosa spontanea, xliij | Ventris siccioris signa, lxxij |
| De lassitudine tēstua spontanea, xliij | Ventris calidioris notæ, lxxiij |
| De lassitudine inflāmatiua spōta, xliiij | Humidioris uentris notæ, lxxiiij |
| Quali curatione ad frigiditates uten- | Frigidioris uentris notæ, lxxv |
| dum est, xlv | Pulmonis notæ, lxxvi |
| Cutis densatę curatio, xlvj | Cordis calidioris notæ, lxxvij |
| Quō curādus sit æstuosus ardor, xlvij | Frigidioris cordis notæ, lxxviij |
| De matutina frictiōe, xlvij | Siccioris cordis notæ, lxxix |
| De uespertina frictiōe, xlix | Humidioris cordis signa, lxxx |
| De cruditate, l | Calidi ac sicci cordis signa, lxxxi |
| De crapula, li | Calidi & humidi cordis notæ, lxxxij |
| De aequalibus intemperaturis, liij | Frigidi & humidi cordis notæ, lxxxiiij |
| Optimi temperamenti dinotio, liij | Frigidi ac sicci cordis notæ, lxxxiiij |
| Temperamenti calidi notæ, liiij | Hepatis calidioris notæ, lxxxv |
| Temperamenti frigidi notæ, lv | Frigidioris hepatis notæ, lxxxvi |
| Siccioris temperamenti notæ, lvi | Siccioris hepatis signa, lxxxvij |
| Humidioris tēperamenti signa, lvij | Humidioris hepatis signa, lxxxviij |
| Calidi et humidi tēperamēti notæ, lvij | Calidi ac sicci hepatis signa, lxxxix |
| Calidi & sicci tēperamenti notæ, lix | Calidi ac humidi hepatis notæ, xc |
| Frigidi & humidi tēperamēti notæ, lx | Frigidi & humidi hepatis notæ, xci |
| Frigidi ac sicci temperamenti notæ, lxi | Frigidi ac sicci hepatis notæ, xcij |
| De capitis dinotione, lxij | Tertium temperamenti signa, xciiij |
| Cerebri temperati notæ, lxij | Calidorū tēperamen, correctio, xciiij |
| Cerebri calidioris notæ, lxiiij | Frigidi intemperamenti medela, xcvi |
| Frigidioris cerebri notæ, lxv | Humidi intēperamēti correctio, xcvi |
| Siccioris cerebri signa, lxvi | Sicci intemperamenti medela, xcviij |
| Humidioris cerebri notæ, lxviij (lxviij) | Calidi ac sicci intēpera, curatio, xcviij |
| Calidioris et humidioris cerebri signa, lxix | Humidi ac calidi intēpe, medela, xcix |
| Calidi ac sicci cerebri notæ, lxx | Humidi ac frigidi intēpera, sanatio, c |
| Frigidi ac sicci cerebri signa, lxx | Frigidi ac humidi intemperamenti |
| Frigidi ac humidi cerebri notæ, lxxi | curatio, frigiditate prædomināte, ci |

AETII MEDICI GRAECI CONTRA

CTAE MEDICINAE, TETRABIBLI, SIVE QVA-
ternionis Primi, Sermo Quartus.DE SANITATE TVENDA, GALENI PRAE-
FATIO.

Cap. I



Vum una sit ars quæ circa humanū corpus uersatur, duæ sunt ipsius primæ ac maximæ partes, prior quæ sanitatē tuetur, altera quæ morbos curat. Quandoquidē uero & dignitate et tempore prior est sanitas morbo, oportet sanè etiā nos prius cōsiderare quomodo quis hāc custodiat. Deinceps uero etiā quomodo quis quā optime morbos curet. Dicā autē sanitas dupliciter: Altera exacta, & optima, & perfecta, & summa: Altera deficientes quidē ab hac, nō tamē in tantū ut animal ægrotet. Et huius graduum nō parua est in corporibus differentia circa magis ac minus. Prius autem recensere cōuenit, quomodo

quomodo quis optimæ ac inculpabilis naturæ sanitatem conseruet, & adhuc ante hoc mentionem facere, quæ nam sit optima corporis structura. Est autem si quis iuxta ipsam essentiã rei exponet, temperatissima, & quæ formationem partiũ, ac actionibus ipsarum exacte conuenientem habet. Et ad hæc numerũ omnem, & magnitudines, & compositionem omnium ipsarum inter se, actionibus commodam exhibet. Si uero quis iuxta notas designare uolet, corpus exacte bene carnosum tale est, quod medium est inter gracile & multa carne obesum; & neq; hirsutum est, neq; pilis nudum, neq; moderato mollius, neque durius, neque album aut nigrum, aut uenis occultis aut amplis, aut animosum aut deiecti animi, aut somnolentum aut uigilans, aut hebeti mente præditum aut uafum, aut ueneri deditum aut uice uersa. Si uero etiam omnibus partibus fuerit exacte inter omnes, excessus medium, erit profecto etiam pulcherrimum aspectu tale corpus, ut quod sit moderatum, & ad omnes labores idoneum. Habebit autem & alia omnia signa temperamenti boni per singulas partes. De quibus pro uiribus pauca indicabimus circa finem huius sermonis. Multa enim corpora temperata quidem sunt, si ita contingat, capitibus, uerum intemperata pectoribus, aut uentre, aut genitalibus. In quorundam uero artubus est intemperies, & plerisque in uno uiscere, aut alia quadam parte. Sed & de his in prauis corporum structuris postea dicitur in hoc sermone. Cæterum de optima structura iam dicamus, cuius singulæ partes uniuerfam habent inculpabilem essentiã. Dicitur autem primum quomodo quis ab initio susceptum eiusmodi hominem, per omnem uitam sanum conseruet, nisi si quid extrinsecus uiolentum ipsi accadat

Quomodo infans recens natus sanus cognoscitur. Cap. II

Indicabitur autem sanus infans statim ex natiuitate, primum quidem ex eo quod genitrix per totum gestationis in utero tempus sana uixit. Deinde ex eo quod ubi natus est & in terram positus infans, ipse eiulatum edit cum conueniente firmitate. Et ex eo quod omnibus partibus ac sensibus integer est, & naturales meatus omnes expeditos habet, uelut sunt aures, nares, fauces, urinæ meatus, podex. Et quod unicuiusque membri naturales motus non segnes, neque exolutos habet, & iuncturarum flexuras ac extensiones, magnitudinesq; ac figuras, & sensum exactum.

De infantis educatione. Cap. III

Proinde recens natus infans, hic nimirum per omnem structuram inculpabilis, primum ita tractetur, ut ipsi umbilicus quatuor à uentre digitis acuto scalpro refecetur. Reprobamus enim aliam materiam harundinum ac uitrorum, ut ne quid atteratur. Deinde contentus in ipso sanguis grumofus exprimitur, & sponsia detergeatur, ac lana carpta obturetur. Postea moderato sale per se tenuissimo conspergimus. Aliquando uero etiam in delicatioribus totum corpus succo ptisanæ aut fœni græci depugnare oportet; & aqua tepida uiscositatem corpori oblitam ablucere, & sordes naribus insitas digitis exprimere, & os atq; aurium meatus purgare, palpebras diducere, & oculos detergere, ac oleum ipsis instillare. Digitis item disparare ipsum anum. Confestim itaque excernit per sedem id quod græcis meconium uocari solet. Porro supra umbilicum hapsus lanæ madefactus imponatur, ad umbilici figuram formatus. Ac cum inum ipsi inspergere reprobamus, propter acrimoniam, etiam si quidam id usurpare soleant. Deinde duplicatus umbilicus, & lanæ inuolutus, leniter in medio componatur. Et postea infans pro amore fasciis inuoluatur. Exhibendum est

dum est autem ipsi mel præ omni alimento, quod optime est despumatum ut de lingat, reprobato butyro uelut stomacho incommodo. Deinde instillanda est aqua mulsa tepida. Postea uero mater, ubi prius crassum ex uberibus emulxit, & ipsa aqua calida fouit, lac præbeat infanti. Præstat enim non accipere matris lac usq; ad quartam diem. Lauare uero oportet puerum bis in die, horarum aliorum interstitio post cibum. Postquam uero exciderit umbilicus post tertiam aut quartam diem, cochleæ testam ustam tritam loco insperge, aut talum suillum ustum, aut plumbum ustum cum uino illine, & obliga.

De nutricis electione.

Cap. IIII

Præ omnibus his eligenda est nutrix, neque iunior uiginti annis, neq; senior quadraginta, quæ bis aut ter peperit, non morbida, boni habitus, iustæ magnitudinis, ampli pectoris, ubera habens moderata, non rugosa, papillas neq; magnas, neq; paruas, neq; angustiores, neq; ualde latas, aut cauernas. Magna enim ubera plus quam opus est lactis preparant, & hoc manens in ipsis corrumpitur; & infantem lædit, simulq; etiam matrem grauat. Parua uero parum lactis exhibent. Et magnæ quidem papillæ offendunt gingiuas, & impediunt linguam ne inueniat deglutionem. Paruæ uero ægrè apprehendi possunt, & propterea affligunt maxillas. Sed & eiaculatū lac per angustos meatus, sublinentem os pelliculam ferit, & aphtham græce appellatū ulcus igneæ caliditatis generat. At latiores & cauernosæ papillæ acuatim remittentes lac, suffocationis causa fiunt. Præterea cōuenit esse nutricem castam, sobriam, mansuetā, mundam, hilarem, & non tristem. Ego inquit Galenus, quū puer aliquando ploraret per totam diem & indignaretur, ubi uidissem stratum ipsius & uestimenta sordida, & ipsum puerum sordidum: iussi & ipsum, & stratum ipsius lauare, & uestimenta mutare, quo facto ab eiulato & indignatione cessauit & obdormiuit.

Probatio lactis.

Cap. v

Probandum est lac gustu, uisu, & olfactu. Nam & gustantibus & olfacientibus iucundū, & uidentibus album ac æquale, & inter liquiditatem ac spissitudinem medium habens, ipsum esse oportet. At uitiosum lac, aut crassum est & caesum, aut liquidum & ferofum, aut liuidum, aut strias floridas habens, aut spuriosum, aut graueolens, aut foetidū, aut cito acefcens, aut gustanti amaritudinis, aut muris, aut alterius cuiusdam peregrinæ qualitatis significationem exhibens. Hæ igitur sint notæ uitiosi itemq; boni lactis, ex quibus cōiecturam facies mulierem morbosam esse, & ad aliam transibis. Cæterum opulentis plures nutrices esse oportet.

Victus nutricis.

Cap. vi

Exercere oportet nutricem moderatis exercitijs, & maxime supernis partibus. Cibos autem exhibere boni succi & qui facile digeruntur, & tempore cōuenienti, & mensura congrua. Atq; ita etiam potus. Abstineat a porro, cepis, allio, salsamentis, & omnibus foetidis & graueolentibus. Et a plerisque bellarijs, præsertim nucleis pineis. Sunt enim oleosi, & propterea bilem faciunt, & uentriculo innatant, itemq; uenerem stimulant. Itaq; penitus ab his nutricem abstinere oportet. Irritantur enim in coitu lunares purgationes, & propterea lac corrumpitur, & uitiosum ac paucissimum fit. Quædam uero etiam concipiunt, quo nihil nocentius fieri infanti qui ex ipsa alitur possit. Vbi autem imminuitur lac, aut corrumpitur, aut etiā omnino extinguitur, aut spissatur, aut attenuatur, præstat quidem alterius nutricis lac præbere. Sin id non permittat res aliqua instans, uictus nutricis curanda est, ut ne in morbum incidat infans. Extincto itaque lacte, considerandum est an totū corpus, aut una pars ægrotet, & lædentem affectionem

q corri-

corrigere oportet. Si uero ob penuriam extinctum est lac, alimentum augere, & melioris succi cibos dare, & plures auferre, aliumque si plus iusto fertur adstringere, & exercitijs supernarum partium uti, & uberum frictione, & fomentis per spongas, ceratis item liquidioribus ad ubera ex oleo irino aut gleucino. Lini uero semen delingere cum melle aut passo. Aut sesamum crudum cum palmula passa, quam pateton graeci uocant, æquis portionibus edendam praebe, & bibat zythum, & eadem die ubera lacte replebuntur. Putabit autem mulier simul ut acceperit potum, omnia sua membra resoluta esse, donec lac in uberibus factum fuerit. Aut lumbricos piscatorum, qui in limo fluminis reperiuntur, & intestina terræ appellantur, quinque aut septem terito, & palmulas passas addito, & simul terito, ac dato in zytho bibendos prælotæ mulieri ieiunæ ad dies decem; & de multitudine ac bonitate lactis miraberis. Præstat autem etiam præcedens pharmacum similiter cum zytho conterere, & bibendum praebe. Vinum uero exhibendum est dulcius. Et fœniculum aut anethum uiride cum ptisana coctum, sorbendum dato. Si uero tenue fuerit lac, balnea reprobanda sunt, uelut quæ humores aquosos reddant. In cibo utendum est alica, ouis sorbilibus, pane similagineo, pedibus ac extremitatibus porcinis, uolucris tenerioribus, carnibus hœdinis, & uino dulci. Sin crassius fuerit lac mulieris, attenuante alimento utendum est, ac minus nutriente, & balneis frequentibus. Crassius enim lac abscessus & furunculos circa infantis corpus generat, & uenter ipsius cohibetur. Sed neque urinae pro ratione prodeunt, & uomitus pituitosi infestant, & agere mobilis ac difficulter spirans puer euadit, & appetitum perdit, ac decolor fit, & forades oculorum habebit crassas, & mucos similiter, & flatu multi ab eo prodeunt.

Si uero acrius fiat lac, excretionem per uentrem plures fiunt cum mordacitate, & appetitus deficit, & pustulae acerrimæ in corpore fiunt, & præsertim circa supernas partes, imò etiam infernas, & infans paulatim gracilescit. Quare omnimodo temperandum est corpus nutricis, balneis dulcibus, & boni succi alimentis. Si uero lac quod multum fertur imminuere uoles, cibos minus alentes & paucissimos dato, ubera uero lenticula cocta integito, aut cuminum cum aceto illinito. Aut lapidem album simplicem, quo ad ædificia utimur, similiter cum aceto. Aut hyoscyamum cum aceto. Aut linteum aceto imbutum imponito, & assidue humectato, perfundito aut aqua marina, aut muria calida, aut myrti decocto.

Ad stertentes infantes.

Cap. VII

Quandoquidem plerumque nutrices ineptis uelut dictum est, utentes cibis, uitio sum lac suum efficiunt, & ex hoc diuersis morbis infantes, qui etiam optimam structuram adepti sunt, obijciunt. Aliquando uero etiam ex forinsecus corpori accidentibus morbi accedunt: necessarium est etiam de diuersis affectionibus pueros infestantibus, pro uiribus breui tractare. Si quidem igitur infans crassiore alimento nutritus, pituitam in uentre colliget, & propterea stertat, lini semen cum melle delingendum dandum est, aut cumini parum cum melle. Et aqua mulsa instillanda est ori assidue calida. Si uero hæc pressura perseveret, oleo medii digiti tingito, & tonsillas illinito, & depressa linguae radice ad uomitum irritato, ubi enim uomuerit, ab omnibus uexationibus confectum liberatur.

Ad uocem infantum interceptam.

Cap. VIII

Ad interceptam in infantibus uocem, ob quamcumque causam præcedentem: Contingit autem hoc maxime suppressa aluo: brassica succum cum modico sale bibendum dato aut instillato. Statim enim soluit aluum, & uocem restituit. Sed & glans ano indenda est.

De

De dentitione.

Cap. IX

Circa septimum mensem incipiunt infantes proferre dentes, & dum punguntur ac stimulantur uelut ab aculeo, dente gingiuas disparante, inflammationes succedunt ipsarum gingiuarum ac maxillarum & tendinum: ad quas etiam febres omnino consequuntur. Accedit & pruritus auditoriorum meatuum. Et aures humectantur. Aliqui uero etiam lippitudinibus capiuntur, & sanguis ex oculorum angulis fluit. Plerisque uero etiam exturbatur uenter, propter stomachi inflammationem, & uentris exolutionem. Itaque lenire ac pinguelacere oportet tendinem & maxillas, mollium lanarum ac mundarum circumiectu, circa collum & ipsius neruum, per oleum dulce ac calidum. Instillare quoque auditorijs meatibus oleum calidum. Perseuerante uero inflammatione, etiam ceratum rosaceum liquidum locis imponere. In cibo offerendum est puero cerebellum, maxime quidem leporis coctum aut assatum: Sin minus, ouiculae: Naturaliter enim opitulatur. Sed & melle moderate cocto illinendae sunt gingivae. Efficit enim minime molestum dentium exortum. Nihil uero duri dandum est ipsis ad mandendum, ut ne gingivae callosiores reddite impedimento sint dentium exortui. Balneo autem utendum est febribus remittentibus. Neque studio habendum est ut uenter adstringatur, ut ne materia sursum repens, supernas partes, praesertim oculos laedat, & febres uehementiores efficiat. Sed & nutrix cogenda est ut aquam bibat, & cibos leuissimos ac forbiles accipiat. Aiunt autem naturaliter auxiliari dentientibus pueris, colocynthidis syluestris radicem, in aureo aut argenteo canali gestatam. Itemque rubi radicem. Sed & uipere, praesertim masculae, dentem, in argento pro amuleto appende. At circa stomachum gestent semper uiridem lapidem de collo suspensum, ita ut stomachum contingat.

Ad inflammationes oculorum.

Cap. X

Lycium Indicum praesertim, sin minus, Pataricum cum lacte diluito, & super nas palpebras cum supercilijs illinito. Aliquando etiam ipsis oculis instillate, multo lacte dilutum. Mirabiliter etiam facit Nilis ex rosis collyrium illitum. Ipsos uero oculos ocymi decocto abluito.

Ad albugines puerorum.

Cap. XI

Ad albugines puerorum ab eiulatu factas, solani nigri succum illine.

Ad inflammationes & humiditates aurium.

Cap. XII

Ad inflammationes & dolores aurium, oui candidum cum lacte muliebri instilla. Aut intestina terrae cum rosaceo cocta. Ad humiditates uero aurium, alumen uino dilue, & lana puram ac mollem in ipso imbue, & in sole assicca. Et rursus imbue ac sicca, & ubi hoc feceris, lanam siccam asserua. Vsu uero expetente, de ipsa accipe & in aurem inde. Ad ulcera uero in auribus, pastillo Muscae utere, diluto cum sapa ac modico aceto. Si uero caro superexcreuerit, primum reprime per pastillum Bithynum dilutum cum uino. Deinde utere Muscae pastillo, uelut dictum est.

De inflammatione, Siriasi graecis appellata.

Cap. XIII

Ex affectionibus quae cum febre accidunt, est & sirialis in infantibus appellata, quae est inflammatio partium cerebri & membranarum, adeo ut sincipitis & oculorum cavitates consequatur, cum febre ardente, & pallore, & corporis siccitate, ac prostrato appetitu. Sirialis autem appellata est a sincipitis cavitare. Siros enim apud graecos dicitur fossa ac corpus cauum, in quo semina seruantur. Quare omnia uelut ad inflammationes facere oportet, ita ut leniamus & mediocriter frige faciamus caput, coriandri succo cum rosaceo humectantes. Sed & totum corpus ex hoc illinatur. Aut cucurbitae ramenta sincipiti impone. Aut

uitis folia, aut portulacam cū rosaceo tufam, sincipiti illine. Aut heliotropij scorpiuri succo sinciput illine. Aut oui luteum cum rosaceo concutito, & sincipiti illinito, & assidue permutato.

Vt exudet puer in febre.

Cap. XIII

Arundinis uiridis medullam terito, & ex ea sinciput ac pedes illinito, ipsumque puerum uestimentis contegit.

De aphtha ulcere oris ardente.

Cap. XV

De aphthis ulceribus, & inflammationibus tonsillarū, dicitur absolutissime in sermone de affectionibus quæ perfectis accidunt circa has partes, in octauo nimirum.

Ad deuoratas spinas aut festucas eximendas.

Cap. XVI

Alumen quo ad coria utuntur cū oleo terito, & gulæ illinito, radicem lingue digito ualde comprimens, & facile ipsas fursum effert.

Ad assiduas sternutationes infantium & grauedines.

Cap. XVII

Ocymum siccum tufum ac cribratum naribus admoue, ut per respirationem attrahatur, aut insuffla. Idem etiam ad grauedinem facit.

Ad tusses puerorum.

Cap. XVIII

Nucleorum nucum pinearum modice tostorum drach. IIII, seminis cucumeris parum tosti drach. I, tragacanthi drach. III, mellis despumati dodrantem. Præpara & præbe delingendum. Tragacanthum autem in uino ueteri dulcissimo macerato. Aliud Hippocraticum. Vitellum oui assatum, & sesami duplum, & salis granū unum moderatum terito sufficienter, & cum melle delingendum dato. Aliud. Nucleos pineos tostos xxx. amygdalas decorticatas xxx. seminis lini tosti, succi glycyrrhizæ, utriusque sextantem, Mellis quod satis est, dato delingendum. Probè etiam facit cuminum cum melle. Item ammium.

Ad alui infantium profluuium.

Cap. XIX

Si aluus infantis fluxione laboret, balneum & gestationem reprobamus. Viui mur autem humectatione stomachi ex uino & oleo melino. Si uero fluxio excedatur, oenanthen leuissime tritam, & acaciam, ac mastichen, æquis portionibus singulis tritis, oui luteo quantum satis est excipe, & ex emollito stomachum illine, & dorsum, & hapsum lanæ purpureæ impone ac deliga. Facit enim citra molestiam. Præ omnibus uero nutricem alimentis boni succi uti oportet, & potibus adstringentibus. Si uero aluus infantis farinæ similia excernat, mentam tritam cum uino nigro, aluo impone ac obliga.

Ad aluum suppressam.

Cap. XX

Si uero supprimatur aluus, glande irritanda est, aut ex sola aqua mulsa infusum immittendum est. Et mel alimentis ammiscendum. Cæterum florem artemisiæ cum oleo tere, & circa umbilicum affrica, & fluat aluus. At de lumbricis dicitur in uniuersalibus auxilijs in nono sermone.

De pustulis puerorum.

Cap. XXI

Iam antea dictum est quod infantes uitioso alimento utentes, uarios incidunt morbos, ut cum alijs & pustulæ, & papulæ instar bullarum efferuentes, & humida ulcera in cute fiant, quæ bubastica uocant, & alia consimilia. Itaque muriam & urinam, & alia quæ aliqui adhibent, reprobamus, ob acrimoniam. Lauamus autem ipsos rosarum decocto aut lentis. Et si ampliori adstrictione opus habemus, myrti aut malicorij. Magis uero ulceratis, cataplasma ex plantagine imponimus, Aut ex seride siue intubo cum pane; Aut ex flore polentæ cum portulaca, aut semperuiuo, aut ueneris umbilico, aut hyoscyamo. Aut rosas uirides aut siccas coctas cum meliloto & palmulis adhibemus. Aut spumam argenti,

argenti, melilotum, alumen, cum aceto terito, & myrteum oleum siue rosaceum adijcto, atque illito. Aliud ad bubastica ulcera. Recrementum plumbi & amyllum, æquis portionibus cum solani succo terito, & adiecto rosaceo illinito.

Aliud pulcherrimum. Cadmiam tritam cum aqua illinito, aut cimoliam cum uino. Aliud. Spumæ argenti, cerusæ, utriusque trientem, malicorij sicci leuissimè triti sextantem, succi stratiotæ fluuiialis quod satis est, utere. Quod si non adsit stratiotes, lentis palustris succum accipe, & utere, aut herbæ uiridis quæ in aquis inuenitur, & stratiotæ similis est, succum ammisce, probè etiam facit serapiadis tritescularis succus. Aliud. Retrimentum ferri terito cum uino ac illinito. Valde enim bonum est hoc. Probè facit & emplastrum ex ladano, & emplastrum ex hordeo, ouii candido, & rosaceo aut myrteo oleo diluta.

Aliud, ad infantium pustulas ac papulas feruidas post rupturam. Cadmiæ drach., l. x. x. x., æris usti drach., l. x. x. x., acaciæ, croci, utriusq; unciam i. tragacanthi sextantem. Tragacanthum aqua macerato ac terito, & cum ipso reliqua excipito, ac pastillos formato. Et usus tempore cum succo senecionis, aut intubi, aut solani, diluito, & addito rosaceo, illinito. Ego inquit, succo senecionis aut intubi excipio tragacanthum ac reliqua, & pastillos effingo.

Ad capitis ulcera, & achores tenuia capitis ulcuscula. Cap. xxii
Pharmacum ex cuius usus ego nomen assequutus sum. Spumæ argenti, cerusæ, utriusq; bessem, seminis ericæ, thuris, utriusq; drach., iiii. uino & oleo raphanino terito ac uitior. Aliud. Acaciæ fuluæ unciam i. ladani trientem, myrrhæ sextantem, opij unciam i. Aqua palustri excipe & forma pastillos, & utere assidue. Aliud. Cochleas albas unâ cum testa exustas insperge. Aliud. Ba: aut situm leuissimè tritam, cum plantagine arida trita insperge. Aliud. Ba: aut situm aridum tritum insperge. Aut cum aqua tritum impone & illine. Aliud. Herbam quam in Alexandria Liparonem uocant, aliqui uero cnestrum appellant, urito, & cinerem cum uino tritum illinito. Vtere etiam reliquis cum discriminationibus referendis in sexto sermone, de uniuersalibus auxilijs ad achoras.

Ad ulcus Melicerida à mellei humoris similitudine dictum, quod & Dulce appellatur, & Syriace Sanal'a. Cap. xxiii
Spumæ argenti, baccarum lauri, æquales portiones terito cum aceto & oleo, & illinito. Sæpenumero eius experimentum fecimus.

Ad sedem infantium procidentem. Cap. xxiiii
Spongide herba podicem assidue deterge. Acatiam cum sapa & uino nigro tritam podici illine. Cochleam uistam tritam quum egreditur prælotæ sedi insperge, & sanabis. ostreorum testas crudas tufas ac tenuissimò cribro excretas insperge. Myrrhi baccas uirides cum uino tritas impone. Vtere autem perfrusione aqua fabrorum, in qua ferrum tingunt. Ego uero semper utor muria tepida, & ualde probè facit. Similiter autem & aqua marina. Vtere etiam dicendis in uniuersalibus auxilijs, quæ suo loco referuntur.

Ad scemorum intertrigines. Cap. xxv
Myrtum siccam tritam insperge, aut cyperum cum rosis.

Ad procidentes puerorum umbilicos. Cap. xxvi
Procidunt pueris umbilici, dum aut in eiulatu diu & multum distenduntur, aut ex plaga, aut ex casu. Talibus igitur ammium cum muria tritum umbilico illine, & rasuram lintei impone, ac ad triduum obliga. Et rursus eo soluto, idem facito. Aut lupinos amaros & ungulam asini uistam, & laterem uistum, simul terito ac imposito, & obligato, Si uero efficacioribus opus fuerit, his quæ ad herniam

inguinū referitur utere. Critonis ad pueros exumbilicares, ob quancūq; causam, Resinæ pinus unc. xvi. aluminis scissi dextantem, mellis dextantes duos: Alumen tritum cū melle ad prunas coquito, & ubi bonam cōpapem habuerit resinam addito, assidueq; mouero, & ubi dissoluta fuerit, laminā de hoc pharmino accipito, & umbilico imponito, ac quotidie alterato. Verū suprà laminā plantaginis folia aut hederæ imponito. Aliud. Aluminis scissi uncias xv. fecis ut ni austeri dextantem, gallarum drach. ii. uino dilue ut spissitudinem habeant, & umbilicū illine, & forinsecus spongiā impone, posca imbutam ac expressam.

Ad hispīdos pueros.

Cap. xxvii

Crassioribus & pluribus fuliginosis superfluitatibus sub cute collectis, ex quibus pili generantur, hispīdiores infantes fiunt. Itaq; caricas urito ac terito, & cum hoc cinere pilis oblitos locos confricato. Ex alio exemplari, Resinam coquito in aqua, & puerum lauato, ac leuiter detergito, ac cum caricarum ustrarum cinere & fabarū cremore confricato. Aliud smegma corroborans ipsos.

Farinæ fabarum, cimolīæ, spumæ nitri, candidi ouorum, & testarum, æquales portiones pro smegmate adhibe.

Quando ablactandi sunt infantes.

Cap. xxviii

Donec firmetur infans lacte nutriatur. Postquam uero solidus factus fuerit, micis panis ex uino mulso, aut uino dulci, aut lacte. Deinde etiam oua forbilia sumat. Nam quæ mandere oportet, salua in ipsis replentur. Potus dandus est uinum dilutum. Vbi uero iam intrepide frumentaceum alimentum infans sumit, quod plerumq; circa uigesimalum mensem contingit: Tunc latenter & paulatim ab ubere desuescat. Si uero ablactatus morbū inciderit, rursus ad lac transferatur. Et ubi cessauit morbus, refocilletur corpusculum, atq; sic ablactetur.

Victus ratio post ablactationem puerorum, & aliarum

ætatum.

Cap. xxix

Ablactati infantes in remissione ac hilaritate exercitiorum uersentur, denaturē ipsi cibi leues ac boni succi. Verum à multo uino abstinere oportet eum qui bonum corporis temperamentum habet. Nam in humidis ac calidis corporibus, uinum replet caput uaporibus. Neq; uero à frigida aqua potu penitus arcere iubeo tales pueros. Sed inter cibos plerumq; & in calidioribus horis, optima aqua uti permitto. A septimo anno ad literas ueniant, & mitibus ac humanis magistris tradantur. At à decimoquarto anno usque ad uigesimalum primum conuenit exercitatio in disciplinis philosophicæ doctrinæ. Prohibendi sunt à ueneris usu. Contrahendum est & uberius uinum, & plura exercitia iam sunt assumenda. His uero qui iam in uigore ætatis degunt, uictus ratio remissa conuenit, tum animi, tum corporis. Et corporis exercitia qualiacunq; fuerint, pro ratione his detrahenda sunt, & alimenta sensim contrahenda, quum habitus ipsorum frigiditatis principium sumat. Maximam autem optimē constructi corporis notam esse statuo ipsius naturæ promptitudinem, quicquid tandem fuerit agendum, ipsa suipsius mensuram excogitante in optimis constitutionibus. Nam & dum exercentur ac fricantur, aut quiduis aliud agunt, tunc primum pigrescunt, quum sufficienter fuerint exercitati. Et sanē etiam à cibis ac potibus tunc abstinent, quum sufficienter fuerint impleti, neque plus iusto appetentes, neque minus ingerentes. Quare nullus timor est de optimæ constitutionis homine, ne uel nimium labore fatigetur, aut cibis nimium expleatur. Ipsum enim sanum corpus omnia sibi ipsi excogitat, naturæ motibus impulsū, præsertim si animus ipsius à puero probē fuerit institutus.

Plerūq;

riq; enim in improbis moribus educati, dum licentiore aut negligentiore uictu utuntur, bonas naturas corrumpunt. Quemadmodum aliqui uice uersa uitio- so corpore à natura producti, moderato uictu & tempestiuis exercitijs, multa na- turæ uitia ac delicta correxerunt. At de exercitiorum mensura, & utendi modo, dictum est in præcedenti sermone.

Victus senum ratio.

Cap. xxx

Naturalis senectus est sicca & frigida corporū temperatura, ex longeuitate pro- ueniens: quū enim corporū essentia unā cū insita caliditate paulatim defluat, & instrumēta iam ulterius q̄ cōueniens erat sicca fiant, tum actiones deteriores red- dunt, tum animal ipsum excarne & seipso gracilius euadit. Postquā uero adhuc amplius fuerint resiccata, non solum excarne, sed etiā rugosum efficitur, & mem- brorū impotens, & in motibus ambiguū. Qui itaq; affectionē ex scientia nouit, quod uidelicet siccitas est cum frigiditye, is bonus fuerit senū Medicus. Cogno- scet enim quod horum correctio per humectantia ac calfacientia contingit, talia autem sunt, aquarū dulcium balnea calida, & uini boni potus, & cibi qui hume- ctant simulq; calfaciunt. Et frictions per oleum mane moderatē fientes. Dein- de deambulationes & gestationes citra deffatationem, uirium senis coniecta- tione facta: non enim parua est etiam in ipsis senibus differentia. Dandus au- tem est cibus modicus quidem, uerum sæpe. Nam si paululum iustam mensu- ram senes excefferint, non parum læduntur. Securius itaq; est debilibus senibus parum cibi offerre, uerum ter in die. Circa tertiam quidem horam panem pro- bē paratum recentem, cum optimo melle despumato. Circa septimā uero præ- frictis, & conuenientibus senibus exercitijs exercitatis, ac lotis, prandium exhi- bendum est, & primum quidē danda quæ uentrem molliunt, uelut sunt olera ex- beta ac malua. Deinde pisces petrosos ac pelagios præbere conuenit, postea ue- ro paululum in lecto quiescere, deinde moderato motu uti. Ad uesperam au- tem coenantes, à piscium esu absteineant. Accipiant autem cibos boni succi & æ- grè corruptiles, uelut est gallina aut uolucris aliqua ex simplici iure. Vinum ue- ro senibus utilissimum est. Sit autem ex calidioribus natura. Quale est quod sub- stantia quidem tenue est, colore autem fuluum aut flauum. Atque unum qui- dem hoc maximū bonum senibus ex uino accedit, quod calfiunt omnes ipsorū partes. Deinde quod serum sanguinis per urinas purgatur. Quæcunq; uero uia na pallida sunt aut flaua, & simul crassa, ea sanguinē generant, & corpus nutriūt. Quapropter etiam ipsa aliquando cōmoda fuerint senibus, quo uidelicet tempo- re neq; serosum humorē in uenis habent, & ampliore nutrimento indigent. Ut plurimum enim in uino urinā ciente senes opus habent, & quod aquosa super- fluitas in ipsis redundat. At uero à nigris & acerbis ac crassis & similibus uinis abstinere ipsos oportet. Diutius enim in uentre manent, & propterea incom- moda sunt. Dulci uero si senex uti uelit, post balneūumat dulce simulq; pallidū colore. Non prohibeo etiam uinorū ex melle paratorū usum, & præsertim his se- nibus qui suspecti sunt de calculi in renibus generatione, aut quos podagra aut articularis morbus infestat. Et tunc in uinum injiciendum est petroselinū solum. Sufficit enim hoc arthriticis. Ad calculosos uero betonica ammiscetur. quæ & cestrum appellatur & saxifraga. Abstinere autem oportet senes ab edulijs & poti- bus, uiscosum & crassum humorē gignentibus. Qualia sunt alica, caseus, oua co- cta, cochleæ, bulbi, fungi, lenticula, & ostreorū caro, & reliqua suprà relata in ali- mentorū crassi succi mētionē sermone secundo. Si uero ex necessitate aliquādo cōtigerit aliquo ex talibus uti, statim exhibendum est pharmacū ex calamintha,

aut ex tribus piperis generibus. Si uero non sit ad manum quid ex his, piper tundendum est & exacte cribrandū, & tum cum obsonijs edendum, tum potui inspergendum. Et allium tunc gustare conducit. Postquā autem soluta est obturatio, & aluus subducta, etiā theriacā antidotū, & mithridaticā, aut aliam quandā ex his quæ ex aromatibus constant exhibere cōuenit. A talium uero usu, transire statim ad humectantē ac calfacientē uictus rationē suprà relatā. Dandę sunt ipsis etiā maturæ & dulcissimæ uirides ficus, ante alium cibum. Sed & in hyeme caricę, nisi accidens aliquod circa dextrā præsertim præcordiorū partē adsit. Quandoquidē uero serosę ac pituitosę superfluitates in senum corporibus, uelut dictū est, colliguntur: urinā quotidie propellere oportet, nō per medicatas res, sed apij decocto cū melle, & uinis urinā cientibus uti. Venter quoq; per oleū bonū subducendus est, præsertim absorptū ante cibos. Manifestū est autem quod & oleracea omnia præ alijs cibis edere oportet, ex oleo & garo. Emolliunt autem uentrē & pruna sicca, præsertim quę ab Hispania afferuntur. Damascena uero in aqua multa meraciore præmacerentur, aut in ipsa decoquantur. Sed & oliuæ muria conditæ, si fieri potest albæ, præsumendæ sunt. Ventrē uero amplius suppresso, etiā mercurialis cocta detur, & cnicus cum ptisana, sed & resina terebinthina. De hac uero accipiendū est aliquando ad nucis regiæ magnitudinē, aliquādo ad duarū aut trium. Non enim solum citra molestiā mollire solet, sed etiā uiscera extergere, & pulmonem & rhenēs. At perfecta dosis eius est uncia una. Idonēū est ipsis & hoc. Caricas pingues accipe, & coriū forinsecus ipsis oblitū detrahe, deinde in mortario tunde, & cnici medullā ipsis adiice, decima plus minus caricarū parte. Deinde ambo tusa misce, ex hoc duarū aut triū caricarū magnitudinē præbe. At uero ex relatis pharmacis nullū unq; largius accipiendū est. Quidā enim gaudent quod confestim uehementer sunt purgati. Verū quanto magis fuerint euacuati, tanto amplius uenter sistit per sequētes dies. Suppressa autē aluo ipsorū, infundere oportet oleū solū calidū. Nam & dura stercora hinc educunt, & lubricitas quædā fit in transitu, & ipsum senū corpus mollescit, instar aridarū pelliū in duratū.

Victus ratio eorū qui in ocio degunt.

Cap. xxxxi

Qui uitā in ocio degit considerare debet, an in priore uitā exerceri consueuit, aut citra exercitationē lauari. Nam quidā hunc morē moderatē ferunt, ut aliqui ex ipsis nō assidue ægrotent, ubi corpore faciliē transpirante præditi fuerint. Atq; talem sanē corporis naturā, ad aliam consuetudinē transferre minimē oportet: quemadmodū neq; illam aliā, eorū qui per multū tēporis interuallū egrotant. Si uero assidue quis ægrotet, cōsideranda est in ipso causa, an ob plenitudinem, aut propter humorū uitiationē egrotet. Et si quidē ē morbis ex plenitudine egrotare uideat, scopus tibi erit propositus, ut omnino salubrē ipsius diætā cōserues, quo semper moderatos habeat humores. Si uero propter uitiatos humores ægrotare solet, optimos facere humores. Quidā igitur plenitudinē coaceruant, quū ea quæ per corpus transpirāt pauciora fuerint his quę accipiunt. In his itaq; seruanda est symmetria ac proportio eduliorū ac potuū ad ea quæ euacuant. Symmetria autē est, ut in utrisq; cōsideremus nos quantitātē, tum eorū quę ingeruntur, tum eorū quæ euacuant. Nam qui in priore uitā statim priusquā exercerentur, in balneū ingressi sunt, in his nunc frictione moderata utendū est, & breui motu. Qui uero exercitabantur ante balneū, his cōsulo ut nunc paululū augeāt consuetudinē. Detrahēre uero oportet etiā aliquid de cibis, & quantitate ac qualitate moderatos exhibere. Qualitatem autem dico, uelut in carnibus porcinis: celerrimē enim plenitudinē & copiā boni humoris congregant, Itaq; ad olera ducendi sunt, & ad pisces

ad pisces similiter ac volucres, qui non multum nutriunt. At uero in his qui uitiosos humores colligunt, non unus est scopus, quoniam neque una est uitiosi humoris species. Quidam enim frigidiores ac pituitosiores uitiosum humorem congregant. Aliqui uero calidiores & biliosiores. Sicut alij atrabiliarium. Fugendi itaque sunt singuli cibi ac potus, qui promptè generare solent humorem qui in ipsis congregatur. Dictum est autem de ipsis abundè, in boni succi & mali succi eduliorum mentione, in secundo sermone huius operis. In quo sanè de attenuantibus edulij dictum est, quæ commoda sunt, his qui crudum appellatum humorem coaceruant, qui semper quidem crassus est, non tamen semper uiscosus. Porro in omnibus his cōmune auxilium est, moderata uentris subductio, & maximè quibus uenter est natura durior. Commune auxilium est etiam ueneris usus moderatus.

De carniū subuersione.

Cap. XXXII

Quum ad immodicā carniū multitudinem deuenerit corpus, liquare ipsum ac subuertere oportet. Ostensum est autem quo calidius & siccus temperamentum, gracile corpus efficit. Huiusmodi igitur faciendū est carnosorum hominum temperamentū, si moderatū fieri debet. Didicisti autem iam quod uelocia exercitia atq; acuta, & diæta attenuans, itemq; eiusmodi medicamenta, sed & animæ cure, totum temperamentū calidius ac siccus reddunt, & ipsum corpus tenuius. Attenuans itaq; diæta manifesta est, pharmaca uero uehementiora sunt, ruta semen, & præsertim syluestris cum cacuminibus, aristolochia rotunda, centaurea tenuis, gentiana, & polium, & quæcunq; fortiter urinā cient, uelut petroselinū. Singula enim hæc & per se, & inter se uniuersa mixta, attenuare & euacuare humores possunt. Sed & sal ex uiperis uitis multum attenuat. Quin & ipsa theriac antidotus attenuat & discutit. Illinatur autem oleo, in quo cocta est cucumeris syluestris radix, & alihæa, & gentiana, & panacis radix, & aristolochia rotunda, poliumq; ac centaurea. Cibi uero non statim a balneis dandi sunt, sed permittendum est ut prius quiescant aut quid consuetarum actionum obeant, & rursus ad secundū balneum ducantur. Præstat autem & balnei aquam discusso-riam esse, si naturalem habere possent. Sin minus, flos salis marinæ aquæ ammiscetur. Deinde uero edulia magna quidem mole, pauci uero nutrimenti danda sunt, ut impleatur quidem, modicum uero alimentum ex ipsis in corpus distribatur. Talia uero sunt olera, & panes sordidiores, & similia quæ iam in secundo sermone relata sunt. Vino autem utendum est albo colore, & tenui substantia. Neque uero ante cibos potus permittendus est, neque copiosus potus indulgendus. Sed & semel in die cibum capere melius est, & pro exercitiis ratione pauciores cibos exhibere. Quin & frictio sicca ex mappis crassioribus, sufficiens est ad attenuandum. Sed & nitro ac asperiore sale frictionem facere conuenit. Multum itaque nitrum in balneis attenuat. Modicum uero, irritamentum est ad carnositatem uberiorem, & ad meliorem nutritionem. Prodest etiam insolatio carnosus, Probè attenuat etiam potum hoc pharmacum, Petroselini trientem, piperis sextantem, anisi, asari, utriusq; unciam unam. Hoc & lotium ciēt, & aluum promouet.

Quomodo graciles renutrire oportet.

Cap. XXXIII

Gracilitas corporib. accedit, quibusdā ex totius corporis intēperatura frigidior ac siccior, quibusdā uero digerendi facultate, aut nutriendi, aut utriusq; imbecillioribus natura existentibus. Omnes autē sic habētes iuuant edulia boni succi, & exercitia tarda ac moderata, & frictio consimilis. Et in summa, omnia contraria rea-

ria relatis ad carnosos. Comodum est etiā ipsis picari per dies tres aut quatuor. Nam & digestionis confert, & nutritioni. Et multos uidere est crasse factos ex hoc picationis auxilio, & praesertim eos quibus facultas digerendi debilis est. Nutriendi uero facultas non debilis quidem est, sed ob idoneae materiae penuriam nutrire non potest. Si uero ieiuni lauentur, ante balneum corpus linteis confricare oportet, donec rubefiat. Deinde frictione non ualde dura uti, ut ne constringentes, cutem densam ac duram efficiamus. Oportet autem decoloribus & alimentum non sentientibus iracundiam inducere, & commotiones animales.

Quomodo quis partes attenuatas sanare possit. Cap. xxxiiii
Ex his qui in quibusdam partibus graciles fiunt, plerique aut ob diuturnā ipsarum quietem, aut ob deligationis fracturae modum, ad hanc affectionem deueniunt. Oportet igitur vires quidem in membro corroborare, largum uero sanguinem attrahere, tum per moderatarum frictionum usum post cibum, tum per commodos parti motus, & per moderatas aquae calidae affusiones. Haec autem post cibum facere oportet, donec pars rubicunda facta eleuetur, & tunc statim a perfusione cessandum est. Oportet etiam picatorum medicamento uti, de quo dictum est in praecedenti sermone, ubi uero frigiditatis sensus circa attenuatam partem fuerit, linteis ipsa perfricanda est, & quodam pharmaco calefaciente. Sed & thapsia illinenda est, aliquando cum melle, aliquando cum cerato.

De lassitudinibus a gymnasijs, aut ex itinere obortis. Cap. xxxv
Lassitudinum primae ac simplices tres sunt differentiae. Quae ulcerosa appellatur, & quae tensiva, & quae inflammatoria. Et ad has insuper ea quae ob multam musculorum siccitatem generatur, quam lassitudinem uocant abusiue, quum non sit lassitudo, sed siccitas.

De lassitudine ulcerosa. Cap. xxxvi
Ulcerosa itaque lassitudo in superfluitatibus tenuibus simulque acribus ac mordacibus generatur: Non enim in his plenitudinis copia est quae affligit, sed humorum acrimonia, qui exercitiorum tempore, aut aliorum uehementium motuum, ex duplici causa generantur. Aut crassioribus superfluitatibus, diffusis quidem ac attenuatis, non autem omnibus excretis. Aut colliquata aliqua pinguedine, uel carne tenera, in uehementibus motibus: necesse est enim a talibus tenuibus humoribus & acribus pungi ac uelut sauciari cutem & carnes, ut & horror aliquando fiat, & rigor, quum fortiter fuerint acres & multi. Tumor autem non est oculis expressus in partibus dolentibus. Accidit haec lassitudo praecipue corporibus uitiosis humoribus ac superfluitatibus, refertis. Consequitur & ad recentes cruditates, quum aut immodestius se exercuerint aliqui, aut in sole diutius uersati fuerint. Sed & citra cruditatem in boni succi corpore conflatur, propter immodici exercitij excessum. Densa autem & horrida apparet his cutis, & dolent uelut qui ulcus habent, alij cute tantum, alij etiam carnibus sub ipsa. Sanatio porro contingit ex eo quod contrarium est affectioni. Oportet enim superfluitates discutere, & sedabitur affectio. Discutientur autem frictione multa & molli cum oleo dulcissimo nulla adstrictione praedito. Quale est dulcissimum sabinum. Maximè enim aduersa his omphacinum. In prima igitur die largo oleo cum multa frictione utendum est, quum omnino nullus percipiat futurae lassitudinis sensus. In secunda uero, quo ea quae facta iam est soluat. Soluit autem ipsam, exercitium moderatum, & frictio multa, pluribus ministris, simul contrectantibus, quo pars ipsa non frigeat, & superfluitates cellerrime discutiant. Haec autem lassitudo plerumque extendi solet usque ad quartam diem. Itaque quarta die lauentur & consueto cibo nutriantur, prius tamen diebus paucioribus

pauciores sint ac humidiores cibi, & nihil uiscosi habentes. Sit autem & balneum non moderato calidius. Laxare enim & discutere uolumus ipsum corpus.

De lassitudine tensura.

Cap. xxxvii

Lassitudo tensura nullam memorabilem superfluitatem in corporibus suam habet. Verum in musculis ac nervis affectio est ob uehementes distentiones facta, quas per exercitia fecerunt. Contingit enim in his rectas in musculis fibras laborare ac tendi, ut proximae sint diuulsioni. Fit autem haec lassitudo uiris maxime boni succi, qui non acuta & uelocia exercitia faciunt, sed magis robusta. Et efficit sane lassatos ualde pigros & ad motum aegros. Non tamen horridi fiunt, uelut qui ulcerosam lassitudinem inciderunt. At uero corpus in his nihil minus quam in ulcerosa lassitudine, & in musculorum squallore, contrahitur uidetur. Et calidiores quam pro natura contingentibus esse uidentur. Sanatio autem in his est tensorum partium laxatio. Frictio igitur his conueniens est modica simulque mollis, per oleum dulcissimum tepidum fiens: & ocium ac quies, & balnea maxime temperata moderato non calidiora & mora in calida aqua diutius facta. Quare etiam si his talem laueris, magnopere profueris. Hic etiam post balneum unctione opus habent antequam induantur. Et si quidem postea sudauerint, deterfos rursus inungere conuenit. Quin & sequenti die ubi surrexerunt de strato, post defrictas superfluitates, & subductam aluum, unctione opus habent, ita ut neque extreme frigido oleo, neque dura frictione contrahantur. Cibus dandus est his modicus quantitate, uerum boni succi, & nihil uiscosum habens.

De lassitudine inflammatoria, & ad ossa pertingente. Cap. xxxviii

Tertia lassitudo est, in qua uelut contusas ac inflammatas sentiunt partes, haec tunc accidere solet quum ob uehementissimos motus calfacti musculi, attraxerint quid de circumfusis ipsis superfluitatibus. Et sola haec eleuat musculos praeter naturam, ut inflammationi similis sit affectio. Et propterea ex contactu dolent, & calidiores apparent. Dolent autem magis quam moueri uolunt. Si uero circa tendines aut nervos in profundo eandem affectionem fieri contingit, ossium lassitudinem affectionem eam appellant, ob sensus profunditatem. Haec lassitudo accidit ut plurimum hominibus ad exercitia non aduersis. Sanatio scopos tres habet, quemadmodum omnia inflammata: superflui euacuationem, distentionis partis remissionem, & inflammatae refrigerationem. Oleum itaque multum dulce tepidum, & fricationes molliores, & in temperatissimis aquis mora diutissima, tales lassitudines sanant. Si uero etiam paulo tepidior fuerit aqua, magis his prodest. Ita uero & quies multa & assidue inunctiones. Cibi dandi sunt his boni succi, uerum pauciores, & nihil omnino uiscosi habentes.

De lassitudine ob siccitatem & gracilitatem.

Cap. xxxix

Alia praeterea est quarta affectio, similis quidem lassitudini, sed non est lassitudo, eo quod neque ulcerosam, neque tensuram, neque inflammatoriam affectionem habet, imo neque horrorem aliquem, neque dolorem, neque ad motus pigritiam similem lassitudinibus infert: uerum solam gracilitatem cum siccitate. Contingit igitur in boni succi & exercitatione utentibus corporibus, quum immodestius exercitata non probe recurata fuerint. Discutiunt enim sic superfluitates, & laxant distenta corpora. Et nihil reliquum fit in corpore praeter siccitatem, quam ex immodica euacuatione habet. Quare etiam correctio huius affectionis in appositione ac repletione euacuat consistit. Non potest autem haec fieri, dum cutis rarefacta est. Proinde cutem contrahere oportet, ac densare, & adstringere, Contrahit autem & adstringit.

git tum frigida aqua, tum feruens. At à frigida periculum est ne homo lædatur, qui iam rarus simul ac uacuus ob exercitiorum copiam factus est. A feruenti uero nulla læsio, sed secuta densitas cuti accedit, ita ut etiam relictus in ipsa calor reuocetur ex feruentis aquæ solio. Vnde feruentius calidæ solium parandum est. Exiliant autem ex ipso statim in frigidum, quo in ipsis maneat firmitas in cute unà cum caliditate. Nam & in sequenti tempore minus discutuntur, & alimentum facile in carnes & in cutem suscipiunt: quo bono nullum maius ipsis excogitare possis. Vitanda est autem longior in frigida solio mora. Exoluit enim frigida lotio, calidæ lotionis utilitatē. Prima itaq; die lotus uelut dictum est, cibum accipiat boni succi & humidioris. Secunda uero recuretur, modicæ simul ac mollis & lentæ frictionis usu, & solio calido. Atque hoc faciat consequenter per multos dies.

De lassatis ex uenere.

Cap. XL

Debilitas uirium sequitur ad immodicum ueneris usum, præsertim in corporibus natura debilibus. Rarefit autem ipsis & cutis, ex uehementi motu. Et pluri-
ma fit per transpirationem discussio ac exhalatio, & propterea siccitas. Aliquando uero etiam frigiditas consequitur, tum propter raritatem, tum propter caloris transpirationem ac sudores. Correctio igitur horum est per constringentia spissantiaq; ac corroborantia cutem. De quorum numero est & moderatū exercitium, & feruentius calidæ aquæ solium, quies item ac somnus multus. Edulia uero sint multitudine quidē pauciora, qualitate uero humidiora, & moderatē calidiora: quo & concoctio bona fiat, & siccitas ex lassitudine corrigatur.

De lassitudinibus spontaneis.

Cap. XLII

Quum de lassitudinibus ex gymnasijs, aut ex itinere obortis dixerimus, nunc de his quæ sine uehementi motu sponte fiunt docebimus: tales enim morbosæ sunt uelut etiā Hippocrati uidetur. Lassitudines enim inquit, spontaneæ denunciant morbos. Sunt autem & harum tres differentiæ, ulcerosa, tensiua, inflammatoria.

De lassitudine ulcerosa spontanea.

Cap. XLIII

Spontanea igitur ulcerosa lassitudo, ob uitiosos humores clandestinē coactos fit, qui acres & tenues ac calidi sunt, ut corrodant & stimulent ac pungant corpuscula sensu prædita. Et quam diu quidem ipsi in uenis ammixti sunt sanguini, lætet ipsorum uis à sanguinis bonitate superata. Vbi uero in carnes & cutem transumpti fuerint, & per mansionem confirmati, tunc ulcerosam affectionē ac sensum inducunt. Et tunc maxime in talibus augentur, quum moueri uolunt. Considerandum est autem in his, utrum in cute & carne sola uitiosi humores contenti-
neantur, aut etiam cum sanguine intra uenarū uasa. Horum autem signa habes ex urinis, & morfu circa cutem, & sudoribus. Quando enim unà cum hoc quod etiam in urinis apparent uitiosi humores, sensus quoq; ipsorum mordax circa cutem contingit, & sudores alieni, tum colore, tum sapore apparent, manifestum est quod & in uenis cum sanguine uitiosi humores continentur, & quod in cute sunt ac carne. Siquidem igitur modicus sensus uitiosorum humorum cōtingat, ieiunium hominem per totum diem seruabimus, quiescere ac dormire iussimus. Deinde uespere multum & pinguius illito, atq; temperatissima calida loto, paucissimum boni succi ac forbilem cibum dabimus. Neq; uero uinum prohibebimus: concoquit enim uinum semicrudos humores, si quicquam aliud hoc facit, & sudores ac urinas prolicit, & ad somnum conducit. Siquidem igitur à prædictis quieuerit hoc symptoma, paulatim ad cōsuetam reducere hominem oportet. Si uero sequenti nocte ac postera die adhuc permanserit, aut auctum fuerit, uisendum

dendum est de auxilio fortiore. Nam tales ubi vires robustae sunt, alterum ex duobus facere oportet, ut aut uenam secent, aut purgatione utantur, ita tamen ut decernas utro auxilio magis opus habent, uelut consequenter dicam. Sin uero debiles fuerint vires, minime secanda est uena. Purgandum uero moderate aut omnino non. Si quidem enim cum multitudine sanguinis robustae fuerint vires, uena secanda est, aut consuetae excretionis suppressae mouendae: uelut sunt haemorrhoides in sede, & in mulieribus lunares purgationes. At ubi soli uitioli congregati sunt humores, citra sanguinis multitudinem, ad convenientem redundantem humorum purgationem ueniendum est. Affligit autem quandoque bilis amara humor, aut atra, quoadque pituita falsa aut acida, aut feroli humores. Siquidem igitur ociosior uita habuerit homo, & cibis crassi succi usus fuerit, & praesertim in hyeme, pituitosus humor colligitur. Verum in pluribus laboribus & cibis acrioribus, & in aestate, amara bilis coaceruatur. In autumno uero, & edulsi eiusmodi, ac laboribus diuturnis, atra bilis. Horum uero notas sumere oportet, & ex colore, & ex hominis motibus, & ex urinis ac sudoribus, & ex siti ac ciborum appetentia. Proinde sanguine praedominante reliquis humoribus, una cum uiribus robustis, uenam secabis. Si uero uitioli humores praedominantur, & vires robustae sunt, purgatione conuenienti utemur. At post uenae sectionem aut purgationem, nutrire oportet hominem edulsi boni succi quae exteriorum quid habent, uelut est pituita: & quae nulla uiscositate praedita sunt, neque crassi succi sunt, neque multum nutriunt. Utendum est & balneis temperatissimis, & unctione ac frictione moderata. Sed & reliqua diata ac cura sic facienda est, uelut relatum est in lassitudine ex gymnasijs generata. Si uero bonus sanguis paucus fuerit, crudi uero humores omnino multi, vires autem debiles: Neque uena secanda est, neque purgatione, neque exercitio utendum: Immo neque omnino motu utendum est, neque lauandum: Nam uenae sectio bonum sanguinem euacuat, uitiolum autem, qui sanum in magnis uenis circa hepar & mesenterium congregatur, ad totum corpus trahit. At purgatio in his tormina ac morsus efficit, & animi deliquia intenta, ad hoc quod nihil memorabile euacuat. Crudi enim humores omnes pigri sunt ac agre mobiles, ob crassitudinem ac frigiditatem. Itaque obturant omnes artus uias, per quas oportet id quod in purgationibus euacuatur ad uentrem accedere ac inferri. Et ob hanc causam neque ipsi euacuantur, & alios impediunt. Ob eandem uero causam neque exerceri, neque omnino moueri, neque lauari hos conuenit.

Omnes enim tales motus humores in totum corpus ducunt, & angustos transitus obturant. Seruandi igitur sunt in omni quiete, & danda edulia potusque ac pharmaca attenuantia ac secantia, & crassitudinem humorum conficientia, citra manifestam calfactionem. Nam humores quomodo cunque fortiter calfacti, undique per corpus meant. Utantur igitur in uictu aceto mulso praesertim, aliquando & pituita: Aliquando uero danda est & aqua mulsa. Possunt enim ferre tenuem dietam, si qui alij idem possunt, propter subiectam crudorum humorum multitudinem. Quandoquidem uero praecordia omnibus talibus eleuata sunt ac inflata & facile sanum inflantur quicquid tandem ingesserint: praestiterit ipsis dare cum cibo modicum piperis, praesertim longi. Melius fuerit & diosporico uti medicamento. Commodissimum est autem ipsis acetum mulsum, ex solo optimo melle & aceto praeparatum: ut sint mellis quidem despumatae partes duae, aceti uero pars una, plus minus. Praestat enim ex accipientium sensu modum iudicare, non nostris commoditatibus. Nam quod mature

iucundum est, hoc cōmodum est. Quod uero iniucundissimum est, id maxime aduersarium est. Prodest talibus etiam apomeli, & præsertim aridum factum.

At ubi iam attenuati aliquantulum fuerint humores, etiam uinum dandum est moderatum, album ac tenue. Sed & in apomelite ac aceto mulso coquendum est aliquando hyssopum & pulegium. Edulijs uero utendum attenuatibus, citra uehementē calfactionē: qualis est capparis ex aceto mulso, aut ex aceto & oleo. Postquā uero omnia perfectē bona tibi apparuerint, tūc ad familiarem uictum paulatim reducere conare, ita ut moderatis exercitijs utantur, & balneis, & unctionibus. Idoneum est autem ipsis unguentum lassitudinē eximens ex abiete paratum, itemq; quod ex populo nigra fit, quorum praparandi modum inter Acopa uocata referemus. Congruum est ipsis & oleū chamæmelinum, & anethinum: Item sampfuchinum tempore hyberno. Sampfuchinum uero oleum sic praparatur. Coquitur sampfuchus in duplici uase cum oleo. Similiter coquitur & rosamarinus herba. Si uero hæc non habeas, radicem cucumeris syluestris, aut althæa, aut bryoniæ, aut betæ albæ accipe, et cum oleo coque, multum enim discutunt.

De lassitudine tensiua spontanea.

Cap. XLIII

Tensiua spontanea lassitudo, si sine exercitijs, aut alio quodam motu excitata fuerit, multitudinem nimirum humorum indicat, qui nimia copia solidas animantis partes distēdunt, & præsertim musculorum fibras. Vicerofusensus non est in hac lassitudine. Sed neque tumor alicuius partis sub tactum aut uisum cadens. Verum solum grauitatem & distentionem percipiunt. Manifestum est autem quod sanguine redundante, optimum auxilium est uenæ sectio in cubito. Possunt & uenæ in talis secari. At uero post totius corporis euacuationem, ad distentarum partium laxationem procedendum est, per unctiones ac frictiones molles, ociumq; ac quietem. Et utendū est balneis temperatis, et cibis citra mordacitatem exterforium quiddam habentibus, qualis est ptisana, & apomeli, & consimilia. Et ut in summa dicam, post uenæ sectionem eadem cura uti oportet, quæ relata est antea ad tensiuam lassitudinem ex gymnasijs exercitijs obortam.

De lassitudine inflammatiua spontanea.

Cap. XLIII

Inflammatiua lassitudo quum sponte citra aliquem motum oborta fuerit, tum propter doloris magnitudinem, tum propterea quod cum manifesta inflammatione partium caliditate consistit, coeleuans musculos in tumorem, neque paucarum horarum, ne dum dierum duorum aut trium moram ac dilationem tolerat: Sed statim febrem uehementissimam inducit, nisi quis sanguinem detrahendo præueniat. Calidissimus est enim talium sanguis, & plurima opus habent ipsius euacuatione, omnes ferme ab hoc malo apprehensi, & plerique ipsorum etiam post uenæ sectionem februnt. Quare neque cunctari, neque parum detrahere conuenit: Sed & cito euacuare, & usque ad animi deliquium ducere, si nihil aliud amplius impedierit. Præstat autem & detractionem repetere in eadem die, ita ut in priore euacuatione homo non animo linquatur. In posteriore neque ferendum est animi deliquium. At quibus hoc modo affectis uena secta non fuerit, aut sponte aliunde sanguis eruperit, hi bona fortuna opus habent ut seruentur, & neque seruantur. Siquidem igitur in capite & collo dolores magis hæserint, humeralem appellatam uenam secare oportet. Si uero thoracem & dorsum & lumbos doleant, internam uenam secabis. Sin æqualiter totum corpus, mediam. Siquidem igitur a uenæ sectione

lectione febris permāserit, curationem facere oportet, quā in febrium tractatione referemus. Si uero sine febre manēant, in prima quidem die à uenæ sectione, pitisanæ succus aut alicæ solum dandus est. Similiter autem & secunda. Si autem & in tertia die sine febre manet, etiam lauato & largo oleo iungito. Etiam si autem laueris, moderatū tamen uictū exhibebis, ex lactuca, aut si ea nō adsit, cucurbita; & alicam uelut pitisanam coctā. Sed & beta, & malua, & atriplice utendū est, si nō adsit lactuca. Ex piscibus dandi sunt petrosi, et asellus ex albo iure probè coctus. Utatur aquæ potu. Aquæ potum dico, non frigida aquæ potionem, sed calidē. Post tertiam si tolerabilis manet æger, inspergere oportet in potum, uini parum albi ac tenuis, & de cætero pro ratione reficere, per boni succi & neutiquam calfacientis diætæ usum.

Quali curatione ad frigiditates utendum est.

Ex Herodoro.

Cap. XLV

Duplex est frigiditatis curandæ modus. Nam & futuram frigiditatem præcauere oportet, & corrigere iam factam. Quo igitur non capiatur frigiditas is qui in frigido aëre uersaturus est; neque famem tulisse, neque præuoluisse oportet, neque crudelitatem pertulisse, aut fatigatum esse, aut crapula impletum esse.

Frigiditas enim consequens ad ciborum crudelitatem, morborum causa est. His uero qui famem pertulerunt, frigiditas ad ipsos nervos penetrat, qui nudi quodā modo sunt, & propria materia priuati. Quapropter qui in frigido aëre uersabitur, totum corpus nardino aut gleucino oleo præinungere debet. Placitas autem pedum, cerato ex laurino parato illinere. Aut ipsas lauri baccas cerato excipere, ac utere. Verum ex ueteribus quidam succum cyrenaicum milij magnitudine, in talibus necessitatibus deuorandum dederunt, cera oblitum. At uero à conuersatione in frigido aëre, desidere non oportet, sed ambulare prius in tepidiore loco. Et postea ad balneum ingredi, & in calida aqua diutius morari. Non presente uero balneo, ad ignem corpus illinendum est, ac confricandum diligentius tum per seipsum, tum per alios. Deinde accipiendus est ciuis calidus potentia & actu. Vinum uero neque ualde acerbum, neque nimis uetus dandum est. Tale enim neruofas partes offendit, iam à frigore uexatas, & præsertim uesicam ac rhenes. Si uero sequenti die frigiditas perseveret, curatione per balneum aut inunctionē conuenit. Et diætā cōsimilis, & acopa ex oleo gleucino & amaracino ac similibus præparata.

Cutis densatæ curatio. Galeni.

Cap. XLVI

Densatur aliquando cutis, tum per uehemens frigus, tum per balnea aluminosarum aquarum, aut aliquid huiusmodi. Fieri potest autem ut & post balneum, & post sudores, aut alio quodam modo rarefacta ac frigefacta cutis densetur. Cognoscitur affectio calore albidior quā pro natura, & cutis ariditate ac densitate, & quod sic affecti in exercitijs ægre calefiant. Neque enim sudant, neque bonum colorem habent. Si uero etiam à plurimis exercitijs coacti sudauerint modicum ac frigidum sudorem excludunt. Sanatio horū est calfactio & cutis rarefactio. Vtendum igitur est exercitijs, & balneis calidioribus, præstat autem in prima balnei domo super leui lapide sedentem perfundere. Vngantur etiam oleo quopiam laxatorio, uelut est quod dulcissimum est, uerum duorum aut trium annorum: Utantur et lauacro statationi apto, calido teporato diutius. In frigido uero ne immorentur. Neque uero aqua sit ualde frigida. Vbi uero induere se uolunt, inungantur aliquo moderatè calfaciente, quale est anethinum aut cicinum. Ex ungentis uero gleucinum, aut susinum,

1 2 aut irinum,

aut irinum, aut amaracinum. Cibus porro utantur moderatis, nihil uisco-
si habentibus.

Quomodo curandus sit aestuosus ardor. Herodoti. Cap. XLVII

Quemadmodum frigiditas famelicos magis lædit, sic ardor repletos. Qua-
re qui in aestiuo sole uersari uolet, repletionem & acrium esum uitet, uinosita-
tem item ac cruditatem. præhumeſcet autem corpus balneis potabilium aqua-
rum, & cibus humectantibus, prospiciendum est & in mora ipsa sub sole, ut ca-
put tegatur, leuiore aliquo uestimento, aut folijs uitis, aut myrti, aut polygoni.

Si uero sitis uehemens oriatur, non acruatim ingerendus est frigida po-
tus, Plurimis enim hinc præterfusio aquæ intercutem cōtingit. Alijs uero ad ar-
dentem pulmonem aquæ frigiditas illapsa, tussis & grauedines excitat, aliqui-
bus etiam tabem. Præstat igitur prius faciem frigida proluere manusq; ac pe-
des, deinde colluto ore paulatim ex interuallis absorbere. Postquam autem
discessit à sole, temperata calida se lauet, & in frigida natet. Si uero non adsit
balneum, aqua & oleo, aut aqua & rosaceo totum corpus humectetur, & mol-
libus manibus præfricetur, & tunc in frigidam insiliat, præsertim si afuctus fue-
rit. Si uero nihil tale adest, aqua perfundatur. Postea potus quidem sit a-
qua. Edulia uero, lactuca, intyba, cucumis, cucurbita. Vinum quoque dilu-
tius solito sit, Obsonium pisces delicati, domestica gallina ex iure albo. A coi-
tu uero abstineat. At ubi caput uehementer calfactum est, aut stomachus ad
huc exardet, ut alba & glutinosa sit saliuā, ut uix sputo reijci possit, & reli-
quum corpus pigrum apparuerit, ac uelut exolutum: caput rosaceo irrigan-
dum est, aut rosarum succo cum oleo omphacino, aut polygoni succo, aut
pampinorum uitis, aut intubi, aut alicuius similis succo. Totum uero cor-
pus humectandum est aqua & oleo, aut aqua & rosaceo. Super stomachum
autem molle linteolum imponendum uino & oleo imbutum. Aut ceratum ro-
saceum, aut melinum quod absinthium habet aut portulacam. Optimum est
autem & absinthij cremorem bibere, ad detergendas biliosas & acres in uen-
tre congregatas superfluitates. Conducit & rosaceum absorbendum dare ad
cyathi unius mensuram.

De matutina frictione. Galeni.

Cap. XLVIII

Matutinam frictionem assumimus post superfluitatum excretionem, excel-
lenter quidem mollem in plus iusto resiccatis, & in his qui in uehementi frigo-
re uersari uolent, & quibus propositum est frigida lauare, & qui lassitudinis sen-
sum habent, & in quibus cutis densitatem corrigere uolumus cum largo oleo.

At uero densitatem ex frigore obortam sanamus, primum quidem siccari
& asperarum frictionum usu, deinde frictionibus ex oleo calido. Ad rari-
tatem uero cutis obortā ex balneis, aut frictionibus, aut ob ueneris usum: paucis
quidē siccis frictionibus utimur, paucis uero etiā post ipsas, ex oleo frictioni-
bus, & eo quopiam ex adstringentibus. Ceterū humiditates ex multo potu obor-
tas solæ siccæ frictiones curant, per linteā factæ, citra pinguitudinem, aut cum
aliqua ex discussoria ui præditis.

De uespertina frictione.

Cap. XLIX

Vespertina frictio lassatis, aut resiccatis, aut alimentū nō sentiētibus commo-
da est. Prandiū in his partius fiat, & amplius tēpus intercedat usq; ad cœnā, &
plerūq; in quiete. Deinde etiā paululū deābulēt. Melius enim est si subductis ci-
bis etiā uentrē exonerauerint. His ita factis, citra periculū frictio assumitur. Fri-
ctio fiat cū oleo dulci, uentre penitus non cōtacto. Periculum est enim, et ipsos
cibos

cibos prius concoqui, & semicoctum aliquem humorem digeri, & caput perturbari, & stomachum subverti. Quare nardino ungento uenter perfundendus est absq; defricione.

De cruditate.

Cap. LI

Quot modis cruditas fiat, & quomodo uariè resistere oportet oborientibus ex hac corpori detrimentis, in loco de alui affectionibus postea declarabitur. Nunc uero necessarium est dicere quomodo ad urgentia accidentia instare oportet. Ructu itaq; accedente ac irritante, & grauitate circa præcordia existente, & ex hac molestia quadam in totum corpus se diffundente, non cunctandū est ad uomitū deuenire, sed aqua plurima tepida hausta cogendus est, ut cibi penitus excernatur. Vbi enim permāserint, & torminū, & dolorū, & grauitatis, capitis, & defillationis, aliquando uero etiā febris, causa fiunt. Si uero quis natura difficulter uomat, aut ob aliam quandam causam uomere impediatur, elaborandum est omni modo ut cibus subducatur, & ex præcordijs secedat. Ad hæc erectior decubitus paretur: Adiuuat enim, si quicquā aliud, cōcoctionem. Et si uigilās quis fuerit, propter nimiam expletionem somnū assequi nō potens, is immotus permaneat, & eandē decubitus figurā cōseruet. Nam assiduæ conuersiones status pariūt. Flatus aut materiā sursum uergere faciūt. Si uero perseuerarit hoc accidēs, etiā pharmaci cōcoctorij ex malis cydonijs preparati, cochliarij mēsurā danda est. Si uero quis adfuetus sit ad frigida potum, & multā sitim percipit, non incongruū fuerit sinceræ frigida heminā exhaurire. Celerrimē enim corroboratum os uentris, quæ in aluo sunt expellit. At uentrē nardino ungento illinere oportet, & partes circa præcordia fouere, & extremarū partium fricione uti. Exonerata aluo ad deambulationē procedendum est, tardē progrediēdo, ne uapores ex cruditate ad caput allati cōcutiantur. Postea uero ad cōsuetā uitæ munia pergendū est. Deinde succedat balneū, & inūctio ex oleo dulci. Vtilis est & absinthij potus. Cibo uero utendū est facile concoctili ac moderato, & cui addita sunt quæ aluo commodant, uelut sunt erinacei & cancri. Deinde olera, beta, malua. Modicē utendum est uino, uerum calidiorē. A reliquis uero abstineat, uelut sunt acrium esus, & bellaria, ac placenta ex melle, & fructus dulces. Talia enim omnia ægre cōcoqui ac digeri possunt. Hinc autem somnus imperturbatus succedat.

De crapula. Philumeni

Cap. LII

Sed & cruditates ex uino obortas, quas crapulas uocant, ferè eodem tractare oportet, ita ut cogamus ipsos uomere à tepida aqua, aut sola immisione digitorum aut pennarum, & in lecto quiescere iubeamus, & turbationem somno sedemus. Et si quis sanè ad frigida potum adfuetus sit, & stomachi ac uentris uexationem siue morsum perceptet, dandi sunt ipsi cyathi duo aut tres synceræ puræ frigida aquæ ex interuallis. Sedata uero turbationē, cibos exhibebimus boni succi, & magis frigefacientes. Potus autem sit modicus, uinum album & tenue, dilutius temperatum. Optimus uero in his est uini absinthia potus à balneo.

De æqualibus intemperaturis. Galeni.

Cap. LIII

Quum tractauerimus quomodo quis à prima ætate usque ad senectutem conseruet hominem optime constructum: Transibimus nunc ad eos qui statim ab initio morbosam corporum constructionem adepti sunt. Duplices autem sunt secundum genus uitiosæ corporum structuræ: Quædam enim æqualiter habent temperatas uniuersas corporis primas partes, quæ similes

appellant. Quædā uero inæqualiter. Dico aut̃ equaliter, quū ad aliquā intēperaturā immutatē fuerint oēs simul corporis partes, frigidiores quā conuenit, aut calidiores, aut sicciore, aut humidiores factę. Et per cōiugationē, quædā calidiores & sicciore, quædā humidiores & frigidiores, quædā calidiores & humidiores, quædā frigidiores & sicciore. Et sanē iuxta instrumentaliū partiū cōpositionē, aliquę equaliter, aliquę inæqualiter cōpositę sunt. Vidi em̃ iā quosdā habere uentrē quidē frigidū, caput aut̃ calidū: alios uero caput frigidū, uentrē uero calidū. Vidi aut̃ & uentrē per accidēs assiduē bile uexatū, qui nō esset natura calidus: Quemadmodū etiā aliū frigescentē, qui nō esset frigidus. Sic & caput, & hepar & splen, et oēs alię partes, fruūtur aliquādo alterius intēperatura, quū ipsę ex natura nihil lęsę sint in propriū tēperamentū, neq; cōtrario modo dispositę. Proinde de primis optimū tēperamentū adeptis a me diceť, quo hoc exēplū habeas quod tēperatū est. Deinde de his qui equalē intēperaturā habēt.

Demonstratū est a me sępe, impossibile esse unā aliquā intemperaturā diutius perseuerare: Ipsa enim sibi ipsi necessariō aliā quandā asciscit. Illud porro nosse expedit, quod quęcūq; corpora morbosam structurā in prima natiuitate habuerūt, ea omnino nō perueniūt ad senectutē. Si uero etiā peruenierint, unū quendā morbum diuturnū habent. Proposuius aut̃ in hac tractatione de uitiōsam structuram habentibus agere, considerantes quomodo quis ipsa conseruet ut plurimum sana. Prius uero referendę sunt temperamentorum notę, postea consequenter etiā intemperaturarum correctiones.

Optimū tēperamenti dinotio.

Cap. LIII

Optimē tēperatus est homo quū corpore apparet exactē mediū inter omnia extremē disposita corpora, in gracilitate ac crassitudine, mollicie ac duricie, caliditate ac humiditate, siccitate ac frigiditate. Et, ut in summa dicā, si animales ac naturales actiones inculpabiles habuerit. Medio itē modo se habuerit inter hirsuta corpora ac glabra, & inter nigra colore ac alba. Habuerit autem capillos, dum quidem puer est fuluiores, in uigore uero ætatis flauiores.

Temperamenti calidi notę.

Cap. LIIII

Calidius quā conuenit tēperamentū totius corporis, nūc dico illud quod proportionē secundū humiditatē ac siccitatē inculpabilē habet. Qui igit̃ ab initio talē corporis naturā adepti sunt, saniores alijs apparēt, & articulata uoce loquuntur, & canūt, & citius gradiūtur. Augebitur aut̃ ipsis caliditas pro annorum proportionē. Iuxta uigorem aut̃ ætatis palām calidiores apparent. Quare morbis & accidētibus a flaua bile facile capiūtur: Nam multa caliditas paulatim cōsumens humiditatem, siccius tēperamentum efficit. Hi colore rubicundī sunt, et nigros capillos habent, progressu uero temporis etiā moderatē densos. Habentq; uenas amplas, sunt enim & graciles. Nam pingues & uenas amplas habentes, nō natura pingues sunt, sed acquisitum tēperamentū habent.

Temperamenti frigidi notę.

Cap. LV

Frigidū ad contactū est his corpus, depile, & pingue. Color aut̃ unā cū capillis, fuluior his est. Si uero multa est frigiditas, liuidi sunt & plūbei coloris, & angustas uenas habent. Si uero quis angustas habet uenas, & gracilis est, is necessariō acquisitum tēperamentum habet, & non ex natura gracilis est.

Siccioris tēperamenti notę.

Cap. LVI

Aegrē mobile, & siccum, & squallidum in his fit corpus facilmē ab omnibus siccantibus. Nam & natura excarnes sunt ac graciles. At cum hoc quod hi graciles sunt & excarnes, amplius etiā durum & asperum apparet tangentibus

tibus horum corpus. Gracilitas autem non solum ad naturales consequitur temperaturas, sed etiam ad acquiras ex longa consuetudine succedit.

Humidioris temperamenti signa.

Cap. LVII

Humidius temperamentum in reliquis consimile est temperato. Verum mollius & carnosius. Nam mollities ab humida temperatura separari non potest. Quemadmodum sanè & crassities non solum ad naturalem sequitur temperaturam, sed etiam ad eam quæ ex longa consuetudine facta est, succedit. Propriū autem est humiditatis etiam grauari corpus ab omnibus humectantibus.

Calidi & humidī temperamenti notæ.

Cap. LVIII

Mollius & carnosius est hoc, optimo temperamento. Vbi uero plurimū fuerit auctū, putredinis facile capitur morbis. Si uero paulò humidius: Multò uero calidius fuerit, tales molliores sunt moderatis, & carnosiores, & non paulò calidiores. Nigri aut sunt ipsis capilli, & caro non pinguis. Si uero paulò calidius, multò aut humidius fuerit, mollis his & multa est caro, & color mixtus ex rubro ac albo: & ad contactū paulò sunt calidiores. Quò uero in summa dicam, in coniugatis temperaturis semper prædominantis qualitatis notæ prævalent.

Calidi & sicci temperamenti notæ.

Cap. LIX

Calidū & siccū temperamentū hispidius ac calidius est, & gracile. Capitis aut pilos boni habitus & nigros ac multos habet in iuuentute. Temporis uero progressū etiā caluities sequitur. At uenæ ipsius amplæ sunt, & arteriæ magnæ ac uehementissimè pullantes. Et sanè & firmum, & articulatum, & musculosum, & minime pingue totum corpus. Et cutem ipsam duriores ac nigriorem.

Frigidi & humidī temperamenti notæ.

Cap. LX

Thorax his angustus est, & pilis nudus, quemadmodum etiam totū corpus. Cutis autem tenera & alba. Capillis subfului, præsertim in iuuentute, & fenescentes non caluescunt. Sunt item timidi, et minime audaces, ac pigri, & obscuras habent uenas. Et crassi sunt ac pingues, et fœmoribus ac musculis infirmi et inarticulati, & fiunt blæsi. Quod si frigiditas ac humiditas amplius augeant, color unā cum capillis fuluus euadit. Si uero plurimum augeant, liuidus. At si inæquale fuerit qualitātū augmentū, eius quæ magis aucta fuerit propriæ notæ prædominabuntur.

Frigidi ac sicci temperamenti notæ.

Cap. LXI

Si uero frigiditas ac siccitas ex æquo fuerint auctæ, natura durum & gracile habent tales corpus, albūq; ac non musculosum, & inarticulatum, ac depile, & ad tactum frigidum, pinguitudo tamen ipsis etiam si graciles sint, per carnem disseminata est. Pili & color corporis pro mensuræ frigiditatis portione se habent. Porro quum calida & sicca temperatura, in tempore inclinatæ ætatis, sæpe transeat in siccam ac frigidam: habitus talium gracilis ac durus similiter fit, uerum melancholicus est. Et propterea colore nigriores ac hispidiores fiunt.

Prædominabuntur autem semper prædominantis temperamenti notæ, obscuræ uero alterius notæ erunt.

De capitis dinotione,

Cap. LXII

Caput paruum quidem uitiosæ cerebri structuræ propriū signum est. Magnū uero non necessariò bonæ. Siquidem enim propter robur insitæ uirtutis materiam multā ac bonā creatis factū est, bonū est. Si uero propter solius materiæ multitudinē, non bonum. Distinguendū uero de ipso tū ex figura, tum ex his quæ ab ipso ortum habent. Ex figura quidem, si fuerit cōcinna. Semper enim hoc signum bonū est. Ex his uero quæ ab ipso ortum habent, si ualidā cervicē habet, & alijs ossibus optimè dispositū est. Et si uniuersum ipsorum neruosum

r 4 genus

genus bene nutritur, ac robustum est. Et si oculi acri visu fuerint præditi. At uero acuminata capita defectuosam circa occiput aut frontem eminentiam habent, aut ultra iustum modum auctam. Proinde ut plurimum sicut magna, ita etiam hæc capita uitiosa comperimus. Raro autem & ex his aliqua sunt bona, efformatrice ipsorum uirtute forti existente, & multitudinem materiæ bonam adepta. Nam qui acuminata capita habent, et ceruice ualida præditi sunt, hi tum alijs partibus omnibus, tum ossibus robusti sunt, ait Hippocrates.

Cerebri temperati notæ.

Cap. LXIII

Temperatum cerebrum naturales actiones moderatas habet, itemque superfluitates quæ per palatum, aut aures, aut nares purgantur: minimeque lædetur ab omnibus extrinsecis quæ calfaciunt, & frigefaciunt, & siccant, & humectant. Talibus pili capitis dum infantes sunt, subfului sunt, pueris uero subflauī: perfectis autem flauī fiunt, medium quodam modo tenentes inter exacte crispas ac simplices. Nec uero facile caluescunt.

Cerebri calidioris notæ.

Cap. LXIII

Si uero moderato calidius fuerit, uniuersa circa caput rubicundiora ac calidiora erunt, & oculorum uenæ conspicuæ. Pili his genitis cito in capite oriuntur, ubi multo sunt calidiores temperatis, nigri & multi, & crispī ac robusti: Vbi uero non multo, subflauī primum, deinde nigrescunt, & progressu ætatis caluescunt. Superfluitates in palato, & naribus oculisque ac auribus, pauca his sunt ac matura, quum inculpate sani fuerint. Replentur autem capite maxime, quum incauta diæta utuntur, & grauantur à calfacientibus edulijs, potibus, & odoribus, atque omnibus forinsecus accidentibus. Et hoc magis adhuc, si non solum calida ex natura fuerint talia, sed etiam humida.

Frigidioris cerebri notæ.

Cap. LXV

Superfluitates plures circa proprios meatus hi habent. Capilli uero ipsis recti sunt & fului ac stabiles, et multo tempore à natiuitate orientes. tenues ac macri primum. Et cito à frigidis causis læduntur, & iuxta ipsum læsionis tempus destillationibus ac grauedine corripuntur. Neque uero capitis partes ad tactum calidæ sunt, neque rubicundæ apparent. Et oculorum uenæ inconspicuæ sunt. Et ipsi quodam modo somnolentiores.

Siccioris cerebri signa.

Cap. LXVI

Meatuum à superfluitatibus puritas, & sensuum sinceritas, signum sunt talis temperamenti. Vigilantissimi uero sunt, & pilos robustos celerrime ubi nati sunt producant, crispas magis quam rectas. Cito uero canescunt.

Humidioris cerebri notæ.

Cap. LXVII

Pili simplices, & omnino non caluescunt, & sensus caliginosi sunt & superfluitatum copia adest, & somni multi, ac profundi.

Calidioris & humidioris cerebri signa.

Cap. LXVIII

Si uero caliditati affuerit humiditas, utrisque parum excedentibus modum, bonus color adest & calor, & uenæ oculorum magnæ sunt, & superfluitates plures moderate maturæ. Et capilli recti ac subflauī. Et non facile caluescunt. Replentur autem & grauantur capite à calefacientibus ac humectantibus. Quum autem ad plurimam humiditatem ac caliditatem ueniunt, morbosum fit his caput & superfluitatibus redundans, & quod facile ab humectantibus ac calfacientibus læditur. Auster his ualde aduersatur, optime autem in æquilonarijs locis degunt. Neque uero uigilare possunt diutius, & ubi ad somnum seipsos conuerterint, simul sopore præmuntur altiore, & uigilijs, & in

lijs, & in somnijs uarias imaginationes obuersantes habent. Visum item habent caliginosum, et sensus non exactos. Si uero una temperatura fuerit intentata, notæ ipsius magis prædominabuntur.

Calidi ac sicci cerebri notæ.

Cap. LXIX

A' superfluitatibus puri sunt hi, & sensibus sinceri, ac uigilantissimi. Et cito caluescunt: prima capillorum generatio ipsis celerrima est, & probè nutritur. Sunt autem nigro ac crispo capillo præditi, & calidi ad capitis cōtactum, rubicundiq; usq; ad uigoris tempus.

Frigidi ac sicci cerebri signa.

Cap. LXX

Frigidū ac decolor caput efficit hoc temperamentum, quantum in se est. Alterantur enim aliquando partes ipsius, ex humorum in toto corpore temperamento. Tales temperaturę uenas oculorum latentes habent, et à frigidis causis promptè læduntur. Quare etiam inæqualiter sani sunt isti, aliquando quidem capite leuissimi, & meatibus à superfluitatibus, puri: Aliquando uero destillati onibus ac grauedine ob paruas causas corripuntur. Sensus ipsis sunt in iuuetute quidem sinceri, & per omnia inculpabiles. Verum progressu temporis citò contabescunt: Et ut in summa dicam: Omnibus capitis partibus citò senescunt, quare etiam citò caluescunt. Capilli ipsis geniti prodeunt quidem uix, uerum macri ac fului. Progressu temporis frigiditate prædominante siccitati, non caluescunt. Si uero siccitas obtinuerit dominium, parum hi caluescunt.

Frigidi ac humidi cerebri notæ.

Cap. LXXI

Humidæ ac frigidæ cerebri temperaturæ soporosos faciunt & somnolentos, & sensibus utiosos, ac superfluitatibus redundantes, & quibus caput facile frigefiat ac repleatur, & qui destillationibus ac grauedine facile corripiantur. Tales tamen non caluescunt.

Ventris siccioris signa.

Cap. LXXII

Si citò siticulosi fiunt, & modicus ipsis suffecerit potus, & uberiore grauentur, & fluctuationes habuerint superfluitate ipsis innatante, & edulij siccioribus gaudeant.

Ventris calidioris notæ.

Cap. LXXIII

Calidior uenter concoquit melius quàm appetit, & multò magis quæ dura sunt & difficulter alterantur. Quæ enim facile alterantur, in ipso corrumpuntur. Gaudet autem edulij ac potibus calidis, & neq; à frigidis læditur, si modè ratur contigerit ipsorum usus. At uero calidorum forinsecus allabentium diurnam conuersationem ferre non potest.

Humidioris uentris notæ.

Cap. LXXIII

Hi neq; siticulosi fiunt, & ampliorem humorem citra molestiam ferunt, edulijq; humidioribus gaudent.

Frigidioris uentris notæ.

Cap. LXXV

Frigidior natura uenter, bene quidem appetit, non autem bene concoquit, & præsertim edulia quæ ægre alterantur & frigida sunt. Facile itaq; in ipso accedunt, & propterea ructum acidum habet. Et gaudet quidem frigidis, læditur aut facile immodico eorum usu. Atq; ita etiam extrinsecus allabentium ipsi frigidorum diurnam conuersationem ferre nequit. Caterum ex morbo conflatæ in uentre intemperaturæ in hoc differunt à naturalibus, quod contraria concupiscunt, non similia, uelut naturales. Siquidem igitur concoquit probè, temperatus est uenter: Si uero non concoquit, non omnino intemperatus

ratus est. Sed siquidem nidorosos ac fumosos efficit ructus, immodicus est ipse ac feruens calor. Si uero acidus, uice uersa. Sic etiam uentres qui acre concoctilia probe concoquunt, immodicum calorem habent. Si uero ipsa non concoxerint, debilis est ipsorum calor. Considerandum est autem an ob aliquem humorem aliunde in uentrem confluentem, hoc ipsis contingat. Nam ad pituitosos humores, acidi ructus consequuntur: Ad biliosos uero, nidorosi aut uirosi, aut alia quaedam peregrinae qualitates. Communia autem accidentia omnium redundantium in uentre humorum sunt nausea. Verum si quidem in uentris amplitudine humores innatarint, supernatabunt in his quae per uomitum reijcientur. Si uero in ipsis uentris tunicis impacti fuerint, frustra lancinabunt per inanes nauseas, ita ut nihil uomitu reijciatur.

Pulmonis notæ.

Cap. LXXVI

Non solum uenter siticulosos & non siticulosos facit, & frigidi ac calidi potus appetentes: Sed etiam thorax, cor, & pulmo. Verum qui propter horum caliditatem sitiunt, plus inspirant, & amplius ac diutius efflant. Percipiunt autem æstum in thorace, non circa præcordia siue hypochondria græcis appellata, quemadmodum qui propter uentrem siti uexantur. Et sanè ubi bibunt, non statim quiescunt: & frigidus potus magis ipsorum sitim sedat, quam multus calidus. Refrigerat autem ipsos & frigidus aer inspiratus, qui ne alleuiat quidem propter uentrem siticulosos. Sic uero etiam frigefactum thoracem habentes, à frigida inspiratione sensibilibiter læduntur. Et maxima est hæc frigidi pulmonis nota. Quemadmodum autem frigidum aerem inspirantes, palam sentiunt molestiam ac frigiditatem: Sic calidus ipsis est gratus. Sed & pituitosas superfluitates hi cum tussi reijciunt. At pulmonis siccitates superfluitatibus carent, & uocem puram habent. Quemadmodum humiditates, obscuram & raucam uocem efficiunt, et ubi amplius aut acutius loqui uolunt, superfluitates ipsis incurrunt.

Cordis calidioris notæ.

Cap. LXXVII

Magnitudo respirationis, & pulsus uelocitas ac densitas, calidioris cordis notæ sunt. audaciaque ac uelocitas ad actiones obeundas impigra. Si uero amplior fuerit caliditas, ex candescencia et furiosa temeritas. Est & thorax ipsis hirsutius, et maxime pectus, & præcordiorum partes thoraci uiciniores. Vt plurimum uero & totum corpus calidius fit ex calido corde, nisi hepar magnopere reluctetur. Sed & thoracis amplitudo, caliditatis signum est, nisi etiam hic magnopere cerebrum resistat.

Frigidioris cordis notæ.

Cap. LXXVIII

Pulsus sunt moderatis minores, non tamen tardiores necessario, aut rariores. Timidi uero ex natura sunt tales, & socordes, ac minime audaces, & pectus pilis nudum habent.

Siccioris cordis notæ.

Cap. LXXIX

Pulsus sunt duri, & animi concitationem non facilem, sed feram & acre sedabilem tales habent. Et ferme totum corpus his siccius est, nisi hepar reluctetur.

Humidioris cordis signa.

Cap. LXXX

Pulsus molles: & mores ad iram procliuēs, ac facile sedabiles. Et totum corpus humidius, nisi hepar restiterit.

Calidi ac sicci cordis signa.

Cap. LXXXI
Pulsus

Pulsus duri & magni, & ueloces ac densi, & respirationes magnæ ac ueloces & densæ. Et pane multò magis uelocitas ac densitas ipsarum augetur, si thorax ad proportionem cordis responderit. Hi omnium maximè pectore hirsuti sunt, & circa præcordia. Ad actiones uero expediti, & animosi, & tyrannicis moribus præditi, & celeres ad iram, ac pertinaces in ipsa.

Calidi & humidi cordis notæ.

Cap. LXXXII

Si uero humiditas unà cum caliditate dominetur, minus quidem prædictis hi hirsuti sunt, nihil uero minus ad actiones expediti. Verum non adeò ferus est ipsis animus, sed ad iram solum sunt procliuēs. Pulsus uero molles sunt & magni, & ueloces ac densi.

Frigidi & humidi cordis notæ.

Cap. LXXXIII

Pulsus molles sunt. Mores minime audaces, ac timidi, & pigri. Sunt autem hi pectore pilis nudo, & minime furiosi fiunt. Nam neque ad iram procliuēs sunt. De thorace ac toto corpore similiter uelut in superioribus distinguendum est.

Frigidi ac sicci cordis notæ.

Cap. LXXXIII

Pulsus duri & puri: Hi omnium maximè ab ira alieni sunt. Coacti tamen ad irascendum, in ira perseuerant. Sunt autem pectore omnino depiles.

Hepatis calidioris notæ.

Cap. LXXXV

Venæ amplæ, flaua bilis copiosior, Tempore uigoris etiam nigra. Calidior est ipsis sanguis. Et propterea etiam totum corpus, nisi cor resistat, Præcordia & uenter hirsuta sunt.

Frigidioris hepatis notæ.

Cap. LXXXVI

Angustia uenarum, pituita copiosior, & sanguis frigidior, & totius corporis habitus frigidior, nisi à corde calefiat. Præcordia & uenter his pilis nuda sunt.

Siccioris hepatis signa.

Cap. LXXXVII

Sanguis crassus et paucus, uenæ duræ, et uniuersus corporis habitus siccior.

Humidioris hepatis signa.

Cap. LXXXVIII

Sanguis copiosior & humidior. Venæ molliores. Sic & totum corpus, nisi cor reluctetur.

Calidi ac sicci hepatis signa.

Cap. LXXXIX

Præcordia hirsutissima. Sanguis crassior ac paucior. Amara bilis plurima. Iuxta uigorem etiam atra. Venarum amplitudo ac duricies. Sic & totum corpus calidum ac siccum. Nam caliditas ex corde proficiscēs, frigiditatem ex hepate proficiscentem superare potest. Quemadmodum etiam frigiditas cordis, caliditatem hepatis superare potest. At siccitatem hepatis, cor humidius ad contrarium transmutare non potest. Quare manifestum est quod ubi amborum temperatura in idem concurrerint, totum corpus exacte iuxta illas afficitur.

Calidi ac humidi hepatis notæ.

Cap. XC

Minus quidem quàm calidum ac siccum præcordia hirsuta facit. Verum plurimum sanguinem & uenas magnas habent tales. Et habitum humidum ac calidum, nisi cor resistat. Si uero amplius utriusque qualitibus naturalem modum exceßerit, facile capitur morbis, putredinis ac mali succi, atque hoc adhuc magis, si amplius aucta fuerit humiditas, paululum uero caliditas. Si uero uice uersa, modicè aucta fuerit humiditas, plurimum uero caliditas, uitiosi humores minime gignuntur.

Frigidi

Frigidi ac humidī hepatis notæ.

Cap. XC

Depile habet præcordium, sanguinem uero operatur pituitosiorē, unā cum uenarum angustia. Et corpus totum frigidius ac humidius, si non à corde ad contrarium transferatur.

Frigidi ac sicci hepatis notæ.

Cap. XCII

Frigidum ac simul siccum hepar, corpus modici sanguinis, & angustarum uenarum facit, atq; frigidius, Præcordia uero pilis nuda talibus sunt, nisi et hic cor superarit.

Testium temperamenti signa.

Cap. XCIII

Calidum testium temperamentum uenericum est, fecundumq; ac masculorum generatiuum. Et citò hirsutus facit genitales partes, & circumscitas moderate, Frigidum uero uice uersa. Humidum autem multo & liquido semine abundat. Siccum uero pauco & moderate crasso. At calidum et siccum, crassissimi seminis est ac fecundissimum. Et celerrimè ad coitum stimulat animal statim ab initio. Tales etiam celerrimè hirsuti fiunt circa genitales partes, & omnes circumscitas, sursum usque ad umbilicum, deorsum usque ad media fœmora. Concitatū quidem igitur est tale temperamentum ad uenerem, uerū citissimè satiatur, & si cogatur læditur. Si uero humiditas ad caliditatem accedat, minus quidem hirsuti sunt hi, sed plus seminis habent. Non tamen magis alijs appetunt, sed multæ ueneri minore detrimento sufficiunt. Si uero & humiditas & caliditas multum fuerint simul auctæ, ex ueneris abstinentia magis læduntur. At si testes humidī ac frigidi temperamento fuerint, partes circumscitas pilis nudæ sunt. Et tarde rem uenerem agere incipiunt, & neque ad actionem procliuēs sunt. Aquosum autem & tenue est ipsis semen & infecundum ac fœminarum generatiuum. Siccum autem & frigidum temperamentum, prædicto quidem in reliquis simile est. Crassius est autem ipsis semen, & omnino modicum. Porro quicumque totum scrotum cum testiculis laxatum habent, & uelut exolutum, hi uiribus ut plurimum sunt debiliores. Qui uero contractum habent scrotum unā cum testibus, & uelut adstrictum, robustioribus uiribus fermè præditi sunt. Et huius rei signa sumi possunt ex omnibus quadrupedibus animantibus.

Calidorum temperamentorum correctio.

Cap. XCIII

Quandoquidem in calidis intemperaturis biliosa sperfluitas redundat: Considerare in his oportet, utrum subit ipsis bilis cum secessibus ac excrementis alui, aut ad supernum uentrem procedit. Si enim subit, nihil moliri oportet: Si uero ad supernum uentrem fertur, per uomitus euacuare à tepidæ aquæ potu. At si aggre uomant, uinum dulce tepidæ aquæ permixtum bibendum dato, atque sic uoment. Exercendi autem sunt exercitio non ueloci ac concitato, sed tardiore ac molliore. Quidam uero ex uehementer calidis omnino non opus habent exercitijs. Sed sufficit ipsis deambulatio, & balneum, inunctis oleo cum mollibus manibus. Hi etiam post cibum balneis gaudent, & aliqui ipsorum crassifæcti sunt ob talem diætā. Vinum his conuenit aquosum tenue & album. Nam fulua calida sunt, item ualde uetusta: Quare his ualde aduersantur. Attendendum est autem in omnibus qui post cibum lauantur, ne hepar affectū sit: Extremè enim læduntur tales si post cibum lauentur. Qui uero cum siccitate calidi sunt, circa ætatis uigorem maxime opus habet humida diætā ex edulij ac balneis, & concitatorū ac multorū exercitiōrū abstinentia. Quare æstatis tēpore citius lauētur, et post cibū rursus, nisi aliquod ex uiscerib, affectū fuerit, Proderit

Proderit his & frigide potus, si nihil impedierit. At siccoribus temperamētis ualde aduersa uenit. Abstineat item ab ardore, lassitudinibus, uigilijs, curis, & omnibus motibus acutis. Biliosi uero ira perciti exardescunt, & in acutas febres incidunt. Verum excessus quantitatem cōsiderare oportet, & pro portione aucti caloris, augere etiam frigefacientem ac humectantem uictus rationem.

Frigidi intemperamenti medela.

Cap. xcv

Quicumque frigidiores natura sunt, circa siccum uero temperamentum ac humidum moderatē se habent, minus uitiosi sunt ad corporis robur ac sanitatem. Excitare igitur oportet ac corroborare ipsorum caliditatem. In humiditate uero ac siccitate totius diætæ medium eligere.

Humidi intemperamenti correctio.

Cap. xcvi

Humidæ naturæ in puerili ætate fluidis & plenitudinis morbis corripuntur, & insuper putredinis. Opus igitur habent pluribus exercitijs, & exacta in uentre concoctione. Nam cibi qui in hoc corrumpuntur, putredinosorum morborum materia fiunt toti corpori. Quapropter ante cibum hiloti, & naturalibus calidis aquis utentes, magnam opem sentiunt. Scopus enim in ipsis est ipsas corporis partes humidas seruare. Atque hoc commune est omni temperamēto. Nam contrarium, ipsa inquam siccitas, omnium animalium corpora citius ad senectū perducit. Quare siquidē possibile esset semper cōseruare humidum temperamentum corporis, uerus profecto esset sophistæ Philippi sermo, qui obedientem ipsi immortalem fore promisit. proinde diutissime uiuerit, qui minime resiccatur. Quum autem humida diætā superfluitates & humorum multitudinem generet, difficile est congruam tenere proportionem, ut neque morbis corripiantur, neque citò senescant. Quantum igitur ad temperamentum attinet, qui humidissimi sunt diutissime uiuunt. Et sanè etiam plus alijs sani sunt, ubi corpus fuerit corroboratum: quemadmodum etiam robustissimi sunt omnium eandem ætatem habentium, usque ad extremam senectutem. Et propterea laudat hoc temperamentum ab omnibus ferè Medicis ac philosophis, qui corporis elementa exacte cognouerunt. Et quidam solum hoc naturale esse putauerunt. Melius enim alijs progressu temporis euadit, quum ab initio sit deterius. Quare qui tali corpori corrigendo prefectus est, ea quæ desunt ipsi providere debet, per exercitia ante cibum sientia, & balnea ac cibos idoneos. Et per plures excretionem tum per urinas, tum per uentrem contingentes. Nihil autem uetat & apophlegmatismis pituita à capite trahentibus uti, & purgationibus tempestiuis. Et præ omnibus, edulij boni succi, & uini urinam proritantis potus.

Sicci intemperamenti medela.

Cap. xcvi

Balneum siccis corporibus temperaturis omnibus commodissimum est. Temperata autem sit & dulcissima aqua. Et si bis aut ter in die lauentur, magis conferet. Sed & uniuersa diætā humectans sit. A lassitudine uero & curis ac uigilijs abstinendum est.

Calidi ac sicci intemperamenti curatio.

Cap. xcvi

Calidum ac siccum temperamentum uarijs curationibus subiacet. Non tamē inuolucundus est similiter frigefacientium usus. Nam iuxta siccas dispositiones necessarium est, non solum uicinas uentri partes, sed etiam totum corpus gracilius fieri.

Humidi ac calidi intemperamenti medela.

Cap. xcix

Quod si humida itemperatura est cum caliditate, adstringentium eduliorum usus utilis est. Sunt autem hæc austera citra caliditatem. Et sanè etiam frigidus potus ipsis commodus est.

s

Humidi

Humidi ac frigidi intemperamenti sanatio.

Cap. c

Humidi uero cū frigiditate tēperamenti, optimē medelæ sunt omnia acria ac calida. Misceant̃ aut̃ iplis etiā acerba, citra manifestā frigiditatē. Optima itē medela est his modicus potus. Sit aut̃ uinū calidū fortiter & adstringens, ac ualde uetus.

His uero etiā ea quæ forinsecus adhibentur proportionē respondeant. Frigidi ac humidi intēperamenti curatio, frigiditate prædomināte. Ca. ci

At si frigiditas humiditatē superauerit, uitiosæ fiunt tales temperaturæ, & hæc maximē fluidis morbis corripuntur. Prodest aut̃ iplis illuuiēs, & exercitia pura, & ratio uictus attenuans, & ungenta moderatē calefacientia.

QVARTI SERMONIS PRIMAE TETRA-
bibli Aëtij finis.

INDEX EORVM QVAE IN QVINTO AETII
Sermonē habentur.

- Q**uod oportet medicū naturę op-
perum gnarū esse. Caput i
- Quod citra prænotionē morbi, fieri ne-
quit ut probē cures. Cap. ij
- Quæ sint bona signa. Cap. iij
- Quæ sint mala signa. Cap. iiij
- Quæ prima dies totius morbi dicenda
sit. Cap. v
- Principiū morborū trifariā dici. Ca. vi
- Quid est febris. Cap. viij
- Quid est exacerbatio. Cap. viij
- Quid est remissio. Cap. ix
- Remissionem dupliciter dici. Cap. x
- Quod est principiū febrilis accessionis.
Cap. xi
- Augmenti particularis exacerbationis
signa. Cap. xij
- Vigoris particularis exacerbationis si-
gna. Cap. xij
- Declinationis particularis exacerbatio-
nis signa. Cap. xiiij
- Quod est principiū totius morbi. C. xv
- Quod sit augmentū totius morbi. C. xvi
- Vigoris totius morbi cognitio. Ca. xvij
- Declinationis totius morbi cognitio.
Cap. xvij
- Quod declinatio totius morbi in iudica-
tionibus confertim fientibus, sensu
nostro aufugit. Cap. xix
- Quod seruandus æger quatuor tēpora
totius morbi pertransit. Cap. xx
- Vtrum tardius aut citius morbus iudica-
cetur. Cap. xxi
- Quomodo prænoscere oportet, an iudi-
cabitur morbus, aut non, & quando.
Cap. xxij
- Futuræ iam iudicationis signa. C. xxij
- Quomodo prænoscere oportet, bonæ
nauē an mala iudicatio futura sit. Ca.
(xxiiij)
- Qui sint boni iudicatorij dies (xxiiij)
& qui mali. Cap. xxv
- In quib. ambigua est dies principij mor-
bi, & nulla præiudicatiua facta, de re
pente contigit iudicatio, quomodo
ambigua inuenire oportet. Ca. xxvi
- De notis expulsiis. Cap. xxvij
- De urinarum notis, & primum quæ sit
naturalis. Cap. xxvij
- Qualis urina optima in ægrotis. Cap.
put xxix
- Quod non omnis alba subsidencia bonum
significat. Cap. xxx
- Quid indicet tenuis & pallida urina.
Cap. xxxi
- Quid indicet tenuis & fulua. Ca. xxxij
- Quid indicet rufa urina. Cap. xxxij
- Vrina tenuis micta, & postea turbata.
Cap. xxxiiij
- Vrina crassa micta, & crassa manens.
Cap. xxxv
- Vrina crassa micta, & postea desidens.
Cap. xxxvi
- Vrina tenuis micta, & talis manens.
Cap. xxxvij
- Differentiæ urinarū oleosarū, & quid
significent. Cap. xxxviij
- Quid

- Quid significant eruinæ subsidentia. Cap. xxxix
 Quid indicent surfuraceæ subsidentia. Cap. xl
 Quid indicet lamineæ subsidetie. C. xli
 Quid indicet polentaceum in urinis. Cap. xlii
 Quid indicet graueolēs urina. Ca. xliii
 Urina nigra quid significet. Cap. xliii
 De egestionum notis. Cap. xlv
 De egestionibus iudicatorijs. Cap. xlv
 De uomitus prænotione ac significa-
 tione. Cap. xlvii
 De eruptionis sanguinis ex narib. præ-
 notione ac significatione. Cap. xlvii
 Quod & per hæmorrhoidas, & mulie-
 bres purgationes sæpe soluitur mor-
 bus. Cap. xlix
 De significatione ex sudoribus. Cap. l
 Abscessu signa iudicatoria. Cap. li
 De sputorum significatione. Cap. lii
 Signa perfecte ac fideliter soluti morbi.
 Cap. liii
 Signa morbi nō perfecte soluti. Ca. liii
 Prænotio diei qua moriturus est æger.
 Cap. lv
 Quod etiā horā mortis egri prænoscere
 possit doctus Medicus Cap. lvi
 In acutis morbis mortem non esse præ-
 dicendum. Cap. lvii
 Febrium diuisio, & de diarijs febribus
 Cap. lviii
 De diarijs ex lassitudine febrib. Ca. lix
 De febrientibus ex uigilijs, & cura, aut
 tristitia, aut ira. Cap. lx
 De febrientibus ex ardore. Cap. lxi
 De febrientibus ex frigore. Cap. lxii
 De febrientibus ex grauedine & destil-
 latione. Cap. lxiii
 De febribus ex cutis densitate. Ca. lxiii
 De febribus ex fame. Cap. lxv
 Diæta communis omnium diariarum
 febrium. Cap. lxvi
 De febrientibus ex inguinis inflamma-
 tione. Cap. lxvii
 De diarijs febrib. ex cruditate obortis.
 Curatio diariarū febriū multarū dierū,
 quarū aliquæ ex mutatione diariarū
 generantur, ob cutis obturationem.
 Cap. lxix
 De febribus continentibus, siue syno-
 chis. Cap. lxx
 De uenæ sectione. Cap. lxxi
 De frigida aquæ exhibitione. Ca. lxxii
 Diæta in febribus cōtinentib. Ca. lxxiii
 Vniuersalis doctrina de febribus putre-
 dinosis. Cap. lxxiii
 De febribus putridis. Cap. lxxv
 Cōmunis diæta omniū febriū putrida-
 rum. Cap. lxxvi
 De febribus continuis. Cap. lxxvii
 Cura febris ardētis. Philum. Ca. lxxviii
 Tertianæ exquisitæ dinotio. Cap. lxxix
 Tertianæ exquisitæ curatio. Cap. lxxx
 Tertianæ spuria curatio. Cap. lxxxi
 De hemitritæo, hoc est, semitertiana.
 Cap. lxxxii
 Quartanæ exquisitæ dinotio. Ca. lxxxiii
 Quartanæ curatio. Cap. lxxxiii
 Quotidianæ febris dinotio. Cap. lxxxv
 Quotidianæ febris curatio. Cap. lxxxvi
 De Epialis febribus. Cap. lxxxvii
 Cōmunia auxiliā febrium per circuitū
 repetentium. Cap. lxxxviii
 De ignis sacri circa uiscera affectioni-
 bus. Cap. lxxxix
 De colliquatione. Cap. xc
 De febrib. quæ in calidis ac siccis tēpe-
 raturis fiunt, citra inflammationē ac pu-
 trefactionem. Cap. xci
 De febribus heclicis ac tabidis. Ca. xcii
 Hecticarum febrium curatio. Ca. xcii
 De popularib. passim uagantibus, &
 pestilentibus morbis. Cap. xciii
 De peste Ruffi. Cap. xcvi
 De his qui crudorū humorū multitudi-
 nem, animo linquunt. Cap. xcvi
 De his qui animo cōcidunt, ob flauam
 bilem os uentris lædentē. Cap. xcvi
 De his qui ob tennes humores animo
 concidunt. Cap. xcvi
 De alijs animi deliquij causis. Cap. xcix
 De dolore animi deliquium inducen-
 te. Cap. c
 De animi deliquio propriē dicto. Ca. ci
 De his qui ob uētris profluuiū, aut san-
 guinis

- guinis eruptionē, aut immodici sudoris euacuationē animo linquunt. C. cii
De his qui ob humorum copiam, animo linquuntur. Cap. cii
De his qui ob quandā uteri affectionē, animo linquuntur. Cap. cii
Ad eos qui ob stomachi debilitatē, animo linquuntur. Cap. cv
De his qui ob uitiosos humores, os uentris rodētes, animo linquunt. Ca. cvi
De his qui ob pituitā in stomacho collectam animo linquuntur. Cap. cvii
De animi deliquio ob fortē frigiditatē
De animi deliquio, ob multam caliditatem. Cap. cix
De animi deliquio, ob inflammationē, aut malignam febrem. Cap. cx
De animi deliquio ob siccitatē. Cap. cxi
De animi deliquio ob principalis membri obturationem. Cap. cxii
De animi deliquio ob repentinam euacuationem. Cap. cxii
De animi deliquio propter affectus. Cap. cxiii
De capitis dolore in febribus. Cap. cxv
De uigiliis in febribus. Cap. cxvi
De graui sopore. Cap. cxvii
Quomodo linguae asperitas in febribus curanda sit. Cap. cxviii
Quomodo sitis curanda sit. Cap. cxix
De aurium dolore in febribus. Ca. cxx
Auris suppuratæ curatio. Cap. cxxi
De lippitudine in febribus. Cap. cxxii
De oculorum obscuratione. Ca. cxxiii
Fluxus sanguinis narium in febribus curatio. Cap. cxxiii
Vesicæ & urinae difficultatis in febribus curatio. Cap. cxxv
Lumborum doloris curatio. Ca. cxxvi
Ulcerationis circa os sacrum in febribus curatio. Cap. cxxvii
Ulcerationis circa scrotum & anum, in febribus curatio. Cap. cxxviii
Pustularum in febribus curatio. Ca. cxxix
De tremoribus in febribus. Cap. cxxx
De conuulsionibus in febribus. Cap. cxxxi
De iucundis ac comodis potionibus in febribus. Cap. cxxxii
De potione pharmaci ex capitibus pauperis. Cap. cxxxiii
Omphacomelitis præparatio. Caput
Mellis rosacei præparatio. Cap. cxxxv
Hydrosoroti præparatio. Cap. cxxxvi
Apomelitis præparatio. Cap. cxxxvii
Hydromeli & Crustuminati præparatio. Cap. cxxxviii
Cydonati præparatio. Cap. cxxxix
Aceti nulli præparatio. Cap. cxl

AETII MEDICI GRAECI CONTRA

CTAB EX VETERIBVS MEDICINAE, TETRABIBLI, siue Quaternionis secundæ, Sermo Primus, & ex ordine Quintus, Per IANVM CORNARIVM Medicum Physicum, latine conscriptus.

DE FEBRIVM COGNITIONE AC CVRATIONE.



ALVBRIS diætæ præcepta ad conseruandā sanitatē cōmoda ac necessaria, iam antea præscripta sunt, didicisti itaq; ex ipsis, qualis & cuius modi diætæ usū, tum ipse quantū eius fieri posset, maxime sanus esses, tum tuæ curæ commissis singulis cōuenientē sanitatē cōseruares. Quandoquidē uero clām nobis ipsis sæpe contingit, ut negligentiore diætā utamur, aut ut propter aliquas actionū circūstantias, aut ob ammentis nos aëris uiolentiā, læsi aliquando morbosis structuris acutarū aut diuturnarum affectionum corripiamur. Præstat etiam de ipsis morbis tractare, & ab uniuersalibus febrilium morborum notis auspicari, tum quod hi magis abundant omnibus ætatibus communes, tum quod non periculo uacant, turbantq; actus

ac tumultum repentinum inducunt, ob symptomatum accidentium copiam.

Quod oportet Medicum naturæ operū gnarum esse. Cap. I

Quare circa prognosticum Hippocratis & alios eiusdem libros, Medicū exercitatum esse oportet, & naturæ opera nosse, Naturæ enim sunt morborū medici. Adiuuare igitur naturā oportet ad salutem decertanti aduersus morbum. Sic enim natura, ubi Medicū ea quæ oportet facientē auxiliariū accepit, & ipsum ægrotum obediētē, & nihil in diætā delinquentē, morbū faciliē superarit. Oportet autē cooperari etiā ministros, & extrinseca, quo nihil his quæ rectē sūt resistat.

Quod citra prænotionē morbi fieri nequit ut probē cures. Ca. II

Propositum est autem nobis partem eam quæ de signis ac notis morborum tractat, prius exponere. Nam citra hoc ut prænoscas in quid desinet morbus, fieri non potest ut modus diætæ tibi probē suppetat: & præsertim in acutis, & citum periculum inducentibus morbis.

Quæ sint bona signa.

Cap. III

Facies bonis signis prædita, poteris enim uel ex sola facie constantē ac firmam prænotionē sumere, priusquā egrū contingas: dico autē ex sensibus in ipsa, uisus, auditus, olfactus. Et ad hæc ex respiratione, sine qua uiuere non datur, & quæ indicat nobis dispositionē cordis. Adest autem & loquendi instrumentū in facie, ipsa lingua, quæ ostendit nobis rationalis animæ partis robur ac debilitatē. Bonum signum est & decubitus decorus, prout maximē consueuit etiā in sanitate se facile conuētere. Bonum signum est & totū corpus ad portandū facile esse, & æqualiter ac leniter calidū, & sitis quantū eius fieri potest exors. Item sanā esse mentē, & bene se habere ad ea quæ offeruntur. Bonū signum est & facilis spiratio, & ordinatus pulsuum motus. Ex his enim & quæ adhuc referentur, cognoscemus tum robur, tum debilitatem, trium animæ actionū, Nam sanam esse mentem, & nō defluere corpus in decubitu ad pedes, cerebrū per omnia sanum esse indicat. Faciei uero floriditas, & facilis spiratio, & pulsus ordinatus, cor sanum esse arguunt. Quandoque enim florida sit facies cum difficili spiratione, uelut in peripneumonici fieri solet. Ac sitis exortem esse, & bene se habere ad ea quæ offeruntur, naturalem facultatem in hepate & toto corpore sanam esse indicat. Bonum signū sunt & somni boni, & sudores per totum corpus temperati & æquales ac moderati, & oportuno tempore apparentes. Bonum item signum est præcordia doloris expertia ac mollia esse. Et ad hæc secessus alui & urinarum ac spirituum expeditos esse, & bona concoctionis signa.

Quæ sint mala signa.

Cap. IIII

Totius faciei ac temporū collapsio, oculi fixi ac caui, lachrymæ inuoluntariæ, & alba oculorū in somnis apparentia, si non aduersus fuit sic dormire, & defluere corpus ad pedes, & præter morem pronum iacere, dentibus frendere, totum corpus inæqualiter cal fieri ac friges fieri, & ad portandum difficile esse. Item sitis intolerabilis, & ardor internarum partium externis frigidis existentibus, excessus mentis & uelut delirium quoddam aut stupiditas, sopor profundior, auersio totius appetitus. Frigiditas oboriens ex inflammatione thoracis ac costarū, difficulter spirare, & frigidū respirare, & foras multū exspirare, intrā uero parū inspirare: hoc enim iam futurā cordis mortificationē indicat, quemadmodū etiā pulsus interceptū esse, aut malē ferire. Faciliē enim spirationē inquit Hippocrates, putare oportet ualde magnā uim habere ad salutē, in omnibus acutis morbis, qui cum febre fiunt, & in quatuordecim diebus iudicant. Malum signū sunt & uigiliae cōcomitantes, aut etiam somni fientes quidē, uerum turbati. Sudores frigidi

§ 3 & inæ-

& inæquales, & non per totum corpus, & aliquando milij figuram præ se ferentes ac uiscosi, Frigiditatem enim fortem hæc indicant, Et non in debito tempore apparere sudores malum est, & sudores statim febrim sequi. Item suppressio recrementorū alui, & maximè uesicæ, & aliarum excretionum. Imò etiam si hæc procedāt, & alicuius perniciosi notas ferant, & præsertim urinæ graueolentes ac crassæ & nigrae: Tales enim in acutis ac malignis morbis omnino periculū significānt. Præcordiorū distentio, & principalitū partium inflammationes maximæ, cerebri inquam ac cordis & pulmonis, & membranæ costas succingentis, hepatisq; ac uentris: ubi enim aliquis ex talibus morbis adest, ualde mala signa apparentia periculosa sunt. Oportet autem uniuscuiusq; signi uim perdiscere, Vnum enim aliquando signum forte ac fidum, plura signa infida ac debilia uincit.

Quæ prima dies totius morbi dicenda est.

Cap. v

Principium totius morbi dicere oportet, illud tempus quando homo febrile inceptit adeò manifestè, ut continuitatem corporis sibi solutam esse putet, & non amplius in publicum prodire ualeat, & consueta uitæ munia obire, & propterea decubitus opus habuit. Non enim idem est displicentiā habere & febrile. Qui enim caput dolet, aut displicentiā habet, & corpore grauatus est, potest ferè in principijs consueta facere, donec præualens ipsi morbus uires eius deiciat.

Principium morborum trifariam dici.

Cap. vi

Principium propriè dicitur impartibilis illa ac indiuisibilis primi morbi inceptus inuasio, in qua uictus homo decubuit. Principium etiam dicitur quod per dilatationem nominant, quod usq; ad tertium diem extenditur. Principiū quoque dicitur proprium ac necessarium, quod uelut partem totius morbi, principium nominamus: quod sanè non dierum numero cognoscitur, sed exacerbationum qualitate, & concomitantium accidentium lenitate. Nam in augmento & morborum & symptomatum accidentium incrementum fit. Exacerbationes enim anticipant, & longius extenduntur in augmento, & symptomata grauiora fiunt. Principium igitur totius morbi dicitur, donec apparuerint manifesta & bona concoctionis signa. Si quidem igitur principium breujs temporis fuerit, morbum uelociter soluendū ostendit, uelut etiam Hippocrati uidetur. In pleuritico inquit, si sputum statim appareat, in principio quidem breujs fit: Si uero posterius appareat, prolongatur: morbus ipse uidelicet. Qua igitur die apparuerint in superfluitatibus quæ excernuntur manifestæ concoctionis signa, in ea dicimus principium totius morbi cessasse, & incipere ipsum augmentum. Concoctionis enim signa nunquam malè apparent.

Quid est febris.

Cap. vii

Febris est calor præter naturā, cordis & arteriarū, uitalem firmitatē lædens, ex profundo emergens, & acris ac mordax ad tactum allabens, præsertim circa thoracem, & ubi arteriæ magnæ sitæ sunt. Verū ad talem calorem inæqualitas quædam & inordinatus motus pulsibus accedit iuxta ipsam febris speciem.

Quid est exacerbatio.

Cap. viii

Exacerbatio, quam paroxysmū Græci uocant, est motus morbi particularis, à remissione ad deterius. Particularis autē motus dictus est, ad discretionē uniuersalis morborū augmenti.

Quid est remissio.

Cap. ix

Remissio est particularis exacerbationis temporaria quies symptomatum corpori coincidentium.

Remissionē dupliciter dici, comprehendit enim & interuallum.

Ca. x

Ex remissionib; ea quæ sincera est, cognoscit ex quiete concomitantium ad exacerbationem.

cerbationem symptomatū circumscripta, Et propterea dicitur Intervallū, quemadmodum in his qui per circuitum quendam exacerbant, uelut tertiana, quartana, quotidiana, capitis dolor, morbus comitialis, padagra, & cōsimiles. Quæ uero insincera est & nō pura, deprehenditur ex symptomatū diminutione, quemadmodū in cōtinuis maximē febribus cōtingit. Nam in his antē absolutam morbi solutionem, non cōtingit pura remissio: Declinationē enim prioris posterior exacerbatio excipit.

Quod est principium febrilis accessionis. Cap. XI

Principium febrilis exacerbationis, fermē est contractio extremarum partium omnium, & maximē nasi. Et quandoq; etiā frigiditas totius corporis. Et ali quando tussicula parum irritans, unā cum frigidityte irruens. Item oscitatio & partium corporis extensio, aut nausea, aut uomitus, aut animi deliquium. Et capitis dolor, aut alterius cuiusdam partis, & in profundum somnum delatio. Pulsus insuper paruus & contractus, tardē feriens ac relidens: Et symptomatum ad præsentem morbum concomitantium irritatio.

Augmenti particularis exacerbationis signa.

Cap. XII

Iuxta augmentum exacerbationis, aliorum quidem accidentium incrementum & unio accedit, contractio uero & frigiditas cessant. Et pulsus inæqualis emicat. Et corpus calescit quidem, uerum non exactē.

Vigoris particularis exacerbationis signa.

Cap. XIII

Iuxta uigorem exacerbationis, calor æqualiter diffunditur, & particulatim distribuitur, per totum corpus. Et pulsus totam augmenti magnitudinem accipientes, ad subiectæ materiæ proportionem extenduntur, itemq; reliqua exacerbationis accidentia. Tunc uero iam tempus est ægroto potum dare.

Declinationis particularis exacerbationis signa.

Cap. XIII

Declinatio est ubi incipiunt aliqua, aut omnia prædicta accidentia minui. Et pulsus ad ordinatum quodammodo motum deueniunt. Aliquando uero & humores exudant. Et calor nimirum contabescit. Quandoq; etiā somni boni cōcurrunt, si longum tempus inter accessiones futurum est, uelut in puris remissionibus fieri solet. Contingit enim in quibusdam morbis, ut exacerbatio posterior prioris declinationem excipiat, uelut in febribus cōtinuis apparet.

Quod est principium totius morbi.

Cap. XV

Iam antea dictum est, quod principium totius morbi illud tempus dicimus, quādo per morbi uiolentiā uires hominis uictæ, principū decubitus factæ sunt.

Quod sit augmentum totius morbi.

Cap. XVI

Augmentū totius morbi est, quū exacerbationes consuetam horam anteuertunt, & longiores ac maligniores, & cū pluribus ac grauioribus accidentibus factæ fuerint.

Vigoris totius morbi cognitio.

Cap. XVII

Quum exacerbationes statim acceperint, & similiter per omnia consequenter contigerint, & cōcomitantia symptomata neq; detraxerint, neq; addiderint, tunc iam in uigore esse morbus dicatur. Vigor enim uehementior morbi totius pars est, quando etiā bonæ iudicationes uel maximē fieri solent.

Declinationis totius morbi dinotio.

Cap. XVIII

In declinatione totius morbi, cōtraria augmento fiunt. Remoratur enim exacerbatio consuetæ horæ impetū, & modico tempore occupat. Et symptomata leniora ac simpliciora fiūt, & bona tolerantia ac remissio adest per omnia.

Quod declinatio totius morbi in iudicationibus confertim fientibus,

Cap. XIX

sensum nostrum effugit. Quicunq; morbi in uigore cōfertim iudicantur, & perfectam solutionem recipiunt,

s 4

cupiunt, eorum declinatio difficulter comprehendí potest, ut neq; sensui manifesta fiat. Imò neq; commodum est de ipsa inquirere. Satis enim est cognoscere quod morbus fideliter, securè, ac perfectè solutus est.

Quod seruandus æger quatuor totius morbi tempora pertransit.

Cap. xx

Si quidem igitur sine periculo fuerit morbus, acutèq; moueatur, & ad hæc bona & commoda signa affuerint ægroto, quatuor morbi tempora citò pertansit, & manifestum est quod etiam seruabitur. Si uero his contraria affuerint, ante uigorem plerumq; morietur.

Utrum tardius aut citius morbus iudicatur.

Cap. xxi

Tardius ne an citius iudicabitur morbus, ex morbi magnitudine, & motus uehementia, manifestum fit. Nam magni morbi citò mouentur. Quod uero citò mouetur, etiam citò iudicatur.

Quomodo prænoscere oportet, an iudicabitur morbus, aut non, & quando.

Cap. xxii

Magni morbi qui & citò & uehementer mouentur, omnino iudicantur. Parui uero & obscuriores, & qui debiliter mouentur, si diurni sunt, soluuntur tantum paulatim citra iudicationem. Raro uero & ad abscessum tales procedunt. Tertiæ enim etiam si intermittat, tamen quia citò & uehementer mouetur, iudicatur. Quartana uero, quia diurna est, paulatim ferè soluitur.

Item omnes qui pigrius mouentur. Naturam itaque morbi inspicere oportet, an biliosus sit, aut pituitosus, aut atrabiliaris. Deinde anni tempus, & ægroti ætatem, & temperamentum, ac studium, & prægressam uictus rationem. Imò & regionem, & statum ambientis nos aëris. Postea uero considerare exacerbationum circuitus, uelut antea dictum est; & an intermittant, siue non, uelut in continuis ac continentibus febribus uidere datur. Si enim festinauerint, & semper anticipauerint conuenientem horam, & uehementiores facti fuerint, & per tertiam occurrerint, breui iudicationem futuram indicant. Si uero pigre moueantur, & eadem hora irruerint, & quotidie contingerint, tardam fore iudicationem significant. Considerandæ insuper sunt & superfluitatum concoctiones, an bonæ sint, & an in diebus indicatiuis fiant, uel robustis. Si enim morbus statim ab initio ostenderit omnia signa extra periculum, in primo quaternario iudicationem promittit. Si uero in quarta præsignificarit, septimam non transgreditur. Leuissimæ enim febres & in signis securissimis fientes, quarta die quiescunt, aut citius, inquit Hippocrates. Maligniores uero & in signis grauissimis fientes, quarta die occidunt, aut etiam citius.

Futura iam iudicationis signa.

Cap. xxiii

Vbi iam affutura est iudicatio, non parua turbatio in ægri corpore præcedit, & præsertim in nocte iudicatoriam exacerbationem præcedente. Quibus enim iudicatio futura est, his nox grauis est ante exacerbationem, inquit Hippocrates. Grauitates enim & uigiliæ, & delyria, & graues sopores, & spirandi difficultates, & uertigines, & sensus obtusi, & dolores capitis, colli, stomachi, ac multarum aliarum partium adsunt. In quibusdam uero aurium sonitus. Et splendores oculis obuersantur. Et lachrymæ inuitæ fluunt. Et urina supprimitur, & labium concutitur, & alia quæcunq; pars tremula efficitur. Et contingit obliuio ac ignorantia præsentium. Et uehemens rigor aliquando incidit, aut ardor antea non factus, & in summa exacerbatio antè solitā horā irrupit. Et multus sopor

ac sitis intolerabilis sequitur, & uociferantur ac exiliunt uelut consternati. Et decubitus figuram seruare non possunt. Et timor impendet uidentibus. At imperitus medicus uidens symptomatum accidentium tempestatem perturbatur, & cum familiaribus ægri calamitatem deplorat, & per condolentiam occultat imperitiam. Verum generosi medici est non turbari, neque ignorare quod euenturum est. Sed ex præsentibus prænoscere, non solum quod iudicatio futura est, sed etiam qualis futura est.

Quomodo prænoscere oportet bonā ne an mala iudicatio futura sit.

Cap. XXIIII

Optimam iudicationem, quam etiam solam simpliciter iudicationem nominamus, non per coniecturam, uelut aliās, sed cōstanter quis prænoscere poterit. Omnia enim signa in talibus morbis statim à principio citra periculū apparent. Quemadmodum rursus in morituris, ut plurimum ab initio omnia mala apparent. Primum omnium igitur considerare oportet ægri uires. Deinde concoctiones ex urinis ac secessibus & sputis. Nullum enim unquā perire uidimus, ex his qui ob præostensam bonam concoctionem iudicati sunt. Tertio quod in uigore & totius morbi, et particularis exacerbationis, & in die testabili iudicatio contingit. Consequenter autem & speciem morbi, & mores. Speciem dico, tertianam, aut quartanam, aut quotidianam, aut aliquam aliam. Mores autem, an sint moderati & leues, aut mali ac maligni. Et mores præcipuè indicabunt tibi, an seruabitur, aut morietur. Et in affectionibus quidem thoracis ac pulmonis attendere oportet sputis, neque uero urinarum inspectio negligenda est. Considerandæ uero sunt etiam egestionis. At in febrientibus absque inflammatione alicuius uisceris, urinis maximè mentem attendere oportet. Cæterum in pernicioso morbo prima ac maximum signum est futuræ mortis citra iudicationem extrema uirium debilitas: Non enim excitantur ad pugnam. Secundum si nullum omnino fuerit ac ne minimum quidem concoctionis signum. Imò etiam si præmanifesta fuerit iudicatio, futuram iudicationem simul præmanifestat, & malam fore iudicat. Ad hæc uidendum est an magnus sit ac malignus morbus, non tamen citò moueatur. Magnum autem dico peripneumoniam pulmonis abscessum, semitertianam, febrem ardentem, & consimiles. Velut uerbī causa, contingat ut uideatur in quarta die primum in urinis nubecula nigra, aut simile quiddam in medio ipsarum pendens, aut subsidentia nigra. Sint autem & omnia accidentia perniciofa, morietur quidem talis homo. Verum si quidem celeriter moueatur morbus, in sexta: si uero tardè, in septima.

Qui sint boni iudicatorij dies, & qui mali.

Cap. XXV

Septima ab initio morbi dies omnium maximè semper perfectè soluit ac fideliter, & bene ac citra periculum, & manifestè ac signanter. Septimæ uero secundum decima quarta maximè imitatur. Propinqua autem ipsis est nona & undecima. Et huic propinqua est decima septima, & quinta. Post has quarta. Et post hanc tertia, & uicesima. Sexta uero sæpe quidem iudicat, uerum plures iudicationes malas, aut etiam lethales inducit, aut certè non perfectas neque fideles. Reuertuntur enim morbi qui in sexta die iudicantur, etiam si soluti esse putentur. Si uero etiam perfecta iudicatio, id quod rarum est in sexta contingat, tamen cum periculosis ac grauibz accidentibus continuat. Proinde sextæ naturam nulla alia dies imitata est. Si uero aliquando in octauam diem aut decimam solutio morbi acruata exciderit, assimilatur quoque

quodammodo ei quæ sit in sexta: Raro enim in his morbus soluitur, & neque fide liter, neque bene neque perfecte: Sed & obscure ac minimè signāter. At medio quodam modo inter primas bonas relatas, & inter postea malas, Tertiadecima locata est, neque similiter reprobanda uelut malæ, neque tamen similis bonis existens.

Quod si bona iudicatio futura est, oportet omnia prius iudicata esse, in urinis præsertim, imò etiam in alijs signis. Tertia igitur & quarta ac quinta dies statim ab initio præiudicantur. Quarta uero septimam præiudicat, & septima undecimam. Undecima uero decimam quartam. Decima quarta decimam septimam, decima septima uigesimalam. Terminus porro acutorum morborum est decima quarta. Quare si hanc transgressus fuerit morbus, ab acutis excidit.

In quibus ambigua est dies principij morbi, & nulla præiudicatiua facta derepente contigit iudicatio, quomodo ambigua inuenire oportet.

In quibus nulla præiudicatiua die facta, derepente contigit iudicatio, & in quibus non exactè cognoscimus principium morbi, in his relpicenda sunt signa, & ambiguum reperietur, si ad exacerbationum proportionem, & ad diærum naturam, mentem aduerterimus. Si enim imparibus diebus facta fuerit exacerbatio in intermittentibus, aut seipsa uehementior facta fuerit in continuis febribus, æstima præsentem iudicationem imparis diei propriam esse. Si uero in paribus exacerbetur, illarum proprie iudicatio erit. Nam ad uehementiores exacerbationes omnino sequuntur iudicationes. Cæterum ad ipsam diærum naturam sic animum advertere oportet: si ambiguum sit utrum nonæ aut decimæ diei iudicatio sit. Si enim accidentia omnia mitiora fuerint, & citra periculum ac bona facta fuerit iudicatio, & consequuta fuerit ad iudicationem bona tolerantia, nonam potius esse iudicatoriam diem dicere oportet. Si uero periculosa & mala facta fuerit iudicatio, & cum grauibz accidentibus, & grauius tolerantia post iudicationem sequatur, decimam diem magis iudicatoriam fuisse dicendum est.

De notis ex pulsibus.

Cap. xxvii

Quum iam expectatur iudicatio, ante omnia pulsus tangere oportet. Nam altus pulsus, quemadmodum etiam uehemens, omnis bonæ iudicationis nota est, & constans signum iam adesse morbi iudicationem. Si uero uehementer ac fortiter ferit digitos, & cum hoc etiam magnus fuerit, & ad distentionem magis quàm ad contractionem festinarit, motus externi potius signum est. Externum autem motum dico, sanguinis eruptionem ac sudores. Internum uero, uentris exturbationem ac uomitus. Si quidem igitur magnus fuerit pulsus, & undosus, & simul mollescat, unà cum hoc quod etiam ipsum arteriæ corpus humectum est, & ad distentionem magis festinat: per sudorem futuram iudicationem sperare oportet. Si uero magnus simpliciter fuerit ac uehemens, & magis ad distentionem quàm ad contractionem festinarit, sanguinis eruptionem per nares fore significat, ubi uidelicet simul testimoniū præbuerint signa in sanguinis eruptione referenda. Si uero uehemens quidem fuerit, non autem magnus, & durior seipso factus fuerit ac inæqualis, & ad contractionem magis festinarit, inclinatione iam ad intestina facta, per uentrem iudicationem facturam expectare oportet.

De Vrinarum notis, & primo quæ sit naturalis. Cap. xxviii

In febrilibus maximè morbis, notæ ex urinis commodissimæ sunt. Quandoquidem uero quicquid ex præter naturam ex naturalibus inuenitur: à naturalibus

ralibus initiū faciamus. Urina igitur optima est in sanis ac optimo habitu præditis hominibus, subfulua aut subflaua, & moderatè crassa, & talis manens colore, qualis micta fuit, & leuem ac albam & æqualem subsidentiam habens omni tempore, copiam uero pro potus ratione. At in fœminis naturalem urinam colore albiorem uirili esse conuenit, & subsidentiam habere ampliorem. In puerili uero ætate, multum crassam subsidentiam habere oportet, propter puerorū uoracitatem, & inordinatos ac intempestiuos motus. Leuem autem subsidentiam Hippocrates uocat, coherentem ac indiuisam indicare uolens. Aequalem uero dicit, ut per totum semper similis mingatur, & non hodie quidem concocta, cras uero cruda: & ut neq; subsidentiam, aut totam diffusionem inæqualem habeat. Proinde in naturali urina quærimus colorem, & diffusionis compagem, & quæ in ipsa diffusionē obiter feruntur, uelut est nubecula, aut simile quiddam in medio pendens, & subsidentia siue residentia quæ fundum occupat. Manifestum igitur est quod urina in aliquo ex istis mutata, cruditas in uenis indicat.

Qualis urina optima est in ægrotis.

Cap. xxix

Optima igitur est urina in ægrotis quæ similima est sanis, subpallida aut subflaua, albam ac leuem & æqualem subsidentiam habens. Defectuosior est, quæ id quod in medio pendet album ac leue & æquale habet. Crudior autem adhuc hæc est, quæ nubeculam talem habet. In qua enim flatus est in profundo crassus ac crudus, siquidem paucus fuerit, permittit materiam ad fundum uasis deferri, diuidens autem ipsam, uniri non permittit. Si uero redundauerit crudus in profundo flatus, eleuat subsidentiam ad medium diffusionis urinæ, & facit id quod in medio pendet. Si uero adhuc amplior fuerit crudus in profundo flatus, eleuat subsidentiam, & ad supernam superficiem diffusi urinæ liquoris attollit. In quantū igitur flatus diuidere ac elauere ualet ipsam subsidentiam, in tantum crudiores urinam putes. Si uero neque subsidentiam, neque quid in medio pendens, neque nubeculam habuerit urina, nosse oportet quod natura nondum humorem concoxit. Si uero aliquando habet subsidentiam, aut illud in medio pendens, aut nubem, aliquando uero non: Pugnam indicat naturæ aduersus morbum, atque hinc modò cruda est, modò non. At uero in tertianis exquisitis & in diarijs febribus, nubecula sola, aut illud in medio pendens, ad morbi solutionem sufficit. Aliquando uero etiam urinam solum boni coloris factam esse.

Quod non omnis alba subsidentia bonum significat.

Cap. xxx

Sæpe uero albus color eius quod in urinæ fufura siue diffusionē fertur, idiotas decipit, ut subsidentiam bonam putent quæ bona non est. Continget enim crudum ac album humorem unā cum urina excretum subsidere, & bonæ subsidentię imaginationem exhibere. Quandoque uero hepate aut rethibus affectis, pus excernitur cum urina, & subsidens decipit artificem. Verum primum distinguendum est, an homo antea affectos habuerit rethines, aut hepar, aut aliam quandam partem per urinam expurgari solitam. Deinde etiam graueolens reperitur urina pus habens. Crudus uero humor à bona subsidentia distinguitur, per inæqualem subsidentis substantiam siue compagem. Non enim coherens sibi ipsi manet, sed in paruas uelut arenulas diuiditur. Et omnino non leuis est, quemadmodum uera subsidentia. In bonis igitur urinis, primum supernè apparet nubes, Deinde subdescendens facit

id quod in medio pendet. In fine uero subsidens in fundo uasis, nimirum ubi perfectè fuerit cōcocta. In crudis uero humoribus, statim ab initio ad fundum uasis multa copia secedit, unā cum hoc quod mali coloris est tota fusura. Postea uero etiam paulatim concoctus ac attenuatus, circa medium fusuræ urinæ conspicitur, & facit id quod in medio pendet. Quum autem amplius attenuatus fuerit ac concoctus, in superficie diffusionis urinæ consistit, & nubeculam facit, decipitque idiotas ut putent morbum ad deterius procedere.

Quid indicet tenuis & pallida urina.

Cap. xxxxi

Tenuis & pallida urina, cruda quidem est substantiæ compage, concocta aut mediocriter colore. Debilitatem autem indicat etiam hæc naturæ, quod colore quidem concoxit, uelut quæ res facilis sit; non autem etiam compage, propter difficultatem. Si uero per multum tempus hæc fertur, periculum est ne sufficere possit homo, donec concoquatur morbus. Nam quæ ualde tenuis est, mala est. Indicat enim cruditatem, in quantum calorem id quod tenuius est depascere oportet.

Quid indicet tenuis & fulua.

Cap. xxxxi

At tenuis in substantiæ compage urina, & fulua colore, melior est quam pallida. Et tamen reprehensione non caret propter substantiam.

Quid indicet rufa urina.

Cap. xxxxi

Rufa urina cruditatem indicat, non mortem. Verum tempore opus habet ad concoctionem. Est enim ex sanguine seroso, nondum ualde concoctionem adeptus, neque proprium colorem. Et propterea diuturniorem morbum significat. At in febribus continentibus, ob sanguinis multitudinem consistentibus, excernitur urina rufa & crassa, & subsidentia rufa, & colore, & fusuræ compage, & subsidentia, cruda.

Vrina tenuis micta, & postea turbata.

Cap. xxxxi

Vrina quæ tenuis mingitur, & postea foris turbatur, cruda est propter flatum crassi redundantiam. Indicat autem naturam incipere concoquere.

Vrina crassa micta, & crassa manens.

Cap. xxxv

Vrina quæ crassa mingitur, & crassa manet, & non desidet, qualis est iumentorum, significat uigere crassorum flatuum ac humorum uelut fermentationem. In his capitis dolores aut adsunt, aut aderunt, propter humorum turbationem ac euaporationes.

Vrina crassa micta, & postea desidens.

Cap. xxxvi

Quæ crassa mingitur urina, & postea desidet, indicat humorum fermentationem quiescere, & quodammodo attenuari. Et separationem ac secretionem incipere.

Vrina tenuis micta, & talis manens.

Cap. xxxvii

Extremam cruditatem tenuis & alba urina significat. Non enim aggressa est in his natura concoctionem. Contingit autem hoc aut ob uirium debilitatem, aut propter obturationem, aut ob morbi longitudinem. Nam in quartanis diuturnissimis, in principio ob crassitudinem & intractabilitatem materiæ, urina excolata tenuis uocatur. Mingitur autem tenuis, etiam ob hepatis obturationem aut rhenum. Verū cognoscitur ex locali dolore. Mingitur etiam aliquando tenue & albū in febribus ardentibus. Febris enim ardens bilis multitudinem indicat, atque hæc urina phrenitidem imminere significat. Non tingitur autem urina, quia non manet in uasis ipsa bilis, sed leuitate sua ad cerebrum decurrit. Si quidem igitur non adest in his phrenitis, scito ipsam iam affore. Si uero adest, & urina tenuis ac alba mingitur in ardentissima febre, ut plurimum mortem prænunciat.

nunciat. Non enim tolerare possunt vires cerebri iam prostratæ ab ardente febre, acrimoniam ac mordacitatem bilis iam putrefactæ.

Differentiæ urinarum oleosarum, & quid significant. Cap. XXXVIII

Solet febris primum pinguedinem eliquare, postea carnem, postremū etiam ipsa solida corpora inuadit. Pinguedine igitur liquefacta oleosæ urinæ excernuntur. Paulatim autem liquatur pinguedo, unde & principiū habet, & augmentum, & uigorem. In principio igitur colliquationis, ita oleosi coloris faciunt urinas, ut ambiguum sit, aquosæ ne sint an oleosæ. In augmento uero oleosæ fiunt, ita ut notabiliorem oleosi mixturam habeant. In uigore autem colliquationis totæ urinæ per totum, tum in colore, tum in substantiæ compage, uelut oleum sunt. At hæc pinguedo eliquata, aut rhenum solum est, aut totius corporis. Si igitur rhenum solum fuerit, confertim excernitur talis copia, imò & caloris sensus amplior circa rhenes contingit. Si uero totius corporis fuerit, paulatim additamentum facit.

Quid significant eruinæ subsidentia.

Cap. XXXIX

Quando consumpta est pinguedo, deinceps caro liquefit, & eruinæ subsidentia in urinis fiunt. Sed & hæc aut rhenum solum sunt, aut totius corporis. Siquidem igitur in febris apparuerit talis urina: totius corporis affectionem esse indicat. Si uero non, in rhenibus solum. Et rursus, si crudæ sunt urinæ, totius corporis est malum. Si uero concocta est urina, eruinæ autem sunt subsidentia, rhenum affectionem indicant.

Quid indicent fursuracæ subsidentia.

Cap. XL

Quum febris pinguedinem consumpserit, & maiorem carnis partem, & in profunditatem uasorum irruerit, fursuracæ subsidentia fiunt, angustiores quidem lamineis, uerum crassiores ipsis. Et hæc similiter aut ex toto corpore, aut ex uelica excernuntur. At si quidem febris affuerit, ex toto corpore. Si non ex uelica. Et si quidem cruda fuerit urina, corporis est affectio. Si uero concocta, solius uelicæ. Sed & localis adest dolor.

Quid indicent lamineæ subsidentia.

Cap. XLI

Quæ ipsæ solida partes affectæ fuerint, primū in superficie deraduntur, & quæ in urinis subsident lamineæ fiunt. Sed & ex uelica sola talia excernuntur. Si quidem igitur fuerit febris, totum corpus afflictum est. Si non, uelicæ affectio est.

Quid indicet polentaceum in urinis.

Cap. XLII

Quum febris post occupatam profunditatem, & maiorem & longiorem profunditatem inuaserit, fiunt talia fursuribus crassiora, & uocantur polentacea. At duo significant hæc polentacea. Aut enim sanguinis assationem indicant, aut fortem solidorum colliquationem. Si quidem igitur alba fuerint polentacea illa, solidorum corporum affectio est: Si rufa, sanguinis.

Quid indicat graueolens urina.

Cap. XLIII

Graueolens urina putrefactionē indicat, & futurā naturæ mortificationem.

Urina nigra quid significet.

Cap. XLIIII

Omnes nigrae urinæ statim etiam crassæ, omnino perniciosæ sunt. Raro enim aut nunquam inuenitur tenuis & nigra. Nam niger color accedit urinis, dum expurgatur atræ bilis humor, aut ipsa atræ bilis, tum quæ ob frigiditatem, tum quæ propter nimiam assationem facta est. Et uiris quidem ac foeminis nigrae urinæ pessimæ sunt. Pueris uero aquosæ. Minus autem perniciosæ fiunt nigrae urinæ, his qui debilem habent splenem, quibus non ex adustione, neque ex perfrigeratione, nigrescit ac liuescit sanguis, quemadmodum in alijs quibusdam

dam contingit: sed ex melancholici humoris diffusionem. At hæ tres differentia crassitudinem substantia habent. Necessario igitur etiam crassæ reperiuntur nigrae urinæ. Proinde in acutis morbis perniciosissima est omnis urina denigrata, & præsertim quum & graueolens fuerit & crassa, & nigram subsidentiam habuerit. Fieri enim non potest ut seruetur æger ex acuto morbo, qui talem urinam minxit. Et si quidem subsidentia fuerit nigra, perniciosissimum est. Si uero id quod in medio pendet nigrum fuerit, minus malum, aut non similiter malum. Si autem nubecula fuerit nigra, adhuc mitius & non similiter malum. Nigra porro urina, aliquando indicat frigiditatem, aliquando caliditatem, siue superaffationem. Si quidem igitur prius mixta fuerit liuida urina, deinde sic nigra fiat: frigiditatem causam habet. Si uero flaua præcesserit, & postea nigra inuenta fuerit, ab ampliore nimirum caliditate superaffata nigra facta est. Scire tamen operæ precium est quod & in febris quæ tantæ declinatione, & in melancholici delirij solutione, urinæ apparent nigrae ac crassæ. Splenicis autem ut plurimum talis urina mingitur, quando debilis fuerit splen. Nullam enim concoctionem ac distributionem melancholicæ superfluitatis facit.

De egestionum notis.

Cap. XLV

Quod de urinis antea dictum est, hoc etiam in egestionibus cognoscere oportet. Dico autem, qualis sit naturalis egestio. Nam ab hac euariatio in aliqua parte, cruditatem indicat. Optima igitur est egestio mollis & compacta, & leuis, & iuxta consuetam horam quam maxime prodians, & ad proportionem comestorum, colorata quidem moderatè bilioso humore, hoc est, subfulua, & non ualde graueolens. Quæ enim talis est, naturalis est. Et manifestum est quod significat sana esse omnia circa uentrem ac intestina. Si uero aliqua parte à relatis euariauerit, præter naturam iam dicitur. uelut est, ualde graueolens, aut crassa, aut sicca, aut dura, aut distorta, & non humori ammixta, & quæ cum stridore & uelut strepitu quodam præter rationem excernitur. Tales enim omnes concoctionis actionis debilitatem indicant. His adhuc deterior est exactè fulua. Est enim bilis intemperatæ ac puræ signum. Nigra uero egestio, atræ bilis signum est, aut sanguinis adusti. Liuida uero intestinorum frigiditatis ac mortificationis. Pinguis autem & oleosa, pinguedinis colliquationem significat. Viscosa uero ipsorum solidorum corporum colliquationem indicat. Quæ autem uaria est colore, & ualde graueolens, uariorum humorum excellentem putrefactionem significat. Cæterum in omnibus his considerare conuenit, an edulia talia fuerint, aut intestinum ex more fluxione laboret, quum debile sit.

De egestionibus iudicatorijs.

Cap. XLVI

Si porro iudicatio alicuius morbi per uentrem futura est, nihil quidem præiudicans, uelut in alijs, neque quicquam proprium ac firmum præsignificans habet. Verum ex eo quod adsunt quidem iudicationis signa, non autem adsunt signa uomitus, aut eruptionis sanguinis narium, aut sudoris, colligere datur. Considerare tamen oportet ex aluo egesta, an plura prodierint quam prius ante iudicationem. Indicant enim inclinationem hac magis fore, & præsertim ubi imminuta fuerint urinæ. Insuper autem & grauitas notabilis, & dolor, & tensio circa præcordia & lumbos, uentris excretiones præcedunt. Quandoquidem uero & per hemorrhoidas, & per locos muliebres, iudicatione fieri possibile est, cõmunia etiam amborum sunt signa quæ nunc sunt relata. Verum considerandum est an

an horum quid ex more expectetur. Si quidem igitur in principio morbi aut augmento, venter perseveranter liquidiora egerit, aut velut biliosa quædam pura, & febris perseverat, & bilis magis augescit: tunc & ardentior & periculosior ut plurimum est morbus. Si vero in vigore multum exturbetur alvus sua sponte, ferè morbi solutionem efficit. At circa vigorem aliquando in morbis diuturnioribus venter exturbatus, omnem materiam morbum facientem deterit. Verum in acutis morbis, & nigra pura & graueolentiam inducentia, præsertim in principio pessima sunt. Quibuscunque enim morbis inchoantibus bilis atra sursum aut deorsum prodierit, mortale est. Est rursus, Quibuscunque ex morbis acutis, aut diuturnis, aut ex uulneribus attenuatis, bilis atra subierit, postridie eius diei moriuntur. Non autem simpliciter si quid nigrum excernitur, iam etiam hoc atra bilis est. Potest enim & sanguis è proprijs locis excidens, & tempore aliquo manens frigidatus in grumos congelari. Atram itaque bilem cognoscemus ex eo quod ad terram lusa, ipsam radat ac fermentet, velut acerrimum acetum.

De Vomitus prænotione ac significatione.

Cap. XLVII

Instante iam iudicatione, uomitum fore expectare oportet, si pulsus fuerit uehemens, & ad contractionem magis festinarit, & durissimus existens ac inæqualis. Cordis item punctura & uehemens oris uentris morsus adest unà cum capitis dolore, & uertigines oculorum, tenebris simul obuersantibus. Et labium concutitur, & salua multa ac tenuis defluit, & nausæ infestant, & infernæ præcordiorum partes frigida tangentibus apparent. Omnia enim hæc coincidunt, bilioso ac mordaci humore in uentre ac stomacho coaceruato, mordentem ac simul contrahente totum stomachum infernè. Vnde & labium concutitur, & salua defluit. Si uero cum his etiam rigor accesserit, citissime uomunt. Quod si etiam cibos recens ingesserint, & maxime potum, citò uomunt. Vtilissimus est uomitus pituitæ ac bilis quàm maxime mixtorum. Vomatur autem non crassus. Nam sinceriores, hoc est, non mixti, reprobandi sunt. Tales enim & cum uolentia & lancinationibus ac molestia uomuntur, unà cum hoc quod signum sunt, solam bilem prædominari. Quin & uarij reprehendi merentur, velut sunt liuidi & nigri ac porracei. Mali enim sunt hi inquit Hippocrates. Si uero omnes hos colores idem homo uomuerit, perniciosum est. Deteriores tamen sunt liuidi ac nigri, in acutis & ardentibus morbis fientes, & præsertim si fuerint graueolentes. Attendere uero oportet & in his, num sanguis cofluxerit in uentrem, & tempore quodam in ipso moram traxerit, & grumosus excernatur. In plurimis enim tale quiddam contingit, ex circuitibus quibusdam. Et non solum nihil molesti infert, sed etiam tolerantiores seipsi sunt, ubi hic per uomitum fuerit reiectus.

De eruptionis sanguinis ex naribus prænotione ac significatione.

Cap. XLVIII

Si sanguinis ex naribus eruptio futura est, propria signa præcedunt hæc. Splendores oculis obuersantur, eo quod flauus est humor. Obtusus autem est uisus, propter multitudinis sursum uersus lationem. Quapropter etiam lachrymantur oculi. Facies rubicunda est, & præsertim malæ. Præcordia distenduntur citra dolorem, difficultas spirandi adest, propter transitum sanguinis per thoracem. Capitis item dolor, & temporum pulsus irruens simul cum iudicatoria exacerbatione, & non in principio morbi existens. Collum dolet, & deliria sepe ac exultationes fiunt. Pulsus autem alti sunt & magni, & ad distentionem magis

t 2 festi-

festinant. Si uero cum his omnibus etiam nares scalpat, iam adest tempus ut sanguis erumpat, & praesertim quum dolor fortiter circa frontem ac tempora incumbit. Quod si etiam sano sanguis erumpere consuevit, augebit sane etiam hoc ualde spem tuam. Atque haec sunt signa iam futurae sanguinis eruptionis. In principio uero apparentia crudo existente morbo, periculum significant, & tales plerumque moriuntur. Si uero facta iam concoctione, praesertim in urinis, haec signa appareant, circa uigorem morbi commodè conspiciuntur. Soluunt autem tales sanguinis eruptiones etiam uiscerum inflammationes in febris, quando maxime ex directo fiunt, uelut inflammato hepate, ex dextro nare: in inflammato splene, ex sinistro. Vnde facillimum iam fuerit etiam medicum praedicere, utra naris sanguinem emissura sit, occasione ex dolente parte accepta. Soluunt etiam saepe sanguinis ex naribus eruptiones phrenitidem, non tamen lethargum aut peripneumoniam.

Quod & per haemorrhoidas, & muliebres purgationes, saepe soluitur morbus.

Cap. XLIX

Vidimus in multis etiam per haemorrhoidas prius existentes in sede apertas, morbum solutum. Similiter & in foeminis menstrua purgatione facta. Oportet autem & in his praegressa concoctione, in morbi uigore excretionem fieri, quo bona & tuta iudicatio fiat. Praecedit & in his notabilis grauitas, & dolor lumborum, imò etiam imi uentris dolor ac distentio.

De significatione ex sudoribus.

Cap. L

Febrem per sudores soluendam cognoscemus ex eo quod ardentissima est, qualis est quam inde Causum graeci uocant. Biliosus est enim hic morbus, & ubi fortiter motus fuerit, rigorem efficit. Si quidem igitur pro ratione suppressa fuerit aluus, aut urina, iudicatione propinqua existente, rigorem expectare oportet. Si uero amorum suppressio facta est, & non adsunt signa uomitus aut eruptionis sanguinis, sudor necessario erit multus, & hoc magis fiet ubi augescere exacerbatone aegri mente moti fuerint, & forinsecus calidiores facti, & uapor quidam calidus ex corpore ascenderit, qualis antea non contigit, uelut uidere est in recens lotis. Pulsus item his sunt magni & alti & ueloces, & ad distentionem magis festinantes ac uelut undosi. Et arteriae tunica mollis ac humecta apparet. Superficies autem totius corporis pruriginosa & mollis, & quibusdam horis rubicunda. Haec in exacerbatione iudicatoria fientia, concoctione praegressa, & iudicatoria die bona existente, salutaris & solutorios sudores significant. Manifestum est autem quod moderatè calidum esse oportet solutorium sudorem, & per totum corpus fieri, & pro ratione leuare, ac tolerantiorum facere aegrotum. At frigidi sudores cum acuta quidem febre mortales sunt, cum mitiore uero, longitudinem morbi significant.

Abcessuum signa iudicatoria.

Cap. LI

Si ad abscessum conuertatur morbus, salutariter se habente aegro, ad hoc maxime animi aduertere oportet. Durante quidem febre & continua existente, & urinis tenuibus ac crudis semper existentibus, & subsidentia non habentibus, si postea apparuerit in aliqua inferiori parte, uelut cruribus aut circa iuncturam aliquam, aut grauitas, aut tressio, aut ardor, aut dolor, absque manifesta causa, in ea parte abscessum fore expecta. Si uero aeger derепente difficulter spiras, citò quidē à difficili spiratione liberatus fuerit, successerit autem dolor & grauitas capitis, & altus sonus ac surditas, huic in glandulis circa aures abscessum fieri necesse est. Fiant autem abscessus magis in hyeme, & senioribus qui trigessimum annum exceperunt.

De

De sputorum significatione.

Cap. LII

In peripneumoniciis ac pleuriticiis affectionibus, sputa propriè appellata, sub-
sidentius in urinis similes sunt. At nihil omnino expuere, sed solum siccè tussia-
re, est ueluti in urinis quum extremè crudæ sunt. Si uero incipiat æger humi-
da & perfectè cruda educere, obscura est & incerta talis transmutatio, & desinit
primum morbi tempus, hoc est principium. Vbi uero inceperit spuere pau-
ca & matura, & semper plura ac facilius educit, tunc augmentum esse dicimus.

Quum autem exactè fuerint concocta ac mollia, & non ægrè educuntur, tunc
instat uigoris tempus. Vbi uero concocta fuerint, ac citra molestiam educun-
tuntur, & imminuta est copia, & dolor non amplius fuerit, & homo facilè spi-
rat, ac bene tolerat, uigorem cessasse putandum est, & morbum iam declinare.

Cæterum ante alia animum aduertere oportet, utrum citius aut tardius spu-
ta extussire incipiat, quemadmodum etiam Hippocrati uidetur. In pleuritis
cis inquit, si sputum statim appareat, in principio quidem brevis sit, si uero po-
sterius appareat, prolongatur morbus ipse uidelicet. Quæcunque igitur spu-
ta subflaua sunt & subfulua & subspumosa ac tenuia, solius cruditatis notæ sunt,
& nihil notabilis mali indicant. Quæ uero purè flaua & fulua & uiridia ac spu-
mosa sunt ac uiscosa, insuperq; nigra, mala sunt. Nam excepto sanguine quia-
cunque alius humor purus fuerit, malam affectionem indicat ex calore gene-
ratam. Sanguinea igitur & pituitosa sputa, moderata sunt. Flaua uero ac ni-
gra, mala. Considerare uero oportet & educationis ipsorum modum. Si enim
facilè expuuntur, iudicium est quod talia bona sunt. Si uero ægrè educuntur,
mala; & præsertim si nigra, aut liuida, aut æruginosa fuerint, aut ualde graueo-
lentia, ut prunis iniecta graueo leant.

Signa perfectè ac fideliter soluti morbi.

Cap. LIII

Perfectè ac fideliter solum esse morbum putare oportet, quum in idem si-
mul conuenerint omnia solutoria signa. Siue igitur in uigore statim & confers-
tim ac constanter iudicatus est morbus; siue paulatim declinando fideliter solu-
tus est, ex his sanè cognoscere poteris. Primum enim & maximum signum bo-
næ ac fidelis iudicationis, sunt cōcoctiones superfluitatum apparentes in diebus
indicatiuis, cum uirium fortitudine. Deinde si in impari die iudicatio facta est,
& ad hæc insuper, si febris soluitur ægro iudicato, & ipse æger ab omnibus acci-
dentibus liberetur, & coloratior fiat tum in facie, tum reliquo corpore, pro eua-
cuationis ratione: & subtiliore pulsu præditus, ac fortior dum assurgit, & bene
tolerans per omnia, & maximè circa concoctiones ciborum ac digestionis: & si
omnes naturales actiones inculpate facit, & corpus pro refectionis ratione ro-
boratur: & color ex non naturali in naturalem transmutatur. Hæc est optima
iudicatio, & oportet ipsos confidenter renutrire conuenienti uictu ac balneis ui-
delicet. Si uero defectuosa facta fuerit iudicatio, morbus recidiuare solet.

Signa morbi non perfectè soluti.

Cap. LIIII

Suspectos de recidiua cognoscemus, ex eo quod putatur quidem solutus esse
morbus, perseverant aut consimiles prioribus urinæ ac pulsus. Et quod adhuc
palidus est æger, & difficulter tolerat, & reliqua cōtraria omnibus prædictis bo-
nis sunt. Et in summa, quoties præter rationem solutus est morbus, his ipsum re-
uerti timor est.

Prænotio diei qua moriturus est æger.

Cap. LV

In perniciosiis morbis considerare oportet exacerbationes per singulos insul-
tus, an quotidie, aut alterius, aut alio modo fiant. Si uero febris est non inter-
mittentium generis, uide an in imparibus diebus, aut paribus, æger magis intole-

tans seipso sit. Nosse enim clare oportet quod in illa die aut nocte, in qua magis intolerans seipso sit aeger morietur: Et si morbus multo plus vires excedit, citius morietur: Si vero vires parum resistunt, differri poterit ad unam atque alteram diem. Fieri autem non potest ut moriturus ad declinationis morbi tempus deveniat. Raro vero in declinatione morbi aliquem mori contingit, nisi alius morbus priori succedat. Neque vero necessario ad vigoris tempus pervenit moriturus, Sed ut plurimum in principio aut augmento aegroti moriuntur.

Quod etiam horam mortis aegri praenoscere possit doctus medicus.

Cap. LVI

Quum quatuor sint particularis exacerbationis tempora, observare oportet qua hora diei aut noctis grauior exacerbatio irruere solet. Insuperque in qua parte exacerbationis aeger seipso grauior factus est, nimirum an circa accessionem, aut augmentum, aut vigorem ipsius exacerbationis. In illa enim hora, in qua languidior, aut praeter solitum magis pulsus destitutus factus fuerit, morietur. Et in accessione quidem exacerbationum moriuntur, ob inflammationes magnas in partibus principalibus, aut propter multitudinem crassorum ac viscosorum humorum acervatim intro lapsorum, ut transitus spiritus perfecte obturent: ita ut suffocetur ac velut extinguatur natura, quemadmodum si quis viridium lignorum copiam accumulet in flammam. In vigore vero exacerbationum moriuntur, emota natura per violentiam ac vehementiam morbi. Eodem modo contingit ipsos etiam in exacerbationis augmento mori. In declinationibus autem exacerbationum moriuntur, exoluta ipsis per violentiam vitali firmitate. Obscurior enim & colubens semper fit pulsus in perniciosis exacerbationis declinationibus. Diffinit enim tunc una cum alijs in corpore, etiam febrilis calor. Atque hinc idiotae melius rem habere imaginantur. Aegri vero aut ad exonerandum alui surgentes, aut alio motu facto, animo linquuntur, aliqui vero paucos ac viscosos sudores exclusos moriuntur.

In acutis morbis mortem non esse praedicendam. Ca. LVII
In acutis morbis coniectatione uti non oportet, in quibus maxime repentina mors, aut periculum ingruit. In his enim facile transluit & ardentior est humor, & vehementissima febris violentia. Et de his morbis Hippocrates pronunciauit: Acutorum morborum non omnino tutae sunt praedictiones, neque sanitatis, neque mortis.

Februm diuisio, & de diarijs febribus.

Cap. LVIII

Ex morbis ob intemperiem orientibus unus est & febris ipsa, calore praeternaturali ad tantam immodestiam euecta, ut angat hominem, & actionem laedat. Differentiae huius caloris maioris ac minoris ratione distinguuntur, & iuxta subiectum siue materiam: aut ipsum cordis corpus calore occupante, aut humores, aut aeream essentiam. Incipit igitur haec praeternaturalis caliditas, alias ex alio de praedictis, & nisi soluta fuerit, progressu temporis similiter reliqua duo genera afficit. Et si quidem in spiritibus permanferit hic calor, diariam febrem efficit. Si vero humores occuparit, febrem putridam incendit. Si vero ipsum cordis corpus iniuria affecerit, hecticam ac habitualement febrem facit. Nam aliqui febricitantes facile solubilem affectionem habent, velut calefactum in sole lignum. Aliqui vero aegre solubilem, velut accensum ab igne lignum, ut etiam fumum edat. Quidam vero plane exuruntur, velut lignum ad carbonis naturam adactum. Tria igitur sunt genera, diariae, putridae, & hecticae. Primum itaque de diarijs tractabimus. Fiunt haec febres, velut dictum est, citra humorum putrefactionem, solo spiritu feruefacto, & propterea diariae appellantur: Nam

Nam ubi loti sunt ægri in prima huius febris declinatione, & cibum boni succi ac humectum acceperint, non amplius secundo febricitant. Proprium autem & inseparabile signum habitualium febrium est urinarum concoctio in prima die, & caloris iucunditas. Verum post exacerbationem sedatam, certiore habebis cognitionem, Nam articularum motus, per omnia assimilatur motui sanorum, quod nulli alij febricitanti adest. Et ipsa bona ægri tolerantia maximum liberationis signum est. Et urina multo meliores post exacerbationem quam in febris principio tibi apparebunt. Et si ipsis dum lauantur, neq; horror aliquis infusus acciderit, neq; alia aliqua iniucunditas, & post balneum consequenter bona tolerantia manserit, confidenter nutrire potes ipsum, & vinum exhibere intrepidè bibendum, quantum in præsens moderatum est. Facile uero à talibus febribus capiuntur hi in quibus defluxiones corporis non uaporosum, sed acre quid ac fumosum habent. Quare si quando suppressus fuerit coaceruatus in ipsis calor, febrilis efficitur. Auspicantes uero ac externè lacessentes harum febrium causæ sunt, lassitudines, frigiditates, uigiliæ, curæ, tristitiæ, iracundiæ, rigor, ardor ac exustio cutis, ut difficulter transpirationem admittat.

De diarijs ex lassitudine febribus.

Cap. LIX

Qui ex lassitudine febricitant, cutem sicciorem quam qui ex alia quadam diaria febre laborant, habent. Et hoc maxime contingit his qui simul frigefacti sunt ex multa lassitudine, ut etiam post febris uigorem permaneat ipsis siccitas. Et pulsus his parui fiunt. Qui uero non nimium fatigati sunt, his humiditates quædam, aut uapor calidus ex profundo effertur. Magni autem sunt & his pulsus. Oportet autem ipsos statim post exacerbationis declinationem, in balneum ducere. Et accuratè simul ac molliter modico oleo dulci tepido perfricos, aquarum dulcium lauatris lauare. Sed neq; si in aëre balnei ipsos morari iusseris, quicquid laesis, propter frigiditatem. Postea quietis studium prodest.

De febrientibus ex uigilijs, & cura & tristitia, aut ira.

Cap. LX

Eos qui ex uigilijs febricitant, distinguit etiam coloris species. Est enim subturnida. Sed & oculorum motus manifesti sunt: uix enim attollunt supercilia. Et caui fiunt ipsi oculi, imò etiam sicci. Pulsus autem densiores fiunt omnibus ob uigilias, curam, ac tristitiam febrientibus. Qui uero ex ira februnt, his neq; cauitas oculorum adest, neque color ille. Et calor his est amplior, & uelut ex profundo emergens. Et magni sunt his pulsus. Omnes igitur relati neque frictionibus, neque balneis multis opus habent. Sed multi olei perfusione omnino non adstringentes. Atq; ubi parum defrici sunt, pro more lauentur.

De febrientibus ex ardore.

Cap. LXI

Febrientes ex ardore statim ab initio perfrigerantibus. sanare oportet, & balneis pluribus dulcissimarum ac temperatissimarum aquarum. Oleum aut modicum adhibendum est, & omnino non affricandū. Sint autem quæ adhibentur capiti frigefaciencia, omphacinū & rosaceum ex ipso preparatū sine sale. Facere aut hæc possumus frigida, uas in quo continentur suspendentes in puteū ut aquam contingat. Sed adhuc magis saliens aqua frigida, oleum frigefacit, & magis adhuc nix forinsecus uasi circumposita. Perfundendū est autem sinciput ex oleo sic frigefacto, lana moderatè excepto, ita ut manum in sublime leuemus, & hoc indefinenter faciamus, usq; ad febris declinationem: atq; ita in balneum dulcium ac temperatarum aquarum ducamus, accessu solo aëris balnei per transitum concessio.

De febrientibus ex frigore.

Cap. LXII

Si quis frigefactus febricitarit, suppressis uidelicet fumosis transpirationibus,

4 qua

quæ per cutem fiunt, & hic in balneum ducendus est in febris declinatione. Caput autem calfaciendum est & ante balneum, & post balneum, in declinatione, ex ungento amaracino aut nardino.

De febrientibus ex grauedine ac destillatione. Cap. LXIII

Qui ob grauedinem februnt laurare non oportet, priusquam ea cōcoquatur, si ex frigidityte aut cruditate destillatio facta est. Caput autem humectandum est irino ungento aut amaracino aut nardino. Si uero ex ardore facta est destillatio capite calfacto, & instar cucurbitæ attrahente materiā ex locis subiectis: hunc statim in balneum dulcium ac temperatarū aquarum ducere oportet, & in frigida immergere, & sub salientem locare. In balneis autem frigefacientibus caput humectare. Sunt autem ea moderata, propter balneum.

De febribus ex cutis densitate. Cap. LXIII

Densatur cutis aut ex frigore, aut acerba qualitate ipsi præter aduetudinē alla pfa. Quale quid accidit etiā his qui in aluminosa aqua lauantur. Arcissima est his cutis, ut etiā tacto cognoscatur. Imò & calor motus, leuis quidem iuxta primam manus admotionem apparens, acris efficitur, si diutius tactus perseueret: Urinæ autem non uelut alijs fuluæ sunt. Quare non accusamus in his quod alimentum non sentiant, unde corporis moles contrahitur. Neque uero oculi caui ac sicci fiunt. Verum sunt quibus humidiores & prominentiores esse uidentur naturalibus, eo quod non contigit transpiratio in ipsis, sed materiæ magis intus concluduntur. Vnde neque pulsus parui sunt uelut in tristitia, aut cura, aut uigilijs, & ualde immoderatis exercitijs. Curare porro eos oportet aquarū dulcissimarum ac temperatissimarum balneis, post exacerbationis declinationē, & præcipere ipsis ut aliquandiu in balnei aëre morentur, affundendumque est ipsis oleū dulce tepidum, & fricatio mollis ac moderata adhibenda. Tenuis autem uictus præscribendus est, & uinum dandum tenue & album.

De febribus ex fame. Cap. LXV

Si ob famē fiat febris, exacerbatione declināte in balneū ducantur, & plurimo oleo tepido dulcissimo perfusi leuissimè fricent, & plurimo tēpore in calido solio morent. Egressi deinde ac uiribus resecti rursus in balneū ducantur, & in calidū solium locent. Postea egressi post balnei turbationē sedatā, danda est aqua calida potanda, deinde pisanæ succus: aliquando etiā pisces petrosi in iure albo parati.

Diæta cōmunis omnium diariarum febrium. Cap. LXVI

Diæta in febribus diarijs omnibus cōmunem scopum habet, ut sit ex edulij boni succi & quæ omnino cōcoquuntur, & nusquam circa meatus detinentur, his quidem qui ex ardore aut ira februnt, quæ simul frigefaciunt ac humectant, frigefactis uero, minus alentia & moderatè calfacientia. His autem qui uigilarūt, aut tristes fuerunt, aut curis uexati, humidus & somnificus cibus congruus est. Fatigatis autem, plurimus & maximè nutriens. At in quibus intemperatura corporis calidior ac liccior facta est, eos oportet aliquando circa primum exacerbationis impetum nutrire. Vinum autem dandum est omnibus qui ex diaria febre laborant, aquosum, tenue ac albū, quod & concoctionē adiuvat, & urinas ac sudores propellit. His uero qui uigilarūt, aut tristes fuerunt, aut curis uexati, magis intrepidè uinū datur. Sed & fatigatis nimitū, dandū est quantū superare possunt. Iratis autē priusq̃ ab affectu omnino liberati fuerint, minimè tutū est uinū dare.

De febrientibus ex inguinum inflammatione. Cap. LXVII

Siquidem citra lacescentē externā causam, inguinis glandularū inflammatio fiat, multitudinē sanguinis plerūq̃ in uniuerso corpore indicat. Nam & calor in his

in his amplior est quàm in prædictis, & facies rubicūda ac tumida apparet. Oportet igitur celerrimè uenā secare priusquàm materia in inflāmato putrescat, ac febrē putridā accendat, post uenæ sectionē utendum est tenui diætā, usq; ad perfectā liberationē. At inflāmato inguinī, ante uenæ sectionē adstringentiā ac repellentiā imponenda sunt, post uenā sectam, laxantia ac moderatē discutiētia. Ceterū quibus propter offensionē digitorum pedis, aut aliud quid tale, inguinis inflāmatio facta est, & ea de causa febris diaria consequuta, tales ne interrogant quidam Medicū quid facere oporteat, sed ulceri ex quo inguinis inflāmatio facta est prospicientes, lauantur circa exacerbationis declinationē. Prohibendum autem est uinum omnibus ex inguinis inflāmatione febrientibus, donec inflāmatio fuerit soluta. Et uictus ratio tenuior ipsis constituenda est.

De diarijs febribus ex cruditate obortis.

Cap. LXVIII

In corporibus ex malis humoribus uitatis cruditates orientes ciuissimè febrē accendunt. Minus autē fit malum, si ob cruditatē aluus infrā erumpat. Non paruum autem malum est, si fuerit suppressa. Feбриunt autē aliqui etiā in quibus profluuiū uentris ob cruditatē fit. Si quidē igitur sola corrupta euacuata esse apparuerint, lauandi sunt ac nutriendi in febris declinatione. Si uero plus iusto euacuatio fiat, melius est nutrire citra balneum, prospiciendo uentri ipsi. Cura uero uentris dupliciter fiat. Si enim non ampliū feratur ipsa aluus, absinthium modicum aqua macerans coquito cum oleo in duplici uasculo, & ex hoc locos circa uentrem humectato. Deinde hapsū lanę purpureę oleo imbutū uentri imposito. Si uero debilius est os uentris, mastichen cum ungento nardino ad strigmentitiā crassitudinem redige, & purpuram ex eo imbutam impone. Sint autem ea quę imponuntur ad tactum calida: tepida enim robur uentris exolunt. At si adhuc feratur aluus, melius est optimo melino uti pro nardino, cū modico uino. Commodum est ad hæc & mastichinum. Si uero etiā uenter exuratur post euacuationem, melino similiter utaris, aut cerato ex ipso parato. Nutriendi porrò sunt adhuc fluente aluo, ex polenta & panibus paucissimū acetum habentibus, quos hinc oxylipes Græci uocant. Insuper genda est autem polenta succo malorū punctorum, aut pirorū malorum, præsertim cotoneorū. Vel in ipsorum decoctum, aut myrtorū. Si uero fluxus cessarit, alica detur, & gallorum testes, & pisces petrosi in iure albo parati, & fructus adstringentes. Si uero inappetentes fuerint, ut auerferentur cibos, ex concoctorio medicamento ex malorum cotoneorum succo ac melle composito, cochleariū unum aut duo danda sunt. Si autē non affuerit id quod ex succo cōpositum est, detur id quod ex carnibus cotoneorū parat, cui nihil omnino piperis additū est, aut ualde exiguū quiddā. Si uero supprimat aluus in his qui ob cruditatē ex diaria febris febricitāt, siquidē cibi adhuc in uentre continentur, plurima tepida pota, digitis aut pennis immisissis, per uomitū iubebi mus id quod molestū est reijcere, deinde præcordia fovere, & quietē agere. Si uero cibi iam descenderūt ad intestina, reclinatis ipsis ita ut partes circa caput & stomachum sursum uergentes habeāt, foveatur uenter, & somnus concilietur. Post somnū autē glandula subdetur, ad superfluitates quę descenderunt educendas, aut per mitiorē clysterem, quale est fursurum decoctum, euacuatio fiat. Diætā si tenuissima, quę plurimam exterforiam uim in se habet. Quod si inflatio accesserit, incoquere oportet in oleo cuminum, aut rutam, & infundere per sedem. Euacuata uero aluo, statim nutriantur. Si uero etiā citra molestiam dormierint, postridie lauantur, adhibentes uentri ungentum nardinum cum modico uino. Et post balneum similiter tenui uictu utantur. Si uero etiā tertia dies, febre

febrē aliquam induxerit, neque sic timendum est, sed similiter laundum, ac moderate nutriendum. Dare autem oportet talibus ante cibum, aliquod concoctorium, oxyporium à cita penetratione appellatum medicamentum, & præsertim quod ex cotoneis malis fit cochlearij mensura.

Curatio diariarū febrium multarū dierum, quarū aliquæ ex mutatione diariarum generantur, ob cutis obturationē. Cap. LXIX

Quædam febres propter obturationem uasorum circa cutem fiunt, ex diariarum mutatione, quā non probè curatæ fuerint statim ab initio. Cōtingit hoc maxime in corporibus uitiolis humoribus præditis, quum multū fuerint uoraces. Nam in talibus circa primam ac secundam diem aliquantisper, non est in pulsu putredinis signum, sicut neq; in urinis, cruditatis: dum enim prolongat quidem declinatio, & nō amplius iuxta proportionē remittit, suspecta est affectio: si enim nō transpirauerint perfectē, necesse est putrefactos esse uitiolos humores. Si quidem igitur puer aut senex fuerit ægrotus, uenam secare non expedit. In medijs aut ætatibus, robore præfente ægroto, uena secetur, si sanè etiam plenitudinis signa affuerint in corpore. Detrahendū est autem pro uiribus, & obturationis magnitudine: maior enim febris ob uehementiores obturationes incidit. Minor autem ob minores. Euacuata uero multitudine, & rarefactis meatibus, fumosæ ac fuliginosæ superfluitates transpirantes pauciores fieri poterint. Periculosum enim est aperire potentibus obstructions uti ante euacuationem. Quæ enim uim exterforiā habent, exhibita dum exhalant simul attrahunt quid ex crassis ac uiscosis humoribus in uasis, & duplicat in angustis meatibus obturationes. Si uero etiam extrinsecus cuti admoueantur exterforia, periculum est ne attrahant etiam aliud quid ad meatus obstructos. Quo igitur securè & intrinsecis exhalatio, & extrinsecis attractio contingat, utilissimū est euacuare pro uiribus corpus. post euacuationē uero non longa facta dilatione, aliqua exterforia edulia aut pharmaca dare. Eduliorū quidem loco pitisanā & aquam mulsam, pro pharmacis autem, acetum mulsam ex solo aceto ac melle paratū. Quæ enim in aceto mulso coquantur aliās, uelut calamintha, & similia calida, febres accendunt, uelut etiam uinum. At post tertiam diem, neq; putredinis humorum signo in pulsibus præfente, neq; in urinis cruditate, & ubi hora suspecta in qua febris accessit in prima diē transijt, confidenter iam hominē lauare oportet. Si uero etiam circa decimā horā suspectus tibi fuerit paroxysmus siue exacerbatio, lauare oportet ante horā sextā. In balneo uero corpore præcalescat illinire oportet oleo dulci tepido, & moderatius cōfricare, postea depurgare & abluere forinsecus corpus. Eligenda ad hoc quædam moderatè extergentia, qualis est ordeacea farina & fabacea. Deinde immittere in solium calidæ temperatæ, deinde etiam in frigidam. Si uero circa decimam horam, ut ita demus, turbatio quædam suspecta sit, nihil exhibendum est præter aquam cui incocta est hyssopus & parum apij. Deinde si nihil mali intulerit hora, nutriendum: Si uero etiam quid attulerit, omnino moderatum apparebit. Quare & lauare poteris postridie ac nutrire. At ubi magna facta est obturatio, necessariò putrefactio contingit. Vnde curatio in putredinosa febre referenda, etiam his congrua est.

De febribus continetibus siue synochis.

Cap. LXX

Continens febris nominat, cuius ab initio usq; ad finem una est exacerbatio, nullam alterius exacerbationis principij significationē faciens. Corporibus bono habitu præditis, & multo sanguine refertis, & ætati calidæ peculiaris est continens febris. Conflatur enim ob calidi sanguinis copiam nondum putrefactū, & eo

eo quod non transpirat, feruore solum caliditatem excitantis. quemadmodum nouum uinum solet in dolijs: tempus autem talium februm maximè uernū est. Sunt autem differentiæ febris continentis tres, nam aut equalis permanet magnitudo ab initio usque ad solutionem, aut additamentū facit, aut detractionē: hoc autem contingit prout maiores aut minores fiunt transpirationes, ex eo quod densior aut rarior est habitus corporis affecti. Est autem multa copia quæ in talibus affligit, & feruorem sanguinis ebullientem consequenter febris accendit. Aliquando uero etiā crassitudo. Scopus igitur curationis in ipsis est euacuare copiam, & extinguere calorem præternaturalem, & crassitudinē secare, si quidem affuerit. Deinde ueterē bonam temperaturā debilitatis partibus reparare.

De uenæ sectione.

Cap. LXXI

Si ualidæ sunt uires, & ætas permittit, & nihil aliud fortiter resistit, sanguinis tantum auferre oportet, quantum uires tolerant. Præstat autem si uires adsunt, usque ad animi deliquium ducere. Quibus uero non sic uena secta est, hi ad extremum periculum deueniunt, ut aut suffocentur, aut animo linquantur, nisi uirum robur, aut larga sanguinis eruptio, aut multus sudor, ex manifesta perniciose ipsos eripiat. Nam multitudo in his non amplius à uenis contineri potens, obturat ac distendit corporis molem, & propterea ipsum aliquando dirumpit, & uasa maximè in naribus aperit. Ea gratia festinare oportet ad sanguinis detractionem, quantum uires ferunt: quo uasorum natura ex transpiratione ac uenatilatione, naturale temperamentum conseruans, iuxta morem ab initio humoribus dominetur. Verum animaduertendum est & ad ipsius uenæ sectionis scopos. Præcedente enim ciborum cruditate, eousque uenæ sectionem differre conuenit, donec tibi satis esse uidebitur concoctio ipsorum in uentre peracta, ite inq̃ secessus superfluitatū in intestinis. Si uero suspectam habes post uenæ sectionē, aliam fore sanguinis euacuationē, uelut muliebrē purgationē, aut hæmorrhoidū in sede fluxum, relinquere oportet in uenæ sectione tantum sanguinis quantum per alios locos euacuandum putas. Quare siue menses fuerint moti, siue hæmorrhoids aperta, totum negocium naturæ permittito. Si uero non tantum quantum oportebat euacuatum fuerit, tunc uenam secato, quo ex utrisque compositionis perficiatur quod conuenit. Aprus est ad uenæ sectionē habitus corporis durus, multi sanguinis, densus, & ægrè transpirans. Status aëris humidior, Resistit uenæ sectioni puerilis ac senilis ætas, temperamentū calidum, ac siccum ualde, & tempus ac regio consimilis, & qui natura humidiores sunt, & præsertim cum caliditate, & qui raro habitu præditi sunt. Insuper quibus os uentris aut amara bile ualde uexat, aut debile est, aut ultra iustū subtili sensu præditū: hi enim omnes facile transpirant, & in uenæ sectione animi deliquiis corripunt, ex quibus ægrè reuocari possunt. Similiter aut etiā si triginta annorū fueritis cui uena secanda est, uerū humidus & mollis, & pinguis ac albus corpore, & paruas uenas habuerit: huic aut omnino non uenā secabis, aut parū detrahes: omnino quidē non, ætatis tempore & in reliquis eiusdē ordinis: parum uero, alijs temporibus ac reliquis constitutionibus. Proinde aliqui in animi deliquiū collapsi in ipsis medicorū manibus, nō sunt reuocati. quare si quis euacuasset citra uirū dissolutionē, nō perijissent. Aliqui uero per omnē deinceps uitā, totū corporis temperamentū frigidius habuerunt, ppter immodicā euacuationē, ut quidā in malo corpore ac habitu uitā degerint: quidā uero ex hoc ipso pernicioso morbis correpti sint, ab aqua inter cutē, & erectæ ceruicis spiratione, hepatisq̃ ac uētris debilitate, & semi fide ratione: optimū igit est, quæadmodū nos semper facere uidisti, nō dierū numero

animum

animū aduertere, neq; soli multitudinē, sed uirium robori, in omnibus quidem, uerum maximē in continentibus febribus; si enim uires conseruentur, non solū sexta ac septima, sed etiam sequentibus diebus uenam secabis.

De frigida aquae exhibitione,

Cap. LXXII

Si aliquando coactus fueris curare aegrotū, qui non solum antea uenae sectione auxiliū omisit, sed etiam nunc aut propter timiditatē aegroti, aut cognatorum sanguinem detrahēre prohibearis: ad frigidae exhibitionem deueniendū est exacta praescriptione facta, quantum ex ipsa fieri possit detrimentū. Nam si hoc paruum uel omnino nullum futurum est, danda est in potu frigida sincera. quantum aeger eius uoluerit. Tunc autē danda est frigida, quum in urinis uideris coctionis signa. Neq; autem in principio, neq; in augmento danda est frigida, sed in ipso uigore totius morbi, ac particularis exacerbationis. Oportuno enim tempore data frigida, corroborat solidarum partium naturam. Corroborata uero natura praetenuat humores aggreditur, ut bonos quidem detineat, inutilēs uero eiciat, aut per uentrem, aut per uomitus, aut sudores. Si uero frigida potior fuerit aeger tempore sanitatis ualde confidenter frigidam dato, ipsa experientia doctus, omnia uiscera frigidae familiaritatem sustinere. Si enim omnino aliqua pars adeo frigida esset, ut ab ipsa laederetur, sanitatis itaq; tempore euidenter detrimentum ostendisset. Quum autem nulla pars in sanitate laesa sit, ne in febre quidem laedi poterit, quum maximum propugnaculum habeat in profundo ardentis caloris multitudinem. Quapropter his qui modicum sanguinem, & minimum carnis habent, frigidae potus periculosior est. Cito enim ad solidas animales partes penetrat carnibus nudatas. Quapropter etiam habituales febres, neq; sincera, neq; multa frigida opus habent: Tenuia enim sunt in ipsis ac modici sanguinis corpora. Vnde quum magni detrimenti timor imminet in ineptis, a frigidae exhibitione abstinere oportet, & uti alijs auxilijs, quae obturationes reserant, & multitudinem euacuant, & feruorem febris mitigant. At uero detrimenta ex intempestiuo frigidae potu orientia haec sunt: Viscosos ac crassos humores attenuari ac transpirare frigida impedit. Quare siue inflammatio fuerit in aliquo uiscere, siue ignis sacer, siue indurata, siue mollis ac laxa affectio, frigidae potus ad huius sanationem nihil confert: sed euestigio quidem non modicam affert lenitatem, eo quod febre iam factam extinguit. Manente autem intus causa, quum ex frigida densatum fuerit corpus, aliam febre accendit priore grauiorem. Atque haec quidem detrimenti species contemni poterat. Verum plerique debilia habentes uiscera, citius ac facilius a frigidae exhibitione laeduntur. Quibusdam enim stomachus singula adeo fortiter affectus est, ut perdidit actionem, & uix potuerit deglutire: Alijs uenter laesus est, ut uix concoquere potuerit: Alijs hepar, ut ex hoc in aquam inter cutem inciderint. Alijs colum, aut pulmo, aut rhenes et uesica, aut aliud quid a frigida laesum, debile ad propriam actionem factum est. Quidam ipsorum statim erectae ceruicis inspiratione, aut alto sopore, aut lethargo, aut aurium abscessu, aut conuulsionibus, aut tremoribus, aut siderationibus corripuntur. Et ut in summa dicam: Omne neruorum genus & caput ipsis affligitur. Noui quod formidinem tibi induxerim per ea quae retuli, ad frigidae exhibitionem. Verum uidisti me saepe ipsa oportune usum esse, & in quibus dare oportet. Et semper utilitatem assequutum esse, citra aegri laesionem.

Dieta in febribus continentibus.

Cap. LXXIII

Quibus uena secta est, his ego post duas uenae sectionis horas, semper do modicum ptisanæ succum, & iubeo quiescere. Et postquam ex somnis surrexerint, rursus

rursus similiter ptisanæ succum exhibeo, & in hoc perseuero usque ad tertiam diem. Quarta ferè semper in balneum duco. Tales enim oportune uena secta uiribus robustis, & ad animi deliquiū euacuati, necessario sequitur non longè postea uentris secessus, attenuatis uidelicet humoribus, & leuatis ac corroboratis uiribus. Aliquādo uero etiam bilis uomitus. Ad quæ statim etiam humiditates per totum corpus aut sudores succedunt. Quare confidenter hos lauato quarta die. At uero tempus exhibendi cibi in febris continentibus, tum his quæ iam relaxatæ sunt, tum his quæ postea referent, quæ sanè unam solum ab initio usq; ad finem exacerbationem habent: est bona ægri tolerantia & consuetudo. Tunc enim ipsis cibi dandi sunt, quando tolerantissimi sibi ipsis esse uident. Et illo præsertim tempore diei, in quo etiam prius morè accipiendi cibi habuerunt: maxime enim tolerantius pertulerint cibos isto tempore acceptos. Robustis igitur uiribus, & dum uigor morbi breui expectat, tenuissimo uictu uti licet. Vbi uero uires egræ sunt, non licet tenui uictu uti, citra magnum detrimentum. Quare alimentis tantum apponendum est, quantum roboris uiribus detractum est.

Vniuersalis doctrina de febris putredinosis. Cap. LXXIII

Transpirationis angustia ac impedimentum meatuum obscurorum totius corporis obturationem facit, per quos fumosæ & fuliginosæ superfluitates quotidie transpirant. At obturationis affectio quum parua fuerit, & probè tractata, diariam febrem efficit. Quum autem siue propter magnitudinem, siue imperitiā Medicorum consuetudinem diariam tempus exceßerit, aut continentem, aut aliam quandam ob humorum putrefactionem accendit febrem. At uero transpiratio multiformiter impeditur, & dum densantur meatus propter siccitatem, aut adstrictionem cutis; & dum obturantur propter multitudinem & crassitudinem ac uiscosam humorum. Dum itaq; quotidie fumosarum ac fuliginosarum superfluitatum transpiratio impeditur, naturalis in nobis calor affligitur. Alius uero præter naturam corporibus accedens, primum humores propter humiditatem putrefacit ac corrumpit: Progressu uero temporis etiam pinguedinem ac carnem, & ipsa solida corpora inuadit. Est autem putrefactio essentia putrescentis corporis ad corruptionem transmutatio, à calore præter naturam fiens. Putrescentes igitur humores, aut intra uasa arctata, continuas & nunquam intermittentes usq; ad perfectam morbi solutionem febres efficiunt, aut per totum corpus delati, & extra uasa elapsi, quandam febrem per circuitum accedentem, & interualla habentem accendunt, uelut tertianam, quartanam, quotidianam, aut aliam consimilem. Causa uero cur non excidant extra uasa humores in febris continuus, est aut multitudo, aut crassitudo, aut uiscositas ipsorum. Quemadmodum igitur dum inaninata corpora putrescunt, primum abijcimus ex ipsis quæ iam putruerunt, deinde reliquum in aëre frigido suspendimus, & perspirationes perfrigerantes molimur. Eodem modo sanabimus in humanis corporibus putrefactionem, quod quidem iam corruptum est omni modo euacuantes. Reliquum uero gestationibus moderatis & transpirationibus perfrigerantibus, ad exactam ac naturalem proportionem reducentes. Proinde ubi prius de non intermittentibus febris tractauerimus, mentionem faciemus deinceps & reliquarum.

De febris putridis.

Cap. LXXV

Quum in omnibus uasis, & præsertim maximis, circa alas ac inguina, ac consimilibus, sanguis calidior æqualiter redundans putruerit, febrem putridam continentem efficit. Plerumq; uero in corporibus multi sanguinis ac carnosus, & denso habitu præditis, & superfluitatibus, calidis refertis hæc generat. Proinde his iam febrientibus pulsus maximus & æqualis ac uehemens est, & qui cōpagem arteriæ

u neq;

neq; duriorē, neq; molliorem habet. Ad tantam uero uelocitatē ac densitatē uenit, ad quantam magnitudinē ipsa febris uenit. Atq; hæc quidē ambabus cōmunia sunt, huic uidelicet, & prædictę cōtinenti citra putrefactionē febris. Verū huic præcipua putrefactionis ligna in urinis, & pulsibus, & caloris specie adsunt. Cuius ratio uero harum febrū, in utroq; genere cōmunicat, tum in eo quod cū putrefactione, tum eo quod sine hac est. At essentia quidem & uniuersa ipsarū natura, ex genere putridarum est. Verum quatenus una est tota ipsarum exacerbatio, ab initio usq; ad totius morbi solutionem, eatenus cōmunicat cum cōtinenti absq; putrefactione. Oportet itaq; etiam curationē ipsis in hoc solum cum illis cōtinentibus cōmunem esse. Per alia uero omnia bisariam secari, ita ut quosdā medendi scopos ex genere putridarum accipiamus, quosdā uero ex propria ipsarum essentia. Sanguis enim est qui hac febre putrefactionem suscepit. Sic uero etiam alias differentias putrefactorum humorum sanare conuenit, iudicationem partim à putrefactione sumendo, partim à propria uniuscuiusq; differentia, uelut pituita, aut utraq; bile. Quandoquidem igitur putridarum febrium septem subiecta sunt præter naturam, à quibus iudicationes sumuntur, nempe copia humorum, & crassitudo, & uiscositas, & obturatio, & transpirantium suppressio, & putrefactio, & febris non habens interuallum: unamquamq; sanē ex re latis affectionem sanare oportet per contraria. Copiam per euacuationē. Crassitudinem per secantia. Viscositatem per extergentia. Obturationē, aperientibus. Transpirantiū suppressionem, siquidem propter constrictionem cutis facta est, per diffundentia. Si uero propter densitatem, per rarefacientia. Deinde putrefactionem, extergentibus & alterantibus ac transmutantibus. Febrem autem, per frigefacientia. Quum igitur uires fuerint fortes, uena & his secanda est, nisi cruditas uentris, aut alterius cuiusdam partis prohibeat, uelut antea dictum est. Nam ex his quæ de illis diximus, considerare oportet cōuenientia etiam de his. Quandoquidem uero neq; obturatio neq; putrefactio curari potest per solam uenæ sectionem, quum alijs auxilijs opus habeant, reseruare aliquid sanguinis oportet ad curationis tempus, ut ne necessitas aliqua ingruat, ob inopiam, intempestiue nutriendi. Quantū enim ad talem febrem attinet, omnino non nutrire oportet. Quantum uero ad sanguinis euacuationē, nutrire opus erit. Quare ex duobus alterum necessarium erit, ut aut nutriendes febrem augeamus: aut non nutrientes, uires dissoluamus. Melius igitur uelut dictum est, relinquere sanguinis proprium alimentum animalis partibus. Et ipsum contentum esse modicis forbitiōnū exhibitionibus, uelut sunt ptisana & aqua mulsa, quibus ut medicamentis magis quàm alimentis opus habemus. Si uero ob aliquam causam relictū fuerit uenæ sectionis auxilium: homini per tenuem uictum connutrito, quum iam concocti fuerint humores, & crassitudo ipsarum fuerit præ attenuata, febre in uigore existente, dabimus frigidam aquam, uelut in superioribus cōtinentibus febribus, nisi quid ex illic relatis prohibeat exhibitionem. Quod si uero etiam frigida potiois auxilium fuerit relictum, alijs auxilijs utendum est, quæ obturationes aperiant, & multitudinem euacuant, & feruorem mitigant, uelut antea dictum est, & deinceps consequenter referetur.

Communis diæta omnium febrium putridarum. Cap. LXXVI

In omnibus putridis febribus. in cōmuni putrefactos humores expurgare oportet, per urinā, & uentrē ac sudores. Hoc enim cōmune est omni putredini. Si uero aliquādo sua sponte ad os uētris impetū fecerint, per uomitus euacuent. Alioquin non oportet ægrē uomentes præter naturam irritare, ut ne uires oris uentris

iris exoluantur, quibus maximè in morbis opus habemus. Eligenda uero sunt quæ citra calefactionē ac reficcationē prædictas euacuationes perficere possunt: Velut est pisanæ succus, & aqua mulsæ, acetum mulsæ simplicissimū, & fauorum mellis elatorum cremor, apomeli Græci uocant, & radices apij decoctum. Aqua itaq; mulsæ ad secandos crassos humores, & detergendos uiscosos, & promouendas excretiones, optima fuerit, in febribus ex coarctatione ac putrefactione abortis, & præsertim continentibus putridis, attramen febrilem calorem auget. Quare si immodica fuerit caliditas ab aqua mulsæ abstinendū est, & utendū pisanæ succo. Si uero obturationes egrè solubiles esse iudicauerimus, acetū mulsæ dandū est: quanquā & hoc si quis immodicè utatur, inteuiua rad. t. & tulsim mouet, & neruofas partes lædit, ut difficile sit reperire tale auxiliū, quod nihil lædens multū profit, atq; hoc cōtingit propter cōplexū affectionū præter naturā in corpore. Quapropter his qui facile à quacunq; re exhibita lædunt, melius est ut pisanæ succo utant, donec ualidius alimentū accipere possint. At si alius nō egerat, aqua mulsæ cū solo oleo infusa eluat. Totū uero corpus forinsecus ante euacuationē discussorijs diffilare nō oportet, post euacuationē uero discussorijs uti licet. Pharmacis aut utendū est tepidā caliditatē habentibus, uelut est oleū chamæ melinū, & in hoc tēporē inter discutiendū inquā, etiā uinū aquosum, potū omnes excretiones mouet. Cōcoctione uero manifesta in urinis apparēte, etiā lauare licet, dulcis & potabilis aque balneo. De febribus cōtinuis. Cap. LXXVII

Febres continuæ eiusdem generis sunt cum intermittentibus siue interpolatis. Eiusdem autem generis dico cum tertiana exquisita, febrem ardentem (causam Græcis dictam) exquisitā, & cum quotidiana, eam quæ quotidie exacerbatur, & tamen non intermittit. Nam & febris ardens omnes alias exquisitæ tertianæ notas seruat, & in hoc solum ab illa differt, quod cum rigore non irruit, neq; intermittit. Et quæ quotidie exacerbatur, similiter omnes notas habet cum quotidiana. In eo uero quod non intermittit, eiusdē cum illa generis est. Eodē modo etiā quæ per quartam exacerbatur, non aut intermittit, eiusdē generis est cum quarta. Et manifestū est quod neq; rigor exacerbationes præcedit, neq; sudor consequitur in hac febre, quemadmodū neq; in febre ardente. In febre ardente rigor superueniens soluit agritudinē. Differt autem febris ardens à continente putrida, eo quod hæc ex sanguine putrefacto conflatur, & à principio usq; in finem unam habet exacerbationem. Febris autem ardens ex flaua bile putrescente incenditur, & alterius diebus exacerbatur, & quandam habet febris imminutionē ac uelut remissionem. Continens uero putrida similis manet usq; ad solutionē.

Cura febris ardentis. Philumeni.

Cap. LXXVIII

Est igitur febris ex flaua bile putrefacta incensa, continua ardentissima, & neque medicis, neq; ægris bonum ordinem exhibet. Lingua enim in his arida est, & nigra aspera. Morfus item uentris, ac sitis intolerabilis, & uigilia. Aliquando etiam delirium. Primum itaq; leniter ac blandè hanc febrem aggredi oportet. Vbi uero concoctionis signa apparuerint in urinis, & morbus iam uiguerit, acrius instare, & ad frigide potum accedere. Nisi & hic aliquid prohibeat, ex his quæ de cōtinentibus febribus relata sunt. Prima uero auxilia in febre ardenti sunt: Decubitus in locis frigidis, qui ad purū aërem patent ac perflantur, Stratū molle & sæpius renouatū, amicula assidue permutata, & satis gracilia & non fordida. Lectus sit abundè amplus, quo possint membra calefacta subinde ad alias atq; alias eius partes transferri. Et per flabellum aër ignauior concitetur. Epithemata conueniunt pectori ac stomacho imposita, palmulæ cum uino & rosaceo, aut

u 2 melinō

melino tritæ. Sunt & frigefacientia commoda, uelut sunt pampini uitis tritæ, feris, polygonum, plantago, ramenta cucurbitæ, lactuca, rumex acutus. Sinagulis autem ammisceantur micæ panis præmadefactæ, aut polentæ. Oportet tamen assiduos horum usus deuitare. At uero panniculi linei complicati moderate graciles aqua & oleo calido imbutæ, & pectori ac stomacho impositæ, ardentem febrem mirifice mitigant. Sed & aqua & oleum calidum, aut aqua & oleum rosaceum, ex alto in pectus delata per lanæ manipulum, uehementiam ardoris facile obtundunt. Oportet autem abunde calida esse aquam & oleum, aut aquam & rosaceum. Tepida enim partium firmitatem exoluunt. Si uero parum nitri his ammixtum fuerit, sudores excludere poterint. In ardentissimis autem febribus etiam aceti parum ammiscendum est, nam & hoc quod debet facit. Cibi porro offerendi sunt humidissimi, & nihil acre habentes, uelut sunt lactucæ, caules cum posca aquosa feruefacti, & cucurbitæ similiter cum posca. Sed & pitisanæ succus tenuior dandus est absque sale, aut alio additamento. Et aliquando post cibum aquam frigidam cochlearij unius aut duorum mensura absorbeant. Aut sit potius ipsorum potus in totum lactei teporis. Sed & aqua frigida fracta colluenda ac gargarisanda præbeatur. Et rosarum succi cochliarium absorptum stomachum refrigerat. Quin & alia animi oblectamenta procurentur. Folia uitis uiridia, item myrti ac rosarum per pauimentum spargantur, & aqua frigida frequenter irroretur. Et aquæ salientes in uicinia sonum edant. Temperamentum autem frigefacientium epithematum ac simile, est uigor exacerbationis. Nam in principijs ac augmentis exacerbationum, dum adhuc inæqualiter affectum est, & caliditas circa uiscera residet, si hæc adhibeantur, diffundunt quiddam sensum, uerum repellentia caliditatem in profundum, maius detrimentum inducunt, incluso intus feruido calore, & rursus febrem ardentem efficiant. At in uigore exacerbationum, ex passa caliditate per totum corpus, facile extinguere poterit ea quæ adhuc reliqua est circa uiscera. Nam & melius spirantes, & minus siticulosi fiunt, his in tempore adhibitis. Et ipsorum roscido uaporem excluso, ad somnum conuertuntur. Cæterum instante iam uigore totius morbi, & nullo prohibente ex his quæ in continenti febre relata sunt, tempus iam est frigida exhibenda. In quibus igitur confidimus, nullum ex uisceribus, neque caput, uelut dictum est, læsionem incursum, sinceram sanè frigidam exhibemus. In quibus uero metus est, atque is uel minimus impedimento est, pro prima uice fractum exhibebimus potum siue frigidam. Frangitur autem si quis temperatæ aquæ calidæ cyathum unum, ad quinque frigida puræ sinceræ ammiscuerit. Atque talis potio suspectis corporibus exhibetur. Quidam uero olei rosacei cyathum frigida exhibenda affundunt, & sic exhibent. Ipsum enim rosaceum non ualde frigefacit, & oleositas eius corporibus intus oblita, non permittit ipsa à frigida aqua lædi. Et simul firmitatem quandam exhibet uentri rosaceum, & lumbricitatem, propter oleositatem. Quidam pro rosaceo, melinum exhibent. Porro balneum illis solum conuenit in ardenti febre, qui citra tumorem aliquem inflammatum, aut erysipelatum agrotant, ubi concoctionis signa apparuerint in urinis. Quod si quis iuuenis sit carnosus, tempore æstatis, & constitutione calida ac sicca, febre in uigore existente, & concoctione in urinis apparente, citra uisceris alicuius inflammationem, & in lauacrum frigida notatorium seipsum iniiciat, atque noster, sudores utique commouerit. Si uero etiam ad frigida balneum adfuerit, ualde confidenter hoc auxilio utatur. Quibusdam enim statim uenter biliosa egressit.

egeffit. At si moderata est febris, & vires robustæ, unâ cum concoctionis signis, profunt ipsis balnea dulcium ac temperatarum aquarum, & ex ungentis chamæ melinum, præsertim si aer ambiens, frigidus fuerit. Nam si aliquando contigerit, ut frigidus existente ambiente æger fortiter à febre exuratur, modicam salutis spem de ipso habere oportet. Si uero neque concoctionis signa affuerint, in tali aeris statu, neque vires fortes habere apparuerit, talem seruari impossibile est. Quare neque laubis ipsum, neque inunges rarefacientibus medicamentis, neque uinum dabis neque frigidam. In quibus enim desperata est salus, uanum est auxilia multos seruantia imperitorum calumniæ exponere. Proinde ego sanè Medicos quosdam noui methodi ignaros, qui imitati sunt ea quæ à nobis fieri solent, & usi sunt his auxilijs, in his qui penitus mortui fuerunt, & neque quicquam profecisse, & oportunum ipsorum usum suspectum ac horrendum fecisse. At nos & temporum occasiones, & auxilia describimus, in his qui seruari possunt. Nam qui incurabiles sunt ægri, his neque occasio, neque auxilia commodant.

Tertianæ exquisitæ dinotio.

Cap. LXXIX

Febris tertiana exquisita in corporibus natura biliosioribus omnino consistit, & in ætate uigoris, & maxime tempore æstiuo, & in locis calidis ac siccis temperamento, & in tali ambientis nos aeris statu. Sed & uitæ in laboribus, & curis, ac uigilijs, ardoribusque & paucio alimento, eoque calido & sicco. Et immodicus calefacientium ac siccantium potionum ac medicamentorum usus, apta sunt ad febrem tertianam. Quum igitur gignatur tertiana, ex flaua bile putrefacta, ac mota, & extra uasa lata, statim à principio rigorem insignem inducit, qui à quartanæ febris rigore in hoc differt, quod in tertianis pungi ac uulnerari corpus ut deatur. Nam in quartanis inualio uehementem perfrigerationem habet, & magis in profundo. Quotidianam uero neque rigor omnino præcedit, sed magis circumfrigescunt. Est etiam in tertianis febribus ordo pulsuum exquisitus, & æqualitas. Excitatur autem in progressibus exacerbationum pulsus ipse ad uehementiam ac magnitudinem & densitatem. Sitim etiam inducit tertiana, maxime in uigore, & hominem exurit, ut se denudet & abiciat uestitum, & magnum ac densum spiritum ducat, & uelut flammam quandam efflet, & frigidam bibere expetat. Et paulò post calor æqualiter per totum corpus extenditur. Quod si etiam manum inieceris corpori, iuxta primum contractum calor multus & acris occurrit, qui uelut cum uapore quodam affertur. Vincitur autem paulò post à manu, & sanè iam etiam bibere tempus est ægro, atque ubi bibit, statim multitudinē calidi uaporis per cutem remittit, prænuntiā sudoris, & uomi- tus bilis apparet, & aliquando etiam uenter egerit. Urine uero his sunt biliosæ & subfuluæ ac subflauæ, & moderate crassæ, & paulò post aut nubeculā albam, aut quiddā in medio pendens, neque nubecula, in primo circuitu apparuerit, ad septem circuitus extendetur morbus. Verum exquisita tertiana quæ in prima die ostendit in urinis subsidentiā albam ac leuem, & æqualem, tertium circuitum non transgreditur. Hæc febris in integram febris quietem definit post exacerbationem, uniuersum exacerbationis tempus duodecim horarū ad summum faciens, & non plurium. Atque hanc exquisitā tertianam nominamus. Quæ uero diuturniorem habuerit exacerbationē, eam appellamus extentā. Si uero quotidie exacerbauerit, cum rigore irruens uehementi, habuerit autem omnes prædictas notas in pulsibus, & urinis, & reliquo corpore, hanc duplam tertianā nominamus. Et hoc contingit propter multitudinē & crassitudinem & bilis inæqualitatem.

u 3 Tertia

Tertianæ exquisitæ curatio.

Cap. LXXX

Tertianam igitur exquisitam uelut à flaua bile cōmota sientem, humectare ac frigefacere quantum eius fieri potest, conuenit. Et quæ quidem in supernū uentrem confluunt, euacuare per uomitus. Quæ uero infernū subeunt, similiter per infernam excretionē. Sed & urinis ac sudoribus uia aperienda est, & uenter quidem mollibus infusus euacuandus est. Vrinæ autem propellendæ sunt, apio & anetho in potionibus maceratis. Et si concoctionis signa apparuerint, confidenter iam etiam absinthij comamaqua mulsa maceratā ac excolatam dabis. Balnea uero ipsis conueniunt, ex aqua calida potabili temperata, & neq; nitrum, neque aliud quiddam tale in balneis adhibere, sed aquam & oleum præcalescitio corpori circumfundere, & in calidē solium locare, ac hortari ut in ipso moretur quantum eius fieri potest. Eos uero qui balneum amant etiam si bis laueris, non peccaueris. A uino uero abstinendum est penitus priusquā concoquatur morbus. Vbi uero concoqui incipit, tenue & aquosum ac modicū. primum dandum est, prope solutionem uero, uberius. Cibi qui humectant ac frigefaciunt, omnes commodant tertianis exquisitis. Quantitas uero in ipsis tanta sit, quantum probè concoquere possunt. Et ex oleribus quidē conueniunt atriplex, blitum, malua, lactuca, & cucurbita. Ex reliquis autem ptisanæ succus, & sorbitiones ex alica, & pisces petrosi, & ex uolucris quæ mollem carnem habent. Ex alijs alas, & gallorum testes, & suillos pedes, ac cerebella, & paruorum porcellorū extremas partes dare conuenit. Sorbendi sunt etiam ouorū uitelli, & fructus gustandi nō egredi concotiles. Abstinendū uero ab omnibus dulcibus & acribus, & salis, nidolorisq; ac uirosis eduljis ac potibus. Et à ueteribus ac natura calidis uinis.

Tertianæ spuria curatio.

Cap. LXXXI

In non exquisitis tertianis, neq; lauare statim ab initio bonum est, sed quando iam apparuerint signa concoctionis: neque quotidie nutrire, sed satis est altera die. Quies autem & calfactio præcordiorum ipsis conducit, & sorbitiones concoctu faciliores. Infusa item inferni uentris non ualde mollia. Et si sanguinis detractione opus habuerint, neq; hæc relinquatur, sed statim ab initio distinctione facta, uelut in Sermone de uenæ sectione dictum est, moderatus sanguis auferatur, quantum in præsens satis est. Totus uero diætæ status non frigefaciens & humectans sit in totum, uelut in tertianis exquisitis, sed etiā quid de incisorio ac calfactorio modo assumat, nimirum uelut crassiore bile subiecta, & non ualde calidior. Maximè uero contulerit ipsis ptisanæ succus, iniecto pipere & hyssopo aut origano. Sed & nardi spicam cum aqua mulsa coctā bibendā dato. Et alia quoque quæ urinam cient, præterquā extremè calfacientia ac siccantia. Maximè quoque absinthij cremor assidue dandus est post septimā diem. Sed & acetum mulsum multis profuit potum. Et aliquod lene purgatoriū, bona cōcoctione in urinis parente. At uero uomitus ab accepto cibo, usq; adeo cōmodus est his qui in hac febre perseverant, ut multos nouerim statim perfecte liberatos ex huius usu.

De hemitritæo, hoc est, semitertiana.

Cap. LXXXII

Febris semitertiana appellata, fit pituita putrefacta ad putrefactū amaræ bilis humorē ammixta, & est ex duabus febribus cōposita: quotidiana enim cū circū frigefactione irruente, tertiana uero cū rigore, febris ex ambabus mixta, horrore inducit. & de rigore quidē minus, plus aut de frigefactione, id quod extremitatibus permixtis cōtingit. Itaq; neq; absou nomen huic febris imposuerūt qui hæmitritæū dixerunt. Duplex est aut modus generationis eius. Aut duabus exactionibus uno tēpore coincidentibus: Aut statim ab initio utrisq; inter se permixtis.

xtis. Quum igitur tertiana prædominatur, horridior febris fit, & iuxta accessio-
nem etiam aliquid rigoris assumit. Statim uero talis etiam calidior est & æstuo-
sior, & quendam bilis uomitum, aut egestionem, aut sudorem inducit. Vbi ue-
ro altera pituitosior febris præualet, prædominatur quidem frigiditas extremi-
tatum, uerum modici sunt horrores: & non sunt siticulosi, neque æstuosi. At
ubi æquales magnitudine fuerint, & tertiana interpellata, & quotidiana conti-
nua, inuasio quidem exacerbationis cum horrore contingit. Et quum pituitosa
febris dominatur, contractiones fiunt ac horrores. Quum autem biliosa febris
præualuerit, acruatim incallescunt. Atq; hæc quidem est semitertiana exquisi-
ta, ex tertiana intermittente & quotidiana cōtinua composita, ambarū febrium
temperatura æquali existente. Cæterū semitertiana nō exquisita, aut biliosum
humorem habet, aut pituitosum. Quū igitur ex utriusq; relatis humoribus semi-
tertiana febris cōfletur, etiā curationem mixtam esse cōuenit. Quare ex his quæ
de tertiana relata sunt, & ex his quæ de quotidiana dicentur, curationem cōpone-
re oportet.

Quartana exquisita dinotio.

Cap. LXXXIII

Quartana exquisita omnē ætatem inuadit, præcipuè tamen inclinata. Hip-
pocrates autem in libro de septenario, uigoris ætatem dixit. Idem asserere uide-
tur, eundem hominem non bis quartanam febrem incidere. Verba eius sunt,
Primum quidem quartana febre idem homo bis neq; capitur, neque unquam
captus est, neq; de cætero corripitur, si semel sanus fiat, & hoc propterea: Iuxta
propriam uniuscuiusq; hominis naturam, & ætatem uigoris contingit. Neces-
se enim est uigentem hominis naturam in hoc tempore quartana febre corripi.
Præterito autem uigore, exolutam esse & a quartana, & ab inuasionem. At ue-
ro naturæ corporum magis atrabiliariæ hanc febrem perferunt, & ex temporis
bus Autumnus, & præsertim ubi ipse seipso fuerit frigidior ac siccior, & in æqua-
lis. Edulia item ac poriones, & totius uitæ uictus siccus & frigidus tempore exi-
stens, quartanarum febrium signū est: Et lienes aucti. Hæc autem febris non
statim à prima die omnino irruit cum rigore, Sed aliquando ex alijs in hanc fit
transmutatio, ex his quæ erroneæ ac inordinatæ uocantur. Verum in progres-
su rigor accedit, & cum augescente etiam rigor augetur. Sensus autem agros-
tis contingit, non uelut pungatur & stimuletur cutis, uelut in tertianis conti-
git, sed & perfrigerantur uehementer, & uelut franguntur usque ad ossa. Pro-
inde audire est agros dicentes, quod ossium lassitudine tenentur, & carnem con-
fringi imaginantur. Pulsus porro sunt parui, obscuri, ac tardi & rari in princi-
pijs accessionū, uelut in nulla alia affectione. Etenim iuxta inuasionem quarta-
narū arteria tibi ligata esse uidebitur, & introrsum retrahi, ac prohiberi à regres-
su. Quare etiam si iuuenis fuerit æger, tamen senilis extremæ ætatis motū arteria
imitatur. Si enim ægotantis naturalem pulsus noueris, aut in principio exa-
cerbationis alterius morbi affueris, nihil aliud expectaueris quo minus pronun-
tatio pulsus ad raritatem ac tarditatem fit. Urinæ uero his in principio quidē albæ
ac tenues & aquosæ, nimirū propter materiæ crassitudinē percolatæ. Progredien-
te uero morbo, pro ratione coloratiores fiunt, & subsidentiā habent crassam.
Sequitur aut sudorum copia circa exacerbationis declinationem. Ex Rufo,
Quartana igitur à splene initium sumētes, diuturniores sunt. Fiunt aut manife-
stæ ex colore, & cruditatibus, & quod uenter non facili egerit, & ex splenis tu-
more, & quod ad sinistram magis se reclinant. Est autem periculum ne pro-
gressu temporis etiam in aquam inter cutem incidant. At uero propter hepar

u 4 inflam

inflammatum quartanarij, coloris sunt albicantis, & toto corpore tumidi, & urinae his sunt ualde rubrae, sandaracham referentes. Et ad contactum tumor dextrae praecordij occurrit. Et hi etiam magis difficulter spirant quam splenici, & subituliunt, & postremum in hydropem ineuitabilem delabuntur.

Quartanae curatio.

Cap. LXXXVIII

In principio igitur moderate ac leniter tractandi qui ex quartana febris laborant, ita ut neque medicamentum aliquod forte adhibeamus, neque euacuationem, nisi sane sanguis ualde abundare uideatur. Tunc enim moderate sanguinem auferre oportet. Et si diducta uena sanguis fluens niger ac crassus fuerit, confidenter euacua: Talis autem in splenicis maxime reperitur. Vbi uero flauus ac tenuis apparuerit, statim cohibe. Secunda est autem uena, aut interna, aut media, in sinistro cubito, si splenicus fuerit homo: Aut in dextro, si circa hepar fuerit affectio. Dieta uero sit flatus expers, & bona. Venter autem molliatur quantum eius fieri potest, per consuetos cibos. Si uero hi nihil profecerint, infusus per clysterem utendum est, primum quidem mollibus, postea acribus. Prohibendae sunt carnes porcinae, & omnes uiscae ac tardi transitus. Item frigida ac humida edulia omnia. Vino utendum est paucum, albo & tenui, ac moderate calido, uolucris autem montanis. Et piscibus mollis carnis, ac facili concoctionis, & nihil uiscosum habentibus. Utendum est etiam salsamentis ac sinapi. Et per dies aliquot accipiendum est pharmacum ex tribus piperis generibus, & diospoliticum appellatum. Et si per solum tritum quotidie acceperint, recte utique fecerint. A frictionibus autem & deambulationibus & alijs consuetis, non penitus arceantur. A balneis uero abstineant, frictionibus contenti, quae ualde profunt. Et si brevis fuerit ac non ualde uiolenta quartana, non malum fuerit in intermedijs diebus consueta exercitia contingere. Atque haec quidem in principio ac augmento facienda sunt. In uigore uero morbi tenuiore uictu utendum est, & iubendi sunt aegri diu quiescere, & uisceribus prospiciendum est, adhibitis fomentis ac cataplasmatibus mollire ac laxare potentibus, & flatus dissoluere. Talia uero sunt, farina ordeacea, & semen lini, iris, cuminum, chamæpitys, & ruta, in aqua mulsâ cocta. Oleum quoque a fomento cataplasmati miscendum est. Oportet autem primum olei soti per paucos dies irrigare, atque ita cataplasmati uti, in die uidelicet adhibitis, si aeger ferat. Epithymatis autem utendum est polyarchio, & eo quod ex styrace paratur, & similibus. Consequenter autem etiam urinam cientibus utendum est. Et aqua mulsâ in potu exhibenda, in qua cocta est ruta & anethum. Quod si concoctionis morbi signa euidenter apparuerint, confidendum est statim pharmacis humores nigros euacuantibus, & non semel, sed saepius, si opus fuerit. Conuenit autem Epithymum quartanis potum, & Veratrum nigrum maxime prodest, eo quod citra molestiam euacuat ea quae molestant. Et uinum dulce in uacuam colocynthis calicem infusum. Omnibus tamen miscendum est apium, aut anisum, aut dauci semen, iucunditatis gratia. Assidue etiam betae ac ostreorum decoctum bibant. Conueniunt his quoque aloëdaria Oribasij, quae sic habent. Aloës drach. c. spicae nardi, asari, mastiches, croci, xylobalsami, singulorum drach. vi. cassiae drach. xii. epithymi drach. xvi. ueratrum nigri exempta medulla drach. viii. forma pilulas magnitudine erui cum pulegij decocto, & exhibe pro uiribus. Possunt & cum melle cocto pilulae formari. Ego uero etiam ueratrum internum adieci. Utendum est & uomitibus a cibo, & a raphanis, si nihil impedierit. Plerique enim ipsis assidue usi, partim perfecte a morbo liberati sunt, partim facile pertulerunt. Nam una cum hoc quod euacuant ea quae stomachum infestant, etiam facilius concoquunt tales

tales, ubi uero nihil iam prohibet, etiam album ueratrum dandum est, primum quidem raphanis infixum uelut in Sermone de purgatorijs dictū est, postea uero etiam ipsum per se. Qui uero uomere non possunt, his uehementius inferne purgatis dandum est medicamentum ex uiperis, theriaca appellatum, & reliqua quæ ad tales febres laudantur. Inter quæ est & familiare illud nobis omnium probatissimum, quod recipit succi cyrenaici, & piperis, & myrrhæ troglodyticæ, & foliorum rutæ uiridum, singulorum æquales partes. Singula seorsim leuissime teruntur, & ruta cum melle trita excipiuntur, fiuntque pilulæ, de quibus aliquibus obolus unus, alijs duo exhibentur. Aliud Asclepiadæ, hoc etiam somnum facit, quo etiam ipse uxor piperis longi, myrrhæ troglodyticæ, succi papaueris, castorij, singulorum pares portiones efforma & utere, obolum unum aut dimidium exhibens cum aceto mulso, duabis horis ante accessionem.

Aliud ad quartanam, facit & ad arthriticos: hoc in quartanis dato prælotis duabus horis ante accessionem, drachmæ unius pondere cum aceto mulso. Arthriticis uero cum aqua mulsa. Bituminis unc. i. myrrhæ troglodyticæ drach. ii. folijs mentæ uiridibus leuissime tritis excipe, ac utere uelut prædictum est. Ceterum qui in principijs talium pharmacorum aliquod exhibuerunt, aut omnino ante uigorem, hi sæpe simplicem quartanā duplicem fecerunt, aut omnino maiorem ac difficiliorem effecerant. Aut duplicem antea triplicem reddiderunt, aut omnino duas difficiles ac maiores effecerunt. Noui ego quendam medicum qui ausus fuit è tribus quartanis correpto dare theriacam ante morbi uigorem. Deinde auctis omnibus accidentibus, quum febris continua successisset, hominem peremit. Archigenis. Quartana febre laborantibus, inquit Archigenes, trifolij bitumen olentis seminis drach. i. in tribus aquæ mulsæ cyathis, exhibere soleo. Mirificè etiam ipsis prodest bitumen ipsum iudaicum tritum potum cum uino diluto drachmæ pondere. Verum pharmacum minimè molestum, & sæpe successum fortitū expertus sum ego hoc, maxime in quibus splenes tument, & hydrops initium capit. Hederæ corymbiferæ folia quinque cum myrrhæ troglodyticæ magnitudine fabæ trita, in aquæ mulsæ dulcioris hemina exhibentur. Sed & castorium potum rigores mitigat, & morbosam carnem consumit, & cōcoctionibus in uenis opitulatur, & segniciem admotum eximit.

Rufi. Absinthij cremor humores uentrem infestantes deterget, & concoctio ni auxiliatur. Vnde neque saluam colligunt qui absinthium bibunt. Mitigat etiam inflammationes hepatis ac splenis, & urinas impellit, & menses mulierum. At si æger adfuetus fuerit, & habitus uentris euacuatione gaudeat, & mordaces humores secedant, lac recens mulctum asininum aut equinum, quibusdam dedi, quos magis purgare uolui. Alijs uero caprinum, propter familiaritatem & parabilitatem. Exhibui autem ab initio heminas tres, & progressus sum usque ad sex. Deinde intermisso uno circuitu, similiter à tribus heminis incepti, & addita quotidie hemina, ad sex progressus sum, & postea detracta quotidie hemina una, rursus per duos circuitus quieui. Et simul morbus dissoluebatur, & corpus nutriebatur. Oportet autem animal boni succi esse, cuius lac exhibemus. Si uero alicui non acescit, neque nidorosum fit, neque per uentrem erumpit, etiam in suspecta die, sorbitionis loco moderatè dandū est, multo tempore ante accessionē, & buccellæ panis modicæ superingerendæ. At uero morbo in uigore cōstituto, apparente manifestissima cōcoctione, nullo uiscere laeso, adfuetis tempore sanitatis, etiam aquā frigidā exhibui duarū heminarū mensura, instante iam propè inuasionē, & reuera à multis rigore prohibui, non parum

sæpe

sæpe etiam febribus exemptis. Melius est aut etiam forinsecus calefacere corpus cyprino aut sicyonio, ante exacerbationes quidem, ut ne rigeant: sedatis aut exacerbationibus, ut ne ab extra allabentibus perfrigerentur. Dioscorides porro dicit prodesse his qui quartana tenentur febre, hæc in potu accepta etiã ante accessionem. Plantaginis radices IIII. siccæ tritæ in uino bibuntur. Verbenacæ rectæ quartus à terra geniculus tritus cū uino potatur. In tertiana uero tertius. Radicis item libanotidis drach. i. in uino exhibetur. Quod si oleo illeueris totum corpus, extremitates autem ex ungento aliquo ad rigores destinato inunxeris, & ægrum contectum quiescere siueris, non experientur rigorem.

Quotidianæ febris dinotio.

Cap. LXXXV

Quotidiana febris in pituitosioribus naturis cōsistit, & tēpore hyemis, & in humidioribus ac frigidioribus, cōstitutionibus. Et senes quoq; magis infestat & pueros, propter edacitatē, & præsertim eos qui in humidis ac frigidis regionibus degunt, & uitā ociosam agunt cū repletionē, atq; hoc magis ubi post cibos assidue balneis utant, & adhuc multo magis ubi ipsi cibi natura sunt pituitosiores, & inordinatus est ipsorum usus. Hæc igitur febris neq; cū rigore irruit statim in prima die, sed temporis progressu non rigor, sed circumfrigefactio ægræ concalescens ipsis accedit. In pullibus aut manifesta ordinis cōfusio, & inæqualitas adest, tempore irruptionis exacerbationis præsertim, & uelocitas ac uehementia motus ipsis non adest. Non aut exurit febris hæc ægros, neq; densam respirationem facit, neq; crebras efflationes, neq; frigida expetentiam excitat. Sed hæc febres minime siticulosa sunt. Vomunt autem pituitosa. Et quæ per uentrem inferni ipsis euacuantur, frigidiora, pallidiora, crudiora, & aquosiora omnino sunt. Exudant aut nequaquam in primis diebus, neq; ad perfectam febris quietem deueniunt. Albus est ipsorum color. Urinæ albæ & tenues in primis diebus minguntur, postea uero crassæ ac cōturbatæ. Hic humor quotidie exacerbatur, desinit aut in quietem febris nō integrā, uniuersum tēpus faciens horarū plerumq; octo & decem. Quapropter etiã amphemerina febris græcis uocatur, de ambabus enim participat, die ac nocte.

Quotidianæ febris curatio. Cap. LXXXVI

In quotidianæ febris curatione aceto mulso utimur in primis diebus, & his quæ urinas probè impellere possunt. Et tota diætæ forma secandi uim habeat. Circa uigorē uero uentri prospicere oportet, & præsertim ori ipsius. Et postea uomere à cibis & raphanis & purgatorijs pituita euacuātibus uti. Reliquā diætā ad cōmunes scopos respectu factio cōperies, ut scilicet attenuante diætā, & pharmacis incisorijs ac attenuātibus utaris.

De Epialis febribus. Cap. LXXXVII

Prædicti generis, pituitosi inquam, est & febris quæ priuatim à leni afflictione ne Epiala appellatur, quum simul & febricitant & rigent, & utrumq; percipiunt eodem tempore in omni corporis parte. Pituita enim acida, & uitrea appellata, citra febrem quidem, rigorem inducit. Si uero putredo aliqua moderata ipsis accedat, febrem epialam efficit. Si uero amplius putrescat, præcedit quidam rigor, sequitur autem febris, exuperata frigiditate à multitudine caloris, ut omnino non appareat iuxta augmenta & uigores exacerbationum. Fortassis aut & pituita uitrea acidam qualitatem habet. Curatio porro consimilis est his qui quotidiana febre laborant, in cisorio curationis modo amplius aucto.

Communia auxilia febrium per circuitum repetentium.

Dioscoridis.

Cap. LXXXVIII

In cōmuni ad omnem circuitū ac rigores utiliter exhibentur ea quæ sudores mouere possunt, & sunt hæc: Seminis smyrnii drach. i. datur potanda ex uino duab.

drab, horis ante accessionem. Item aristolochiæ drach. i. & iridis drach. ii. & cala-
minthes decoctū cū castorij drach. i. in quartanis & quotidianis. Chamædryos
item decoctū assidue potatū, quartanā & quotidianā soluere solet. Caroi quoque
semen, ferulæ semē, uerbasci radix, aut succus cū uīno. Aliud, quod ad omnem
circuitū, & maximē ad quartanas datur, duabus horis ante accessionem. Facit
& ad calculosos, ac dysentericos, & stomachicos. Est etiā anxiosus ac desperatis,
& lippientibus cōmodum. Seminis hyoscyami albi, seminis apij, seminis anisi,
styracis, singulorū drach. iiii. croci drach. x. opij drach. iiii. castorij drach. ii. myr-
rhæ drach. i. cū aqua ad fabæ ægyptiæ magnitudinem formato, & cum duobus
aquæ cyathis exhibeto. Aliud ad omnem circuitum. Aphrodæ. Seminis
hyoscyami, myrrhæ troglodyticæ, opij, styracis, singulorum drach. i. croci, zingi-
beris, aloës, singulorum drach. x. & obolos iiii. excipe melle, & exhibe nucis pon-
ticæ magnitudine, cum aquæ cyathis iiii. præ illitis extremitatibus ac cruribus, &
sine ut dormiant. Ego uero etiā castorij drach. i. adieci, & mirificē uim suam
declarauit. Vere etiā confidenter antidoto pæonia, & ea quæ ex sulphurē
cōstat. Miram enim efficaciam habent aduersus omnem circuitum, præsertim
quartanas ac quotidianas febres. Caterum quæ trita cum oleo illinuntur, pro-
sunt omnibus qui per circuitum exacerbantur cum rigore, fouent enim corpus,
& sudores mouent. Sunt autem hæc. Chamæmeli flos tritus, & in pastillos
efformatus, ac in umbra siccatus, & usu expetente cum oleo tritus ac illitus. Se-
men uiticis cum oleo, semen libanotidis, flos salis, nitrū, spuma nitri, baccæ
lauri, pyrethrum, smyrnij semen, hypericū, calamintha, canchryon, castorium,
conyza, costus, granū cnidium, cum nitro oleo & aceto, oleum amygdalinum,
cyprinum, irinum, gleucinum, chamædryos, staphis agrestis. Asclepiadæ un-
gentum ad accessiones cum rigore. Hoc sæpe tertianas depulsi inquit: Spumæ
nitri drach. ii. myrrhæ drach. ii. piperis grana xx. ceræ drach. iiii. olei cyprini
aut irini, aut gleucini, aut amygdalini sexuncem, liquefacta aridis ammiscen-
tur. Vfus est hora ante accessionem. Magis autem confricandi sunt pedes,
unde horrores initium sumere uidentur. Aliud ad tertianas. Granū cnidij,
spumæ nitri, piperis, æquales portiones excipe irrino, & ad frigmentitiā crassi-
tudinem redige, & utere extremitates leniter confricans. Hoc medicamentum
sudores ciet, & per duos aut tres circuitus sanitatem reducit. Aliud, ad quarta-
nas, tertianas, ac reliquos circuitus. Myrrhæ drach. viii. casia drach. x. pipe-
ris drach. x. ii. staphidis agrestis drach. iiii. nitri drach. iiii. ceræ sexuncem, Cypri-
prini aut alterius talis lib. i. Myrrham uīno dilue, & staphidem & reliqua contun-
de ac cribra, & cum myrrha tere, ac cerato affuso excipe. Vfus autem tempore
pharmacum cum pari cyprini portione illine.

De ignis sacri circa uiscera affectionibus.

Cap. LXXXIX

Fiunt aliquando ignis sacri affectiones circa aliqua uiscera, febrem ardentem
ac habitalem inducentes. Et si quidem circa uentrem fuerit ignis sacri, erysipe-
las græcis appellatus, febrem ex his accensam lipyriam nominant. Si uero cir-
ca hepar, urentem siue fumosam. Si circa pulmonē, algidam. Talis aut febris fri-
geficientibus ac humectantibus opus habet edulij ac potibus, & his quæ extrin-
secus imponuntur. Quū igitur febris habitualis aliū morbū ammixtū non ha-
bet balneo indiget, quemadmodū etiā aliæ omnes caliditates ac siccitates. Si ue-
ro affectio fuerit circa uiscera ignis sacri, a balneo quidē abstinere oportet in totū,
frigida uero in uigore morbi utendū est cōtentiosa, sic autē appellare solemus,
quum semel frigidissimam & multam damus. Ante uigorem aut frigida non

est

est danda, nisi ab ægroto cogamur, cui mos sit frigidam bibere, & qui sitim non ferat. At forinsecus imponenda sunt frigeficientia, & si nihil profecerint, tunc etiam frigida potus exhibeatur, aut edulia potius frigeficientia, conueniunt aut maxime lactuca humida ac dulces, pura frigida elota. Atque quidem acceptæ optimæ sunt. Si uero opus fuerit aliquando ad preces ægrorum, in suauitate ipsarum mitigare, acetum multæ aquæ frigida ammixtam, ad intinctum cōcedemus. Sit aut acetum exacte separatū ab omni uinosa qualitate. Forinsecus aut etiam ipse lactucæ succus aptus est. Imò etiam semperuiui, & intybi, portulacæ, atriplicis, solanici ac plantaginis, cum pane sicco trito, & modico bono rosaceo, & his quæ similiter resiccant. Optimū uero est id quo nos utimur, iuxta uyarum acerbarū tempus. Expressum enim ipsarū liquorem, in mortarium conijcimus cum portulacis uiridibus tundimus, & utrūque liquorem in uas mittimus, osculumque eius diligenter obturamus, atque sic uas in aquam immittimus. Melius autem est etiam niue uas obruere. Vfus aut tempore polentam tenuissimam ammisceo, & postea subigo ut liquidius euadat medicamentū, idque duplici linteolo infarctum præcordijs impono, non immorari sino, sed ubi tepidum factū fuerit tollo, ac alterū impono. Atque hoc semper cōsequenter facio, donec æger sentiat profunditatem quodā modo perfrigeratam, & à siti liberetur. Ammisco autem aliquando etiam oleum omphacinū, aut rosaceum, ubi circa præcordia fuerit ignis sacer, inflammationis naturam habens. Vidi mulierem supinam decubentem in terra & uoce destitutā, habentemque pulsum formicātem, unā cum manū ac pedum perfrigeratione. Putabam aut calidam esse affectionem. Nam simul cūre latis pessimis signis, densiorem uidebam respirationē factam. Hoc aut signū est magni doloris, ac calidi morbi in præcordijs ac thoracis partibus existentis. Dixit aut quidam ex astantibus se audiuisse mulierem dicere, quod arderet eius stomachus, & frigida potiois magnam cupiditatem haberet. Quapropter etiam in pauimento iacet, inquit, uenans frigiditatem. Itaque cōfusus dedi ipsi per cochliariū aquam frigidam, iterū atque iterum immittens ipsam ori eius uiolenter. Videbam aut labia ipsius placide aquā intus attrahere. Et ratiocinatus ipsam expectare frigida potū, propter insitam uentri feruidam affectionē, rursus amplius exhibui. Post hoc aut oculis quoque annuere incepit, indicans sic me facere debere. Accepta itaque cōfectione ex papaueris capitibus cōstante, diacodion appellata, parū de ea cum uino cnidio & aqua frigida, per cochliariū ori infudi. Et ex hoc nimirum paulò post sensim loqui cepit. Quare rursus amplius de hac potione dedi, uino emmeleo pro cnidio accepto, cū modica aqua. Ori item uentris semperuiuum & lactucam, cum pane trito & rosaceo imposui. Frigida aut hæc adhibui propter affectionis caliditatem, & tempus æstatis, donec frigiditatem abum de sentiret.

De colliuatione, Philagrii.

Cap. xc

Colliquatio nominatur quum excernitur quid per uentrem, non ex comestis aut cōcoctis, sed ex humoribus ex toto corpore in ipsum cōfluentibus, quod simile quidem est bili quæ assidue per uomitum reijcitur, ac per uentrem secedit. Differt autem ab ipsa foetoris graueolentia, & quod egestio fuluior apparet, & crassitudinem habet strigmentitiā, aliquādo etiā oleosam, aut adiposam: Colliquatio aut appellatur hic morbus. quoniam recēs cōpacta essentia pinguedinis ac carnis ab ardentissima febre dissoluitur ac colliquescit. Et ubi iam diuturnū est malū, etiā ipsarū solidarū partiū essentia ex parte eliquatur. Quapropter grauissima omnium est hæc febris, satis aut clarū est quod extinctorijs medelis utimur, ita ut ualde frigida aquā potandam exhibeamus, & cataplasmata & epithemata frigida

frigefacientia thoraci ac præcordijs imponamus. Et cibos humectantes ac frigefacientes demus. Dicitur autem de his in tractatione de febribus ardentibus. Dicitur item consequenter in sequenti capite.

De febribus quæ in calidis ac siccis temperaturis fiunt, citra inflammationem ac putrefactionem.

Cap. XCII

Quicumque temperatura bilioli, & habitu graciles & natura aridi, & stomachum subtili sensu præditum habentes, & qui facile in bilem efferuescit: hi ubi famem aut uigilias pertulerunt, aut nimium delassati sunt, & præsertim in perfectione ac æstiuo sole, aut tristitia affecti sunt, aut grauibz curis pressi, promptè ab horroribus ac febribus corripiuntur. Nam habitus in bilolis naturis, ob famem ac omnia relata, facile in bilem efferuescit. Et primum quidem in æqualitatem percipiunt, postea etiam horrorem. Et si quidem in motibus perseverarent, aut cibum non acceperint, statim febricitant. Mordaces enim humores ac uapores per sensitiua corpora delati, horrores ac rigores generant. Et propterea horrente ac densata cute, uelut quæ ex natura in his aridior est, cohibentur fuliginosæ ac fumosæ superfluitates, antea transpirare solitæ, & sic febrem accendunt, nisi talis cibum accipiendo uelut dixi præuerterit. Ostendi autem tibi aliquos qui sic febricitarunt, & maxime qui ex longo morbo se recolligebant. Ex quibus uni in foro obuiâ factus horrore incipiente, introducto ipsi in officinâ quandâ, panem ex uino diluto exhibui, & euestigio horrore sedauî, & febrem prohibui. Alios uero in suas domos abire festinantes, in principio horroris, aut paulo post nutriui. Et in summa, quibus adhuc sunt principij exacerbationum accidentia in talibus temperaturis, his omnibus panem ex uino diluto citò exhibui, & horrorem statim sedauî, & febrem prohibui. Quanto enim citius ipsos nutries, tanto magis febrē impedies. Si uero aliquando paulo tardius ipsos nutriui, febris quidē facta nō est. Calor autē modicus ipsis accedet, ut si diutius moreris nutrire, tali caliditate excalescet, ambiguū ut sit an febrē appellare ipsam oporteat. Si uero duæ horæ post horrore initium factæ fuerint, manente adhuc horrore etiam tunc nutrire oportet. Verum prædicere quod febricitant hi febre nō molesta, ad quā exudationes consequentur. Et hoc factò, & lauare oportet, & rursus nutrire. At postquā sedatus est horror, incipitque febris cū contractione, nō amplius nutriēdi sunt illo tēpore. Declināte uero exacerbatione statim alatur, & ne expectetur donec febris integrē quiescat. Detur etiā potus aqua calida in uigore amplior. In omnibus enim squalētibus affectionibus nō cessant exacerbatiōes priusquā aut balneis, aut alimētis humectantibus rigentur. Quosdā uero etiā declinatione incipiēte: Alios autē uigore exacerbationis instantenutrio. Fames enim in his tēperaturis, maxime febrientibus, nō simpliciter nociua est, sed si quid aliud perniciofa. Aut enim ex fame in ardētes febres incidūt, ex quibus si nō morte pręuēti fuerint, in habituales delabunt, & ex his rursus in tabē. Aut statim ab initio habitualis febris ipsis coincidit. Proinde à principio sic nutrire oportet eos qui talē temperaturā habent. Quā uero aut ex lassitudinibus, aut ira, aut curis pluribus, aut uigiliis, aut tristitiis, aut ex omnibus simul cōmissis, corpore uehementer resiccato, febris inuaserit, squalidā quidē habens cutē, ardentem aut caliditatem, timor profectò est talē hominem habituali febre corripiendū esse, & præsertim in æstate, & sicca ac calida constitutione. Opus igitur habēt tales humectantibus ac frigefacientibus edulij ac potibus. Qui enim temperatura calidi ac sicci sunt, hi etiam necessariò uires debiles habēt. Non enim fieri potest, ut corpus calidū ac siccū, ubi febris

x citet

citet vires ualidas habeat. Conuenit igitur quàm celerrimè per ptisanā succū, aut sorbitiōes ex alicā nutrire, & paululum panis insuper exhibere, atq; sic per frigida potum ægrum curare. Extinguitur enim statim ac sedatur febris perfrictē, si non inflammatio aliqua ipsi adest, neq; humorum putrefactio. Si tamē magnum detrimentum futurum coniectaris, exhibitionem eius inhibe, & per ea quæ extrinsecus corpori adueniunt ac abhibentur, curationem molire. Forinsecus autem adueniunt, aër nos ambiens, & quæcūq; humectare ac frigescere solent medicamenta. Et ad hæc aquarum dulcium balnea. Si itaq; ambiens nos aër temperatus fuerit, utendum est eo uelut habet, nihil amplius moliendo. Si uero aut multum calidus est aut frigidus calido quidem uice uersa excogitanda sunt subterraneæ domus, frigidaq; ac quæ uentis perflantur ad septentrionem conuersæ. Auras quoq; ipsis quasdam proprias excogitabimus. Aliquando ex Euripis in quos plures aquæ salientes se præcipitant. Aliquando aqua frigida ex uasis in uasa transfluente. Hæc uero statim etiā somnum conciliāt. Respergenda est etiā domus assidue frigida aqua pura. Et rosæ multæ, aut uitium pampini, aut myrtus per terram sternantur. Aut alię quædā plantæ frigefacientes. Arcenda est ab ingressu hominum copia. Nam & hoc domum calfacit. Si uero frigidissimus est aër, uelut in hyeme maximè, per regumenta corpus foueatur. Frigus enim densat ac constringit cutem, & humorū qui intus aduruntur defluxiones transpirare prohibet. Maiorem enim ex frigida inspirationē utilitatem fore noscendum est, quàm ea est quæ ex cutis perfrigeratione contingit. Similiter autem & in his quæ forinsecus imponuntur, eligenda sunt frigefacientia citra fortem adstrictionē, defatiationēq; ipsius cutis. Et non solū quæ frigefaciunt, sed etiā quæ cōpage corporis fuerint partium tenuium, quantum eius reperire est in frigefacientibus aut citra ammixtionem alterius uehementis qualitatis. Est autem simplicissimum medicamentum ex humectantibus ac perfrigerantibus, quod & ad ignem sacrum utor, & ad pudendorum inflammationes in principio. Ceram albissimam in duplici uase liquato, & in aquā frigidā diffundito, ac manibus emollito diu eam eluens. Deinde similiter ipsam liquatam, in aliam aquam diffundito, et rursus tertio idem facito. Ad hanc autem ceram sic lotam, rosaceum ex optimo oleo omphacino preparatum adjicito ut sit quidem ceræ unc. i. rosacei uero triens. Hæc similiter in duplici uase liquato, & ab igne ablata moueto, donec aliquantulum frigefiat. Postea in mortarium diffunde, & pistillo fortiter tere, aqua potabili ac frigidissima paulatim instillata quantum satis est, & tandem fictili puram aquam habente excipe, & aquam quotidie permuta. Hoc pharmacum tenui linteo inductum impone, nō super totum pectus, uelut quidam faciunt, neque super tota præcordia, sed illo maximè loco in quo multæ caliditatis sensus percipitur. Permutetur autem pharmacum semper priusquàm manifeste calefiat. Aliud epithema optimum. Rumicis acuti succus polenta tenui ammixta, duplicato linteo detricto excipiat, & frigidus imponatur. Facit & portulacæ succus, & semperuiui, cum uuæ acerbæ succo & polenta. Item tribuli uiridis succus, & polygoni, ac seridis, & lactucæ cum polenta. Sed & ipsa horum folia trita imposito. Bonum pharmacum etiā hoc est: Palmularum pinguium carnem exemptis membranis, cum posca meratiore ad flacciditatem usque coctam, & cum tenuissima polenta tritam impone. Si uero aridius hoc uidebis, ex prædicto cerato parū, aut rosacei optimi minimū quiddam ammisce. Bonum etiā pharmacum est rosarū succus cum tenui polenta.

Et ipsæ

Et ipsa rose trita imposita. Et hæc quidem assumimus multū frigefacere uolentes. Si uero moderatē hoc facere uoluerimus, non modica est copia emplastrorum leniter perfrigerare potentium. Ego enim noui, imposito aliquādo frigido medicamento præcordijs, hominem euestigiō difficulter spirasse: alium autem statim tussiuissē. Et paulō post amborum accidēs quieuisse, frigido phar maco sublato. Balnea porro dulcium ac calidarum aquarum, aut potius temperatarum, utilissima sunt omnibus siccam ac calidam temperaturā habentib. Lauandī aut sunt quemadmodū hectici, in secunda balnei domo, corpore ex aqua & oleo calido perfuso, & ipsis statim in temperata aquæ solium locatis. Deinde etiam in frigida solium. In frigida tamen moram diutius trahere non oportet. Si uero inflammatio alicuius uisceris accedat, balneū recusare oportet. Illud tamen nosse expedit, quod si quando inflammatio principalis partibus in talibus febribus ac corporibus coinciderit, omnino moriuntur. Et præsertim si pulmonis, aut membranæ costas succingentis, aut uentris, aut hepatis inflammatio fuerit. Nam quantum ad inflammationes harum partium attinet, minime nutrire oportet. Quantum uero ad uirium debilitatem, sæpe nutrire oportet. Quare necessarium est ut aut dum nō nutrimus, uires exoluamus: aut dum nutrimus, inflammationes augeamus.

De febribus Hecticis ac tabidis.

Cap. XCII

Hectica, hoc est, habitualis nominatur febris, quum ad tātam immodestiam uenerit caliditas præter naturam, ut in habitu sit ipsius solidæ essentiæ similis corporis cordis. Et propterea egre solubilem habet structuram. Primum igitur calor præternaturalis eliquat, & resiccat, ac consumit essentiam in partibus uelut ex humore concretam, qualis est pinguedo & caro: Deinde uero propriam humiditatem consumit, ex qua corpora nutriuntur: Quæ sanæ circūfusa est ac instar roris dispersa, circa omnes animalis partes. Hinc autem transit ad carnosum genus, quod fibris & membranosis partibus solidorum corporum insitum est, quod sanæ discindentes coqui tollunt, fibras uero abijciunt. Exactū autem eius cōplementum in hoc est, si ipsa solida similium partiū essentia sic cior facta est, quando & tabida febris uocatur. Duplex est aut genus hecticarū febriū. Quædam enim ex ipsis post febres ardentes plerūq; fiunt, aut usq; adeo in longum extētas, ut tēporis progressu humorē corporis cordis cōsumplerint. Aut manēte adhuc humiditate fiētes, et cordis corpus occupātes, hinc incendūtur: quemadmodū lucernarū flamma ex funiculo, superstitē adhuc in lucernis oleo. Et hæc quidē una est ipsarū generatio: Altera uero quā ab initio statim irruerint, primā generationē diarijs similē facientes, ob tristitiam, & iram, & lassitudinem ampliorem simul cū ardore factā. Has igitur non difficile est curare. Eas uero quæ in tabem procedunt, sanare impossibile est. Natura enim ipsarum calida est & sicca, simile quiddam patiente corde, quale quid patitur funiculus in lucernis: ubi plurimum fuerit exustus. Qui enim exustus est comminuitur, ut neque si largum oleum affuderis, luculētam flammā excitare possis. Proinde parua hæc & infirma flamma circumcirca tremit, semper amplius minor euadens, donec fuerit extincta. Facilis autem cognitu est hæc febris. Priusquā enim contigeris pulsus ac caliditatem, oculos immodicē cauos uidebis, uelut in foveis quibusdam sitos, & gramas in ipsis reperies siccas, et squalidam quandam affectionem, qualis his fieri solet qui per totum diem in sole æstiuo multum puluerem percurrunt. Perijt autem & ipsorum coloris uitalis flos. Et cutis circa frontem sicca est ac circumtensa. Et plerumque palpebris nitant,

stant, uelut somno grauati. Est autem hæc affectio non somnus, sed impotentia uigilandi. Et tempora sunt collapsa, ut loci caui appareant. Et quid aliud quam ossa & cutis sunt in totum? ut etiam si denudatum consideraues uentrem, neque aliquod intestinum, neque uiscus aliquod saluum esse putes, & præcordia uehementer retracta esse ad thoracem, & cutem totam siccam ac obaridam, & si distenderis digitis apprehensam, uelut corium quoddam producit. Febris itaque exacte tabida incurabilis est uelut dixi. Tabescit enim in ipsis totum corpus, instar arboris extreme arefactæ, aut ob flammæ uiciniam, aut ob uehementem ac immodicam siccitatem. Atque hæc est quam senectam ex morbo uocant. Tale enim corpus fit in his qui secundum naturam ad extremam senectam perueniunt citra febrem, paulatim extincto in ipsis infito calore. Verum eorum qui secundum naturam consenuerunt, mors sine molestia contingit, ob frigiditatem ac siccitatem imminens. Tabida uero febris non solum sicca, sed calida affectio est. Hæc igitur uelut dixi incurabilis est. Illud porro omnibus febribus hæcticis commune est, ut debiles sint & æquales semper, à prima die usque ad extremam respirationem. Maximum autem & minimum ambiguum naturæ ipsius signum habebis, si cibum homini præbueris. Alimento enim accepto accenditur calor, & pulsus augeatur ad magnitudinem ac uelocitatem. Et quod in ipsis contingit simile est ei quod accidit in calce ac lapidibus calefactis. Si enim frigidissimam aquam ipsis affuderis, multo calidiores apparent, uaporosa in ipsis caliditate, abhumida essentia irrigata. Donec igitur aliquid humidæ essentiae seruetur hæctica solum febris est: Quum uero in periculum uenerit, ut non amplius supersit aliquid humiditatis, exacta iam tabes, Marasmus græcis dictus, consistit. Nos autem earum solum curationem aggredimur, quæ sanari possunt.

Hecticarum febrium curatio.

Cap. xciii

Hecticas febres omni modo statim refrigeramus, priusquam progressæ in tabem desinant. Caput autem curationis ipsarum in humectantibus ac refrigerantibus consistit, tum his quæ foris adhibentur, tum quæ intra corpus accipiuntur. In quibus est & aer qui inspiratur. Omnes igitur hæcticos, etiam si iam principium tabescendi acceperit, absque hoc ut alia febris ipsis sit implicata, aut propter humorum putrefactionem, aut cum principalis partis inflammatio, confidenter lauato, citra omnem tamen laborem, ut ne uires exoluantur. Referatur itaque æger in lecto ad balneum. Præparata autem ipsi sindone calida, ipsa ad primam balnei domum gestetur. Sint autem quatuor qui sindonem teneant, in singulis angulis unus. Deinde in prima domo nudatus, ad secundam portetur. In qua toto corpore ex oleo tepido dulcissimo perfusus, ad tertiam domum feratur, & in solium locetur. Sit autem aer balnei temperatus, & humidus præparetur, parietibus aqua calida respersis. In ipsa uero solij aqua temperata abunde quiescat, moderatè in sindone uectus, nulla corporis perfusione fiente, neque item capitis perfusione. Hinc autem extractus à quatuor adolescentibus sindonem gestantibus, in frigidam aquam cōfertim mergatur, ne minimum quidem moræ in ipsa trahens. Statim autem alius paratam habens sindonem aliam, ipsi inijciat, et alius aliam simili modo, demissus autem in lectum, mollibus linteis lenissimè detergetur. Postea uero unctus et uestibus cōtectus ad domum in lecto referatur. Sit autem & domus balneo uicina. Eos quidè igitur qui iam tabescunt, lauare oportet uelut dictum est. Qui uero in hæcticis febribus sunt, nondum

dum tabescentes, hi etiam citra sindonem lauari possunt. Deferendi tamen & hi sunt ad domum siue in lecto, siue uehiculo quopiam, aut lectica: Deinde oleum ipsis infundendum, uelut dictum est. Et postea ad calidam aquam ducantur, ut in illa immorentur. Deinde ad frigidam prodeant, ut nullam omnino moram in ipsa trahant. Atque ita deterfi ac inuncti ad domum reducantur. De balneis igitur satis dictum est. Consequens est ut de alimentorum uiribus addamus. Quod quidem igitur frigidos & humidos conuenit esse cibos hecticis febribus profuturos, omnibus manifestum est. Tales autem sunt, pituitae succus frigidus accipitus, & alica uelut pituita preparata, conuenit etiam panis aqua frigida madefactus. Verum nullius horum frigiditas sincera sit, ueluti potus. Nam quæ bibuntur, & cito calefcunt, & meatus penetrant. Quæ uero eduntur aut sorbentur, diutius in uentre perseverantia, perfrigerant ipsum si immodice fuerint frigida. At ubi iam diuturna est febris lac asininum dandum est, diligenti animaduersione habita, ne in uentre in caseum coaguletur. Hoc uero aliquando etiam ipse eger nos docebit, ut qui suæ naturæ habet experimentum. Quandoque autem nos ipsos deprehendere oportebit paulatim ad eius usum progrediendo. Fugienda est autem quantulum eius fieri potest, mellis mixtura in omnibus hecticis febribus. Dandum uero est primum lac asinae in cubiculum adductæ, quo calidum adhuc lac potetur. Si quidem igitur probe fuerit concoctum, & non corruptum, copia eius augeri potest, ut in exhibitione cyathus dimidius addatur. Reliqua uero diæta facienda est, uelut in siccis uentris intemperaturis, uelut in proprio loco dicitur. Quanto autem hecticarum febrium caliditas maior illis est, tanto frigidioribus auxilijs opus habet, et diligentia ampliore, ut ne damnum aliquod consequatur, ex fortiorum auxiliorum usu.

De popularibus, passim uagantibus, ac pestilentibus morbis.

Cap. XCIII

Populares & communes morbos uocant eos qui simul multis hominibus coincidunt, quorum uelut generatio, ita & causa communis est. Communia itaque edulia praua, morbos communes pariunt. Item uitiosæ aquæ potus, & aeris immodicæ, & labores consueti relictæ. Fames, & repletio, præsertim ubi post magnam indigentiam, abundantia succedit. Sed & regionis natura sæpe communes morbos inuexit, aëre quem inspiramus a putredinosa euaporatione inquinato. Causa uero talis putredinosæ euaporationis, aut mortuorum multitudo est, uelut in bellicis contingere solet. Aut paludes quedam, aut stagna, aut barathrum aliquod profundum in propinquo, uenenosam ac prauam exhalationem remittunt. Hæc igitur assidue contingere solent. Sed & ambiens nos aer, temperamenta assidue peruertit, dum aut immodice calidior, aut siccior, aut frigidior, aut humidior euadit. Nam reliquis causis non omnes simul obnoxij sumus, neque per totum diem occurramus. Aer autem nos ambiens forinsecus omnibus circumfusus est, & per inspirationem trahitur. Necessæ igitur est ut ad mutationes eius, iuxta temperamentum ipsius coafficiantur etiam animalium corpora. Aliquando uero ambiens nos aer humidior ac calidior factus, pestilentem constitutionem inducit. Et quia sunt in corpore humores ex uitioso uictu ad putrefactionem idonei, principium fit pestilentis febris. Quare si quis moderatis laboribus, & uictu modesto ac castigato utatur, in totum illesus manet per omnes eiusmodi affectiones. Et nos sane hoc prænoscentes, statim incipiente tali constitutione, quæcumque corpora humida uidemus, omni modo siccare conamur. In his autem quæ natura sicciora sunt, pristinam naturam conseruamus. Quæ uero superfluitatibus redundant, purgationibus sanamus. Obturationes autem meatuum aperimus ac extergemus. Et in summa sanitatem corporibus

x 3 custodiui-

custodiuius, cōtraria adhibentes. Et quandoq; refrigerationibus usi sumus, si ita opus esset: quādoq; uero calfactorijs. Sed & rogo ingēti extructo & intenso, aërem ad caliditatē ac siccitatē transmutare quis potest, humidū & frigidū factum. quemadmodum Hippocratē Athenis fecisse dicunt. Itemq; Acronem Agrigentinum. De peste. Ruffi. Cap. xc v

Omnia horrendissima in peste fieri possunt, & nihil occultatur, uelut in singulis morbis. Plurima enim & uaria, fiunt, delyria uaria, bilis uomitus, praecordiorum distentiones, dolores, sudores multi, extremitatum frigiditas, profluuiā biliosa, tenuia, flatuosa, urinā, alijs aquosā ac tenues. Alijs biliosā. Alijs nigre, malas subsidentias habentes, & pessima ea quae in medio uasis dependent. Sanguinis narium destillationes, aestus in thorace, linguae torrefactae, uigiliae, conuulsiones uiolentae. Sed & ulcera praua & carbunculosa & pernicioosa, in peste fieri possunt, & in reliquo corpore, & in facie, ac tonsillis. Si uero solerti ingenio quis praeditus sit, futurā pestem praenoscet, attendens anni temporibus, quae & mala sunt, & in bruta animantia impetum faciunt. Si enim ambiens nos aer, pestis causa fuerit, uolucrum generis prior interitus erit. Si uero ex prauis de terra exhalationibus hoc contigerit, quadrupedum animantium prior corruptio fiet. Quum autem haec tecum expenderis, amplius etiam illud cogita, Quale est praesens anni tempus, qualistotus annus, hinc enim conperies quomodo uictus rationem optimē constituas. Verbi causa: Debebat esse, si recte res fieret, tempus siccum, nunc uero humidum factum est. At si quidem humidum factum est, necesse est etiam uictum resiccantem constituturē, quo excedens humiditas consumatur. Respicienda sunt etiam studia hominum, an non ad sanitatem conducant, & ea prohibere. Ventris quoq; cura habenda est. Si uero superior uenter pituitam habuerit, uomitu euacuetur. Quibus autē sanguis abundat, his uena secetur. Bona est & per urinas purgatio, & quaecunq; alia. Si uero aestuosus fuerit aeger, & flamma usq; ad pectus ascenderit, non fuerit alienum frige facientia pectori adhibere, & frigida potum dare, non paulatim exhibendo, uincitur enim ab ampliori in uentre caliditate, & plus nocet, ac amplius exurit. Sed & multa & acruatim frigida dada est, ut copia eius flamma extingatur. Si uero ardor occuparit interiores partes, extremitates autem & superficies frigida fuerint, & praecordia distendantur, & uenter colliquamenta partim sursum, partim deorsum mittit, uigiliae q; affuerint ac delyrium, & linguae asperitates, his calfactoria fomenta adhibere oportet, ut calor ad superficiem corporis trahatur, & quibuscunq; id fieri potest modis condum est, ut calor ex profundo ad externa educatur.

De his qui ob crudorum humorum multitudinem animolinguuntur. Cap. xcvi

Quidam febricitare incipiunt, ex magna crudorum humorum copia collecta, una cum hoc quod os uentris male affectū est, aut ex cruditatibus, aut alijs. His inflata sunt praecordia, & totū corpus maiore naturali molē habet. Et color alijs quidē albidior & aquosior fit naturali. Alijs autē nigrior ac liuidior euadit, quos plūbicolores aliqui appellant. Pulsus uero omnium minores sunt quam pro caliditatis ratione, obscurioresq; ac omnino inaequales. Siquidem igitur hi humores copia sua vires grauauerint, et crassitudine ac multitudine meatus animalis obturarint, multis de causis pernicioosa est affectio, et animi deliquitū inducēs, tum quod animal nō nutritur, tum quod suffocatur. Et quod temperamenti symmetria alteratur ac corrumpitur. Etenim crudi humores nutrire non possunt priusquam

priusquàm concoquantur. Multi uero grauant aut obturant transpirationes,
 & calorem extinguunt. Si uero neq; obturarint, neq; grauarint, hi animi deli-
 quia quas syncopas uocant, non inducunt, sed omnino animo exoluuntur ta-
 les, si nō frequentius alantur. Danda est aut̃ eis copia, non pro una uice, neq; ci-
 bi crassi aut uiribus frigidi, sed ex genere attenuantium & calefacientium. Sic
 etiam medicamenta ipsis danda sunt, quæ homo febricitans accipere potest,
 attenuantia ac calefacientia. His commodum est uinum aquosum album ac
 tenuē, nisi ualde febricitarint, quod tamen non adeo contingit in relata affe-
 ctione. Debiles enim sunt his febres, & adhuc magis si fuerint senes. Vinum
 autem dandum est ipsis ad singulos cibos, & potius ad uesperam & noctem,
 non mane & usq; ad meridiem. Iuuenibus uero non statim ab initio uinum de-
 tur. Nulli porro talium sanguinis ablatio citra maximum detrimentum fie-
 ri solet, etiam si euacuatione indigent. Imò neque uenæ sectionem, neque pur-
 gationem ferunt, qui sanè etiam citra hæc derepente animo concidunt. Quo-
 modo igitur hos sanare oportet? qui egent quidem euacuatione, euacuantia
 uero non ferunt nullum equidem inueni in his euacuationis modum præ-
 ter confrictionem. Incipere uero statim ab initio morbi conuenit, primum a
 cruribus supernè deorsum per lintea moderatè aspera. Deinde etiam totæ ma-
 nus confricentur, supernè deorsum. Postquàm autem artus satis calidi appa-
 rent, & timor fuerit lassitudinis sensum ipsis accessurum ob multitudinem fri-
 ctionis, oleo laxante utendum est, quale est quod dulcissimum est. Abstinen-
 dum autem ab omphacino, & omnibus adstringentibus, hyemis aut̃ tempore
 etiam discussorio utendum est, quale est oleum sicyonium, & chamæmelinū,
 aut aliud simile, uelut anethinum. Postea uero oleum detergeatur, & progres-
 sus ad totam spinam fiat, & hæc similiter fricetur, primum per lintea, deinde o-
 leo. Postea rursus ad crura progressus fiat, & rursus ad manus, deinde rursus ad
 spinam, ita ut per totam diem hoc agamus in domo lucem habente puram, &
 minimè humecta. Sit autem & caliditate moderata domus. Commodissima
 est his aqua mulsa, in qua coctum est hyssopum. Verum neque cibi, neque sor-
 bitio, neque aqua ipsis danda est, neq; permittendum ut large bibant, sed aqua
 mulsa sola utantur per primos tres dies, ita ut per successionem fricemus, & il-
 lud solum tempus remittamus, in quo somnus ipsos occuparit. Ad hūc autem
 conducit maximè amplior frictio. Sed neq; amplior somnus talibus cōmodus
 est, neque enim humores discuti permittit, et uiscera grauat. Vtriusq; igitur mo-
 deratis natura opus habet, somno & uigilijs. Siquidem igitur pulsus ipsis ual-
 de paruus & fortiter inæqualis est, extremū periculum imminet, et facere opor-
 tet quæ dicta sunt, nihil aliud curiosius conando. Si uero firmitatem & magni-
 tudinem moderatam habuerit, & non fractus neque mollis fuerit ac æqualis,
 uentrem considera, & clysterem adhibe confidenter, si non probè egestionem
 faciat. Contingit enim ex aquæ mulsæ potu, ut probè euacuetur omnis super-
 fluitas, quæ in primis uenis congregari solet, iuxta simas hepatis partes & me-
 senterium. Si uero superfluitatum impetus amplius quàm oportet in uen-
 trem fiat, primum amplius ipsam decoquito. Talis enim minus aluum subit.
 Si uero etiam postea superfluitas humorum amplius feratur, neque sic sistere
 oportet, sed pro aqua mulsa pristinæ succum dare. Si uero ferri adhuc perse-
 ueret, sorbitionem ex alica dato, pulsus nimirum in hoc sequens. Aliquan-
 do enim derepente mutantur ad debilitatem, aut inæqualitatem, aut paruita-
 tem, quo tēpore conuenit exhibere panē ex uino diluto, neq; uentre uidelicet,

neq; hepate inflammato. Nam si inflammatae fuerint he partes, corpore crudis humoribus repleto, desperatus est aeger pulsibus ita mutatis. In talibus igitur egrotis si mortem predixeris, & nullum strenuum auxilium adhibueris, te ipsum inculpatum seruabis. In quibus autem spes est salutis: Est autem in omnibus citra inflammationem ita aegrotantibus: quum a principio susceperimus ipsos, turpissimum mihi uidetur ut animo concidat aeger. Si uero perceperis aliquando crassos esse humores, semper acetum mulsum dabis pro aqua mulsa. Et si quidem aestas fuerit, & aeger frigida potor, huic frigidum acetum mulsum dabis, hyeme uero omnibus calidum. Aduersissima sunt his balnea, & aer nos ambiens multum calidus aut frigidus factus. Quare neq; lauare conuenit, & reclinare tempore aestatis in domo frigida, hyeme uero calida. Laiduntur enim ualde ex utroq; excessu. Nam in balneis, & aestate, & omni caliditatis incremento, crudi humores diffunduntur, & per totum corpus diffiunt, ut periculum sit etiam ad pulmonem & corporu eturos esse, & quandoq; etiam ad cerebrum recursuros esse. Melius igitur est circa hepar et uenas ipsos permanere. At uero in domibus immodice frigidis, & hyeme, & omnino in frigido ambiente, humores crudi incocti permanet, & obturationes hepatis augent et exacerbant, si paru fuerint: Si uero non fuerint, generantur propter crassiciem detenti ac impacti. A cataplasmatibus autem & perfusionibus abstinere oportet, donec multitudo partim euacuetur, partim concoquatur. Qui enim hac in talibus affectionibus adhibent, ipsi inflammationes per ea quae faciunt efficiunt, non animaduertentes praecordia laedi. Hac igitur facienda sunt a prima die, ubi ipse inceperis curationem. Si uero aut iam animo concidunt uocatus fueris, praecordiis non inflammatis, dabis ipsis panem non multum uino uuluo madefactum. Et si quidem fuerit aestas, aut regio natura calida, aut constitutio calida, cum aqua frigida: Sin contra, cum calida uinum dabis. Postquam autem sedatum fuerit eiusmodi animi concisus accidens, experiendum est ut calida potum exhibeas. Nam ad totam curationem melior est calida, crudorum humorum concoctionem adiuuans. Statim uero & in his ad frictionem deuenies, eo quo dictum est modo.

De his qui animo concidunt ob flauam bilem os uentris laedentem.

Cap. xcvi

Cap. xcvi

In quibus ob flauam bilem os uentris laedentem animi deliquium contingit, his exhi-
bendus est frigidus potus, sit tamen hic uinum calidum natura, fuluū, tenue, et uetus.

De his qui ob tenues humores animo concidunt.

Cap. xcvi

Qui ob tenues ualde humores animo concidunt, ut citissime tum per sudores tum per obscuram transpirationem exoluantur, contrario modo curentur his qui ob crudos humores animo linquuntur. Nos enim paulatim euacuamus, eo quod uires acuatam euacuationem non ferant. Qui uero ob tenues humores animo concidunt, paulatim assidue nutrimus. Si uero a principio hos exceperimus, uiribus adhuc robustis, non paulatim alimus: Possunt enim hi amplius alimentum semel exhibitum superare. Quemadmodum autem diximus priores perniciose affectos esse, ubi uiscus quoddam inflammatum fuerit. Eodem modo etiam hos incurabiliter habere putandum est, si aliquod uiscus fuerit inflammatum, uiribus iam languentibus. Neque enim possibile est ipsos assidue nutrire, sed in declinationibus solum. Neque si non nutruerimus possibile est ipsos seruare. In talibus affectionibus lethalis constitutio celerime fit in facie: Nasus acutus, oculi caui, tempora collapsa, & quae deinceps recensentur. Et siue amplius excreuerint, siue uigilauerint, aut tri-

aut tristitia affecti fuerint, si non citius alantur, statim talem faciem habent. Si igitur propter uigilias, aut tristitiā, aut ampliorem excretionem, tale factum fuerit, parum mali esse puta. Si uero citra hæc, perniciosum. Atq; hoc magis si statim à morbi initio sic habuerint. Non enim durabunt ad ipsius concoctionem. Nutrire igitur ipsos tunc necessarium est, & cutem ipsorum densare, & aërem domus frigidum præparare, uelut dictum est de his qui ex sicca intemperie febricitant. Vngendi quoq; sunt adstringentibus ungentis, & cibi exhibendi nō ualde promptè defluētes. Et neq; aqua mulsa, neq; pitana succus, eis exhibendus est, sed panes, et sorbitiones ex alica, & fructus austeri, ac ægrè corruptiles, tum per seipsi, tum cum pane et alica ex aqua cocta. Dentur etiam ipsi ouorum sorbilitum uitelli foli, & gallorum testes, & cerebella suilla probè assata, aut bene cocta. Nam crudiora extremè lædunt. Et in summa, omnia facienda quò crassior materia fiat, & cutis densetur, & transpirationes impediuntur. Prodest his uinum aquosum ab initio post cibos acceptum.

De alijs animi deliquij causis.

Cap. xcix

Sunt & aliæ quatuor causæ, ob quas homines animo concidunt. Dolor uehemens, uigiliæ, euacuatio immodica, & in delirantibus ipse motus. His quin tam si libet adde, principiorum intemperiem, Celerrima igitur perniciēs instat corde affecto, consequenter autem cerebro.

De dolore animi deliquium inducente.

Cap. c

Dolor est repentina temperamenti mutatio, et futura continuitatis solutio. Non enim quæ paulatim fit alteratio, animal dolore afficere potest. Apparet enim corpora non solum dum acuatim ad non naturalem habitum ducuntur, molestiam habere mutationem, sed etiam dum ad naturalem habitum reducuntur, nisi paulatim id contingat, dolore affici. Proinde eos qui in uehementissimo frigore iter fecerunt, acuatim calefactos dolore affici scimus circa uigum radices adeo ut ferre non possint. Quærimus igitur quomodo ægrotantes dolent, nullo forinsecus accedente ipsis dolorem inducente? Necessarium est in corpore talem quandam causam quærere, quæ calfaciens uehementer, aut perfrigerans, aut essentiam alicuius sensitiui corporis diuidens, angorem nobis inducat. Et primum sanè considerabimus cuius naturæ esse oportet id quod corporum diuisionem facere poterit. Necessarium igitur est aut rupturam, aut contusionem, aut erosionem esse affectionem, in qua continuitas diuiditur. At ruptura fit extensione, contusio ex grauitate, erosio ex mordaci qualitate. Quum igitur foris nihil fuerit quod dolorem inducat, aut tendens, aut grauens, aut mordens, sed ex seipso aliquid horum patitur corpus, omnibus nimirum manifestum est, quod ab aliquo intrinsecus fit. At tensio quidem ab essentia distendēte corpus ipsum cōtinens fieri potest, aut ab immodica siccitate. Contusio uero ab aliquo tumore duro adiacente. Morsus autem ab acri humore. Considerandum igitur est in doloribus, an sit humor multus, aut status transitum non habens, uelut in colitis. Aut grauis moles, uelut in inflammationibus & tumoribus induratis. Aut humor mordax, aut affectio sicca, uelut in conuulsis. Aut frigiditas uehemens. Aut caliditas. Et horum singulorum correctio ritè facienda est. Stupidus itaque dolor ex frigida fit affectione. Pulsatiuus autem dolor proprius est magnæ inflammationi. Si uero uelut ab aculeo infixio, aut uelut à cerebro perforari quis sibi uideatur, crassi intestini, quod colum nominamus, hæc doloris species existit. At uero in rheinibus cum grauitate quadam dolor est in uno loco firmatus,

matus, circum lumbum dextrum aut sinistrum, retrorsum magis. In colo uero dolor ex loco ad locum transit. Pungitius autem dolor circa membranas consistit. Qui uero profiliens dolor appellatur, contingit in uehementibus hemi cranijs, dimidia capitis parte affecta. Cognoscitur ex hoc, quod uelut à radice quadam, à primario affecta parte dolor initium fumens, celerrimè ad adiacentes utrinque partes fertur. Quapropter ad ambas extremitates contingentibus distentionibus, etià nerui ad utraque partem distenduntur. Minimè ad latitudinè distentos dolores nerui ipsi habent. At uero membrana subter omnem cutem distenta, tensiuos & stupidos dolores inducit. Quæ uero inter carnem sunt membranae, dolores uelut diuellentes faciunt. Sunt enim multæ, & inæqualiter insitæ, & forinsecus ipsam carnem ambientes. Caterum circumscissarum ossibus membranarum dolores profundi sunt. Et ipsorum ossium dolentium imaginationem inducunt. Quia igitur nulla externa causa doloris apparet, prægressam causam & diatam consideranda. Si enim fuerit præter consuetudinem ociosior, aut cibis pluribus homo usus est, aut multum nutrientibus. Aut consueta excretio suppressa est. Si quicquam horum, aut omnia apparuerint, multitudo est doloris causa. Et propterea quam celerrimè homo euacuetur. Si enim cum omni securitate tibi licebit his quæ fluxiones repellunt uti, in partibus dolore affectis. Si quidem igitur multitudo fuerit quæ distendit, uiribus fortibus existentibus, uena secetur, & ex magna uena inflammata aut dolenti parti propinqua sanguis auferatur. Si uero debiles fuerint uires, reuulsio fiat & deriuatio sursum, aut deorsum, aut utrinque, aut per frictions. Vitiosis autem humoribus solis infestantibus, purgatio fiat. Ambobus autem currentibus, utrisque euacuationibus utendum est, primum uenæ sectione, postea purgatione. Si uero his factis dolor remanet, manifestum sanè est circa partem affectam impactum esse id quod molestat. Manifesta est etiam curatio, per discussoria fiens medicamenta. Eodem uero modo etiam propter spiritum flatuosum, aut pituitam uiscosam fiète dolore, uelut in colicis per fomenta & irrigationes medemur. Si uero tumor grauens aut contundens, dolorem effecerit, tumor ipse curandus est per attenuantia ac rarefacientia. At si ob mordacem humorem dolor fiat, aduersissima his sunt attenuantia ac calefacientia, anethum autem ueride in oleo coctum, dolorem eximit, et somnum inducit si affecta pars oleo calido irrigetur.

De animi deliquio propriè dicto.

Cap. ci

Hactenus de animi deliquio dictum est, quod syncopen greci uocant, hoc est, animi concisionem. Tale uero quiddam est et quod propriè animi deliquium, hoc est, lipothymia uocatur, itemque exolutio. Et nomen quidem animi deliquij unum est. Causæ uero ipsius plures, & curationes iuxta singulas species. In tantum autem de ipsis nunc dicemus, in quantum quis his satis cognitis, resistere possit exacerbationibus derepente incidentibus. Differt autem animi deliquium à syncope, quod animi deliquium derepente incidit, sensu & motu hominem priuans, & omnino non sudant: Syncope uero, & uigilantes, & dormientes inuadit, & omnino cum sudoribus qui synoptici appellari solent.

De his qui ob uentris profluuium, aut sanguinis eruptionem, aut immodici sudoris euacuationem, animo

linquuntur.

Cap. cii

Qui ex bilis supernæ ac infernæ excretionibus, & alui fluxionibus, & alijs immodicis euacuationibus animo relinquuntur, his aqua aspergenda est, & natus apprehendendus, & eos uentris confricandus, & digitis aut pennis immixtis lanuandum

cinandum, & ad uomitum cogendum. Manus & crura pluribus & uehementioribus uinculis deligentur, manus in euacuationibus infernè fientibus: Crura uero in supernè fientibus. Auxiliatur etiam in talibus euacuationibus uinum aquosum uetus frigida dilutum. Balnea uero fluxionibus in uentrem commoda sunt, uerum his qui ob sanguinis eruptionem, aut sudorem immodicorum euacuationem animo linquuntur, aduersissima sunt. Adstrictione enim hi indigent et frigidityte, non laxatione. Vinum uero frigida dilutum uelut dictum est, etiam his commodum est. Neq; uero extremitates ligare conducit, neq; uomere, neq; omnino moueri. Sed desari his cõuenit ac frigesieri. Quapropter aërem domus frigidum paramus, frigidos uentorum flatus inducentes, & pauimenta adstringente qualitate sternentes, uelut myrto, rosis, pampinis uitis.

De his qui ob humorum copiam animo linquuntur. Cap. ciii

Qui ob humorū copiam animo linquuntur, plurimū fricētur & calefiant, & manum iuncturæ ac malleoli ipsis deligētur. A cibo uero & uino, ac balneis omnino arceantur, si febricitarint. In potu autem detur acetum mulsum.

De his qui ob quandam uteri affectionem animo linquuntur. Cap. ciiii

Similiter etiam hæ quæ ab utero affecto exoluuntur ex aceto mullo curanda sunt. Et crura fricanda ac liganda, maxime his quæ ab utero strangulantur, & in quibus retractus aut loco motus est uterus. Cucurbitas quoq; inguinibus a fororibus affigemus. Et naribus quidem odora menta graueolentia adhibebimus. Vtero uero beneolentia, & laxare ac calefacere potentia medicamenta admouebimus. At uero his quæ ob immodicam mensium euacuationem animo linquuntur, manus magis deligabimus, & fricabimus, & cucurbitam pectori affigemus.

Ad eos qui ob stomachi debilitatem animo linquuntur. Cap. cv

Ad eos qui ob stomachi debilitatē animo linquuntur, cataplasmatibus utemur ad stomachum roborantibus, ex palmulis, uino, polenta, croco, aloë, mastiche. Et irrigationibus ex absinthio, & oleo melino & mastichino ac nardino, & uino. Et si stomachus exuratur, ammiscenda sunt etiam frigefacientia, uelut effrauentorum cucurbitæ succus, aut lactucæ, aut portulacæ, aut solani, aut intybi, aut rumicis acuti, aut uuæ acerbæ. Hic autem non solum frigefacit, sed etiā adstringit. Prodest etiam generose ipsis extremarum partium frictio. Si uero ex horum usu melius habuerint, eos quidem qui stomacho exuruntur statim ad balneum ducere oportet. His autem qui quandam frigiditatis sensum habent, parum dandum est de medicamento ex tribus piperis generibus constante. Aut ipsum piper album.

De his qui ob uitiosos humores os uentris rodentes animo linquuntur. Cap. cvi

Quicūq; uitiosis humoribus os uentris mordentibus exoluuntur, his aqua calida data uomere iubeto. Si uero ægrè uomant, stomachus & pedes ac manus prius foueantur. Deinde digitis aut penis immisissis uomant. Si uero uomitus nō contingat, uentris excretionē adiuuare oportet glandulis subditis. Si uero ex his melius habuerint, comam absinthij in aqua mulsa coctam, bibendam dato, & omnibus modis stomachum corroborato, tum per ea quæ foris imponuntur, tum per ea quæ intra corpus sumuntur. Non tamē à principio hoc facere cõuenit, neq;

neq; absinthium præbere. Sed posterius post uitiosorum humorum euacuati-
nem, ubi iam pura facta fuerit aluus.

De his qui ob pituitā in stomacho collectā animo
linquantur.

Cap. cvii

Si pituita multa et frigida in stomacho collecta, exolutiones fieri cōtingit, sto-
machum oleo calido in quo absinthium coctum est plurimum rigabimus. De
inde aquam mulsam dabimus, in qua hyssopus aut simile quid commaduit, itē
acetum mulsam & piper, & pharmacū ex tribus piperis generibus constans, &
id quod diospoliticum appellatur. Et tota rationis uictus summa ad incisorium
ductum sit destinata.

De animi deliquio ob fortem frigiditatem.

Cap. cviii

Exolutiōes ob fortes frigiditates, similiter ut bulimo, hoc est magna fame ex
frigore oborta, correpti curentur, ita ut omni modo ipsos calefaciamus. Vi-
num igitur dandum est ipsis calida dilutum, & cibi calefacientes, Fricandi sunt
etiam ac fouendi iuxta ignem.

De animi deliquio ob multam caliditatem.

Cap. cxix

Qui ob multam caliditatem animo linquantur, aut in aëre suffocante uersa
sunt, aut in balneo diutius moram traxerunt, eos roborare oportet confestim
quidem frigida aqua aspersa, & uentilatione facta, & agre ad uentum conuer-
so. Fricandum est etiam ac lancinandum os uentris. Et consequenter ui-
num & cibi dandi.

De animi deliquio ob inflammationē, aut malignam febrem.

Cap. cx

Qui ob inflammationem magnitudinem, aut uehementis febris maligna
tem, animo linquantur in ipsis accessionibus, & artus perfrigeratos habēt, eos
fortiter fricare oportet ac fouere, & crura ac manus ipsorum deligare, & iubere
ut uigilent, & ab omni cibo ac potu abstineant. Optimum est autem in his præ-
nosse quod futurum est, & ipsum ante exacerbationem lenire ac mitigare.

De animi deliquio ob siccitatem.

Cap. cxi

Sed & eos qui ob siccitatem animo linquantur in exacerbationum princi-
pijs, optimum est prænoscere. Si enim duabus aut tribus horis ante accessione
nutriueris, & manus ac pedes ligari iusseris, non interibunt. Oportet autem ci-
bos esse concoctu faciles & stomacho cōmodos. Si uero etiam uehemens peri-
culū fore suspicaberis, panē ex uino dabis, aut alicā coctam uino infuso exhibe-
bis. Si uero modicam syncopā fore speras, uinum ne dederis, sed mala punica,
aut alia poma, & adstringentes fructus tibi amiscebis. At post exacerba-
tionem non est necessarium fructibus uti. His uero qui derepente in peri-
culum incidunt, uinum calidum dandum est, & panis, & alicā omnino modi-
ca. Si enim aut amplius dabis, aut cibos concoctioni resistentes, hi qui sic affe-
cti sunt suffocabuntur.

De animi deliquio ob principalis membri obturationem.

Cap. cxii

Qui ob principalis partis obturationem animo linquantur, his acetum mul-
sum dandum est, & potiones ex hyssopo, origano, pulegio & melle, & cibi inci-
soria ui præditi. Crassi enim & uiscosi magno his detrimento sunt. Quare ab
ipsis abstinendum est. Fricandi sunt artus & ligandi, & potionibus urinam
cientibus utendum, ex apio, petroselino, dauco, & similibus. Vbi uero manife-
sta consequitur utilitas, etiam uino aquoso ueterij utendum est.

De animi deliquio ob repentinam euacuationem.

Cap. cxiii

Si ob repentinam & aceruatim factam abscessus rupturam, aut sectionem,
aut

aut euacuatione, uelut in hydropicis, animi deliquium contigerit, statim quidem odoramenta reuocentur, postea uero sorbitionibus probe concoctilibus nutriantur.

De animi deliquio propter affectus.

Cap. CXIII

Si propter tristitiam, aut gaudium, aut timorem, aut iram, aut terrorem, exolutio fiat, per odoramenta, & narium ac oris apprehensiones reuocatos, ad uomitum cogito. De cardiacis & bulimo dicitur suo loco in stomachi afflictionum tractatu.

De capitis dolore in febribus.

Cap. CXV

In his quibus in febribus caput dolet, uitanda est multa lux; Laedit enim uisum, & membranas ad motum ducit. Utendum est autem frictione pedum, & extremitatum deligatione, ac constrictione. Vitanda est etiam caliditas à carbonibus, aut lucernis, aut sole & fumo. Item iniucundi & humiditate referti odores. Et clamores, & iræ, & frequens potus, ac collutio oris. Nam aut statim ab ore, aut humectio stomacho, uaporum multitudo ad caput deferitur, quod alias iam ignitum est. Maxime uero irrigationibus largioribus utendum est, ex oleo omphacino, aut optimo rosaceo, lanæ manipulo excepto, & digitis ex alio expresso, & instar salientis cum ictu quodam delabente. Quod si non resistat aer ambiens, frigida sit irrigatio, aut per se, aut ex nostro studio. Aucto autem dolore, etiam in aerem rosaceum fundatur. Si uero tempus permittat, & dolor cum ardore quodam immitatur, ocymi succus aut polygoni, aut mentæ, ex tertia aut quarta parte rosaceo ammisceatur. Et tunc etiam parum aceti ipsis diligenter ammisceatur, maxime in quo acetum fuerit coctum. Perseuerante uero dolore, ad uenæ sectionem deueniendum est, si nihil aliud fuerit quod prohibeat. Odoramenta quoque non incommode assumuntur, myrtus, rosa, pulgium. Cataplasmata uero conueniunt in sincipite ac fronte, polygonum tritum cum flore polentæ, & folijs seridis ac plantaginis. Si uero dolor uehementer incumbat, hyoscyami folia uiridia aut papaueris cum micis panis. Præstant autem amygdalæ amaræ madefactæ ac decorticatæ, & cum micis impositæ temporibus ac fronti. Optima uero est aloë fronti illita cum aceto. Aut crocomagma. Et intestina terræ trita illinuntur, & celerrime mirifice opitulantur. Venter porro in ipsis facile solubilis præparetur. Considerandum tamen ne stomachus uehementer infestatus, caput ad consensum perducatur. Et conandum ut quæ molesta sunt per uomitus euacuentur.

De uigilijs in febribus, Galen.

Cap. CXVI

Si uigiliæ nimium infestauerint, manus & crura deligari iubebimus, eo tempore quo ad somnum conuerti solent, & hortamur ut assidue aperiant ac claudant palpebras, donec satis fatigati fuerint. Deinde repente soluimus ligamenta, & tollimus lucernam, & multam quietem esse iubemus. Ex Herodoto & Philumeno. Puluaribus uigilantium subdantur capita papaueris, aut radices papaueris nigri, aut mala mandragoræ, aut hyoscyamus. Odoramentis autem utendum est, papauere uiridi, & lactucis, quæ meconitides appellantur, & menta, & coriandro ac rosas. Nos autem minus horrida faciei proluione utimur, incoctis in aqua calicibus papaueris nigri, & meliloto. Aut calamintha, aut pulegio, & melius facit. Odoramentum uero optimum hoc est. Papaueris albi calicum tostorum corticis, radices mandragoræ, æquales portiones terito, & uino ac paulo rosaceo subactas olfaciendas exhibeto. Suffumigio autem somnifico utendum est tali. Styracis, amomi, ammoniaci thymiamatis, bdellij scythici, corticis radices mandragoræ, opij, singulorum æquas partes

y præ-

præparato & suffito in lignis cupressinis. Mirificè facit etiam berenices suffuturum, similiter suffutum: Ducit enim ad somnum. Descriptum autem habetur in tractatu de theriacis, Sermonem inquam decimo tertio. Vngento uero somnifero utere hoc. Styracis sextantem, rosarum siccarum unc. i. seminis hyoscyami nigri, unc. i. baccarum myrti nigrarum unc. i. olei rosacei lib. i. Vini ueteris odorati quantum satis est. Contusa & cribrata terito cum uino, & adjicito oleum, & unitis utitor, illitis ex eo naribus intrinsecus ac extrinsecus, & fronte. Imponendum est etiam fronti serpillum cum meliloto in passo coactum. Item semen ocymi, & atractylidis semen, hyoscyami semen & folia, similiter & solani halicacabi, itidem faciunt. Illine etiam frontem ex cyphi cum uino, & crocomagmate. Si uero perseverarit uigiliarum symptoma, frontem & tempora aliquo pastillo dolorem eximentem illine. Et si nihil profecerit, prædicta rei difficultate, ad dolorem eximentia, in potu exhibenda procede. Est autem minus molestum, & sapore iucundius omnibus pharmacis somnificis, id quod ex calicum papaueris decocto ac melle componitur. Cuius compositionem paulo post in hoc Sermonem referemus. Vtere & cataplasmate optimè ex palmulis maceratis aut coctis in uino, & cum polenta tritis, adiecto modico rosaceo, aut melino, Pectori enim impositum quodammodo præparat ad somnum.

De graui sopore. Herodoti.

Cap. cxvii

Perfectam curationem eorum qui in grauem soporem delapsi sunt, in sequenti Sermonem de capitis affectionibus trademus, in quo etiam de phrenitide docuimus. Nunc autem dicere necessarium est quomodo quis urgentibus symptomatis resistere possit. Proinde spongia posca imbuta, non ualde frigida, faciem detergere oportet, & extremitates fortiter deligare. Odoramenta uero adhibeantur incisoria uim habentia & excitatoria, & maxime castorium. Et in exacerbationum remissionibus cucurbitæ dorso ac spinæ efficaciter affigantur. Perseuerante uero morbo, etiam sternutatoria in exacerbationum remissione adhibeantur. Cauendum autem est à lucernarum usu, Caput enim inde repletur. Sit autem & ciborum materia incisoria uel prædita. Habent autem uim excitandi etiam in ipsis, ea quæ sequenti Sermonem ad lethargicos describentur, tum per se, tum cum aceto naribus admota.

Quomodo linguæ asperitas in febribus curanda sit.

Cap. cxviii

Lingua in febribus aliquando siccatur, & opus habet humectatione. Aliquando uero exasperatur magis aut minus, & diffringitur, aut nigrescit, aut carbonis speciem induit. quod à uiscerum inflammatione contingere solet. Si uero ipsa quidem lingua, uelut dictum est, affecta fuerit, præcordia uero mollia reperiuntur, periculosum signum est. Humectare autem ipsam oportet, semine lini decocto in ore detento. Efficacius id erit si myxæ cū semine lini fuerint coctæ. Sed & digito in hoc succo madefacto linguam confricabimus, simul detrahentes etiam fordes dentibus adhaerentes. Deinde colluant os aqua pura, aut spongia pura detergeant. Deinde rosaceo diligenter illinantur. Sed & ipsum rosaceum melli ammixtum egregie efficax est. Et portulacæ succus in ore detentus, locos humectat. Et rhus culinarius aquæ, aut aquæ mulsæ ammixtus. Et prunorum damascenorum aut myxarum ossa in ore detenta mitigant. Sæpe etiam lactucæ caulem ad olivæ magnitudinem defectum, aut de symphyti radice, in ore tenendum dedimus, & quod oportuit fecit. Sint autem cibi more

mordacitatis exortes, & omnino non adstringentes, leuesq; ac forbiles. Si uero etiam præcordia inflammata fuerint, horum curationem facere oportet. Principium enim & finis interancorum lingua est. Si uero diutius durarit lingua asperitas, adipem anserinum si affuerit, sin minus, gallinaccum, aut qui adhuc præstantior est phasianicum duplici uasculo liquato, & digito in ipso intincto, linguam abunde fricato. Si uero adhuc perseverarit asperitas, butyro recenti similiter utere, facit optimè, sed in principio eo uti non conuenit.

Quomodo sitis curanda sit. Philumeni.

Cap. CXIX

Sitis duplex est, altera ob humiditatis inopiam; altera ob caliditatis redundantiam. In febrilibus itaq; ambæ affligunt. Nam caliditas in his multa est, & sic citas succedit, multa humiditate per uolentiam febris consumpta. Si quidem igitur sine detrimento bibere possent quando uellent, hanc sanè sitis medelam statim amplecteremur. Quandoquidem uero & mensuram & tempora potus decernere oportet, lenimenta quædam sitis excogitanda sunt. Nam intempersiue sumptus potus, nō solum sitim non extinguit, sed etiā uisce uersa auget. In principijs enim exacerbationū omnes materiæ febres accendentes, ad profundū declinant, & propterea sitim intendunt. Datus autē in illo tempore potus à materiæ multitudine superatur, & simul uitiatu accessio fit mali. Quare in principijs & augmentis potus exhibitionem prohibere oportet. In uigoribus autem, primum per gargarismos, & per collutiones oris, squallorem corporis mitigare oportet. Deinde declinatione incipiente potū dare. In remissione uero etiam nolentes aliquando cogantur potum assumere, ut ne humore indigi ad exacerbationis accessionem delati reliccantur ac exurantur. Mitigare autē aliquo modo sitim oportet olei frigidissimi irrigatione, aut rosacei instar salientis delabentis. Sed & auxilia ad febres ardentes relata, & ea quæ ad linguæ asperitatem dicta sunt in ore retinenda, sitim mitigant. Omnibus autem præstat lactuca semen cōmansum, & radix dulcis appellata, & cucumeris semen. Oportet autem post horum commanducationem collutionibus ac gargarismis uti. Sint autē & cibi omnes humectantes. Catapotion sitim eximens. Ex Dioscoride. Seminis cucumeris drach. viii. tragacanthæ drac. iiii. tragacantham tusam ac cribratam ouorum crudorum recentium candido dilue, & ex contritis simul catapotia efforma, eaq; in umbra sicca, & unum sub lingua tenendum præbe, ita ut dissolutus liquor absorbeatur. Dato etiam cremorem malorū cydoniorum absorberi dum, aut pisorum, aut omphacij succum, aut hydrosotum, aut mel rosaceum cum aqua calida. At uero in sanis, sitis ob siccitatem facta medela est somnus. Concoquit enim humores. Sitis autem ob caliditatem, medela sunt uigiliæ. Caliditas enim in uigilijs circa superficiem expāditur. Sitis uero ob caliditatem eduloriorum facta, aut ob multum uini potum, medela est frigida potus.

De aurium dolore in febribus. Philumeni.

Cap. CXX

Aurium dolor in febribus fit, & aut ipse febrem auspicatur, aut succedit, & periculosiores febres efficit. Succedunt dolori atq; inflammationi etiam uigiliæ. Si uero perseverarit etiam mentis emotiones. Hippocrates autem lethales fieri dicit in his dolores. Si igitur moderatus est dolor, & in principio, rosaceum tepidum auribus instilletur. Aut candidum & aquosum oui, cum lacte muliebri, forinsecus autem hapso lanæ oleo imbuto, in quo anethū coctū est, aures obturentur & integantur. Caput item rosaceo irrigetur, aut oleo omphacino. Si uero dolor amplius intendatur, & uenæ sectio assumatur, & aluus irritetur: Postea quoq; forinsecus per ambitū aurium cataplasma ex pane, aut semine lini impositum, natur,

y 2 natur,

natur, hyoscyami aut papaueris uiridibus folijs simul contritis. Butyrum autem pro oleo in cataplasma misceatur. At in dolorum exacerbationibus, foruendi sunt loci spongijs aqua & oleo calido imbutis, donec dolor sistatur. Vementer enim hæc mitigant, & rursus prædictum emplastrum imponatur. Instillandum est etiam auribus oleum amygdalinum, aut rosaceum, in calice papaueris ad calidum cinerem calefactum. Aut intestina terræ in rosaceo cocta instilla, Aut asellos sub hydrijs stabulantes, aut araneos.

Auris suppurata curatio.

Cap. cxxi

Suppurata inflammatione & eruptione per meatum facta, ubi lana specillo obuoluta pus eduxerimus, primū aqua mulsa eluimus: deinde uino mulso: Postea aceto mulso: deinde modica nitri spuma aceto mulso ammixta. In meatum uero indemus nostrum medicamentum lana exceptum, quod egregiè facit. Est autem alumen liquidum, mel, & rosaceum, æquis portionibus singula modice cocta. Optimè facit & Musæ pastillus optima sapa & modico aceto dilutus.

Cæterum de sonitu & audiendi difficultate, inter communia auxilia dicetur. Nosse tamen oportet pessimum signum esse in acutis febribus auditus difficultatem. Nam aut lethargum, aut mentis apprehensionem, aut parotidas perniciosas, aut aliud quoddam periculum minatur. Raro autem permanet audiendi difficultas in aliquo qui morbum superauit, sed simul cum morbo intercidit. Etenim aliquando per circuitum repetit in exacerbationibus augescens.

In remissionibus uero simul discedens. Quo contingente auditorum meatum uexare non oportet, sed solum caput irrigare cum his quæ in febribus ad capitis dolorem conueniunt.

De lippitudine in febribus.

Cap. cxxii

Si lippitudo in febribus fiat, abstinere oportet ab omni medicatione. Infundendum est autem oui tenue & candidum cum lacte. Et foris illinendum glaucium, aut Nili collyrium ex rosas, aut aliud quoddam ex croco, ex his quæ fluxiones repellunt cum refrigeratione. Si uero dolor uehementer uexet, fomentum fiat per spongijs, & hapsus lanæ ouo imbutus pro more imponatur. Si uero augeatur dolor, etiam panis imponatur, in calicum papaueris ac melliloti decocto madefactus, cum oui assati uitello, aut etiam cocti, addito modico rosaceo. Aut psyllium feruenti aqua madefactum imposito. Suppurata inflammatione collyrijs dolorem eximentibus utendum est.

De oculorum obscuracione. Philumeni.

Cap. cxxiii

Fieri solet circa morborum solutiones, aut etiam ubi uires recolligunt ægri, circa utrumque oculum aut circa alterum obscuratio, ut uix uidere possint, uelut per caliginem quandam. Et ut aliquando quædam ante oculos uideantur pilis similia. At dum oculi considerantur, puri apparent. Rarissimè uero in talibus circumstantijs, circulus pupillæ aut minor aut amplior reperitur. Ipsum porro obscuracionis oculorum accidens, ut plurimum seminis in somno effusione prægressa, iuxta morbi solutionem, aut refectionem euestigio incidit. Et est singnum debilitatis spiritus uisui ac neruossæ partis. Itaque in perfecta corporis conualescentia, etiam uisus actio integrè restituitur. Quapropter à localibus auxilijs abstinere oportet, & neque fomenta, neque illitiones adhibere. Verum resectorij totius corporis ductus usu, hoc ipsum accidens corrigere.

Fluxus

Fluxus sanguinis narium in febris, curatio.

Cap. CXXIII

Fluxum sanguinis e naribus in quarta die in febris fientem, pessimum signum Hippocrates dicit. Multitudinem enim significat in toto corpore, aut in capite. Destillat enim sanguis aut ob compressionem, aut ob densationem meatuum. At uero uberior excretio eius, multitudinem & laxare, & minuere potest. Paulatim igitur euacuationem facere oportet inde, unde natura impetum habet. Hac ratiocinatione facta, ausus fui in destillationibus in quarta die fientibus, per graminis cauliculum, uelut mos est uasa narium fauciare. Non autem oportet modico fluxu contentum esse, sed pro uiribus detrahare. Sufficiente autem facta euacuatione, consueti more eundem suppressere.

Vesicæ & urinæ difficultatis curatio in febris.

Philumeni,

Cap. CXXV

In principio pessimarum febrium etiam hoc accidit, ut uesica doleat, & paulatim ac cum dolore urinam emittat. Et hoc non solum molestum est, sed etiam signum quod tota pars neruosa doleat. Est enim totum corpus crudioribus humoribus refertum. Confluit autem ex ipso accruata multitudo in uesicam, quæ amplius distenta ad actiones suas inefficax fit, & periculum suppressæ urinæ inducit. Proinde imo uentri, pectini, ac inguinibus, lana pura oleo dulci calido aut sicyonio imbuta imponatur. Præstat autem rutam, & anethum, & apij semen in oleo cocta esse: Aut cuminum tritum lanæ inspergere. Si uero dolor augeatur, etiam cataplasmata post irrigationes adhibeantur. Et in intestinum rectum oleum & butyrum cum fœnigraci decocto infundantur. In mulieribus uero & in utero, & in intestinum rectum. Si uero inflammatio urgeat, & rubor cum multa caliditate in summo uentre appareat, etiam uenæ sectio adsumatur. Diæta autem sit tenuis & exquisita. Utanturq; ptisana, aut alica lota ex aqua mulsa, aut ouis forbilibus. Post hæc etiam micæ panis probè lotæ exhibeantur. Deinde de malua friabilis assumatur, & porrum capitatum pluribus aquis coctum. Et pisces tenerimi. Insectio quoque appareatur usque ad umbilicum & totos lumbos, ex artemisia, fœni graci, pulegij decocto, & oleo ammixto. Progressu uero temporis, castorium lanæ inspergatur. Cæterum potus ita affectis commodissimus est, post augmentum quietum, cucumeris satiui semen, quod præmaceratum decorticatur, & tritum datur cochlear, II, mensura cum aceto cyathis tribus. Et mouet quidem urinam citra molestiam. Dolores autem euestigio soluit. A reliquis autem urinam cientibus, quam diu febres perseverarint, in totum abstinendum est, ut ne urinæ copia ad uesicam delata, ipsam distendat, & malum augeat.

Lumborum doloris curatio.

Cap. CXXVI

Lumborum dolores fiunt plerumq; in febris prauis statim ab initio, & perma-
nentes maximas uexationes inducunt, & repente dissipati, periculosiorem
fore morbum indicant. Circa primos igitur dies irrigatione ex uino & oleo uten-
dum est. Deinde spuma niui, & uinum dulce mari mixtum, & oleum, simul
unita & lana sordida excepta, locis adhibeantur. Tales autem irrigationes uehe-
mentiam quidem doloris mitigant, dolorem autem non omnino tollunt. Pro-
gressu uero temporis uenæ sectione utendum est. Deinde cucurbitæ loco adhi-
bendæ. Postea cataplasma parabimus ex semine lini & fœno græco, & hoc in
facculum coiectum lumbis supponemus, ut super ipso decubitus fiat. Deinde
irrigatio ex oleo rutaceo fiat. Et cerata ex cyprino facta adhibeantur. Venter
autem à principio facillè solubilis per cibos paretur. Vehementer autem prodest

Y 3 ipsi

ipsis clyster, ex decocto cucumeris sylvestris & melle solo iniectus. Euacuat enim pituitam & citissime alleuat, nisi uehemens fuerit febris.

Ulcerationis circa os sacrum in febribus curatio. Philumeni.

Cap. CXXXVII

In diuturnis & aliis habitum eliquantibus febribus, consumpta carne, super nudis ossibus decubitus fit, & eminentes maxime ipsorum partes, dolores & aegre curabiles ulcerationes habent, eo quod per stratum trahantur. Non solum autem ob curationis difficultatem graues sunt ulcerationes: dilatantur enim & profundae fiunt, & crassa labia habent, proserpuntque & usque ad nuditatem procedunt: sed etiam notatae sunt a ueteribus, uelut haec affectio perniciem portendat. Quapropter antequam immedicabilis fiat, curationem eius aggredi oportet. Primum itaque ubi locus rubicundus & dolorosus fieri incepit, circulum laneum iustae magnitudinis loco subdemus, quod affecta pars per uacuum firmata, a compressione liberetur, & decubitus minime aerumnosus fiat. Postea uero ceratum ex rosaceo aut myrteo oleo paratum, quod recipit spumam argenti, cerussam, ordeumustum, imponemus, subiecto uidelicet ex lana circulo. Idem faciunt etiam omnia sedis celerata. Et adhuc magis id quod residet in aëreis uasis in quibus aqua coquitur, quod uelut testa adhæret fundis ipsorum, si cerato rosaceo ammisceatur. Reperitur autem eius copia in aëneis balneorum uasis. Item ceratum ex melle, quod quatuor haec aequaliter recipit, spumam argenti, oleum, cerussam, mel. Diluitur autem rosaceo, & mirifice facit. Adhibeatur etiam formentum per spongas. Si uero inflammatio fiat, panis cataplasma locis imponatur, cum solano, aut polygono, aut plantagine, aut brassicae folijs. Si uero pascendo proserpat, ulceratio, lenticula cocta cum malicorio imponatur. Utendum est & medicamentis ad nomas paratis, cum rosaceo dilutis. Item emplastro uiridi Epigonij. Et pastillo qui Corax appellatur, & Andronis aut Musae pastillo cum sapa. Contracta autem & repressa noma mitioribus communibus auxilijs utendum est.

Ulcerationis circa scrotum & anum, in febribus curatio.

Philumeni.

Cap. CXXXVIII

Saepe in aegrotantibus exulcerantur partes haec, quandoque ob solam negligentiam. Aliquando uero etiam a prauis & acris humoribus, & malignis febribus. Itaque reperire est ita affectos etiam mente laesos, & non percipientes dolorem, neque animaduertentes feruorem, nisi is qui curam ipsorum gerit ex odore cognoscat. Primum itaque per spongiam fouendus est locus ex aqua leniter calida. Deinde illinendus myrteo aut rosaceo oleo. Et postea scrotum myrto sicca leuissime trita conspergatur. Deinde ex candido ouo, cum cerussa & modico rosaceo aut myrteo illinatur, ut ne exarescat. Si uero illitionum inquinamenta non ferant, ceratum molle praeparetur ex rosaceo, quod cerussam & argenti spumam habeat, & uitellos ouorum coctos. Conuenit etiam ceratum Butyrinum, & quod ex anseris aut gallinaceo adipe paratur. Et emplastrum siue ceratum ex ordæo. Et omnia ad sedem parari solita. Si uero nome succedat, utendum est curatione in ossis sacri ulceratione relata. Cibi uero exhibeantur ipsis dulciores, pro facta de febribus coniectatione. Ventris quoque cura habeatur maxime locis circa sedem alleuatis.

Pustula

Pustularum in febribus curatio, Herodoti.

Cap. CXXIX

In febrientibus assidue fiunt pustulae circa labia & nasum, iuxta febrium solutionem. Verum in principijs febrium non simpliciorum, sed a pravis humoribus ortarum circa totum corpus exoriuntur uibices similes culicum moribus. In malignis autem & pestilentibus febribus exulcerantur, & quaedam ad carbunculorum speciem accedunt. Omnes autem multitudinis corrupti & habitus erodentis humoris signa sunt. Quae uero in facie oriuntur, omnium malignissimae sunt. Deteriores autem sunt plures quam pauciores, & maiores quam minores, & quae cito delentur quam quae multo tempore durant. Deteriores item feruētes quam quae pruritus inducunt. Et quae quidem succedunt aluo suppressa, aut moderatas egestionis faciente, bonae sunt. Quae uero fluente aluo & uomitibus uexantibus fiunt, male. Si uero succedentes aluum resiccent, bonae. Sequuntur ad pustulas, febrium malignitas & plerumque etiam animi deliquia. Eas igitur quae circa febriliu simplicioru solutiones fiunt circa labia & nasum, rosaceo illinere oportet per se, aut cum cerusa & spuma argenti. Cōfert etiam pastillus ex croco, myrrha, & alumine, quem iridem uocant. Et niger pastillus, qui recipit crocomagmatis, balauisij, atramenti sutorij, myrrhae, & aloes, singulorum partes aequales. Teruntur haec cum uino uelut collyrium, & in pastillos efformantur, & usus tempore cum aqua aut lacte illinuntur, aut cum uino, ubi ad strictionem augere uoluerimus. Agglutinantur autem haec post illitionem, aut sine hac, pellicula palmulae ossi adhaerente, aut membrana oui. At uero pustulae uibices referentes curentur uenae sectione in principio, si nihil impedierit. Solent enim reuersae intra corpus periculum afferre, si non per uomitus, aut per aluum acrimonia secedat. Quapropter etiam aluus per pisanæ succum, & oua, & oleum chamamelinum molliatur. Detineant autem uesperis infusum per totam noctem. Sed & ciborum contractione utendum est, quo undique multitudo tollatur. At in accessionibus propter succedentes circa stomachum uehementissimos morsus, aqua tepida data uomere iubemus, digitis aut pennis immisissis. Cibi uero exhibeantur contemperandi uim habentes. uelut est pisanæ succus, aut alica cum aqua mulla. Si uero febris ardens infestet, illinatur corpus aqua & oleo, nitro modico ammixto. Pustulas enim circa superficiem retinet, & materiam in profundo attrahit, & profunditatem refrigerat, & saepe sudores excludit, qui acrium humorum multitudinem in uaporem diffilare possunt. Ceterum in pestilentibus & carbunculosis, uenae quidem sectionem adhibemus statim in principio, non autem cibi contractionem. Fames enim peiorem materiam facit, & uires in his conscindit, quas integras seruare uolumus in omnibus febribus, maxime pestilentibus. Siquidem igitur admiserint loci, illinendae sunt pustulae pharmaco crasso, ex rosaceo & cerusa, & thure ac uino dulcissimo. Aut ex spuma argenti & manna thuris cum rosaceo. Reliquae uero partes cerato integantur ex eadem materia parato. Cōueniunt etiam ipsi omnia cerata & emplastra quae ambustis adhibentur. Et pustulas quidem circa faciem, calide prolutione mitigabimus. Quae uero in reliquo corpore sunt, per spongas diutius foueantur, maxime prurientes. Si uero serpentia fuerint ulcerum, etiam calcis uiue parum ammisceantur: mirificè enim resiccat, & serpiginem ipsam sistit. Quae uero iam depascunt, lenticula cocta cum malicorio ac melle, aut plantagine, aut polygono, aut rosis cum pane integantur. Bonum est etiam his caprinum lac, ad humorum prauitatem contemperandam. Oportet autem quartam partem lactis aquam ammiscere, & simul coquere assidue uersando, donec dimidium de toto superfit, quo neque in casei naturam transiens exacefcat, neque feru

uefactū nidorosum fiat, propter febrem detinentē. Declinatione uero facta, per medicamentū purgatorium idoneū materiæ euacuentur. Postea autē Antidorus theriaca detur, aut mithridatica, aut alia quædam ad lethalia uenena, & uirus euaculantia facta. Nam humorum fortis mutatio per corruptionem facta, ueneno pharmacō similis est. Fiunt porro aliquando pustulæ magnæ colore albæ, modicum pruritus inducentes, redundantes in scorbis, natibus, lateribus, & summa uentris plerumque parte. Origanum autem ex multa lenta & alba materia habent. Hæ uero cum toto corpore curantur. Neque enim grauem morbum minantur, si saltem modico uictu quis utatur. Quod si febres in his urentes fiant, commodum fuerit frigidam dare in exacerbationum uigoribus, morbo in uigore existente, nisi uiscera habeant quæ faciliè læduntur. Fiunt etiam aliquando pustulæ rotundæ, inæquales, subalbæ, aut subrubræ, cum eleuatione carnis. Aut uariis similes, qui in facie oriri solent, & duræ sunt, ac multum pruritus inducunt, ut uigiliarum causa fiant, dum indefinens adest cupiditas ad scapendum. Consequuntur autem hæ plerumque ad febres intermittentes, & minime grauem indicant morbum. Quapropter conuenienti tempore æger in solium calidum intentē insideat. Utendum est & his quæ foris illinuntur, uelut est oleum myrteum aut lentiscinum cum myrto, aut manna thuris, aut cimolia torrefacta, aut alumine liquido, aut farina fabarum. Aut sesamum tritum cum modico aceto illinito. Si uero pruritus urgeat, linteis crudis aut per spongas ex aqua feruente foueto. Si autem exulceratæ fuerint, utendum est ceratis ad ambusta destinatis, præsertim eo quod ex ordeo paratur. Porro quæ ualde rubræ sunt, pessimè existunt. His autem deteriores sunt liuidæ, nigræ, & tumidæ, similes existentes carnibus compunctis, redundant autem in facie & pectore, & uentre, lateribusque ac dorso. Tales à principio aggredi non oportet, sed differre. Si enim non successerit, in eum qui curationem aggressus aut pollicitus est, culpam incidit. Si uero permanserint hæ usque ad uigorem, & non progrediantur in peius, non omnino negligere oportet, etiam si raro, attamen aliquando opem ferre, & oportuno tempore medicamenta adhibere, atque magna animaduersione curare. Quæ enim post mortificationem superficiem ex alto emergunt, quid aliud significarint, quam uitam aliquo modo ab internis efferri.

De tremoribus in febribus, Herodoti.

Cap. cxxx

In maligis febribus fiunt tremores. Constantur enim ex uitato uictu, & frigida potu, & potu, ac multi uini, & ex immodico rei ueneræ usu, ac similibus. Abstinentum itaque est ab his quæ nocuerunt, & exhibenda quæ prodesse possunt. Necesse est autem omnino affectam esse in omnibus spinalem medullam. Quapropter tota spina contegenda est, & affectæ partes, lanis sicyonio aut potius gleucino imbutis; aut cerato liquidiori ex aliquo talium parato, aut ex oleo rutaceo. Rigandum est etiam caput in primis diebus oleo dulci. Si uero protrahatur morbus, anethino in accessionum interuallis. Deinde adhibeantur curbitæ à primo uerticulo usque ad lumbos, impositis cataplasmatibus ipsius paratibus unâ cum præcordiis, ex cruda ordeacea farina oleo & aqua diluta ac cocta. Integantur autem hæc lanis oleo ueteri aut sicyonio imbutis. Cibi exhibeantur sordides calidi. Prouidendū etiam ut faciliè solubilem faciamus aluum, permittendūque in hoc ductu, donec febres minuantur aut soluantur. Progressu uero temporis si perseverarint tremores, communis auxiliorum modus uelut in alijs tremoribus adhibeatur. Ita ut alterius in olei calidi solium locemus, & ante solij infessum & postea, sicyonio aut antiquo oleo illinamus. Aliquando etiam castoreum

storium ungento ammiscendum est. Si uero perseverarint dolores, etiam in potu exhibeatur castorium. Et ceratum imponatur ex ipso paratum. Et cōmunia ungenta ad resolutiones in usum assumantur.

De convulsionibus in febribus. Galen.

Cap. cxxxix

Convulsionibus plerumque fiunt propter repletionem nervosarum partium, quæ ratione etiam fortiter inflammatis accidere solent. Insuperque ob mordacem tenuem humorem, nervosas partes erodentem. Et propter fortem frigiditatem congelatio simile quiddam efficientem. Fit etiam convulsio ob excellentem siccitatem. Sequitur autem maxime ad perniciosas phrenitidas, & tum propter febris vehementiam, tum ob intentos & agrestiores motus. Et ex his qui sic convulsi sunt, neminem servatum esse ipse uidi, neque qui uidisset audiui. Proinde prædictæ tres convulsionis species sæpe curantur. Incurabilis est autem ea quæ ob nervosarum partium siccitatem. Aliquando uero in ore uentris humor tenuis, & acris, ac maxime æruginosus, convulsionibus fortes & syncopam inducentes efficit, ut frigida exudationes fiant. In his aqua tepida in potu oblata, digitorum aut pennarum immisione, uomitum mouemus. Si uero circa intestina morfus sensus contingat, pilularum succum per clysterem iniicimus. Damus autem cibos ægre corruptiles, uelut est alica cum mali punici granis, & similia. Si uero nihil tale fiat, convulsionibus per totum corpus fientes similiter ut tetanicos, qui antrorsum ac retrorsum conuellantur, curabimus. In partialibus uero primò partes contractas blandè cōrectabimus, & dolores ipsarum mitigabimus, molliterque fricabimus oleo sicyonio antiquo calefacto. Si uero adhuc perseverent, etiam castorij ammiscetur, & reliqua relaxantia ungenta adhibeantur. Qui uero ob siccitatem conuellantur, propter febris uolentiam, & præsertim delirio præsentem, his lauandum est caput multa calida dulci ac temperata aqua. Manus quoque ac pedes multa calida perfundantur. Deinde oleo dulci calefacto caput irrigetur, & manus ac pedes illinantur, & amiculis foueantur, & quies inducatur. Quod si sanguinis multitudo adsit, & convulsionem inducat, uena secanda est. Deinde cucurbitæ affigendæ cum scarificatione. Et si quidè crura fuerint contracta, postremo uerticulo cucurbitæ affigatur. Manibus uero convulsis, septimo uerticulo, & ei quod humeri articulo subiectum est cucurbitas affigemus. Si uero toto corpore ab affectione immuni, labium contrahatur aut palpebra, graue hoc accidens ducendum est. Detractiones autè sanguinis per cucurbitas in his fiant à ceruice & primis duobus uerticulis. Caput uero oleo anethino calido irrigetur. Vbi autem tempus balnei oportuni apparuerit, lauentur, & in aquæ potu adhuc seruentur. Si uero uinum exhibere opus fuerit, modicum & aquosum præbeatur.

De iucundis ac cōmodis potionibus in febribus. Philumeni. Ca. cxxxix

Duplex robur & admirandum simul auxilium exhibet, id quod etiam naturæ ob iucunditatem gratum existit. Venter enim ubi quod blandum est susceperit, & in se complexus est, tenet & probè concoquit pro uiribus, maxime si fuerit quantitate moderatum. Excitatur enim natura, & actiones sæpe ab affectionum feritate misere afflictas suscitatur, ac morbo repugnat iuxta duplicem modum. Ipsum quidem malum palam contrarietatis natura castigans: uires autem animal gubernantes cōsolans, & excitans, ac fortificans, ad superandum morbum. Omnes igitur homines ut plurimum dulcibus gaudent potibus, & præsertim si adstrictionem, & caliditatem, & quasdam eiusdem generis qualitates habuerint ammixtas. Quale est uinum dulce, & uinum mulsum. Verum hos potus non tantum est in febribus exhibere. At eos quos nunc referemus, etiam si magna animaduersio

uersione opus habeant, tutius tamen quàm prædictos exhibere possumus.

De potione pharmaci ex capitibus papaueris. Galeni. Cap. cxxxiii
Sumatur autem in manus medicamentum ex papaueris capitibus, quod optimum potu est iucunditatis gratia, & optimum ad calidas ac magnas affectiones circa uiscera consistentes, & totum corpus apprehendentes. Item febricitantibus, & cholericis in quibus bilis infernè ac supernè erumpit, affectionibus. Et his qui delirij in febribus ac uigilijs affliguntur. Prodest & tussi frequenti ex tenui fluxione factæ, quæ ex capite calidiore in pectus destillat. Preparatur autem hoc modo. Capita papaueris moderatæ magnitudinis decem numero unâ cum ipso semine, recentia, neque ualde mollia, neque dura, in aquâ pluuiæ optimæ sextario uno per diem ac noctem macerare oportet. Deinde ad ignem non fixum mantem coquere, donec flaccida appareant, & expresso liquore, & per panniculum rariorem excolato, mellis optimi despumati dimidiam aquæ mensuram amisce, & agitando coque ad compagē mellis Attici. Præstat autem per passum Creticum, aut per sapam, mellis loco præparare, ubi fluxus fuerit ualde tenuis. Ammisceo etiam aliquando ad hoc pharmacum glycyrrhizæ radicem, ut unâ cum papaueris capitibus coquatur. Si uero hæc non affuerit, succum ipsius siccum inijcio. Si uero continetur in pulmone humor delapsus educatione indigens, melius est per mel ipsum parare. Datur moderata mensura duorum cochleariorum. Auges autem & minues copiam, pro corporis magnitudine cui id exhibes, & pro ætate, animi tempore ac regione. In omnibus enim his ad frigiditatem declinantibus, minimum dabis. Ad caliditatem uero, plus. Sed & de stillationis quantitatis ac qualitatis respectu, plus aut minus dabis. Certè ex eo quod ex capitibus papaueris Thebaici præparatur, datur ad summum uncia unâ. Talis est descriptio Galeni huius pharmaci. Ego uero semper in usu eius quod ex passo præparatur perseuero, aliquando mel ammiscens ad eius exhibitionem, aliquando acetum mulsum, aut mel rosaceum, aut omphacomeli, aut aliud quoddam pharmacum hepaticum, aut splenicum, aut stomachicum, & uires eius ad præsentem semper affectionem transmutans. Exhibeo autem ipsum non solum somno indigentibus, ad uesperam, & ad tussim. Sed etiam infans laborantibus post uenæ sectionem, & febrientibus uehementer, & quibus os uentris intolerabiliter perustum est. & in igne sacro, atque aliâs calida affectione thoracis & pulmonis, hepatis item ac intestinorum & mesenterij. Et non solum semel, sed iterum, & non solum in febrium uigore, sed etiam ante uigorem, & ante manifestam concoctionem, in quibus uigilia, aut caliditas acris & magna hominem affligunt. Præstat autem ea quæ sexcenties feci in huius pharmaci exhibitione recensere. Etenim in febribus putridis ante morbi uigorem, & in his qui ex hepatis, aut splenis, aut pulmonis affectionibus ægrotant, acetum mulsum simplex exhibitioni eius ammisceo. In uigore uero febrili, omphacomeli, aut mel rosaceum adijcio. In rarioribus quidem corporibus, & qui os uentris debilius & non appetens habent, omphacomeli. his uero qui dulci potu gaudent, & qui medicatum aliquem humorum, aut biliosum, in uentre habent, uel rosaceum. Atque hæc quidem in febrilibus affectionibus. Urinæ autem stillicidium ex urinarum acrimonia abortum, magnifice sedat maxime in balneo, & ante balnei ingressum largè datum. In quibus etiam uictus ratio plenior & melioris succi esse iubemus. Sed & in nephriticis ac lumbis calidioribus medendi uim habet. At uero his qui urinæ profluuium laborant, & quibus bilis supernè & infernè erumpit, exhibeo frigida ammixta, præsertim in calidioribus temperamentis, Oportet autem in bilis supernè ac infernè effusione, hæc

ne, habitum corroborare forinsecus per adstringentes irrigationes, & similia, atque sic pharmacum exhibere, cum omphacomelite calido temperatum. Si uero thoracem humoribus repletum per tussim euacuare uolueris, acetum multum uariè ad eius exhibitionem ammisceto, & calidum exhibeto.

Omphacomelitis præparatio.

Cap. cxxxiiii

Botri uiræ acerbæ accipiantur qui iam maturescere incipiunt. Deinde in domo temperie moderata ad biduum uel triduum expandantur, & resiccati exprimantur, & liquor uasè uitreo excipiat, & optimi mellis despumati pars una, ad tres succi partes ammiscetur, & ad dies aliquot ad solem exponatur hoc pharmacum, donec feruere desuerit ac quieuerit. Deinde in domo superiore seruè ne putrescat. Hæc autem proportio tibi pro regula sit in optimo melle & optimo uuarum acerbæ succo. Augebis autem & minues quantitatem mellis, pro tenuitate aut crassitie succi. Utendum est ipso in tenuibus ac diuturnis uentris fluxionibus, ob calidas affectiones factis. Et in his quibus os uentris appetentiâ nullam habet, propter caliditatem. Et in his qui humectum stomachum habent, post uentris per uomitus euacuationem. Et in prægnantibus mulieribus, & quæ terram aut carbones, aut alia quadam aliena edunt, ubi per picram ex aloè purgationem feci, omphacomeli exhibeo. Bonum est & his qui ob excedentè uentris euacuationem animo linquuntur.

Mellis rosacei præparatio.

Cap. cxxxv

Mel rosaceum tres partes succi rosarum exunguium excolati accipit, & melis partem unam. Coquitur autem ad solem calidum expositum ad plures dies, eodem modo quo omphacomeli, & postea adseruatur. Si uero turbulentus fuerit aer, aut frigidior, quando mel rosaceum paras, ammixto optimo melle ad rosarum succum, & per rarum panniculum siue linteum excolato, simulq; ad lentum ignem coquito, donec quartam aut tertiam succi partem consumpleris, atq; sic exceptum medicamentum uelut dictum est adseruato. Et ubi calidiorè uideris aerem, uelut omphacomeli insolato. Adstringit equidem leniter, & propterea frigefacere potest. Habet & uim exterioriâ ex melle. Habet & subamarum quiddam, & leniter acre, unde ori commodum est calidam quandam inflammationem habentibus, propter calidi fluoris influxum, itemq; in acris ac biliosis fluxionibus in uentre, ubi uidelicet affecti prius uomuerint. Exhibemus etiam ipsum his qui uentre exuruntur, citra humorum superfluitatem, atq; hoc absq; uomitu. Item febricitantibus, uigore iam totius morbi instante, & particularis exacerbationis. Sæpe enim in febrilibus morbis etiam unica potio larga sufficit in conuenienti tempore data, ad affectionis solutionem, tum per sudorum eruptionem, tum per uentris subductionem. Inter reliquos enim potus mel rosaceum conuenientissimum est, his quibus acres humores per uentrem subire uelis.

Hydrososati præparatio.

Cap. cxxxvi

Rosarum recentium exunguium, & per diem ac noctem præficcaturum lib. i. mellis sextar. i. aquæ pluuiæ ad tertias decoctæ sextar. i. i. commisceto hoc modo. Aquæ pluuiæ sextar. ix. coquito donec tres reliqui fiant, & ad ablata ab igne aquam feruentem præficcatas rosas inijce, & uas pluribus operimentis probe contextum adserua. Sequenti uero die aquam excola, & rosas non expressas abijce, ut ne aspera aqua fiat, & coniecto melle in mortarium, ac probe trito, aquam cum ipso unito, & fistilibus uasis præsertim recentibus ac crudioribus excepta, ad paucos dies insolato, & in domo in qua uinum repositum est adseruato. Hoc multo magis quam mel rosaceum frigefacit.

Apome

Apomelitis præparatio.

Cap. cxxxvi

Apomeli sic præparare oportet. Fauos accipe melle plenos, colore quidem albos, uerum mel pellucidum continentes, & mel ipsum manibus exprime, & ad aquam fontanam optimam ammiscce. Et si quidem crassius fuerit mel, quatuor aquæ partes, ad unam mellis ammiscemus: Si uero liquidissimum fuerit mel, tres æquæ partes ad unam mellis adiicimus. Si uero sicciores tibi uidebuntur faui, ipsos in tenues partes cōminutos in mensuratam aquam mitte, & manibus sufficienter tere, exprime, excola, & metire, & cognosce quantum mellis addere oporteat. Deinde in ollam nouam mittimus, in qua prius aqua fuerit feruefacta, propter terream qualitatem, & ad ignem non fumantem coquimus, detrahentes semper inter ebulliendum insidentem spumam, aut cerosam partem. Postquam autem neq; spuma, neq; quicquam fecis superstitierit, & octaua aut septima pars de tota mensura decesserit, ollam ab igne tollimus ac frigesieri sinimus. Et post perfectam perfrigerationem, sequenti die id quod supernè fluitat detrahimus, & in uasa fictilia recentia ac crudiora transfundimus, & in uinaria cella adseruamus. Est autem apomeli exterforia ac incisoria ui præditum, & biliosa per aluum ducit, & ad urinam ciendam conducit, & febres putridas ad solutionem præparat. Calidis tamen & siccis maturis aduersatur. Et in morbis calidis, & præcordiis inflammatis nocuum est. Et neq; sitim sedat, imò etiam auget. Dandum est autem ante forbitiones. Nam post cibum datum nocuum est.

Hydromeli & crustuminati præparatio.

Cap. cxxxviii

Hydromelum sic præparatur. Succus malorum lib. vi, mellis lib. xii, aquæ ad tertias decoctæ lib. xviii. Alia præparatio. Malorum dulcissimorum & odoratissimorum, ac friabilem carnem habentium, corticem & interna grana detrahito, deinde contusa exsuccato, & succum per panniculum purum ac densiorem excolato. Sumito autem succi sextar. i, mellis sextar. ii, aquæ pluuiialis in coctura ad tertias redactæ sextar. iiii. Postquam igitur præcoxeris aquam ad tertias, adijce ad ipsam mel, & ubi efferbuerint simul, ab igne ablata quodammodo frigesieri sinito, & sic omni spuma detracta, malorum succum adiicito, & uasis fictilibus excipito, oblinito, & in cella uinaria reponito. Utimur autem eo post dies quadraginta. Quum autem rosas exungues ad hydromelum ammiscere uolueris, unciam rosarum per diem ac noctem in ipso macerato, deinde excolatū adseruato. Bonum enim colorem inde acquirit, & non accessit. Eodem uero modo etiam ex crustuminis, & alijs priorum generibus præparare potes.

Cydonati præparatio.

Cap. cxxxix

Præparatur etiam ex malis cydonijs magnis, cortice & internis granis exemptis, deinde contusis & exsuccatis, & succo per panniculum excolato. Sumatur autem succi sextar. iiii, Mellis sextar. vii, aquæ pluuialis ad tertias decoctæ sextar. xii. Primum itaque aquæ sextar. xxxvi, coquimus, & ubi reliqui fuerint sextarij xii, mel adiicimus, & quum ebullierint ablatam ab igne ollam aliam quatenus frigesieri sinimus. Postea detracta superstante spuma, succum cydoniorum adiicimus, & unita excipimus, ac uelut hydromelum adseruamus. Aliquando uero ut ne præparata potio corrumpatur in hyeme propter frigus, mel prius despumamus, & succum excolatum ad ipsum iniicimus, & in fictili oblito per totam hyemem seruamus. Postea in uere aquam ad tertias decoctū, uelut dictum est, accipimus, & mel cum succo ipsi ammiscemus, atq; sic utimur. Idem facimus etiam in malis, & crustuminis ac alijs piris. Quomodo uero præparauerimus cydonatum & hydromelum, & ante hyemem, & post hyemem in solamus

mus ipsum per dies quadraginta, cauentes ab imbribus ac ventis, & sic in uinaria cella reponimus. Melius igitur est præparare id quod cum melle seruatur sub caniculæ æstu. Potest etiam rosarum exunguium, & per diem unam siccatarum uncia una, ad sextarium mellis desumati adijci, & aqua uelut dictum est sub canis æstu coqui, & uniri, & sic excolari, ac per dies quadraginta insolari. Conuenit hoc quod ex succo malorum cydoniorum præparatur, morbis qui adstrictione & extersione opus habet, qui internis partibus exulceratis sunt, ore, stomacho, uentre & intestinis. Auxiliatur etiam scabiei in uenis. Et rhenibus ac uescicæ in quibus furfuraceæ ac squamosæ & capilliformes urinarum sunt subsidentiæ.

Aceti mulsi præparatio.

Cap. CXL

Acetum mulsum componitur ex optimo melle, & pellucidissimo aceto, ita ut sint mellis partes duæ, acetii pars una. Hæc proportio pluribus corporibus conuenit. Variari tamen potest semper pro gustus & temperamenti agroti ratione, ut habeat, quod blandum ac gratum est naturæ. Coquitur ad mellis cõpagem, & exhibetur calida temperatum. Potatum extergit uiscosos humores, & crassos attenuat. Quapropter uiscera omnia ab obturatione liberat, hepatis, splenis, uentris, mesenterii, & rhenes. Commodum est enim his, siue in febribus, siue citra febres detur. Aquæ uero multæ ammixtione, uehementia uirium ipsius exoluitur. Tussim autem mouere quæ non est, & intestiniradere acetum mulsum, Hippocrates & Galenus dixerunt, non in corporibus crassis & glutinosis humoribus refertis, sed puris & non redundantibus superfluitatibus. Aut his quæ ex tenui & acris fluxione laborant, & quæ nervosas partes ualde subtili sensu præditas habent.

QVINTI SERMONIS AETII FINIS.

INDEX EORVM QVÆ IN SEXTO AETII
Sermonē habentur.

| | | | |
|---|------------|--|-------------|
| De hydrocephala affectione. | Cap. i | tant. | Cap. xv |
| De phrenitide. | Cap. ij | Auxilia ad comitiales. | Cap. xvi |
| De lethargo. | Cap. iij | De his qui ex stomacho primario affecto, comitialis morbi modo conuellantur. | Cap. xvij |
| De catocchia & catalepsi. | Cap. iij | | |
| De caro. | Cap. v | | |
| De comate. | Cap. vi | De his qui ex parte aliqua habent morbi comitialis causam. | Cap. xviij |
| De uertiginosis. | Cap. viij | Curatio senum ac puerorum comitiali morbo correptorum. | Cap. xix |
| De infania. | Cap. viij | Curatio ualde senum comitiale. | Cap. xx |
| De melancholia. | Cap. ix | | |
| Curatio melancholiæ. | Cap. x | | |
| De infania lupina aut canina appellata. | Cap. xi | Curatio puerorum recens natorum comitiale. | Cap. xxi |
| De incubo. | Cap. xij | | |
| De morbo comitali. | Cap. xij | De fatuitate. | Cap. xxij |
| Quæ arguunt morbum comitalem. | Cap. xiiij | De memoria amissa. | Cap. xxiiij |
| Quæ collabentes comitiales excitant. | | De commorsis à cane rabioso, aut his qui aquam timent. | Cap. xxiiij |
| | | z De cere- | |

- De cerebri inflammatione. Cap. xxv
 De erysipellate cerebri. Cap. xxvi
 De syderatione. Cap. xxvij
 De resolutione. Cap. xxviii
 De supercilij aut palpebrae resolutione. Cap. xxix
 De conuulsione canina. Cap. xxx
 Linguae resolutae curatio. Cap. xxxi
 De instrumenti uocalis resolutione. Cap. xxxii
 Deglutitionis resolutae curatio. Cap. xxxiii
 Vesicae resolutae curatio. Cap. xxxiiii
 Colis resoluti curatio. Cap. xxxv
 Intestini recti resoluti curatio. Cap. xxxvi
 Cruris aut alterius cuiusdam membri resoluti curatio. Cap. xxxvij
 De conuulsionibus aut distentionibus. Cap. xxxviii
 De Tetano siue distentione & conuulsione. Cap. xxxix
 De capitis dolore distinctiones. Cap. xl
 De dolore capitis ex ardore aut caliditate oborto. Cap. xli
 De dolore capitis in febribus. Cap. xlii
 Ad capitis dolorem ex ebrietate, & meri potu. Cap. xliij
 Perfrigerati capitis medela. Cap. xliiij
 De capitis dolore à stomacho. Cap. xlv
 Quae ex natura capitis dolorem inducunt. Cap. xlvi
 Ad dolorē capitis ob plagā. Cap. xlvij
 De cephalaea. Cap. xlviii
 De hemicrania. Cap. xlix
 Communis curatio cephalae & hemicraniae. Cap. l
 Epithemata ad capitis dolorē. Cap. li
 Quae naribus indita caput purgant. Cap. lii
 Apophlegmatismi pituitam per os à capite detrahentes. Cap. liiij
 Smegmata & puluilli insperiles, caput densantes. Cap. liiij
 De alopecia. Cap. lv
 De defluuio capillorum. Cap. lvi
 Ad supercilia pilis denudata. Cap. lvij
 Tingentia ac nigrefacientia pilos. Cap. lvij
 Vt fului pili fiant. Cap. lix
 Vt albi pili fiant. Cap. lx
 Vt crispi pili fiant. Cap. lxi
 De his quae pilos corrumpunt. Cap. lxii
 Quae pilos extirpant. Cap. lxiiij
 Psilothra pilorum. Cap. lxiiij
 Quae pilos attenuant. Cap. lxv
 De furfurib. siue porriginē. Cap. lxvi
 De morbo pediculari. Cap. lxvij
 De Achoribus & reliquis pustulis capitis. Cap. lxvij
 Ad capitis scabriciem. Cap. lxix
 Ad parua & densa ac rubicunda capitis ulcuscula. Cap. lxx
 Resiccantia ac cicatricem inducentia achoribus. Cap. lxxi
 Smegmata ad achoras, furfures, asperitatem, & scabriciem. Cap. lxxij
 De aurium affectionibus. Cap. lxxiij
 Ad dolores ex frigidityte. Cap. lxxiij
 Ad dolores ex aqua medicata. Cap. lxxv
 Ad dolores ob humorum crassitudinem. Cap. lxxvi
 Ad aurium sordes. Cap. lxxvij
 De sonitu aurium. Cap. lxxvij
 Ad auditus difficultatem ac surditatem. Cap. lxxix
 Ad aurium inflammationes. Cap. lxxx
 Ad aures absq. ulceratiōe humectas, quae uelut exudant, & seorsum humorem excludunt. Cap. lxxxij
 Ad ulcera in meatu auris. Cap. lxxxij
 Ad corruptiones ac foetores aurium. Cap. lxxxij
 Ad superexcrecentes in aurium ulceribus carnes. Cap. lxxxvij
 Ad uermes in auribus. Cap. lxxxv
 Ad sanguinis ex auribus eruptiones. Cap. lxxxvi
 De calculis aut alijs corpusculis in auribus illapsis. Cap. lxxxvij
 Ad affectiones aurium extra meatum. Cap. lxxxvij
 De parotidibus. Cap. lxxxix
 De narium affectionibus. Cap. xc
 Ozanae

| | | | |
|------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|
| Ozænarum curatio. | Cap. xci | tur. | Cap. xcvi |
| Polyporum curatio. | Cap. xcij | De narium obturatione, & odoratus | Cap. xcvi |
| Ad ulcera in naribus. | Cap. xcij | oblacione. | Cap. xcvi |
| Ad sanguinis è naribus eruptionem. | Cap. xciii | De sternutatorijs. | Cap. xcviij |
| Quomodo sanguis è naribus elicia- | | Ad sedandas redundantes sternutatio- | Cap. xcviij |
| | | nes. | |

AETII MEDICI GRAECI CONTRA
CTAE EX VETERIBVS MEDICINAE, TETRABIBLI,
SIVE QVATERNIONIS SECVNDI, SERMO
Secundus, & ex ordine Sextus.

De cerebri, capitis, & neruorum affectionibus, aurium
item ac narium.

DE HYDROCEPHALA AQVOSA CAPITIS AFFE-
CTIONE, LEONIDAE. Cap. i



Ydrocephala affectio appellata est ab aquoso humore in ca-
pite collecto. Plerunq; igitur aquosus humor colligitur. Ali-
quando autem feculentus aut cruentus. Semper uero lentus
consistit, aut ex obscura, aut ex manifesta causa. Ex obscura
quidem, localibus uasis sua sponte rarefactis, & aquosa in
ipsis essentia, quæ cū sanguine permixta est, depulsa & in unū
locum cōgregata. Atq; ex huiusmodi causa aquosus humor colligitur. At uero
ex manifesta causa fit, uasis localibus ex plaga aut cōtusione ruptis, et sanguine
in ipsis prætereffuso, & deinde rarefacto, ac in essentiam feculentā, aut cruen-
tam dissoluto. Frequentissime uero fit hæc affectio ex tali causa in infantibus,
quum obstetrix functionis suæ inexperta, & durior manu rem tractans, cor-
pora aliqua in capite infantis attriuerit. Colligitur autē hic humor in hydroce-
phalis, aut inter cutem & membranā caluam ambientem, siue musculum
temporum. Aut sub membrana caluam ambiēte, inter ipsam & os capitis. Aut
sub calua, inter os & cerebri membranā. Maiores autem nostri dicunt etiam
inter cerebri membranā & ipsum cerebrum colligi, id quod perniciosum exi-
stit. Siquidem igitur lentus humor fuerit collectus sub cute extra membranā
caluam ambientem, aut inter hanc membranā & os capitis, tumor adest iu-
sta capitis partem ubi collectio facta est, concolor, citra dolorem, mollis ad ta-
ctum, cedens ac trāsiens ad digitorum contactum. Et siquidem sua sponte fiat
ab initio, doloris exors & concolor est locus. Si uero ex plaga, aut contusione,
primum quidem rubicundus & dolorosus fit tumor, postea uero lētescente hu-
more & in tenuem essentiam transeunte, tumor concolor citra dolorem eua-
dit. At ubi collectio sub calua facta est, inter os & membranā cerebri, ab ini-
tium modicus est humor, caput grauat, & uertigines assiduæ fiunt, & sen-
sus heberantur, uisus inquam, auditus & reliqui. Quum autem redūdauerit hu-
mor, futuræ capitis ob multitudinem disparantur, et propterea caput magnum
fit, & locus collectionis apparet. Humor enim ad digitum cedit. In commu-
ni igitur

ni igitur in collectione sub cute, & in ea quæ inter membranam caluam ambientem & ipsum caluæ os fit, iisdem aggressionibus utimur, ad humoris excretionem. Et si quidem paruus est tumor, apex ipsius unica sectione diuiditur: Si uero maior, duæ aut tres sectiones fiunt, aut plures iuxta magnitudinis proportionem, in locis ad effluxionem commodis. Non oportet autem uelut in abscessibus, post chirurgiam limniscos transnittere, sed ipsas solas sectiones linamentis disparare. Nam post humoris excretionem, corpora in his facile agglutinantur. Quapropter linamentorum usu in ipsis contenti sumus. Post indita linamenta, si infans fuerit cui chirurgia adhibetur, deligationem propter grauitatem recusamus, uerum lana ouo imbuta imponatur, & caput pileo contegatur. In robustioribus autem linamenta forinsecus custodiantur, & deligatio fiat. Poterit autem à tertia die cōglutinatio adiuuari, per emplastrum quoddam glutinatorium. Quod si sub temporum musculo collectio fiat, expectare oportet donec humor redūder, ut ne musculus incidatur. Et postea à lateribus musculi sectionem facere. Et si quidem humor in profundo sub musculo contineatur, duæ sectiones fiant utrinque à lateribus musculi ipsius. Deinde corporis scula securè per scalpelli manubrium exorientur. Post totius autem humoris excretionem, curatio fiat uelut dictum est. At si sub calua collectio facta fuerit, itidem expectare oportet, & quum redundauerit humor, & futuræ fuerint disparatæ, fastigiatum locum diffecare, & consequenter facere uelut in capitis futuris disparatis.

Dephrenitide. Ex Posidonio.

Cap. II

Phrenitis inflammatio est membranarum cerebri cum febre acuta, delirium & mentis percussione inducens. Raro autem ab initio phrenitis cum febre irruit, plurimis uero à quarta aut quinta aut sexta incipit, & adhuc serius, cum ipso ferme periculo incidens, ut iam aliqui septima, aliqui nona delirare inceperint. Differentiæ autem phrenitidis plures sunt, sed tres principalissimæ. Aut enim imaginatiua facultas solum læsa est, seruat autem ipsis ratiocinatiua & memoria. Aut ratiocinatiua solum læsa est, seruat autem imaginatiua & memoria. Aut etiam imaginatiua læsa est, seruat autem memoria. At uero ubi memoria deperdita est in febrilibus morbis, simul perit omnino & ratio, & imaginatio. Proinde anteriore cerebri parte læsa, imaginatio solum læditur: Medio uero cerebri uentriculo læso, ratio peruertitur. Posteriori autem circa occipitium parte læsa, perit memoria, & cum ipsa omnino etiam reliquæ duæ facultates. Quibus igitur imaginatio læsa est, hi iudicant quidem recte, imaginantur autem peruerse. Quibus uero ratio solum læsa est, imaginantur quidem recte, iudicant autem non recte. Quibus autem memoria læsa est, nullius antea factorum meminerunt, imò neque omnino recte imaginantur, neque iudicant. Conuenit itaque parti magis læsæ auxilia adhibere, & tamen neque alias negligere. De memoria itaque perdita priuatim paulò post dicemus. Nunc uero quomodo phreniticos curare oportet dicendum est. Aeger igitur decumbat hyeme quidem in domo tepida, æstate uero, frigida. Quies autem imperanda est & ipsi aegroti, & omnibus in domo, & uicinis. Et qui quidem ad lucem efferuntur, in tenebricosa domo decumbant. Qui uero ad lucis splendorem resipiscunt, in pricipida domo degant. Si quidem igitur phrenitis cum febre ab initio in prima die, aut secunda, usque ad quartam irruat, & non ex transmutatione alterius morbi succedat, & urinæ fuerint subseruentæ, & facies rubicunda, & ætas

ætas uigoris, & bona corporis habitudo adest, & omnia signa simul indicant sanguinis multitudinem, uena cubiti secetur, ea quæ media est, & pro uiribus detrahatur, & non usque ad animi deliquium. Minus autem quam oportet auferatur, ob plurimam quæ in ipsis ex uehementi motu contingit discussionem ac exhalationem, & propter lassitudinem. Sed & sectio moderata fiat, ut ne ager clanculum brachij uinculum exoluat. Consequitur enim periculum sanguinis eruptionis. Quod si ob aliquam causam, uenæ sectionis auxilium relinquatur per clysteres uentrem euacuare oportet, cum fursurum aut ptisanæ succo, modicæque nitri spuma ac pauco melle. Caput autem rosaceo magis tepido irrigetur. Nam cerebri membrana inflammata, frigiditas rosacei non est tuta. Imò neque caliditas. Frigidum enim densat meatus, & superfluitates in capite discuti non permittit. Quod uero ualde calidum est, seruorem duplicat. Quare æstate exacte tepidum rosaceum adhibendum est, cum modico aceto. hyeme uero moderate calidum. Commodum est & chamaemelinum ex æquo ipsi ammixtum, si ambiens frigidior fuerit. Si uero uehementius fuerit delirium, post factam euacuationem, uelut dictum est, per uenæ sectionem aut clysteres, capitibus papaueris in oleo coctis caput rigato, & faciem assidue proluui præcipito ex aqua, in qua papaueris capita sunt cocta. Fronte uero somnifero aliquo pastillo illine. Olfaciant etiam assidue somnifica, in præcedenti sermone conscripta ad uigilias. Et sub cervical capita papaueris subdantur, aut mandragoræ mala. At uero auctis malis, dandum est etiam somniferum ex capitibus papaueris pharmacum, cochlearij mensura plus aut minus, pro uiribus. Dandum est autem id quod ex melle præparatur, non quod ex passo, propter uinositatem. Detur autem hoc pharmacum in exacerbationis declinatione: Si enim datum fuerit in uigore, trahit quidem ad somnū, febris autem excitatur, & ager ad ambo partitus, grauius fert quod contingit. Dato uero pharmaco quiescere iube. Præstat autem mel rosaceum ad pharmacum ex capitibus papaueris adijcere, temperat enim acrimoniam, & aluium subducit. Quapropter etiam aqua quæ bibitur, mel rosaceum irrorare bonū est, in exacerbationis uigore. Ceterū assiduū usum stupefacientium pharmacorum, potionum, irrigationum ac illitionum uitare oportet. Facile enim in his qui immodice perfrigerantur, transitus fit à phrenitide in lethargum, quando etiam perniciosus fit morbus. Quare ubi delirium moram traxerit, serpyllum aut spondylium in oleo coquatur: Crassos enim uapores transpirare faciunt. Quum autem manserit facies etiam post uenæ sectionem, incontracta & rubicunda, cucurbitas occipitio affige, & moderatis uulnusculis impactis cutem scarifica, & ad libræ mensuram sanguinem detrahe. In cibo porro dandus est ptisanæ aut alicæ succus, aut micæ panis sæpe lotæ cum rosaceo melle. Mitigata uero febris, dentur oua sorbilia, & lactuca feruescens, quæcumque moderate humectant ac frigefaciunt, una quæ nutriunt, propter uirium debilitatem.

De lethargo. Archigenis & Posidonij.

Cap. III

Lethargi principio duo sunt. Quibusdam enim septum transversum et uiscerum primario affecta, cerebrum ad consensum ducunt. In quibusdam uero cerebrum affectionem auspicatur. Et quibusdam statim ab initio affectio incidit. Quibusdam autem ex mutatione alicuius acuti morbi. Nam à phrenitide maxime, in his qui per stupefacientia pharmaca perfrigerati sunt, transitio ad lethargum fit. Quin & à continente febre mutatio in lethargum fit sæpissime, item que ex alijs plurimis morbis, præsertim in quibus plures euacuationes

z 3 subsequatur

subsequuta sunt. Aliquando etiam in diuturnis febris, per circuitum contingit egrotos somno immergi, uelut in quotidianis fit & semiterianis, quandoque etiam quartanis. Et alij quidem cum conuulsione & contractione neruorum in soporem deferuntur. Alij pedetentim facta accessione. Et alij quidem unam immersionem sustinent, in quo extreme periclitantur. Alij in circuitibus in somnum deferuntur, & rursus reuocantur. Proinde considerare oportet speciem delationis in soporem. Qui enim per circuitum somno immerguntur, manifestiorem pulsum habent. Qui uero semper affecti sunt, minutissimum & aegre mobilem. Hi uero etiam dum excitantur, aliena loquuntur, & obliuiosi sunt. Qui uero per circuitum afficiuntur, nihil tale patiuntur. Et alij quidem cum grauitate & elata respiratione in somnum deferuntur, ut & stertant, & singultus ac suspiria edant dolorem indicantia, quem reuocati neque eloqui possunt, propter rationis laesionem. Alij uero quietissime dormire uidentur. Et alij quidem perfrigerantur artus, & rugosi ac pallidi sunt, & corporis miscella fere congelatur. Alijs uero diffunditur, & uelut rorem effundit circa exacerbationum declinationes. Qui igitur hac affectione occupati sunt, his haec adfunt. Praecordia reuelluntur, uenter contrahitur, & uolenter ab assidentibus excitati, rursus in somnum deferuntur, & obliuio ipsis. Nam dum saepe ad mictionem urgentur, porrecta ipsis matula, se in manibus ipsam tenere obliuiscuntur.

Aucto uero malo, totum corpus segne redditur ac uelut mortificatur. Supra ni autem decumbentes, ad pedes defluunt, distentis manibus ac cruribus. Nasus quibusdam destillat. Os ipsis hiat, & fortior eius hiatus succedit. Inferna mandibula uelut resoluta ac laxata uidetur. Atque haec quidem adfunt lethargicae affectioni. At uero curationem ipsorum aggredientes in domo lucida ad splendorem ipsos locamus. Sit autem domus tepida. Pedes & manus confricentur. Odoramenta excitatoria exhibeantur, uelut est castorium, funiculus lucernarius extinctus, pix liquida, bitumen, galbanum. Sufflata quoque lethargos excitat, lapis gagates, bitumen, castorium, peucedanum, sulphur, galbanum, sagapenum, cornu ceruinum, hirci sordes, abrotonum, silphium. Sternutatoria quoque naribus admoueantur. Si uero multitudo humorum in corpore est, si quidem sanguis fuerit redundans, uena secetur secunda die, & pro uiribus euacuetur. Si uero pituitosa & lentior materia fuerit, uelut in lethargicis redundare solet, attenuantia exhibere oportet, & quae crassiciem secare possunt, ita ut his quibus neruosa pars laesa non est, acetum mulsam exhibeamus. Quibus uero laesa est, decoctum apij, foeniculi, adiantij, & similium. Sed & alius efficaciore infuso eluatur, & glandes subdatur ex ruta, nitro, cumino, & melle cocto. Caput autem rigetur in principio quidem serpillum in aceto et oleo cocto. Verum in interitis affectionibus peucedani radicem pro serpillum in aceto coquito, & cum oleo capiti adhibeto. Bonum est ipsis & oleum irinum. Tremoribus autem & contractionibus succedentibus, castorium cum modico aceto terimus, & oleo addito caput irrigamus. Si uero praecordia sint inflammata, in principio cataplasmata adhibeantur, ex polline aut pane, & malo coroneo cocto, aut papinis uitis. In progressu uero, semen lini ad pollinem aut panem ammisceatur, & absinthium, & althaeae folia cocta. Postea uero ex ordeii farina, & foeno graeco, & althaeae radice cataplasmata fiant. Omnibus autem absinthium ammisceatur. Sit autem latum linteam, ut utrinque latera, et percutus sub mammis amplecti possit. Post cataplasma uero partes nudas sine re non oportet, sed cerato nardino aut cyprino contegere. Retro autem dorso ceratum ex sicyonio factum imponere, quod terebinthinam & baccas lauri tritas in farina habet.

habet. Et si quidem inflatio adsit, ammisceantur cataplasmatibus ea quæ flatus discutiunt, uelut sunt, cuminum, baccæ lauri, ruta, & similia. Si uero quid induratum fuerit, & libanotis addatur, & farina fabarum. At uero in diuturnis iam lethargicis uiribus præsentibus danda est hiera ex colocynthide. Et sternutatoria adhibenda, ex ueratro albo, struthio, pipere, castorio. Et naribus infundendum elaterium cum lacte, aut cyclamini succus, aut ipsa radix sicca trita infusillanda, & ori ac palato sinapi cum melle illinendum. Deinde occipitio curbitæ affigenda cum multa flamma, item circa primum & secundum uerticulum, sanguis que detrahendus ex posteriore capitis parte. Postea derafis capillis capitis sinapismus adhibendus ex caricis cum sinapi aceto macerato. In tremantibus uero etiam castorium sæpe potandum detur. Affectione autem declinante æger ad balneum ducatur, & sinegmate mordacior utatur. Velut est sex uista, sinapi, pyrethrum, piper, baccæ lauri, calx uiua, nitri uero duplum adijciatur. Cibi porro sint tenues & incisorij ac resiccantes. Et cum condimentis parati, apij, anisi, cumini, pipere & baccis lauri. Et ex uolucris conueniunt, gallina domestica, columba, auicula montanæ, & perdix. Ex piscibus, petrosi. Ex oleribus, porri, asparagus, petroselinum, chamædaphne. Vinum aquosum, tenue, album subadstringens. Sed & reliqua curatio iuxta eundem modum fiat.

De catocha & catalepsi.

Cap. IIII

Mediam inter phrenitidem & lethargum affectionem reperies, quæ species est delirij siue amentia. Medici autem catocham & catalepsi, hoc est mentis occupationem & apprehensionem uocare solent, ex humore atræ bilis magis cõtingens. Periculosior est aut hæc affectio quàm lethargus. Verùm in febribus lethargo similibus consistit, & aliquando dormire, aliquando uero palpebras apertas habet, aut nictant, aut intetè uident, & uelut fixos oculos ac palpebras habent, & penitus immobiles, adeo ut neq; si quis manum oculis ipsorum obtendat, eos claudant. Voce insuper ac sensu priuantur, neq; audientes neq; respondentes. Admauent aut manus suas aliquando ad caput & oculos ac nares, uelut qui uellcentur, atq; hoc non sentiunt. Pulsus sunt parui, languidi, ferme deficientes. Spiritus aliquando densus, aliquando rarus. Et per interualla quædam magnum spiritum ducunt. Aluus & urinæ supprimuntur, non præscitate. Habent enim multum humorem, sed propter sensum stupiditatem. Græmque his subarida in angulis oculorum fixæ sunt. Et aliquando uicinos parietes attingunt. Et in summa, neq; phreniticis omnino similes sunt, neq; lethargicis. Quædoq; etiam ob sanguinis multitudinem confertim caput occupantis & ipsum superimplentis fit hæc affectio: quemadmodum uidimus in adolescente quodam multo sanguine referto. Qui quum triduum exegisset, neq; claudens palpebras, neq; ad uehementes uociferationes transmutans oculos, neq; respondens, quarta die sanguinis eruptione larga per nares facta, ab omnibus molestijs cõfestim liberatus est. Quare si æger multo sanguine refertus appareat, citra dilationem uenam supernam in cubito seca, & pro uiribus detrahe. In alijs aut primū uentrem per clysterem eluere oportet, simpliciore infuso immisso uelut est fursurum succus cum spuma nitri & melle. Postea uero etiam polypodij radix cum fursuribus coquatur. Caput autem primum irrigetur oleo dulci tepido. Deinde si caput calidius apparuerit, caput papaueris in oleo coquatur. Si uero frigidius, serpillū. Et si quidem facile solubilis fiat aluus ex prædictis infusis, in ipsis perseverandū est. Si uero sistatur, ueratri nigri radix cum fursuribus coquatur.

potus ipsis cōuenit apomeli, aut aqua mulsa pro tempore diutius cocta. Quod si urīne crassae fuerint, etiam anethi & api decoctum detur. Cibi sint, ptisanæ succus & similia. Aqua his aduersatur, auget enim inflammationem, & fluctuationes facit, & splenes excitat, & sitim non sedat. Totum autem corpus oleo anethino inungatur, maxime hyeme. In quibus uero etiam tremor succedit, castorij drach., i. cum aqua mulsa ori infundatur.

De caro. Posidonij.

Cap. v

Quum frigidi & humidi humores cerebrū occupāt caros appellata græcis affectio succedit, hoc est, capitis percussio, cum debili febre. Consequitur sensum stupor, & totius corporis immobilitas, cum principalium actionum læsione, oculi uero ipsorum semper sunt clausi. Differt autem caros à lethargo, quod lethargici interrogati respondeant, & non omnino sine uoce decumbant. Verū qui in caron collapsi sunt, somno profundissimo detinentur, ut dum punguntur sentiant quidem, non tamen loquātur, neque oculos aperiant. Curandi uero sunt & hi similiter uelut lethargici, ita ut magis incisorium & attenuatoriū curationis ductum faciamus. Stomachi quoque cataplasmata, una cum hoc quod calefaciant, etiam corroborandi uim habere oportet.

De comate. Posidonij.

Cap. vi

Soli uapores calidi & humidi, & subiectis partibus ad caput in febribus delati, et ipsum implētes, affectionē faciunt, quā Medici coma nominant. Cognito scitur si somnus amplior naturali fiat, & in somnis peregrina loquūtur, et corpore inæqualiter habent, & infernā mandibulā inter dormiendū laxatam. Et saepe excitati cōfertim rursus in somnū deferuntur, & caput humidius habet. Curantur ex irrigatione rosacei, aut chamæmelini cum aceto. Sit autem acetum acerrimum. Si uero frigidius appareat caput, anethinum cum oleo dulci ex æquo permixtum ac calefactum adhibe. Et in summa, in quantum intenta est frigiditas, in tantum calefactoria augeantur, ut etiam pulegium aliquādo & rutam in oleo coquamus. Glandes quoque sedi subdantur, quæ multū irritare possunt. Nutriantur autem ptisanæ succo, & apomelita.

De uertiginosis. Archigenis & Posidonij.

Cap. vii

Vaporibus calidis & acris ad caput delatis, & animalem in cerebro spiritum euerrentibus, primum hebetudines quædam in oculis fiunt. Postea etiam aurium sonitus assidui, & auditus grauitates, atque hæc maxime cōtingunt circa ciborum coctionem, & ubi ex somno exurgunt, augeſcente affectione, uertigines & obtenebrationes oboriuntur, ut putent se uidere omnia circūuerti. Cōtingit hoc etiā ubi confertim ex sellis surrexerint, cruditate quadā prægressa. Perseuerante uero diutius malo, ex facili occasione uertigine afficiuntur, ut etiam concidant aliquando, maxime ubi in circulum circumuertantur. Nam quod alijs ob multas circuitiones cōtingit, hæc illis ex una. Sed & si alium quendam circumuerti uiderint, uertigine afficiuntur, aut si trochum, aut tale chum qui circumuolutatur allabens mouetur, & simul cum illo circumfertur. Atque sic inæqualem & turbulentū ac inordinatū humorem, ac spiritus motum efficit. Facile uero corripitur hac affectione quibus cōsuetæ excretionēs sunt oppressæ. Sed & cruditates & ardores assidui, & ebrietates, affectionem hanc efficiunt. Consequitur & alui suppressio, & propterea multa inflatio, & urinarum tenuium ac paucarum excretio, materia ad caput accurrente. Graciles autem in totum ferme sunt, & pigri ad omnem aggressionem. Siquidem igitur

igitur ea quæ oculis obuersantur sanguinolentiora se uidere putant, ad insaniam magis apti sunt. Qui uero purpurea uident, ad morbum comitalem. Si igitur uires robuste fuerint, et nihil aliud aduersetur, uena secunda est, siue principium affectionis fuerit, siue tempus iam progressum fecerit. In uenæ autem sectione uitandum est ne acuatim euacuemus, eo quod ex qualibet occasione concidant. Quare pluribus detractionibus ex quibusdam interualis utentes congruam mensuram explebimus. Irrigetur autem caput tempore sectionis uenæ aceto & rosaceo, polygoni aut hederæ succo ammixto. Et lana conuoluta rosaceo aut cœnanthino madefacta eodem tempore uentri imponatur. Si uero quid sanguinis detractionem impediatur, uelut gracilitas, aut aliud quid ex sepe relatis, subducatur aluus, primum per clysterem ex fursurum succo, spuma nitri & melle. Postea uero picra ex aloë compositio assidue detur. Si uero accidentia perseverarint, etiam uehementioribus purgatorijs utendum erit ita ut ad redundantem humorem pharmacum adaptes. Ex efficacioribus autem purgatorijs commodant his quæ scœniculum in aceto mulso coctum habent. Et quod ex palmulis, ruta, & scammonia preparatur, quorum compositiones relatæ sunt in purgatoriorum Sermone. Sed & pituitam à capite per os detraherentibus, & gargarismis utendum est, ex origano, pulegio, & aceto mulso. Postea uero etiâ anagallidis succus naribus infundatur, aut cyclamini, aut radicis betæ, aut elaterii cum lacte. Sed & nitrum cum nigella tritum, & oleo ueteri ammixtum, generosam per nares purgationem facit. Post hæc autem ad balneum ducantur. Tale uero frictorium caput corroboras ipsis conuenit, Lapidis asij unc. i. spumæ nitri albæ unc. i. iridis unc. i. floris iunci odorati sextans. Ex hoc quod satis est accipe & sincipiti insperge, modicam aquam calidam irrorans. Deinde ubi lauisti, & caput calida non madefecisti, sed solum abluisi, egressus de folio frigida ter aut sæpius madefacito. His uero qui ualde calidum caput habent, etiam rosaceum cum aceto sæpe adhibeas, & ipsum ex salientibus aquæ in balneo frigefacias. Et si quid ex his cesserit affectio, cessandum est à medicationis molestia. Si uero perseverarit, arteriæ in capite iuxta tempora supra aures inciduntur, uentre prius euacuato, aut per hieram, aut per clysterem. Postea uero cōfrictorijs fortioribus utendum est, quæ ad insanos referuntur. Cibi sint boni succi, facile concoctiles, flatus exortes, omnino stomacho commodi, uentri commodi, urinam cientes. Vinum modicum sit, album & tenuissimum, & non ualde uetus. Conueniunt hos balnea naturalia aluminosa. Maxima uero et prima ac ultima in his præseruatio ac curatio est, ut suppressæ excretiones commoueantur & officij sui commoneantur, maxime in mulieribus.

De insaniam. Archigenis & Posidonij.

Cap. VIII

Insania fit citra febrem, multo sanguine non putrefacto ad cerebrum cōfluente, qui aliquando purus est, et multitudine solum affligit, uelut in ebrijs. Aliquam uero flaua bile ammixta. Præcedit insaniam capitis debilitas, uelut in podagra debilitas pedum semper adest. Tunc autem dolent quum materia locis influxerit. Si itaque ob solum sanguinem insaniam fiat, hæc consequuntur. Ritus immodicus ipsis commouetur uidentibus sæpe ob oculos imagunculas quasdam risu dignas, & hilaris est ipsis facies, & assidue canunt. Aliquando enim ex contingentibus euaporationibus sonitus circa aures adsunt, ut putent se tibicines quosdam audire. Seruatur in ipsis memoria, uelut ex cantilenis quas familiares habent coniectare licet. Lasa est autem imaginatio & ratio. Si uero flaua bilis ad sanguinem fuerit ammixta, & mordacem ipsum effecerit,

effecerit, uelut ex ipsa stimuletur ac pungatur cerebrum et membranæ eius, iracundi & temerarij & percussores ac iniuriosi fiunt. In quantum enim bilis sanguini mixta est, in tantum mutat iucunditatem, & auget tristitiam ac iram. Si uero amplius fuerit bilis superaffata & crassifaceta, & ipsi corpori cerebri ac membranarum instar uisci agglutinata, pungatq; ac diuellat: ferina deliria efficit. Quidam enim iam propriam carnem gustarunt, & domesticos uelut insidiatores tractarunt, occiderunt, percusserunt, uulnerarunt. Contingit autem eundem hominem aliquando risu immodico teneri, aliquando ira et indignatione. Nam in fame ac inedia tolerata, & ex acrioribus ac falsioribus alimentis & in pluribus motibus ac turbationibus, sanguis seipso acrior efficitur. In contrario uero statu, mitior. Sepe autem etiam nullo auxilio adhibito, per modicum cibum & commoda alimenta, progressu temporis id quod lædit consumitur, & cerebrum à superfluitatibus intactum manet, & purum mentis emotionis interualum ac defectus & intermissio consequitur. Quibusdam per circuitum quendam irruit affectio. Alijs semel in anno. Alijs bis, aut sæpius, coaceruato uidelicet paulatim eo quod molestum est. Corripiuntur hac affectione pauci ante uigorem ætatis. Plurimi in ipso uigore, & post ipsum. Viri magis quam mulieres. Et ex illis magis qui animalibus affectionibus, diuexantur, uelut sunt iracundi, risu multo & intempestiuo utentes, intractabiles, iracundi, curiosi, auari, potiores item & assidua cruditate laborantes. Et quibus consuetæ excretionibus suppressæ sunt. Et propterea etiam mulieres aliquando insaniant, quibus menses suppressi sunt. Infinitæ uero sunt insanix species, quas exponere superfluum est. In delapsuris igitur in hanc affectionem, præditorum proœmia quædam præcedunt, uelut risus præter rationem non assuetus id facere, et facili occasione irascuntur, & aurium sonitus adest, & splendores oculis obuersantur. Et uigiliæ adsunt intentæ, & curæ per uices repetentes ac peregrinæ, grauitas item & uibratio capitis. In progressu uero temporis omnia hæc intenduntur, & appetentiæ ipsis putidiores fiunt, & ad uenerem prompti sunt. Et ideo assidue seminis in somno effusiones ipsis fiunt, & oculi cauantur, simulq; intenti ac fixi consistunt. Atq; hæc consequuntur usque ad perfectam mentis emotionem. Oportet igitur doctum medicum agrî curam gerentem, his apparentibus, aut quibusdam ex ipsis, facere quæ oportet. Si itaq; tales notas affectio præmiserit, aut etiam iam insiterit, uictum tenuem exhibere conuenit, forbilem, liquidum, non percellentem, uentri commodum, & qui neutiquam sanguinem generare potest. A uino abstinendum est penitus. Vbi uero per triduum hominem eo uictu curasti, aliquam cubiti uenâ secato, præcipue quidam supernâ. Si uero nō appareat, mediâ. Aut si hæc non appareât, uenas circum talos perquirito, maxime in mulieribus, eo enim momento etiâ menses impelluntur. Quod si neq; hæc appareât, ad eas quæ in summis manibus, ac pedibus sunt transeundum est. Studendum enim est ut prius per uenæ sectionem generosa euacuatio fiat, atq; sic affectarum partium curatio sequatur. In uenæ autem sectione pro uiribus euacuationem facere oportet. Extincto enim seruire, euestigio quidē considerantes fiunt. Simul autem & locus alijs auxilijs datur. Quandoquidē uero aliqui in prima detractione generose ferunt euacuationem. In repetitis autem detractionibus animi deliquia incidunt, conuenit hos in prima detractione euacuare quantum opus est. Sic enim multum de flatuosa & uaporosa superfluitate coëuacuatur. Itaq; pulsus assidue rãgere oportet dum sanguis fluit. Et si cōsiderint, reseruare ad repetendam detractionem. Sepe enim recuperatis uiribus postera die detractionem repetimus.

repetimus. Aliquādo etiam tertiam sectionem seruantes appposito sale. Caput uero irrigare oportet rosaceo cū aceto, aut polygoni succo, aut oleo cēnāthino, aut melino. Lana autē sordida oleo imbuta lincipiti imponatur, & frequentius renouetur. Post euacuationem omni modo procurandus est somnus. Sanguine enim euacuato si successerint uigiliae, acriores & feriores ipsos faciūt. Quapropter cōfidentes pharmacum ex papaueris capitibus dabimus, quod somnū inducit, cum ptisanā aut aliā succo, aut cum aqua. Iucundum enim fuerit, & postea somnus succedet. Plerique enim ipsorū omnia somnifica contemnunt. Quapropter etiā si prima die eo accepto dormierunt, intermissa die una, rursus dandū est de eo cochliariū unū. Solet enim uel solū post uenae sectionē, perfectē liberare ab affectiōe, unā cū conueniente diata. Cauendū tamē est ne consequenter ipsum exhibeamus. Stupefacit enim sensus. Studendū etiā est ut uentrem facile solubilē faciamus, tū per cibos, tum per clysteres. His autē factis, a locibus auxilijs incipere oportet hoc modo. Sanguinē a uena in fronte eleuata nō facta impulsione, uelut quidā facere solent, propter maximas inflammatio- nes mēbranae caluā ambientes, quae saepe sauciata ipsa succedere solent. Detrahēda est autē sanguinis libra ferme una. Post hāc euacuationē, in his qui sanguinē habēt biliosiorē, in termis quinque diebus, detur picra ex aloē, cochliarij magni mēsurā cum aqua mulsā. Deinde etiā per nares caput purgetur, radicū betae succo infuso, aut elaterio; aut atramento sutorio cū lacte. Sternutatorium quoque adhibeatur ex ueratro albo & herba lanaria. Sed & per os pituita detra- hatur, per mastichē & staphidē agriā. Et per gargarisationē aceti mulli, in quo coctū est pulegiū & hyssopū. Subducatur etiā aluus purgatorijs ex centaurea, & ex gentiana. Sed & ipsa per seipsam radix gentiana commoda est pota dra- chmae unius pōdere cū aqua mulsā. Datur & aristolochia eodē modo. Prodest autē maximē ipsis scēnūculi magni syluestri radix & semē, ex aqua quotidie po- ta. Et radices bryoniae drachma una. Postea uero sanguisuga toti capiti circū- circa affigantur, & praesertim lincipiti. At in mulieribus studendum est ut men- ses moueamus. Deinde uiribus reparatis per dies septem, Galeni hieram da- to, quae maximē ob stoechadis copiā euacuat. Dato autem drach. iiii. ex aqua mulsā. Deinde rursus narifusoria adhibeantur. Declinante uero affectione ad balneum ducantur. Fricatorium autem commodum ipsis in balneo, hoc est. Iri- dis illyricae, lapidis asij, mannae thuris, spumae nitri albā, puniceis, buccinorum ustorum, floris iunci odorati, apij, cassiae, rosarum siccarum, singulorum unc. i. tundito & cribrato, ac utitor in prima balnei domo, inspergens lincipiti quan- tum satis est, & aquam tepidam irrorans, ita ut satis longā moram in domo tra- hat, quo uires pharmaci usque in profundum distribuantur. Deinde capite le- niter detergo et abluto, ubi lotus est ita ut caput non madescerit calida, ex solio exeat, & frigida iterum atque iterum irriget. Si uero ualde calidum caput habuerit, etiā sapius frigida perfundatur. Post hāc per rubificatoriū ex sina- pi & caricis caput corroboretur. Et per interualla quādam pituita per os detra- hatur, & narifusoria adhibeantur. Diata uero statuatur tenuior, concoctu faci- lis, uentri commoda, flatus exors, uim temperandi habens. Vim usus his ra- rus sit. Si uero reliquiae affectionis superfuerint, ad ueratrum album deueni- endum est. Modus autem utendi relatus est in Sermone de purgantibus me- dicamentis. De cetero uero admonendi sunt, ut ab omnibus edulijs & poti- bus bilē gignentibus abstineant. In uere autem quotannis uenā secent gratia praeserua

præseruationis. Deinde etiam purgentur, & præsertim si bilis magis redundarit. Mulieribus uero menses consueto tempore proritentur ut fluant citra impedimentum. Sed & in alijs consuata excretionis procurentur.

De melancholia. Ex Galeno & Rufo.

Cap. 1x

Quemadmodum in apparentibus corporis partibus, aliquando omnibus eadem temperatura apparet, uelut in malo corporis habitu, elephantiasi et hydropisi: Aliquando uero una quædam pars, aut amara bilis, aut pituita, aut atra bilis humore suscepto, ipsa solum temperaturam mutat. Sic etiam circa cerebrum fieri potest, ut aliquando toto in uenis sanguine atrabiliario facto, ex communis detrimenti ratione etiam cerebrum lædatur. Et rursus ut alio tempore, sanguine in toto homine illaeso permanente, is qui iuxta solum cerebrum est alteretur. Et contingit hoc dupliciter, aut aliunde confluente in ipsum, aut generato in loco atræ bilis humore. Generatur autem a caliditate multa indigena, aut flauam bilem, aut crassiorem & atriores sanguinem adassante. Plerumque uero partes circa præcordia primario affectæ, caput ad consensum perducunt, & delirium efficiunt, aut ipsa bile cerebrum occupante, aut aliqua uaporis melancholici exhalatione, quemadmodum in morbo flatuoso & præcordiali appellato. Nil enim rationi nostræ obstat, aliunde & ex alia parte principium & generationem affectionis esse. Nam os uentris quomodoque affectum facile ad consensum ducit cerebrum ob cognationem, per maximos duos nervos qui ex supernis ad ipsum deferuntur. Perducit etiam ad consensum cor ipsum ob uicinitatem. Similiter quoque septum transversum, quod etiam ipsi inferitur. Communitas est etiam stomacho ad spinalem medullam, qua parte & incumbit, & colligatur uerticulis colli. Principium itaque eiusmodi melancholici plerumque ex cruditatibus: Flatus enim ipsis succedunt multi, qui facile eleuantur & circa præcordia diutius morantur, & ructus ipsis acidi consequuntur, nullo eiusmodi cibo accepto. Ventres plerumque ipsis sicci sunt, somni parui diuulsi, insomnia turbulenta & peregrina, vibrationes corporis alia aliâs, uertigines capitis, & flatuum sonitus circa aures. Et alijs quidem caput plenum & graue esse uidetur, alijs uero leue & uacuum, alijs siccum. Quidam neque omnino caput se habere putant, ad quæ excogitasse dicitur Philotimus supra reliqua curatione plebeum pileum, a quo grauatus caput se habere intelligeret. Fiant etiam mente capti, & timidi, & misericordes, & lachrymantur ac deserta persequuntur. Quidam etiam demones ab inimicorum prestigijs sibi immisos esse putant. Alij uenenosum pharvacum accepisse suspicantur, & suspensionem ipsorum confirmant uirosi ac peregrini ructus qui ipsis adsunt. Et est morbus hic omnifarius & non facile enumerabilis. Velut uerbi causa circa timores. Alius amicissimos timet, alius omnes homines. Et alius ad lucem prodire timet, et tenebras persequitur. Alius fugit caliginosos locos. Plerique tamen in tenebrosis locis degere cupiunt, & in monumentis ac solitudinibus. Quidam uero etiam aquam timent, & uinum & oleum, & omnem liquorem, uelut qui morfi sunt a rabioso cane. Et in summa, Melancholica deliria multiformia quidem sunt, ob particulares corruptas imaginationes. Vnum uero omnibus ipsis commune est: Timor & tristitia. Tristantur enim omnes præter rationem, & neque si interrogas habent quod dicantur tristentur. Non pauci uero ipsorum mortem timent, & alia quædam nullo timore digna. Sunt etiam qui mortem uehementer exoptant. Quod igitur ob atram bilem ratiocinalis animæ principia occupant, timor fit, & tristitia, & mortis formido, nihil miri est. Videmus enim etiam extra corpus nihil nobis irrendum,

rendum, uelut sunt tenebræ. Quum igitur uelut caligo quædam rationali ani-
mæ parti circumfusa fuerit, necesse est timere hominem, ut qui causam timoris
secum in corpore circumferat. Sicut enim in profundis tenebris pueri timent,
itemq; adulti imperiti. Ita etiam atræ bilis color, uelut tenebræ rationis locum
obumbrans timores efficit. Quapropter omnium symptomatum singulas ac-
cidentium causas enarrare impossibile est. Pleraque enim multam difficultatem
habent, uelut uerbi gratia. Cur fugiunt uelut horrenda, quæ non sunt horrenda.
Alia uero persequuntur uelut bona, quæ non sunt bona. Et cur alius domesti-
cos timet, alius uero omnes homines, & huiusmodi. Plurimorū uero sympto-
matum causas medicum dicere, non est difficile, uelut, qui sibi uidetur uas fictile
esse, propter siccitatē hoc patitur; frigidus enim & siccus est melancholicus hu-
mor. Similiter etiam qui cutem suam siccis pellibus similem esse putat. Qui uero
putabat se caput non habere, fortassis ob leuitatē hoc passus est, quam flatus uen-
tosus sursum latus ipsi exhibuit. Cur uero appetunt melancholici plures cibos?
num quia frigescit ipsis os uentris. Cur autem aliqui ipsorum uini potiores sunt?
num quod frigiditas calfactione opus habet. Cur autem occidunt seipsos? num
quia a maioribus malis liberari se putant. Nisi fortassis talem opinionē induunt,
quod bonum est mori, quod barbaris quibusdam uidetur. Cur autem crudita-
tes assidue ipsis fiunt? Num quia turbatum & superfluitatibus plenum est ipso-
rum corpus, & propterea etiam uenter intemperatus, ut qui semper ex atræ bi-
lis humore perfrigeratur. Cur autem alui plerumque ipsis siccantur? Num quia
flatus superni circa præcordia consistunt, & non ualde infra secedunt. Necesse
itaque est ob hoc ipsum etiam uentres siccis esse. Ex multa uero retentione, ali-
quando coaceruata ac colliquata egerunt. Oculis autem plerumq; nictant, &
oculi ipsi procidunt, & crassa labia habent, propter crassum flatum. Atri ue-
ro coloris, propter humoris diffusionem. Hirsuti uero pleriq; ipsorum sunt, pro-
pter multitudinē crassarum superfluitatū. Veloci uero plerumq; lingua sunt, &
balbi, & gracili uoce præditi, ob linguę incontinentiā. Motus enim cōcitationes
a flatu fiunt. Quicquid autem concitatē mouetur, citō defluit. Et procliuē sanē
fuerit etiam aliorum symptomatū causas reddere, si quis ex his progressum face-
re uolet. Porro nigrescit aliquādo hic humor supercalefactus, aliquando super-
frigefactus. Nam quale quiddam patiuntur carbones, dum uruntur lucidissimi
ob flammā existentes, extincta autem flamma nigrescentes: tale quiddā circa cla-
rum sanguinis colorē frigiditas facit. Videmus enim etiā in externis, quædā cor-
pora liuida fieri ac denigrari a frigidityte. Et rursus excessus caloris resiccans ac
cōsumens humiditates a quibus calor nutrit, humores nigrefacit, quemadmodū
etiam sol fructus, & hominū corpora. Hæc igitur sunt quæ ante curationē Me-
dicum cognoscere oportet. Quæ uero discenda sunt ut quis ita ægrotantibus o-
pem ferre possit, iam tempus est subiungere. Non parum autē refert ad curatio-
nem, nosse unde morbus initū habuit. Cognoscere itaq; oportet quod duplex
est melancholiæ species: Quædā enim ex natura & temperatura ab initio atræ bi-
lem habent. Quidā uero ex mala diætā postea id temperamentū acquisuerunt.
Et est hæc species segnīs semper & tristis. Qui uero ex flauæ bilis superaffatione
in delirium incidunt, audaciores & iracundiōres alijs sunt, & percussores, & omnia
horrenda facientes, & maxime tempore quo bilis superaffat. Quo uero tēpore
ipsa extincta fuerit, tristes, moesti ac timidi fiunt. Quū igitur totū corpus melan-
cholicum sanguinem habuerit, a uenæ sectione principiū curationis facere con-
uenit. Quum autem solum cerebrum, æger uenæ sectione non habet opus, nisi

A

multo

multo sanguine redundarit, & præseruationis gratia detractiōem faciamus. Cognitio uero an totum corpus melancholicū sanguinem habeat, aut iuxta solum cerebrum talis sit, ex his à testat. Nigriores & hirsuti, & qui uenas amplas habent, aptissimi sunt ad atræ bilis generationem. Aliquando etiam homines colore rubicundi, confertim in melancholicam temperaturā transeunt. Consequenter autem ab ipsis, flauis, & præsertim ubi uigilijs, & laboribus pluribus, & curis, & tenui uictu, aut melancholicis edulijs fuerint usi. Ad hæc si suppressa est hæmorrhœis in sede, aut alia excretio cōsueta, aut mulieribus menses, nec parū confert anni tempus, & ætatis status, & regio, & ægri etas ac studiū. His omnibus præconsideratis, ubi speraueris in totius corporis uenis melancholicū sanguinē contineri, certissimū experimentū adhibeto, ex uenæ cubiti mediæ præsertim sectione. Si enim effluens sanguis non uidebit atrabiliarius esse, statim cohibeto. Si uero talis apparuerit, quantum pro ægri corporis habitu satis fore putaris euacuato. At uero tertia melancholiæ differentia, cuius principium à uentre harere diximus, & quæ affectio præcordialis appellatur, sæpe ex relatis cognoscitur. Primum enim incipiunt uentris symptomata, uelut sunt inflationes rugitus, ructus acidi ac uirosi, & quod uenter resiccatur, & quod in secessibus ac uomitibus & ructibus alleuantur, & quod ipsi ægri percipiūt omnes uexationes circa præcordia consistere. Quemadmodū igitur dum quibusdā sæpe ex uentre fuliginosa quædam aut fumosa, aut omnino crassiorū uaporum exhalatio sursum fertur, uelut in suffusos oculos habentibus, aliqua ob oculos uersantur. Eodem modo etiam nunc dum melancholica exhalatio ad cerebrum, uelut fuligo aut fumus, fertur, melancholica quoque symptomata circa mentem contingent. Quum igitur melancholici delirij propria symptomata apparuerint magna. Circa uentrem uero aut nihil molesti, aut minimum fuerit, in his cerebrum primariò affectum esse putandum est, uelut prædictum est.

Curatio melancholiæ. Galeni.

Cap. x

Melancholiā ex cerebro primariò affecto obortam, per balnea assidua, & diutina tam boni succi humidam ac flatu exortem curare oportet, citra aliud efficax auxilium, nisi ob temporis longitudinē humor affligens ægrē euacuetur: quando sanè magis uarias ac fortiores curationes adhibere oportet. Incipientē autem affectionem curare conuenit. Nam inueterata ac aucta, ægrē tractabilis euadit.

Rufi. Siue autem cerebrum primariò affectum fuerit, siue præcordia, communia sunt subducentia uentrem auxilia. Primum igitur bonæ concoctionis curam habere oportet. Postea uero purgare primū epithymo & aloë. Horū enim etiam si parum quotidie acceperit, prodest tamen moderatē & paulatim subducendo. Posidonij. In quibus sanguis redundare apparuerit, statim ab initio uena secetur in cubito, & præsertim in quibus consuetæ sanguinis excretiones sunt suppressæ. Verū in mulieribus quibus menses defecerūt, uenā in talo secare oportet. Et in singulis pro uiribus sanguinē euacuare. In quibus autē uitiiati humores magis redundant, præparatū per uictū ægrū purgabis per hierā Rufi, aut Archigenis, aut Iusti. Si uero utriusque redundant, facta prius uenæ sectione purgato. Postea interpositis aliquot diebus, aluū per clysteres euacuato, primū cū fursurū succo, spumaque nitri ac melle. Deinde etiā polypodij radices cōtusas, aut epithymū cū fursurib. coquito. Post triduum à clysteris usu, deī ipsis picra ex aloë cōpositio, quæ supra reliqua omnia, etiā epithymū accepit. Præparanda est autē, uelut Themison iubet. Ita ut aloës accipiat dra. c. mastiches, croci, spice nardi, cinamomi, aut cassiæ duplum, asari, carpopalsami, singulorū unc. i. His uero etiam epithymi sextans

sextans addatur. Detur autem cochliarij magni copia cum aqua mulsa. Deturq̃
 ipsis ex modicis intervallis iterum atq̃ iterum. Deinde rursus per uictum repa-
 ratis uiribus, rursus dato hieram Rufi, aut Archigenis, aut Iusti. Sit autem pon-
 dus drach. II. cum aqua mulsa, & salis cochleario paruo. Melius est autem per
 euacuantia quotidie leniter uentrem subducere. Atram uero bilem ducit ama-
 racus, & cunila appellata, drach. II. pondere aquæ mulsæ insperfa & pota. Con-
 ducit & lactis sero aluum subducere. Sed non de caseis dandum est serum. Præ-
 stat enim quod à lacte per cocturam separatur. Sit autem lac equinū, aut si non
 possit haberi, bubulum. Lac ipsum in ollam nouam mittatur, & fici ramulo agi-
 retur. Postquā autē ter aut quater ebullierit, acetū mulsum irroretur. Deinde per
 colatum in potu detur. Et primū quidem ammiscendū est mel, quum autē uenter
 subire inceperit, non amplius addatur mel. Accipiat autem æger hoc serum per
 heminas, non infra quinque heminarū mensuram. Ab omni uero euacuatione
 utendū est malug semine leuissimē trito, duarum drachmarū pondere, cum aque
 cyathis tribus. Egregiē enim facit. Quare sæpe ipso utendū est. Optimū est &
 pulegij decoctum sæpe bibere, & ante purgatoria, & post ipsa. Et similiter cen-
 taurij parui. Absinthij autem decoctum & assiduē & consequenter præbe. Sto-
 macho enim & uentri in his commodū est. Et neq̃ flatum multū in uentre fieri
 permittit, neq̃ secessum penitus rescicari, & urinam ciet, & concoctionē probē
 adiuuat, adeo ut ego ex huius solius usu nouerim quosdam à morbo liberatos.
 Danda sunt etiam urinā mouentia, anisum, daucus petroselinū, asarum, nardus;
 & his adhuc amplius foeniculi magni syluestris semen, & radix. Chamæpitys
 autem & chamædrys promptius accipienda sunt, ita ut singula hæc cum aqua
 coquantur, aut arida trita potioni inspergantur. Comoda sunt etiam euacua-
 tiones per sudorem, & labores, & balnea fientes, & per illutiones in sole, qualis
 est quæ cum oleo chamæmelino fit, & cum oleo ac nitro. Quod si habitus permi-
 serit, rursus per hieram purgato. Conuenit autē neq̃ præcordia negligere, & ma-
 ximē ubi accesserit Medicus curationis ipsorū coniecturā faciet. Fomenta igitur
 conueniunt ex oleo, in quo cocta sunt ruta, anethū, serpyllū, absinthiū, artemi-
 sia, pulegiū uiticis semē, baccæ lauri, aut folia tenera. Hæc enim dolores mitigāt,
 & flatum minuūt, at uero in inflationib. stomachi cū morfu, cum inū & pulegiū in
 aceto coquere oportet, & per spongas stomachū fouere. Aliquando etiā alumē
 aceto inspergimus. Cataplasmata autē habeāt aut anisum, aut apiū aut cum inū in
 oleo præcoctū. Et cyperus leuissimē trita, & iris, & libanotis cataplasmati addat.
 Permittantur autē diutius, & ante & post cibū. Ablato autē cataplasmate præcordia
 contegantur, aut lana amplissima, aut leuissima & pura pelle agnina, præillitis lo-
 cis ex nardino. Utendū est etiam cucurbitarū adhibitione, ad flatum quidem inas-
 nium, ad inflammationes uero ac duricias, cum scarificatione. Postea uero cera-
 tis ex cyprino utendū est, & polyarchio, & quod ex styrace paratur, & quod ex
 feminibus fit, & similibus. In progressu autē curationis, etiam rubificatione ex ca-
 ricis ac sinapi uti, ualde proderit, & concoctiones reuocat. Nam & uentri robur
 addit, & si quis dolor in præcordio restat, eum eximit. Utendū est etiam acribus
 smegmatis ad præcordia, & picatorū medicamēto, hoc est, pice sicca per seipsam
 liquefacta, aut cū modico oleo. Calida autē imponitur cuti, & uentri ac dorso ad-
 hibetur, ac finit donec sua sponte decidat. Quare licet cū ipsa lauari, & quod pau-
 latim disparat forfice auferre. Valde uero prodest eis sterus bubulū aridū aceto
 mulso infarū ac impositū. Profunt etiam bulbi cum nitro aut alumine triti ac im-
 positi. Sed & his ad bubulum sterus ammixtis uile fit cataplasma, & præsertim

ubi morsus ab ipsis circa stomachū percipitur. Caterū in quibus conuulsiones assidue corpori adsunt, confert etiā castorij potus, & illitio corporis ex castorio cum oleo sicyonio. Cōuenit & moueri & exerceri ipsos pro uiribus ante cibos. Balnea uero probè concoquenti non sunt ualde necessaria, nisi lassitudini alicui mederi uelis. Qui uero non bonū uentrē habet ad concoquendū, huic cōducit frequentius lauari, aut ieiuno, aut post perfectā concoctionē. Post balnea cibos damus concoctu faciles, flatu exortes, ex aluo secedentes, exacta cōsideratione facta quomodo ex singulis homo afficitur: non enim omnes ad omnes cibos similiter dispositi sunt. Plerunq; tamen cōueniunt panes clibano cocti probè præparati. Volucres non pingues, nō uirosæ, montanæ. Oua gallinarū mollia. Pisces petrosi & molles carne. Herinacei uero marini plurimum præstant ad iucunditatem & utilitatem. Vitanda sunt omnia in stagnis degentia, & in paludibus. Ex carnibus conueniunt hœdinæ, & lactentium animalū, & ex his magis extremæ partes probè coctæ. Non inutiles sunt etiam uulua, & uentriculi, & pedes suilli. Ex oleribus ad cōmunem uictum cōferunt dulcia. Acriora uero aliquando danda sunt pharmaci loco, uelut est asparagus palustris, petroselinum, & similia. Moderata uero copia omnia accipiuntur. Vinum sit tenue & album & non ualde uetus. Non autem acruatim detur potus inter cibum, neq; magna copia potus exhibeatur, ut ne cibi in uentre fluitent. Acetum quoque acerrimum cochlearij mensura post omnem cibum absorbeatur ubi iam uult dormire. Sed & pleraq; obsonia in aceto tincta edere conuenit. Præstat autem aceto ammiscere parum de scilla, & ruta, & aristolochia tenui. Posidonij. Cōmodum est autem ad inflammationes tale oxyporū præparare. Ligustici, seminis apij, zingiberis, thymi, singulorum unc. i. mellis despumati quantum satis est. Dato cochlearij dimidium mane, & uespere similiter. Quod si mellis dulcedinem auersentur, salem concoctorum eiusmodi ipsis præparato. Scillæ assatæ unc. i. salis ammoniaci quincuncem, seminis apij, foeniculi, thymi, petroselini, anisi, sinonis, zingiberis, singulorum drach. iiii. panis puri sicci quincuncem, piperis sesquiunciam. Ex hoc cochlearij mensuram edendam dato cum cibo, prout uoluerit. Detur etiam ipsis antidotus theriaca ex quibusdam interuallis, & præsertim hyeme, & inchoante uere. Rufi. Vomant ex longioribus interuallis etiam à cibis. Verum à raphanīs, aut origano, aut thymo ieiunī. Non tamen fortioribus uomitorijs utendum est. Sunt enim talia nociua in his, ærumnam uentri ac stomacho ad dentia, iam antea ex morbo afflictio. Videntur enim aliqui ex efficacioribus uomitorijs melancholia correpti. Proinde operæ pretium esse nosse, quod multi sic ægrotantes, in tempore curationis nihil commodi perceperunt. Dimissa uero curatione restituti sunt, natura ante curationem præualete contra morbos debiles ex medela factos. Quapropter naturæ remissionem dare oportet. Videtur enim unā cum curationibus affligi. In quiete uero inualescere, & superare morbos iam antea attenuatos.

De infania lupina aut canina appellata. Ex Marcello.

Cap. xi

Qui morbo lupino siue canino appellato corripiuntur, in februario mense noctu exeunt, per omnia imitantes lupos aut canes, & usq; ad diem monumēta maxime aperiant. Cognosces autem ita affectos ex his signis, pallidi sunt, & uisus imbecilli, & oculos siccos habent, & non lachrymant. Videbis etiam ipsos cauos oculos habere, & linguā siccam, & saliuam omnino non profundunt. Sunt quoque siticulosi, & tibias habent exulceratas immedicabiliter, propter assiduos casus,

calus & canum morsus. Actalia quidem sunt signa. Nosse uero oportet melancholiam speciem esse hunc morbum. Quem curabis tempore accessionis uenam secando, & sanguinem usque ad animi deliquium euacuando, & agrum boni succi cibis nutriendo. Utatur autem balneis dulcibus. Deinde sero lactis per triiduum usus, hiera ex colocynthide Rufi, aut Archigenis, aut Iusti purgetur, iterum atque iterum ipsam sumens ex interuallis. Post purgationes etiam theriaca ex uiperis utendum est, & alia adhibenda in melancholia iam antea relata. Ad uesperam uero inuadente iam morbo, irrigationibus capitis somnum inducere solitis utendum est, & talibus quoque odoramentis, Nares item opio illinantur. Quandoque uero etiam somnifica in potu exhibeantur.

De incubo, Posidonij.

Cap. XII

Qui incubus appellatur non est dæmon, sed magis præludium & procemium morbi comitalis, aut insaniam, aut syderationis. Nam cruditates ex uoracitate affectionem præcedunt. Dum enim uentriculi cerebri uaporibus crassis ac frigidis implentur. Prohibent hi facultates per neruos transire, & morbum agere excitabilem efficiunt, & qui uix ad rectam actionem perducitur. Vnde etiam immobilis penitus tales permanet. Præcedit enim incubum suffocatio, uocis priuatio, grauitas, & immobilitas. Per multam uero anxietatem attenuato ac discussu spiritu, & apertis meatibus derepente excitantur. Cauendum igitur est à malo dum in principio est. Inueteratum enim & assidue incidens, quosdam ex relatis morbis inducit, dum paulatim in uentriculis cerebri crassus humor coaceruatur. Quæcumque enim patiuntur comitali morbo correpti in exacerbationibus. Eadem perpetuantur incubo pressi dum dormiunt. Siquidem igitur sanguis redundat, uenam in cubito secare oportet. Si uero uitiosi humores magis prædominantur, purgatio facienda est per hieram Archigenis. Maxime autem opitulatur ipsis hoc: Corticis ueratri nigri drach. i, scammoniae obol. iij, anisi, aut dauci, aut petroselinii parum. Dieta uero sit tenuis & penitus flatus exors. Auxiliatur etiam ipsis niger pæoniae fructus, si quindecim grana trita cum aqua in potu exhibeantur. Rigare uero oportet etiam caput oleo anethino calido, & pileo contegere ubi cubitum uadit æger.

De morbo comitali, Galeni.

Cap. XIII

Tres sunt morbi comitalis differentiae. Omnibus autem commune est, cerebrum affectum esse. Aut primario consistente in ipso affectione, at per consensum oris uentris. Raro autem fit etiam tertia species ex parte quadam, in qua incepit affectio, & deinde sensibiliter ægroto ad caput ascendit. Atque hanc speciem in puero quodam uidi, qui principium affectionis in crure habebat, & postea per tempus quoddam per femur & lumbos ac spinam ad collum & usque ad caput ascendebat. Vbi uero caput pertigisset, non amplius sui compos erat. Tale quiddam contingit etiam in his qui à scorpione, aut aliqua alia uenenum eiacularante bestia icti sunt. Quidam enim ictus à scorpione, grandine se impeti putare dixit. Et erat totus subfrigidus, & frigidum sudorem excluderat, & medicamentis adhibitis uix seruatus est. Non igitur impossibile est circa aliquas non principales partes eiusmodi essentiam generari, citra externam causam. Et hanc ipsam ubi in neruosa parte constitit, uim suam per continuitatem ad neruorum principium transmittere. Posidonij. Conuulsio sequitur ad morbum comitalem, eo quod principium neruorum affligitur ab infestationibus ac molestiis exhibentibus. Quemadmodum enim stomachus, dum aut alimentum copia grauatur, aut ab acri humore mordetur, non solum singultum, sed etiam conuulsionem inducit. Sic etiam principium ueruorum ad talem motum perducitur, dum

A 3 reſſea

reijcere conatur quicquid tandem fuerit id quod ex primario affecta parte ad ipsum affertur. Ceterum ordinati aut inordinati circuitus ipsis fiunt iuxta diætæ modum. Aut enim per omnia æqualiter diætam habent ægri, aut inæqualiter & inordinatè. Irruente igitur comitialis morbi exacerbatione, conuulsas & obtortas partes deligare oportet, inungereq; ac dirigere. Deinde isparato ore pennam oleo illitam immittere, cyprino præsertim, aut irino, aut narcissino, & uomitum irritare, quo incumbentes stomacho humores extrahantur. Oportet etiam odoris sensum irritare, uelut peucedano aut succo cyrenaico. Perleuerante uero exacerbatione, Medicus confidenter cogens, ac mandibulas diducens castorium ori infundat, & succum cyrenaicum cum aceto mulso. Reuocatis autem ipsis, per sedem infundatur centaurij ac calaminthæ decoctum, aut aristolochiæ. Deinde recuperatis uiribus, per hieram Galeni ex colocynthide purgantur. Eiusmodi sanè est recentis & acuti comitialis morbi curatio. Deinceps autem quæ ad inueterati demolitionem pertinent trademus. Oportet itaq; ægros in longo aquæ potu continere, & in curationis aggressione, si nihil impederit, uenâ secare, & intermissis diebus quatuor aut quinque corpus reficere, ac sic infra euacuare, maxime per ueratrum nigrum, aut colocynthidem. Veratri autem corticem siccum tundere ac cribrare oportet, & eius drach. i. cum aqua mulsa præbere. Aut modico pipere addito melle excipere, & catapotia deuoranda dare. In colocynthide uero eiectione semine, & relicta medulla, uinum dulce infundito, ac per noctem finito. Mane uero uinum excolatum ac tepesactum bibendum dato. Post sufficientem purgationem lauare ipsos oportet. Tertia deinde die cucurbitas affigere præcordijs ac dorso cum scarificatione. Deinde intermissis aliis quot diebus ac refecto corpore, purgare per hieram Galeni ex colocynthide. Postea uero etiam capiti cucurbitas affigere. Et sequenti die cataplasma capiti adhibere, ex pane cocto cum aqua mulsa, amygdalis amaris simul contritis, aut serpillio, aut calamintha, aut menta, aut ruta. Et hoc faciendum est per triduum. Postea radendum est caput, & illinendum peucedani succo in aceto diluto. Aut spondyliis aut serpillum, aut iris in aceto coquatur, & facta intermissione, rursus ex hiera drach. iiii. solum dato. Deinde sternutatorijs utendum est, & pituitam per os ducentibus, & naribus forijs, ita ut cyclamini succu naribus infundamus, aut ipsam radicem siccâ tritam insufflemus, aut elaterium cum lacte. Et rursus factò interstitio, clysteri ex centaurio & colocynthide utere. Deinde sinapissimum capiti adhibe, & eduliorum acrium esu per interualla utere.

Quæ arguunt morbum comitiale.

Cap. xiiii

Arguunt comitiale morbum & eo affectos collabi faciunt suffita, bitumen, lapis gagates, cornu ceruinum, odor hepatis caprini assati, & ipsum hepar dum editur.

Quæ collabentes comitiales excitant. Didymi.

Cap. xv

Si magnum pedis ægri digitum diuiseris ex quacunque parte, & destillante sanguine labia ipsius collapsi illeueris, statim excitabitur. Asclepiadæ odoramentum excitans comitiales. Sagapeni, piperis, castorij, amygdalarum amararum, radices peucedani, spondylii, galbani, singulorum drach. i. i. silphij drach. i. opobalsami drach. i. aceto dilue ac pastillos efforma. Vsu uero expetente aceto dilue ac naribus subline. Utendum est hoc in exacerbationibus. Facit & ad uteri strangulationes. Pharmacu hoc repositum seruetur in ærea pyxide, quam naribus ægri admovebis. Aliud. Galbani, spondylii aut serpilli, æruginis rase, castorij, acori, singulorum drach. iiii. succi peucedani drach. ii. aut radices drach.

drach. III, succi cyrenaici drach. I, opobalsami drach. I, piperis grana XXXIII, amygdalas amaras decorticas XXX, picis liquidæ quantum satis est, aceti tantundem, Excipe & utere.

Auxilia ad comitiales, Dioscoridis.

Cap. XVI.

Ad comitiales facit rutæ sylvestris semen cum aqua potum, Et spondylium eodem modo. Item radicis bryoniæ drach. I, seminis siue fructus balsami drach. III, Cardamomi drach. I, Ramentorum loti arboris cremor. Foliorum quinquefolij drach. I, quotidie pota, Testudo terrestris cocta ac delincta. Laser cum cibo acceptum. Summe uero prodest castorium post aliquam purgationem acceptum, ad dies quinque aut plures, drach. I, pondere cum aqua mulsæ. Et eborisamenta magnopere profuisse cognouimus, ad dies quinque aut plures, duorum cochleariorum mensura quotidie pota cum aqua mulsæ. Ex Asclepiade, Oxallidem, siue rumicem acutum, uiridem præsertim, quotidie dato à prima luce usque ad trigessimam. Eadem oxallis herba uiridis data cum uino delyrantibus, in naturalem statum eos restituit. Aliud, ut ne assidue cadant inquit Archigenes, Eryngij montani appellati, cuius folia angusta & parua, & flores auricolores & oculorum speciem præferentes. Huius radicem contundito ac diligenter cribratam reponito. Et ex hac mystra duo ad dies quinque dato, sufficiens melle adiecto, ut eclegmatis crassitudinem habeat. Et hoc facito ex interuallis ut trecentos sexaginta quinque dies expleas. Qui enim hoc pharmacum per anni spacium, hoc est trecentos sexaginta quinque dies sumit, ab hac affectione non corripitur. Aliud. Scillæ assatæ internæ partis trita, anethi, singulorum acetabulum, apij acetabula tria, Excipe melle, & nucis ponticæ magnitudine exhibe cum aceto mulso. Et qui bibit si potest, currat. Sin minus, concitate deambulet. Aliud Asclepiadæ. Folij oleæ XXV, & castorio cum aceto mulso usus est Themison. Facit ad comitalem morbum & elephantiasim. Est & hæc theriaca bona. Sefelis drach. V, scordij, castorij, cinamomi, seminis tritæ folij, singulorum drach. VI, staphidis sylvestris drach. III, gentianæ drach. VIII, aristolochiæ drach. VI, pyrethri drach. VIII, euphorbij drach. V, piperis albi drach. X, opobalsami drach. III, succi cyrenaici drach. III, Excipe aceto mulso simplici, & dato comitalibus cum aqua mulsæ drachmas tres, elephantiasim uero affectis sesquidrachmam præbe. Aliud. Quo Serenus utebatur ad comitiales, cui nullum comparari potest. Idem concoquit & euacuat. Castorij, uerratini nigri, scammoniæ, singulorum drach. II, opopanacis, cumini thebaici, centaury, nitri, sulphuris uiui, abrotoni, ammoniaci thymiamatis, seminis rutæ sylvestris, absinthij, singulorum drach. I, contusa & cribrata excipe aqua, & efforma pilulas fabæ Aegyptiæ magnitudine, & unam quotidie præbe cum aceti mulsæ cyathis IIII. Diuina huius cõpositionis uis est. Recipit autem simplicia XII, & habet drach. XV. Aliud. Coagulum leporis quotidie ieiunus bibat erui magnitudine aqua dissolutum. Si non adest leporinum, hoc dino utatur. Aliud Archigenis. Ad comitiales, & qui per circuitum couelluntur, & à uoluulo uexantur, & ex diuturno capitis dolore laborant. Castorij, abrotoni, radicis panacis, pyrethri, croci, singulorum drach. VIII, seminis rutæ sylvestris, myrrhæ, piperis, singulorum drach. IIII. Terito in aceto mulso scillitico, & pastillos drachmales formato, & unum exhibeto non febrilibus cum aceto mulso. Febrilibus in remissione ac interuallo cum aqua mulsæ per triduum, Deinde interposito triduo, rursus per aliud interuallum dato. Facit etiam ad arthriticos. Ducit mulieribus menses, si nouies per interualla uelut diximus bibatur. Aliud cõsimilis usus, Castorij, piperis, radicis

A 4 panacis

panacis, singulorum drach. viii, pyrethri, staphidis sylvestris, abrotoni, seminis rutę, zingiberis, acori, dauci, singulorum drac. iiii, croci, iridis, cardamomi, singulorum drach. ii. Dato ex hoc arido cochlearium cum aqua mulsa. Facit ad comitiales, resolutos, & tremulos.

De his qui ex stomacho primario affecto, comitalis morbi modo exacerbantur. Galeni. Cap. xvii

Quando stomacho primario affecto fit morbus comitalis, oportet agro precipere ut bonę concoctionis studiosus sit, & circa horam tertiam panem accipiat probe præparatum, ex uino ueteri albo & tenui diluto ac leniter adstringente. Dato autem ipsis etiam amarum ex aloë pharmacum sæpe in anno. Dicitur autem amplius de his qui ex stomacho comitalis morbi modo affliguntur, in Sermone de stomachicis. Multum uero prodest ipsis fesele, & spondylij radix ac semen, & aristolochia, cum aqua trita pota. Auxiliatur his magnifice & uenę sectio à talis & poplite, si assidue fiat. Noui etiam puerum qui omnino non corripiebatur comitali, ex quo pœonię radicem gestabat magnam & recentem de collo suspensam, ut indefinenter stomachum contingeret.

De his qui ex parte aliqua habent morbi comitalis causam.

Posidonij.

Cap. xviii

Quibuscunque uero ex alia manifesta parte morbus comitalis principium habet, uelut in prædicto puero ex crure: Post totius corporis euacuationem, unguentis locum prius excalfacere oportet. Deinde epithema ex seminibus imponere. Et ex emplastris quę rarefaciunt & intemperiem transmutant. Quale est quod Ebrietas appellatur, & quod ex althæa paratur, & mnasæa inscriptum. Postea uero phœnicinum appellatum. Post temporis autem interstitium drosaces ac sinapismi loco adhibeantur. Et sic quidem adolescentes ac iuuenes, & inclinatę ætatis homines, fortiter curare oportet.

Curatio senum ac puerorum comitali correptorum.

Cap. xix

Senes autem & pueri affecti hoc modo curentur. Corporis equidem euacuationes in his uitare oportet per purgantia medicamenta. Imbecille est enim & senibus & pueris corpus, ad resistendum fortitudini purgatiuorum. Per clysterem uero euacuandi sunt præsertim senes, ex centaurea, aristolochia, polypodio ac anetho. Sed & manducationum usus senibus conuenit, & gargarismatum, ac eorum quę naribus induntur. At uero pueris simplicissima infusa immittantur. Frictoriorum quoque ac sinapismorum simpliciorum usus pueris adhibeatur. Senibus autem efficaciorum. Sed & antidoti præscriptę senibus sunt exhibendę.

Curatio ualde senum comitalium. Posidonij.

Cap. xx

Valde senibus consulendum est ut uictu solum calidiore utantur, & ut bonę concoctionis rationem habeant. Impossibile est enim eos qui cum hac affectione consenuerunt, humana ope curari, ac à morbo liberari. Quibus autem temperaria est affectio, ab aliquibus occasionibus allapsa, etiam si ualde senes fuerint, ab ipsorum curatione desperandum non est.

Curatio puerorum recens natorum comitalium. Posidonij.

Cap. xxi

Afficiuntur etiam recens nati pueruli à morbo comitali, & difficilem curationem habent, non tamen desperatam. Possunt enim ipsorum matres aut nutrices calidis cibis ac potibus nutriri, quo lac semper calidius ac tenuius fiat. Possunt etiam capita infantium puluisculis calidioribus conspergi, uelut est cypre-

est cyperus, adiantum, iris. Oleo item anethino assidue illini, & irino, ac amaracino calidis. Lauari quoque possunt, ita ut caput non rigetur, neq; calida, neque frigida. Nisi ubi opus fuerit sordes detergere per spumam niri ac mel, & sic caput iolum calida ablueri, non autem immergere. Dandum est etiam ipsis mel despumatum ad delingendum. Et collo alliganda est pæoniæ radix recens, ut semper stomachum contingat.

De fatuitate.

Cap. XXII

Fatuitatis quoq; ac delyrii curationē aggredi oportet à principio generationis ipsorum, si partes corporis uniuersæ, & præsertim capitis, moderatè se habuerint, & si rationem antea moderatam ac integram habuerunt, postea uero dementes apparuerunt. Oriuntur ambæ affectiones frigidior cerebro factio, alia quando ex sola qualitate, uelut fieri solet in profectionibus dum pluuia caput frige facit, aut etiam uehemens uentus. Aliquando uero etiam modica pituita ad cerebrum illapsa. Differt autem fatuitas à delyrio, quòd fatuitas quidem consequentia & dicit & facit. Delyrium autem transgressionem inconsequentem habet, & sermonem alium alij connectit, ita ut posterior nihil commune habeat cum priore. Delyrium item senibus plerunque accidit. Fatuitas autem & in pueris, & adolescentibus, ac reliquis ætatibus, ex prægressis quibusdam morbis consequitur. Caterum curatio amborum morborum consimilis est ei quæ ad comitiales relata est, per calefactoria auxilia similiter fiens, non tamen similiter siccantia.

De memoria amissa. Ex Ruso ac Galeno.

Cap. XXIII

Memoriæ detrimentum sæpe in quibusdam morbis factum esse compertum est, læsa simul etiam ratione. Ita ut affectio quidem utraque eadem sit, intendatur autem quando unà cum memoria etiam ratio perijt, quod sanè fatuitas appellatur. Pereunt autem ambo hæc in lethargo, & omnibus affectionibus soporiferis. Vnde etiam curatio ad prædictas affectiones descripta adhibetur instantibus iam morbis. Contingit autem hoc etiam ex peste, quemadmodum accidit in peste Athenis facta. Si uero irruerit aliquando ex aliquo prædictorum morborum, soluto iam in totum, & in obliuionem transeunte: considerare oportet qualitatem magis prædominantem, hoc modo. Sola quidem humiditas redundans, profundos ac longos somnos facit. Sola uero siccitas, uigilias. Si uero frigiditas fuerit cum humiditate, soporiferæ ac stupidæ affectiones fiunt. Si uero humiditas fuerit cum modica frigiditate, memoriæ detrimentum & fatuitates succedunt. Quum autem multa sit differentia temperaturarum, pro maioris ac minoris ratione, multiformis fit uarietas causarum animales actiones lædientium. Obseruare igitur oportet somnos eorum qui memoriā perdidērunt, aut intelligentiam: Intelligentiæ enim amissio fatuitas est: utrum somnos lentī sint ualde, an moderatus ipsis sit somnus. Ita enim repereris intemperaturam prædominantem. Insuper autem cōsiderandum est utrum multa excernantur per os & nares de humoribus ex capite delabentibus, aut siccæ appareant partes hæc. Si quidem igitur frigiditas sola est, calefacere solum cōuenit, non item siccare. Si uero cum siccitate fuerit frigiditas, calefacere ac humectare. Atq; ego sanè noui quendā qui fermè memoriā amiserat, & ratione læsus erat, ob studiū & uigilias circa disciplinas. Alium item uinitorem ob uinæ labores similiter affectū. Et uterq; ipsorum palam à calefacientibus ac siccantibus lædebat: Ab humectantibus uero simulq; calefacientibus opem sentiebat. His aut prædictis curationē annectamus, Si igitur ob purgationes quasdā, aut alias immodicas

dicas euacuationes, aut animi deliquia, fractis uiribus, memoriae detrimentum
 succedat, resectoria diæta uti conuenit, nihil aliud curiosius moliendo. Robo-
 ratis enim corporibus & collectis uiribus, restituitur etiam memoria. Eodem
 uero modo si propter extremam senectutem accesserit memoriae detrimentum, non
 oportet curiose quid moliri, sed solam conueniente diæta cõtentum esse. Qui-
 bus autem derepente deficit memoria, alia uero sana esse uidentur, in his comi-
 talem successurum timere oportet, aut resolutionem, aut etiam syderationem.
 Et in summa magnum quoddam malum in ipsis comperies. His igitur suffi-
 ciunt aliquando præseruationes à morbis imminetibus. Dum enim morbi ad-
 uentum prohibemus, ex hoc etiam memoria conseruatur. Prohibent autem
 prædictos morbos, primum attenuans & incisoria diæta. Deinde etiam purga-
 tiones conueniunt, & similia. Si uero ex morbis uelut dictum est irruerit, uelut
 lethargo aut peste: horum curationem contentiosius aggredi oportet. Summa
 uero medelæ est in calfaciendo uniuersum ipsorum corpus, intrinsecus ac extrin-
 secus, iuxta mensuram euariationis habitus naturalis. Calefactoria quæ ferme
 talibus conueniunt æstate quidem oleum per se calidum: Hyeme uero irinum
 cum aceto acriori, aliquando serpillio, aut spondylío, aut calamintha in ipso co-
 cto. Aliquando etiam nitro iniecto & pipere, aut baccis lauri. Commodum
 est etiam castorium cum oleo occipiti adhibitum. Auxiliatur autem his maio-
 rem in modum hieræ Rufi purgatio. Quandoque enim inquit huius solius pur-
 gatione usus, multum profeci in purgando, quum nihil boni secum detrahat.
 Incipit enim supernè à capite detrahère, & postea etiam alias partes pertransit,
 nullam uiolentiam, nullum dolorem inferens, non ardorem, non stomachi do-
 lorem, non sitim. Verum semper pro euacuationis ratione alleuat. Vnde etiam
 stomachum corroborat per purgationem, ut ciborum quoque appetentiam au-
 geat. Creditur etiam post purgationem per hieram, eboris ramentum memo-
 riæ opitulari, drachmæ pondere potum cum aqua mulsa, & similiter cerui cor-
 nu. Quin & castorium similiter drachmæ pondere potum, post purgationem
 cum aqua mulsa magnopere prodest. Maximum auxilium est & ueratri albi
 potio, non uelut quidam putant postremum, sed ab ipsa recte etiam quis incipe-
 re possit. Quid enim opus est diu & multum laboribus fatigari, quum ex ma-
 ximo auxilio maximam medelam consequi liceat? Quare citra omnem fora-
 midinem ueratrum dandum est, priusquam æger per morbum excoletur, & ui-
 res auxilij exiles fiant. Commoda sunt quoque sternutatoria ex ueratro albo
 & castorio, naribus admota post euacuationes: & quæ naribus induntur ac in-
 funduntur: & quæ pituitam per os detrahunt. Alimentum uero conuenit fra-
 bile & aliquo modo calefactorium ac attenuatorium. Ab oleribus autem o-
 mnibus frigefacientibus abstinendum est, & à fructibus ac bellarijs, caseoque ac
 lacte, & à cibis crassefacientibus ac inflantibus. Alia enim ex ipsis spiritum
 conturbant, alia densant. Acriora uero ex interuallis exhibeantur, uelut sunt
 allia, thymbra, origanum, pulegium, & raphani. Sed & horum copia uitane-
 da est. Semper autem cruditas cauenda. Nam cruditates omni re magis men-
 tem uitiant. Vinum his conuenit tenue, album, & non ualde uetus. Per mode-
 ratam enim caliditatem tum alia non pauca potest, tum animam mansuefacit &
 ad tripudia aptam facit, motum ei præbens concinnum ac sedatum. Multus autem
 aquæ potus, & adhuc magis uini, pessimus est. Caput enim ualde humes-
 cat. Multa autem humiditas obliuiofissima est. Somnus sit moderatus, & à re-
 pletionem ne fiat, Veneris uero usus sit rarissimus. Neque enim ad totam sanitatem
 conducit,

conducit, neque ad animæ ratiocinationes. Imò & tristitiam inducit, & lancia natio illa in coitu contingens, conuulsioni quodammodo cognata est. Et per frigeratio quæ succedit congelat quodam modo ac stupefacit intelligentiam.

Cæterum post purgationes uniuerfales ac locales, etiam sinapismus occipitis commodus est, & post sinapismum, balneum. Cruditas autem & lassitudo penitus uitentur, tum aliarum corporis partium, tum maximè capitis ac ipsius mentis: Vitandi quoque uehementes ardores ac frigora. Ambo enim caput replent. Vitanda & edulia crassefacientia, & infantia, ac humectantia. At uero si quis ex his progressum faciat, etiam in sanis qui humidius caput habent, uicis rationem commodam præscribere poterit, ut quis optima memoria præstet.

De commorſis à cane rabioso, aut his qui aquam timent. Ex Rufo

& Posidonio.

Cap. XXIII

Quæ canes natura calidi ac sicci sint, per æstatem ex ambiente nos aëre aliam caliditatem ac siccitatem acquirunt, & ob immoderatam intemperaturam insaniant, & hæc insania rabies uocatur. Patiuntur autem hoc magis in illis regionibus, in quibus maximæ & inæquales ambientis mutationes inordinatè fiunt: In quibus & hyemes uehementes fiunt, & æstus excellentes. Insanientes autem canes, & siti uehementi correpti potum non admittunt, eo quod insaniant.

Vnde etiam magis intenditur ipsis ueneni malignitas. Signa canum rabiosorum hæc sunt. Muti sunt & adeo delirant ut ne familiarissimos quidem cognoscant, sed hos primum attingant. Cibum auersantur, & siticulosi quidem sunt, non tamen bibunt, & plerumque anhelant. Ore autem hiant, & linguam exerunt, ac saliuam largam & spumofam profundunt. Aures item inclinant, & caudam laxatam habent, segniusque incedunt & uelut somnolentiores existunt. Si uero etiam currerint, uelocius solito currunt intempestiuè ac inordinatè.

Huiusmodi canes fugere oportet. Omnes enim qui à rabioso cane morſi sunt, si neglecti fuerint, aut male curati, in affectionem timoris aquæ incidunt. Et hoc maximè patiuntur qui uitiosis humoribus repleti sunt. Vnde quidam statim ubi commorſi sunt, aquam & alios liquores timent. Alij post quadraginta dies. Alij post longius tempus. Contingit autem ipsis grauior perturbatio, quum aquam, aut aliud quoddam pellucidum speculum uiderint. Aspiciunt enim faciem suam rubicundam, ac toruè tuentem, atque ira plenam. Fieri autem potest, ut quemadmodum aliqui dicunt, etiam canis à quo morſi sunt imaginem in aquis apparere imaginentur. Recordati autem formæ canis, conferunt ab immodico timore corripuntur. Hoc uero patiuntur ob immodicam siccitatem. Nam philosophus quidam morſus à rabioso cane, & geroso animo affectioni resistens, & incoſequens ratus canem in balneo apparere: Apparebat enim ipsi quemadmodum etiam alijs hoc modo affectis: Ratiocinatus igitur & sic secum loquutus: Quid cani & balneo commune est? superauit affectionem, & sanatus est ab affectione, ubi citra timorem bibisset. Quum igitur aliquis à rabioso cane commorſus est, ei quàm celerrime per receptam curationem auxiliari oportet, etiam si paruus & in superficie consistens fuerit morſus, de hac re certi, quod nullus ex his qui non probè curati sunt effugit. Primum itaque uulnus maius facere oportet, osculo ipsius per scapellum diuiso ac dilatato. Deinde etiam fissuris incussis omnem circum locum uellicare, eo studio ut effluxum sanguinis multum per locum efficiamus. Vlcus uero cauterijs ignitis amplioribus inurere. Deinde porrum imponere, aut panem cum

sale

sale trito, aut cepas, aut allium. Et ubi crusta exciderint, ulcera ad dies quadraginta aut sexaginta à cicatrice arcere. Et si ad cicatricem peruenerint, rursus per cinerem uitis aut ficulneum, & similia, ulcera resolueret. Hac de causa bonum est etiam folia marrubij, & anagallidem imponere. Hæc uero etiam à cerasse serpente morlis magnopere auxiliatur. Vlcus autem perfundendum est chaz mæmeli, & radicis rumicis acuti, quem oxallidem uocant, decocto. Noui ego quendam senem, qui ubi quis morsus esset à rabioso cane, sola oxallide curabat. Nam & ulcus decocto perfundebat, & herba integebat, & de ipsa bibendum dabat. Et hoc pharmacum uelut robustum ualde laudabat. Mingunt autem homines qui ipsam acceperunt multa & intemperata. Et propterea morbum regium hæc expurgat. Nos uero etiam impetiginem ex ipsa cum aceto confrictam depellimus, & pruritui auxiliamur per eandem radicem. Vtimurq; etiam ipsa ad morsus canis rabiosi cum alijs auxilijs. Similiter facit etiam syluestris rumex aculeatus, radicem habens oblongam, uelut raphanus paruus. Commოდum est etiam ipsis pharmacum Galeni ex pice brutia. Est autem hoc. Pice brutia lib. i. opopanax quadrantem, aceti heminas ii. Opopanax cum parte aceti terito, Reliduum uero aceti ad picem adijce, & coque donec acetum consumatur, atq; ita ad tritum in mortario opopanax diffunde, & unita excipe ac impone, & hoc pharmaco per dies quadraginta aut sexaginta utere, & non permittet ulcus cicatrice includi. Bonum est & theriacam antidotum ex uiperis oleo rosaceo dilutam uulneri imponere. Sed & aridum hoc ipsis conuenientissimum est. Salis fossilis drach. viii. chalcitidis drach. xvi. scillæ drach. xvi. rutæ uiridis drach. iiii. æruginis rasæ drach. iiii. feminis marrubij drach. i. Reponitur siccatum in sole, in ærea pyxide. Vtere primum sicco, donec crusta inducatur. Deinde cum rosaceo, donec crusta excidant. Sed & potamogeton cum sale impositus non permittit incidere in affectionem timoris aquæ. Vtere autem hac herba & humida & sicca. Danda est etiam antidotus theriaca in potu per primos tres dies, nucis auellanae magnitudine. Neque enim aliquem noui qui eam accepit aquæ timore correptum. Nec uero ab alijs auxilijs abstinentium est, sed danda maximè est antidotus celebris ex cancris fluuiatilibus. Est autem compositio eius hæc. Cancrorum fluuiatilibus magnorum uiuorum, in uase aeris rubri uistorum cineris dextantem, gentianæ quincuncem, thuris unc. i. preparandum est hoc pharmacum mense Augusto luna decima octaua. Si uero non affuerit quod sic præparatum est, nihil de hoc curiosus sis, sed quocumq; tempore paratum exhibe uelut dictum est. Præstat tamen lignis uitis exustionem ipsorum facere. Dato cochlearij mensuram cum aqua calida ad dies quadraginta, si ab initio hac potione usus fuerit. Si uero non ab initio, sed post aliquot dies, dato quotidie cochlearia duo, donec impleueris quadraginta dies. Facit quoq; per seipsum cinis cancrorum potus, & cum melle uulneri impositus. Præparatur quoq; antidotus ex nucibus, etiam febricitantibus iam conueniens. Nam supra hoc quod affectioni resistit, etiam somnum conciliat. Compositio eius hæc est. Sagapeni drach. ii. opij thebaici drach. ii. croci sesquiscrupulum. lycij indicis scrupulos x. & dimidium. carnis nucum iuglandium nō ualde ueterum drach. xl. excipe & exhibe drach. i. cum aqua pluuiali calida ad noctem, post uigorem febris. Ita ut mane quidem antidotum ex cancris, uespero uero ex nucibus præbeas. Quod si hæc antidoti non adsint, dato confectionem cyphi apellatam, siue eam quæ ex rebus xxxvi. constat, siue eam quæ ex xxxviii. paratur habueris: commodus est etiam succus cyrenaicus aut parthicus, fabæ magnitudine

gnitudine deuoratus. Quidam hepar ipsius canis qui momordit coctum præbent commorso. Mergi quoque iecur assatum datum cum oleo ac modico sale commodum est. Aiunt enim ita efficax ipsum esse, ut æger euestigio aquam petat. Sed & hippocampus marinus assatus comestus prodest. Sanguinem enim ipsius amorem aquæ inducere dicunt, & formidini aquæ resistere. Vnde iterum atque iterum hippocampus edere iubent. Et ipsos hippocampos cum acris aceto tritos ulceri imponunt, & hoc pharmaco sæpe rabiem superarunt. Quin & catuli coagulum cum aqua datum, utilissimè ab ipsis bibitur. Et ubi semel ipsum acceperint, assidue commouet ipsis potus cupiditatem, & bibunt, etiā alios liquores intrepide. Oportet autem catulum non multorum dierum esse, sed recens natum & adhuc lactentem. Prodest ipsis etiam leucanthemum herba pota. Tantam autem eius vim esse aiunt, ut si ex ea fundum poculi sublinatur ac exhibeatur, ipsi libenter potum accipiant. Idem etiam de chamæmelo traditur. Utilissimum autem est ipsis bitumen iudaicum cum potum cum aquæ cyathis tribus. Datur ex ipso perfectis scrupulus unus, aut uelut aliud exemplar habet, drachma una. Vtiliter etiam datur syluestris fici uirgultorum cortex siccatus ac tusus & cum aqua potus. Et Lycium iudicum. Et abinthium, & scordium, & centaurea parua. Aristolochia, artemisia, chamædrys, bryonia radix, polium, laser, cancrorum fluuiarium decoctum multo anetho cum ipso cocto. Substernitur autem commodè & insternitur ipsis, ursæ pellis, & phocæ. Sed & hyenæ pellis efficacissima est, ut ipsis infecta uelociter mentem in integrum restituat. Quin & pellis hyenæ exusta, ita ut cinis in potu detur, affectionem formidinis aquæ sedat. Cognitionem autem an homo à periculo liberatus sit, ex his sumit. Vlcus nucibus regijs leuissimè tritis integre. Sequenti uero die solue, & cataplasma gallo aut gallinæ edendum obijce. Si enim ex eius esu non mortui fuerint, tunc ulcus ad cicatricem perducito, nimirum uelut liberato ægro à periculo. Vere autem eodem etiam ab initio ad dinotionem. Si enim gallina ex esu cataplasmatum prima die impositi ulceri non moritur, scito non à rabioso cane hominem morsum est. Si uero mortua fuerit, uice uersa. Primum enim ne attinget quidem. Si uero à fame coacta ederit, morietur, si rabiosus canis fuerit. Hoc igitur quotidie alterare oportet, donec ex eius esu gallina non moriatur. Cæterum ulcus ipsum optimè ac tutissimè ad cicatricem perducit antidotus theriaca, cum rosaceo diluta. Vlceribus autem ad cicatricem perducitis, ueratrum album præbeatur ad totius affectionis destructionem. Nam & rabiosi canes hoc cum polenta accepto uomunt, & statim resipiscunt à rabie liberati. Fieri etiam poterit quod opus est, si per Ruffi hieram infra purgaris, ubi quid prohibuerit ueratri acceptionem. Danda est etiam quotidie hiera, non ad purgationem, sed tanquam auxiliare medicamentum, nucis auellanæ magnitudine, cum cyatho decocti saluæ, aut herbæ sideritidis, quam herachleam appellant. Quidam etiam sola ipsa utuntur, & multum prodesse dicunt, & propterea etiam Alyssum, ab eo quod rabiem eximat, ipsam nominant. In uictu indigentia & repletio uitanda sunt, & magis indigentia. Nam indigentia humorum malignitates augent, quod nequaquam commodum est ulceri maligno. Quapropter alimentum moderari oportet, quo & probe concoquat corpus, & succulentissimum ex bono succo fiat. Quin & egestionum quotidianarum & mictionum cura habenda est. Ad hoc autem faciunt & prædictæ radices, & scandix comesta, & sceniculum. Crethini autem tum uentrem, tum urinam mouet. Cichorium uero syluestre etiam stomacho commodum est crudum comestum. Appellant ipsum aliqui serim, aut picridem. Commodus est & brassicæ aspara-

B gus,

gus, & asparagus palustris, & rumex hortensis, & agrestis, & acutus. Et ex piscibus qui teneram carnem habent, gāmari & cancri, & herinacei recentes cum uino mulso. Ex carnibus extremæ partes, & uolucres omnes montanæ, concoctui faciles ac boni succi. Vinū tenue & album, nō ualde uetus. At uero præseruationis gratia singulis annis appropinquante eo tempore, per hieram præparari oportet. Et instante iam die theriacam antidotum accipere per triduum.

De cerebri inflammatione.

Cap. xxv

Cerebrum inflammātū sæpe ita intumescit, ut etiam futurę capitis disparentur, & dolorem maximū ac exurentem cōpressis membranis inducit. Consequitur nausea stomachi multa, & bilis uomitus, & rubor multus in facie cōsistit, & oculi prominent, & facies intumescit, itemq; totum caput. His ergo uena secanda est à cubito. Oportet quoq; à naribus & uenis sub lingua sanguinē euacuare. Vtere etiam irrigationibus capitis, quarum usus aliās ad inflammationes adhibetur, & cataplasmatibus humectantibus & concoquere ac maturare potentibus.

De erysipellate cerebri.

Cap. xxvi

Fit & erysipelas, hoc est, ignis sacer, in cerebro, & patitur æger hæc. Dolet totum caput, & uidetur sibi flammam in ipso habere. Et facies ipsius frigida est, itemq; præcordia. Et os siccat. His igitur uena secetur, & præsertim uenæ sub lingua incidantur. Forinsecus autem adhibe capiti frigefacientia unguenta, & pastillos quibus ad erysipelata utimur.

De syderatione. Ex Galeno.

Cap. xxvii

Syderatio propter repentinū exortum, indicat humorem crassum, aut frigidū, aut uiscosum implere principales cerebri uentriculos, & nō propter intemperiem totius essentia eius fieri. Magnitudinem itaq; periculi, ex magnitudine læsionis respirationis coniecta. Quū enim respirationem multū impediri, & uix fieri uideris, nō paruam morbosam affectionem conijce in cerebro factam esse. Est aut syderatio Græcis apoplexia appellata, priuatio sensus & motus totius corporis, unā cum læsione principalium actionū, derepente incidens. Ex Archigene. Syderationis affectio ex natura magna est, & uehementer acuta. Contingitq; ut qui periculum effugerūt in diuturnū morbum incidunt, resolutionis aliquarū partium, aut etiam totius corporis, aut etiam uiolatę rationis. Senibus aut magis accidit affectio, & magis in hyeme, & cōstitutione frigida, & ex uehementibus cruditatibus, & ardoribus uehementibus, & immodico uini potu ac ebrietate. Talia enim habitū perfrigerant. Et in summa qui in hanc affectionem collapsi sunt, uiuentes sunt cum mortificatione, aut cū tota sensus priuatione. Priuatum igitur corpus oleo calido inungendū est. Caput autem rigandum rosaceo cum aceto. Coquendū est autem in aceto serpillum aut spondyliū. Odoramenta quoq; adhibenda sunt, castorium, opopanax, & galbanū. Et aperto ore insillandum est acetū mulsum. Et pinnae oleo cyprino, aut irino, aut narcissino imbuitæ immittendæ sunt, & uomitus prouocandus, & sedes assidue illinenda cū ruta & cumino, addito nitro ac melle, ad flatum prouocandos. Si uero hæc nihil profecerint, clysteribus utendū est ex decocto fufurū, & cucumeris syluestris radices, & centauro, nitroq; ac melle. Aut ex muria cum melle ac oleo ruta ceo. Enten dum autem est ut quod infusum est emittatur, per lumborum ac uentris frictionem. Et si opus fuerit etiā digiti in sedem immittantur & obturamenta educantur. His peractis uenā secare oportet periculo prædicto. Detractio autem fiat dextra manu, & copia eius qui detrahitur diuidatur. Commouere enim oportet tantum, non exoluere uires, & calorem extinguere. Inspiciantur etiam pulsus in

in euacuatione, & faciei color, ac respiratio. Et si nihil mali consequitur, etiam repetenda est detractio. Post uenæ sectionem, adhibeantur odoramenta exci-
tatoria, & uociferationes. Et corpus totum inungatur. Et si qua pars resolu-
ta fuerit insigniter, hapso lanæ integatur sicyonio aut pingui ueteri oleo, imbu-
to. Qui uero ad uenæ sectionem inepti sunt, primum ad uomitum uelut die-
ctum est, commoueantur, & sedes ipsorum illinatur his quæ flatus educunt.
Deinde post illitiones, cucurbitis concutere conamur magnis & fortibus, retror-
sum iuxta lumbos affixis, & ubi per tempus aliquod attraximus, transferimus
ipsas utrunque ad pectinem ac inum uentrem. Sape enim expresserunt ea quæ
in uentre sunt, & simul cum expressione reuocarunt morbo occupatos. His
uero nihil efficientibus, aliquando ipsi ausi fuimus ori hieram infundere. Et quæ
suscipere non possent, quantum oportet, per clysterem infundimus. Et prius-
quam quicquam egeretur, accidentia concurrentia reuocarunt me ad amplio-
rem aggressionem. Et sanè permittit hæc affectio, ac cogit uel temerè omnia ten-
tare. Hæc igitur in necessitate fiunt. Vbi uero tolerare possunt, etiam reliqua
auxilia annecte. Febris tamen occupat hominem, alios prima, alios secunda
die, & exhibet spem salutis ipsa calamitas febris. Sed neq; negligenda est. Vbi
si qua resident in intestinis, ea educere oportet. Si deorsum repât, per clysterem.
Si sublimia sint, per purgatorium inferne pharmacum, & maxime per hieram
Archigenis. Post purgationem cucurbitæ præcordijs ac capiti affigantur cum
scarificatione. Si uero aliqua compunctio etiam inferius fiat, illic quoq; scarifi-
catio adhibeatur, præsertim in mulieribus, iuxta uteri regionem. Quod si ad
altam quandam affectionem transitus fiat, curatio ad illam adaptetur. In sum-
ma uero providendum est in syderatis, ut facilis fiat per aluū ac urinas excretio.
Curandum est autem ut accipiant cibos quotidie quidem, uerum paucos & le-
ues ac calidos, & exterforia ui præditos, plerumq; cum melle edulcatos.

De Resolutione. Ex Archigene.

Cap. XXVIII

Quum omnes nervi sensum simul ac motum amiserunt, Syderatio appellatur
affectio. Si uero iuxta alterā partem, siue dextram, siue sinistram hoc contigerit,
Resolutio uocatur, illius partis uidelicet iuxta quam facta est. Constat hæc
affectio, humoribus multis uiscosis ac crassis nervos obturantibus, per quos mo-
tus uoluntarij perficiuntur. Manifestū igitur est quod redundantem humorem
euacuare oportet. Nec uero aptius principium in his reperire datur quàm a ue-
næ sectione, si quidem permiserit ætas, habitus, tempus, studium, prægressus ui-
ctus, & reliqua quæ prohibere solent uenæ sectionem. Oportet autem modera-
tam detractionem facere, ut ne perfrigerentur. Frigiditas enim cum siccitate, ue-
lut dictum est affectionem inducit. Quapropter solum imminuenda est materia
paululum per uenæ sectionem, & præsertim in prouectiori ætate. Detractio
uero fiat a sanioribus partibus. In hoc aut tempore contesta esse oportet mem-
bra, hapso lanæ oleo sicyonio aut gleucino imbuto. In prouectioribus ætate, etiā
caloriorum inspergendū est irrigationi. At in his qui derepente resoluti sunt, ue-
lut ex ardore, præstat irrigatio ex lanis succidis, & oleo ac aceto, aliquando etiam
nitro. Sape uero irrigationem renouare oportet. Cibus cōuenit his modicus.
Sint aut forbitiones alicæ lotæ, & succi ptisanæ. Interpositis diebus quibuscūq;
a uenæ sectione, aluus subducatur, primū clysteribus; Deinde etiam per aloës &
polypodij ac colocynthis cremorem purgetur. Conuenit etiam hiera Archige-
nis pro uiribus accepta. Post purgationē cucurbitæ affectis partibus adhibean-
tur. Si uero hæc ineptæ fuerint, uicinis affigantur. Post cucurbitas utendum est

B 2 cata

cataplasmatibus ex semine lini, & fano græco, ac ordeï farina, cum oleo ueteri coctis, & pulueribus insperfilibus ammixtis. Aut etiam emplastris quæ acceperunt picem, resinam, mamnam thuris, aliquando etiam bitumen. Egregiè facit & artemisia coïncocta, & calamintha, ac ruta, & conyza. Postea uero etiam nitrum ammiscemus, & in muria cataplasmata coquimus. Modicam autem aquam esse oportet, quæ & ipsa in coctura consumatur. Postea autem pro lini semine, farinam loliaceam & fabaceam adhibere conuenit. Optimum est & erysimum. Deinde cerata & ungenta adhibeantur. Aluus autem semper facile solubilis sit. Catapotia ad resolutiones, tremores, & opisthotonicos. Succus cyrenaici, piperis, galbani, singulorum drach. i. passo dissoluto ac facito catapotia, & dato ex eis obol. ii. & his acceptis absorbeant aquæ mulsæ cochlearia duo aut tria. Aliud ad tremulos, resolutos, & opisthotonicos. Myrrha, castorij, styracis, piperis, æqualibus partibus utere. Aliud. Opopanacis, sagapeni, castorij, myrrhæ, succi cyrenaici, piperis, uirgultorum rutæ, singulorum drach. i. præpara catapotia & exhibe, & insuper absorbeant aquam mulsam. Ungenta uero idonea sunt huiusmodi. In aliquo ex prædictis oleo scillam macerare oportet in sole ad dies quadraginta. Si uero tale oleum non affuerit, in præfens scillæ sextantem in olei sextario coquere oportet. Similiter etiam canchry, hoc est libanotidis semine utendum est. Ammiscendum est & ceræ parum, & galbani, & propolis, aliquando etiam castorij unc. i. & adarces ac euphorbij, singulorum drach. iiii. & nitri drach. iiii. Commoda est quoque ranunculus herba similiter præparata. Manifestum est autem quod à lenioribus incipere conuenit. Sed & cerata ex his parari possunt, adiecto pyrethro, baccis lauri, nitro, sinapi. Malagmata uero conueniunt ex baccis lauri, & quod uiride appellatur. Sæpe uero sufficit ceratum cyprinum, largo sinapi ammixto, quod malagmatis usum exhibet. Conueniunt etiam sinigmata ex fece uini, & aceto, & combusta adarce, euphorbioq; ac calce uiua parata. Sed & dropaces ipsis commodissimi sunt, sint autem leuia omnia quæ imponuntur, propter corporum debilitatem. Reuocat autem sensus etiam thapsia cum aqua illita aut cum aceto, post dropaces. Item illitio ex cantharidibus. Verum ulcerationes ex talibus fientes cicatrice citius includere oportet. Quin & sinapismi ipsis comodi sunt, & postea balneum. Utendum est post purgationem etiam positionibus ipsis conuenientibus. Castoriū itaq; assidue ipsis detur drach. ii. pondere cum aqua mulsa. Et opopanax magnitudine fabæ, cum castorio, & sagapeno erui magnitudine ab ipsis deuoretur. Item succus cyrenaicus eadē magnitudine. Sed & farmentorū uitis uiridiū, decoctū, à ieiunis assidue potū, ualde prodest partibus corporis resolutis. Vtilissima est etiā post purgationes & aliās euacuationes, theriaca ex uiperis antidotus, & mithridatica. Est & simplicius pharmacum ualde celeberrimum ad huiusmodi affectiones, hoc. Castorij, seminis rutæ syluestris, opopanacis, sing. obol. ii. pyrethri obol. i. acori tantūdem, piperis grana. x. Cū aquæ mulsæ cyathis ii. dimidium huius totius primū dato, robusto uero totum. Vniuersa uero curatio à capite initū sumat. Hoc enim radix est & principium totius affectionis. Quapropter illitiones ipsius sint, castoriū, peucedanū, baccæ lauri, & menta. Hæc modico acri aceto excipiantur, addito irino ungento, ut liquidioris ceratæ crassitudo fiat, & illinatur ex hoc totū caput usq; ad frontē. Sed & odoramenta eiusdē generis adhibeantur. Postquā aut aluus efficaciori clystere præeuacuata est, & totū corpus iam minus superfluitatum habet, cucurbitæ capiti adhibeantur cum scarificatione, primum quidem tali quæ multum sanguinem extrahere potest.

potest. Deinde uero moderatiore. Hoc autem auxilium sæpe adhibendum est, leuibus & inanibus cucurbitis primum capiti circumpositis, & deinde locis agglutinat. Sic enim affixæ nihil minus quàm repetita sanguinis detractio possunt. Tonsura uero non solum cucurbitarum gratia, sed etiam per seipsam assidue fiat. Si uero ambiens nos aer non fuerit frigidus, etiam rasura commoda est. Statim autem prædictis illitionibus caput modicè confricandū est. Postquam autem detracta fuerit materia, etiam sternutatorijs & pituitam per os ducentibus utendum est. Ego uero etiam crustas inurere nō dubitarim per ignem, aut per medicamentum. Vnam quidem circa occipitis cauitatem, quo loco spinalis medulla initium habet, duas autem ab utraq; ipsius parte. Tres aut quatuor in uertice. Vnam ex his in medio capitis, tres circū ipsam. Vlceribus enim diutius fluidis permanentibus, non despero perfectam restitutionem. Reliqua diæta sit attenuatoria, uentri cōmoda, nihil uiscosi aut uirosi habens. Et quæ urinae ciant alimentis ammisceantur. Utendum est etiam potionibus relatis ad morbum comitalem, & ungentis ad arthriticos referendis. Quum enim cōmunia sint hæc, superfluum est eorum etiam hic meminisse. Si uero fuerit æstas, etiam in totum detegantur loci, & denudati aëri exponantur. Quibusdam enim hoc tempore principium recuperationis actionum contigit.

De supercilij aut palpebræ resolutione.

Cap. xxxix

Si supercilium aut palpebra fuerit resoluta, curabuntur ungentis calidioribus & acrioribus fronti illitis. Palpebra uero collyrio ex sandice & germinum oleæ succo illinatur. Optimum autem in ipsis, & maximè in supercilio relaxato, hoc. Mastichen cum succo brassicæ nō lotæ terito, & distenta frontis cute, fronti crassius illine. Perseuerante uero affectione, palpebram quidem futura curat. Supercilium uero fasciolæ de fronte ablatio.

De conuulsione canina.

Cap. xxx

Caninam cōuulsionem uocant mandibularium musculorum resolutionem. Distorquetur igitur in obliquum os & nasus & oculus, & in summa, dimidia faciei pars. Auxilia itaq; resolutæ parti adhibeantur, non oppositæ. Decipiuntur enim aliqui, qui mandibulam ab opposita parte distrahi putant. In commutatur ipsi commodant omnia in resolutione relata. Nam & sanguinis detractio, si nihil prohibuerit, & purgatio, & clyster, & cataplasmata, & ungenta, & malagmata, & sinapismi, & taphiæ usus, conducunt. Priuatim uero deligatura quæ ad opposita reducit. Et sanguinis detractio à uenis sub lingua. Et cucurbitæ duobus uerticulis impositæ. Et quæ pituitam per os detrahunt, item quæ per nares. Iam uero etiam acris illitionibus utendum est ad oculum affectū, præsertim collyrio ex sandyce & germinum oleæ succo.

Linguae resolutæ curatio.

Cap. xxxxi

Si lingua fuerit resoluta, uenæ sub ipsa secantur, corpore uniuerso prius euacuato. Et cucurbita sub mentū ponatur. Et quæ pituitam per os detrahunt, & collyria ex sinapi, & linguae exercitia adhibeantur. Reliqua item occipitio ac collo uniuerso admoueantur, uelut sunt illitiones acres, & epithemata, & sinapismi.

De instrumenti uocalis resolutione.

Cap. xxxxii

Resoluitur & uocale instrumentū, faucium inquam musculi, & extremitatis asperæ arteriæ, imò etiā thoracis superiores. Spiritus itaq; in ipsis supprimitur. Quidam etiā gracilem uocem acquirūt. Alij uix loqui possunt. Et alijs aliter uox impeditur. Proinde post uniuersalia auxilia, etiā thoraci adhibeantur ea quæ antea enumerauimus. Et gargarismi acres ipsis exhibeantur. Priuatim uero ad

B 3 ipsos

ipſos utendum eſt ſpiritus detentione, & coaceruata expiratione, & cōcinna uo-
ciferatione. Poſt hæc aut per uicſū ac exercitia uniuerſum corpus corroboretur.

Deglutitionis reſolutæ curatio.

Cap. xxxiii

Si deglutitio reſoluta fuerit, hoc eſt, delatrix ciborum promptitudo: Nam ſiſto-
machus, hoc eſt, gula reſoluta fuerit, perniciem inducit: calida omnia adhibenda
ſunt. Priuatim uero conandū eſt ut cibi indātur quā penitiſſimè, ut ne ad aſpe-
ram arteriam dilabantur. Cucurbitæ quoq; mento affigantur. Et ungenta uſur-
pentur ad partes iuxta tonſillas acriæ, ex caſtorio, ſagapeno, ſucco cyrenaico præ-
parata. Gargarifmi item ex ſinapi, Et quæ commanſa pituitam ducunt. Forinſe-
cus quoq; adhibendæ ſunt illitiones communes prædictæ ipſi mento.

Veſicæ reſolutæ curatio.

Cap. xxxiiii

Veſicæ reſolutio ſiue detinuerit urinas, ſiue inuoluntariè excreuerit, iſdem
cōmunibus auxilijs curabitur, circa pectinem & maximè circa intercapedinem
inter anū ac ſcrotum adhibitis, qua parte ſitum eſt ueſicæ collum, quem locum
quidam ſiran, id eſt catenulam appellant. Utendum eſt aut ſupra prædicta, iriga-
tionibus pectinis ex ungento nardino, & malabathrino ſuſinoq; ac ſicyonio, in
quo cocta eſt cryngij radix, cyperus, cardamomū, ruta. Sed & ſedes his illinenda
eſt. Poſt cōmunia uero auxilia, etiā per inſuſa in annū conandū eſt reuocare ueſi-
cæ actiones. Sunt aut hæc, à principio quidē caſtorij cū oleo ſicyonio, aut ruta,
aut cumīno, aut anetho in oleo cocto. Deinde centaurij & colocynthidis deco-
ctū, ita ut modò cum aqua, modò cū ptiſanæ ſucco ſimul coquantur. Optime ſa-
cit & anagallidis ſuccus. Et origani ac thymi decoctū. Omnibus aut ammiſcens
dū eſt oleū ſicyoniū & caſtorij: Aliquādo etiā opopanaca & galbanū in ipſis elia-
quamus, ſi frigoris ſenſus ipſis affuerit. Inſundimus etiā per colem oleū ſicyoniū
cū caſtorio aut opopanace. Quandoq; etiā ſilphiū in oleo coquimus. Priuatim
uero in his qui urinas detinēt cathetere inſtrumento inmiſſo ad urinas proleſtan-
das utimur. Et poſt urinæ euacuationē, cathetere adhuc inſito, aliquod ex prædi-
ctis inſundimus, anguſtiſſima fiſtula ad utrē parata, quæ catheteri adaptari poſſit.
Et mirū eſt quanta inde utilitas emergit, ex inſuſo uidelicet poſt urinas excretas.
Utendū eſt aut in utriſq; etiā urinā cientib. per interualla: Velut eſt ſion, & iunci
odorati flos, ac ſimilia. Utendū et aceto ac uīno ſcillino. Dicit aut de his amplius
in Sermone de affectionibus ueſicæ.

Colis reſoluti curatio. Cap. xxxv

In colis reſolutione urinæ excretiones non impediuntur. Seminis aut excretio
& coitus impeditur. Oportet igitur auxilijs ad ueſicam relatis uti. Priuatim ue-
ro nūc etiam coxendicibus calefactoria adhibere. Et iam quoq; tentiginem cien-
tia, de quibus ſuo loco dicitur, exhibere. Facit autem cum reliquis pudendū cer-
ui ſœmori uelut zona alligatum. Et carnes ipſius comeſtæ, & polypi marini, &
herinacei. Et ex uolucris ſturni. Caſtorium autem in omni reſolutione com-
modum eſt. Cauenda uero ſunt in ipſis omnia frigida edulia ac potiones.

Inteſtini recti reſoluti curatio.

Cap. xxxvi

Inteſtino recto reſoluto omnino inuoluntariè ſtercora excernunt. Aliquando
uero etiā ſiſtuntur. Itaq; etiam auxilia eadem ſint quæ in ueſica ſunt relata, coxen-
dicibus adhibita. Priuatim uero in his, nūc adſtringentia & corroborantia, nūc
pinguia & leuia, per clyſterem inſundimus, & rursus mordacia ac lancinantia.
Proinde cupreſſi ac rubi decoctū adſtringit, maximè ubi immodicè egerit. Sul-
lus aut & anſerinus adeps, & oleum maluæ maximè pinguefacit ac lenit, ubi ſter-
cora ſupprimuntur aut acria exiſtunt. Muria uero & colocynthidis decoctum,
itemq; centaurij, artemiſiæ, conyzæ ac thymi lancinant ac mordent. Egregie
facit

facit & trifolij bitumen olentis decoctum. Quum autem frigiditatis sensus affuerit, commodum est silphium, & gentiana, & bryoniae radix, in omnibus infusis scdis. Ego uero aliquando etiam acopon lassitudinem eximens ex euphorbio paratum dilutum, per clysterem cum sceni graeci decocto immisi, & bene succellit.

Cruris aut alterius cuiusdam membri resoluti curatio. Cap. XXXVII

Si crus aut manus, aut aliud membrum resolutum fuerit, communia auxilia in resolutione relata adhibeantur, & exercitia moderata unicuique parti congrua. Utendum est etiam in omni resolutione ungentis quae ad arthriticos referuntur. Cibi uero sint in omnibus faciles concocti, attenuatorii, uentri commodi, nihil uiscosi, aut mali succi habentes. Vinum sit album, tenue, & non ualde uetus. In summa uitanda est corruptio, frigiditas, ardor, ocium, lassitudo, coitus, uini multipotus. Ex epistola Archigenis ad Marsum, potio resolutis conueniens, de qua sic ait: Optimum est hoc pharmacum, & ad eiusmodi affectiones ualde à me probatum. Castorij, seminis rutae syluestris, opopanax, singulorum obolos ii, pyrethri, acori, singulorum obolum unum, piperis grana x. Cum aquae mulsa cyathis ii. dimidium ex hoc primum dato: robusto uero totum. Indicat autem obolum habere siliquas tres.

De conuulsionibus aut distentionibus.

Cap. XXXVIII

Quum statim à principio, aut non multo post principium morbi, fiunt conuulsionibus, & permanserint, ex repletionem originem ducunt. Quum autem multis sudoribus praegressis, aut uomitibus, aut uentris excretionibus, aut sanguinis eruptione, aut post uigilias, aut famem, aut motus multos & uehementes conflatae fuerint, ad euacuationem consequuntur. Et ubi etiam in sanis contigerit aliquid, quas partes repente conuelli, ob repletionem fieri necesse est. Si uero ex febris ardentibus succedit conuulsio, ob uehementem nimirum totius corporis, & maxime neruorum partium siccitatem contingit, & est huiusmodi malum maximum ac ferè incurabile. Quum igitur corporis partes antrosum distenduntur, emprosthotonus appellatur: quum retrorsum, opisthotonus, quum uero aequaliter in utraque partem tenduntur, tetanus uocatur, conuulsionibus itaque ob uehementem siccitatem nemo curauerit. Has autem quae ob plenitudinem aut inflammationem fiunt curaueris, plenitudinem quidem euacuando, inflammationem uero, proprijs ipsius auxilijs adhibitis. Fit etiam conuulsio in his qui uehementer ob uomitus lancinantur, & sedatur ubi quae molesta sunt per uomitum fuerint reiecta. Auxiliatur conuulsis succus centaurij tenuis potus, & seseli cum aceto mulso aut posca. Castorium autem non solum potum, sed etiam foris illitum commodat. Atque haec exhibemus his qui ob plenitudinem conuelluntur.

De tetano siue distentione, & conuulsione, Ex Archigene.

Cap. XXXIX

Quid significet tetani nomen, iam antè dictum est. Corripiuntur autem hac affectione cum ob alias causas, uelut dictum est, tum ex uulneribus, & in foeminis ex abortu. Verum tetani ex uulnere fientes non ita sanantur. Neque autem pueris, neque senibus conuulsio fit tetanica. Infantes enim magis infestat morbus comitialis. Quare negligendum non est, sed uena secanda, si distentio ex uulnere consequitur. Copia uero detrahenda est multa quidem, sed tamen non usque ad animi deliquium. Et paulò post exhibeatur alica cum aqua mulsa. Sit autem modicum quod exhibetur. Et ex aqua & oleo tepido agri illinantur, & in solio desideant infra umbilicum. Oportet autem & partes quae non madefiunt praellinare, & praesertim caput, & probè contegere ut ne impleatur. Vngenta autem & illitiones adhibeant.

B 4 beana

beantur ex oleo sicyonio & gleucino, aut irino, aut oleo ueteri. Conueniunt & ungenta lassitudinem eximentia moderatè calfacientia, uelut est quod foetidum appellatur, & quod ex sampfuchio fit, & quod ex populo nigra, & similia. Quorum compositiones in Sermonē de arthriticis referuntur. Si uero non à uulneribus, sed ex repletionē fiat tetanus, post uenæ sectionē, ungentis magis lancinantibus utendum est, quæ adarcen habent, & similibus. Deinde etiam cataplasmata locis affectis adhibeantur, quæ laxare ac discutere possunt simulq; lenire. Et hæc maximè musculis circa collum & maxillas ac spinam adhibeantur. Horum autem materia sit fœnum græcum, & semen lini, & farina ordacea ac loliacea. His addatur terebinthina resina, & galbanū, & mel ac oleum multum, in quo de cocta sunt ruta, conyza, aut artemisia, aut libanotis. Infartiatu etiam aliquando ammoniacum thymia. Sint autem molliissima ac leuia cataplasmata. Sed & fomentum adhibeatur incumbente cataplasmate, ex uesica magna & oleo calido semiplena. Aut ex sale frictio, aut ex milio in sacculis. Sed & cataplasmata in saccos coniecta imponantur, ut fomentū citra inquinamentū fiat, & præsertim si capiti id imponere oportet. Vitandæ autem sunt assiduæ irrigationes capitis. Caput enim inde repletur. Occupet cataplasma & irrigatio, ceruicem & maxillas ac totam spinam usq; ad lumbos. Inspargatur irrigationibus castorium. Et curbitæ cum scarificatione locis affectis omnibus affigantur. Temporis autem successu etiam folia ex oleo assumantur moderatè, bis aut ter in die, ita ut quinta olei pars ad ignem calefiat, reliquū in solium mittatur. Domus autem calida appareatur. In potu conueniunt optimum apomeli, & radices silphij decoctum, & ipsa trita, & hyssopi decoctum, & succi cyrenaiici magnitudo erui deuorata, & myrrha troglodytica magnitudine fabæ. Ex omnibus autem minimè offendit, & maximè efficax est castorium tritum datum cochlearij mensura. Post hæc commodant sedis illitiones ex ruta & opopanace. Auxiliatur & oleum infusum rutacei cum terebinthina. Danda est ipsis & Archigenis hiera drachm. ii. ponere cum pari castorio, cum ptisanæ succo ac melle. Deinde quædā ex alijs dantur, & ipsum castorium per se.

De capitis dolore distinctiones. Ex Galeno.

Cap. xl

Qui citra distinctionē doloris capitis auxilia descripserunt, maius detrimentum quàm emolumentum his qui eis fidem habuerunt, attulerunt. Neq; enim omnes ob unam affectionē caput dolent, Sed tum ipsæ affectiones plures sunt, tum curatio ipsarum singularum propria existit. Vna enim affectio est iuxta in temperiem simplicem citra humorum complexum: Alia iuxta humorū qualitatem: Tertiā uero multitudinē tantum ipsorum humorum contingit: Quarta quum multitudo hæc transitus humorum ac uaporū obturarit. Et ad has adhuc alia, quum ob imbecillitatē in aliquibus capitis partibus spiritus flatuosus innasceretur. Vehementissimi igitur capitis dolores fiunt iuxta caliditatem ac frigiditatem. Moderati uero iuxta siccitatem. Ad humiditates autem nullus consequitur dolor. Eodem modo quum ob redundantes humores, siue iuxta omnes capitis partes, siue iuxta unam quancunq; tandem dolor contigerit, uehementior quidem ob calidos ac frigidos: moderatior autem ob resiccantes citra caliditatē aut frigiditatē manifestam oboritur. Humectantes autem penitus nullum dolorem inducunt, quantum ad qualitatem ipsorum attinet. Nam ob multitudinē, citra quidem obturationē, grauant caput. Cum obturatione uero dolores inducunt. Si uero multitudo mordacē qualitatem habuerit, dolorem augebit. At uero spiritus flatuosus & uaporosus distentionem efficit citra mordacitatem.

De dor

De dolore capitis, ex ardore aut caliditate ob-

orto.

Cap. XLII

Capitis dolores ex ardore solis, aut caliditate obortos sanant quæ frigefaciendi uim habent, citra manifestā adstrictionem. Optima uero ex ipsis sunt quæ essentiam tenuiorē habent. Quapropter nihil melius est ab initio quā optimum rosaceum frigidissimū factum, & sincipiti affusum. Sit autem rosaceum eo anno factum ex oleo omphacino, citra salis ammixtionē. Proximum à rosaceo locum habet chamæmelinū, ubi moderatā frigiditatē inducere uolumus. Quum enim uehementer frigefacere uoluerimus, semperuiui succum ammiscere conuenit, aut polygoni, aut lactuca, aut uua acerba, aut portulacæ, aut pampinorum uitis, aut psyllij, aut intybi. Papaueris autem & mandragoræ succus uehementer frigefacit. Quapropter nocuius est. Caterum Erasistratus maximum præseruatium in calidioribus habitibus esse dicit, ubi quis in sole uersaturus sit, si spongiam latam, densam, aqua imbutā, & probè expressam capiti imponat. At si dolorosa caliditas in capite inualescat, unā cum spiritu flatuoso, ab initio quidem curatione per repulsoria utendum est, quæ ex adstringentibus ac frigefacientibus contingit. Postea uero ex mitigatorijs ac concoctorijs medicamentis aliquid ad repulsoria ammiscere oportet. Deinde etiam ex discussorijs quippiā addendum, paulatim detractis pharmacis quæ repellunt.

De dolore capitis in febribus.

Cap. XLIII

In capitis doloribus in febribus coincidentibus, ueha secunda est in prima aut secunda remissione, si nihil impedierit, & præsertim in bono habitu præditis ac multo sanguine repletis. Animaduertendū est autem, ne ob exhalationes ex uentre fiant, aut propter aluum suppressam. Si uero posterius post septimā irruant, præuacuata memorabiliter per clysterem aluo, cucurbitæ occipitio aut ceruicæ affigantur. Et caput ex olei irrigationibus mitigetur, rosacei quidem, in calidioribus, & hora æstatis, cum modico aceto, chamæmelini uero uim, non ualde calidis. Anethini autem in frigidioribus habitibus, & in hyeme, quinta aceti parte addita. Frons uero illinenda est ex cypheos confectioe in frigidioribus. Croco magmate autem in calidioribus. Porro medelæ doloris capitis ex febrium magnitudine oborti, in febrium tractatione supra descriptæ sunt.

Ad capitis dolorem ex ebrietate & meri potu.

Cap. XLIII

Vina temperie calida maximè generant capitis dolorem, ut quæ omnino quidam uaporibus caput replent, aliquando uero etiam humoribus calidis. Proinde de opus est multitudinem quidem euacuare, caliditatem uero frigefacere. Rosaceum igitur aut tale quoddam non ualde frigidum satis est capiti adhibere. Solum item ac quietem. Et ubi talia per totum diem fuerint adhibita, in uesperam lauare oportet, & boni succi cibis nutrire, non tamen calefacientibus. Quælis est prisanæ aut alicæ succus, & panis ex aqua, & oua forbilia sine garo, & lactucæ seruefactæ. In potu omnino utendū est aqua. Post omnē uero cibum, parum dandum est de malo punico, aut piro, aut pomo, aut uua passa. Sequenti uero die lauetur, & boni succi cibo nutriatur. Et uinum tenue album modicum detur. Caterum præsumpta ebrietatem arcant hæc. Amygdalæ amaræ quinque aut septem à ieiuno comestæ. Vinum absinthites aut myrteum præsumptum. Eripse myrti baccae præsumptæ. Brassicæ cauliculi præcomesti. Ebrietatē autem extinguunt postea ingesta, centaurij tenuis decoctum, ceruinum cornu, uerberis rectæ semen cum aqua.

Perfris

Perfrigerati capitis medela.

Cap. XLIII

In capite recens frigefacto, rutaceo oleo calido sinciput irrigare oportet. Si uehementiore caliditate opus habuerit, parum euphorbij oleo iniiciatur, aut unguentum irinum illinatur, aut amaracinum, aut laurinum, aut serpillinum, aut nardinum. Frons quoque talibus inungatur, & narium ac aurium meatus illinatur.

De capitis dolore à stomacho.

Cap. XLV

Quidam etiam si modicus in uentre, & maxime circa os ipsius, humor acris fuerit collectus, statim caput dolent, humoribus in uentre prauos uapores ad caput mittentibus, ut aliquibus ipsorum suffusis similia symptomata accendant & exhalationibus, si non cibum ingesserint. Et propterea famem ferentes laeduntur. Augescit enim ipsis huiusmodi humorum maliginitas propter inedia. Oportet itaque sic uexatos sanare, ita ut nihil capiti adhibeamus, uerum quam citissime molestos uentris humores euacuemus, aqua tepida exhibita in potu, & immixtis peninis uomitu proritato, deinde uero post modicum interstitium cibis boni succi & stomacho commodus detur, si fieri potest lotis post uomitum: Sin minus, ante balneum. Atque hic tantus sit ut ne laedantur dum lauantur. A coena uero parum bibant, & sequenti die mane absinthio & eadem dieta utantur. Et de cetero quotidie circa horam tertiam aut quartam modicum panem accipiant cum oliuis albis, aut cum uua passa, aut aliquo huiusmodi, per experientiam reperto, eo quod singulis optimum est. Aliud enim alij optimum est, iuxta naturae proprietatem. Interpositis autem horis duabus balneum petunt. Pessima porro affectio est, ubi uitiolis humoribus in uentris tunicis absorptis, aut inelutibiliter infartis, nausae ac lancinationes inducuntur. Quibus optimum auxilium est aloë pharmacum, quod aloës quidem habet drachmas centum, reliquorum uero quae recipit singulorum drach. VI. croci uero drach. IIII, aut minus, crocus enim caput percellit. Datur ipsis ex hoc pharmaco drach. I. cum aquae cyathis duobus. Cauenda autem sunt in omnibus, & praesertim his, edulia natura capitis dolorem inducentia.

Quae ex natura capitis dolorem inducant.

Cap. XLVI

Non solum in his qui caput per stomachi consensum dolent, sed etiam in omnibus capitis affectionibus, uitanda sunt quae natura capitis dolorem inducunt. Sunt autem haec: uiticis semen, absinthij succus, lactis potus, glandes quercinae comestae, oliuae nigrae, memecyla, eruum. Hoc etiam articulos exoluit. Amplius autem legunt myrrha, thus, hederæ corymbi. Mentem uero perturbant lentisci fructus, crocus, peucedanum, cyclaminos sicca cum uino pota, styrax modicus quidem potus, tristitiam discutit, multus autem, turbulentos somnos facit.

Ad dolorem capitis ob plagam.

Cap. XLVII

Si uulnus ob plagam factum fuerit, glutinatorijs & inflammatione arcentibus pharmacis utendum est, postquam ulceris labia fibulis impositis constrinxerimus. Si uero usque ad pelliculam os caluae ambientem plaga penetret, diducta pellicula caluariam ambiente, ossis conscalpto, iuxta concornationis modum curare oportet. Contingit autem non parum saepe, in casu praesertim ex sublimi facto, ut quaedam partes circa cerebrum aut membranas eius abruptantur, quando sane etiam periculum uehementius & acutius imminet. Optimum itaque fuerit in his, nisi aetas prohibeat, & nisi uitalis facultas debilis appareat, a uenae sectione curationis initium facere. Quod si aliquid uenae sectionem impediatur, aluum per clysterem euacuabimus, reuulsionis simul ac euacuationis gratia. Deinde auxilijs ad inflammationes commodis utemur. At uero membranam cerebri sauciatam, inquit

quit Archigenes, probè glutinat calaminthæ succus infusus, & farina milij arida inaspera. Deinde butyrum, & rosaceum, & adeps suillus infusus uetus, simul mixta & tepefacta infusa.

De cephalæa, Galeni.

Cap. XLVIII

Cephalæa inueteratus & ægrè cedens capitis dolor appellatur, qui ex facili occasione maximas exacerbationes habet, adeò ut neq; strepitus, neq; uocem uehementiorem, neq; lumen splendidum, neq; uini potum, neq; odora menta caput repletia tolerare possint, neq; item motum. Sed in quiete ac tenebris ob dolorum magnitudinē decumbere uelint, nam uelut à malleo sibi pertundi uident: quidam uero uelut cōtundantur aut distendantur & quæ circa caput sunt sentiunt. Non paucis autem usq; ad oculorum radices, dolor progreditur. Habet autem hæc affectio aliquando continuos dolores, aliquando exacerbationes & intervalla, siue ordinata, siue inordinata. Intermittit enim aliquando eiusmodi exacerbationes, uelut in comitiali morbo correptis, interceditq; tempus aliquod quod omnino accusari non potest. Manifestum igitur est hanc affectionē consimilem aptitudinē capitis, ut faciliè lædatur, uelut in cephalalgicis habere. Verum ad maiore debilitatem deueniunt in hac affectæ capitis partes. Et quidam ex eis cerebri membranas dolitant. Quidam uero membranā tantum caluariæ ambientē. Dolores igitur cum grauitate, humorum multitudinē indicant, cum mordacitate uero aut humorū aut uaporum acredinem. Cum pulsu autem inflammationē. Cum tensione uero, siquidem citra grauitatē ac pulsum fiat, status tenuis & uentosi multitudinem demonstrāt. Si uero cum pulsu, membranosi corporis inflammationē. Si uero cum grauitate distentio fiat, humorū multitudinē intra membranas contentam. Et dolores quidem in superficie hærentes, membranæ os caluæ ambientis affectionē significant. Qui uero in profundo sunt cerebri membranarū. Quibus enim affectio inter caluariā est, his dolores usq; ad oculorum radices procedunt, eo quod oculorum, tunica ex cerebri membranis ortū habeant. Siquidē igitur humorū aut uaporū multitudinē reperiis causam, siquidē propter totius corporis repletionē facta est, uniuerso corpore euacuato capitis dolorē sanabis. Si uero uelut debile existēs caput, ad se sublato humores ac uapores susceperit, materiam reuellere oportet in totum corpus, atq; ita particulæ mederi. Per clysteres itaque reuulsio fit, & ligaturis extremitatum, & pluribus infernarum partium confrictionibus. Interdum etiam sanguinis detractione. Caput autem curabis, quando quidem reuulsorij uti oportet, per repulsorias irrigationes. Post totius uero corporis euacuationem iam caput euacuantibus ac discussorij uteris. Deinde his quæ corroborare possunt. Repellit igitur oleum omphacinum, & rosaceū per se, & cum aceto, & quod ex papaueris capitibus, & oleæ teneris germinibus, & hederæ cacuminibus, ac menta uiridi apparatus. Adhibeantur autem remedia tepida quidem, ubi frigidior & crudior fuerit humorū multitudo. Frigida uero, ubi calidior & biliosior extiterit. Discutit autem oleum dulcissimū calidum, & hoc magis inueteratum, item sicyonium. Si uero crassior fuerit humorum multitudo, ipondylium aut serpillum, aut pulegij comam, aut calamintham, aut mentam oleo incoquens, multitudinem euacuabis. Eadem hæc etiam robur parti addunt. Quapropter usque ad perfectam curationem eis uti conuenit. Omnium porrò maximè discutit, & mirificè corroborat, uerbenaca rescta, præsertim uiridis. Imò etiam arida cum radicibus, & simul cum serpillio, oleo incocta. Coniicienda etiam ad ea crocodiliadis maximæ circa aquas nascentis radix. Quin & ipsam per se uerbenacam, si oleo incoxeris, caputq; inde rigaue

rigaueris, omni capitis dolori antiquo, ex frigiditate aut ex crassiss humoribus oborto medeberis. Maximè etiam profunt sub aquario uase nascentes aselli, mil lepedæ appellati, si cum oleo coquantur.

De hemicrania, Ex Galeno.

Cap. XLIX

Affectio dolorosa iuxta dimidiam capitis partem contingit, quam hemicraniam appellant, & ut plurimum per circuitum exacerbatur. Fit autem propter influxum uaporum aut humorum, siue multorum, siue calidorum, siue frigidorum. Et aliquibus contingit ut extra caluariam doloris sensum perceptent. Quibusdã autem in capitis profunditatem penetrat. Aliqui uero temporũ musculos uehementer dolent. Dinotiones autem ex his quæ de cephalæa dicta sunt fiant. Proinde purgare ipsos oportet, aut prius uenam secare, atq; sic localibus auxilijs uti, ita ut quis tum per digitos suæ manus, tum per lintea, dimidiam frontis partem, & maximè circa temporũ musculum, confricando excalfaciatur, ante exacerbationis tempus hoc faciens. Post exacerbationem uero hemicranicis appellatis phar macis utendum est, siquidem multa caliditas in doloribus percipiatur, his quæ refrigerans quippiam habent. non præfente uero caliditate, his quæ multum calesci faciunt. Virisq; uero aliquid ex his quæ robur addunt miscetur, quod adstringentem habeat facultatem. Optimum porrò est ungentũ quod habet euphorbiũ unc. i. ceræ quadrantem, olei dulcissimi lib. i. Ex hoc dimidiam frontis partem unã cum temporum musculo illine. Cõmodissimum est ad frigidas affectiones, ut sæpe ex unico eius usu ante balneum, dolor cessarit. Sic autem affectis prodest etiam in aurem infusum oleum tepidum, modico euphorbio adiecto. Satis est enim si ad libram olei, drachm. iiii. euphorbiũ addantur. Cæterum naturæ si quadam ratione aut potentia, euphorbiũ ad hemicranicos facit sic adhiberi. Terito ipsum cum aceto, & si quidem dextrũ tempus dolet, illinito sinistrũ; si uero sinistro dolet, illinito dextrum, & celerrimè sanat dolorem. Item intestina terro terito, & dolens tempus illinito, mirificè faciunt. Similiter utere carne cochlearũ. Vtere etiam paulò post describendis cõmunibus omnis doloris capitis auxilijs.

Communis curatio cephalææ & hemicranie, Ex Archigene & Galeno.

Cap. L

Inueterata & ægrè solubili cephalæa aut hemicrania existente, principium curationis à uenæ sectione, aut purgatione facere conuenit, aluo prius per clysterem euacuata. Manifestum est autem quod multo sanguine refertis uenam secare oportet. Vitiatis autem humoribus referti, purgandi sunt. Et deinde irrigationibus cõmodis utendum est. Et à naribus sanguis detrahendus. Deinde pituita per os ducentibus, & his quæ naribus induntur utendum. Postea raso capiti illinendum est id quod ex scammonia & peucedano ac aloë constat. Epithema uero conuenit ex amygdalis amaris, & thure ac myrrha. Emplastra uero ex agario co, & quod ex scilla constat, & nigrum ex cucumere syluestri, conueniunt pultibus locis inducentia, & quæ in profundo sunt ad superficiem transferentia. Non incongruum est etiam malagma ex baccis lauri. Nos autem utimur cataplasmatibus ex cantharidibus, & mirificè facit, dum per longum tempus ulcuscula ab hoc pharmaco fientia sanie manant. Oportet autem munitum esse uesicam per las cius potum ac irrigationes, eo quod faciliè ab ungentis ex cantharide lædatur. Perseuerante uero affectione, secundæ sunt arteriæ circa aures, & præsertim quæ in temporibus sunt. Quidam etiam uestione profunda usi sunt in cephalæa, qui hoc solum cauerunt ne quis musculus sub cauteriũ caderet. Adhibentur autem cauteria nucleoformia, ubi magis dolor heret. Et licet usq; ad os urere quo squa mæ dis

ma discedant; Barbari uero luniformem diuisionem faciunt circa anteriore capitis partem, supra frontem, à sinistra aure usque ad dexteram, pelliculam caluam ambientem exoluentes, & capitis os deradentes, caput tamen munientes. Et non potest temere assumpta esse uideri his qui mali difficile tractationem nouerunt, propter quam neque talia auxilia maiora quam opus est existunt. Veratrum autem non minus cauterijs prodest, imò etiam magis. Inducendum his, tum comitalibus, ueratrum albi bulbum tritum & in puluerem redactum exhibui drachmę unius pondere, uelut in Sermone de purgatorijs dictum est. Purgantur enim hinc efficaciter cum ualde multa excretionē. Deinde interpositis quibusdam diebus de surculis exhibeo drach. II. Amplius enim hinc lancinantur quam excernunt. Et rursus tertio similiter præbeo. Nam ad affectionem iam firmatam, & in ipsis ut ita dicam ossibus fixam, non est alius efficacior modus. Post hæc reparatis uiribus infra purgamus, per interualla quędam per nostram hieram, quo illuc repere cogamus materiam sursum uergentem. Vitare autem oportet frigiditatem, ardorē, lassitudinem tum reliqui corporis, tum ipsius capitis, per uisum, auditum, olfactum & gustum, & præcipue tactū. Vitanda sunt etiam acriora edulia, uelut ceparum, alliorum, & similia: Item ea quę inflant, & quę difficulter transeunt, uelut sunt casei, lac, fungi, tubera, bulbi, rapa. Eligantur autem uentri commoda & quę facile concoquantur, friabilia, non pinguis, non uirosa, stomacho grata, urinam cientia. Fugendum est etiam mel & omnia dulcia. Vinum uero album & tenue sit, et non ualde uetus, neque ualde odorum, & copia moderatum. At uero stœchadem herbam coctam cum aqua, aut aqua mulsā, in omni capitis dolore, uelut solum & maximum remedium exhibeto. Aliud ad omnem capitis dolorem, Os cerui uistum & tritum cum rosaceo dolenti loco illinito. Aut ocimum tritum imposito. Aut mentam cum aceto tritam bis in die illinito. Aut rumicem syluestre & galas simul tritas temporibus ac fronti illinito, & euestigio sanabis. Aliud. Stercus hîrundinum antequam in terram cadat, unā cum luto quod in nido reperitur, aceto in ligneo uase madefacito ac illinito. Aliud. Pilulas caprini stercoris tritas illinito ac alligato, atque hoc mane ac uespere facito, & sanabis. Aut nasturtium torrefactum cum aceto & rosaceo terito, & cerati crassitudine imposito, & citissime medeberis. Aut intestina terrę trita illine. Aut cochlearum carnis cinerem, stercus bubulum, thus, æqualibus portionibus cum aceto trita illine. Quidam uero ex nostris præceptoribus, inquit Galenus, hoc utebantur ad hemicranias, piperis drach. II. crocomagmatis drach. II. euphorbij recentis drachmę dimidium. Si uero uetus fuerit, drachmā unam, stercoris columbarum in agris degentium drachmę dimidium, atramenti scriptorij boni drachmę dimidium. Terito cum acerrimo aceto, & illinito temporis musculū & dimidium frontis, ac totam affectam partem. Crocomagmatis præparatio. Croci drach. centum, myrrhæ troglodyticę drach. quinquaginta, rosarum siccarum drach. quinquaginta, amyli recentis drach. quinquaginta, gummi drach. quinquaginta. Teruntur cum uino. Ad capitis dolorem temporibus illinitur. Miscetur etiam in præparationes aliorum pharmacorum. Aliud quod non solum hemicranicis commodat, sed etiam omni inueterato capitis dolori, illitum. In dolore quidem capitis, à tempore ad tempus per totam frontem, in hemicranijs uero dimidia parti affectæ. Croci drach. x. atramenti sutorij drach. x. aluminis drach. III. myrrhæ drach. III. opij, omphacij sicci, chalcitij

chalcitidis crudæ, singulorum drach. iiii. gummi drach. xv. Cum uino faler
no uelut collyrium terito, & pastillos formato. Et usus tempore cum posca, aut
aceto meracò illine. Aliud. Scammonia drach. vi. croci drach. ii. comæ he
deræ drach. vi. sulphuris uiui drach. iiii. anisi drach. viii. seminis apij drach.
viii. diligenter terito & cum ocymi succo pastillos efformato. Hoc multo rosa
ceo dilutum irrigatio fit capitis lethargicis commoda. Verum in capitis dolore
cum aceto adhibetur. Aliud pharmacum non solum in his commodum, sed
etiam ad uertiginosos faciens. Radicis peucedani drach. iiii. iridis myricæ
drach. ii. æruginis, acori, singulorum drach. i. spondylii drach. iiii. piperis nigri
drach. ii. et dimidiam, serpilli drach. iiii. myrrhæ drach. ii. castorij drach. ii. et di
midiam, baccas lauri. xxxv. rutæ uiridis drach. viii. mentæ uiridis drach.
iiii. opij drach. i. Vino excipe & forma pastillos. Vfus autem tempore, ace
to & rosaceo dilutos illine. Sed & cerato rosaceo excepti fronti imponuntur,
uelut malagma. Pastillus qui non solum hemicranicis prodest, sed etiam
ischiadicis. Thapsiæ drach. iiii. euphorbij drach. iiii. succi medici drach. iii.
myrrhæ drach. i. opopanax drach. i. Contusa simul ac trita cum uino effor
ma, & utere cum aceto. Alius. Radicis peucedani drach. iiii. croci drach.
i. myrrhæ drach. iiii. opij drach. i. Cum aceto formato pastillos, & utere cum
aceto in irritationibus. Euestigiò soluit dolores. Alius ad omnem capitis do
lorem & hemicraniam, per multam experientiam cognitus. Succu absinthij,
succu hederæ, stercoris caprini, cochlearum unà cum testis exustarum, chartæ
magmatis, gallarum, foliorum raphani, uitellorum oui, succi maluæ, æquales
portiones terito cum aceto, ac formato pastillos, ac utere cum aceto.

Epithemata ad capitis dolorem.

Cap. LI

Amygdalarum amararum, floris uiticis, radicis peucedani, mentæ uiridis,
uirgultorum rutæ, baccarum lauri, serpilli, spondylii, castorij, singulorum unc.
i. rosarum siccarum sextantem. Dissoluito cum aceto, et excipe cerato rosaceo,
Deinde in linteum infarta, derales capillis, toti capiti imposito, & per fasciam
deligata usq; in sequentem diem seruato, & rursus exoluito, ac renouata impo
nito. Aliud malagma, ad omnem capitis dolorem. Aeruginis drach. iiii.
æris usti drach. iiii. squamæ ferri stomomatidis appellati drach. ii. terræ cimoliæ
drach. iiii. chalcitidis crudæ drach. iiii. pumicis crudi drach. iii. terebinthinæ
unc. i. ceræ septuncem, olei ueteris quincuncem. Aridis leuissime tritis liqua
bilis liquefacta affunde, & emollito ac utitor. Si uero durius esse uideatur,
oleo amygdalino emolli, & utere uelut dictum est. Facit etiam fronti ac tempo
ribus impositum. Facit quoq; mirifice emplastrum nigrum Archigenis corio
inductum, & dolenti tempori impositum. Euestigiò enim soluit dolores. Ha
betur autem inter auxilia ad orthopnoicos descripta Sermonis octauj capite
quingentesimo septimo.

Quæ naribus indita caput purgant.

Cap. LII

Quod si necessitas postularit etiam per nares caput purgare oportet, posito
tius corporis euacuationem, anagallidis succo naribus infuso, aut cyclamini.
Aut ipsa cyclamini radice insufflata. Aut elaterio cum lacte infuso. Cæteru
pharmaco parabili sæpe usus sum nigella pridie in acri aceto macerata, & dein
de cum aceto trita, ac naribus infusa. Facit etiam ad narium obstru
tionem. Aliud. Hederæ succus aut calaminthæ, per narifusorium instru
mentum naribus infusus, multum mucum ducit. Aliud. Nucleum specilli
in aquam

in aquam tingito, & eo atramentum sutorium leuissimè tritum excipito, & nares penitissimè indito. Hoc multum purgat, & dolores euestigio leuat. Aut atramentū sutorium lacte tritum infundito. Purgat maximè ictericos. Aliud.

Nigellæ tritæ drach. vii. spumę nitrī drach. i. salis ammoniaci drach. i. oleo ueteri aut irino, aut cyprino dilue, & tomentum specillo obuolutum medicamento immerge, & ex eo nares assiduè illine. Et defluet quicquid caput infestat. Habeat autem pharmacū compagem cerati liquidioris, & seruetur in cornea pyxide. Aliquādo pro spuma nitrī elateriū adicio, & facit ad diuturnas lippitudines, ac morbum comitiale. Ducit enim multam humiditatem.

Aliud citra molestiam purgans, & confestim dolorem eximens. Cyclamini siccae drach. vii. iridis siccae drach. ii. nitrī rubri drach. i. Ego uero elateriū pro nitro adici, & probè trita per stipulam insufflaui, sursumq; attrahere iussi, & postea deorsum inclinari, ut collectus humor deflueret. Sed & per sternutatoria caput concutere oportet, quę describentur in Sermone hoc inferius ubi de narium affectionibus agemus.

Apophlegmatismi pituitam per os à capite detrahentes.

Cap. LIII

Nitrī semissem, staphidis syluestris quadrātem, anisi trientem, foliorum lauri uiridium sextantem, uuarum passarum uinaceis exemptis quantum satis his excipiendis. Ex hoc manducandum præbe pro una uice quadrantem, & commansa exspuere iube. Aliud quod commansum, caput purgat. Pyrethri, piperis, hyssopi, staphidis syluestris, singulorum equales portiones uuarum passarum carne excipe, & manducanda præbe. Verum post horum usum, sale ac melle recurentur. Aliud caput purgans, quod neque caput dolere permittit, neque oculorum caliginem fieri. Prodest & auribus & dentibus. Et qui per tempus ipso utitur, in nullam ex his affectionibus incidet. Est autem optimū. Sampsiuchi sicci, iridis illyricę, pyrethri, hyssopi, nitrī, piperis, seminis apij, radices pascis, staphidis syluestris, singulorum drach. iiii. Si uero uim eius intendere uoles, adijce etiam myrrhæ drach. iiii. Singula primum seorsim, deinde si multerito cum aqua, & formato pastillos, pauco melle ammixto. Vtus autem tempore, melle & aqua diluito, ac pro gargarismate utitor. Aut oleo cyprino aut irino, aut ueteri ammixto naribus infundito.

Smegmata & puluilli inspersiles caput densantes.

Cap. LIIII

Smegma densans caput, nitrī Bernicarij semissem, baccarum lauri, sinapis, sampsiuchi, singulorum sextantem, cyperi unc. i. fecis uini ustæ unc. i. Hoc smegmate in balneo illito defricetur. Oculis autem linteam multiplex aut spōgia prætendatur. Aliud. Nitrī assati lib. i. baccarum lauri lib. ii. staphidis syluestris, sinapis singulorum lib. i. radices cucumeris syluestris semissem: Vtere uelut dictum est in inueteratis affectionibus. Smegma capitis, faciens ad de stillationes & aquosam capitis affectionem, experimento constans. Nitrī assati uino extincti semissem, iridis, aristolochiæ, helenij, singulorum unc. i. aceti mulsi quantum satis est. Contusa ac cribrata aceto mulso permisceto, & præaraso sincipiti ante balneum illinito, & breui tempore finito, ac affricato. Smegma ad omnem capitis dolorem & oculorum fluxionem, experimento constans. Helenij, myrrhæ, calami aromatici, farinæ lupinorum, farinę erui, sulphuris uiui, spumę nitrī, æquales portiones ptisanę succo excipe, et pastillos forma. Vsi uero postulante, ptisanę succo dilutis utere. Hoc smegma in balneo sincipiti, inspergere oportet, capillis antea inter se disparatis, ut corpori

C 2 auxilium

auxilium adhæreat, præcipereque ut os claudatur, quo per nares calidum amere uehementer attrahentes subiectam materiam citius transmittant. Sapo constantini resiccans fluxiones, Balaustiorum sextantem, myrrhæ, sandarachæ, spicæ nardi, singulorum sextantem, costi, aloës, gallarum, thuris, malicorij, foliorum rosarum, sarcocollæ, singulorum quadrantem, saponis gallici lib. i. decocti lupinorum amarorum sextarium, i. Arida contundito ac cribrato, & cum liquididis conterito, sapone adiecto, & pastillos formato ac utitor, ubi opus fuerit diluens quantum satis est cum uino, & illinens ante balneum sinicipiti præalo. Deinde paulo post affricans & abluens. Sapo Andreæ comitis ualde celebris: Floris iunci odorati, casia, cyperi, amomi, folij malabathri, costi, singulorum unc. i. gallarum sesquiunciam, nardi celticæ, aluminis, iridis, fecis uini anti qui ustæ, gypsi usti, nitri, singulorum scrupul. xii. rosarum siccarum scrupul. viii. salis scrup. viii. testarum purpurarum ustarum, quadrantem, saponis gallici lib. i. lupinorum decocto trita accipe ac utere. Xeromyron, hoc est unguentum siccum ad capitis fluxione laborantis curationem minime uanum. Iridis helenij, floris iunci odorati, singulorum lib. i. rosarum siccarum quadrantem, amomi, costi folij, gallarum singulorum semissem. Vtere post balneum, præillito capite ex uino austero, & tunc insperge. Aliud optimum. Iridis quadrantem, gallarum unc. i. casia, costi, folij, spicæ nardi, balaustiorum, rosarum siccarum, carpobalsami, singulorum sextantem, myrrhæ drach. iiii. Contundito ac cribrato, & præillito capite ex uino austero inspergito, maxime post balneum. Alius puluis inspersilis Theodosij, caput resiccans. Gallarum, balaustiorum, singulorum trientem, cyperi sextantem, spicæ nardi, folij, corticis thuris, corticis pinus, nardi celticæ, singulorum unc. i. iridis sesquiunciam. Contusis ac cribratis utere. Alius ualde bonus. Iridis quadrantem, gallarum, rosarum siccarum, singulorum sextantem, aluminis unc. i. Vtere uelut dictum in capite calidiore. Alius puluis ad caput humidum, à quo tum oculi, tum alia partes fluxione infestantur. Radicis pæoniæ unciam, i. aluminis scissæ unc. i. baccharum lauri drach. iiii. cyperi sextantem, nardi celticæ semissem, contusa cribrata insperge. Hoc ego sæpe expertus sum. Puluis caput corroborans, facit & ad eos qui oculos assidua fluxione laborantes habent. Florum mali punicati unciam, i. gallarum unciam, i. cyperi, iridis, helenij, singulorum trientem, seminis rutæ syluestris, quod Harmala & Befasa uocant, sextantem. radicis chamæleonis nigri sextantem, carpobalsami unc. i. floris iunci odorati sextantem, aristolochiæ, rosarum siccarum, myrti siccæ, nardi celticæ, singulorum unciam, i. xylobalsami sextantem, amomi, malicorij, staphidis syluestris singulorum unc. i. contusis cribratis utere. Aliud sinigma resiccans omnigenas fluxiones, & præsertim acres, & subcrassas, multo experimento comprobatum. Milij quadrantem, ladani sextantem, floris iunci odorati sesquiunciam, seminis rosarum sicci sesquiunciam. aluminis liquidi sextantem, spicæ nardi unc. i. sinapis sextantem, iridis, acaciæ, piperis, staphidis syluestris, singulorum sextantem, costi, folij, pyrethri, singulorum unc. i. calami, musci quem sphagnum siue hypnon uocant, singulorum sesquiunciam, nitri rubri lib. ii. Nitrum urito & aceto mulso extinguito, & ad reliqua trita ammisceto, ac utitor ita ut sinicipiti inspergas, & paulatim affrices.

De Alopecia.

Quæadmodum plātæ aliquæ ob humoris inopiā resiccate corrumpuntur. Alique uero ob humoris alieni ab ipsarū natura attractionē. Eodē modo & capilli, aut propter

Cap. l v

propter humorum ex quibus nutriri consueuerunt inopiam, aut propter eorū dem uitiationem corrumpi solent. Et propter inopiam quidem humorum, cal uicies contingit: Propter uitiatos uero humores alopecia & ophiasis, unum quidem ambæ secundum morbosam affectionem malum, nomina uero iuxta figuram habentes diuersa. Serpenti enim similis læsa capitis pars in ophiasis aparet. Alopecia autem sic appellata est, quoniā uulpibus frequenter accidit hæc affectio, uelut tradunt. Humorū igitur prauorum redundantia causa est affectionis. Quales autem sint hi, ex colore cutis capitis cognosces. Si enim albidior est, pituitam: Si nigrior, bilem atram: Si pallidior, bilem flauam significat. Et sanè redundantes uitiatos humores euacuare oportet, aut per pilulas ex aloë & colocynthide, aut per Galeni hieram ex colocynthide. Si quidem atræ bilis humor redundauerit, ueratro nigro ad ipsam ammixto. Si uero amara bilis, scammonia: Si pituita, ipsa per se ipsam detur: Post totius corporis purgationem, pituitam per os ducere melius est, atq; ita localibus auxilijs uti. Hæc autē discussoria uitiatum humoris esse oportet, & essentia tenuiū partiū. Si uero supra hoc quod discutit uitiosos humores, aptū fuerit pharmacū ad bonum sanguinē attrahendum, optimū sanè tale fuerit. Porro præraso capite locū linteo cōfricare oportet, ac cōsiderare. Si enim post modicā frictionē pars rubescit, affectionē sanatu facilē putato. Si uero post multā frictionem rubescit, sanatu difficilem. Deinde Thapsiam recentem tritā, uiribus ipsius largæ aquæ ammixtione exolutis, illinere. Considerare autē oportet post thapsiæ illitionē, num ob uehementiā ultra quā cōuenit cutē rubefecerit. Hoc manifestū erit, si flauior colore euaserit. Periculū est enim ne exuratur cutis, si nos sæpe ipsa utamur. Proinde aut ad aliud molliustrāre oportet. Aut si ipsa uti uelimus, uim ipsius exoluerē, per ceratū aut adipis ammixtionem: Animaduertas autē ne alopecia ulce- retur, quod si fiat, anserino adipe aut alio quodā tenuiū partiū illine. Adhibean- tur autē hæc auxiliā in aëre calido, citra aurā frigidā in sole, hyeme uero in bal- neo. Ex reliquis porro pharmacis huiusmodi affectionibus cōuenientib; ca- lidissimū est euphorbiū: Minus autē ipso calida est thapsia, post thapsiā uero si- nupi, & nasturtiū, iuxta aliū aut modum adarce: Deinde nitrū Berenicarū, et sulphur, & spuma nitrī, & utrūq; ueratrū, & erucæ semen, & oleū laurīnū, & al- cyoniū utrūq; uistū & nō uistū, & pix, & cedria, & radices calami sepiarij, & cor- tex, ambo uista. Et murinū sterces, & anserinus adeps, & maximē ursinus ac hyenæ. Et amygdalæ amaræ totæ uistæ, & uiperæ, pellis ac caput uistū. Et for- tib; quidē ex his ceratū liquidum ammisce: Imbelliora uero oleo laurino aut pice liquida excipe. Et diuturnas ac egrē curabiles affectiōes, per fortia curato, incipientes uero & curatu faciles, per debiliora. Critonis medicamenta ad alopecias. Pilorū ursi uistorū, radicum calami uistarū, adianti uisti, foliorum fi- ci uistorū, panniculī Cilicij uisti, singulorū equalēs partes adipe ursino & cedria excipe. Vsus autē tempore, loco foto & per fici folia cōfricto, ac per nitrū deter- so, pharmacū illine. Archigenis ad alopecias. Verbenacā rectā in sole cum aceto tritā, loco prius per nitrū preparato illine, & rarū linteum superimponē, hoc præmadefacto loco tollendum est. Aliud. Alcyoniū clarius ad lucernā exurito, & opobalsamo nō adulterato extinguito, & cum eodē tritum illinito. Adhæret enim in totū, & nō discedit donec pili fuerint exorti. Aliud. Equi nos dentes exure, ac uterē cum aceto. Ad diuturnas autē alopecias egregiē fa- cit thapsiæ succus cerato exceptus, ac loco impositus, ut nihil aliud facere sata- gas. Decedit enim summā superficies, & linies effluit, & pili sua sponte enascū-
C 3 tur;

Aliud. Squamam ferri stomomatis diu cum aceto in sole tere, & modico oleo addito illine. Aliud, ad alopecias & pilorum defluuium ac uirilignes, inueteratas. Buccina usta cum oleo ueteri terito, ad strigmentitiam crassitudinem, & præraso ac confricto loco illine. Insigne hoc est. Aliud Asclepiadis. Spumæ nitrî partes II. salis ammoniaci partem I. hæc usta & cum acerrimo aceto ad strigmentitiam crassitudinem trita, illine & affrica, donec pharma cum in profundum penetret, alopecia prius leuiter conscalpta ut locus pilis comode densetur, & hoc bis per diem facimus. Aliud. Marrubium uiride tritum illine. Aliud. Perdicij herbæ uiridis folijs locum assidue confrica.

Aliud. Sphœritidis, hoc est cupressi folia trita cum aceto adhibe. Aliud. Herinaceorum marinorum testas uistas cum melle illine. Aliud. Herinaeci terrestris pellem, aut caput ustum, adhibe cum melle. Aliud. Alcyonij drachmas II. sulphuris uiui drachmam I. muscarum tostorum ut resiccentur, cyathos II. Muscas per se terito, alcyonium uero urito, & sulphur ustum & contusum ac cribratum cum aqua contere, & fel suillum & acetum paulatim siccis affunde donec strigmen tostum fiat. Deinde axungiam à rotis curruum derafam, & in manu emollitam, ut emplasti forma fiat, ammisceto, & prærasis ac confrictis confidenter, uelut optimum, illine. Aliud.

Herinacij terrestris usti cinis pice liquida exceptus, alopecias remouet. Aliud. Sorani, quo etiam Archigenes usus est, & id uehementer laudat. Alopeciam præscalptam & confrictam, deinde in superficie scarificatam, ceparum aut raphanorum cortice trito intege, addito melle. Aut cum his confrica, & nasturtij semen, & muscercas, & piper, & ueratrum album, æquis portionibus cum aceto illine. Est enim ualde insigne. Aliud.

Archigenis. Rhœis culinarij drachmas. IIII. sinapis drachm. II. cum aceto illine. Aliud. Cantharides uistas, & tritas cum melle affrica. Aliud. Corij noui partem lanuginosam, in æreo uase ustam, cum oleo antiquo, aut melle, aut aceto tere ac illine. Cito pilos producit. Aliud.

Cyclamini radicem uiridem tritam illine. Aut siccam ustam adhibe. Aliud. Felis stercore cum sinapi ac pipere, addito aceto utere. Aliud.

Allium ustum cum rosaceo illine. Aut betæ radicem eodem modo. Aliud.

Vngulas asini uistas, asphodeli radicem ustam, alcyonium, nitrum, æquis portionibus oleo ueteri excipe, ac utere. Aliud. Herinaceorum marinorum cum testis exustorum drach. II. muscercæ drachmam. I. aceto dilue ac illine loco præfricto. Aliud. Alcyonij usti, cornu ceruini usti, cyperi usti ex toto, æquis portionibus utere cum aceto. Aut abriotonum ustum cum oleo uetustissimo adhibe. Ad alopecias & caluiciem ac pilorum raritatem ægre curabilem, in capite, in mento, & in supercilijs. Pilorum uris unciam. I. radicis calami quadrantem, filicis cum radice quadrantem, castaneorum hispidi corticis, quadrantem, lanarum succidarum pinguiissimarum sexuncem, capita muscarum xxx, muscas quinque sine capitibus. Omnia in nouam ollam coniecta, in furnum ponito ut exurantur. Deinde cinerem terito. Habeas autem in uino Aminæo prius trita, ladanij unciam. I. folij malabathri unc. I. myrrhæ sextantem. Et adijciatur his olei ueteris sextans, olei cedrinij uncia. I. atque ita aridis insperlis excipe. Deinde ubi linteolo alopeciam perfricueris, & leui scarificatione usus fueris: Aut cepa, aut scilla, aut fici folijs exscalperis, pharmacum ipsum illitum affrica. De cætero uero lo-

tum

tum rigido ac aspero linteo confricato, & hoc modo illinendo usque duos menses progreditor. Quod si amplius in hac curatione perseveraris, etiam caluiciem perfanabis. Aliud Oribasij, Muscardarum unciam, i. stercoreis cameli exusti, ordeis usti, singulorum pugillum unum, foliorum lauri ustorum manipulum unum, excipe sorde ab axibus derafa, hoc est, qui à rotis curuum deraditur.

De defluuio capillorum.

Cap. LVI

Est & alia capillorum affectio, quæ ex raritate cutis, & penuria essentiae pilos generantis consequitur. Quapropter etiam curatio hoc modo læsorum, non eundem scopum cum alopecijs habet. In alopecijs enim scopus est, ut uitiatum humor consumatur. In his uero, ut habitus capitis corroboretur, & boni succi allatio procuretur, & cutis densitas ac raritas moderata reuocetur.

Solet autem hæc circa pilos affectio plerumque his qui ægrotarunt accidere. Raro uero etiam citra morbum. Et plurimi ægrotantes citra pharmacum, per rescientem corpus uictum breui sanati sunt. Quare pharmaca in ipsis sint quæ moderatè cutem densant, unà cum hoc ut non perfrigerent ipsam. Quæ enim ualde adstringunt, omnino etiam frigefaciunt, & alimentum affluxum repellunt. Vnde etiam amplius pili defluunt. Quapropter moderatè adstringentia ammiscere oportet humectantibus pharmacis, quale est ladanum, & oleum lentiscinum, quæ ex natura sua adstringunt & moderatè calefaciunt. Itaque neque expertus sum, neque mente concipere possum, aliud præstantius fore medicamentum ad defluos pilos, eo quod ex ladanum & lentiscino oleo paratur. Si uero non affuerit lentiscinum, crudo & immaturo oleo utendum est. Illud autem manifestum est, quod raso capiti pharmacum crassius adhibere oportet. Verum ad cutem detonso, liquidius. Quod si magnum fuerit pilorum defluuium, & coniectes magnam cutis capitis raritatem factam esse, oleum myrteum pro lentiscino, ad ladanum ammisceris. Potes & unguentum nardinum ammiscere in ætate frigida, & tempore hyemali. Commodum est etiam ad hæc pharmacum, unguentum illud diuitem feminarum, spicatum appellatum, & quod Salca appellatur. Quare his uel solis diuites uti iubeto. Cleopatra porro inquit, ad defluos pilos utere hoc. Terram cimoliam solidissimam in uino austero macerato, addito mororum succo tanto quantum combibere potest, & semen hyosciami tenuissimè sufficiente mensura adijcito, terito, ac pastillos formato, eos que in umbra siccatos in fictili nouo reponito. Vsu uero expectente, aqua dilutos affricari iubeto. Deinde rescicatos eluito, & per dies quinque rursus illinito. Vtere hoc in capitibus calidioribus. Facit etiam ad faciei ac colli impetigines. Aliud ad defluos pilos. Verbenacam rectam uiridem unà cum radicibus in oleum omphacinum coniectam per plures dies insolato, & oleo excolato utitor quotidie pro communi. Si uero non affuerit uiridis herba, siccam unà cum radicibus contusam ac cribratam oleo ammiscere, ut strigmentiam spissitudinem accipiat, & ubi per aliquot dies siueris, utere. Et minime uanum medicamentum comperies.

Aliud ad pilos ex morbo defluentes. Chamæleonis nigri radices uino coctas crassius capiti illine. Aliud. Sambucum ustum, & cerato liquidissimo exceptum illine. Auget hoc pilos, & cutem densat, & defluere non permittit. Sed & narcissinum unguentum illitum pilos defluere

non finit. Aliud. Ladanum & rosas in uino ueteri terito ac illinito. Conferuat enim pilos, eosdemq; nigros facit. Aliud conseruans pilos: Idem etiam nigrefacit. Myrti baccarum nigrarum sextar. i. uirgultorum myrti sextar. i. seminis apij sextar. i. adianti sextarij dimidium, ladanum tantundem, uini nigri sextarios. v. Coquito ad perfectam dissolutionem, Et ubi tertia pars restat, adijcito olei omphacini aut alicuius ungenti sextar. ii. ac rursus coquito. Postquam autem bis aut ter ebullierit, expressum ac excolatum humorem diligenter reponito. Vsu uero expetente, in præfatis omnino utitor, bis per diem illinens ex eo capillos. Cæterum in pueris pulchros ac densos pilos facit, nuciste fsta usta ac uino trita, & illita. Aliud. Loti arboris folia trita illinito.

Ad supercilia pilis denudata. Cap. LVII

Vt ne defluant pilis neq; à supercilijs, neq; alia corporis parte, melanthumustum & cum aqua tritum impone, ubi pilos emergere uolueris, præsertim uero in supercilijs. Aliud. Apes plurimas uistas ac oleo ammixtas illine animaduersione habita ne alium locum contingas, ubi pilos enasci non oportet. Aliud.

Adamantem lapidem cum aqua tritum illine, quod si albos producere uoles pilos, cum aceto eundem terito.

Tingentia ac nigrefacientia capillos. Cap. LVIII

Medicamenta quæ albos pilos tingunt ac nigrefaciunt, ex austeris ac acerbis composita magnopere lædunt. Non enim solum in superficie, sed etiam in profundo cutem alterant, usq; ad locum radicum pilorum. Detrimentum uero foeminis utentibus illic accidit, aliquando ad morbum comitiam, aut syderationem, aut ueternum, aut soporem profundiorum: Aliquando uero etiam de stillationibus egre solubilibus corripuntur, ut tabes cõsequatur. Et scio multas foeminas mortuas esse, ex perfrigeratione à talibus pharmacis inducta. Magis autem læduntur quæ frigidius temperamentum habent. Cæterum quæ citra læsionem adstringentium pilos nigrefacere uolunt, cedria illinantur. Illinantur autem tribus uel quatuor horis ante balneum. Deinde lotæ confricentur: Oportet autem ipsam citra olei ammixtionem adhibere, in capitibus uehementi resiccatione ac calefactione indigentibus. In alijs uero oleum ammiscendum est. Nam unà cum hoc quod consumit humiditates, etiam pilos nigrefacit, & defluos corrigit, & non defluos habitiores efficit. Idem facit & pix liquida cum oleo adhibita. At uero Archigenes pilos nigrefacientia sic describit. Radicis capparis corticem cum lacte asinino ad tertias coquito, & trita in noctem imponito, pilis antea confrictis. Aliud. Radicis ilicis corticem aqua coquito donec mollis euadat, & imponito. Aquam uero cocturæ affricato. Aliud. Quod intrinsecus in anemona nigrum est, cum oleo myrteo tritum illinito. Aliud. Corticis salicis succum cum oleo affrica, summe denigrat. Aliud. Lapis Alabandicus siue Alabandinus uocatus, colore subnigricans cum fuluedine ac pelluciditate, quo mulieres ad ornatum utuntur, tritus et cum uino nigro ac oleo omphacino affricatus, superficiem pilorum nigrefacit. Aliud. Malum punicum uiride immaturum accipe, & cololum eius diligenter repera, quo id quod amputatum est, congruum operculum fiat. Deinde eiectis granis, & tenuibus membranis intus relictis, in uacuum mali calicem sesami illoti drach. iiii. iniice, & thuris tantundem, utrisque uicissim locatis donec impleatur. & tunc proprium operculum impone, & luto aut fermento tritico obline, & in clibano torre. Postea uero lutum aut fermentum adime, ipsum uero malum punicum leuissimè tere, & in uitreo uase

uaserepone. Deinde præfricto ac resiccato capite modicum de pharmaco ad paucum oleum ammisce, ac pilos illine. Et hoc quinquies repete, hoc etiam crispis ipso facit. Quidam pro sesamo ac thure, nigellæ ac gallarum confusarum, singulorum drach. iiii. in mali punici calicem coniiciunt. Aliud quod pilos denigrat, ac crispis facit. Oportet autem per terram cimoliam pilos confricare, & tunc tingere. Præstat quoque caput prærasum esse, & crassius remedicamento illinere, uitata fronte & omnibus uicinis partibus. In multis celebre factum est, & est ualde necessarium. Sulphuris fullonici, atramenti futorij, gallarum, calcis uiuæ, spumæ argenti, singulorum sextantem, ferruginis unc. i. Singula seorsim terito, & cum aqua ad ungenti formam reducito, ac confider utitor nihil ueritus calcem. Non enim urit, eo quod uis ipsius à reliquis est oppressa. Hoc & ligna & cornua et lanas tingit. Aliud efficax experimento cognitum. Denigrat pilos ad miraculum usque. Foliorum fici nigra, foliorum uitis nigra, foliorum mori, singulorum lib. i. Omnia in aqua pluuiali per diem unum macera, deinde diligenter coque, & præras pilis impone. Aut si hoc nolueris radicibus pilorum liquidius illine. Aliud quod pilos nigrefacit. Ladani, gallarum, amygdalarum amararum depurgatarum, fecis uini, foliorum adiantij, singulorum sexuncem, uini è uinaceis expressi (quod loram uocant) sextar. iiii. Omnia in uas æreum stanno obductum conijce, & ad tertias coque. Deinde excola, & in alio uase paruo ad mellis consistentiam coque & ad hæc ungenti Mendesij, aut alterius huiusmodi, parem mensuram adde, & conuassata repone, & hoc quotidie utere. Sit autem plumbum potius quam stanno, id metallum quo æneum uas obducitur. Aliud quod à canis præferuat. Colocynthidem syluestrem perforato, & interna probe repurgato. Deinde ipsam oleo expleto, & integrum hyosciami albi semen adijcito, & per diem unam finito, Et hoc per annum semel commode illinito. Aliud barbam nigrefaciens. Recrementum ferri & plumbum in aceto coquito, donec tertia pars restiterit, & illinito, atque ab oleo penitus abstineto.

Vt fului pilij fiant.

Cap. LIX

Fuluos pilos faciunt lupini crudi, & nitrum cum aqua illitum, loti arboris ramentorum decoctum. Ligustri folia trita cum herba lanariæ succo imposita. Fex uini ueteris usta, & cum oleo balanino trita, ut iustam spissitudinem habeat. Hoc ubi dormitum ire uoles illine, & mane flauierunt.

Vt albi pilij fiant.

Cap. LX

Hirundinis simum cum felle taurino tritum illine, & albi euadent. Aliud. Verbasci albi florem urito, & aceto extinguito, & ad smegma ammixto utitor.

Vt crispi pilij fiant.

Cap. LXI

Spumam salis cum myrrha affricandam præbe. Aliud. Carpasi succum illine, & manebunt crispi ac nigri. Aliud. Asphodeli radices urito, et tritis cum uino utitor. Aliud. Semen lini uino maceratum modice coquito ac excolato, & ad succum oui candidum ammisceto, & ex eo uesperis pilos confricato ac caput obligato. Postera uero die in balneo abluito, & hoc saepe facito. Vt illa die non abluito. Aliud celebre. Nucem pineam integram uiridem bonam unam, iridis scrupu. xii. myrti unc. i. baccarum myrti unc. i. polytrichi sesquiunciam, ladani sextantem, gallarum unciam i. mastiches æthiopice

æthiopicae unc. i. pampinorum uitis sextantem, lachrymae palmae arboris scrup. xii. adipis ursini scrup. xii. seminis betae scrup. xii. rhois coriarij scrup. vi. aluminis scissi scrup. vi. olei omphacini sextar. iiii. succi artemisiae, succi serapiadis tritesticularis, succi polytrichi, succi asphodeli, succi anagallidos, singulorum quadrantem. Misce ac utere.

De his quae pilos corrumpunt.

Cap. LXII

Eorum quae pilos corrumpunt tres sunt differentiae. Nam quaedam proprie psilothra appellantur, quaedam attenuatoria, quaedam omnino ipsos extirpantia. Quae igitur ipsos penitus extirpant, periculosi usus sunt. Aliquando enim non solum illitas partes corporis, de cetero penitus depiles reddunt, sed & uel que ad caput & mentum, superciliaque ac palpebras, nuditas pilorum procedit.

At uero attenuatoria & psilothra minime periculosum usum habent.

Quae pilos extirpant.

Cap. LXIII

Pilos penitus extirpare dicitur thynni hepar putrefactum, ranarum in arundinetis degentium sanies, testudinis marinae sanguis, uitis albae lachryma, lachryma hederæ, itemque bryoniae, scolopendra marinae, stellæ marinae. His amiscetur nitrum, amurca & cedria, & oleum quod insulsum appellatur: Item Alcyonia et sandaracha, & his similia. Aliud. Vrticæ syluestris semen cum oleo tritum fortiter affrica, & defluent pilii. Tardius autem circa pubem puero rum pilos enasci facit, aliquando uero etiã eos qui sunt, extirpat, uitis lachryma cum oleo illita, & humor qui ex uiridi sarmento dum uritur exudat. Aliud.

Succi thymali characitæ cyathum, i. uini & olei singulorum cyathum, i. misce, & illine in balneo: Et ubi modicum sudaueris, & deinde per strigilem confricueris reperies pilos in strigile. Qui uero post dies quadraginta exoritur, lanuginosi erunt. Aliud. Asellorum sub hydris stabulantium drachma xii. sandarachæ drach. iiii. calcis uiuæ drach. viii. auripigmenti drach. viii. lixi uij ex ligni ficulnei cinere excolati heminas. i. acetii cochlearium. ii. Omnia unita in olla coquito, donec experimentum tibi facienti, illita pilos tollunt: Et utere in balneo uelut dictum est. Aliud. Buglossi & semperuiui succum, æquis portionibus cum stercore hircino terito, & uitrea tabella excepta densa rifinito, acutior in balneo. Aliud. Bulbum hyacinthi purpureos flores habentis cum thure & amygdalis amaris terito, & oleo affuso unito, & in balneo ungitur ex hoc: item que citra balneum quotidie, & paulatim pilii corrumpentur.

Psilothra pilorum.

Cap. LXIII

Ex his quae pilis denudant, & psilothra appellantur, utile est lixiuium, & auripigmentum, & sandaracha, & calx uiua. Manifestum est autem uehementiam ipsorum frangi, debiliorem & liquidorum ammixtione, ptisanæ inquam aut oryzæ succi. Crito itaque tale psilothrum in libris de ornatu describit. Calcis uiuæ partes, ii. auripigmenti partem. i. Hæc in mortarium plumbeum coniecta, aqua calida aut ptisanæ succo affuso terito, & ubi nigra facta fuerint, in balneo illini iubeto. Hoc statim corpus glabrum facit, et pilis enascentibus emergit. Aliud. Oryzam, fabas, cicer, ptisanam, simul in aqua coquito, & ad hoc decoctum primum calcem ammisceto sufficientem, & pro uirgulis est agitato: Et ubi dissoluta fuerit, auripigmenti unc. i. inspergito, unito, & myrrhæ tenuissimè tritæ unc. i. mastiches unc. i. punicis torrefacti drach. iiii. opobalsami cochlearia, ii. adijcito. Aliud. Sandaracham cum hyosciami succo tritam illine. Aliud. Fructus fici syluestris sex uncem, & foliorum eius

eius sexuncem, herinacium terrestrem integrum uiuum, succi aconiti, hoc est, iridis syluestris lib. i. ueratri nigri lib. i. fecis uini uisæ lib. i. caricarum pinguium nigrarum, lib. i. auripigmenti auricoloris trientem, costi trientem, casie trientem, carpobalsami trientem, olei sextar. i. Omnia contusa cum herinacio ter restri uiuo, in duplici uase cum aqua coquito: Sint autem aquæ marinæ lib. v. donec aqua fuerit consumpta. Et ab igne ablata per triduum finito, & ubi sedata fuerint excolato, ac utere oleo in prima balnei domo antequam sudare incipiunt.

Quæ pilos attenuant.

Cap. LXV

His quæ pilos attenuant uti poterit medicus, in his qui duos ac magnos pilos habent. Sunt autem talia exterforia & attenuatoria facultatis. Quemadmodum autem in omnibus alijs medicamentis differentia secundum excessum & defectum est, ita etiam in exterforijs. Ordei itaq; farina & fabarum, & erui, spumaq; nitri ac nitrum, moderatiorem uim habent. Quæ uero his fortiora sunt, in his qui duos ac magnos pilos habent conueniunt. Quale est nitrum uisum, & nitri spuma & aphrolitum, & testæ calainæ. Item sepia testæ uisæ ac non uisæ, & stilium ac clibani testæ, & pumex uisus ac non uisus, & muricum ac purpurarum ac reliquorum ostreorum testæ, alcymiaq; ac herbæ lanariæ radix. Veratrum item utrumque, & bryoniæ radix ac dracunculi, aristolochiaq; ac panacis radix, & canchry ac huiuscemodi. Quod si odorata hæc facere uolueris, cyperum & melilotum, & rosas siccas, & iūci odorati florem & iridem, & melissophyllum, ammisceris. Diuitibus uero nardum celticam & indicam, ammonium, folium malabathri, myrrham & costum. Attenuat etiam pilos cinis samentorum uitis, & ficulneus, & ex tithymalis, tritus & in balneo affricus. Et ab exustis uinaceis cinis, & alumen scissum, & sterces caninum siccæ. Aliud sinegma illustrans cutem, et pilos lanuginosos faciens, ualde bonum. Mora crudissima cum terra cimolia ac nitro, æquis portionibus trita adseruato, ac utitor.

Puluillus attenuans pilos in balneo, multo experimento cōstans. Puniceis costi, testarum sepia uisæ, nitri, cimolia, æquis portionibus utere confidenter. Alius. Testarum purpurarum uisæ sextantem, alcyonij sextantem, nitri bessem, cimolia bessem, puniceis unc. i. omnia tosta terito, & utitor in balneo, ac miraberis. Alius, quo usi sumus in cubicularia. Calcis uiuæ ex marmore factæ lib. i. auripigmenti unc. i. staphidis syluestris, cimolia testarum sepia, radices bryoniæ sicca, aluminis scissi, singulorum drach. iiii. cerusæ unc. i. sampuchi, aloës, ueratri nigri, singulorum scrup. vi. Contusis ac cribratis utere, iniiciens ex eo in familiare psilothrū drach. iiii. & ouorū cādida, iiii. Deinde psilothrū ablue, & rursus siccum affrica, & quotidie in balneo hoc utantur. Aliud sinegma attenuatorium, & lanuginem producat. Farinæ fabarum, pumicis, similaginis, spumæ nitri albæ, singulorum chœnices atticas, ii. fœniculi cum pitana cocti, & postea aceto mulso eloti ac siccati, tusiq; ac cribrati chœnices, ii. saponis gallici lib. ii. Saponem reliquis antea tritis ammisceris, ac manibus subige, & utere.

De furfuribus siue porregine.

Cap. LXVI

Quibusdā se scalpētibus, furfuribus similia sæpe ex capitis cute decidunt. Contingit autem hæc affectio a uitiosis serosis humoribus, quos cōsumere scopus est in eius curatione. Itaq; discussoria ac exterforia adhibenda sunt pharmaca, ubi p purgatorij medicamentū prius totū corpus euacuauerimus, si uitiatas humoribus fuerit refertū. Quidā etiā aliqua adstringētia ad discussoria ammiscuerūt, quo p ipsa

ipsa affecta pars corroboretur, ut ne facile in seipsam suscipiat influentes serolos humores, sed resistat eosque repellat, ueluti est sutorium atramentum, & similia.

Deterget itaque furfures in capite: Cimolia cum betæ succo aut fœnigræci, aut utrisque simul ammixtis. Aliud. Fabam unā cum cortice molito, & cum betæ succo utitor. Aliud. Furfurum dimidiam chœnicem in aquæ sextar. i. macerato, deinde diu manibus terito, & succum excolato, & ad ipsum acetum heminam dimidiam addito, & ad spissitudinem coquito, et sic affricato. Deinde betæ, aut fœnigræci, aut lupinorum decocto abluito. Aliud. Terræ cimoliæ, sulphuris uiui, æquales portiones terito cum aceto, & affrica in balneo, & calida aqua ablue, & illine non solum in balneo, sed etiam citra balneum.

Aliud. Spumæ argenti, olei rutacei, acetum, pares portiones terito & illinito. Hoc multo experimento constat. Aliud. Cucumeris syluestris radice coquito, & decocto utitor. Archigenes de medicamento ex bryonia dicit, præ omnibus inquit, hoc tibi paretur. Si igitur iuxta pondus præparare uoles, sic facito. Cimoliæ sex uncem, nitri quincuncem, farinæ fabaceæ quadrantem, corticis aridi radice cucumeris syluestris sextantem, bryoniæ sextantem, farinæ ordeaceæ ac lupinorum, singulorum unc. i. Aliud. Cimoliæ lib. ii. nitri, bryoniæ, corticis radice cucumeris syluestris sicci, farinæ fabarum singulorum lib. i. farinæ ordeaceæ ac lupinorum, singulorum sextarii dimidium. Singula seorsim leuissimè terito, mensurato ac unitis utitor in balneo. Archigenes dicit, ad furfures farinam fœnigræci, & nitrum, & cimoliam, cum betæ succo affrica, & fel bubulum aut suillum addito aceto illine. Deinde post horam ablue, & atramento sutorio ac nitro cum modico oleo tritis illine. Aut cuminum, & myrobalanum, & fabaceam farinam, æquis portionibus cum aqua lixiuij terito, & affricato. Aut amygdalas amaras decorticas, cum aqua aut aceto tritas affrica. Postquam uero reliccati fuerint pilæ, calida aqua ablue.

Aut maluam syluestrem in aqua marina donec decima pars supersit terito & affricato. Aut nitrum & pumicem, & fecem uini, pari portione cum aqua calida affrica. Aut spumam nitri, & atramentum sutorium, æquis partibus cum uino adhibe, ter aut quater in mense. Hoc adeo efficax est, ut nihil reliquum faciat. Aliud. Thus tritum cum aceto illine. Aut scorpiuri succum illine. Aut scillam affato, & ubi mollis facta fuerit, expressum succum oleo ammixto illine. Vicius sit flatu exors, nihil ex crasso humore præditus habens, uelut sunt tubera, fungi, bulbi, legumina, & carnes bubulæ ac similes. Sin autem quæ ingeruntur uentri commoda, concoctu facilia, & mel cibus addatur. Ad intinctus confert acetum cum sapa. Condimentum sit cuminum, apium, fœniculum, aliorum parcus sit usus. Et maximè ab omnibus bellarijs abstinentum est. Vinum utile est tenue & album. Iucunditatis tamen gratia etiam uinum dulce & uinum mulsum permittitur. Ex fructibus uua arefacta optima est, deinde ficus ante cibum. Postea malum punicum post omnem cibum. Et amygdalæ uirides commodæ sunt ante cibum. Et bonæ concoctionis potissima ratio habenda est. De abulationes lenes plurimæ mane ac uespere optime sunt. frigida lotio balneis præstat. Verum in calida se lauanti incommoda est multa in aëre cōuersatio. Et capitis perfusio solis melior est. Et post hæc large per frigida refrigera. Dormire ad satietatē commodū est. Ab ira et indignatione, in solatio neque ac uehementi frigore abstineant, itemque ab omnibus quæ caput replent.

De morbo pediculari.

Cap. LXVII

Pediculorum generatio quibusdam acruatim in capite contingit, multis humoribus moderatè

moderate calidis in profundo cutis collectis, ubi etiam pediculos generari con-
tingit, non in superficie cutis, in qua furfures consistunt. Itaque pharmaca ipsorum
necessarium est liccantia esse, & quæ magis ex profundo attrahere ac euacuare
possunt. Lupinos igitur in aqua coquito, & decoctum ipsorum affricare iubeto.
Aut myricæ decocto, aut aqua marina, aut muria meraca cum aceto perfundito.
Aut hederæ succum melle mixtum illinito. Aut perdicij succum, dormitum eunt illi-
nito. Aliud ad pediculos capitis, ac totius corporis. Ligustri florem cum ui-
no tritum, capiti ac toti corpori affrica, ubi dormitum ire uolet. Aut staphidis sylue-
stris partes II. sandarachæ & nitri, utriusque partē I. adhibe cum aceto. Aut rhoem
culinariū cum oleo tritum illine. Aut alumine cum oleo trito utere. Aut ueratrum
album, & staphidem syluestre, ac nitrum, æquis portionibus cum oleo trita, in bal-
neo adhibe. Aut rumicis syluestris radice cum oleo in balneo utere. Aut modis-
copipere cum multo oleo utere. Aut oleum laurinum aut raphaninum illine. Si ue-
ro pili denudati sunt, staphide syluestri cum aceto & oleo utere. Aut alumine li-
quido cum oleo. Prodest item ipsis potus allij drachmarum duarum, cum origa-
ni triti drachma una ex aqua mulsa.

De achoribus & reliquis pustulis capitis.

Cap. LXVIII

Vlcusculum quod achor Græcis appellatur, in capitis cute consistit, tenuia fora-
mina habens, per quæ tenuis sanies effluit mediocriter uiscosa. Similis autem est
ipsi alia affectio, quæ Corion, hoc est, fauus appellatur. Quæ quia foramina ma-
iora habet, humores melli similes continentia Meliceris uocatur, hoc est, fauus
mellis. Proinde scopus in his est ut humores affectionem facientes euacuemus.
Si uero adhuc influxerint, ut prius influxionem impediamus, euacuato primum
corpore per purgatorium medicamentum, initio sumpto à uenæ sectione, si aget
ferre potest. Deinde purgatorio utimur sero lactis præparato ex aqua mulsa, am-
mixtis ad ipsum epithymi drachm. III. Relata est autem seri præparatio Ser-
monis secundi capite nonagesimo sexto. Si uero intemptius est lactis usus,
colocynthidem perfectam accipe, & semen ejice, & in ipsam tomentum siue pul-
pam adhuc habentem, sapam aut uinum mulsum infunde, & per diem ac no-
ctem macerari sine, & postea calefactum exhibe. Deinde uero etiam caput pur-
gandum est per ea quæ naribus induntur, & quæ per os pituitam extrahunt.
Conueniunt autem ipsis secantia & discussoria medicamenta, eò quod uisco-
sus est humor qui affectionem generat. At uero incipientes achoras, ubi totum
corpus superfluitatibus caruerit, per adstringentia ac repellentia curabis. Talia
autem sunt myrti, & pini cortex, & rubi folia imposita, plantago imposita, oleæ
syluestris succus affricatus, salicis folia & flos imposita, similiter polygonum. Quæ-
dam uero prohibent ne achores augetur, simul reprimentia quod influit, si-
mulque concoquentia ac discutientia quod iam continetur, ut quæ mixtas uires
habent, quibus sanè post principium uti oportet. Tale est oleum myrteum & ro-
saceum & lentiscinum, rubi succus cum oleo, portulacæ succus cum oleo, lada-
num cum uino illitum, ligustrum & lentes. Quædam uero antiquis & modera-
tis auxiliantur, discutientia & extergentia citra sensibilem caliditatem, non tamen
aliquid irritans habentia. Quibus utendum est maxime ubi dolor aliquis cum
achoribus affuerit. Sed & in his à debilioribus initium facere conuenit. Cimolia
igitur ad hanc rem apta est, & Cretica ac Samia terra, pompholyx ire ac spodiū,
& spuma argenti & Cadmia tenera, & adiantum cum rosaceo illitum, & foeni
græci decoctum affricatum, & malua trita cum liliacea farina imposita. Aut
melilotum cum farina foeni græci ex uino impositum. Item cicerum decoctum, &

D ipsum

ipsum cicer coctum impositum, nuces rancidae comansae ac illitae, quod si his nihil effeceris, siccum ex charta pharmacum illine cum aceto. Si uero acrius tibi uideatur spumam argenti pari portione adde. Si uero non affuerit siccum pharmacum ex charta, chartam ure, & cinerem eius aceto subige ac utere in his qui duram carnem habent. Quaedam porro uehementem adeo uim habent, ut ualde crassos ac uiscosos humores euacuare possint, ipsosque dissoluere achoras, etiam si iam in scirrhum indurati fuerint. Talia sunt chalcitis, sex uini usta, sandaracha, & calx. Acetum autem fortissimum est omni tempore ad achoras, & discutiens & repel lens. Sit autem acerrimum. Discutit etiam optimè lilij radix affricata, & thus cum aqua & nitro, & lupinorum amarorum decoctum affricatum, & cucumeris syluestris radix cocta, & fici folia cum aceto trita, bulbi cum nitro affricati, rutae folia imposita, farina fœni graeci cum nitro affricata, thus cum aceto illitum, malicorium cum laurino oleo illitum, allium cum cauliculoustum, ac cinere cum oleo illito. Hoc ualde bonum est. Aliud. Mulier quaedam nuces regias mandebat, & puero achoras habenti imponebat, & sanatus est. Aliud. Radices anchusae uistas, ac cum oleo ad strigenti spissitudinem tritas, illine cum penna, & sanabis. Aliud. Thymum urito, & cinerem cum uino & oleo subactum illinito. Aliud. Cnestrum quam in Alexandria liparona uocant urito, & cinerem cum uino tritum illinito. Aliud. Buccinarum uistarum cinerem cum aqua adhibeto. Est hoc salutare pharmacum non solum ad achoras, sed etiam ad omnem papularum eruptionem. Quod si incideris in achoras inflammatos & dolentes, dolorem prius liquido medicamento cocitorio mollientem ac leni mitigabis, quale est parhygrum, & omnia ad sedem parata, & quae ad carcinomata descripta sunt. Farinam itaque sabaceam uino madefactam ac tritam, ut emplastrum formam acquirat imponito. Facit & ad feruentiora & agrestia in capite pustularum genera. Aliud ad maximos & inflammatos dolores, leniens, dolorem eximens ac percurans. Collyrium quod asper appellatur, aut aliquod ex Libianis appellatis, aut consimile quoddam cum modico hyoscyami succo terito, & adiecta sapa ac rosaceo illinito. Alia pinguis compositio, ad achoras, pustulas, papulas feruidas, intertrigines. Est & ad sedem bona. Spumae argenti drachm. viii, foliorum rutae tenerorum drach. xxv. Aceto dilue, & rosaceo aut myrteo excepta pennis illine. Hoc magno experimento nobis constat. Alia similis. Spumae argenti drach. iiii, cerusae drach. vi, sulphuris uiui drach. iiii, ceram drach. iiii, rosacei aut myrtei quantum satis est, ut liquidum cerati spissitudinem accipiat. Liquida siccis affunde, & unitis utere. Haec ad totius corporis pustulas comoda est. Alia ad humidos achoras. Ladani drachm. viii, cerusae tantundem, sulphuris uiui drach. viii, utere cum uino & myrteo oleo. Aliud pharmacum. Ladani, baccarum myrti nigrarum, spumae argenti, sulphuris uiuis, seminis hyoscyami, malicorii, aequas portiones terito, & uino ac myrteo, aut rosaceo oleo affuso utitor. Aliud ad feruidas, saniofas & impetiginosas papulas. Verbenacae supinae drachm. viii, acaciae drach. viii, myrrhae drach. ii, uino austero trita illine. Aliud. Facit & ad eas quae in mento sunt. Baccarum myrti, malicorii, atramenti sutorij, spumae argenti, aequales partes tritas cum uino & oleo myrteo adhibe. Emplastrum ad achoras uetustissimos. Resinae pinus siccae, cereae, adipis suilli, aut bubuli, aequas portiones simul liquatas in aquam excolato, & diutius manibus emollitis utitor. Aliud. Quo usus est Aegyptius in Palladio Magistrano in Alexandria, ubi medicorum auxilia frustra tentasset. Colophonae semissem, ammoniaci thymiamatis sextantem, galbani scrup. iiii, opopanaxi scrup. iiii, olei drach. iiii, mastiches, cerae, singulorum unc. i, resinae pinus lignosae drach.

drach. iiii. æruginis scrup. iiii. Quod si magna affuerit acrimonia, æruginē ne adſcias. Hoc abſceſſus diſcutit, & iam ruptos euacuat ac ſanat.

Ad capitis ſcabriciem.

Cap. LXXIX

Rutam & alumen terito cum melle, & præraſis pilis illine. Aliud, Sulphur uiuum & ſtaphidem ſylueſtrem terito, & picis ſero ammixto illinito.

Ad parua & denſa ac rubicunda capitis ulcuſcula.

Cap. LXXX

In paruis ac denſis & rubicundis capitis ulcuſculis, mammarum papillis ſimilibus, à quibus etiam ſanies effluit, caput radito, & ſemen lini tritum ac melle ſubactum imponito. Aut conchylum urito, & cum aqua tritum imponito. Aut emplaſtrum e lolio imponito. Et ubi euacuatū fuerint humores hoc ſublato myrſinum appellatū imponito. Cæterum ad rubicundas papulas in capite, ceruſam cum laurino illine. Aut pini corticem cum cerato. Aut teſtam clibani cum aceto aut uino. Aut betam coctam impone. Aut betæ ſuccum ad ceratum roſaceum quantum eius admittit adijce & impone.

Reſiccantia & cicatricem inducentia achoribus.

Cap. LXXXI

Spumæ argenti drach. xxi. calcis uiuæ tantundem, aceti unc. i. roſacei tantundem, utere. Aliud ualde bonum, quod humida ulcera reſiccat, & cicatrice includit, Spumæ argenti, ceruſæ, ordeï uſti, æquales partes cum roſaceo aut myrteo illine. Emplaſtrum melinum, reſiccans omnem fluxionē, & cicatricem inducens, præſertim in antiquis ulceribus. Spumæ argenti, ceruſæ, ſalis ſoſſilis, ſingulorum lib. i. aluminis ſciſſi ſemiſſem, atramenti ſutorij ſemiſſem, olei lib. ii. aceti ſextar. i. oleum, ſpumam argenti, & ſalem, ac ceruſam coquito, ſingula per ſe & ſimul leuiſſimè trita. Vbi uero non amplius inquinauerint, alumen & atramentū aceto diluta, ad pharmacū ab igne ablatū & aliquo modo frigefactū paulatim adijcito, unito, & in mortarium diſfundito, & probè mollito, utitor.

Smegmata ad achoras, furfures, aſperitates, ac ſcabriciem. Cap. LXXXII

Quod ſi in declinatione fuerit affectio, & omnino ad cicatricem uergat, ad totam affectionem eradicanam huiusmodi ſmegmatis in balneo utendum eſt. Terræ Cimoliz lib. ii. nitri rubri tantundem, myrobalani lib. i. myrthæ, iridis, piperis, ſingulorum unc. i. nardi celticæ, coſti, caſiæ, ſingulorum unc. i. contundito, cribrato, ac utitor in balneo.

De aurium affectionibus.

Cap. LXXXIII

Aurium dolores ſunt, tum ob frigiditatem à uentis inductam, aut à frigidis aquis, aut iſſdem medicatis, in quibus homines ſe lauant; tum ob inflammationem cutis in meatu, aut nerui auditorij in profundo. Fit etiam dolor propter ſpiritum ſtatuofum, qui tranſitum non habet.

Ad dolores ex frigidityte.

Cap. LXXXIII

Dolores itaq; à ſola frigidityte obortos, calefacientia quàm celerrimè curant. Cepa igitur aut allium in oleo ſeruefactū frigiditytes omnes ſanat. Ego uero euſphorbio modico ad multum oleum ammixto utor. Aut pipere exactiſſimè trito cum uino & oleo. Prodeſt & amaracinum, & optimum nardinum, & laurinum. Sed & ruta in oleo dulciſſimo cocta magnificè facit.

Ad dolores ex aqua medicata.

Cap. LXXXV

Quum medicata aqua circa auditoriū meatum continetur, oleum aſſiduè infundere conuenit, ita ut aurem eluamus, & per mollem lanam detergeamus, & deinde ruſus infundamus. Magnopere uero ipſos mitigat oui candidū cum laſte muliebri tepidum infuſum. Omnia enim quæ adhibentur moderatè calida ſunt. Prodeſt ipſis & anſerinus adeps. Sed & exuſio per os aquam attrahit,

D 2 Aut

Aut per arundinem, uelut per aquæfuforium instrumentum (siphonem Græci dicunt) exuctione facta, ceparum succum cum anserino adipe instilla. Valde enim mitigat. Si uero quis uno pede auri affectæ proximo exiliat, inclinans quodammodo seipsum, aquam facili excernit.

Ad dolores aurium ob humorum crassitudinē. Cap. LXXVI
Si dolor auris cum capitis grauitate obortus fuerit, crassi & pituitosi humores causa doloris existunt. Dinotio autem ex prægressa diæta tibi continget. Nitrum igitur ac spumam nitri auricularibus pharmacis miscebis. Veratrū item album ac nigrum, & amygdalas amaras, & ex aristolochiis eam quæ ad manum est, & cucumeris syluestris ac bryoniæ radicem, & centaurij magni radicem, & parui comam, & iridem, & cassiam. Et in summa, omnia amara citra mordacitatem ac molestiam meatus purgant, & extergent, & crassos humores impactos secant.

Ad aurium sordes. Cap. LXXVII
Ad aurium sordes unguentum nardinum tepidum instilla, & sequenti die per specilli concuum eas quæ expositæ magis sunt expurga, & rursum nardinum infunde. Si uero locus durus fuerit, aut etiam sordes duræ, nitrum torrefactum ac leuissimè tritum in aurem insperge, & acetum calidum instilla, & apposita lana pernoctare sinē. Postera uero die, aqua & oleo calefactis elue.

De sonitu aurium. Cap. LXXVIII
Sonitus in auribus plerunque ex flatuoso spiritu generantur. Fiunt etiam alia quando ob sensus auditus subtilitatem, ex euaporationibus. Dinotio contingit tibi primum ex temperatura & habitu hominis. Deinde etiam ex omni prægressa diæta. Sed & ex eo quod aut paulatim, aut acuatim fit sonitus, inuenire datur affectionem. Quin & ex eo quod hoc sonitus accidens aut per interualla recedit, aut perpetuò permanet, affectio cognoscitur. Exacta uero dinotio hæc à te fiat. Si enim quis putet à spiritu flatuoso exitum non habente, sonitum fieri, & secantia ac attenuantia adhibeat, & nihil proficiat unā cum hoc quod etiam his quæ pituitam per os ducunt utatur. Tunc sanè ob auditus subtilitatem, sonitum fieri coniectet. Ego uero in talibus ammisceo ex his quæ sensum stupefaciunt, uelut est mandragoræ succus, & opium paucissimum. Aut oleum in quo intestina terræ cocta sunt infundo. At uero ad sonitus ob flatuosum spiritum generatos, talia commoda sunt. Apollonij ad sonitus ac bombos & sibilos dederat pente sientes. Acetum acerrimum calefactum instilla. Aut acetum cum rosaceo calefactum instilla. Si uero perseverarint, cuminum, rutam, anethum & nigellam, cum aceto coquito, & rosaceo adiecto utitor. Aut colocynthis medullam in oleo coquito, & oleum infundito. Si uero adhuc remanet ampliori tempore, omnibus amaris & acris, & attenuatorijs ac discussorijs utere, quæ paulò antea descripta sunt ad eos qui ob humorum crassitudinem aures dolent, ita ut singula cum aceto coquas, & mel addas. Facit autem ad inueteratos sonitus, castorij & spica nardi, æquis portionibus cum aceto & rosaceo. Aliud ad sonitus diuturnos. Herbarum lanariæ, croci, castorij, ueratri albi, æquales partes tere cum aceto, & in forma pastillos, & utere cum uino. Cæterum ad sonitus ex morbo, fomento per absinthij decoctum adhibito, acetum cum rosaceo infunde, aut raphani succum cum rosaceo. Aut aloem optimā cum uino mulso. Si uero adhuc perseverarint, ueratro nigro cum aceto cocto utere.

Ad auditus difficultatem ac surditates. Cap. LXXIX
Qui difficulter audiunt, per hieram ex aloë, aut per catapotia ex colocynthide purgandi sunt, & pituita per os detrahenda est, & caput omni modo resiccandum ac

dum ac corroborandum. Utendum est & attenuatoria diata. In ipsam uero aurem immittenda sunt pharmaca quæ findunt ac secant, & attenuant uiscosos ac crassos humores. Quorum sylua iam antea relata est in his qui ob humorum crassitudinem aures dolent. Fomenta ad grauem auditum, Apollonij. Ad audiendi difficultatē repente obortam, & ex capitis dolore, absinthium cum aqua in olla coctum per arundinē pro fomento adhibe, ita ut alterā arundinis partem cavitati auris adaptes, alterā uero foramini operculi ollæ inferas, quo uapor qui exhalat ad auditorium meatum allabatur. Aliud, Baccas lauri aut folia in aqua coquito & similiter utere, aut origanum, aut hyssopum eodem modo, aut aquam marinam cum aceto similiter. Est & hoc optimum, urinā tauri, aut bouis, tertia acetī parte addita, pro fomento adhibeto. Item myrtum contusum similiter coctum adhibeto. At uero circulum ex lana auri circumdare oportet, ut ne loci uicini amburant. Elotiones porro his cōueniunt, acetum acre album, cum pari aquæ mensura, & nitro leuissimè trito calefactum infunde per multos dies. Et postea aqua calida elue, atque sic subscripta infunde. Quæ auribus in auditus grauitate infundantur. Porri succum irino ungento ammixto infunde. Veratri nigri radicē cum aceto tritam, & melle exceptā, in aurem inde, & per dies quinque sine. Capræ recens maciata cornu urina eiusdē exple, ea maxime quæ in uelica ipsius reperitur, aut alia asseruata, & cornu in fumum ad dies nouem suspende, ac utere. Clausos caligarum ueterum numero centum, in uino Amineo ad dies septem macerato, & donec septies ebulliant coquito, excolato, & adseruato, & usus tempore quantum satis est calefactum infundito. Hoc usus ego surdum curauī. Aliud, Asphodeli radicē in oleo coctā adhibe. Hoc etiam in ueteratā audiendi difficultatē sanat. Optimus est etiā cucumeris syluestris radicū aut foliorum succus cum aceto infusus. Aut capræ urinam & fel eiusdē simul calefacta infunde. Aut castoreum cum baccis lauri & aceto. Aut ueratrum nigrum cum aceto terito, & melle diutius cocto excipito, & collyria ad glandis figurā formato, & in meatum indita per triduum sinito. Aliud, Nasturtij seminis quantum satis est, & nitri parum, ficus pinguis carne granulis exemptis excipe, & collyria meatui auris congrua efforma ac inde, & per triduum sine. Hoc sordes multas ducit, & statim alleuat. Aliquando uero pro nasturtio sinapi conijcimus. Vere hoc etiam ad aurium sordes. Multum quoque opitulatur ad auditus grauitatem spongia in tenues partes concisa ac intorta & melle imbuta meatui indita. Idem commodum est ad enascentem in auditorio meatu superfluam carnem. Aliud, Omnis piscis fel infusum prodest, item perdicis, & capræ. Aliud, Fel tauri cum anguis senectū tritissima aceto exceptum, & meatui inditum, grauem auditum soluit. Quidam cum rosaceo indunt. Aquæ uero fomentum adhibere oportet. Aliud, Saluæ succum cum oleo omphacino in aurem instilla. Vere, est ualde commodum. Aliud, Herinacei terrestris fel cum oleo infunde. Aliud, Veratri albi drach. iiii. castorei drach. i. spumæ nitri drachmā i. infunde cum aceto, & utere uelut optimo. Vere etiā pastillo ex amygdalis amaris cum aceto mulso. Descriptus est ad aures purulentas.

Ad aurium inflammationes.

Cap. LXXX

Moderatas & non pulsantes inflammationes sanat rosaceum cum aceto tepescitum. Et glaucium in cote medica tritum cum uino dulci ac modico aceto. Si uero uementior fuerit inflammatio, dolores quidem mitigat, tenue, ac candidum ouum cum lacte muliebri tepidum infusum. Optimum uero ad ipsos pharmacum est nardinum ungentum, cum modico medicamento Basilico appellato, aut cum adipe anserino, aut phasianino. Vbi uero magnus est dolor, necesse est stupefacientibus

D 3 sensum

sensum uti, ita ut ad lac muliebre, & oui candidum, modicum opij ammisceamus. Ammiscendum est & castorium, ad uehementiores dolores pari mensura, ad leuiores dupla proportionem. Nos autem opium & castorium cum sapa probe conterimus, & tepesacta infundimus. Oportet autem omnino non contingere auditorium meatum tempore doloris. Et fomentum adhibere per auricularium specillum, lana molissima circumdatum, ita ut lanam tepido Basilico medicamento, cum nardino aut alio ex his quae infundunt tingamus, & ad principium auditorij meatus indamus, & pharmacum in profundum destillare sinamus. Et hoc assidue facere oportet. Postquam uero repletus est meatus, lanam supernè obdito. Quod si aestas fuerit, & multae caliditatis sensus aegrum circa inflammata aurem uexarit, fomentum per rosaceum bonum fiat. Mitigat porro feruentes inflammationes tepida cum rosaceo instillata, auriculae muris succus, & polygoni, & portulacae, & ramentorum cucurbitae succus. Item aranei cum rosaceo cocti, & aselli sub hydryis stabulantes similiter, & intestina terrae eodem modo. Et blattae domesticae interanea cum rosaceo. Et oleum amygdalinum ac hyoscyaminum. Medicamentum auriculare est succis, ad inflammationes quae aegre transmutantur: cito enim ipsas suppurat. Succus ramentorum cucurbitae, succi calami, succi perdicij, succi brassicae, singulorum cyathum unum, nitri tostij, myrrhae, croci, singulorum drach. iiii, ungenti nardini unc. i, aluminis liquidi unc. i, aceti scillitici sextantem, mellis optimi lib. i, excipe & repone in uitreo uase. Et usu postulate, cum nardino aut rosaceo diluto utere. Aliud, ad diuturnas & aegre transmutabiles inflammationes. Galbani drach. vii. seui taurini drach. iiii, cerg. colophoniae, saponis, singulorum drach. iiii, picis drach. i, Colophoniam, picem, seuum liquefacito, & galbanum cum cera praemollitum adijcito, & deinde etiam saponem, & excolatis utitor, ita ut in cote cum aqua aut oleo aliquo diluas. Ad maximos dolores. Aloem optimam uino mulso dilutam instilla, aut lanas succidas aceto feruescente, & instillato, in superius ipsam lanam in aurem indito. Quod si mitius facere uelis, cum aceto aut sapa coquito.

Ad aures absque ulceratione humectas, quae uelut exudant, & seorsum humorem excludunt.

Cap. LXXXI

Misy in linteolum illigatum, & prunis obrutum, exurito & una cum exulso linteolo terito, & per arundinem insufflato. Aut gallas terito, & linteo illigatas exurito, ac similiter utitor. Aut alumine in testa exustum, & oleo praefuso tritum insufflato. Porro postquam penitus sedata fuerit inflammatio, castorium cum oleo infundatur, quo detrimentum ex afflictione solvatur.

Ad ulcera in meatu auris.

Cap. LXXXII

Recentia quidem ulcera glaucium curat solum cum aceto tritum, & omnia ex ipso collyria, & quae ex croco, itemque ex rosis fiunt & appellationem habent. Curat etiam eadem collyrium Damocratis ex myrrha. Quae uero pure manant citra dolorem, & moderate hoc patiuntur, per eadem curantur. Quae uero fortiter pure manant, per pastillos. Qualis est Andronis & praesertim Musae, cum sapa & modico aceto infusus. Quod si etiam haec superentur, recrementum ferri cum acerrimo aceto, in caniculari aestu ad solem terito, & pastillos efformato, & utere cum aceto. Si uero non est canicularis aestus, recrementum ferri leuissimum tritum cum aceto ad prunas coquito donec rescicetur, & utere cum aceto. Aurium elotiones. Caeterum Apollonius ad aurium ulcerationes talia scribit. Vino mulso calido frequenter ipsas elue. Aut myrtum cum uino coquito ac utitor. Si uero foetidum fuerit quod prodit, malicorium & lentem cum uino coquito, & tepidum infundito. Post elotiones autem conueniunt ad infundendum, fel bubulum, & maxime

ximè porcini, in malicorio tepesactū instilla. Idem facit & caprinū fel, & omnis piscis fel rosaceo ammixto. Aliud optimum. Alumen scissum tritum, cum sapa & aceto in feruenti cinere coquito ad mellis spissitudinem ac utitor. Facit etiam omne alumen cum polygoni succo, & Erasistrati Panchrestos appellata ab omnimoda utilitate, liquida. Habetur autem inter ocularia medicamenta.

Aliud. Aluminis scissi, croci, gallarum, æquis portionibus utere cum uino. Auricularis compositio ad dolores magnos, & pus album. Amygdalas amaras decorticatas, VIII, spumæ nitrī albæ drach, III. thuris drach, III, opij drachmas tres, croci drach, IIII, galbani drach, II, myrrhæ drach, I, aceto trita excipe, & forma pastillos ac utere, si dolor adest, cum rosaceo. Si pure manant, cum uino mulso, aut aceto aut sapa. Si uero auditus grauitas affuerit, cum aceto. Ad diuturnas ulcerationes, Aloës, thuris, myrrhæ, singulorū drach, IIII, misyos drach, II, efforma cum aceto, & utere resolutis cum aceto aut rosaceo.

Ad corruptiones ac foetores aurium.

Cap. LXXXIII

Malicorij & lentis decocto elue uelut prædictum est, & utere subscriptis. Aluminis scissi libram unam, atramenti futoriij drach, VIII, myrrhæ drach, VIII, croci comagmatis drach, VIII, uini dulcis myrtei sextar, III. Alumen cum uino coquito, & ubi ad compagem redactum fuerit, reliqua prius trita cum aceto adijcito, & unitis utitor cum sapa & aceto. Aliud, ad purulentas & graueolentes aures. Vrsi fel instilla, si uero aridum fuerit, cum aceto & sapa diluto utere. Summè enim prodest. Aegyptium pharmacum ad omnes relatas affectiones, etiam si fuerint congenitæ. Amygdalarū amararum drach, II, piperis albi drach, II, fabarum Aegyptiarū internam partem drach, II pondere, croci, myrrhæ, opij, thuris, castorij, singulorū drach, II, omphacij drach, IIII, atramenti futoriij drach, IIII, spumæ nitrī drach, II. Terito cum aceto in quo malicorium coctum est, & excipe ad strigementitiā spissitudinem. Vtus autem tempore quantum satis est de hoc phar maco accipe, & nardino ungento dilutum instilla.

Ad superexcrecentes in aurium ulceribus carnes, Hera-

clidæ Tarentini.

Cap. LXXXIII

Aeruginis drach, VIII, squamæ aris drach, IIII, mellis heminæ dimidium, hoc est dodrantem. Arida trita melle excipe, ac coque ut rubicundum pharmacum euadat, & utere super eminentem locum hoc ponens. Aliud. Aeruginis drachmas quatuor, atramenti futoriij drach, IIII, succi marrubij cyathos tres, mellis quantum satis est, præpara & utere uelut dictum est. Aliud Apollonij Memphitæ. Deprimit omnem superexcrecentē carnem, citra dolorem. Aluminis scissi drach, IIII, misyos usti drach, IIII, aeruginis drach, II, lemnij sigilli drach, II, gummi drach, II, (alij singulorum tot uncias pro drachmis habent.) Terito cum aceto, & formato pastillos, ac utitor cum uino aut aqua. Deprimit & cicatricem inducit. Facit & ad nares exulceratas.

Ad uermes in auribus.

Cap. LXXXV

Vermes in auribus aut generatos, aut extrinsecus illapso, amara & acria in summa occidunt, uelut sunt, capparis foliū aut succus, cedria, urina humana uetus, singula cū melle: aut aristolochiā tritā insuffla: aut calaminthe succū infunde. Aut ueratū album cum uino: aut colocynthidis decoctū, aut centaurij, aut absinthij, aut polij cū uino: aut scordij, aut marrubij succū, aut elaterij cum aceto. Facit & maluæ hortenlis aut syluestris succus: maximè in his quæ sunt inflammate.

Ad sanguinis ex auribus eruptiones.

Cap. LXXXVI

Ad sanguinis ex auribus eruptiones, ut ne in grumos coëat, porri succum &

D 4 acetum

acetum mixta infunde, & sanguinem sistet, & grumos dissoluit. Aut malum punicum in aceto coctum infunde. Aut gallum in aceto coquito & excolato, & rubi succum misceto ac infundito. Aut polygoni succum cum modico aceto, aut acaciam, aut amurcam, aut lycium cum aceto instillato.

De calculis aut alijs corpusculis in aurem illapsis, Cap. LXXXVII

Si calculus, aut faba, aut consimile quid in meatum auris illapsum fuerit, elue. Aut specillum lana obuolutum resina tinge, & extrahe. Aut per glutinosum aliquid quod pharmacum aut dropacem idem facito. Quod si non successerit, sternutatorium naribus inde, & os obtura ac nares. Nam iuxta contingentem spiritus extensionem id quod incidit efflatur. Hoc autem assidue fiat donec exciderit. Si uero intus manserit, auris inflammata conuulsiones inducit. Optime uero eorum quae illapsa sunt eiectionem adiuuat concussio, ita ut si puer fuerit pede teneatur, & cum concussione in caput eleuetur. Si uero perfectae aetatis quispiam ita fuerit affectus, ipsum in tabulam secundum affectam aurem reclinatum, caput ad tabulam firmare iubeto: Deinde leuata tabulae circa caput parte deferri finito, idque sepe repetito. Mouebis enim quod incidit, & ad expeditiores meatus partes progredietur, atque ita angusta & concava specilli parte immissa scite extrahito. Si uero faba aut consimile quid in aurem illapsum, in ea maneat, madefactumque ac tumefactum dolores inducat, impossibile est ipsum integrum eximere. Quare per specilli concavum industriè partiri ac diuidere ipsum oportet, atque sic particulatim extrahere. Deinde sapam aut uinum dulce calidum infundere ac lenire meatum ex lancia tione offensum.

Ad affectiones aurium extra meatum, Cap. LXXXVIII

Foramina in pulpis aurium in pueris inflammata, oleo quod in area lucerna aeruginem contraxit, assidue illine, & sanabis. Ad contusas aut aures, myrrham, mannam thuris, terram nigram, qua quidam pro smegmate utuntur, cum aceto ad cerati spissitudinem unita imposito, & nequaquam amplius irritato. Aliud, Sulphur uiuum, myrrham, thus, cum pice liquida in splenio imposito. Philagrij ad contusas aures, Mannam thuris aut ipsum thus, & aloem, cum uino & rosaceo terito & imposito, his etiam cochleas paruas integras tritas, si haberi possint, addito. Aliud, Intestina terrae cum modica terra ex qua accepta sunt, tere & impone. In quibus uero fractae sunt aures, intrinsecam expeditiorem concavitatem cartilagineam figulina terra expleto, & resiccare finito, ac solanum cum cerusa illinito, donec in integrum restituantur. Si uero inflammatio ad contusionem accesserit, meatui quidem butyrum tepidum, aut adipem anserinum, aut gallinaceum instilla. Aut etiam ocymi succum cum aliquo ex relatis adipe. Forinsecus uero cerusam cum solani, aut polygoni, aut coriandri succo illine. Aut putamen mali punici dulcis in uino coctum ac tritum obline. Aut glaucio utere. Emplastrum autem hoc adhibeto, Sandycis lib. i. olei lib. i. aquae semissem. Coquito simul donec non amplius inquinent, & utere.

De parotidibus.

Cap. LXXXIX

Parotides ex genere sunt inflammationum. Fiunt autem glandulis circa aures affectis. Non tamen utimur in ipsis, uelut in alijs partibus inflammatis, in principio repellentibus. Imò uice uersa attractorijs utimur, assilgentem humorem ex profundo ad cutem attrahere conantes, & naturae opem ferre, quae per humorum ex loco in locum, impetuosum illapsum, febres curat. At uero quum uehementi impetu fluxus illabit, nihil nos curiosius agentes, omnia naturae perimitimus. Si enim aut cucurbitam, aut pharmacum quoddam humores ex profundo ad cutem attrahens adhibuerimus, uehemens dolor hominem occupat, ut

ut ex ipso & uigiliæ succedant, & febres intendantur, ac uires exoluantur. Mitigare igitur tunc potius conuenit, & non humorum influxui opitulari, per cataplasmatum maximè lenientium usum, quæ ad hoc quod moderatè humectata habent caliditatē, per quam mitigare dolores ualent, etiā influentes humores concoquere possunt ac suppurare. Vbi uero suppurati fuerint, discutere ipsos aggre diemur. Si uero duricia cum dolore apparuerit, emollientia ad attractoria misceamus. Proinde ubi uehemens dolor obtinet, & humores adhuc influunt; butyro utemur locum assiduè illinentes, aut adipe fūillo, aut butyrum & adipem simul liquefaciemus, & modica cera adiecta, ut mollius ceratum fiat imponemus. At uero moderatas parotidas, in quibus neque multa copia influit, neque dolor uehemens adest, neque suppuratio expectatur, facile curabimus per formula ex muria, & cataplasmata ac pharmaca discussoria. Quale est Mnasæ emplastrum, & emplastrum ex succis, & his adhuc magis ea quæ molliora sunt & ceratiformia, ex butyro & œsypo parata, quæ assument ostrea usta, aut buccina, aut purpuras. Quale est & hoc. Adipis anserini ueteris insulsi sexuncem; butyri unciam unam ceræ sextantem, ostreorum ustorum tritorum sextantem. Liquabilibus liquatis ostrea insperge, & unitis utere confidenter. est enim efficacissimum hoc. Aliud ualde bonum. Apochymatis sexuncem, picis bessem, ceræ quadrantem, colophonæ sextantem, adipis uitulini sesquiunciam, bituminis sextantem. Reliqua liquato ac excolato. Bitumen uero cum modico aceto terito, & liquata ad ipsum affundito, & emollitis utitor. Quin & in induratis iam ac diuturnis parotidibus, buccina usta & omnia ostrea adipi, ueteri porcino liquato ammixta uelut dictum est, citra omnem molestiam discutiant omnes diuturnas ac induratas inflammationes. Quapropter utendum est in durioribus parotidibus albo emplastro ex buccinis, quod Ariobarzanium appellatur, & eo quod Dionysia appellatur, & ex misy paratur. Describuntur ea in Sermonē de emplastris. Ego uero soleo parotidas puerorum & mulierum solo butyro curare.

De narium affectionibus.

Cap. xc

Ex genere tumorum præter naturam polypi in naribus generantur. E genere uero ulcerum ozænæ. De excretionibus autem præter naturam sunt sanguinis eruptiones. Ozænæ itaq; ex acrium & putredinosorum humorum in fluxu fiunt. Nam si solum acres fuerint, incurabilia ulcera facere solent, non tamen graueolentia. At polypus appellatus, polypi marini carni iuxta essentia proprietate, & colore & cōpage similis, ex crassis & uiscosis humoribus generatur. Ceterum curatio utrisq; cōmunis est, ozænæ & polypo, ut primum caput resiccat ac corroboretur. Manifestum est enim quod uitiosorum humorū redundantia naribus ex capite influit. Quomodo uero caput roborare oportet, iam dictum est. ubi de capitis dolore egimus, ubi diuersa sinigmata & epithemata descripsimus, quæ sine capiti ac toto capiti præparato imponuntur. Verum ad iam præscripta optimè ad ipsos facit emplastrum ex anemona capiti impositum. Itemq; hoc: Myrrhæ unc. i. thuris unc. i. cochleas integras v. ouorum candida ii. Omnia in mortario contrusa ac mixta illinito, linteo capiti superimposito, & finito per dies ix. Atq; ita postea localibus auxilijs utere.

Ozænarum curatio.

Cap. xc i

Postquā itaq; per prædicta caput corroboraui præparaueris, ad nasi curationē procedes, scopum propositū habens in ozēnis, ut affectam partem per pharmaca mixtam uim habentia resicces, repellentia uidelicet ac discussoria. Repellentia igitur

igitur austera & acerba, quæ in communi adstringentia appellantur. Discutunt autem siccam & calidam uim habentia. Archigenes autem ad dolores in naribus & ozænas talia describit. Calaminthæ succum infunde. Aut ipsam siccam tritam insuffla per arundinem. Aut erucæ succum assidue infunde. Aut mel in nasum stillato, & per sternutatorium concussione facta, tectoria ulceri obdusa excutito. Deinde ueratrum album cum multo nasturtij semine naribus attrahere iubeto, & postea amurcam cum melle illinito. Aut ranunculi succum cum alumine liquido in nasum instillato, & attrahere iubeto, atq; hoc facito donec perfanaueris. Si uero antiqua fuerit affectio, etiam acetum acerrimum ammisceto. Meatus autem nasi ex hoc illinito. Spicamnardi & misy, æquis portionibus trita cum uino austero ad strigmentitiam spissitudinem illine, & lana obtura. Optime uero facit ad ozænas atramentum sutorium melle cocto exceptum, & chalcitis eodem modo, & ærugo, & squama aris, & floridum medicamentum ori destinatum. Ethoc, chalcitidis crudæ drach. xii. cadmiæ drach. viii. terito cum aceto ad multos dies sub caniculæ feruore, & exsiccatum utere cum uino ipsum diluens, aut siccum insufflans. Aliud. Mysios, chalcitidis, myrrhæ, singulorum drach. iiii. atramenti sutorij drach. iiii. aluminis scissi, gallarum, squamæ aris, singulorum drach. iiii. aluminis rotundi drach. ii. thuris drach. i. acetilib. i. Omnia trita simul coquito in æneo uase, & ubi ad mellis compagem redacta fuerint ablatis utere, linamento intincto & naribus penitissime indito. Siccus puluillus ad ozænas. Fructus ericæ, myrrhæ, nistri, malicorij, singulorum drach. iiii. croci, costi, singulorum drach. ii. trita insuffla. Alius. Aluminis scissi, myrrhæ, singulorum drach. iiii. sandarachæ, rhois culinarij, salis ammoniaci, croci, costi singulorum drach. ii. trita insuffla, naribus prius uino mulso collutis. Aliud Theodori ad graueolentiam narium. Amomi, myrrhæ, casia, rosarum siccarum, æquales partes tritas cum ungento nardino dilue ac utere. Aliud. Myrrhæ, casia, rosarum, singulorum æquales portiones contusas ac cribratas melle excipe, & mane ac uesperis illine donec malum cesset. Aliud. Hedychroo cum uino mulso trito utere. Aliud, lucundum appellatum, Myrrhæ drach. iiii. casia drach. iiii. floris iunci odorati drach. iiii. rosarum siccarum drach. i. terito cum uino mulso ueteri, reponito ac utitor illinens ex eo nares. Aliud. Cyperi quadrantem, sandarachæ, aluminis scissi, myrrhæ, croci, singulorum unc. i. aridum insuffla. Aliud Apollonij ad polypos. Veratrum & origanum trita insuffla. Aliud. Veratrum nigrum & sandaracham, æquis portionibus cum oleo terito, & lana excepta naribus indito. Aliud. Atramentum sutorium, æruginem, laser, æquis portionibus, cum oleo illine naribus per specillum lana obuolutum, ad dies nouem. Deinde uolsella trahe ac exime. Aliud ad ozænas quo assidue utor. Ad pastillum Musæ adijce chalcitidis drach. vi. aliquando etiam xii. & ueratri albi drach. ii. Vtereq; cum uino mulso. Aliud. Auripigmentum tritum per specillum large admove. Vbi uero intumuerit & eminuerit, ueratro nigro arido trito moderato utere, & in septem diebus ut plurimum nasus uetus cuius redditur. Deinde diphryge trito cum melle expurga. Aut auripigmentum, calcem, & ueratrum album trita cum melle adhibe. Aliud celebre. Myrrhæ drach. iiii. chalcitidis drach. iiii. casia drach. iiii. spicæ nardi drach. ii. mysios drach. ii. ueratri albi drach. i. Vtere sicco, & cum uino mulso. Aliud bonum. Mysios torrefacti drach. vii. iridis drach. iiii. croci drach. i. excipe melle ac illine. Aliud. Aluminis scissi unc. i. myrrhæ unc. i. thuris sesquiunciâ, muscij herbe quæ

quæ & dorcadias appellatur drach. IIII, æruginis drach. II, salis ammoniaci scrup. IIII, terebinthinæ unc. I, mellis trientem, aceti quantum satis est. Aliud, facit & ad polypos, Aëris usti, squamæ ferri stomomatis, aluminis scissi, singul. unc. I, myrrhæ unc. I, thuris sesquunciam, aristolochiæ, uerbenacæ rectæ, squamæ æris, æruginis, singulorum unc. I, aut omnium æquas portiones, adhibe aliquando uino diluta, & per linamentum inde. Aliquando uero cum cōpositione ex moris, aliquando cum melle. Aliquando etiam siccum insuffla, aquam in ore continere iubens. Aliud cuius uilitatem ne contempseris. Centaurij tenuis usti, polij usti, chamaemali usti, singulorum drach. VII, æruginis, squamæ æris ustæ, radicis cyclamini siccæ, myrrhæ, aloës, malicorij, singulorum drach. IIII, tritis utere prout uoles. Aliud ad ozænas, & erosiones, & nomas, & crassitudinem, & omnia narium uitia: Succus foliorum uitis albæ quadrantem, mannæ thuris, atramenti futorij, chalcitidis, aristolochiæ, singulorū drach. III, terito & siccato ac insufflato. Pastillus ad ozænas Cyri Archiatri Edeffæ. Cadmiæ ter ustæ ac uino extinctæ, plumbaginis, plumbi usti, spumæ argenti, spicæ nardi, thuris, foliorum cupressi, herbæ sabinae, gallarū, Lycij indici, gummi, singulorum drach. IIII, ceruise, glaucij, folij, balauftiorum, floris iunci odorati, malicorij, aloës, acaciæ, singulorum scrup. VII, florum rosarum & foliorum, singulorum scrup. VI, contusa & cribrata terito cum aceto, & formato pastillos, ac utere cum uino, aut sapa.

Polyporum curatio.

Cap. XCII

Iam antea dictū est quod ex crassis ac uiscosis humoribus polypus generatur, & propterea mixta materia opus habet, adstringente & secante, & discutiente, ac siccante. Quorum sylua talis est. Aluminis scissi, myrrhæ, sandarachæ, singulorum drach. IIII, atramenti futorij usti drach. I, gallarū drach. I, tritis utere, ubi prius nares uino odorato elueris, ita ut postea per specilli nucleū illinas. Vtere etiam his quæ ad ozænas præscripta sunt. Aliud. Soreos drach. II, chalcitidis tostæ drach. II, fructus myricæ drach. I, croci drach. I, myrrhæ drach. I, trita insufflata uelut dictum est. Aliud. Chalcitidis tostæ drach. II, misyos drach. II, atramenti futorij usti drach. II, amomi drach. II, myrrhæ drach. IIII, croci drach. I, terito & utitor siccis. Aliud mirabile. Soreos quadrantem, aluminis scissi quadrantem, gallarum sextantem, myrrhæ sextantem, utere sicco. Aliud ad polypos, ozænas, ægilopas, & quæ citra sectionem ac uisionem remouere uoles. Disparat etiam ossa corrupta. Ramentorum æris rubri unc. I, salis ammoniaci sextantem, aluminis rotundi quadrantem, aceti acerrimi heminas. VI. Arida trita adiecto aceto æris rubri uase excipe, & ad solem expone ac paulo reconde. Vfus autem tempore aquam in ore teneri iube, & per arundinem naribus insuffla. Ad polypos & ozænas. Sinapi tritum aqua misceato, ac subigito, & collyria glandiformia formato. Deinde gracile linteolum sinapi obducito, quo ipsum extrahere possis ubi uoles, & naribus indito, principio linteus foris relicto, & totam diem finito, & excidet polypus. Aliud ad polypos & ozænas ac superexcrecentem carnem. Aluminis scissi scrup. IX, aluminis rotundi scrup. VI, atramenti futorij scrup. VI, chalcitidis scrup. XVIII, myrrhæ scrup. XII, squamæ æris scrup. IX, thuris scrup. IIII, gallarum scrup. XII, contusa cribrata terito cum aceto uelut collyrium, & formato pastillos. Vfu uero postulante, quantum satis est cum melle contere, & linamentum, intinge, ac naribus inde, & ad diem unam sine. Altera uero extrahere, & sequetur polypus, quod plerumque fieri solet. Aliud Orbasij.

Squa

Squamæ æris drach. viii. sandarachæ drach. iiii. æris drach. vi. ueratri nigri drach. ii. Siccum hoc insufflato, & uelut optimo uitior. Nam in diebus decem manifestam utilitatem declarat. Nechepfos rex ad carnem in naribus enatam, Squamam æris, & squamam ferri, ac alumen scissum, æquis portionibus terito ac insufflato, aut per specillum adhibeto, aut in linamento uitior. Asclepiadæ ad polypos. Atramenti sutorij drach. i. diphrygis usti drach. ii. calcis uiuæ drach. ii. sandarachæ drach. ii. sicca adhibe. Aut linamentum intortum aqua ma defactum ac pharmaco imbutum inde. Aliud quo Antipater usus est. Atramenti sutorij, sandarachæ, æquales partes tritas insuffla, & per specillum admo ue. Aliud. Atramenti sutorij usti drach. iiii. rubicæ sinopicæ drach. i. trita insuffla. Naturale Apollonij ad polypos. Nycticoracem iugulato, & calido ipsius sanguine polypum illinito: Reliquum uero in sole siccato ac reponito, & ad ozæ aridum tritum inspergito. Aliud eiusdem ad exulceratos polypos, & ad ozæ nas. Dracunculi radicem aridam tritam insperge, facit & succus ipsius illitus. Aut cupressi folia, aut pilulæ ficus carne exceptæ. Facit & saluia imposita. Et aser cum atramenti sutorij, aut æruginis pari portione. Galenus autem ad polypos inquit & ozænas comperit egregie facere subscripta. Primum quidem id quod ex malis punicis paratur. Sint autem æquali numero ac magnitudine ex tribus generibus accepta, de austeris, de dulcibus, & de acidis. Oportet autem ipsa recentia matura contundere, ipsaq; tota confringere exacte, quo succus ex ipsis exprimi possit. Quem modice coctum reponimus in stanneo uase. Quod uero restat solidum & crassum, diligenter in mortario tundito, & ualde bene in pila terito, ac collyria formato, oblonga, & crassitudine & longitudine differetia, eaq; siccato. Et usus tempore congruum ex his collyrium in nasi meatum inde, in quo polypus existit. Nam citra mordacitatem & consensum tollit polypum longiori tempore. Si uero humidior & mollior polypus tibi uideatur, amplius accipies de austeris punicis malis: Si uero durior, de acidis. Quandoquidem autem molestum est semper collyrium ferre, conuenit ab eius usu interquiescere, & interim dum collyrium non adhibetur, succo expresso uti, & ex ipso inter nas oris partes illinere, hiante agro, eo maxime loco quo nasus ad palatum perforatus est, atq; hoc per pennam, aut lanam specillo obuolutam. Cæterum ex siccis pharmacis noui aliquando diphryge polypum consumptum. Conuenit in ipsis quoq; prædictum collyrium ex malis punicis siccum, leuissime tritum ac insufflato. Aut per specilli nucleum naribus inditum. Omnia autem hæc aliter due facere oportet, ut nunquam desit medicamentum loco affecto. Facile enim ab influente humiditate eluitur. Philagrii. At in eunuchis & molle corpus habentibus, & propterea nullam mordacitatem ferentibus, rosas siccas leuissime tritas adhibe. mirifice enim prosunt mollibus & humidis corporibus. Nam pleraque quæ efficaciter polypos eximunt, exacerbant quodam modo ubi seorsum non contigerint. At uero in diuite quodam qui odoratum pharmacum expetebat ad ozæ curationem, pastillo hedychroo usus sum, subegitq; ipsum cum uino ueteri odorato. Et mirum est quam breui affectio curata est. Relata est autem huius præparatio in theriacis descriptione.

Ad ulcera in naribus.

Ulcera in meatibus nasi simpliciora semper curauim per pastillos Andronij, & Pasionis, & Polydæ, & Musæ, & Bithynum appellatum, aliquando uino dulci ipsos exoluens, aliquando austero. Et quandoq; per acetum uinosum aut acre, ita ut ab affectionum symptomatis, pharmacorum usum inueniamus. Archigeni

Cap. xciiii

genes autem pinguibus emplastris eiusmodi ad ipsa usus est. Plumbi recremen-
tum tritum, cum uino ueteri ac myrteo oleo, æquis partibus in fictili uase coqui-
to ad prunas, semperq̃ agitato. Et ubi strigmentosum factum fuerit, pharma-
cum, ablatum in pyxide plumbea seruato. Oribasij ad narium ulcera. Spu-
mæ argenti drach. vi. cerusæ drach. vi. plumbi usti & loti drach. iiii. myrrhæ,
aloës, singulorum drach. i. gallarum drach. i. uino & myrteo oleo dilutis utere.
Facit etiam ad sedis uitia. Aliud Oribasij. Atramenti futorij drach. vii. alu-
minis scissi drach. vi. gallarum drach. iiii. malicorij drach. iiii. Ex uino aut aceto
terito. Aliud eiusdem, ad simpliciora in meatibus nasi ulcera. Spumæ argenti
drach. vi. cerusæ drach. vii. malicorij drach. iiii. aluminis scissi drach. iiii. teria-
to cum uino & affuso oleo myrteo, in plumbeo uase seruato ac utitor. Optime
faciunt ad eadem: Asteris collyria, & Libiana appellata, & præsertim Cleonis ac
similia, cum uino & oleo myrteo diluta.

Ad sanguinis è naribus eruptionem.

Cap. xciiii

Sanguinis è naribus eruptionem sistit foliorum urticæ succus per linamen-
tum inditus. Et ipsa folia trita fronti imposita. Item chalcitis arida trita linamen-
to excepta ac indita. Oportet autem linamentum lucernarium frigida aqua tin-
ctum in chalcitide obuoluere. Sistit & lysimachij herbæ succus, & anthyllidis.
Et ferulæ pars lanuginosa cum aceto indita. Thus cum polygoni aut porri suc-
co, alinini stercoris recentis succus, cum porri succo, & aceto per linamentum
inditus. Aut stercus idem ustum insuffla. Aut spongiam nouam pice liquida im-
butam inde. Aut hippureos succum, aut ipsam herbam tritam inde, & fronti
imponere. Aut saluæ folia trita adhibere. Aut ouorum testas urito ac terito, & de
his duas partes sumito, & de galla omphacitide partem unam, & linamēto aqua
aut aceto tincto excepta indito. Frontem uero bulbis tritis cū porri succo aut
aceto integito. Aut gypsum oui candido subactum fronti ac naribus imponis-
to. Magis autem facit lapis specularis translucidus cum aceto. Aliud. Co-
chlearum carnes cum aceto tritas adhibeto. Aut cochleas uistas ac tritas, fronti
ac naso cum aceto imposito. Apollonius autem inquit, cochlearum carnes
cum thure tritas naribus indito, & sanguis sistetur. Iisdem etiam frontem inte-
ge. Aut siccum ex anemona pharmacum emplastri forma fronti impone. Aut
emplastrum ex salicibus. Optimum autem est hoc, ex cuius usu sæpe laudem
assequutus sum. Lapidem molarem feruefactum ac ignitum acerrimo aceto
extingue, & uaporem naribus admove, ac sistetur. Commodum est & per spon-
gias frontem frigefacere, & caput in sublime leuare, & manuum iuncturas in-
guinæq̃ ac genua deligare. Apollonius porrò ait, pedis è directo naris unde
sanguis erumpit, magnum digitum ligato, & multum ac ægrè sisti se sinentem
sanguinis lationem sedabis. Commodum est etiam cera aurea obstruere, & in ore
aquam pluuiam frigidam continere. Sed & cucurbitam occipiti affige cum sca-
rificatione. Et circa uiscera magnam cucurbitam adhibe, si dextra pars sanguine
manarit ad hepar: si sinistra, ad splenem. Aliquando etiam uenam secare co-
gimur. Summe uero facit hoc. Rhoidarij & ochræ æquales partes cum aceto
in oppositam nari aurem instilla. Nimirum si dexter nasi meatus sanguinem fun-
dit, in sinistram aurem: si sinister, in dextram. Sed & quæ ad sanguinē spūens
res describentur potanda præbe.

Quomodo sanguis è naribus eliciatur.

Cap. xc v

Mentam tritam melle exceptam ad collyrij formam redige, ac naribus inde.
Aut rubiæ radicem leuissime tritam oleo subige, & naribus penitissime illine.

E Aut

Aut graminis florem, aut summam eius asperiores partem naribus inde, & ob torque donec sanguis erumpat.

De narium obturatione, & odoratus oblatione, Ga-

leni.

Cap. xcvi

Oculis & linguae ac uniuerso corpori sensum ac motum suppeditat cerebri per nervos. Verum odoratus sensus intra caluariam est in anterioribus cerebri uentriculis uaporosum quendam spiritum habentibus. Caterum necessarium est prius nosse quomodo nasus constructus est, & quae corpora meatibus ipsius cohaerent. Quum itaque nasus habeat medium interseptum, & duos memorabiles meatus, qui sane apparent, unus in singulis naribus, nosse oportet supra nasi partes utrumque ipsorum dextrum ac sinistrum bifariam findi. Et altera quidem pars ad internam oris partem circa palatum uergit: Altera uero recta uelut ab initio ferebatur, ad ipsum cerebrum ascendit. Sunt autem in cerebro duae paginae oblongae ac cauae, principium quidem ex anterioribus uentriculis habentes, progredientes autem ad illam caluariam partem, unde nasus initium habet. Iuxta hanc uero partem etiam ossa coliformia sita sunt, per quae inspiratio & expiratio iuxta cerebrum contingit, & superfluitates in ipso expurgantur. Sed & crassa cerebri membrana, qua parte coliformia ossa contingit, tenuibus cauernis perforata est. Et per hanc sane primam excolantur crassiores cerebri superfluitates, quas mukum appellamus. Et haec deferuntur, primum quidem ipsam membranam penetrant, postea uero per coliformia ossa excolatur, atque sic in nasi meatus incidunt. At in transgressu per hos meatus, aliquando pars aliqua ex his quae deferuntur, praeterfluit in os, per praedicta foramina ex naso in palatum, & praesertim ubi fuerit mucus ille uiscosus ac crassus. Reliquum autem quod defertur, per nares euacuatur. Adiuvamus autem excretionem per os ex palato, per screatum. Excretionem autem ex naso, per uiolentioris efflationis ac sternutatoriorum usum. Respirationis equidem ac olfactus gratia facta sunt foramina cerebri in nares. Utitur autem ipsis natura ad recrementorum cerebri purificationem. Proinde odoratus laesio non in meatibus nasi est. Sed aut anterioribus cerebri uentriculis ad intemperiem perductis, aut meatibus in ossibus colatorijs obturatis, mucosae ac destillatione ut plurimum praegressis, aut his partibus perfractionis uel humectatis. Nam & aer qui palam per inspirationes attrahitur, tum nares aliquando perfrigerat, tum uicinas ac contiguas partes, & hoc maxime ubi ambiens nos aer frigidus factus est. Archigenis. Primum igitur conuenit eos qui olfaciendi facultatem laesam habent, aut colatorios meatus obturatos, in siccioribus locis diuersari, quales maxime sunt maritimi, & gymnasijs pro uirijs uti, itemque unctionibus singulis diebus, ita ut erectum habeant collum, & per alios confricentur. Caput quoque pectine perfricare oportet, & nitro detergere in balneo, & aqua marina calida abluere, ac caput perfundere, marina caelida affusa. Deinde etiam aquae frigidae modice immergere in egressu. Optimus est & in marina aqua assidue natari. Utendum est & medicamentis quae narium bus indita caput purgant. Caterum tota uictus ratio attenuatoria sit facultatis. Quare etiam acrium rerum esus ex interuallis adhibeatur. Domus in qua degunt moderate calida sit, pro temporis anni ratione. Somnus diuturnus incommodus est ipsis. Dum autem dormiunt, cervicalia sublimia habeant, & in latum reclinantur, & non secundum affectam partem, uelut si contingat unum ex colatorijs meatibus esse obturatum. Quotidiana itaque uictus ratio talis sit. Claro autem instante aere, primum uentrem expurgare tenta, per Archigenis ex colatorijs locum

locynthide hieram. Deinde hirudines sublimiori nasi parti adhibe, & multum sanguinem trahere sine. Post tertium autem diem, splenio ab intermedio superiorum usque ad malam, obturatam nasi partem intege, sit autem factum ex emplastris discussoriam uim habentibus. Quale est melinum Serapionis, & emplastrum Icesij, & nigrum Archigenis, & quod ex tithymali succo paratur, & quod ex scilla, ac conlimilia. Horum autem usus non fiat infra quindecim dies. Post hæc picra ex aloë assidue uenter subducatur. Commodus est enim frequentior ipsius usus. Postea pituitam per os ducentibus utendum est, ex staphide syluestri ac mastiche. Postquam autem sufficiens euacuatio per os facta est, emplastro ex agarico, aut ex canchry, aut malagmate ex baccis lauri, aut aliquo consimili nasus integatur, & frons usque cutis rubificationem. Solent enim talia mucosam humiditatem per cutem attrahere. Postea uero sternutatorio utendum est, primum simpliciore, deinde efficaciore, quale est ueratrum album leuissimè tritum. Tertia deinde aut quarta die à sternutatorij usu, radendum est caput, & sinapisimus adhibendus usque ad frontem. Deinde lauentur. Et post multos rursus dies, si opus fuerit, rursus caput per naribusorium instrumentum purgetur. Sit autem efficax medicamentum quod adhibetur. Quale est elaterium cum lacte, aut cyclamini succus. Aut ipsam cyclaminum siccam tritam insuffla. Aut cum cumeris syluestris radicem. Aut nigellam tusam ac cribratam, & oleo uetustissimo addito probè tritam, per nares infunde, & pharmacum per respirationem uehementius attrahere iube. Aquam autem ægro in ore tenendam exhibe. Hoc ego usus sum in quodam adolescente, qui ex muco ac destillatione diuturna olfactus sensum læsum habuit, & ubi consequenter per triduum hoc auxilio usus esset, magnopere auxilium percipiebat. Quarta uero die attracto uehementius per inspirationem pharmaco, fortem mordacitatem in profundo capitis sentiebat, & quum hæc paulatim imminueretur, postera die penitus cōualuit. Utiliter etiam nigella assumitur cum aceto. Conuenit autem post horum usum, post triduum uidelicet, sinapisimum fronti adhibere, facieiq; ac naso, & postea lauare. Sed & odora menta assidue adhibeantur odorata hæc. Narcissus, sisymbrium, serpillum, lilij folia, uiolæ, menta, polium, ruta syluestris, & thymbra. Omnium uero utilissimum est castorium aceto dilutum. Quin & potum castorium tritum cum aqua mulsæ cyathis tribus, præ multis auxilijs proderit. Efficacius autem reddiatur, aceti scillitici cyatho dimidio addito. At uero acetum scillinum quotidie à ieiunio trium cochleariorum mensura acceptum, utilissimum ipsis existit. Cæterum post has omnes lancinationes, si adhuc affectio aliquo auxilio opus habet, adhibendus est etiam à raphanis uomitus, ita ut ipsi concisi aceto mulso aut garo madescant. Sequenti uero à uomitu die, æger absinthij decoctum bibat, aut pulegij. Et post hoc imponendum est naso emplastrum ex scilla, cuius experientiam feci, relinquendumq; aliquo tempore ut uaros in loco excitet, & strigamentosam humiditatem extrahat. Habetur autem hoc emplastrum in Sermone de emplastris tractatu. Atq; hæc omnia etiam bis ac ter & sæpius adhibenda sunt, ad pertinaciores affectiones.

De sternutatorijs. Hippocratis.

Cap. XCVII

Sternutatio fit calefacto cerebro, aut humectato eo quod in capite uacuum est. Aër itaq; intus existens erumpit, sonitus autem fit, quoniam per uacuum & angustum spiritus transit. Consideremus autem quomodo sternutationes capitis grauitatem sanant. Fiunt equidem sternutationes, maximis inspirationibus prægressis, & efflatione celerrimè sequente. Appello autem efflationem, acera-

E 2 uatam

uatam expirationem. Habet enim cerebrum duas has facultates, per quarum alteram superfluitates in anterioribus uentriculis excernit ad seipsum cōtractas. Per alteram uero alas nasi expandit, & spiritum attrahit. Quum itaque à spiritu grauat, tunc ipsum excernit per contractionem sui. Si uero obturatis in naribus uis, impeditur excernere grauantem spiritum, aut mucum. Tunc uiolento motu ad sternutationem procedit, depellere conans ea quæ meatus obturant. Vnde sternutationes capitis grauitatem, uelut dictum est sanant. Imò etiam affectiones quasdam circa cerebrum consistentes. Quales maximè sunt, lethargus, & profundi sopores, ac consimiles. Tales enim per sternutatoria maximè curantur. Sed & ad solem respicientes ad sternutationem irritamur, diffusis uelut atrior à caliditate crassis cerebri spiritibus. Extrudunt autem sternutationes etiam mucos ex cerebro crassos ac uiscosos, per uehementem spiritus impetum, etiam hos foras cōiicientes. Porro sternutationem mouet, ueratrum album, herba lanaria, piper, castorium, cyclaminum, euphorbium, nitrum, herba ptarmica, hoc est, sternutatoria appellata, cuminum, singula seorsim ac simul leuissimè trita & admota. Non autem hæc insufflare oportet, sed motam pyxidem naribus admo- uere, aut per specilli nucleum naribus penitissimè indere. Et simplicia quidem sunt hæc. Sunt & composita ex ipsis adeò confata, quale est hoc: Sternutatorium Heraclidæ Tarentini. Cumini Aethiopici, piperis, herba lanaria, castorij, singulorum æquas portiones, contusas ac cribratas in aream pyxidem reponere. Vfus autem tempore agitatam pyxidem aperiri & naribus adhibere. Aut per specillum penitissimè inde. Aliud, Piperis, ueratri albi, herba lanaria, euphorbij, castorij, succi cyclamini sicci, æquis partibus utere uelut dictum est. Aliud ad diuturnos capitis dolores, uertiginem, capitis grauitatem, & comitalem. Veratri albi drach, IIII, nitri rubri, herba lanaria, castorij, piperis, singulorum drachmā unam, utere uelut dictum est.

Ad sedandas redundantes sternutationes.

Cap. XVIII

Redundantes sternutationes sedant ea quæ etiam grauedinem sanant, oleum rosaceum naribus infusum, & oleum dulce, & unguentum nardinum. Olfactum uero sedant sternutationem, anisum, ocymi festuca sicca, tusa, nigella sicca trita. Aut thymū fermento oblitum, & cinere obrutū, & ubi tostus est, tritum adhibere. Singula uero hæc raro linteolo illigata olfacienda dato. Sedat sternutationes & grauedinem, etiam myrrha per se, uel cum thure & uino odorato trita, illitis hinc naribus. Facit & menta, & hedychroon, & cyphi. Sed & aqua tepida fronti aspersa sternutationes sedat. Quin & si ab utraq; nasi parte, iuxta magnos oculorum angulos uenas sitas digitis compresseris, sternutationem sedabis. Atque

10 Apollonius naturale auxilium prodit ad hoc, ut pueri non sternutent.

Ciconia inquit, pennæ in domo habeantur, & impossibile est ut sternutent.

SEXTI SERMONIS AETII FINIS.

INDEX EORVM QVAE IN SEPTIMO AE-
tij Sermone habentur.

- D**Enatura oculorum. Cap. i
Quot & quæ affectiones circa sin-
gulas oculi partes fiunt. Cap. ij
Perturbationis oculorum curatio. Ca-
put iij
Inflammationis oculorū superficialis
curatio. Cap. iij
De inflammatione ob plenitudinē, &
de chemosi oculorum. Cap. v
De balneis. Cap. vi
De uini potu. Cap. vii
De uenæ sectione. Cap. viij
De purgatione. Cap. ix
De fomento. Cap. x
De frigida oculorū intemperie. Cap. xi
De oculorum inflatione. Cap. xij
De tumore oculorum. Cap. xij
De tumore indurato. Cap. xiiij
Vlcerum in oculis communis curatio.
Cap. xv
De illabentibus in oculum animalculis
aut paleis, aut arena. Cap. xvi
De calce uiua in oculū illapsa. Cap. xvij
De ulcerationibus ab igne. Cap. xvij
De his quæ oculo infiguntur. Cap. xix
De fugillatione. Cap. xx
De puncturis oculorum. Cap. xxi
De uulneribus profundioribus. Cap. xxiij
De ouiformis humoris excretionē. Ca-
put xxiij
De oculi prolapsu. Cap. xxiiij
De ulcerationibus superficialib. ex hu-
morum influxu obortis, nubecula, ca-
ligine, epicaumate, encaumate. Ca-
put xxv
De argemo. Cap. xxvi
De fossulis, & concavis ulcerum gene-
ribus. Cap. xxvij
De supputatione aut ungue. Cap. xxviij
De pustulis. Cap. xxix
De carbunculis in palpebris. Cap. xxx
De canceratis oculorū ulcerib. Cap. xxxi
De malignis oculorū ulcerib. Cap. xxxij
De myocephalis. Cap. xxxiiij
De staphylomatib. Cap. xxxiiij
Staphylomatum chirurgia. Cap. xxxv
De ulceribus cicatrice indigentibus.
Cap. xxxvi
De cicatricibus & albuginibus. Ca-
put xxxvij
Materia attenuans cicatrices & albugi-
nes. Cap. xxxviij
Auxilia ad cicatrices & albugines. Ca-
put xxxix
Albuginum tinctura. Cap. xl
Ad glaucos oculos ut nigra habeant
pupillas. Cap. xli
De puerorum curatione. Cap. xliij
De aspritudinibus, ac densitatibus, sy-
cosiq. ac callis. Cap. xliij
De oculorum debilitate. Cap. xliij
De myopia. Cap. xlv
De nyctalope. Cap. xlvi
De hebetudine oculorum. Cap. xlviij
De obfuscatione oculorum. Cap. xlvij
De resolutione oculorum. Cap. xlix
De glaucedine. Cap. li
De suffusione. Cap. li
De mydryasi, hoc est, pupillæ dilata-
tione. Cap. liij
De tabe pupillæ. Cap. liij
De macie oculi. Cap. liij
De expressione oculorum. Cap. lv
De confusione. Cap. lvi
De his quæ in albo oculi nascunt. Cap. lviij
De pterygijs. Cap. lviij
Pharmaca ad pterygiā. Cap. lix
Chirurgia pterygiorum. Cap. lx
De carnis in angulo magno incremen-
to. Cap. lxi
Chirurgia incrementi carnis in angu-
lo. Cap. lxij
De sanguinis ex angulis eruptione.
Cap. lxiiij
De concretionē palpebrarum ac cōtra-
ctione. Cap. lxiiij
De pediculis palpebrarum. Cap. lxv
De pilis pungentibus palpebrarū, & de
duplici pilorū ordine, itemq. multipli-
ci quā phalangosam uocāt. Cap. lxvi
E 3 Phars

- Pharmaca ut euulsi pili non renascantur. Cap. lxxvj
 Agglutinatoria pilorum. Cap. lxxvij
 De futura palpebrarum sursum uersus. Cap. lxxix
 De futura palpebrarum deorsum uersus. Cap. lxx
 De euerfione palpebræ. Cap. lxxi
 Chirurgia euerfionis palpebrarum. Cap. lxxij
 De lagophthalmis. Cap. lxxiij
 De lippitudine dura. Cap. lxxiij
 De lippitudine sicca. Cap. lxxv
 De lippitudine scabra. Cap. lxxvi
 Curatio lippitudinis dura, sicce, scabre. Cap. lxxvij
 De defluuiō pilorum palpebrarū, quod uitium & madarosis, & ptilosis, & milphosis à Græcis appellatur. Cap. lxxvij
 De abscessu in palpebris. Cap. lxxix
 De calculo palpebrarum. Cap. lxxx
 De grandine oculi. Cap. lxxxi
 De ordeolo siue preputiola. Cap. lxxxiij
 De ganglijs, atheromatis, steatomatis, & meliceridib. palpebrarū. C. lxxxiiij
 De uaricibus palpebrarum & malignis agnatis eminentijs. Cap. lxxxiiij
 De ægilope. Cap. lxxxv
 De uisione ægilopis. Cap. lxxxvi
 De anchilope. Cap. lxxxvij
 De carnis in angulo magno decremen-
 to. Cap. lxxxvij
 De his qui tempora inurunt. C. lxxxix
 De arteriarum sectione. Cap. xc
- De caluariæ circūcisione. Cap. xci
 De frontis per submissum scalpellū excoriatione. Cap. xcij
 De uasorum sectione. Cap. xcij
 De musculorum temporum cataplas-
 matis, agglutinatorijs, ac illitionibus. Cap. xciiij
 Totius capitis illitiones. Cap. xcvi
 Cataplasmata oculorum lippientium. Cap. xcvi
 Illitiones oculorum. Cap. xcviij
 De aridis collyrijs. Cap. xcviij
 De liquidis collyrijs. Cap. xcix
 Collyria ex croco, & ex succis diuersa. Cap. c
 Collyria unius diei, monohemera ap-
 pellata. Cap. ci
 De collyrijs sistentibus. Cap. cij
 De lenibus collyrijs. Cap. cij
 De lenibus & albis collyrijs. Cap. cij
 Collyria libyana, & tephra, ac spodiaca. Cap. cv
 Collyria ex thure. Cap. cvi
 Collyrium Cleonis. Cap. cvi
 Collyria ex rosis uiridia ac alba. Cap. cvi
 Collyria diasmyrna, & chiacia appella-
 ta ex uino. Cap. cix
 Collyria ad aspretudines, & extersoria. Cap. cx
 Collyria enstaeta, hoc est, instillatitia
 appellata. Cap. cxij
 Collyria ex cornu ceruino. Cap. cxij
 Collyria Nardina & Theodotia. Cap. cxij

AETII MEDICI GRAECI CONTRA 331

CTAE EX VETERIBVS MEDICINAE, TETRABIBLI,

SIVE QVATERNIONIS SECVNDI, SER-
mo Tertius, & ex ordine Septimus,

De morbis oculorum.

DE NATVRA OCVLORVM.

Cap. I



VRATIO circa oculos uaria est & diuersa. Nam & ipsa parti-
cula, oculus inquam, non simplex est, sed compositionem sorti-
tus est ad suam essentiam constituendā, tunicis nimirum & hu-
moribus, insuperq; palpebris ornatus. Natura enim nervos a
cerebro ad oculorum regiones descendentes, uisuiuos uidelicet,
& partem duarum membranarū cerebrū complectentiū, quae
cum ipsis nervis excurrit, augens & uelut dilatans, tunicis oculorū originem es-
sentiae largita est, ut quae omniū intimam tunicam retiformem appellatā, ex ner-
uo uisuiuo construxit. Aciniformē uero tunicam huic praepositā, ex tenui mem-
brana produxit. Similis est enim acino uug, & figura, & colore, & rotundiore fo-
ramine perforata est iuxta pupillā. At uero tunica quae ambabus his forinsecus
praetenditur corniformis uocata, ex crassa membrana originē habet. Quae uero
his omnibus foris obducta est, alba illa quam agnatā appellamus, ex pellicula fo-
rinsecus ossi capitis circūsitā, quae circumossalis & circūcalualis appellatur gene-
tionem habet, ex propaginibus corporū oculo circundatorū. Ceterū humores
in oculo tres sunt: Intimus omniū est qui in cauitate retiformis tunicae continet,
uitriformis dictus: similis est enim & colore, & substantia uitro fuso. Exterius autē
ab hoc situs est ad finem retiformis tunicae, humor glacialis siue crystallinus, qui
etiam discoformis & lentiformis appellatur: similis est enim colore quidē glaciei,
figura uero lenti, aut disco. Forinsecus autē circumfusus est, ouatus siue ouiformis
humor: similis est em colore & substantia, humori albo ac tenui in ouis. Omniū
igitur intimus humor uitriformis, ad hoc ut glaciale alat cōstructus est, qui uero fo-
rinsecus ipsi circumfusus est ouiformis, ad hoc ut hunc humectet factus est, & ad
hoc ut ipsum a solis splendore iniuria affici nō permittat. Palpebras porro cōsti-
tuit tunica agnata: ex his autē singula ē naturali statu emota, oculū egrotare faciūt.

Quot & quae affectiones circa singulas oculi partes fiunt. Cap. II
Quae propriē dicuntur lippitudines, & chemoses, & perturbationes, & tumo-
res, & suffusiones ex plaga, & prerygia, affectiones sunt tunicae agnatae. Eadem
etiam ulceratur, & carbunculo infestatur, & cancerosam affectionem habet. At
lippitudo dura & lippitudo sicca, cōmunes affectiones sunt palpebrarū. & ipsius
oculi. Ceterum circa externā palpebrarū superficiē, pustulae aquosae, melicerides
& steatomata. Verū ex his quae circa internā palpebrarū consistunt, est densitas,
aspretudines, sycoses, grandines, calculi, concretio, conclusio. Et lagophthalmi
appellatur, quibus superna palpebra reuulsa est, ut oculum cōtegere non possit.
Ectropij uero quibus inferna palpebra euersa est. Sed & mutilationes & cora-
rosiones & ulcerationes in palpebris cōsistunt. Circa palpebrae uero extremita-
tem fit trichiasis. hoc est, pili pungentes, & defluuiū pilorum, quod madarosis &
pilosis dicitur. Fit & morbus pedicularis, ac porrigo, & paruus instar ordeī ab-
scessus. Sed & Milphosis, id est, pilorum nuditas, affectio est extremitatis pala-
pebrae. Rubicunda enim his est palpebrae ala, colore milium, hoc est, minium

E 4 reficiens,

referens unde etiam Miltosis uitiū appellatur. At uero anguli afficiuntur quidē etiam in Aegilopis, sed non soli. Carunculæ autem naturalis supra iustum modum incrementum, & eiusdem decrementum, solorum angulorum affectiones sunt. Porro circa tunicam corniformē, consistit caligo, nubecula, argemon, epicauma, coeloma, bothrium, ruptio, prolapsio, unguis, pus, pustulæ, carbunculi, canceratæ affectiones. At circa aciniformem tunicam fiunt, prolapsio, myopia, cephalæ, staphylomata, pupillæ dilatatio, quæ mydriasis & platycoria appellatur, tabes, confusio, pupillæ distractiones. Suffusio uero circa ipsum foramen aciniformis siue uniformis tunicæ consistit, hoc est, iuxta pupillam. Sed & outiformis humor amplior seipso factus, aut crassior, exactum uisum impedit. Quin & imminutus idem humorem crystallinum resiccat. Quæ uero glauco appellatur, siccitas est uehemens humoris crystallini. Obscuratio autem obturatio est nerui uisui, ut omnino non uideat, qui sic affectus est, pura tamē apparente pupilla. Læsos etiam oculos habent, citra hoc ut aliquid mali appareat circa oculos qui nyctilopes appellantur. Totorum uero oculorum manifesta læsio est, quæ expressio uocatur. Est autem prominentia oculi uelut extrā positi. Cæterum curationis tractationem à simplicioribus & superficialibus morbis in oculis incipiendam putamus.

Perturbationis oculorum curatio. Cap. iiii

Perturbationes oculorū à fumo factas, & ardore, aut puluere, aut alio cōsimili, facile curabis, si iusseris agrū à lædente causa discedere, uelut sole aut fumo, aut alio simili. Deinde oculos lauare, primum aqua tepida dulci, postea etiam frigida. Iubendus est etiam splendorem auersari, & oculos claudere. Ex his enim sedatur malum, nulla alia re adhibita, sed solum indigentiore uictu. Si uero ex ardore obortæ sunt perturbationes, ampliore potu utendū est. Si enim somnus successerit profundior etiam lippitudo formidata cōcoquetur, quare neq; à balneis abstinendū est. Verum diæta exquisitiore utendū. Perseuerante uero affectione quiescere oportet, & palpebras illinere collyrijs ex croco, aut rosis, & maxime collyrio Nili ex rosis. Granas autem, & glutinationes noctu circa oculos fientes, expurgat & probè iuuat posca aquosissima, & ipsa aqua per se frigida affusa. Et alia quod ex siccis delachrymatis appellatis, præsertim quod crocū procataleptum cum, hoc est, præoccupatiuum, siue perseueratiuum, appellatur.

Inflammationis oculorū superficialis curatio. Cap. iiii

Quod si inflammatio superficialis fiat in tunica agnata, & dolor uehemens non adsit, repulsoria in ipsis adhibenda sunt collyria, ita ut uehementiā mordacitatis ipsorum, per oui ammixtionem mitigemus. Plerunq; enim tenuis oui lippitudo quorū cum collyrijs Monohemeris, hoc est, diarijs appellatis, sufficit ad curandas superficiales & incipientes lippitudines, citra magnam inflammationē, & uehementem dolorem. Sæpe enim ita inflammationes mitigauit, ut homo ad uesperam balneo usus sit, & postridie collyrio nardino ad restitutionem in integrum, & corroboratiōē se illeuerit. Ammiscetur autem ad collyrium nardinum circa primam illitionē, minimū quiddam ex repulsorijs, circa secundā adhuc minus. In quibus igitur collyrijs dominant adstringentia, plurimū liquorem oui esse oportet, modicū uero collyrij. In quibus autem prævalent cōcoctoria, uelut est nardinū, ea crassius adhibenda sunt. Fomentū adhibendū est his per spongiā, si moderatus est dolor, semel aut bis: Si uehementior, melius est uel quinque uicibus eo uti, animaduersione tamē habita ad oculi qui curat sensus subtilitatē aut hebetudinem: Quicunq; enim oculi secundū naturā uenas amplas habent, & sanguine plenas,

plenus, itemq̃ qui glauci sunt, omnino non ferunt collyriorum adstrictionem. Quare aquosiora in his collyria adhibere oportet.

De inflammatione ob plenitudinē, & chemosi oculorū. Cap. v

Si plenitudo in toto corpore subiecta est, & inflāmatio in oculis magna sit, & dolor uehemens adest, non amplius sufficit collyriorū usus ad talem affectiōē. Vario itaq̃ opus habemus in his medicationis ductu. Et oportet prima ac maxima auxilia adhibere. Quorū etiā Hippocrates in aphorismis meminit, ubi ait: Dolores oculorū soluit meri potus, aut balneum, aut fomentū, aut medicamentum purgatoriū, aut uenæ sectio. At non eidem hominī omnia auxilia hæc adhiberi iubet. Sed alij uenæ sectionem, alij purgatoriū pharmacum; alij fomentum, alij balneum, alij uini potum, Itaq̃ à balneo initium faciamus.

De balneis.

Cap. vi

Balneū conuenit his quibus inflāmatio tumida in oculis est. Est autem tumor mole quidē laxus, sed ad tactum frigidior, & colore albus, & qui influit fluxus, minus mordax est, & minus calidus. Imo neq̃ chemosis in ipso oculo subrubra est, neq̃ distenta. Hæc autem affectio magis in senili ætate contingit, & plerumq̃ hyemis tempore, & magis scæminis pinguibus: Et ut compendio dicam, omnibus frigidum ac pituitosum cerebrū habentibus, inflāmatio tumida contingit. Quum itaq̃ omnia relata signa uideris, confidenter balneū assumito: adeo enim ægrū leuat, ut alio auxilio non habeat opus. Oportet autem magis in aëre morā trahere, & oculos plurimū fouere sicciore fomento per spongas multū expressas. Quod ubi feceris, palām percipies tumorem in calido aëre disparuisse, & interim ægros penitus ab affectiōe liberatos. Si uero quid ad perfectam curationem detulerit, nardinum collyriū in balneū ituro instillato. At si moderatus apparuerit dolor, etiā crassius collyriū adhibebis, præcalescitū uidelicet in cote, ita ut loto, uelut dictum est, & è balneo egresso, humiditatem diligenter per spongiā detergeas, & sic idem collyrium, illinas, obseruans ne quid ex ipso in oculum præterlabatur. Solet enim magnum damnum excitare. Quare neq̃ sudantibus illinendum est. Fit enim in balneo humorum diffusio, & præterlapsum collyriū mordacitate quadam inducta, matērias faciliē ad oculum trahit, & duplicat inflammationēs. Si uero relata affectio durabilior fiat, & fluxionis essentia, ad frigiditatem magis ducatur, tunc smegmata capitis in balneo adhibenda sunt, & pulueres insperiles post balneum. Et primum quidem simplicibus uti oportebit. Si uero causa perseverarit, etiā ad composita transeundū est, quorum sylua talis est. Baccæ lauri, nitrum tostum uino extinctum, sampsuchus, sex uini uasæ, & similia. Puluisculi uero mulieribus præsertim consueti adhibendi sunt, qualis sunt ex iride, & apij semine, & cupressi pilulis, & ungentis siccis appellatis. Oportet autem non immodicē calida esse, neq̃ acria quæ adhibentur, sed leniter calida, & habere, ad adstrictionē ammixtam. Horum uero compositiōnes iam relatae sunt in præcedenti sermōne. Smegmata igitur in balneo iniicere oportet incipiti, pilis prius inter se disparatis, quo auxiliū corpus cōtingat, percipiendumq̃ ut in balneo os claudant, quo calido aëre uehemēter per nares attracto, subiectā materiā citius transmutent. Post balneū autem detergis capillis, puluisculi inspergant, uelut dictū est. Et de balneis quidem hæcenus. Consequenter etiā de uini potu.

De uini potu.

Cap. vii

Vinum attenuat, & incrassatos humores transmutat. Et sæpe per accidens ali quod horum euacuationem facit. Conuenit autem esse uinum colore fuluum, & substantia tenue, & non uetus, neq̃ uehementer adstringens. Dandū est autē uinum

uinum his maximè qui ipsi adfueti sunt, & qui siccam ac frigidam intemperiem magis prædominantè habent. Videtur enim societatem quandam ad balneum habere uinum ipsum. Quò igitur euacuatione ac transmutatione humorum opus fuerit, balneum assumendum est. Quum autem transmutatione, & renutritione, ac humectatione & calefactione, moderataque euacuatione, uino opus habemus: misceere igitur uinum oportet aqua calida non multa. Sit etià meracius quam pro consuetata temperatura. Sit & aqua quæ adijcitur purissima, & fumi ac odoris exors, & ualde feruida, quo etiam seipsa tenuior euadat, & sufficiat ad amplioris uini temperaturam. Sit & poculum in quo exhibetur amplius, & conetur æger oculos inter potandum aperire. Sic enim exoluta obstructione, & multa naturali ac saluberrima lachryma influente, à dolore liberabitur. Statim enim laxantur palpebre, & seipsis magis mobiles fiunt, ac leuiiores. Illud uero considerare oportet, an ne caput hominis facile lædatur, talium enim caput facile læditur ex uini potu. Cæterum ad reliquias affectionis oculi, collyrio uti oportet, primum leni ac dulci instillato, ad accessoriam perturbationem curandam. Et ubi oculi in quieto statu fuerint, & à feruore inflammationis liberati, tunc repulsorium collyrium adhibeatur, quale est quod Hermolaus appellatur, & cõsimilia sistentia appellata. Dum enim rubor adest, & inflammatio, adstringentibus collyrijs uti non oportet. Conclufis enim per adstrictionem materiæ reliquis, dolorem maiorem faciunt. Et de uini potu hætenus. Dicendum & de uenæ sectione.

De uenæ sectione.

Cap. VIII

Adhibenda est uenæ sectio, si nihil ex sæpe relatis impederit, in dolore oculorum, in his quibus multa oculorum distentio est, & multus rubor, & ad contactum resultus, & ardor, & lachryma multa ac calida, & chemosis iuxta corniformem & agnatam tunicam, ut à uehementi inflammatione palpebræ euerantur, ut uix oculos operiant, & subrubra apparet tunica agnata, & maiori tumore prædita est, & totum corpus sanguine repletum. Secunda est autem potius superna in cubito uena, humeralis appellata, faciendaque est maior sectio, ad hoc ut crassior sanguis euacuetur, ueloxque animi deliquium succedat, quo dolor eximatur, & inflammationis feruor extinguatur. Euacuatio autem toto corpore, collyrijs & reliqua curatione, reliquias affectionis percurentur. Utendum est autem collyrijs, qualia sunt cygnaria, & Libiana, ita ut aquosiora calida instillemus. Fomento in his non ualde adhibenda sunt, sed per spongiam ex aqua tepida leniter deterfio fiat. Alimenta danda sunt lenia, facilia, concoctu & ad digerendum, uentri comoda, urinam cientia, nihil acre & salsum habentia aut crassi humoris aut ægri concoctile. Post inflammationis depulsionem, nardinum aquosius instillandum est usque ad perfectam sanitatem. Et uenæ quidem sectionis hætenus mentio facta sit. Transeundum est hinc ad purgationem.

De purgatione.

Cap. IX

Si neque ætas, neque anni tempus, neque stomachi imprimis debilitas, aut alterius cuiusdam uisceris, neque aliud quoddam maximum impedimentum fuerit, purgatio assumenda est, in his quibus tenuis & multa lachryma defertur, aut salsa, aut acris, aut frigida. Et uniuersum corpus uitiatum humoribus refertum, & caput superfluitatibus redundans, & alius assidue suppressa, & copiam ex hoc malarum superfluitatum congregans. Et ad hæc uehemens doloris uexatio adest. Nam in uenæ sectione plenitudinem totius corporis suspectam habemus. In purgatione uero uitiosos humores auersamur. Purgatoriorum autem natura non una est, sed plures, iuxta redundantem enim & affligentem humorem, pharmacorum materia euariatur.

euariar. Siquidem igitur aluius assidue fuerit suppressa, aloë ipsis exhibenda est, cum brassicæ succo trita, & in catapotia redacta. Si uero pituita magis redundarit aquosa, exhibe pharmacum ex euphorbio, pipere, & sale ammoniaco præparatum. Si uero bilis abundarit, picram ex aloë dato, scammonia leuissime trita duobus scrupulis, aut minus additis, pro uirium ratione. Si autem atra bilis humor dominatur, addantur ad picram dosim, epithymi scrup. vi. & scammonie obol. iiii. Cæterum post sufficientem per purgatorium euacuationem, si quidem simplex & sine uulnere fuerit affectio, adstringentibus collyrijs utendū est: quale est Hermolaus, & similia. Et hæc per instillationē adhibenda sunt. Si uero uulneratus fuerit oculus, teneris utendum est. Qualia sunt cygnaria, & libiana. Iam igitur Aphorismi Hippocratis scopus, quantum in præsens opus est, relatus est, hoc est, quomodo ad maximos dolores ac inflammationes cito instare ac reniti oportet. Quandoquidē uero in multis maxima auxilia relinquuntur, uenæ sectio maximè & purgatio: considerandū sanè est quomodo tales tractare oportet. Proinde cum uniuersalibus iam relatis signis, etiam peculiaria quædam circa oculum signa uidere est, totum morbum redarguentia ac indicantia. Gramæ itaq; & lachrymæ apparent, aliquando glutinosæ ac crassæ, aliquando tenues & cito destillantes. Et aliàs falsæ aliàs acres, aliàs mordaces. Et quandoq; calidæ quandoq; frigidæ. Grama itaq; statim in principio lippitudinis apparens, magis cruditatis lignum est, & diuturnā lippitudinem fore significat. Oportet itaq; in talibus leniter curationem facere per dulcia collyria instillata, & reliquū consimilem ductum, quo temporis progressu concoctio uere fiat. Nam repulsoria collyria, quum sint ferè uiribus frigidiora, obstructionē & corporum condensationē faciunt, & dum humorū materias cōcludunt, maximas inflammationes ac graues dolores inducunt. Aliquando etiam ruptionem tunicæ corniformis faciunt, propter humorū distentionem, & maximè ubi rubor adest, & inflammatio, & materia multitudo in oculis subiecta est, talia uero collyria sunt quæ ex uberiore opio & acacia præparantur. Quale est quod Antoninus, & quod Hermolaus appellatur. Et quæ Pelaria appellantur, & his similia. Quidam enim collyrio Antonino amplius usi, unā cum dolorū augmento, etiā uim uisui in iuriā affecerunt. Nam per immodicā perfrigerationem, portulacæ mortificationē magis induxerunt.

De fomento.

Cap. x

Fomento utendum est multò, maximè si in principio crassissima gramæ appauerint, quo ipsæ extenuentur. A balneis autem penitus abstinentum est. Aliquando etiam à uino. Tibi exhibendi sunt modici, uentri commodi, ac attenuantes. Quod si duriorem aluum habuerint, per betarum ac fuisurum decoctum eluatur, cum melle ac sale. Os autem per pharmacum ex moris illinatur, ad materię euacuationem. Aut per collutionem aliquam pituita per os detrahatur: pleriq; enim maxillares musculos læsioni obnoxios habentes, manducationem aggre ferunt. Postea uero uelut dictum est, simplicia collyria infundantur. Et si quidem calida fuerit affectio, Libianis collyrijs utendū est. Quale est quod à nobis ad huiusmodi affectiones experientia cognitum est, & in Heratomis reperitur, & ab ipso Tephrum appellatum est, pompholygemq; non habet. Vnde etiam nos descriptionem ipsius delegimus. Nam pompholyx rara inuenitur, & facile adulteratur. Optima est autem pompholyx colore non alba, sed magis ad liuedinem uergens. Signum optimæ est, si in prunas inspersa, auricolarum ignis speciem efficit. Utendum est igitur collyrio Tephro appellato, ad lippitudinem à calido humore obortam. Si uero non affuerit hoc, alio quodam ex

Libia

Libianis appellatis utendum est, aut cygnario. At si inflammatio affuerit, cum lachrymæ calidæ influxu, hecatontarchium collyrium aquosius instillare condicet, si non ulceratus fuerit oculus. Et si quidem inflammatio prædominatur, addenda sunt ad hecatontarchiū quædam non adstringentia collyria. Si uero influxus magis præualeat, ipsum per seipsum aquosius intundatur. Omnibus autem præstat, in quibus gramæ crassæ sunt ac uiscosæ, id quod ex uino paratur, & llotheum inscribitur, cum albumine oui infusum, atq; hoc aquosius, ut coloretur solum ouum ex collyrio. Citissimam enim opem affert citra aliud auxiliū. Post collyriorum usum, si puncturam aliquam aut mordacitatem, aut caliditatem perceperit, solum albumen oui calefactū infundatur. Nam lachryma ex supernis partibus delata, apud palpebram colligitur, & arenæ imaginationē exhibet. Et quidam Medici fidem habentes his quæ ab ægro dicuntur, uelut sit aliquid sub palpebra arenæ, inuersam palpebrā spongia detergent. Et uidentur sibi in præsens quidem egrum ab omni suspitione liberare. Verum maximū detrimentū in posterum ipsi inducunt. Dum enim exasperant palpebrā, pungitiuum dolorē con duplicant. Proinde his quæ ab ægris dicuntur non ualde attendere oportet. Doloribus enim perturbati, ignorāt id quod ipsos lædit. Conuenit igitur post collyrii usum, largo fomento uti: hinc enim lachrymæ influxus dissoluetur. Deinde solum oui candidum præcalefactū infundere. Statim enim à punctura liberantur. Rarefacit enim albumen oui meatus & per uiscositatem faciliē euacuat, lachrymā & meatus obducit, ac humorū acrimoniā contemperat, & ipsorum tenuitatē ad iustam spissitudinē transmutat. Et in summa, siue punctura infestari, siue non, infundendū est oui candidū per seipsum, post collyriorum usum. Omnem enim morbosam putredinē deterget. Nam collyriorum essentia quomodocumq; tenuis fuerit, tunicis tamen oculorū ac palpebris insidens, aspretudinē quandam inducit, quæ ubi oculum contigerit minimē bona censenda est. Quidam porro dolorem obtundere uolentes, & caliditatem & acrimoniā edulcare, lac pro ouo infundunt. Decipiūt autem seipsos ex ignorantia, pro paruo solatio, diuturnam affectionem ægro propinantes. Idem enim faciunt quod hi qui uulnere pinguiā adhibent, & carnem superexcrecentē augent. Sed & quum lac faciliē alteretur, à caliditate in oculo præter naturam acrius euadit. Et de calida quidem lippitudine hæc tenus. Consequentur etiā de frigida dicendum est.

De frigida oculorum intemperie.

Cap. xi

In frigida oculorum intemperie minus quā in calida dolores sunt. Tardius aut curantur, & si successerit in his inflammatio, tumida fit & colore uelut plumbea. Plerumq; autem oculus his non ualde perturbatus est, neq; rubicundus. Lachryma uero ipsis destillat per paruum angulum, aliquando etiā per magnum modica ac frigidissima. Progressu uero temporis etiā palpebræ inflammantur, & puncturæ consequuntur. Conflatur hæc affectio humoribus pituitosis ac frigidis in capite redundantibus. Aliquādo etiā ex mora in aëre frigido, & maxime post balneū. His igitur tempestiuē præeuaquatis per clysterem balneū adhibeatur. Sed & uinum dandum est, uelut paulo antè in aphorismo Hippocratis dictum est. Infundendū est autem ipsis incipiente lippitudine collyrium nardinum Zoili ad aquosiores compagem dilutum. Et quantum lachrymæ immittuntur, tantum collyrii compages inspissetur. Sitq; tibi hic uniuersalis scopus curationis oculorum, ut pro decremento influentiū humorum, crasse facias compagem collyriorum quæ adhibentur. Declinante uero lippitudine nardinū collyrium aqua dilutum per specilli nucleum palpebræ sublinatur.

De oculis

De oculorum inflatione. Ex Demosthene.

Cap. XII

Inflari oculum dicunt, quum absq; manifesta causa intumescens, decoloratio & pituitosior ac fortiter pruriginosus fit cum fluxione. Contingit autem hoc plerumq; senioribus, prurit ab angulo ad nasum incipiente, uelut si quis à musca aut culice sit commorsus. Frequens est hæc affectio in æstate. Curatur spongiæ totu. Deinde palpebrā intrinsecus subline melle per se, & cum croco trito. Comodat & liquida Erasistrati panchrestos. Illinendæ sunt & palpebræ forinsecus cum melle. Conducit & euacuare aluum. Deinde etiam lauare, & temperata calida aqua caput perfundere. Et post balneum dare uinum. At si pruritus uehemens est, & ætas ac reliqua permiserint, & nihil aliud obstitit, uena secanda est in cubito, aut aluus purganda. Prodest & aqua marina affusa præsertim hyeme.

De tumore oculorum.

Cap. XIII

Tumere oculum dicunt, ubi palpebrā forinsecus eleuari contigit, decoloratio remq; esse ac grauiorē, & agrè mobilē. Itemq; dum pallidior apparet. Aliquando etiam album palpebræ aliquantulū excedit nigrum. Est aut tumor laxus forinsecus circa palpebrā obortus, qui digito compressus citò cedit, & citò rursus repletur. Est & ut plurimum citra dolorem, & concolor naturali habitui. Fit autem plerumq; à fluxione aquosa. Curandi porro sunt tumores qui circa solas palpebras forinsecus sunt, citra oculi consensum, præuacuata per clysterem aluo, solis illitionibus, præmissis fomentis per spongiā. Laxi uero tumores & concolorēs, præuacuata similiter aluo, & præmissis fomentis, melle illinantur intrinsecus palpebræ sublito. Prodest & Erasistrati liquida illita. Utendum etiam ad ipsos apophlegmatismis ex melle cocto, uua passa, thymo & pulegio. Acriora uero uitanda sunt, uelut est staphis syluestris, & similia. In quibus autem oculus condolet palpebræ, præuacuata aluo, & inedia imperata, spongiæ fomentum adhibeatur. Aliquando etiam faciei perfusione utendum est, & præsertim ubi pruritus consequitur. Deinde absinthium aut hyssopum tritum supernè illinatur cum melle. Si uero corpus debile fuerit, lentem coquito, & per colum culinarium, aut cribrum, aut rarum panniculum seu linteum excolato, & ammixto melle expressum liquorem illinito. Quod si æstas fuerit, crocum cum uino mulso illine, aut cum coriandri, aut solani, aut intubi succo. Facit & glaucium. Oculus uero Erasistrati liquida sublinatur, aut aliquo alio medicamento quod plurimam humiditatem ex oculis ducere potest.

De tumore indurato.

Cap. XIII

Fiunt etiam indurati tumores forinsecus circa oculum, plerumq; renitentes ad contactum ac duri, progredientes usq; ad malas & supercilia. Hoc autem maxime contingit ex carbunculosis affectionibus, & diuturnis lippitudinibus præcipue in mulieribus. Oportet igitur ubi palpebræ simul intrinsecus fuerint crassæ, ipsas euertere, & collyrijs exasperationi destinatis confricare. Si uero forinsecus solum fuerit affectio, nequaquā oculus sublinatur. Sed frictio totius corporis & induratae partis adhibeatur. Post hæc imperandū est ut oculos claudant, quo interim diutius confricentur. Deinde subscriptum collyrium oculis illinatur. Thuris drach. v. i. gummi drach. v. i. aluminis scissi drach. i. malicorij drach. i. Trita ex aqua illine, & siccari permittite. Ad uesperam autem linteum molle & lana superligetur. Imò etiam interdū, si fuerint. Deambulatione utendū est multa & lenta. Vitanda sunt balnea, sol, & reliqua calfactoria, legumina item & belularia. Ira etiam & detentio spiritus, & uomitus, & coitus tollatur.

F Vlces

Ulcera in oculis communis curatio, Seueri.

Cap. xv

Exulceratur oculus aliquando extrinsecus aliqua re illabente. Aliquando ex humorū influxu, aut erosione tunicae agnatae, siue corniformis, aut palpebrarū, aut angulorū. Curanda autem sunt in cōmuni omnia in oculis quomodo cūq; fientia ulcera, uniuerso corpori prae omnibus prouidentia adhibita, quo id quod redundat in habitu tollatur, per uenae sectionē, aut purgationē, aut clysterem. Si uero rei circumstantia omnibus his opus habuerit, omnibus utendū est. Dieta uero cōstituenda est contraria afflictioni, ita ut tenuem humorē inspissemus, crasum aut attenuemus, & uiscosum secemus, corruptorū & acriū temperamentū inducentes, & undiq; naturale temperamentū agro exquirentes. Alius aut facili solubilis semper per cibos reddat. Et fricatio multa internarū partū fiat. Vtendum & deambulationibus pluribus lentis, & aquae potu. Et balneū rarissimē adhibendū. Collyria uero tenera ulcerato oculo infundant. Quale est quod Aster appellatur, cōmodissimū ad ulcera medicamentū. Sed & alba cygnaria à colore appellata, & praesertim quae ex foenigraci succo parant. Si uero sordidū fuerit ulcus, cum foenigraci succo collyria diluere oportet, & sic infundere. Viscositas enim ipsius facile remouet sordes. Possidet aut cum uiscositate etiam laxatoria facultatē. Quare saepe in ulceribus ipso solo foenigraci succo usi perfecimus quod opus fuit. Si uero multa fuerit sordes, ad foenigraci succū parū mellis addere conuenit. Oportet aut foenigracū exactissimē purgare, & saepe abluerē, ac pura dulci aqua madefacere in fictili uase probē torrefacto: (uitare enim cōuenit aeneum uas ad eius cocturā) postera uero die diffusa aqua, aliam purā adijcere, & ad lenitum ignem fumū nō edentē coquere. Reijciatur aut primū & secundū decoctū, quo omnis amaritudo excludat. Deinde purissima aqua affusa, & olla probē coapta, coquito ad cōpagem mellis liquidioris. Postea per linteam excolato, foenigraco non expresso, sed succo sponte defluente cōtentus, utere uelut dictū est. Caterū decoctū hoc usq; ad secundā, aut ad summū tertiā diem seruare oportet. Inueteratū enim acrius euadit. Postquā autem pura facta sunt ulcera, à foenigraci succo abstinendū est. Et si profundiora fuerint ulcera, libiano utendū, aut potius collyrio ex thure. Vbi uero incarnata fuerint ulcera & explanata, aut etiam adhuc paulō profundiora, adhibenda sunt collyria quae cicatricē inducere possunt, quale est Cleonis. Et de cōmuni quidem ulcerū curatione sufficiunt relata. Cōsequens est ut dicamus quomodo ad singulas affectiones instare oportet. Et primum dicendum est de ulceribus ab extrinsecus illabentibus obortis.

De illabentibus in oculū animalculis, aut paleis, aut arena, Demosthenis.

Cap. xvi

Si in oculū inciderit culex, aut aliud quoddā animalculū, altero oculo clauso, & affecto aperto, animalculū sua sponte prodibit. Si uero palea, aut arena, aut tale quid inciderit, tunc etiā idem facere tenta. Si uero permanserit, digito exime. Aut potius aquā, aut lac, aut aquā mulsam instilla. Si aut amplius oculo adhaeserit, per pharmacū quoddam non inquinans, & non acre eripe, quale est quod ex melle paratur.

De calce uiua in oculū illapsa.

Cap. xvii

Si calx uiua in oculū inciderit, aqua quidē & lac infusa attrahunt & exurunt. Verū albumen oui infusum, uim ustoriae calcis obtundit, & eo adhuc magis olē rosaceū.

De ulcerationibus ab igne.

Cap. xviii

Quae ab igne fiunt ulcera, duriores crustas faciunt. Quapropter frequenter humectentur lacte infuso cum albumine oui. Collyrijs autem utendum est ex sit bio, & quod Cleonis inscribitur.

De his

De his quæ oculo infiguntur.

Cap. XIX

Si in oculum infixus fuerit aculeus, aut officulum, forcipe extrahatur, atq; hoc attentè in directū ne frangatur. Si uero nihil eminuerit, sed æquale corpori fuerit, specilla duo accipito, & nucleis ipsorum utrinq; admotis, oculum comprimito, ut quod infixum est in medio consistat. Vbi uero prominuerit, uolsella extrahatur. Deinde turturis aut columbæ sanguis infundat, aut albumen oui. Si uero statim eximi nō poterit, oculis infusis & cataplasmatibus ad inflammationes cōgruis curetur. Nam post dies aliquot suppurata punctura, id quod infixū est emerget.

De sugillatione.

Cap. XX

Sugillatio dicitur quum ex plaga quadā, ruptis aut cōtusis uasis in oculorū tunica sanguis sub tunica subierit, & statim quidem cruentus color oculi fuerit, postea uero liuidus. Sic affectos curare oportet cōmuni prædicta ulcerū curatione, per uenæ sectionē, aut purgationē, & quæ consequunt, infuso candido oui tepido, aut sanguine turturis uel columbæ. Supernè uero imponenda est lana uino & rosaceo ac ouo imbuta, & deligatio leuis adhibenda. Postera die oculus sepe foueatur per spongiam cum absinthij aut hyssopi decocto, forinsecus autem lana imponatur. Quum uero oculus ab inflammatione liber factus fuerit, melle, aut Erastriati liquida illinatur, aut collyrio aromatico. Bene facit & solani succus cū melle infusus. Et thus suffitum cum pari bitumine. Cæterum ad inueteratas sugillationes probè facit hoc. In æris rubri uas pueri incorrupti urinam mittito, & æreo pistillo in sole ad multos dies terito, ut multum succum remittat, & siccātū melle excipito, ac uitior. Apollonius autem Memphites ad sugillationes ac uibices, tale collyrium prodat. Lapidis hæmatitæ, sanguinis asinini de corde siccati in sole, æquales portiones cum urina pueri incorrupti tere, & cardamines iberiæ dis appellatæ succū adijce ac simul tere, & infunde. Aut collyria ex his efforma, & usus tempore cū muria instilla. Aliud. Lapidis hæmatitæ drach. II, sanguinis columbæ sicci drac. III, sanguinis asinini drac. III, gummi drac. II, terito ac uti tor uelut dictū est.

De puncturis oculorum.

Cap. XXI

Omnes puncturæ in oculo, quales à stilo aut aliqua cōsimili re fiunt, post cōmuni prædictam curationem, sanguine turturis aut columbæ statim ab initio irrigato, aut oui candido. Et ab initio quidem uitanda sunt fomenta & cataplasmata calida. Post quartam uero aut tertiā diem, toto corpore præeuiacuato, spongijs foueto, & cataplasmata ad inflammationes destinata imposito. Collyria uero adhibeantur leuissima, etiā si impura appareant ulcera. Utendū igitur est spodiaco, & tephro, & alstere, ac similibus. Facit & collyrium Nili ex rosis aquosum cum ouo instillatum.

De uulneribus profundioribus.

Cap. XXII

Quum profundius & maius factum fuerit in oculo uulnus, ut periculum sit ne effluant ex oculo humores, animaduertendum est ne inflammatio succedat, & febris subsequatur. Præ omnibus igitur uenæ sectione utendum est, si uires sustineant, nullum est enim efficacius auxiliū ab initio. Si uero uenæ sectio relinquitur, purgatorio idoneo utamur, sin minus, clysteribus aluum subducentibus euacuatio fiat. In oculum uero calidum oui instilletur. Et cataplasma adhibeatur ex ouo simul confuso uirello, cum rosaceo & uino, ita ut lenitè tepescat & lana exceptū imponatur. Sequentibus diebus fomentū fiat ex decocto rosarū aut meliloti, & infundatur lac muliebre cum ouo tepidū. Cataplasmata adhibeantur ad inflammationes descripta, & maxime id quod ex capitibus papaueris, meliloti, croco, & pane parat. Illinenda est etiā frons ac tempora modico apio cū croco.

F 2 Sint

Sint autem leuia cataplasmata, & superna palpebra sola ex his integatur, quo aperiri possit oculus, & lachrymas influentes excernere. Oculus quoque leuiter deligetur. Si uero aliqui cataplasmata ferre non possint, his palpebrae, ac tempora, & frons collyrio Nili ex rosis illinantur: Si uero uehementiores fiunt dolores, caput pilis denudetur, & cucurbita occipiti ac uertici affigatur. Et in noctem quaedam dolorem eximentia in potu exhibeantur. Circa quartam uero aut septimam diem Nili collyrium ex rosis instilletur aquosissimum usque ad perfectam curationem. Cibus dandus est sorbilis, boni succi, uentri comodus: oportet enim uentre semper probe solubilem esse. A uino uero abstinendum est usque ad declinationem. Cauenda sunt autem & quae caput replent, & fluxionem irritant.

De ouiformis humoris excretionem.

Cap. xxiii

Si puncto oculo ouiformis humor excernatur, ut etiam oculus aliquantulum contrahatur, reliqua quidem similiter, uelut dictum est fiant, ut ne inflammatio succedat. Verum post inflammationis ac ulcerationis declinationem, balneum conducet, & uinum tenue moderatum. Et cibus boni succi, quo humor probe renutrietur ac rursus expleatur.

De oculi prolapsu.

Cap. xxiiii

Prolapsus totius oculi, ex uiolenta quadam capitis plaga contingit, aut ex ulceribus carbunculosis, aut internis ualis ac pelliculis, quibus adharet oculus, ruptis aut laxatis. Procidit enim quibusdam totus oculus foras, ut a palpebris contingi non possit. Aliquando etiam usque ad malas & supercilia procidit. Atque hoc maxime contingit ex casu ab alto loco, aut ex plagis capitis uolentis. Periculosa est autem affectio. Itaque curatio statim adhibenda est, per uenae sectionem, aut purgationem. Sed & reliqua adhibeantur quae relata sunt in communi ulcerum curatione. Contrahendus est cibus, & postea in ouo & rosaceo ac uino simul cotulis lana imbue & impone. Deinde uero cataplasma ex meliloto & papaueris capitibus adhibe, cui addita sunt hyoscyami folia cum pane aut psyllio modice madefacto. Assidue uero alterentur cataplasmata, ut ne calefactae partes suppurent. Sequentibus diebus remittente inflammatione, cucurbita occipiti cum scarificatione affigatur. Praesente uero inflammatione, cucurbitae sunt ineptae. Assidue autem ouum & lac tepidum instillent. Remittente uero inflammatione, collyrio Nili ex rosis cum ouo utendum est. Aut etiam mellis summi exortis parum ipsi ammiscendum, ad sanam excernendam. Simul autem sub palpebra subijciendus est specilli nucleus, ut ne coactio aliqua fiat, quod si prolapsus magnus factus fuerit, & nulla spes est ut uisus restitatur, cataplasma matris suppuratoris utendum est, qualia sunt quae ex polline fiunt. Sed & lentem cum melle imponere oportet. Et inflammatione declinante balneum petendum est.

De ulcerationibus superficialibus, ex humorum influxu obortis nubes

becula, caligine, epicaumate & encaumate.

Cap. xxv

Quae ex humorum influxu fiunt superficiales ulcerationes, diuersimode nominantur: caligo enim est ulcus superficiale in nigro oculi factum, consimile caliginoso aeri colore caeruleo, quod multum locum nigri occupat. Quum uero in pupilla factum fuerit, non facile aegri uident. Nubecula autem uocatur profundius ac minus caligine ulcus in nigro, & est colore albius. Epicauma uero dicitur, quum nigrum oculi in superficie exasperatum, inustum fuerit, & colorem cinereum praesentauerit. Encauma uero est ulcus ut plurimum ex febre fiens, cum crusta impura, in nigro aut albo. Et in nigro dum sit in profundo, plerumque in purgatione, maiore nigrarum corrosione contingente, humores paulatim foras effunduntur, & totus oculus effluit. Has igitur superficialissimas ulcerationes, cum febre aut sine febre fientes sanare oportet, aluo per clysterem praeuacuata, ita ut collyrium Nili ex rosis

rosis aquosius instillemus, & in ipsis intervallis infusionis collyrii, lac infundamus. Præteritis deinde aliquot diebus, ammiscendum est ad Nili collyriū, chiacum appellatum Apolloni, aut aromaticū. Deinde uero etiam meracis his utendum. Citò enim cicatrices, easque tenuēs & serē non apparentes inducunt.

De argemo.

Cap. xxvi

Argemū est ulcusculum circa iridis circulum factū, partem albi, & partem nigri occupans, & album apparens. Quum igitur profundius & sordidū factū fuerit circa iridis circulū, & citius repurgatū, aliquando procidit tunica uuliformis. Quapropter meatus obducētibz pharmacis in ipsis à principio utendū est, quò ulcera ab inflammatione liberentur, & tunica oculi subnutrita crustam reiciat.

Defossulis & concavis ulcerum generibus.

Cap. xxvii

Fossulæ appellantur quum in nigro fiunt caua, angusta, & pura ulcera, puncturis similia. Concaua uero uocantur, rotunda & ampliora fossulis ulcera, & minus profunda. Nō igitur ipsa purgare oportet per acria collyria, sed potius per mitia renutrire, & maximē ea quæ fossulæ appellantur. Concaua uero diuturna primū leniter detergentibus curabimus, & deinde ad renutrientia transibimus, qualia sunt quæ ex thure fiunt. Vbi uero explanata fuerint, aut etiā adhuc cauiora sunt, Cleonis collyrio utendum est. Si uero sordes multæ ulceribus insit fuerint aqua mullā infundatur. Nos autem ad scenigræci decoctū paratum uelut ahtea dictū est, modicū mellis ammiscuimus, & citius rem quæsitā assequuti sumus. Vtūtur etiam in cauis ac sordidis ulceribus collyrio Theodoti Seueri aquosiorē cum oīuo, & citra omnem dolorem repurgat, & celerrimē ad cicatricē perducit. Meminisse uero etiam in his oportet prædictæ communis ulcerum curationis.

De suppuratione, aut ungue.

Cap. xxviii

Suppurationes in ulceribus fientes diuersas appellationes habent. Unguis enim dicitur quum à profundiore ulcere pus defluēs, & inter tunicas illapsum, & in circulo iridis figuratū, similem ungui resectio imaginem præ se fert. Ampliorē uero pure collecto, & dimidiū nigri occupante, aut per totam corneā tunicā pelucente, suppuratum esse oculum dicimus. Fiunt autem hæc etiam circa exulcerationem, dolore capitis, aut lippitudine prægressa. Contingunt etiā inflammatione prægressa, propter ampliorē humorum repletionē diruptis quibusdā uasis, & sanguinē ex ipsis profuso suppurato. Consequitur autem ad suppurationē dolor uehemens pulsatorius, & rubor circa oculum totum, & temporum dolor. Curatio facienda est ab initio reiectis fomentis, per alui per clysterem euacuatiōnem. Deinde per uenæ supernæ in cubito sectionem. Ita ut postea etiam uenam circa magnū oculi angulū secemus, citra colli ligationē, aliās fieri solitā. Sed & cucurbitā occipiti affigemus, aut hirudines temporibus. Deinde collyrijs ad inflammationes destinatis utendū est, & maximē Nili ex rosis, cum oīuo aut lacte aquosius instillato. Post teritiā uero diem fomentū per spongiā adhibendū est, quidē meatus obstruentiā uitanda sunt. Utendū autē discussorijs ac lenientibus, maximē chiaci Apolloni, & similibus ex myrrha paratis, quæ diasmyrna appellantur. Quæ enim uehementer discutiūt ac resiccant, statim quidē multā tenuioris euacuatiōne faciunt. Quod uero reliquū est & crassius condensat, & ut ægrē dissolui possit resiccat. Galeni. Medicus quidā apud nos expertissimus ophthalmicus, etiā capitis concussionē multos sanauit. Et locabat quidē ipsos in sella erectos, & utrumque à lateribus caput apprehendebat, atque ita cōcutiebat, ut nos manifestē uideremus pus deorsum ferri, & infra manere, propter grauitatem uidelicet.

F 3 cci,

cer. Quū igitur in superficie fuerit pus & ulceri contiguū, dum purgā ulceris om-
nino etiā in uaporē exhalat pus: quū uero ulcus superficialiū fuerit, & superius.
Pus autē amplius, & in profundo inferius ulcere, & à pharmacis non excolatur,
oculū sub pure perpungere oportet, acū oblique circa iridē & coronā appellatā
immissio, & pus excernere. Atq; hanc chirurgiā locis non inflāmati adhibere o-
portet. suppurationes autē in albo tunicā agnatē fientes, scalpro uenę sectorio ex
inferna parte diuidito, & tunicā agnatā leniter subexcoriato. Ceterū post humo-
ris euacuationē, in utrisq; oui candidū instillato. Deinde integrū ouū cum uino
mulso cōquassato, & molli lana exceptā oculo superposito ac deligato. Postera
uero die fomento ex aqua calida per spongiā adhibito, & ouo infuso, rursus pre-
dictum lanæ hapsū imponito, & post triduū collyrio Dionis illinito, aut quo-
piam ex his quę ad perpunctiones adhibent. Est autē Dionis collyriū hoc. Spodij
drac. III, thuris, squame aris, myrrhe, acacię, spicanardi, opij, sing. drac. I, gummi
drac. VI, excipe aqua pluuiali. Vsu uero expetentē infunde cum candido oui, &
predictū lanę hapsū superpone. Si uero postquā inflāmatio cessauit, caro ex di-
uisione prominuerit, predictū collyriū cū lacte dilutū illine. Probē etiā deprimit
& repurgat chiacū Apollonij. De pustulis. Cap. xxxix

Pustulę fiunt & in albo, & in palpebris. Plerunq; uero circa corniformē tuni-
cam. Et alię in superficie fiunt, alię in profundo: cōstat enim tunica corniformis
ex quatuor uelut membranosis corpusculis, densissimis ac fortissimis. Aliquādo
igitur sub prima membrana pustulā fieri cōtingit, quando etiā colorē nigriore
præ se fert. Aliquādo sub secunda aut tertia cōsistit, quando sanē etiā albidior pu-
stulę color fit, eo quod in profundo tunicā corniformis occultat: naturalis enim
pustulę color niger est. Tunica uero corniformis alba est, & cornibus similita.
In quantū igitur in profundo corniformis tunica pustula occultat, in tantū colo-
rem assimilat, & maiore dōlōrē inducit, & molestior est. Nam siue ob plenitudi-
nem rupta fuerit pustula, siue ab acrimonia corrosa, ut tunica ulcere, facilis cura
tu est superficialia ulceratio. Difficilis autem profunda. Periculū est enim ne re-
liquum corniformis in profundo tenuē existens rumpatur, & uiformis proci-
dat, ac effluat oculi humores. Præsertim si iuxta pupillam ruptio fiat. Facta enim
iuxta pupillam ruptione, etiamsi pro more agri, tamen aliud quid graue conse-
quitur. Nam inducta ulceribus cicatrice, homo non uidebit, propter inductas ci-
catrices. Quandoquidē uero aliquādo etiā ob corniformis corrosionē uiformis
tunica procidit, & superficialis pustulę imaginationē facit, operæpretiū est
de his exactius distinguere. Pustula itaq; superficialis, similiter undiq; nigra est,
non tamen nigredine exactē saturata. At in uiformi tunica pars quę procidit,
aut nigra est, aut cærulea. Quod uero maximū signū est, fundum prolapsę uni-
formis per circulum reperies album. Alba est enim colore corniformis tunica,
quā rupta uiformis procidit. Sed & pupillę magnitudo imminuit in uiformis
prolapsu, aut sanē omnino euariat secundū figurā: non enim pupilla exactē cor-
seruat rotundā figurā in prolapsu, sed iuxta partē quandā uelut diuisa apparet.
Proinde relatis signis diligenter intendere oportet, & affectiones inter se distin-
guere. Nam iuxta affectionū differentias etiā curationē uariare oportet. In pro-
lapsu enim uiformis, magis adstringentib; ac repulsiuīs utimur. In pustulis uero
ro his quę leniter discutiunt. Curandę igit sunt pustulę ita ut caueamus primum
multiloquiū, sternutationes, iras, spiritus, detentiones, clarū splendorem, deinde
contrahendus est etiā potus ac cibus, & ad alui euacuationē acri clystere utendū
est. Tentandū quoq; ut lacte alui soluat, in quibus id neq; accessit, neq; in ni-
dorem

dorem uertitur, neq[ue] uomitu reiicitur. In talibus enim uitandum est lac, & utendum gallinæ iure, aut cnici succo, aut aloë, aut per simplicius quoddam aliud sol- uenda. Vitanda sunt etiam uehementiora purgatiua, & maxime quæ stomacho sunt magis infesta. Deligationes autem & multos lanæ hapsos in his reproba- mus. Valde enim nocent non solum in his, sed etiam in omni lippitudine, ex hu- morum acrimonia facta. Cataplasmata igitur adhibere oportet, ubi inflamma- tio affuerit, maxime in principio, leuia quidem, sed lata. Sunt enim cataplasma- ta tenuibus ac mollibus linteolis illinenda, & super totum oculum imponenda, supercilio ac mala & tempore simul comprehenso, & sinenda, quam diu fuerint madida. Postquam uero siccata fuerint, tollenda & alia imponenda. Adhibean- tur ea quæ ad inflammationes cõgruunt, uelut est tenue ouorum, & uitelli ouo- rum triti cum croco ac modico opio, moderatoq[ue] passo ac pane. Conueniunt et- iam adstringentiâ, uelut sunt mala cydonia cocta, aut malicorium in aqua co- ctum. Verum uitandũ est, uelut dixi, ne oculum in his diutius deligetur; est enim nocentissimũ hoc. Mitigata uero inflammatione, etiam ab emplastris abstinenda est, propter grauitatem. Collyria uero in principio conueniunt, Nili ex ro- sis, cum lacte dilutum & infusum. Proficiente autem curatione, adhibendũ est id quod ex thure, myrrha, ac croco paratur. Postea etiam nardina. Forinsecus aut illinendæ sunt palpebræ collyrio Nili ex rosis, frons uero acacia & hypocisthide, cum croco & modico opio. Fomenta ab initio tepida adhibeantur. Nam inten- ta à principio inflammationes exacerbant. Postea uero caliditatẽ intendere oportet. Deambulationes & alij motus ab initio non cõueniunt. Balnea uero & reli- qua uaporatoria fomenta post principiu. A uino abstinere oportet per omnẽ cu- rationem, & aqua calida in potu uti, & cibos molles ac facile cõcoctiles accipere. Fugienda est in his sanguinis ex fronte aut uenis angularibus detractio: procidit enim oculus, & maxime si inflamatio simul affuerit, aut profundior exulceratio.

De carbunculis in palpebris. Seueri.

Cap. xxx

Quandoquidẽ carbunculi sunt ex genere pustularũ, & sunt hi quoq[ue] aliquan- do in palpebris, oculumq[ue] ad maximũ consensum perducunt, age & ad hos pau- ca auxilia proferamus, dinotiones ipsorum primum exponentes, quum sint etiã alij quidam abcessus palpebrarũ, qui imperitis carbunculi uideri possint. Nam & ordeolum tuberculũ, & panũ, & uari circa palpebras fiunt, sed cũ tumore quo- dam hæc, & ferẽ citra inflammationẽ, & non cum uehementi dolore. Carbuncu- li uero ruborẽ ab initio habent, ut oculũ sibi peruri putent, tumorẽ uero aut emi- nentiã non statim inducunt. Nam ob immodicã caliditatẽ, uelut ruptionẽ quan- dam carbunculus sustinet, & quod effluit ex ipso quũ sit acre ac mordax, superfi- ciem quidem carbunculi resiccat, & crustam inducit, uicinis uero lotis morbum inserit. Consequitur igitur ad ipsos fortis inflammatio, tum ipsius oculi, tum par- tium circumsitaram, & maxime glandularũ circa aures, ut quandoq[ue] magnarum ulcerationũ, & ruptionũ oculi causa fiunt, in superq[ue] prolapsũ, & nuditatis pal- pebrarum. Et cicatrices à carbunculis crassæ fiunt, & assidue ulcerantur. Et in re- liquo quidẽ corpore sanguis qui effluit ex carbunculis niger reperitur, propter superaffationẽ. In oculis autem sanguis non omnino ex carbunculis manat, eo quod neq[ue] redundet in oculo sanguis. Vnde plerunq[ue] etiam albi colore sunt car- bunculi in palpebris. Et si quidẽ emotio affectionis cita cõtigerit per conuenien- tem curationẽ, carbunculus penitus disparet, si uero durauerit, & egrẽ discuti po- terit, necessariò locus nigrescit. Proinde incipientibus carbunculis non statim ad cataplasmata & illitiones progredi oportet, sed per clysterem primum aluum

euacuare. Deinde lacte moderatè cocto purgare. In sanguineis corporibus etiā uena secanda est. Postea per spongas fomentum adhibendum, primum ex simplicioribus. Adstringentibus enim & frigefacientibus, & aliquando etiam resicantibus pharmacis usi, hos sanabimus. In principio igitur quū seruator adest, humorem extinguere cōstantes, coriandro trito ruborē oculi illinimus. Et solanum cum passo tritū & carbunculo adhibitū, statim ipsum abolet. Atq; hic ductus in principijs magnopere prodest. At frigefacientia cataplasmata oculo in carbunculis adhibita, repellunt quidē id quod influit carbunculo, & externas inflammationes sedant, uerum periculū est ne in ipsum oculū impetū faciat: hoc enim solanum aliquādo perpetravit. Adhibitū enim cum passo statim quidē tumore aboleuit, oculus autē hinc repletus est. Ceterū carbunculos iam depascentes uariè curare oportet. Nam quod defluit acré ac mordax existit, ut etiā uicinos locos depascatur, & periculū sit ne oculus lædatur: solet enim et osio his contingere. Cōuenit igitur spongia detergere, & oculū moderatè perfundere, rosarū, aut rubi, aut pampinorum uitis decocto. Sit autē tepidius decoctū, aut potius lactei teporis. Quod si etiā sordidi fiant loci, ex eo quod nome depascens præualuit: (sape enim etiā palpebræ excidunt) ad huiusmodi fluxiones etiā hypocythidis succū aquæ ammiscemus, & myrtū & acaciā passo diluta locis illinimus. Oportet enim pro corporis curādī ratione, etiā materias eligere maximè medias. Valde enim efficacia pharmaca loci non sustinent, qualis est ærugo, & similia. Per mordacitatē enim etiam si salutis spem habeat oculus, hac quoq; priuat: neruose enim partes & præsertim carnis denudatæ, à uehementer mordacibus lædunt, ut etiam caris in ducant. Malicoriū itaq; ex malis puniceis acidis cum lenticula seruēfacimus, & de rasa interna parte, cū modico melle terimus, & ex eius usu magnopere proficimur: celerem enim purgationē facit, & humores qui oculis inferunt, quodāmodo supprimit. Nam pingua nomas augment. Aucta uero noma, in uino malicorium coquere oportet, & per se citra lenticulam imponere. Crustas autem magis malicoriū coctum tritum cum melle impositū resoluit. Sunt & cōposita pharmaca carbunculus cōuenientissima. In principijs enim seruorū, pastillum ex halicacabis illitus excellenter extinguit. Frigefacit enim & resiccat moderatē: Si uero contrahere oportet carnem superexcrecentē, Musæ pastillum aridū tritū adhibemus. Si uero incarnatione opus est, ipsum Musæ pastillū cum sapa dissolutū illinimus. At si cicatricē inducere intendimus, rursus pastillum ex halicacabis assumimus. Apollonius autem ait: Ad carbunculos oculorum hoc pharmaco utimur. Spodij drach. iiii, lapidis scissilis drach. ii, croci obol. iiii, myrrhæ paululum torrefactæ obol. iiii. Terito cum uino odorato donec arefiant, & passi creatici, aut alterius non acris heminam ammiscere, cōtere, excipe ac subline. Disparat crustas, & purgat ulcera, siue extra palpebras affectio fuerit, siue intrinsecus in profundo. Facit & ad fluxionem ac inflammationes. Si uero dolor oculum uexarit, hoc collyrium illine, & euestigiō sistet nomen. Recrementi plumbi tritū loti & exsiccati drach. iiii, spicæ nardi drach. i, gummi drach. ii, foliorum oleę centum uiginti succū. Succum aquæ hemina ad folia adiecta exprimito, excolatūq; & ad reliqua conterenda utitor. Facit & collyriū Nili ex rosas cum ouo infusum. Maximè uero Nardinū candido inscriptum, per submissionē palpebræ sublitū, usq; ad perfectā curationē: oportet enim ubi pura facta sunt ulcera, fomento primo misso, specilli nucleū lacte tingere, & palpebris submittere, atq; angulos inter se disparare, ne distorta concretio fiat. Et ob hoc neq; oculū deligare oportet, maxime post ulcerū purgationē, Nam circa principia si inflammationes maximæ & di-

stentiones

stentiones fuerint, lenticulæ coctæ cataplasma cū pane imponere cogimur. Sed & psyllium impositum inflammationes mitigat. In doloribus enim aliarum oculi inflammationū adhibitu, somnum inducit. Sint autem leuissima cataplasmata. Sed neq̃ diu in cataplasmatū usu perseverare oportet. Augent enim putrefactionem, & oculū magnopere lædunt, uelut etiam in pustulis prædictū est. Postquā igitur aliquantulum mitigauimus inflammationes, statim à cataplasmatīs, tum in carbunculis tum in pustulis abstinēbimus. At uero in locis circa aures per consensum inflammatis, splenium ex cerato butyrino imposito.

De canceratis oculorum ulceribus.

Cap. xxxi

Vlcuscula in nigro oculi fientia, cicatricem non recipientia, parua, dolorosa, parua uasa habentia uaricosa, cancerata dicuntur. Et aliquando quum cicatricē accepisse putantur, resoluuntur citra manifestā causam. Fiunt autem in his punctis discursus usq̃ ad tempora. Et consequitur in ipsis fluxio humoris moderata acris ac tenuis. Et album in oculo itemq̃ nigrū, semper rubicundū est. Et auersantur cibum. Augentur autem ipsis uehementer dolores, illitis acrioribus medicamentis. Contingit hæc affectio maximē senioribus, ex diuturnis lippitudinibus. Et scēminis quibus menses defecerunt. Curatio porro adhibenda est, habita totius corporis cura, cum prædictione quod fieri nō possit ut perfectē sanentur, sed fieri posse ut mitigentur, primum per conuenientem diætā: Deinde etiam per pharmaca dolores lenire potentia. Diætā igitur huiusmodi sit. Postquā à lætō surrexerunt, corpus moderatē illinant oleo dulci. Caput autem modicō rosaceo aut omphacino. Et uiridi sindone oculo prætenta, deambulare iubeto in tenebroso ac non uentoso loco, cum silentio & absq̃ alia distentione, ita ut neq̃ caput agitent, quantū eius fieri potest. Postquā autem ampliore & lenta deambulatione usi fuerint, ad domiciliū tenebrosum, & non ualde lucidū se recipiant, & rursum ab alio corpus ipsorum illinatur, excepto capite, confrictis maximē lumbis ac infernis partibus. Postea uero lactis moderatē cocti, remota cōcretionē sit perstante, hemine mensurā accipiant. Nam acrimonias quæ affluunt hebetat, & aluum facit solubilem facit. Si uero ineptus sit ad lactis potum, pollinē polentæ passo moderatē calido diluto inspergito, & sorbendū dato: Postea si fame uexentur, duobus ouis sorbilibus utantur, & somnū diurnum uitent. Circa decimā autem horam confricti assument panem purum, cum obsonio quodam uiscosum quippiam habente, uelut sunt oua sorbilia, cerebellū porcinū duabus aquis coctum. Ex piscibus muræna, torpedo, glauciscus. Ex oleribus malua, attriplex, lactuca. Assumenda etiam alica ac oryza, & laganum in gallinæ iusculo coctum, & pedes suilli ac tali probē cocti. Omnia uero sint moderata. Vinum bibant & tenue subadstringens, & ipsum moderatum. Ab omnibus autem falsamentis & leguminibus penitus abstineant. Item à balneo, nisi necessarium hoc fuerit, aut lassitudinis gratia, aut tardē cōcoctionis. Atq̃ tunc tardandum in ipso est, sed citra exeuendum. Dolore uerō & fluxione oborta illinantur pharmaca lenia ad puruloculera conuenientia, uelut est spodiaceum, & collyrium Cleonis, & similia. In oculum autem assidue infundendum est ouum, aut lac muliebre tepidum. Mittat etiam lentis decoctū infusum, aut plantaginis, aut portulacæ. Verum ad temporum dolores utendū est collyrio Nili ex rosīs. Si uero ad uehementes inflammationes cataplasmatīs uti cogamur, cataplasmate ex papaueris capitibus utendum est leuissimo. Antea enim dictum est quod fugere oportet cataplasmata in oculis calidam affectionem habentibus. Ammiscendum est autem cataplasmati ex papaueris capitibus, in his & crocus, & lac muliebre.

De ma

De maligñis oculorum ulceribus.

Cap. xxxii

Fiunt & alia maligna ulcera, partim à magno angulo initium fumentia, partim à nigro, partim ab albo, & oculum citò corroduñt, & praesertim in corporibus uitiosis humoribus refertis & quæ acrium rerum esu uisa sunt. Sanies etiam ab ulcere manat multa ac graueolens, & sequuntur dolores uehementes ac febres. Sæpe etiam alui fluxus. Depascuntur etiã aliquando ulcera uicinos oculis locos. Curandę uero sunt etiã huiusmodi nomæ, per prædictæ dietæ usum. Veruntamen eiusmodi exhibenda sunt quæ aluum non soluunt. Vnde in his magis uolucrum genere utendum est, maxime montanarum. In oculum uero infundendum est lac, aut ouum, & prædicta collyria. Si uero nome transgressa fuerit oculos, curatio ita fiat. Pompholygem optimè lotam, ex muliebri lacte illinere oportet, & superimponere, sanie prius per aquam elota, deinde per lac. Facit similiter & cerusa lota ac siccata, & cum lacte adhibita. Et plumbi lotura sicca, quæ confrecto plumbeo mortario cum plumbeo pistillo colligitur. Facit & plumbi recementum lotum, & amyllum. Singula cum lacte muliebri. Cataplasmata uero si coacti fuerimus adhibere, mala cydonia cocta adhibeantur, aut rosæ uirides, aut sicca uino macerata, polygonum item ac solanum, & semperuium, & feris cum polente polline. Si uero uasa in fronte ac temporibus fuerint eleuata, etiam sectionis uasorum rationem habere oportet.

De myocephalis.

Cap. xxxiii

Quæ ulcera quæ propter erosionem aut ruptionem corniformis tunicae sunt, profunda euadunt, pars aciniformis tunicae procidit, & quod prolapsum est nigrum aut caeruleum apparet. In circuitu uero circa fundum eius partis quæ procidit, labia corosæ corniformis tunicae alba apparent. Et si adhuc magis pars prolapsa durauerit, labia ruptionis tunicae corniformis callosiora facta adhuc magis alba apparent. Diuisa est autem omnino in uiformis siue aciniformis tunicae prolapsu pupilla ipsa, ut omnino non appareat, aut & situ & figura immutata. Et per hæc discriminatur myocephalon à pustula. Dicitur autem myocephalon, quoniam figura simile est capiti muscæ. Repulsorij autem & adstringentibus opus habet pharmacis, qualia sunt maxime quæ ex uino fiunt. Est autem & hoc celebre ad ipsum: Cadmiæ, æris, chalcitidis crudæ, singulorū unc. i. æruginis drachm. iiii, myrrhæ troglodyticæ drach. ii, & dimidiam, croci drachm. iiii, salis ammoniaci drach. iiii, gummi drach. iiii. Excipe uino ueteri adstringente. Aliud, ad pterygia, carnis incrementum iuxta magnum oculi angulum, aspritudines. Exerit etiam cicatrices. In alio exemplari reperi, etiam staphylomata facere. Misyos crudi drach. xii, cum aqua cochleario terito, deinde croci leuissimi triti drach. xx, adscito, ac rursus terito, & additis myrrhæ drach. iiii, excipito ac utitor. Post illitionem uero ex ipso factam, spongiam teneram imposito ac deligato. Aliud bonum. Facit & ad data staphylomata. Misyos crudi sextantē, croci unc. i, gummi unc. i, tere cum uino & utere. Mirificè etiã facit in ipsis theodotij Seueri, & si quidē inflammatio non affuerit crassius illine, si uero affuerit, cum ouo infunde. Adhibeat ipsis quoq; cōueniens deligatio. Et inflammatis cataplasma ex papaueris capitibus impones. Aut psyllium aqua calida madefactū. Collyrium Hori faciens ad myocephala cum Theodotio. Facit & ad diuturnas ternues fluxiones. Cadmiæ, squamæ æris, croci singulorum drac. viii, opij drach. xii, misyos usti, myrrhæ, acaciæ, gummi, singulorum drach. iiii, Excipe aqua.

De staphylomatē.

Cap. xxxiiii

Differentiæ staphylomatū plures sunt: Nam & causæ affectionis varię sunt, ple-

runq; tamen quomodocunq; factum fuerit staphyloma uisum destruit. Appellatur autem staphyloma, quum corniformis tunica fuerit eleuata, & eminentiam acino uix similem fecerit. Fit autem aliquando humoribus sub aliquam corniformis tunica striam collectis, à quibus humoribus coactam corniformē tunicā sustinere contingit ac eleuari & incuruari, facereq; staphyloma citra ruptionem. Fit hoc etiam ex pustula quadam inter strias corniformis tunicae satis profundē consistente, quae tunicam eleuauit, non tamen rupit. Appellant etiam staphyloma quam ob corniformis tunicae rupturam, magnus uniformis tunicae prolapsus factus fuerit. Differt hoc à primo, quoniam in illo eleuatio sola est tunicae corniformis, unde etiam tota moles albidior apparet. In hoc uero ruptura quoq; facta est tunicae corniformis, & quod prolapsum est caeruleum aut nigrum apparet. Quum autem maximum factum fuerit staphyloma, ut extra palpebras transgrediatur, & induretur, ita ut ipsa corniformis circumcirca callosa facta sit, & talem affectionē constringat, clauus appellatur, quoniā per omnia clauī capiti similis existit. Hae igitur affectio quomodocunq; fiat, duobus malis subiacer, uisui uidelicet detrimento, & figurae deformitati. Et sic quidem affectū oculum ad naturalem statum reducere, impossibile est arti. Figurae uero deformitati consiliū coningere potest, maxime per chirurgiam. Quaecunq; igitur staphylomata recentia sunt, & propter inflammationē eleuatae sunt tunicae, curanda sunt, cataplasmatū ad inflammationes descriptorū usu, & simili quoq; diata. In quibus autem sub corniformis strias humores aliqui collecti eleuationē fecerunt, si dolor affuerit, semē lini cum fenogreco ex aqua mulsā cocta imponemus. Declinantibus uero doloribus, farinam fabaceā cum rosīs aut semine lini ex aqua impone. Aut rubi folia, aut bryoniae botros immaturos, cū butyro & terebinthina, aequalibus portionibus impone, & deliga. Ad dolores uero cōuenit etiā solani succus cum lacte muliebri infusus. Collyriū autē ad non inflammata staphylomata cōmodum hoc est. Alcyonij drach. i. iiii. salis ammoniaci unc. i. spumae nitri drac. i. lachrymae oleae syluestris drach. i. gummi sextantē. Excipe aqua. At Theodotiū Seueri brassicae succo dilutū, & crassius oculo adhibētū, unā cum spongiae deligatione, molē dissipat, si nō diuturna fuerit affectio. Caeterū aegrē curantur staphylomata quae ampliorē fundū habent, & quae uenas sanguine plenas habēt. Incurabilia autē sunt eminentia, & colore uaria, & temporū dolores inducentia. His sanē nihil aliud adhibendum est, quā ea quae dolores mitigare possunt, quae in malignis ulceribus iam antē relata sunt.

Staphylomatum chirurgia. Cap. xxxv

In staphylomatis quae angustum habent, & non maligna sunt, comoda est actio secundum constrictionem appellata, cuius hic est modus. Duas acus accipere oportet filum duplex intortum habentes equali prorsus longitudine. Dein de hominē ad pedes tuos collocato, capite ipsius reflexo, ita ut occiput ipsius genibus tuis imitatur. Et deinde disparatis palpebris, per mediū staphylomatis fundū, ex supernis deorsum acū transmittito. Sit autē non ualde crassa, neq; oblonga, deinde dum detinet oculus ab acū transmissa, alterā acū duplex filū habentē similiter transmittito à paruo angulo ad magnū, per mediū itidē staphylomatis fundū, quo figura duarū acū transmissarū cruciformis fiat, aut litera graeca X. similis. Nam quū paulo obliquior facta fuerit transmissio, facilius acus extrahuntur. Deinde incisis duplicatorū filorū principijs, superna duo principia, superno acus principio subiiciētes, inferna uero inferno, strennuē cōstringimus. Similiter autē & oblique acus principia cōstringimus, optima uero cōstrictio fit, rectis principijs ad obliqua ductis, & hoc modo colligatis. Deinde apicē staphylomatis resecas.

secamus, solo fundo ipsius relicto gratia filorū, ut ne elapsis ipsis humores oculi effundantur, & oculus cauior fiat. Cur autem staphyloma excindimus? primum quidem compendiarie curationis gratia. Citius enim fila excidunt, & ulceratio curatur. Deinde etiam minori dolore aeger affligitur per totum curationis tempus, quum & corpora transpirent, & neque magna inflammatio consequatur. Post resectionem uero apicis staphylomatis, acus extrahere oportet, filis uelut dictum est constrictis, & tunc lac infundere, aut oui candidum. Supernè uero oculo imponatur ouum cum rosaceo ac modico uino concussum, & molli lana exceptum. Imponatur etiam tempore alius lanæ hapsus ipsidem imbutus. Et facta deligatione, aeger in quiete seruetur. Postera die fomentū fiat per spongas probe expressas, & lacte infuso, lana ouo imbuta imponat & deligetur. Atque hoc faciendū est per plures dies, donec fila excidant. Elapsis aut filis illinantur tenera ad ulcera delicta, ut pura exulceratio fiat. Deinde cicatricem inducentibus utendum est.

De ulceribus cicatrice indigentibus.

Cap. xxxvi

Purgatis oculorū ulceribus, & expletionē indigentibus, animaduertere oportet ut ne carne redundent, sed aliquanto cauius ad cicatricem perueniant, praeterim si in pupilla fuerit ulcus. Nam supereminentes cicatrices uisum impediunt, & deformitatē afferunt, & dum ex palpebris punguntur, fluxiones inducunt. Quae uero aliquantulū cauae sunt, melius apparent ac splendorē excipiunt, & decorae si fuerint partim concolores. Tales autem consequuntur, si à mollibus & meatibus obstruentibus pharmacis, compendio ad cicatricē inducentia transeamus. Praestat autem si aliquādo clandestinè caro superexcreuit, citò reprimere ac eminentias attenuare, & sic cicatricē inducere. Vitanda autem sunt tingentia cicatrices pharmacum, & maxime si iuxta pupillam fuerit ulcus: dū enim denigrantur impediunt uisum. Sed & deligationes oculorū in ulcerationibus uitandae sunt, quibus alii qui utuntur uolentes humiliare cicatrices. Deligatus enim exulceratus oculus, & immobilis factus, saepe palpebris agnascunt. Porro ulcera ad cicatricē perducta diligenter notare oportet. Quidam enim decipiuntur, & cauiiores factas cicatrices, caua ulcera esse putantes, mollia & replentia collyria illinunt. Deinde contingit locos quidē non impleri, uerum tunicas ex hoc crassas fieri. Quum itaque perficiem ulceris claram factā uideris, & albam ac leuem. Et album oculi naturalem colorē recepisse, & totum oculum à fluxione liberatum, scito cessasse iam ulcus, & cicatricem inductam esse. Est autem optimum collyrium quo usi sumus in puris ulceribus & cicatrice indigentibus, quod Cleoni inscribitur.

De cicatricibus & albuginibus.

Cap. xxxvii

Omnes cicatrices in nigro oculi albae apparent. Densata enim corniformi tunica subiectus ipsi caeruleus color non translucet. Maxime tamen supereminentes albescunt. Aequales autem minus sunt albae. Cauiiores uero quodāmodo cōcolores sunt nigro. Quae uero adstringentibus pharmacis usque ad inducā cicatricem curantur, magis obscurant, eo quod pelliculae per adstrictionē multū densantur. At uero callosas ac diuturnas & crassas cicatrices curare nō oportet. Necesse est enim in talibus, collyrijs ualde acris uti, & à uehementi mordacitate aliae oculi partes ulcerabunt. Si uero etiā suffusio aut glauco affuerit, uanū est cicatrices extergere. Oportet autem eum qui cicatricē exterere uelit per uictū corpus accommodare, quo moderata materia & boni succi, in toto corpore adsit. Itaque ab omnibus acris abstinere oportet, salisque ac crassi succi cibis. Et à multo uino. Et bonae concoctionis maxime curam gerere, & moderatē boni succi edulsi uti. A balneo uero curationis tempore abstinendū est. Illitio autem facienda est ante cibum ubi

ubi probe concoxit, & capite ac toto corpore levis est, ventris onere prius deposito, & non statim à lecto ad illitionem transeundum, neq; ante coenam. Vitanda sunt excooriantia cicatrices pharmaca. Quidam enim illinentes ipsas acerbis medicamentis, & excoriantes, ac candida ramenta per spongas detrahentes, ea in coticulis nigris circumferentes ostentant. Deinde illinunt aliquod medicamentum quod tingere potest. Verum fluxionibus succedentibus ex pharmacorum acrimonia, itemq; inflammationibus, & aliquando resolutis cicatricibus, ulcera magis profunda fiunt. Deinde cogantur rursus adstringentibus ac meatus obstruentibus collyrijs uti, et cicatrices magis crassas faciunt.

Materia attenuans cicatrices & albugines, Galeni Cap. XXXVIII

Proinde in his quæ attenuari possunt, utendum est pharmacis moderate extergentibus. Exterforia autem non minima facultate, participat æstus ustum, & squama aris, & flos eiusdē, & chalcitis usta. Si uero lota fuerint talia, exterforia quidē adhuc manent. Tanto uero imbecilliora actionibus fiunt, quanto etiam leuiora. Securius est autem leuioribus uti. At fortiora his sunt, Misy, & ærugo. Quare etiam ad sycoses & callos conueniunt si ammiscentur. Quidam his adhi- ciunt etiam gallas, pharmacum uehementer adstringens. Sed uehementius est adstrictione simulq; acrimonia atramentum sutorium. Multo uero moderatius euadit ustum ac lotū. Eiusdem materiæ est & squama ferri stomomatis, Quæcū- que igitur ex adstringentibus multum terream compagem habet, aspritudines sycosesq; ac callos eliquant, uelut sunt Misy, & ærugo, & similia. Quæ uero ex succorum genere sunt, uelut omphacium & hypocistis, glauciumq; & acacia, in subliationibus facile cum lachryma eluuntur. Citra mordacitatem autem extergent, cornu cerui ustum, & cornua caprarum. At thus tardissimæ particeps est extergendi facultatis, eximitq; dolorem ac concoquit. Prædictorum uero animalium cornua, exterforia quidē sunt, sed neq; uim eximendi dolorem, neq; concoctoriā habent, quum frigida ac sicca sint temperaturæ. Thuris autem cortex adstringit quidē & ipse non instrennuē, sed multum omnibus prædictis inferior est. Thuris uero inter onera contracti pollen, quod mannam dicūt, differt à thure, eo quod modicam adstrictionem assumpsit. Parua enim quædā corticis segmenta ipsi ammixta reperiuntur. Habet & armenium appellatum uim extergendi, quo uidelicet utuntur pictores. Item atramentum indicum, & propterea ulceribus non inflammatis citra molestiam adhibetur. At aloë mixtæ facultatis est, uelut etiam rosa. Habet enim amarum quiddam, quod extergit. Habet & adstringens quiddam, quo contrahit ulcera & ad cicatricem ducit. Sal uero ammoniacus, & lapis Asius, & flos ipsius, fortissima sunt pharmaca. Quare etiam ad scabras oculorum affectiones conueniunt. Cæterum ex aromaticis commodè his miscentur, casia & malabathrum, ac amomum, discussoria quidē facultate prædita, uerum etiam adstrictione participantia. Nam in communi de omnibus exterforijs medicamentis nosse oportet, quæ moderata sunt, & quæ sycoses ac collas consumunt, ea omnia etiam ad cicatrices crassas conueniunt.

Auxilia ad cicatrices & albugines

Cap. XXXIX

Ad albugines dracunculi semen habentis occultatum in terra simile piperi, idipsum semen accipe, & tritum cum melle illine. Aliud, ad cicatrices & hebetudinem uisus. Seminis rutæ scrup. II, armeniāci scrup. VII, salis ammoniaci scrup. III, ammoniaci thymiamatis scrup. III, utere sicco. Aliud, Cicatrices recentes exterit citra omnem molestiam, lac equinum cum modico melle assidue illitum: Aut anethi florem purpurascens cum modica aqua terito, & per

G lintecum

lintheum excolato, ac succum oculo bis in die instillato. Et postea cucumeris hor-
 tensis semen commande, & expressum per linteolum succum in oculum instilla,
 & hoc assidue facito. Aliud ad albugines, Sideritidis herbae fructum leuiss-
 sime tritum insuffla. Deinde comprehensum manu oculum, frigida aqua paululū
 prolue, Exterget etiā generose; Alcyonium milesiū cum melle, Ammoniacum
 thymiamā tritū cum uino & melle. Quod si puero paruo albugo facta fuerit in
 oculo; Mater pueri ammoniacū cōmandet, & in pueri oculum sufflet. Facit &
 Anemones radix bulbiformis leuissimē trita illita, Et anagallidis ceruleū florem
 habētis succus cū melle. Aliud Capnī Chelidonī appellati succus cum melle.
 Nitrum cū oleo ueteri, mentē succus mirifice facit, Columbæ fimus in cote cum
 aqua dilutus præter opinionē facit, Itē felis fel illitū. Aliud ad albugines certū.
 Butyrū liquefactū solū illine, summe prodest, & utere. De hoc plura promittere
 nō oportet, omnē enim promissionē uincit. Aliud optimū, Lac muliebre, melā
 teriam ex clauis uetustis ac aceto paratā, mel bonū, hæc tria æquis portionibus
 simul mixta et excolata adhibe uelut diuinū pharmacū. Aliud, Rumicis hortēlis
 & plātaginis semen in testa exurito, & cinerem exactē terito, ac utitor. Aliud,
 Crocū, piper, æquali pōdere lenissimē trita, cū felis felle in collyria redigito, & in-
 titor. Aliud, Pullorum hīrundinū capita detracta in olla exurito ac terito, & in
 corneo uase reponito, ac utitor. Est enim utilissimū auxiliū etiā ad percussos ocu-
 los illitū. Aliud, Lapidē sarcophagū appellatū, ex quo loculos defunctorum ma-
 gnos faciūt, tundito, cribrato, & cū sputo ipsius ægri præsertim ieiuni terito, ac
 cōfidenter illinito. Aliud, Vitulæ fel hemine mensura ad ignē modice coquito,
 & optimi mellis parem mensurā adijcito, & myrrhæ drach. II. croci drach. II. simul
 terito, ac rursus in æneo uase sufficienter coquito, & in pyxidem areā reponito,
 ac utitor. Aliud, Lapidis magnetis uiui, lapidis ophitæ, stibij, æquas portiones tu-
 fas, cribratas, ac rursus pbe tritas, niçteridis herbe succo ac optimo melle addito,
 illine per specillū ex lapide sarcophago factū. Aliud, Galbanū cū melle liquefa-
 ctum ac simul tritum adhibeto. Aliud collyriū, tollit albugines mirifice ac cito.
 Squamæ ferri stomomatis drach. II. aluminis scissi drach. II. gummi uermiculati
 drach. III. terito ex aqua, & formatis collyrijs utitor. Aliud, Rhāni succū, si fieri
 potest de semine, sin minus, de folijs, sextantē, ammoniaci thymiamatis unc. I. testa
 rū sepiæ unc. I. mellis attic sextantē. Trita excipe ac utere. Quidā solū ammonia
 cum cū rhāni succo terentes illinunt. Ipse uero succus per se illitus cicatrices tina-
 git. Archigenis collyriū ad albugines, quod ex una illitione plurimā albuginis
 partē tollit, Summe etiā facit ad omnē periculofam ac diuturnā lippitudinē. Co-
 chlearum ustarū drach. III. aeris usti drach. IIII. squamæ aeris drach. VI. squamæ ferri
 stomomatis drach. XII. æruginis drach. VI. lapidis scissi drach. I. aloës drach. I. om-
 phacij sicci drach. II. lycij indici drach. IIII. chalcitidis drach. III. myrrhæ drach. III.
 thuris drach. III. corticis thuris drach. II. croci drach. II. crocomagmatis drach. II.
 spicæ nardī drach. III. cytinorum drach. II. gummi drach. VIII. terito cum aqua,
 & formato collyria, ac utere cum aqua. Quod si aridū facere uoles, trito collyrio
 utere sicco. Facit & harmatium collyriū, & præscriptū ad mycephala ex uino,
 & his similia. Probē etiā facit ad cicatrices, inquit Apollonius, collyrium pepis
 esmenon, id est pressum appellatum, quæ omnia in tractatu de multi usum colly-
 riorum cōpositione describent. At uero theodotiū Seueri cum aqua crassum illi-
 litum, ad tantā tenuitatem perducit cicatrices, ut sensu cognosci nō possint. Op-
 ptimum aut in ipsis est succum collyriū Alexandro regi inscriptū ex croco, spica
 celtica, & terra ampelide paratum, Habetur aut inter sicca multi usum collyria.
 Albugi.

Albuginum tinctura.

Cap. XL

Iam antè dictum est quod abstinere oportet à pharmacis cicatrices tingen-
tibus. Verum ut ne ignorentur ea quæ hoc facere possunt, etiam horum mentio
facienda est. Gallam inquit tritam repositam habe, & usus tempore nucleum spe-
cilli calefacito, & eo de pharmaco excipito, ac albugini admoueto. Postea uero
atramentum futorium aqua dilutum adhibeto. Aliud, Malicorium tritum ad-
moueto, & postea atramentum futorium cum aqua tritum. Aliud, Mali puni-
ci dulcis carnem tritam modica aqua adstillata, & leuissimam factam reponito.
Et usus tempore, ubi hanc sæpe affricueris, & præadstrinxeris, hyoscyami succum
cum illinito, ad dies x v, hoc & tingit albugines, & dissipat, multoties illitum.

Aliud, Facit et ad glaucos oculos, Misy cum aqua tritum in collyria redigito.
Similiter autem aliud collyrium ex galla formato, Vsus autem tempore, ubi per
collyrium ex galla præadstrinxeris, collyrium ex misy illinito. Aliud siccum.
Gallæ drach. i, acaciæ drach. i, atramenti futorij drach. ii, Vtere. Aliud colly-
rium, Florum mali punicæ, atramenti futorij, acaciæ, gummi, singulorū dra. iiii.
stibij drach. iiii, gallarum drach. ii, Aqua excipe. Si uero flores punicæ nō affue-
rint, id quod in ipsis malis inter grana membranæ speciem præfert iniice.

Cap. XLII

Ad glaucos oculos, ut nigras habeant pupillas.
Malicorij punici dulcis succum infunde. Deinde interstitio facto hyoscy-
ami ceruleum florem cum uino tritum instilla, aut hyoscyami succum. Oportet au-
tē debito tempore flores colligere ac reponere. Aliud, Acaciæ fructum, & pa-
rum gallarum diligenter tere, et anemones succo excipe, ut mellis crassitudo fiat.
Deinde liquorem per linteum diligenter exprime, ac repone, & utere uelut di-
ctum est. Aliud, Concuere syluestris succum illine. Hic mulieres glaucocu-
las oculis nigricantibus facit. Aliud, Hyoscyami ceruleum florem in umbra
siccato ac reponito. Vsus autem tempore florem uino austero dilutum præillini-
to: Et postea ipsum florem leuiter tritum per se illinito. Hoc uim suam statim de-
clarat.

De puerorum curatione. Seueri.

Cap. XLIII

Ingens grammarum copia in oculis puerorum reperitur, & inflantur plerūq;
horum palpebræ à materiæ multitudine. Sunt enim pueri natura humidiores ac
calidiores. Itaq; horum collyria perfrigatoria sunt, et aliquo modo resiccatoria,
participantia etiam non modica adstrictione, quo sordium copiam influentem
repellere possint. Ad tantam enim adstringendi facultatem progressa sunt pue-
rilia collyria, ut etiam aspritudines tollant. Hebetatur enim in pueris collyriorū
acrimonia à locali humiditate, & grammarum multitudine. Sed & per allabentiū
humorum copiam, propter ploratū fientē, collyria eluuntur. Est autē nobis experie-
tia cognitū in ipsis primariū et mirabile collyriū, qd recipit lapidis scissi dra. xx.
lapidis hæmatitæ drach. xx, æruginis drach. iiii, chalcitidis crudæ drach. iiii,
æris usti drach. iiii, opij drach. vi, myrrhæ drach. vi, gummi drach. xvi. Hæc
est collyrij compositio, ratione approbata, & experientia utilis cognita. Teritur
ex aqua. Sed et aliud collyrium ad ipsos utile experientia constat, quod recipit:
Lapidis scissi drach. xxiiii, Lapidis hæmatitæ drac. xxiiii, æris usti dra. viii,
ammoniaci thymiamatis drach. viii, misyos usti drach. viii, opij drach. iiii, se-
minis hyoscyami drach. iiii, gummi drach. viii. Excipe aqua. Oportet autem &
in his à principio ammiscere lenia collyria, atque sic paulatim ad efficacem au-
xiliorum facultatem progredi. Mirifice etiam ad ipsos facit theophilium collyria-
um, et quod Mono inscriptum est, quæ inter multi usus collyria habentur.

G 2 De

De aspritudinibus, et densitatibus, sycosisq; ac callis. Seueri. Cap. XLIII

Quandoquidem ratio auxiliorū cognitionem respicit, & uelut inter se con-
dependentes facultates reperit, admonet sanè eadem ut nihil aliud ab ipsis in-
terponamus. Proinde asperitates quæ etiam ab aliquibus densitates uocantur,
ex mala curatione sæpe fiunt, dum medici diutius collyria instillant. Quemad-
modum enim in externis uulneribus pinguium adhibitio, carniū quarumdā
inutilium causa est: Sic etiam in præsentī fieri cogitare oportet. Sint autem et ex
fluxione diuturna minime mordaci: Si enim acris esset, citius oculis damnum in-
duceret, quàm palpebris affectionem inseminaret. Fit etiam aliquando non præ-
gressis fluxionibus, neq; manifesta causa præsentē. Et sunt huiusmodi non simi-
les his quæ ex fluxionibus fiunt. In illis enim dentiores & asperiores ac cruentio-
res euerse palpebræ apparēt: In his uero uelut milij grana, aut crui parua semina
uidere est, intra palpebras exurgētia. Estq; hæc species reliquis curatu difficilior.
Differunt tamen hæc inter se: Nā densitas in superficie est & cum rubore. Aspri-
tudo uero maiorem inæqualitatem ac eminētia habet, cum dolore simul ac gra-
uitate. Ambæ autem oculos humectant. Quæ uero Sycosis dicitur, altiores emi-
nentias habet et uelut incisas, & cui alij rei quàm ficui hianti similis est: Callosi-
tas uero aspritudo est diuturna, induratas & callosas inæqualitates habens. Qua-
dam igitur aspritudines radere conantur, partim ferro, partim folijs fici. Est autē
tem hic conatus nociuus. Amplius enim ipsas augent, & duras cicatrices indu-
cunt, & assiduarum fluxionum autores fiunt, dum semper oculi ex succedenti-
bus dyrrioribus cicatricibus punguntur. Curare uero oportet aspritudines, nullo
ulcere circa oculum existente, collyrijs ad pueros relatis, ita ut euerfis palpebris,
si nō inflammata fuerint, illinantur, & per specilli nucleum diu affricentur. Qui
enim cito ab affricione desistunt, densant magis, et oculis fluxionem inducunt.
Si uero permanserit causa, efficacioribus uti conuenit. Quale est hoc. Teste se-
pia drach. viii, punice drach. viii, rubricę sinopice, ammoniaci thymiamatis,
singulorum drach. x, gummi drach. viii. Excipe aqua. Ex huius usu magnam
laudem reperies. Statim enim ab illitione cuticulæ quædam in spongiæ admo-
tione excidunt. Oportet autem post collyrii illitionem, aquam frigidam per spon-
giam adhibere. Est & aliud collyrium ad huiusmodi affectiones, quod recipit
cadmiæ dra. iiii, squamę æris drach. iiii, salis ammoniaci drach. iiii, opij dra. ii,
gummi drach. xii. Excipe aqua. Ego uero seueriano sicco collyrio usus profeci,
cuius & tu experiētiā magistrā habebis. Apollonius autem dicit, ad exaspera-
tas palpebras utēdum est pharmacis, quibus etiā crassissimas cicatrices depurga-
mus. Quale est hoc. Aeris usti drach. viii, myrrhæ drach. i, squamę æris drach. i,
acaciæ drachm. ii, cadmiæ drachm. ii, spicæ nardi drachm. i, cinamomi drach. i,
croci drachmam i, piperis grana xvi, hyperici drachmas ii, ammoniaci thymia-
matis drachmas tres, æruginis obolos duos, gummi drachmam unā, terito cum
uino ueteri austero, & collyria formato, ac utitor. Aliud. Ad fluxiones
antiquas, & palpebras densas. Cadmiæ drach. xvi, æris usti drachmas. iiii, se-
minis hyoscyami drachmā. i, opij drachmas. ii, myrrhæ, fructus ericæ, acaciæ,
singulorum dra. iiii, gummi drach. viii. Omnia sicca leuissime terito, & lac mu-
liebre adijcito, ac simul trita in collyria efformato. Et ea similiter lacte trita cras-
se illinito, adhibito prius fomento. Liquida compositio ad aspritudines: Facit
& ad oculos suppuratos. Chalcitidis ustæ drachmas. iiii, croci drach. viii, mellis
drach. ix. Arida cū aqua terito, et ubi probè siccata fuerint, mel ammisceto ac uti-
tor. Thophili liquida. Ad omnes sycosas eminētiās, et omnē carnis extuberantiā.
Aeris

Aerbusi drach. II. misyos usti drach. I. myrrhæ, croci, omphacij, singulorū dra. I. vini chij aut alterius adstringentis ueteris, odorati, unc. sedecim. mellis Attici detentem. Sunt & alia collyria faciētia ad aspritudines. Quale est phoenix, & diosnyfus, & similia, quæ inter multi usus collyria describentur. Cæterum in quibus cum palpebrarum aspritudine, etiam tunica oculorum inflammata dolore uexantur, ammiscere oportet aliquid de exterforijs, ad propria inflammationi medicamenta: Qualia sunt collyria ex uino parata. Sedata uero oculorum inflammatione aspritudines exterere oportet. Verum in his qui ulcus habent cum fluxione mordaci, fieri non potest ut huiusmodi medicamento utamur. Corniformis enim amplius corrodetur, & uiformis prolapsus maior fiet, & uehemens dolor hominem apprehendet. Augebitur autem et malignus fluxus. In his igitur collyrium huiusmodi parare oportet. Pumicem leuissime tritum tragacantho aut gummi madefacto excipimus, & parua collaria formamus. Deinde euer sis leuiter palpebris diutius affricamus. Et postea lac infundimus, & collyrijs ad pustulas ac ulcera destinatis utimur. Cessante uero in temporis progressu fluxione, ad acriora collyria transimus, ac cum ipsis palpebras uelut dictum est cōfricamus. Miscemus etiam ad ea quæ ulceribus conueniunt, collyria ex uino, paulatim augentes ipsorum mixturam, quo neq; palpebræ uexent tunicas oculorum, et ulcera pura facta impleantur ac cicatricem recipiant.

De oculorum debilitate. Demosthenis.

Cap. XLIII

Debiles oculi dicuntur, qui neq; album, neq; splendidum, neq; igneum uidere sustinent, sed ex quauis occasione uisum continent, & lachrymantur, præsertim inter egendum. Differunt autem hi à fluentibus propter carunculæ naturalis circa magnum decrementum: fluentes enim hoc modo, etiam citra aliquam externam causam lachrymantur, hi uero occasione aliqua oblecta. Curandi uero sunt deambulationibus, cursibus, exercitijs supernarum partium, cum frictione & spiritus detentione, capitisq; rasura, ac leui oculorum frictione post exercitia, & frigide in caput perfusione. Utendum est & aquæ potui, & uictus ratione media. Conducit et legere cum clamore, itemq; sic scribere. Si uero pharmacis opus fuerit, adstringētibus et perfrigerantibus ac meatus obstruentibus utemur.

De myopia.

Cap. XLV

Myopes dicuntur qui ex natiuitate parua quidem prope uident, magna uero procul uidere non possunt. Et qui scripta ad motis oculis legunt. Et alij quidem inæquales, alij æquales oculos habent. Incurabilis est autem talis affectio.

De Nyctalope.

Cap. XLVI

Nyctalopas uocant qui die quidem uident, occidente uero sole obscurius. Deinde noctu penitus nihil cernunt. Hoc autem magis fieri uidetur propter aliquam capitis debilitatem, et maxime uisui spiritus crassitudinem, itemq; reliquorum oculi humorum ac tunicarum. Quibusdā uero contingit, ut noctu quidem melius uideant, interdū autē deterius. Et si noctu luna appareat, nihil cernunt. Sed hoc rarū est, illud autē prius plurimis cōtingit. Curandi porro sunt qui in nocte nō uident: Si bono habitu præditi fuerint, uenæ cubiti sectione, itemq; ab angulis oculorū: qui uero uitiosis humoribus redundāt, cōueniēti pharmaco purgētur. Postea post uniuersalē euacuationem utendū est his quæ pituitā per os ducunt, & quæ per nares purgant, et sternutationes ciendæ. Narisuforium autem pharmacum ipsis commodum hoc fuerit. Piperis, staphidis syluestris, singulorum scrup. II. sinapis strup. I. tundito ac cribrato, & radicū betæ succū adficiat, ut mellis liquidi compages fiat, & contrita naribus infunde, ac attrahere iube.

G 3 Atq;

Atq; hoc ad dies v. aut vii. facito. Vtere etiā alijs quæ in nares mittuntur, in Ser-
mone de narium affectionibus præscriptis. Ante cibū uero bibāt hyssopū, origa-
nū, rutam. Diæta autē attenuatoria sit ex toto. Si uero per hæc non successerit,
rursus purgatoriū dandū est, quale est hoc. Scammonia obol. iiii. castorij obol. ii.
salis obol. iiii. In debilioribus autē scammonia obol. ii. inijce. Talis enim purga-
tio sepe euestigio ab affectione liberauit, aut multo meliorē dispositionē induxit.
Post paucos autē dies dandum est purgatoriū pituitam et bilē ducens, quale est
hoc. Colocynthidis obol. ii. scammonij obol. iiii. salis obol. iiii. Excipe in catapo-
tia sex, et medijs habitibus tria præbe, fortibus autē omnia. Oculi uero illinantur
melle cocto, & ad continendū liquorem immisum claudantur. Aut oleo uetustissi-
mo similiter illinantur. Aut aluminis scissi in testa exusti drach. ii. salis ammoniaci
aut cappadoci dra. i. terito et cū melle illinito, aut cū lacte muliebri. Aut hyænæ
fel cum melle. Vitandus tamē est frequentior acriorū pharmacorū usus. Assidue
uero utendū est oleo uetustissimo. Putatur ipsis prodesse hepar hirci assatum, cū
sale citra oleū, calidissimū comestū. Quidā etiā destillante ex hepate dū assatur sa-
lie ipsos illinūt. Aliqui hepar coquūt, et oculos super elatū uaporē detinētes, hoc
fomento utūtur. Auxiliā etiā elateriū ex interuallis cū melle illitū. Et perdis-
fel aut capræ syluestris, aut hirci. Buglossi etiā piscis fel illitū ualde prodest. At ue-
ro diæta tota attenuatoria sit. Et ab initio etiā à uino abstinendū est. Et uitāda om-
nia crassefaciētia. Ceterū in his q̄ noctu melius uidēt, interdū autē deterius, noscō
iectamus spiritū multū attenuari, aut tunicas rarefieri, atq; ex hoc spiritū dissipari,
ac uisum obscurari. Noctū uero crassefieri collegiq; ac sensum mouere. Et opor-
tet in his robur oculis addere. Herophilus tamē uice uersa in libro de oculis dicit,
ad eos q̄ in die nō uident, gūmi, crocodili terrestris sterus, misy, hyænæ fel, trita cū
melle illinito bis in die, et ieiunis hirci hepar edendum præbe. Ego uero coniecto
hoc magis facere ad eos qui noctu non uident.

De hebetudine oculorum, Galeni.

Cap. XLVII

Hebetudo oculorum est obscuritas uidendi, ob plurimas causas contingens.
Aut dum uisus spiritus incrassatur, aut dū tunica densatur ac crassefiūt. Aut
dum humores in oculo crassi ac viscosi fiunt. Cōtingit etiā his hebetudo qui diu-
turno morbo detenti fuerunt, et tristitia ingēti. At in senibus unā cum hoc quod
crassi facti sunt humores, & tunice, & spiritus uisus, etiam debilitas adest spiri-
tus uisui, & imminutio multa, ac collapsio, & uelut corrugatio nerui uisui ac tu-
nicarum in oculo densatarū ac crassefactarum. Nam dum imminuuntur humo-
res in oculo senibus ipsis, & minus de spiritu ex supernis ad pupillā defertur, usq;
adeo rugosa fit sepe corniformis tunica, ut senes partim omnino nō uideant, par-
tim male et uix adhuc cernant. Corrugationes enim mutuo inter se incidūt, et tu-
nica uelut conduplicatur, & aliā crassitudinē aduentitiā assumit. Porro auxilia in
cōmuni ad hebetudinem, ex eadē materia componuntur, ex qua etiā in incipien-
tibus suffusionibus, et partim in collyriorum formas effinguntur, partim liquida
sunt, quæ etiā induratis inflammationibus tunicarum conueniunt; partim siccā.
Horum compositiones in fine huius Sermonis habentur.

De obfuscatione oculorum, Demosthenis & Galeni.

Cap. XLVIII

Obfuscatio est perfectū ut plurimū uidēdi impedimentū, citra manifestā circa
oculū affectionē, pura uidelicet apparēte pupilla. Et quibusdā paulatim affectio
conflāt, alijs cōferim incidit, ut minimū aut semel in totū nō uideāt. Et obfuscatio
nis q̄dem paulatim cōflāt plures causæ sunt, de hebetudine iam relatæ. Eius ue-
ro

ro quæ confertim incidit, causa est obturatio nervi uisui, crassis ac uiscosis humo-
 bus cōfertim ipsis illapsis, aut eiusdē nervi resolutio. Præcedūt affectionē assiduæ
 cruditates, et meri potus, insolatio, capitis inustio ac ardor, aut perfrigeratio. Aut
 assidua lectio post cibū, aut balnea similiter assidua post cibū. Et uomitus intēpe-
 stui, coitus immodicus ac intēpestiuus, spiritus detētio uiolēta, quæadmodū in tu-
 bicinibus cōtingit. Hæc enim et his similia, dū modicē sūt, uisus hebetudinē effi-
 ciunt; dū uero immodicē, obfuscationē. Fit etiā aliquādo obfuscatio ob fortes ca-
 pitis plagas, aut casus ex alto, resolutio quādoq; neruo uisui, aut rupto, aut quod
 omniū mitissimum est, humorū copia per uehementem concussionē illata, et uisi-
 uum neruū obturante. In resolutionibus igitur nerui, tarde mouetur oculus, aut
 omnino non. Quum uero ex uiolenta plaga in caput facta, aut ex casu, à cerebri
 cōnexu ruptus fuerit neruus, primū quidem oculus prominentior fit, deinde ca-
 uatur & alimentū non sentit. Quum autem ob humorum crassorum aut uiscos-
 forum copiam, neruus confertim obstructionem sustinuerit, absq; alia causa, ne-
 cesse est capitis grauitatem consequi, maxime in profundo iuxta radices oculo-
 rum. Eos igitur quibus oculi confertim obfuscantur curare oportet, uena cubiti
 incisa, si plenitudine grauatus fuerit æger. Validissimū enim auxilium in ipsis est
 uenæ sectio. Deinde interpositis aliquot diebus, fasciam collo circundabimus ac
 constringemus, & postquā frontis uenæ eleuata fuerint, rursus exoluemus, et
 hoc iterū atq; iterū faciemus: quo per spiritus motū, humores obturati uiolēter cō-
 cutiantur. Postea eleuatas angulares uenas, ab utraq; nasi parte secare oportet, et
 fortem euacuationem facere. Ego enim ad tres heminas ex angularibus uenis
 aliquādo euacuaui. Post hæc cōfertim cucurbita occipitio affigēda est cū scarifi-
 catione. Contingit enim plerūq; statim incumbente adhuc cucurbita hominē re-
 spicere. Sed non oportet hoc auxilio cōtentum esse, uerū reparatis uiribus, post
 tertiam diem purgare. Deinde ad dietam deducere. At uero in his quibus paula-
 tim per multū tēpus oculi obfuscantur, præmissa recta uictus ratione, à uenis an-
 gularibus euacuationē, uelut dictum est, faciemus. Et in his qui nō multo sangui-
 ne abundāt, statim ab initio ab angulis auferat. Deinde cucurbita occipitio affigā-
 tur. Ex postea purgatio fiat. Per dietā uero maxime aluū facile solubile facito per
 cibos, bonæ cōcoctionis præ omnibus ratione habita, per aliquot autē dies dan-
 da est aloë deuoranda, terebinthina excepta in catapotia, facit & cnici succus cū
 melle. Utendū est et exercitijs infernarum partiū, et deambulationibus pluribus
 in umbrosis locis. Vitandus est uini potus, et aquæ potio, uiriliter toleranda. Vi-
 tandus est etiā omnis cibus crassefaciens, & assiduus coitus, & capitis insolatio.
 Neq; uero balneū conuenit, neq; somnus diurnus, neq; uehementior à cibo mō-
 tus, neq; legere aut scribere. Vitandæ sunt iræ, indignationes, & curæ pertinaces,
 et uehemētes perturbationes, ac timores, præsertim post cibū, et assidui uomitus.
 Quotidie autē proluenda est facies aqua frigida, præsertim pluuiali, et illinendum
 corpus per alios. Perseuerate uero affectione, etiā per naribus foria caput purge-
 tur, ita ut naribus infundamus quæ ad capitis dolorē dicta sunt. Utendū est & pi-
 tuitam per os detrahentibus ibidē relatis. At uero illitio oculorū, diuturna ita exi-
 stente affectione, primū per simplicia fiat, ueluti per mel nō fumosum, aut oleū ue-
 tus: postea etiā cōpositis utendū est. Nos autē laudē assequuti sumus in ipsis ex Dia-
 centeti collyrij usu, et liquida Aglaidæ cōpositione ad suffusiones destinata. Cō-
 mune uero ad omnē obfuscationē ac hebetudinē hoc est. Videat autē ad mēbra
 narū crassitudines facere. Croci dra. i. myrrhæ dra. i. piperis grana x v. spice nardi
 obol. i. i. succi fœniculi dra. x vi. ammoniaci thymiamatis dra. i. mellis quincūcē.

G 4 Ad

Ad omnia leuissime trita fœniculi succum affunde, deinde tere ac resicca, & am-
xto melle ænea pyxide excipe, ac utere. Ante illitionem uero, fomentum per spō-
giam in aqua calida marina tinctam oculis adhibendum est. Aliquando etiam
tota facies in marinam tepidam immitenda est. Atq; hæc quidem communia in
omni obfuscatione. Cæterum his quibus ob coarctationem multorum aut cras-
sorum humorum ad neruum delatorum, uisus impeditur, post uenæ sectionem,
& cucurbitæ admotionem, & purgationem, caput sinapisino integendum est.
Et postea etiam caustico pharmaco occiput exulcerandum. Et capitis ex aqua ca-
lida perfusione utendum. Præstat autem salsuginosam aut nitrosam esse aquam.

De resolutione oculorum.

Cap. XLIX

Non solum neruus uisus, uelut prædictum est, sed etiam totus oculus alia
quando resoluitur, aliquando cum reliqui corporis dextris aut sinistris partibus
resolutis. Aliquando uero priuatim circa solam palpebrā fit resolutio. Aliquan-
do uero etiā totus oculus resoluitur. Et siquidem palpebra fuerit resoluta, oculus
semper conclusus est, & palpebra non sentit. Si uero totus oculus resolutus fue-
rit, motus ad dextram ac sinistram, sursumq; ac deorsum perficere non potest. Et
si quis acrius pharmacum sublinat non percipit morsum. Si igitur palpebræ so-
lius fuerit resolutio, præpurgato per aloëdaria uniuerso corpore, & post aquæ
potus & frequentioris deambulationis, ac multæ infernarum partium frictionis
usum, palpebra assidue alumine scisso cū acri aceto illinatur, & collyrijs calidis
tribus, aut eo quod ex sandice constat. Quod si hinc non restituatur, sursum suæ
re ipsi oportet. Totius autem oculi resolutiones ægrè curabiles sunt, maxime
in ætate proiectis. Si uero ex natiuitate contigerit resolutio, impossibile est hanc
corrigere. In quibus igitur salutis spes est, talis curatio facienda est præ omnibus:
si bono habitu præditus fuerit, uena cubiti secetur: Deinde auus per clysterem
eluat. Postea purgatorio corpus euacuetur. Deinde pituitam per os ducentia-
bus utendum. Deinde per ea quæ naribus induntur purgandum. Postea cucur-
bita occipitio affigenda cum scarificatione. Et hirudines temporibus admove-
dæ. Propinandum etiam castorium per se, & cum absinthio. Dandum & pule-
gium, hyssopum, ruta, cum aceto mulso ac sale. Postea caput castorio illinatur, cū
rosaceo & aceto. Et ex eodē ungento, mollis lana imbuta, oculo clauso impona-
tur, cauendo ne in oculum instellet. Atq; hæc curatio bis in die fiat. Palpebræ ue-
ro forinsecus & frons, castorio cum croco ex aceto illinantur. Mihi uero uide-
tur liquidæ ex castorio ac melle ad affectionem commodæ, quæ compositiones
et sublinendæ & superlinendæ sunt. A uino uero, & carnosio multumq; nutrie-
ntē ac crassi succi cibo omni abstinendum est, et assumendi qui excretiones fac-
ile solubiles faciūt, ac humores attenuāt. In primis temporibus uitanda sunt etiā
ieiunia à raphanis, deligatio oculo, & citra multam lincinationem.

De glaucedine.

Cap. L

Glaucedo duobus modis dicitur. Glaucedo enim proprie mutatio est cris-
tallini humoris ad glaucū colorem, siccitasq; ac concretio. Altera autem glau-
cedinis species ex prægressa suffusione, fit humore iuxta pupillam uehementissi-
me congelato ac resiccato. Et hæc species incurabilis est. At proprie dictam glau-
cedinem incipientem aliquando sanare datur, ex deambulatione pro uiribus,
& totius corporis frictione, ac lauacris maxime capitis. Aestate uero etiam frigi-
dæ lauacrum conuenit, & tonsura capitis ad cutem. Oculi uero solo oleo anti-
quo sublinantur.

De

De Suffusione, Ex Demosthene.

Cap. LI

Suffusio est praterfusio humorum circa pupillam congelatorum, ut ubi perfecta fuerit, uisum impediatur. Incipiente uero suffusione talia ægris accidunt. Velut culices parui caliginosa quædam oculis sepe obseruari uidentur. Et quidam ex ipsis piliformia uident, alij uelut lanarum filamenta, aut araneorum texturas. Quibusdam circa lucernas circuli apparent. Hæc aut ubi apparuerint, aliquando pura pupilla apparet his qui negligentius considerant. Aliquando uero colore maris refert. Augescēte deinde affectione, augescunt etiā accidētia: perfecta uero eadem, homo non uidebit, pupillæq; colorem ad albedinem mutat, & omnino non transluet. Plures autem sunt coloris species. Quædā enim suffusiones aërem assimilant, aliquæ uitrum referunt, aliæ albicantes sunt, aliæ ad cæruleum colorem magis mutantur, aliæ glaucescunt, quæ etiam incurabiles sunt. Curant aut sunt qui suffusione tentantur, in principio sanguinis de cubito detractione. Et si nihil impedit, etiā clysteribus acrioribus, & purgatiōibus. Deinde quoq; cucurbita occipitio affligenda est cum scarificatione, & pituita per os detrahentibus, ac naribus forijs, ex interuallis utendum. A uino uero abstinendū est per totā curationem, & ab omnibus replentibus caput. Itēq; a balneo, nisi quis lassitudinis ac tardæ concoctionis gratia ad lauandū se cogatur. Et tunc omnino nō in aëre balnei moretur, neq; in folio morā trahat. Sed paululū insecēdat, & cito exeat. Diæta uero omnis sit attenuatoria. Medicamētis aut utendū est, primū simplicibus, uelut melle, et oleo ueterij, ac scœniculi succo. Deinde etiam compositis liquidis ac siccis collyrijs, quæ paulō post describentur inter communia auxilia.

De midryasi, hoc est pupillæ dilatatione.

Cap. LII

Pupillæ dilatatio appellatur, quā pupilla colore quidē nihil abalienat, multo uero latior quā pro naturali modo euadit, ut aliquando ad iridis circulum accedat, & quādoq; in totū uisum impediatur. Aliquādo tamē uident, uerum obscurare, & quæ uidetur ab ipsis, omnia minora putantur, diffusio uidelicet spiritus uisui, fit hæc affectio propter humorum allapsū, qui aut acuatim, aut paulatim fertur, a quibus citra sensum uisiformis tunica distenditur, & pupilla amplius dilatatur. Est aut affectio ualde ægre curabilis. Quā enim mēbranosa sit tunica uisiformis, ubi semel distēta fuerit induratur, neq; facile amplius cōtrahi potest. Accidit aut affectio hæc magis pueris, propter tunicarū debilitatē. Sunt et quæ ex natura nigros oculos habent, magnas etiā pupillas habēt. Quapropter facile in hæc affectionem delabuntur. Curanda est aut affectio, si nihil impedierit, uenæ sectio ne in cubito, aut purgatione. Si uero hoc fieri nō poterit, angulares uenæ soluantur. Deinde cucurbita occipitio affigatur. Utendū est & deambulationibus lētis ac pluribus, in locis umbrosis. Et omni modo conandum ut materia ad infernas partes detrahatur. Quapropter in principio etiā clysteri utendū est, & infernarū partium fricatione per alios. Post deambulationē et inunctionē, facies aqua marina prouatur, hyeme tepida, æstate frigida. Tota etiā facies in aquā mittatur oculis per tempus quoddam apertis. Quod si marina nō adsit, parum salis aquæ misceatur, aut posca aquosa assumatur. A uino abstinendū est donec affectio fuerit soluta. Et tota diæta tenuior sit et uentri commoda. Balnei usus rarior sit, & tunc caput non ualde perfundatur. Pharmacis utendum est subadstringentibus, uelut rosa, croco, nardo, thuris cortice, pompholyge, spodio et acacia. Nā ualde acres pharmacorū facultates, humorū copiā attrahentes, distendūt mēbranas, & latiorē pupillā efficiūt. Quapropter et quæ uehemēter adstringūt, uelut est chalcitis, misy, et quæ amplius frigefaciūt, uelut cicuta, mēbranas indurāt. Sed et amplius cōtra

heret

hiere ac coarctare pupillam in commodum est. Nam hæc res pupillam ad tabem perducit.

De tabe pupillæ.

Cap. LIII

Tabes pupillæ dicitur, quum angustior & hebetior facta fuerit. Hoc autem plerisq; contingit ex periculosis debilitatibus, aut ingenti capitis dolore. His autem maiora apparent quam pro naturali modo, quæ ab ipsis uidentur, propter pupillæ angustiam. Curationem porro in his contrariam midryasi facere oportet, ita ut exerceamus supernas partes, humeros ac manus, cum spiritus detentione. Et caput ac faciem diligenter confricemus. Deinde oculos summis digitis. Facies etiam aqua calida proluatur. Et caput ungento quodam moderate calefacere potente illinatur, quale est irinum. Et modico facio interstitio, oculi rarefaciente, & acriore, ac humiditate attrahente pharmaco sublinatur. Quale est hoc collyrium. Ammoniæ thymiamatis drach. i. crocomagmatis drach. iiii. croci drach. ii. æruginis drach. iiii. Trita cum aqua efforma et utere. Facit et Erasistrati liquida compositio. Victus sit optimi succi & forbilis. Vinum fuluum & odoratum. Somnus excipiat cibum. Sed et balnea conueniunt, & capitis ex aqua calida perfusio.

De Macie oculi.

Cap. LIIII

Oculus macer esse, & alimentum non sentire dicitur, quum ex uehementi capitis dolore, aut in febribus acutis, paulatim humiliatur & cauatur, & in totum minor sit, & aliquanto obscurior, & uisum impedit. Cōtingit autem hoc sæpe ex calidæ incisione & perforatione. quando sanè etiam ægrè curatur. Differt autem macies à tabe, quod tabes pupillam solam minorem facit: macies autem totum oculum minorem & humiliorem efficit. Curandi porro sunt sic affecti, spongiatum ex calida aqua expressarum circa oculos fomento. Lac quoq; tepidum ipsis infundendum, et ab omni collirij adhibitione abstinendum. Cibi dentur ipsis multum nutriētes et optimi succi. Vinum sit fuluum & tenue. Utendū est balneis, & capitis ex calida aqua perfusione. Exercitijs item partium supernarum, & spiritus detentione.

De expressione oculorum.

Cap. LV

Exprimuntur oculi aliquando ut prominentes permaneant. Et hoc contingit his qui strangulantur, & in athleticis certaminibus, & sceminis quæ in partus doloribus amplius distenduntur. Aut ex fluxionibus plurimis, quæ acerrime à capite defluerunt. Qui igitur ex strangulatione in hoc inciderunt, his uenæ cubiti secetur. Si uero aliās crassi humores influentes oculos impetuerunt, purgantur ueratro nigro, aut scammonia. At expressiones oculorum in sceminis ex partus doloribus sæpe cōtingentes, purgationes per locos muliebres soluūt. Quare has procurare oportet. In uiris aut post uenæ sectionē, aut purgationē, si permauerit affectio, cucurbita occipitio affigatur, & aquæ potus exhibeatur, & eis ubi contrahantur. Oculo uero imponatur lana melle imbuta cum modico croco, et hapsus lanæ superimponatur, & placida compressionē deligetur. Conducit his etiā post principium, aqua marina frigida faciei affusa, & intybi succus, ac polygoni, & psyllij cum opio illitus. Et quæcunque alia comprimere ac contrahere possunt.

De confusione.

Cap. LVI

Confusio oculi plerumque ad uehementes plagas consequitur. Sed et ex uniformis tunicæ inflammatione contingit, ruptis in ipsa uasis. Pupilla uero colore turbida fit, & aut maior, aut minor seipsa euadit. Curandæ igitur sunt confusiones ex plaga, per uenæ in cubito sectionem. Et totus oculus sanguine recens mactati turturis, aut in illius penuria, colūbe expleatur. Et mollis lana in oculo effi uiuo et rosaceo coquassato madefacta imponatur ac deligetur. Et postera die idem

idem fiat. Tertia uero fomentum adhibeat, & lac instillet. Postea ouorum assatum utelli imponant, cum melle & croco trito, linteolo illiti. Quum autem pupilla iam purgata fuerit, collyria ad antiquas affectiones destinata sublinant, quale est aromaticum, & chiacum Apollonij, & similia. Facilius autem curatu est consusio in his quibus pupilla sola ampliatur, colore uero & figura simili permanet. Difficilius autem curatur in his quibus pupilla diuisa est.

De his quæ in albo oculi nascuntur.

Cap. LVII

Omnia quæ præter naturam in albo oculi nascuntur, quæ quidem doloris exortia sunt, in quibus pili sepe exoriuntur, & quæ non ualde à naturali colore euariant, curabis hamo apprehendens ac extendens, & postea scalpro pterygijs destinato ressecans. Deinde salem tenuem inspergens, & lanæ hapsum imponens ac deligās, & reliquam curam adhibens uelut in pterygiorum resectione. Quæ uero subrubra, & tumida, ac uaricosa sunt, dolorificaq; & aspera, & tempora per consensum afficiunt, ea omnia fugere oportet uelut maligna, & pericula ac oculorum prolapsus inducentia in chirurgia.

De pterygijs.

Cap. LVIII

Pterygium, unguis latinis quibusdā uocatus, dicitur quum album in oculo amplius augetur, aut carne superexcrefcit, ex scabra quadā lippitudine, aut assiduis fluxionibus. Incipit aut huius augmentum, sepe quidē ab angulo magno appellato iuxta nasum: Rarius aut à paruo: Et adhuc rarius generatur à supna aut interna palpebra. Extenditurq; usq; ad nigrum. Quum uero maius factum fuerit, etiā pupillā cōtingit, & uisum impedit. Facilia uero curatu sunt pterygia albicantia, & angustū fundum habentia. His uero cōtraria, ægre curant. Nā subrubra post curationem chirurgicā, cariem ac dolores dimidiæ capitis partis inducunt, atq; post symptomatū sublationem oculus liberat. At pterygia in quibus etiā principia sunt suffusionis curare non oportet. His enim sublati, citius suffusio cōflatur. Sed neq; crassa pterygia curanda sunt, & euerfa, & eminentia, ac indurata, & quæ tempora per cōsensum afficiūt. Sunt enim maligna & cācerata. Quæ uero usq; ad pupillā ptingunt, & ppter ea uisum impediunt, si tollātur liberant quidē oculū à fluxionibus, cicatrix aut quæ ex chirurgia iuxta pupillā succedit, nihilominus uisum impedit. Ceterū ex pterygijs ea manu curare oportet, quæ aucta ad nigrum se extendunt: Quæ uero parua & in albo sunt, ea conandum est ut pharmaciā cōprimamus.

Pharmaca ad pterygia.

Cap. LIX

Pterygia probe deprimit siccū ad scabiē destinatū, ex chalcitide & cadmia cōpositū qd ad scabros angulos descriptū est. Et theodotiū collyriū Seueri tritū ac siccū adhibet, & oīa extensoria collyria, ad aspritudines & sycofes descripta, & quæ ad myocephala & staphylomata cōueniūt, maximē ex uino parata. Archigenes aut ad pterygia inq; atramentū sutorij dra. II, salis ammoniaci dra. II, gummi drac. I, terito ex aceto, & collyria formato ac utitor. Aliud celebre quod celeriter ipsa cōsumit. Chalcitidis ustæ ut fulua euadat, drac. IIII, croci drach. I, tritis utere siccis. Aliud, experientia cognitum. Chalcitidis ustæ drac. XX, cadmiæ drac. X, squame aris rubri drac. I, piperis drac. I, utere. Aliud, ex fundo tollēs pterygia. Atramenti sutorij torrefacti drach. II, aris usti drach. I, siccum adhibe. Et post detractionem, collyrio ex rosīs cura, aut ex croco collyrio. Aliud, Magne tem lapidem uiuum diligenter terito, & semel in die utitor. Aliud, Populi nigræ succum cum duplici melle illine. Aliud, Atramentum sutorium cum fellē suillo, æquali pōdere trita illine. Aliud, Sepiæ testas uistas, cū sale ammoniaco, æquis portionibus tere ac utere. Aliud, facit & ad sugillationes & hebetudines lapidis

lapidis magnetis uiui drach. iiii. æruginis drach. i. miniij Sinopici drach. iiii. ammoniaci thymiamatis drach. iiii. croci drach. ii. Mellis quincuncem. Hoc etiam ad albugines facit. Aliud. Glaucium tundito, cribrato, & modica aqua terito, & sufficienti pompholygis cinere addito, collyria formato. Et utere cum aqua bis per diem. Aliud. Aesustum cum pueri incorrupti urina terito ac utitur, Aliud. Squamæ æris rubri, nitri rubri, punicis, cimoliæ, singulorum drac. iiii. Terito ex aceto donec siccentur, & utere. Reponito autem in testaceo uale puro.

Chirurgia pterygiorum.

Cap. LX

Ad pterygij uero sublationem ita chirurgiam aggredimur. Palpebras inter se disparamus, & hamulo circa medium pterygij transfixo, leuiter distendimus ut ne cuticula corniformis tunicæ eleuetur. Simul enim sublata maximas inflammationes inducit. Deinde acum accipimus, quæ filum & pilum equinum transmissum habet, & hanc distento per hamulum pterygio subiicimus. deinde deligatum per subiectum filum pterygium distendimus, filum leuiter sursum trahentes, & fili principium ministro industriè tenendum præbentes. Nos autem utraq; manu pilum tenentes, sursum ac deorsum ipsum commouemus, & pterygium subexcoriamus, initio à nigro facto usq; ad angulum. Deinde continuate ipsius ad nigrum exoluta per pilum, & distenta per filum, scalpro ad pterygia destinato funditus auferimus pterygij partem iuxta angulum, palpebras & angulum cauentes. Quibus enim palpebræ simul inciduntur, his concretiones fiunt. Quibus autem funditus angulus refecatur, his naturalis eius loci carnis decrementum succedit. Si uero fundum pterygij fuerit relictum, regeneratur, si non pharmaco aliquo ex prædictis fuerit consumptum. Congruentis igitur modi coniecturam facere oportet. Quod si ægri formidolosi oculos aperire non fuerint ausi, hamulo supernæ palpebræ submisso, leniter ipsam extra distendimus, atq; sic uelut dictum est operamur. Post detractionem uero, muriam acriorem oculo infundimus, deinde lanam ouo imbutam imponimus, & oculum deligamus. Sequenti deinde die soluimus, & moderato fomento adhibito, album ac tenerum Seueri collyrium infundimus. Quartâ uero collyrijs ad affectiones commodis utimur, de cætero uitantes tenera & incarnantia collyria. Sunt autem ad affectiones commoda, nardina & theodotia, & omnia ex uino fientia collyria.

De carnis in angulo magno incremento.

Cap. LXI

Encanthidem uocant, quum magnus oculi angulus ad nasum auctus carne superexcreuit, id quod maximè in canibus contingit. Verum in hominibus recundat, qui in mari uersantur. Proinde si benignum fuerit hoc carnis incrementum, dolore uacat, & tenerum est ac laxum: Si uero malignum, durum erit & inæquale, & dolores punctorios inducet. Oportet autem benignum curare ac paruum phatmacis siccis, tum eo quod ex cadmia & chaltitide ad scabros angulos paratur, cum hoc ipso quod optimum est. Aluminis scissi, misyos torrefacti, atramenti sutorij, partes æquales. Hoc egregie consumit omne carnis angulorum incrementum. Vtere etiam theodotio Seueri collyrio, sicco trito adhibito, & eo quod ad myocephala ex uino paratur.

Chirurgia incrementi carnis in angulo.

Cap. LXII

At uero maius & malignum carnis in angulo incrementum, uolfella appropinquans refecare oportet. Si uero maior fuerit eminentia, acum duplex filum habentem transmittere ad fundum oportet, deinde filum constringere, & paruo interstitio facto, donec caro liuescat, scalpro auferre, & siccum scabiæ destinato adhibere: & hapsum lanæ aut conduplicatum linteum superimponere, uero

uero die fomentū adhibere. Et post tertiam mellis usu curam absoluerē. Cauendū est autem ne unā cum carne præter naturam aucta, etiā ipsum angulum funditus tollamus, alioqui rheas, hoc est naturalis carnis in angulo decrementum succedet.

Cap. LXIII.

De sanguinis ex angulis eruptione. Fit & sanguinis ab angulis eruptio, maxime pueris, ob assiduos eiulatus ac distentiones apertis circa palpebras uasis. Curandi autem sunt poscæ frigida aut aquæ frigida perfusione, tum super angulos, tum super caput facta. Infundendum etiā oui candidum per se, & cum aliquo collyrio ad tenues fluxiones conueniente. Utendum & infernarum partium deligatura & cibo crassefaciente. In perfectis autem ætatibus cucurbita occipiti affigenda est cum scarificatione.

De concretionē palpebrarum ac contractionē

Cap. LXIII

Concrescunt & agglutinantur palpebræ ad album aut nigrum in oculo, aut inter se, ulceratione prægressa. Quum igitur ad album concretio palpebrarum facta fuerit, & oculi motus impeditur, affectionem hanc Ancylosim uocant, hoc est contractionem. Quæcunq; igitur concretiones iuxta angulum factæ sunt utriusq; palpebræ, eas hamulis distentas dissecare oportet, & linamēto indito dispare. Et postea uelut communia ulcera curare. Quæcunq; uero concretiones factæ fuerint extremitatis palpebrarum ad oculi tunicas, eas cæco hamulo distendere oportet, & scalpro pterygijs destinato concretionem exoluere, deinde carnis incrementum sicco aliquo deprimere, & ære leuissimè trito palpebras sublinere, & oculum usq; ad perfectam curationem indeligatum sinere.

De pediculis palpebrarum.

Cap. LXV.

Pediculi generantur in palpebris latī, parui, multi, ex ingluuie, & illuue ac mala diæta ortum habentes. Curatio igitur adhibenda est primū, ut pediculi diligenter expurgentur. Deinde aqua marina tepida affundatur. Et postea subscriptum pharmacum loco adhibeatur. Aluminis scissi drach. ii. staphidis syluestris obol. i. piperis obol. ii. aris usti drach. i. myrrhæ obol. duos, lapidis scissi obolos tres, misyos torrefacti drach. i. terito ac utere sicco. Adhibenda præterea sunt balnea, & caput discutientibus ac corroborantibus cōfricandum. Et exercendæ infernæ partes, & uictu boni succi utendū. Similis autem curatio lendibus quæque palpebrarum adhibeatur.

De pilis pungentibus palpebrarum, & de duplici pilorum ordine, itemq; multiplici, quam phalangosim dicunt.

Cap. LXVI

Pilorum pungentium in palpebris exortum, Trichiasim græci uocant, quam sanè sub pilis naturalibus in palpebris alijs exorti, & intrò nuentes, tunicas pungunt, & oculorum fluxiones concitant. Dicitur etiā trichiasis, quum ipsæ palpebræ laxatæ sunt, aut ipsarum extremitas intrò nutat, ut pilī non facile appareant, nisi quis distendat ac disparet palpebras. Vocant autem medici palpebræ laxationem phalangosim, aut casum. Pilorum uero subcretionem, duplicem pilorum ordinem, hoc est distichiasim. Fiunt autem hæ affectiones, & præsertim duplex ordo, ex multa humiditate. Quemadmodū enim in terra largitas aquarum plurimas herbas profert: Sic etiā in palpebris, maxime ubi influentes humores minime mordaces fuerint. Si enim id quod influit falsum fuerit, etiā naturales pilos reijciet. Perfecta igitur pilorum pungentium curatio, est consultio palpebrarum sursum uersus. Quandoquidem uero aliqui ob molliciem non audent seipso chirurgiæ submittere, auxilium ferendum est ipsis quantum eius fieri potest. Veteres itaq; huiusmodi auxilia ad ipsos conscripserunt.

H Pharmac

Pharmaca ut euulsi pili non renascantur.

Cap. LXVII

Pungentes pilos euellito, & euerfa palpebra, sanguinem ranarum recentem illinito, & frigefieri finito. Aut cimicum sanguine similiter utitor. Aut chamaeleonem album urito, & cinerem sanguine ranarum excipito. Et usus tempore salua diluito, & praeuulsis pilis loco illinito. Aliud, Succum Chelidonij herbe quae etiam capnium dicitur, sufficiente gummi excipito, siccato, ac parua collyria formato, & utitor uelut predictum est. Aliud, Cochlearum carnes cum uiridium ranarum in harundinibus degentium sanguine, aut herinacei terrestres cruore terito, & atramento scriptorio moderato adiecto siccari finito. Et utere uelut dictum est, uitata pupilla. Aliud, Hirudines urito ac terito, & utitor assidue pilis praeuulsis. Aliud, Intestina terrae in testa ad cinerem exusta, ac leuissime trita, praeuulsis pilis inspergito. Aliud lacertam in olla exurito, & ad cinerem tritum par pondus sandarachae adijcito ac utitor. Aliud bonum minime molestum. Siliquas siccas non antiquas diffringito, & humorem qui in ipsarum cauitatibus uiscosior, modicus, ac melleus reperitur, specilli nucleo exceptum, praeuulsis pilis loco illinito. Atque hoc assidue facito. Summe autem facit inquit Archigenes, herinacei terrestres fel, & sanguis pari mensura, cum modico castorio. Castorium itaque leuissime tritum sanguine ac felle excipito, & uelut piscium squamas formato. Vtere autem ita ut pilos radicitus euellas, deinde squamam unam salua ex ore ieiuni dilutam euerfae palpebrae illinas, & ad dimidium horae in loco detineas donec siccetur. Dolore quidem afficiuntur aegri, sed pili non amplius enascuntur. Aliud, Psyllium & cicuta semen, ac cedriam, pari portione uespertilionis sanguine excipe, ac utere uelut dictum est, ne oculum contingas. Aliud, Linteum ex nauis uetus accipe, & in lucernam pro funiculo lucernario inde, & lucerna ex oleo cyprino impleta, fuliginem in aereo uase collige, ac utere pilos euellens, & locum assidue illinens. Et si renati fuerint, idem repetito. Aliud, Potamogitonis succum & artemisiae succum, aequis partibus adhibeto. Aliud, Fel uituli, & castorium, & gummi, aequis portionibus citra aquam conterito, efformato ac utitor, praeuulsis pilis illinens ter in die, & comperies successum. Aliud, Porci masculi fel, & adipem eiusdem, in fictile uas nouum densissimum ac leuissimum mittito, & aceti acerrimi heminae quartam partem, & olei aleni tantundem affundito, & denso linteo obligatum ad dies septem finito, & postea diffusa in mortarium terito, & uelut unguentum excipito. Idem etiam in toto corpore probe facit. At uero Alenum oleum, aniygdalinum oleum esse dicitur.

Agglutinatoria pilorum.

Cap. LXVIII

Pilos in palpebris praeter naturam introrsum refractos, glutinat mastiche per specillum calidum admota, & sic pilis ad proprium ordinem refractis. Bitumen eodem modo. Glutinum similiter. Cochleae glutinositas acu excepta. Hieracii succus. Medicamentorum agglutinatoriorum appellatorum liquor. Ammonia cum thymia. Compositum autem hoc, Resinae siccae, picis siccae, sulphuris uisui, bituminis, singulorum drachmae dimidium. Liquata reponito. Et usus tempore specillum igne feruefacito, & pharmacu contingito, ac eo pilos reglutinato.

De futura palpebrarum sursum uersus.

Cap. LXIX

Ad futuram palpebrarum sursum uersus faciendam, aeger desideat ad sinistram chirurgi partem, humilior ipso, ad splendidam lucem. Sunt autem ministri duo probe periti adstantes, alter retrorsum, alter a latere. Et chirurgus primum per collyrium, aut superficiali scarificatione, notet sufficienter quantum in palpebra redundat

redūdat, & corrugatae cutis refectionem, ut neq; plus neq; minus quā oportet rescindatur. Si enim latius resecta fuerit, aeger lagophthalmus euadit. Si uero angustius, rursus palpebra laxatur, & pili similiter pungūt. Notetur etiā circa medium palpebrae iuxta extremitatē locus superficialia caesura. Post factā uero notationem, euersa palpebra, subsecutionē intrinsecus facimus ultra pilos praeter naturam exortos, quo ipsi ad naturales foras tendāt. Aliquando uero in ipsos pilos praeternaturales, si penitus insiti fuerint subsecutionē facimus, ut succedēs cicatrix ipsos rursus enasci prohibeat. Nihil autē uetat etiā duras subsecutiones facere, unā ultra pilos praeter naturam exortos, quo extremitatis palpebrae fiat resiccatio. Alterā super ipsos praeternaturales pilos. Sit autem profundior subsecutio: Adiuuat enim refractionem & palpebrae leuitatē: & ab altero extremitatis siue marginis palpebrae termino usq; ad alterum procedat. Deinde lintheola parua duplicata, figura triangulari imponant, unum iuxta magnum angulum, alterum prope paruum. Super haec autem linthea minister qui retro adstat apices magnorum digitorum firmet, & uno impetu palpebrā distendat, imprimens digitum sub supercilio, quo aequalis palpebrae tensio fiat. Signum autē sit tibi optimae tensionis palpebrae, quā media nota propriū seruarit locum, hoc est circa medium fuerit reperta. Post distentionem uero, primum facienda est obliqua & ad uerū similitudinem sectio superficialia infernē, ut ne ex superna influēs sanguis chirurgiā impediat. Sitq; haec sectio propinqua palpebrae extremitati. Deinde supernē luniformis sectio fiat. Initium autem & ipsa sumat ex infernis à magni anguli loco, & delata ad notam, rursus deorsum uergat ad paruum angulum. Sitq; etiam ipsa superficialior, ut ne musculi faucientur. Deinde minister qui à latere stat, palpebram distendat. Postea hamulus in circumscriptae fasciolae principium transfigatur, in sinistro oculo, ad paruum angulum, in dextro ad magnum. Distento autem hamulo per sinistram manum, fasciola scalpro ad hanc rem destituta subexcorietur, animaduersione habita ne si profundior excoriatio fiat, musculi uulnerentur, & incurabilem habeant palpebrae laxitatem. Post cutis autem excisionem, ad futuram sursum uersus ueniendum est. Et prima futura media fiat. Deinde utrinque aliae duae, ut in totum quinque fiant futurae. Post futuram, distenta palpebra propter uulnera, moderatum splenium glutinosum futuris sub supercilio impone. Super ipsas uero sectiones spleniola parua glutinatoriam & inflammationem arcuentem uim habentia imponantur. Postea lana ouo imbuta toti oculo imponatur, ac deligetur. Quandoquidem uero augescens & acris ac salsa fluxio illota, pilos naturales rejicit, & palpebrae marginem duram efficit: pilis autem praeter naturam subenatis etiam augmentum praebet: difficilisq; fit in his palpebrae euersio: conuenit acum robustum filum habentem, per mediam marginem palpebrae transmittere, & filum sursum trahere, atque sic per specillum palpebram pro ut moris euertere, & sectionem uelut dictum est, facere.

De futura palpebrarum deorsum uersus

Cap. LXX

Quod si inferna palpebra pilos pungentes produxerit, futura deorsum uersus probatur. Et prius quoq; in his sufficiens laxata superfluae cutis resectio notatur. Nam & hic latiore fasciola excisa, euersio contingit: angustiore uero, inuulilis est chirurgia. Post factam notationem, linthea complicata uelut dictum est angulis imponantur, & palpebra distendatur. Postea minister digito malae impresso, ipsam detrahat. Fiat autem prima sectio luniformis inferior. Deinde ad uerū similitudinem & obliqua appellata circa palpebrae marginem. Facien-

H 2 da

da est autem excoriatio, & futura, uelut antea dictum, & reliqua eodem modo. Ceterum sola deorsum uersus futura contenti sumus in interna palpebra, uitata subsecione, ut ne palpebrae euersio contingat.

De euersione palpebrae. Demosthenis.

Cap. LXXI

Palpebrae amplius eueri solent, ulceratione praegressa, & carne ipsarum superauicta. Aliquando etiam a duriori cicatrice palpebra contrahitur ac eueritur. Contingit autem hoc magis circa internas palpebras. Curanda uero sunt moderata carnis incrementa, arido subiecto. Aeris usti drachm. i, atramenti futorij, misyos tostij, chalcitidis tostae, singulorum drachm. i. Aliud, Aeris usti drachm. viii, misyos torrefacti drachm. ii, chalcitidis tostae drachm. i, atramenti futorij drachm. i. Aliud, Ad inueteratas iam euersiones. Aeruginem in testa torrefactam terito, et per se adhibeto, Aut plumbi usti parē portionē ammisceto.

Chirurgia euersionis palpebrarum. Antyli.

Cap. LXXII

Maiora uero carnis incrementa scalpro auferre oportet, deinde aere usto trito cōtingere, aut aloē cum māna thuris. Et sequenti die fomento adhibito similiter curare. Tertia uero die post fomentum melle utendū est usq; ad perfectā curationem. Si uero maior fuerit euersio, sic chirurgia facienda est. Ex interna palpebrae parte duae sectiones fiant, litera graeca Λ, figurā habentes, ita ut angusta litera pars inferne sit ad malā, lata uero superna ad palpebrae marginē. Deinde fasciola illa litera Λ, figurā referens excindat, resecta simul etiā subiecta carne. Nō est enim chartilaginosa interna palpebra. Cutis tamen indiuisa seruanda est. Deinde de labia excisionis futura cōtrahenda. Sufficiet enim una futura iuxta partes marginis palpebrarum facta. Sic enim incuruata & eleuata palpebra, ad internas partes reuertetur. Si uero cicatrix ex aliqua causa extra palpebram facta, palpebram euerterit, tollenda quidem est, uelut dictum est, ex internis partibus palpebrae fasciola illa litera Λ, figuram referens, nō profunda sectione facta, & labia sectionis uelut dictum est, per futuram cōtrahenda. Postea cicatrice forinsecus per hamum distenta, acum duplex filum habentem, sub totius cicatricis carnosam molem transmittimus, a paruo angulo initium facientes, & ad magnum ipsam acum ducentes. Deinde acu sic posita, filum utrisque ipsius partibus subiicimus, & per ipsum totā carnosam cicatricis molem distendimus. Et sic ipsius excisionem facimus, tollentes simul cum carnosa mole, etiā infixam acum. Post chirurgiam autem, externā sectionem linamentis disparamus, et cōduplicato linteo ex frigida aqua impositis, deligatione utimur usq; ad tertiā, frigidam irrorantes, & linteum cōplicatum incumbere sinentes. Tertia uero die soluimus, & spongas ex aqua tepida adhibemus. Fomentum enim in his nō conducit. Cauere enim oportet, ne forte glutinatio intrinsecus nō succedat. Postq; uero exciderit futura, corporibus glutinatis, de cetero impauide fomentū adhibeat, ad hoc ut etiā cicatrix tenuior fiat, & oculus mitiget. Deinde repressiua collyria palpebrae intrinsecus sublinant. Externa uero sectio disparata seruet, p omnem curationē melioribus pharmacis adhibitis. Cōtinget em̄ ex intrinseco cutis incrementū, auxiliū quoddā ut palpebra intro uertat. Si uero ppter carnis in angulo magno incrementū, facta fuerit palpebrae euersio, exciso eo incrementō, palpebra ad naturale habitum reuertet. Ceterum illud nosse cōuenit, quod supernae palpebrae euersio curabilis est. Sed & illa quae ob internae palpebrae resolutionē cōtingit sanari non potest. Similiter & ea quae propter resectionem latioris fasciolae in futura deorsum uersus contingit. Et quae ob latam cicatricem fit, ulceratione uidelicet praegressa, quemadmodum in carbunculis contingit.

De

De lagophthalmis. Demosthenis.

Cap. LXXIII

Lagophthalmi appellantur, in quibus superna palpebra reuulsa est, et apertus est oculus inter dormiendum, uelut in leporibus fieri solet. Contingit autem affectio aliquādo ex futura sursum uersus, palpebra plus iusto reuulsa, ut oculum contegere non possit, aliquando ulceratione spontanea praegressa, uelut in carbunculis. Curandi uero sunt hi luniformi sectione in totam cicatricem facta, ut superior sectionis circumferentia sursum tendat, apices autem deorsum ad marginem palpebrarum spectent. Postea ramentis linteolorum sectio disparetur, & palpebra deorsum detrahatur, & æqualis naturali figuræ fiat. At uero in conuulsis palpebris qua parte contrahuntur, isthic sectio fiat, & palpebra similiter laxetur. Verum in curatione fugere oportet resiccantia medicamenta, & aquam mulsam. Adhibendum est autem emplastrum tetrapharmacum, & succo sceni græci perfundantur. Et in summa totus curationis ductus laxatorius ac impinguans in his assumatur.

De lippitudine dura. Demosthenis.

Cap. LXXIII

Lippitudo dura est, quum palpebræ duriores fuerint, & ipse oculus durior, & ad motum pigrior fuerit, dolensque ac rubicundus, & præsertim quum post sursum rectionem ex somno, palpebræ difficulter aperiri possunt, & nulla humiditas euacuatur, gramæ uero in angulis consistunt paruae, contortæ, subaridæ. Et quum ipsas palpebras euertere uolumus, non facile à nobis uerti possunt, ob duriciam.

Cap. LXXV.

De lippitudine sicca.

Lippitudo sicca est, quum subaribus factus fuerit oculus, & pruriginosus, & leniter dolens, citra duriciam palpebrarum.

De lippitudine scabra.

Cap. LXXVI

Lippitudo scabra est, quum anguli ulcerosi sunt, ac rubicundi, & ualde pruriginosi, & palpebræ rubicundæ, & lachrymæ salis ac nitrosæ destillant.

Curatio lippitudinis duræ, siccae, scabræ.

Cap. LXXVII

Predictarum affectionum diligens cura habenda est. Neglectæ enim suffusio numerum, glaucedinis, et lippitudinis diuturnæ, ulcerationumque ac staphylomatum causa sunt. Curanda itaque est lippitudo sicca, cum reliqua corporis cura, etiam per ea quæ humiditatem ad oculos prouocant, qualia sunt sicca pharmaca postea describenda, stratiotica appellata, & collyrium diacentetum, ac similia. Dura uero lippitudo similiter curanda est, per pharmaca humiditatem excernere potentia, subliata Erasistrati liquida compositione ac similibus. Ad hæc etiam mollientibus ac humectantibus utendum est, uelut calidæ leniter temperatæ prolutione. Et fomentum per spongas assidue adhibendum. Vitanda uero sunt pharmaca frigefaciencia, meatus obstruentia, & agglutinatoria, et aquæ frigida affusio. Ex his enim oculus magis induratur. Si uero simul fuerit scabra ac dura lippitudo, (ex humorum enim acrimonia palpebræ indurari solent, ut anguli quidam erodantur & ulcerosi sint, oculus autem & palpebræ ægre moueantur & indurentur) in talibus præmisso spongiæ fomento, primum per siccum ad scabriciem paratum medicamentum, anguli contingantur. Et moderato tempore interposito, rursus spongia fomentum adhibeatur, & pharmacum humiditatem detrahare potens sublinatur. Quale est Erasistrati liquidum, & collyrium stratioticum, & diacentetum. Est autem compositio siccæ ad scabros angulos medicamenti hæc. Chalcitidis crudæ drach. v. cadmiæ drach. v. Hæc trita in ollam induntur, quæ addito operculo, gypso oblinitur, & in uas acetum dilutum habens imponitur, ut olla forinsecus quidem mandefiat, non diffuset autem in ip-

H 3 san

sam humor, & sinitur ad dies VII. Deinde siccatur in sole, ac teritur. Aliud.
 Philoxeni siccum, Achariston appellatum, (eo quod digna ipsi gratia referri
 non possit) ad corrosos angulos, & scabras affectiones, & lippitudines siccas,
 Cadmia dra. II, chalcitidis crude dra. I, aloës obol. II, eruginis obol. II, piperis gra
 na. X, florū rosarum drach. IIII, Tritis utere. Aliud, Ad scabrā lippitudinē. Cad
 mia drachm. I, æris usti drachm. I, spicæ nardi drach. I, piperis torrefacti obol. II,
 Terito cum aceto in sole, & siccato utere uelut probato. Aliud Meneclis, ad
 corrosos angulos, facit ad delachrymationem. Spodij drachm. IIII, omphacij
 sicci drachm. II, spicæ nardi obol. III, piperis torrefacti grana X V, tritis utere.
 Aliud, Cadmiæ sextantem, salis ammoniaci sextantem, solij malabathri sextan
 tem; piperis unc. I, utere. Aliud, Facit & ad carnis in angulo decrementum.
 Costi quadrantem, æris sextantem, fuliginis cedriæ unc. I, misce ac utere.
 Aliud, Ad scabras lippitudines, sycoses, putredines, & carnem superexrescen
 tem, Cadmiæ drachm. III, chalcitidis drach. VIII, piperis grana quinquaginta,
 spicæ nardi drach. I, Cadmiam & chalcitidem terito cum uino, & ubi siccata fue
 rint, nardum & piper leuissime trita adijcito, & in puluillum redactis utitor.
 Aliud Capitonis ad lippitudinem siccam, & corrosos angulos, ac oculos hume
 scos, & palpebras ficosas. Cadmiam ad polentæ magnitudinem confringimus,
 deinde melle Attico subactam in fictile uas mittimus, & operculo foramen ha
 bente imposito, eoq; luto oblito, uas rectum inter prunas locamus, ac uentila
 mus. Quum autem albidior factus fuerit uapor exhalans, sublatam ollam ape
 rimus, et cadmiā uino uetere extinguimus. Deinde eius accipimus drach. VII,
 æris usti drach. V, stibij drach. IIII, Et armenij si affuerit, drach. VIII, & hæc co
 rusa ac cribrata, cum uino uelut collyrium terimus, & resiccatum tollimus ac
 utimur, per specilli nucleum sublinentes palpebras, mane ac uesper. Nos autem
 cadmiam, & reliqua omnia simul adipe uiperæ subacta torrefacimus, & posita
 uino extinctis siccatisq; ac tritis utimur. Aliud. Tomenti purpuræ ueræ
 drach. VIII, cadmiæ drach. X, æris usti drach. X, lapidis hamatitæ drach. X, Om
 nia trita ac melle subacta, uelut prædictum est torreto, & extinctis uino, ac tritis
 & arefactis utitor. Aliud. Archigenis, ad omnia prædicta. Amurcam co
 ctam terito cum melle, & utere. Utendum etiam collyrijs & siccis medicamen
 tis, infra inter multi usus pharmaca describendis.

De defluuiō pilorum palpebrarum, quod uitium & Madarosis,

& Ptilosis, & Milphosis græcis dicitur.

Cap. LXXVIII

Madarosis et ptilosis extremitatis siue marginis palpebrarum affectiones
 sunt. Et Madarosis quidem, ipsum solum pilorum defluuium est, ex acris flu
 xione obortum. In ptilosi uero et crassescunt & callescunt hæ partes, ut compo
 sita sit affectio ex madarosi & lippitudine dura. Quare etiam auxilia in hac simi
 lia sunt relatis ad illam. Optimum autem est ad ipsos pilos, siccum Philoxeni ad
 pruriginosos ac corroso angulos. Facit & ad uisus hebetudinem. Cadmiæ
 drachmas V, salis ammoniaci drachmas II, croci dra. II, spicæ nardi dra. II,
 piperis albi drachmam. I, utere. Aliud stibium muliebri extincti drachmas. XIII, aloës, mira
 rhæ, spicæ nardi, singulorum drachm. I, ordeï usti leuissime triti drach
 mas. IIII, utere sicco. Aliud. Ad ptilos & corrosas palpebras. Medula
 lam bubulam ex anteriore dextro pede, cū fuligine terito ac utitor, fuliginem au
 tem sic facito, Papyrum pro funiculo lucernario in lucernam inde, & oleo selsa
 mino

mino repletum accende, & supra lucernam leue testaceum aut æneum uasculum pone, eoq; fuliginem excipe, & paulatim per prunam collige, ipsaq; cum medulla trita uere. Facit etiam egregie uituli coagulum. Aliud dosandri, ad milphoses, & inueteratas affectiones. Facit etiam ad carnis in angulo incrementum. Cadmig, stibij, chalcitidis crudæ, misyos crudi, singulorum drach. viii. Hæc contusa & melle subacta torre uelut dictum est, deinde uino extinctis ac tritis, adijce spicæ nardi drachm. ii, croci torrefacti dra. ii, piperis drachm. i, & simul contritis, utere. Cæterū simplicia ad pilos, & corrolas palpebras facientia hæc sunt: Amurca cocta, lyciū indicum, armeniū quo pictiores utuntur: Nam cū aqua illitum consumit uitiosos humores, & pilos naturales auget; Rubigo ferri ad multos dies in sole trita & cum uino ac myrrha in collyria redacta, Spodium ceparum succo exceptum.

De abscessu in palpebris. Demosthenis.

Cap. LXXXIX

Abscessus in palpebris internos, apice ipsorum inciso, et humoris expressio ne, curare oportet. Deinde muria infundatur, & lana ouo imbuta imposita deligatur. Postera die fomentum adhibeatur, & mel sublinatur, & de cætero collyrium repressum instilletur. Externos uero post sectionem & humoris euacuationem, impositis linteorum ramentis ex melle, & addita lana deligabimus. Quicunque uero abscessus palpebræ chartilaginem corruerint, si quidem extrinsecus fuerint, eos possibile est ouo, ac melle purgatos, capitali sicco medicamento incarnare. Si uero intrinsecus fuerint, euerfa palpebra, & nudata chartilaginibus parte derasa, æs leuissime tritum adhibeatur & supra palpebram ouum cum uino & rosaceo conuassatum imponatur. Postera die fomento adhibito, æs leuissime tritum inspergatur, et rursus supra palpebram ouum ponatur. Tertia uero die mel palpebræ sublinatur. Et postea collyrium repressiuum adhibeatur.

De calculo palpebrarum.

Cap. LXXX

Calculus in palpebris dicunt, quum euerfis palpebris, tofis similia circa ipsas extiterint alba ac aspera, uarorum speciem præferentia. Eorum curam facere oportet euerfis palpebris, & cute iuxta apicem tenui scalpro dissecta ita ut per specilli concauitatem tumorem molis collectæ exscalpamus. Deinde æfustū tritū adhibeamus. Et ouū cū uino & rosaceo in lana exceptū imponamus ac deligemus. Postera uero die, eadem curatio repetatur. Tertia mel sublinatur. At uero in tofis forinsecus palpebris innascentibus, post dissectionem et scalpturam, splenium emplastri tetrapharmaci imposito.

De grandine oculi.

Cap. LXXXI

Grandine affici dicunt palpebras, quum euerfis ipsis rotundæ quadam eminentiæ pellucidæ grandini similes apparent, quibus dissectis humor euacuatursimilis candido ouī. Curatio autem facienda est euerfis palpebris, & incisione per scalprum facta, ita ut humore excreto subiectum aridum pharmacum affricetur. Aëris uisti drachmas ii, squamæ æris drachm. i, sandarachæ drachmam i, æruginis, salis ammoniaci, croci, singulorum drachmas iii, myrrhæ obulos duos, utere tritis. Fiūt etiam aliquando extra palpebras grandines subduras, fabis similes. Has si quis uiolentius contingat, dolores intentos inducit. Et quandoque animi exolutionem. Has aut curare oportet cutē iuxta apicē incisa, et scalptura per specillum concauum facta. Sanatur facile mellis & ramentorū ex linteis impositione, & fomentis. Si uero pharmacis ad grandines uti uelis,

his utaris. Fici sylvestris grossos coctos impone. Aut fici folia. Alia illitio optima. Pollinis tritici quadrantem, sulphuris uiui unc. i. terito cum aqua, & formato pastillos, ac utitor. Faciunt & ea quæ ad ordeola descripta sunt.

De ordeolo siue præputiolo.

Cap. LXXXII

Ordeolum aut præputiolū uocant, quum in palpebris forinsecus iuxta pilos maxime suppuratum quoddā tuberculū factū fuerit, figura ordeo simile. Facile uero curatur nuclei specilli calefacti fomento. Sed & ceræ albæ calidæ fomento id discuties. Aut de musca capite abiecto, reliquo corpore ordeolum cōfrica. Aut galbanū mollitū modico intro addito impone. Aut cū cera emollita parū misyos crudi cōmollito, ac imposito. Faciūt et ficus sicca cū uino mulso cocta, & cū modico galbano trita. Aut sagapenū cum aceto tritū illine. Facit etiam ad grandines. Fomentum uero loco adhibeatur per spongiā, & per panem calidū. Post humoris excretionem mel illinatur. Deinde collyria ulceribus commoda.

De gāglijs, atheromatis, steatomatis, & meliceridib. palpebrarū. Cap. LXXXIII
Fiunt aliquibus extra palpebras etiā hæ affectiones. Curantur autem ganglia ceratis & malagmatis ad ganglia describendis, & aquæ calidæ affusione. Est enim nerui cōtortio ganglium. Melicerides autem, & parua steatomata, ac atheromata, curantur aliquando ustorio medicamento apici ipsorum imposito, donec incumbens cutis in profundum crustam accipiat. Deinde post crustæ casum, exscalpta tunica humorem continente per specilli cōcauitatem. Si uero tunica eximi non possit, per subiectum pharmacum erosiuum consumatur. Sandarachæ drach. ii. arsenici drach. i. squamæ æris drachm. i. ueratri nigri drachm. i. elaterij drachm. ii. chartæ in cinerem exusta drach. ii. utere cum rosaceo. Magna uero chirurgia curantur, quemadmodum in reliquo corpore ex fundo ablata, unā cū tunica humorem continente. Deinde labia cutis per futuram contracta curentur, uelut in futura palpebrarum sursum uersus fieri solet. Cauendum autem ne lata fasciola cutis in chirurgia auferatur, ut ne lagophthalmi fiant.

De uaricibus palpebrarū, & malignis agnatis emineñtjs. Cap. LXXXIV
Varices in palpebris ne cures: Sunt enim maligni: Neq; etiā agnatas emineñtias in palpebris tumidas, dolentes & subrubras, & ad digitorū cōpressionem in seipsas se contrahentes. Sunt enim etiam hæ malignæ ac incurabiles.

De Aegilope. Seueri.

Cap. LXXXV

Aegilops abscessus est iuxta magnum angulū. Est aut affectio egre curabilis, propter corporum tenuitatē subiecto osse corrupto. Ob situs aut uicinitatē etiā ipsi oculo dānum infert aliquando, per naturale paruum iuxta angulū foramen. Incipiente itaq; inflammatione, statim in prima die conandum est ut repellatur ipso solo inflāmato loco illito ex collyrio Antonino, aut alio quodā uehementer repellente, ac stupefaciente. Solet enim hæc illitio id quod cōfluxit dissipare. Si uero perseverarit inflammatio, tentandum est ut similiter uelut aliæ inflammationes curentur, per discussoria medicamenta, quæ citra mordacitatem agunt. Coafficitur enim oculis ex acribus, & in ipsa affecta parte inflammatio augetur. Nos autem in inflammationibus nondum transmutatis, ex emplastri Barabari, aut Leana, aut Athenæ, aut ex salicibus, aut ex aceto & oleo parati usui, abscessum discutimus ac resiccamus. Asclepiades autem ad aegilopas pharmaca talia conscripsit. Succus illecebræ, quam quidam portulacā sylvestrem uocant, aut semperuuium paruum, succi solani, singulorū sexuncem, thuris drachm. vii. galbani sexuncem, mastiches quadrātem, thus tritum cum succis coquito et ubi dissolutū fuerit, galbanū præmollitū adijcito. Mastichen em improbamus. Aliud

Aliud, Thuris drach. VIII, myrrhæ drac. VIII, ladani drac. I, ceræ drac. VIII, alu-
minis scissi drach. IIII, spumæ nitri drac. IIII, coaguli leporis drac. IIII, Tundito
hoc pharmacum, & cum fece ungenti irini emollito. Si uero uictis discussorij
medicamentis inflāmatiō suppurabitur, quā celerrimē secare oportet, & hu-
morem euacuare, ac subscriptis uti. Bdelli, myrrhæ, ladani, spumæ nitri, colo-
phonia, singulorū drach. IIII, ceræ drac. X, ungenti irini quantū satis est. Alij pro
colophonia, oleæ folia trita habent. Et cum axungia ægilopi imponūt. Et sordes
subalares ouium cū axungia eodē modo. Aut ueratri nigri radicem madefactā
imponē. Aut perdicū herbā pro cataplasmate adhibe. Aut farinā erui cū melle.
Aut cinerē lignorum uitis aceto subactū imponē. Aut staphidē syluestre & ama-
moniā thymiamā cū melle imponē. Aut alumen scissum cum terebinthina
uelut splenium imponē. Si uero ad angulū reperit, ad superficiem autē omni-
no nō processerit, tunc scalpro ad uenæ sectionem, aut pterygijs destinato, me-
dium anguli corpus diducere oportet, et bonā carnem ex profundo producere.
Deinde ipsam enatā carnem resiccare. Id quod continget si penitus nō pinguiā
loco adhibuerimus. Quare sanē in principio post apertionē lentacula cocta, aut
malicorio cū melle utemur. Repurgato uero loco, & nascente iā carne, uirum
leuissimē tritū, siccum inspergimus, & in eius usu perseveramus usq; ad absolutā
curationem. Est enim admirandū auxiliū, cuius efficacia satis expendi nō potest.
Sed & alumen scissum leuissimē tritū, et modica terebinthina exceptū, ad empla-
stri formā, purgat & incarnat ac cicatricem tutō inducit. Oportet autē & in ulce-
ris cavitatem de pharmaco indere, & forinsecus paruum spleniū ex ipso impo-
nere. Profectō nos hoc curatiōis ductu usi, alio auxilio ad recentes ægilopas nō
indiguimus. At uero quæ ab antiquis ad hāc affectionem descripta sunt auxilia,
huiusmodi sunt. Aægilopa curāt, si nō per profundū corruptū fuerit os, chama-
meli folia cōmansa impolita. Aut maluæ folia cōmansa cum sale imponē. Post
apertionem uero ipsa malua trita utere usq; ad cicatricem inducā. Aut solanū
maxime halicacabū, aut myrtum cōmansam imponē. Aut oenanthes, aut auria-
culæ muris folia. Facit & ægilopis frumentacei succus cū farina frumenti impo-
situs. Et plantaginis folia maducata ac impolita. Thus item & columbinū ste-
cus cōmiscetur ac imponuntur, & lapidescunt ac inhaerent usq; ad inducā ci-
catricem. Aliud, Propolim, terebinthinā & thus, paribus portionibus spleniō
illita adhibe. Facit & siccum pharmacum ex eruo cum melle. Aliud, Fel porci
fumo resiccato terito, ac exulcerato ægilopi imposito. Aliud, Thus tritum
pice liquida excipe, & emplastri forma imponē. Incipientes enim ægilopas hoc
pharmacum dissipat. Iā uero ruptos sanat, ulceri inditum, & superimpositum.
Aliud ad ægilopas experientia cognitum. Itemq; ad strumas. Radicem lilij re-
centem ad emplastri formam terito, & imposito. Rumpit enim & repurgat &
usq; ad perfectam curationem cicatrice includit.

De uestione Aægilopis.

Cap. LXXXVI

At in quibus affectio diuturna os corrumpit, aut ad angulum in fistulam a-
bit, cicatrice superficiei inducā, in his triangulari incumbētis carnis detractio
ne facta & angusta sectionis parte ad angulum adaptata, & deinde spongia oculi
lo impolita, cauteria ignita ipsi sectioni adhibemus, usq; ad os ad squamæ remo-
tionem inurentes, ita ut etiam obliquas in ulceris cavitare partes, & maxime su-
pernas inuramus. Si enim post primū cauterij admotionem spectaueris, apa-
parebit tibi angustissima cauernula, quæ supernē ex obliquis humorem ulce-
ri transmittit, uelut lachrymam. Quare oportet cauterium cauernulæ fortiter
apprimere,

apprimere. Et ubi sufficiens facta fuerit uestigio, lenticulam coctam cum melle adhibere. Elapsa uero crusta, & ulcere aliquo modo purgato, alumen scissum tritum terebinthina liquida exceptum modica, ut emplastri forma fiat, cavitati ulceris indimus, & splenium ex eodem factum, supra ulceris cavitatem imponimus. Celerrimè enim repurgat, incarnat, & cicatricem inducit. Probè etiam incarnat utrum leuissimè tritum inspersum. Vtere, & probabis.

De anchilope.

Cap. LXXXVII

Circa prædictum locum ubi ægilops sit, colligitur etiā lentus humor melleus aut pultaceus, plerumq; in tunica contentus, dolorem non inducens, paulatimq; augescens. Curatur aut chirurgiā, quemadmodum etiā reliqua circa corpus atheromata, ita ut superficies dissecet, & subexcorietur, & tunica humorem continens funditus tollat. Post sublationem autem ipsius, quo secuta curatio fiat, & affectio non regeneretur, cauterijs ignitis crustas loco inurimus: Et deinde lenticula cum melle curamus. Elapsa uero crusta, alumine cum terebinthina, uelut antea dictum est, usq; ad cicatricem ductam.

De carnis in angulo magno decremento.

Cap. LXXXVIII

Carnis in angulo oculi magno imminutio ac decrementum fit, quum exulceratione, aut pterygij, aut incrementi carnis ablatione, totus angulus funditus fuerit sublatus, & allabentem lachrymam continere non poterit, sed ad malas defluit. Contingit hoc etiam aliquando ex male curatis ægylopiis. Et uocatur hoc uitium græcis Rhœas. Dicuntur autem etiā Rhœades, qui ob assiduas fluxiones oculorum, semper lachrymant. Curandi uero sunt illi quibus angulus funditus sublatus est, adhibito pharmaco locos densare potente ac consolidare, quale est quod tephrum dicitur. Si uero callus fuerit, præirritare oportet per aliquod acrius medicamentum. Sed & chirurgiā utendum est. Collum enim fasciā circumdata cōstringitur, & uas circa nasum notatur. Deinde uas illud scalpulo biangulari dissecatur. Deinde spongia oculo imposita, cauterium loco apprimitur, non usq; ad os, sed ut cutis & sectio solum flammā sentiat. Sit autem cauterium triangulare. Postea lenticula cum melle adhibetur. Vbi uero pura facta sunt ulcera, oculus disparatus seruatur, donec angulus carne pura fuerit repletus, ut ne concretio fiat. Probè facit in ipsis etiā alumen cum terebinthina. At uero oculos præ diuturna lippitudine flentes, aut humectos, curare oportet præ omnibus aquæ potu, & parco cibo, exercitijsq; ac deambulationibus, & capitis frictione ac rasura, & frigida perfusione. Est & diæta optimi succi ac incrasstante utendū, et oculi sublinendi ex medicamentis meatus obstruentibus, frigefacientibusq; ac adstringentibus. Post aggressionē uero frigida aqua & posca oculi pilulantur. Optimum aut pharmacum ad hos experimento cōstans hoc est: Platanis folia exsuccato & excolato, ipsumq; succum in fictili nouo ad solem exponito, & linteo tenui puro uelato, quotidieq; agitato, & resiccato tritū reponito, & pro collyrio sicco utitor. Stibiū ad anguli magni decrementū Alexandri regis ualde bonum. Facit etiā ad ptilosim palpebrarum. Terræ ampelitis, croci, nardi celticæ, æquales portiones tulas melle subigito, & in ollā missa, addito operculo foramen habente, eoq; oblito, prunis imponito, & nō uētilato. Quā aut nō amplius caliginosus uapor per foramina exhalarit, ab igne tollito ac frigefacientibus nito. Deinde tula, cribrata, ac trita in tenuissimum puluillum pro stibio abhibeto. Aliud. Stibiū ad Rhœadas. Aeris uesti sesquiunciam, stibij sesquiunciam, croci unciam I, spicæ nardi unciam I, folij malabathri trientem, rosarum uirgidium sesquiunciam, Reliqua leuissimè terito. Deinde rosas per se bene leuigatas aridis

aridis unito, & simul tritis donec siccantur utitor. Aliud stibium, multa experientia cognitum. Aeris, cadmiæ, stibij, singulorum sextantem, piperis grana XVIII, chareophylli unc. I. spōgiarum nouarum quadrantem, mellis quantū satis est, Aes, cadmiā, stibium, tusa sufficiente melle subigito. Deinde ipsa spōgia excepta in ollam mittito, oblinito, urito. Et ad cinerem exactissimē tritum piper & chareophyllum adijce, & tuis, cribratis rursus exactissimē tritis utere.

De his qui tempora inurunt.

Cap. LXXXIX

Quidam barbaris legibus seruientes, in diuturnis oculorum fluxionibus, tempora inurunt, aut per pharmacum, aut per medullam lignorum nucis iuglādīs, quod hyfca appellant. Quidam etiā ferrum candefaciunt & ustionem perficiunt. Ego itaq; eiusmodi affectionem ex temporum ustione constat m uidi. Hi enim immodeste pharmaco usi, & ustione usq; ad profundum facta, unā cum alienis humoribus, etiā naturales consumpserunt, & ad extremā siccitatem oculum deduxerunt, & nō intelligebant se morbum incurabilē pręparare. Quid enim aliud cōtingere poterat, quā quod hic cōtingit? Primum dolor molestus & immodicus ardor. Quū igitur tentassemus per collyria obtundere dolores, amplius aegri grauauimus. Liquidum enim collyriū oculo illitum, uelut arenulas quasdam producit, ab immodica caliditate torrefactū. Et quum rursus per ouum mitigare uellemus, rursus per caliditatē etiā ipsum crassefactū est, & uelut ad mēbranas quasdam redactum, quæ aegre ab oculis secedebāt. Sed & lacte usi sumus, & ipsum similiter inspissabatur, & in summa, uelut ab igne humores coacti inspissabant. Proinde multo labore insumpto, quum fœni græci succum instillassēmus, moderatē dolorem mitigauimus. Nam et hic a morbo superabat. Postea uero rationem ducem sequuti, ad rosacei usum deuenimus, tepefaciētes hoc ac infundentes, ut etiā aeger nobis absentibus, ipsius solius usū ab accedentibus alleuaretur. Quin & ad alia multa utile nobis uisum est rosaceum ad oculos. Si enim ex natura siccitas affuerit, ut aegre mobilis & penitus lachrymarum exorsit oculus, etiā his commodum est pro collyrio sublitum.

De arteriarum sectione. Severi.

Cap. XC

In chirurgijs circa caput & frontem, unus generalissimus nobis scopus est, ut aegrum a fluxionis affectione liberemus. Verum priuatas & uelut particulares aggressiones facimus, propter uires, propter accidentia, propter locos, propter materiæ fluxionum qualitatem. Quum igitur arteriarum genus unum sit, loci uero diuersi, nunc de posterioribus expendemus. Hæ enim uelut principia quædam earum sunt, quæ circa superficiem capitis existunt. Conuenit igitur in magnis doloribus, cario, staphylomatīs & prolapsibus, arterias in posterioribus capitis partibus secare. Statim enim utilitatem inde percipiunt aegri. Præterea autem sunt loci, & sic pulsus exacte per tactum notandus, & spatium distantiendum ab auribus trium digitorum, ad caluam posteriorem appellatam. Conuenit autem secare non obliquē, sed transversim, usque ad os, & membranam caluam ambientem exactissimē radere, & sanguinis excretionem usque ad animi deliquium expectare, in quibus uidelicet uires robustæ sunt, & dolor uehemens. Sic enim sopies accidens symptoma. Deinde cuneolum sectioni parem indimus, & linamenta conuulsa plurimo cuneolo imponimus, & to utimur sufficienter adstringentes, & ad frontem ambo principia ducentes ac deligantes. Postera die uino & oleo ligamentum rigamus, & non soluitur. Tertia die soluimus, & uibices moderatē proluimus, & os deradimus.

E

Et postea quoque ossis rasura utimur, & hoc facimus, usque ad quatuor aut quinque dies, donec os sanguinem emiserit. Hoc enim signum est sufficientis rasurae. Ceterum medicamentis quae linamentis illinuntur utendum est in his, ex pumice & cera ac oleo paratis. Et postea cephalico sicco appellato ex eruo utendum est. Sed & id quod a nobis praeparatum unice ad hos facit. Statim enim post ossis rasuram positum, carnem producit. Accipit autem farinam triticeam tenuissimam partes II. colophoniae liquidissimae partem I. Hoc ubi siccum inspersum est linamentis & splenio, cum istos linamenti adhibendus est ex aliquo pharmaco & cerussa parato. Nam & ad cicatricem inducendam confert. Cap. XC

Sed & calvariae circuncisionem, periscyphismum graecis dictum, assumimus, in quibus diuturna & tenuis oculorum fluxio existit, & multa uasa fluxionem delegantia. Oportet igitur rasos locos notare, ut ne in coronalem futuram, aut temporum musculos, sectio fiat. Facienda autem est sectio paululum supra frontem transversa initio a tempore ad tempus facto, ita ut membrana calvariam ambiens simul dissecetur, & diligenter radatur. Deinde cuneolis sectioni inditis linamenta adhibemus, & reliqua consequenter facimus, uelut praedictum est in arteriarum sectione, assumpta ex uino & oleo irrigatione. A tertio die curatio suppuratoria fiat. Deinde ea quae resiccationem promittit. Siquidem igitur a solo principio oculi fluxione infestantur, praedicta sectione contenti sumus. Si uero una cum supernis uasis, etiam ex temporibus fluxio feratur, post factam relaxationem supernam sectionem, alias duas luniformes assumimus, unam ab utraque parte. Habeat autem principium, tum ea quae a dextris sit, tum quae a sinistris, a principis transversae sectionis superne factae, ita ut ex supernis ad tempora deferantur, usque ad medium frontis. Procedant autem luniformiter ad supercilia conversa, ut ne temporum musculos iniuria afficiat. Sit autem figura trium harum sectionum similis litterae graecae π , ita tamen ut apices ad internas partes incuruatos habeat hoc modo π . Oportebit autem & hic cuneolos sectionis indere, & consequentia facere, uelut antea dictum est. Porro dicunt Aethiopes a natiuitate frontem circuncidere, ut ne oculorum fluxione infestentur. Cap. XCII

De frontis per submissum scalpellum excoitatione. Frontis per submissum scalpellum excoitationem, hypospatismum graecis appellatum, assumunt qui deformitatem cicatricis maxime per circumulum frontis in frontis circuncisione, deuitant. Verum haec curatio imperfectior illa est. Unde magis frontis circuncisione periscyphismo appellato utendum est, ita ut rei magis necessariae curam habeamus. Cap. XCIII

De uasorum sectione. Vasorum sectionem assumimus uno oculo affecto, & in oculorum perpetuis lachrymis, & in hemisrania. Assumimus autem in his, quibus manifesta & eleuata sunt in fronte uasa. Vas uero atramento notamus, & summis utriusque manus digitis, frontis cutem ab utraque notae parte eleuamus, & superficiariam sectionem in ipsam notam, ex directo uasis facimus. Et rursus paulatim subiacentes cuti membranas dissecamus, donec nudum uas apparuerit. Atque sic hamulis duobus transfixis labia sectionis eleuamus, et paulatim per scalprum subradentes, uas a circumfistis membranis liberamus. Et caeco hamulo subiecto, uas ex profundo attollimus, & ita eleuato acum duplex filum habentem submittimus, mox ablata acu filum dimittimus. Idem etiam in altero uasis termino facimus. Et postea uas perpungimus, & euacuationem fieri sinimus. Sufficienti uero sanguine euacuato, utroque termino uasis, per subiecta iam fila deligamus, & mediam am

dium ipsius refecamus. atq; ita linamentis inditis, & hapso lanç ex aqua frigida imposito, deligatione utemur. Postera die uino & oleo irrigamus. Tertia uero exoluimus, & moderata perfusione facta, linamenta ex aqua mulsâ indimus, donec ex ciderint fila. Et usq; ad perfectam incarnationem eadem utimur. Est enim bonum auxilium. At uero cicatricis inductionem per emplastrum melinum facimus, aut per id quod ex cadmia paratur. Leonides porro, soleo inquit, ubi mixta est, fluxio, & à fronte, & à musculis temporum, iuxta paruos oculorum angulos temporibus uicinos, supra fines superciliorum, crustas inuere per cauteris nucleiformes, id uehementer cauens ut ne temporum musculos contingam. At in fluxionibus à sincipite, constringo collum, & uasa in fronte magis eleuata noto, & hæc ipsa præralis pilis inuro. Illitio ualde celebris ad diurnas fluxiones. Viperarum capita in olla probe exurito, & cinerem cum lupinorum amarorum decocto tritum temporibus illinito. Et miraberis de medicamenti efficacia.

De musculorum temporum cataplasmatibus, agglutinatorijs, ac illitionibus. Seueri. Cap. XCIII

Quandoquidem fluxiones ad oculos ex superincumbentibus locis suppediuntur: Nam hemicranæ, & caries, & fluxiones capitis, dolores oculorum augent: opere precium esse puto etiam ad hos pauca auxilia referre. Utendum igitur est agglutinatorijs & illitionibus, uelut dictum est, in his quibus oculi fluxione infestantur, & in quibus uasa circa frontem ac tempora eleuata distenduntur. Nam si influxio non ex ualis circa frontem, & tempora, ac palpebras contingit, sed ex profundius sitis, agglutinationes & illitiones magis lædunt. Insuper autem si citra inflammationem, fluxiones oculorum fiunt, agglutinatoria ipsas cohibent. Si uero inflammatio affuerit, humores ex circumlitis locis ad inflammatos impulsos, per compressionem magis distendent. Itaq; agglutinatoria ex simlagine & ouis ac thure composita uitanda sunt. Resiccata enim distendunt uasa, & fluxiones augent. Quæ uero mollia permanent, aut distensionem non efficiunt, & tum frigidityte, tum adstrictione, uasa deprimunt, his utendum est. Si igitur calida fuerit intemperies quæ lædit: Crocum, opiū, myrrham, thus, ex aqua trita, & ad strigmentitiam spissitudinem redacta illinimus, & statim inducto somno, dolorem depellimus. Idem præstant & fluuiatiles struotæ cum aloë contriti. Sed & polygonum cum mastiche tritum ac illitum, dolorem mitigat. Et mandragoræ cortex cum thure mtrificè facit. Et mastiche cū succo brassicæ illotæ trita mtrificè resiccant. Item fabrorum fuligo, quam uulcaniam appellat, leniter cum ouo subacta. Et calx uiua cum ouo in frigidis intemperiebus, Et hirundinum sterces cum mastiche & ouo candido.

Totius capitis illitiones. Seueri.

Cap. XCV

Totum caput intemperie calida affectum, acacia cum uino trita illinendum est. Nam acetum in huiusmodi capitis illitionibus uitare oportet. Facit & Samia terra, cum plantaginis aut solani succo trita. Si uero frigidior fuerit caustaria calidæ affectioni auxilia adhibenda sunt. Nasturtio enim cum ouo trito multū profecimus. Et per erucae semen cum aceto tritum idem effecimus. Sed & thaplia cum sinapi aceto trita, magnopere prodest. Et cochleæ Aphricanæ cum thure ex aceto trite, multam fluxionis illationem relidunt ac excindunt. Ethirundinum nidus cum stercore in ipso reperto, aceto subactus graues dimidijs capitis dolores sanat. Et euphorbiū cum aceto tritum. Vtere etiam sinegma

I tis

tis & puluillis inspersilibus, supra ad diuturnum capitis dolorem descriptis.

Cataplasmata oculorum lippientium. Dioscoridis. Cap. xcv

Cataplasmatibus uice imposita mitigant oculorum inflammationes, sola rubi aut auriculæ muris, aut tribuli uiridis, aut portulacæ, aut semperuuii, aut polygoni, aut intybi, aut coriandri, aut cupressi. Aut hyoscyami folia trita, Aut cucurbitæ ramenta, Aut peponis caro, Aut calicum papaueris decoctum affusum. Aut ipsi calices cocti triti impositi. Commodus est etiam panis aqua madidus tritus cum modico rosaceo impositus. Et ouum cum rosaceo ac uirido conqualfatū, & hapso lanæ exceptum ac impositū. Aut ouorū affatorum uel coctorū uitellos, cum modico croco, & opio phaseli magnitudine, ex sapa tere ac impone. Aliud Asclepiadæ, ad maximos humorum influxus ac dolores. Rosarum siccarum drach. i. opij drach. i. croci drach. i. efforma in pastillos cum passō, in quo melilotū coctum est, Et usus tempore ex ipsis terito cum passō, & amixto pane imponito. Aliud ad maximos dolores ac uigilias. Psyllij semen in feruentē aquā coniectum, paululū finito, Et ubi dissolutum fuerit conqualfato ut emplastri formā acquirat, & ex eo oculū integito. Suauem enim somnū inducit. Aliud Demosthenis, ad dolores & prolapsus oculorū, egregie facit. Calices papaueris in aqua mulso coquito, & ipsos quidem expressos abijcito, aquam mulsam aut triticeo, aut ordeaceo polline ammixto imponito, modico etiā rosaceo adiecto, Aut polentæ florē, pro polline, aut panē puram accipito.

Ceterū cataplasmata omnino tempora cōprehendant, & supercilia cūfron te. Solam autem supernam palpebram cataplasmate integimus, infernam non cōprimētes, quo aperiri oculus possit, & lachrymā illatam excernere. Assuetum autem summē tepida apponantur, hyeme uero leniter calida.

Illitiones oculorum.

Cap. xcvi

In uehementibus doloribus palpebras forinsecus illinere oportet, maxime quidem collyrio Nili ex rosis, aut aliquo dolore eximente ex croco parato, aut croco trito cum modico papaueris succo, affuso lacte aut hyoscyami succo.

Alia illitio Asclepiadæ, ad doloris uexationes. Aloës, lycij indicij, uiridij, croci, opij, myrrhæ, singulorum æquales portiones terito cum uino, & formato pastillos, ac siccato in umbra. Vsu uero expetente, passō dilue, & oculos actēpora illine. Alia illitio repulsoria optima. Foliorū mali siccorum tusorum ac cribratorū lib. i. myrrhæ sextantē, glaucij sextantē, gummi sexuncē. Excipe aqua. Illitio Asclepiadæ mordax, euestigiō fluxionē compescens. Facit & ad lippitudines scabras. Aeris ustri drachm. iiii. croci drachm. iiii. piperis drach. ii. opij drach. ii. gummi drach. iiii. Excipe aqua. Hæc forinsecus illita maximos humorum illapsus relidit. Verum uitare oportet ne quid de pharmaco in oculum præterlabatur. Aliud phloginū inscriptū linimentū. Aeris ustri ac loti drach. xii. croci drach. vi. piperis drach. iiii. myrrhæ drach. iiii. opij drach. iiii. gummi drach. xii. Terito cum uino ueteri odorato adstringente. Alia illitio ex sandyce, ad perfrigerationes & resolutiones palpebrarum, quales conuētiunt & in his qui canino more conuelluntur. Facit etiam ad acuendum uisum ante balneum illita. Sandicis drach. xiiii. crocomagmatis drach. vi. piperis drach. iiii. gummi drach. vi. Excipe aqua. Aliqui adijciunt etiam opobalsami drach. iiii. & illinunt ad hebetudinem uisus.

De aridis collyrijs. Galeni.

Cap. xcvi

Ex aridis pharmacis quædā affectionē in oculis cōgregari prohibent, humo- rum ut

rum uidelicet influxiones impediētia, ex quibus oculi affligi solent, Prestantissimum autem ex his apparuit, & experientia iudicatum est, quod ego composui, inquit Galenus: & ob id apud multos in usu est, ac ferè per omnes gētes, quibus Romani imperant. Ac primum sanè ipsius compositionē scribā, quum præstātius esse putem, nullis omnino affectionibus corripi, quàm eas quæ iam præoccuparunt sanare. Vtilissimum autē est sanis oculis pharmacum. Vritur lapis phrygius in sabaceas magnitudines contractus. Eum uero in ollam nouam missum, deinde forinsecus luto oblita olla, addito operculo foramen habente, eoq; oblito, ollam prunis imponimus. Quum autē lapis ignitus factus fuerit, tūc iam ollam in aliud uas purum euacuare oportet, & recenti butyro extinguere. Facta autem extinctione, rursus in eandem ollam missum, prunis adhibemus, ac uentilamus. Ignito uero lapide, ubi purum uaporem efferrī uiderimus, rursus euacuatum extinguimus uino ueteri fuluo odorato. Deinde rursus missum in ollam lapidem, tertio urimus, & rursus extinguimus melle Attico non multo. Postremum autē melle extinguitur, ut mellis qualitas in lapide permaneat. Cæterū diebus trita ac præleuigata in promptu habere oportet, ita ut in tenuissimum puluerē redacta sint subscripta. Aeris usti unc. i. piperis albi unc. i. folij malabathri unciam. i. stibij drach. xii. His ammisce lapidis usti, tusi, cribrati ac triti lib. i. Et postquam omnia simul probe fuerint unita, & reponere medicamentum uoles, adijce opobalsami primarij drach. xii. Sit autem opobalsamū tenuē, et pellucēti compage, nō crassum. Impedit enim crassitudo, ne sic cum pharmacum euadat. Utendum autem est ipso ad palpebras solas, inductio specillo citra tunicarū oculi contactū. Iubendusq; est homo cui hoc sublinitur palpebras apertas habere. Hoc itaq; à me cōpositum est, nō permittens hominem qui ipso recte utatur, oculorū lippitudine apprehendi. Stibium ornandis palpebris præseruatium, pueris maxime cōmodum. Stibij drach. xvi. plūbi usti ac loti drach. viii. squame æris drach. i. croci drach. i. florum rosarū, myrrhæ, spicæ nardi, thuris, piperis, singulorū drach. i. palmularū ossa decem. Omnia in fictile uas coniecta diligenter torrefacito, deinde tuis ac tritis opobalsami primarij cōpage tenuioris cochlearia duo adijcito: Et tritis ac siccatis utitor. Aliud Seueri, facit ad oculorum & palpebrarum pulchritudinē. Stibij quadrentem, purpuræ ueræ ustæ sextantē, spicæ nardi unc. i. Vtere. Stibium ornans palpebras. Stibij usti & loti drach. viii. ossium palmularū uistorū drach. viii. atramenti futorij drach. ii. nardi celticę drach. ii. Vtere, constat experimēto. Aliud, faciēns ad decorē, angulos rarefactos ac humectos moderatē refic cans. Cornu ceruini usti, purpuræ ustæ, singulorū drach. iiii. folij scylmatis unc. i. Vtere. Stibium optimū ad tenuē fluxum, & corrosos angulos. Nutrit hoc etiā oculos debilitatos, in multis affectionibus cōprobatū, & mirifice omnibus se opponēs. Facit etiā ad ornatum. Inductum enim multo tempore in angulis permenet. Habet autē hoc modo, Carnis purpuræ torrefactæ drach. iiii. succi anemonēs drach. vi. stibij usti & uino extincti drach. iiii. succi baccarū sambuci drach. iiii. spinæ ægyptiæ drach. ii. ordeï usti drach. ii. gallarum nigrarum drach. ii. acaciæ drach. ii. mororum rubi aridorum tusorum drach. iiii. costi tusi drach. iiii. folij tusi drach. iiii. Singula seorsim terito, & simul in uase plumbeo reposito, ac utitor. Aridum Danaï, quod uelut res sacra in regia urbe uentum est numismatis cxxx. & cum multo labore ab eo impetratū. Præseruat ab omni lippitudine, palpebris inductū. Aeris usti unc. i. unguēs siue onychias aromaticos ustos magnos tres, piperis grana xxxi. ordeï usti grana xxxi. palmularum ossa

rum ossa usta 1x. areas muscas. xxi. folij scrup. 1x. sanguinis draconij scrup. 1111. Aes accipe quod ab greis uasis deraditur, et in fictile uas missum, ac prunis impositum, ad triduum ure, ita ut quotidie ter ipsum urina pueri incorrupti extinguas, & postremum aqua dulci. Aereas autem muscas accipe ex locis ubi boues degunt, aut si ibi non reperias, ex mortuis animalibus. Aliud palpebras ornas, pharmacum quod prosperè accommodatur. Facit & ad diurnas lippitudines.

Stribij usti et uino extincti drach. 111. plumbi usti ac loti drach. viii. fuliginis thuris, spicae nardi, myrrhae tostae, croci tosti, squamæ aris, singulorum drach. 1. Tritis utere. Aridum ad angulos calidiores & rubicundos ac exasperatos: Seueri croci drach. 1111. cadmiæ lotæ drach. 11. cerusæ drach. 1. Aliud Seueriani cerussæ bessem, cadmiæ trientem, salis ammoniaci sextantem, piperis sextantem, folij trientem. Aliud palpebras ornans, facit & ad lippitudinē siccam. Sanat etiā omnem lippitudinē, post mitigatos dolores illitum. Aeris usti leuissimè triti unc. 1. cedriæ puræ trientem. Aes cum cedria ad strigmentitiā spissitudinem terito, & in arūdinem mittito, & hanc obturatā forinsecus totā luto ablinito, et in clibano prunis obruto, & per diē ac noctem finito, & exemptā terito, & collyrii Pelarij drach. xxi. 1111. adijcito, & croci drach. 11. & folij scrupul. 11. Et utitor.

Aliud siccum collyriū celebret, resiccans multas fluxiones, & uisum acuēs. Optime quoque attenuat cicatrices, Aeruginis unc. 1. cadmiæ unc. 1. chalcitidis unc. 1. stribij unc. 1. mellis mensuram congruam. Omnia leuissimè trita, & melle subacta, in ollā mittito, & addito operculo foramē habente, oblinito, ac urito donec tenuis uapor progrediatur. Deinde exēpto ac trito utere. Quod si ipsum paululum mordax facere uolueris, post uisionem adijce piperis grana. xxv.

Aliud aridū ualde bonū: Cadmiæ sextantē, mellis sextantē, aeris usti drach. 1111. salis ammoniaci drach. 11. piperis drach. 1111. spicae nardi drach. 11. Cadmiā leuissimè tritā melle subige, ure, & uino austero extingue, & cum reliquis tere ac utere. Est delachrymatiuū. Facit et ad asperas palpebras. Aliud siccum ad lachrymantes oculos, & eos qui à longa lippitudine non probe sanati sunt. Est etiā praeoccupatiuū. Cadmiæ drach. viii. aeris usti drach. viii. stribij drach. 1111. Cadmiā cum are in frustra crassiora contusam, & melle subactam in olla exurito, uelut antea dictum est, & uino ueteri odorato extinguito, ac siccatō. Et deinde stribium per se uisum in olla ammisceto, & tuis cribratis ac tenuissimè tritis utitor. Quidam etiam armeniaci drach. 11. ammiscent. Hoc siccū pharmacū saepe cum uino, uelut collyriū contriui, et siccato usus sum, inducens ipsum palpebris mane et uesperī. Aliquando autem etiam stribij drach. viii. inieci.

Aliud siccū croceū, procatalepticon, id est, preseruatiuū. Aloës, croci, glauci, sarcocollæ, singulorum unc. 1. leuissimè tritis utere. Aliud, quo utor, & affectiones illino. Sistit fluxionē in una diē, si dense ac saepe illinatur. Facit etiā ad ægilopas, & palpebras corrosas, & pilos pungentes in palpebris, post euulsos pilos, pilorum locis illitum. Sarcocollæ, croci, glauci flauī, aloës, chelidoniz, singul. unc. 1. myrrhae troglodyticae drach. 1111. Chelidoniā tusam cribratā, reliquis adijce, & cōtritis utere. Ego cū aqua uelut collyriū contero, & sicco utor.

Aliud siccū collyriū celebre, uisum acuēs, inoffensos cōseruans oculos. Stribij scrup. 1111. fuliginis purpuræ ueræ, rosarū siccarū, singulorum scrup. 11. croci scrup. 1111. folij scrup. 1111. spicae nardi scrup. 1111. Tritis utere. Fuliginē autem sic facito. Lanam purpuræ cedria tinctā incende, & pelui leuissimo, aut greo uale tege, & conflatā fuliginē penna collige, ac utere. Aridum albū, uisum acuēs. Facit ad pruritus, et uisiones ex sole, & lippitudines incipiētes ex frigidityte, ante & post

te & post cibum. Cadmiæ drach. II, salis ammoniaci drach. I, piperis drach. II, aluminis scissi drach. II, folij drach. II, cerusæ oboli dimidium. Terito cum uino albo, & siccato utitor. Aliud siccū acre. Cadmiæ drach. XXIIII, salis ammoniaci drach. II, spice nardi drach. I, piperis albi drach. I, tritis utere. Aliud optimum. Cadmiæ drach. VIII, croci drach. II, salis ammoniaci drach. II, spice nardi drach. I, piperis albi drach. VI, Tritis utere. Aridum Seueriani. Cadmiæ ustæ & lotæ drach. VIII, salis ammoniaci drach. II, piperis albi drach. II, folij drach. I, cōtusis, cribratis, ac probe tritis utere. Aliud aridū acre. Cadmiæ drach. VII, testarum sepiæ sextantem, salis ammoniaci unc. I, piperis unc. I, folij unc. I, utere, constat experientia. Aliud aridū uisum acuens, Oribasij. Radicis chelidoniæ sextantem, aloës sextantē, folij unc. I, piperis decorticati drach. III, ueratri albi drach. I, Vtere. Aridum Apollonij ad uisus hebetudinē. Cadmiæ drach. VII, fecis uini ueteris siccæ ustæ drach. V, piperis albi drach. V, salis ammoniaci drach. X, sandarachæ drach. II, folij drach. II, nitrī usti drach. III.

Aliud aridū ad suffusiones & hebetudines. Viperā masculā totā uiuam in ollam mitto, & succi fœniculi cyathū unum adijcito, et thuris non sekti granum magnum addito. Deinde totā ollam forinsecus luto oblitam, uirito donec cinerem redigantur indita, teritoq; ac utitor hoc arido medicamēto uelut celebrī. Faciunt ei uiperæ capita usta, trita, & induta. Aliud. Incomparabile.

Veratri albi & piperis, æquas portiones tulas ac tritas adhibe per triduū, purgatione prius per uentrē facta, & pes os ac nares. Aridum ad incipientes suffusiones, glaucedines, & pellicularū crassitiē. Cadmiæ drach. XXIIII, salis ammoniaci drach. X, sandarachæ drach. III, ueratri albi drach. II, folij drach. II, utere. Ego si aliquandō opus habeo arido collyrio ad præsentēs affectiones cōmodo, hoc trito & in leuissimū puluillum redacto utor. Aliud siccū acuens uisum, experientia cognitū. Cadmiæ drach. VII, folij drach. VIII, spice nardi, drach. I, piperis, croci, auripigmenti, salis ammoniaci, chelidoniæ, singulorum drach. I, artemisiæ, folij malabathiri, singulorum drach. I, utere.

De liquidis collyrijs. Galeni. Cap. XCIX

Liquida ocularia medicamenta cōponuntur ex succis, & liquoribus, felleq; ac melle, & ammoniaco thymiamate, ita ut ammisceatur ipsis etiā moderatio. Quædā, uerum uiribus nō repugnantia, myrrha inquā, & thus, & crocus, & galbanū, & quæcunq; alia huiuscemodi, quæ tunicas rarefacere, & crassitudinē humorū ac spiritus attenuare possunt, & humiditatē præternaturalē discutere, & tunicis oculorū per suum temperamentū, robur præbere. Liquidū acuens uisum. Succum ex malis punicis expressum, in uas fictile Atticum leuissimum ac densissimum mitto, & tenui linteo obligatum ad solem exponito, donec mellis crassitudinem acquirat, & parem mēsuram mellis ad succū adijcito, & fictili uase exceptum reponito. In ueteratum enim melius euadit. Quum autē dormire uolueris, ex hoc leuiter oculos sublinito. Hoc pictoribus, & scriptoribus, & aurifusoribus ac senibus conuenit. Aliud. Ampullam uitreā oleo expleto, & iniectis fœniculi folijs teneris in solem exponito ad dies quadraginta. Et expresso fœniculo, oleo utitor. Aliud uisum acuens. Adipem uiperæ in uitream ampullā mitto, et ubi liquatus fuerit, specillū in eo tingito, ac illinito. Hoc ualde cōmodū est. Aliud uisum acuens. Colocynthidis semen tusum, cribratum, ac leuissime tritum cū melle adhibeto. Experimēto cōstat. Aliud ad uisum acueudū, & ad suffusiones ac cicatrices oculorū. Chamæleonis nigri radicē ustā, ac leuissimē tritā illinito. Aliud. Intestina terræ in testa ad cinerē

exure, & cinerē trito cum melle utere. Ego hoc arido usus sum ad albugines.

Aliud ad inchoantes suffusiones. Mel, oleū uetus, et fœniculi succū, equis portionibus misce ac utere. Aliud. Sagapeni drach. ii, sumæ nitrī drach. v, mellis lib. ii. Aliud Demosthenis. Ego uero subscripto utor: Caulalidis succū, coronopodis succū, chamædryos succū, æquis portionibus excolato, siccato, colliria formato, ac utitor. Si uero liquido uti uoles, cū melle tritis utere. Aglaide liquidū ad principium suffusionis. Floris æris obol. v, piperis obol. v, croci drach. ii, castorij drach. ii, fellis galli drach. i, omphacij drach. iiii. & dimidiam, spicæ nardi obol. i, lapidis hæmatitæ obol. ii, spumæ nitrī obol. ii, floris salis drachm. xxxii, opobalsami drach. xxxii, mellis quincuncem. Omnia trita in argenteo uase reponito. Erasistrati panchrestos liquida cōpositio, Ad inflationes pruriginosas, & lippitudinem scabram, aures purulentas, ulcera ægre recipientia cicatricem, cynāchen siue anginā, & ad nomas in ore ac pudendis. Aeris uisī drach. ii, myrrhæ drach. iiii, misyos tosti drach. iiii, piperis drach. i, croci sesquidrachmā, uinī austeri ueteris cochlearia, iiii, passi cretici cochlearia, ii, trita rursus terito cum uino, & ubi id combiberint, passum adijcito, & unita in aereo uase ad mollem ignem coquito, usq; ad mellis spissitudinem, & in ænea pyxide reponito. Alia liquida ex succo uerbenacæ. Facit ad hebetudinem uisus, pupillæ debilitatem & obfuscationem, facit et ad corrosos angulos, ad tenuem fluxum, & inchoantes suffusiones: Fellis capræ drach. viii, mellis attici sexuncem, lycij indicī drach. iiii, piperis drach. iiii, succi uerbenacæ rectæ deuncem, & sic ci succi drach. viii, piperis tustum ac angustissimo cribro excretum, postea diu in mortario terito, et sicco succo adiecto, simul terito: Deinde etiam liquidum succum, et mox lyciū addito. Et ubi leuigata fuerint, mel adijcito, & mox fel ipsum ut unita excipe ac utere. Quidam ipsam herbam, uerbenacam dico, tūdunt ac cribrāt, & drach. viii, adijciunt. Si uero siccius medicamentum euadat, collirium efformato ac utitor. Siccum cassij, ad uisum acuendum & ad glauccidines, antiquas lippitudines, uisus hebetudines, ac obscurationes. Fel taurinū totum in æneā pyxidem euacuatum, ad dies x, finito, deinde trita adijcito, croci, myrrhæ, opobalsami, singul. drach. i, piperis grana. xx, mellis Attici duplū fellis. Et omnia simul trita in uas æneum inijcito, & ad mollem cinerem ad mellis spissitudinem coquito, & in ænea pyxide reponito, ac utitor uelut bono. Simul enim ut illitum est, efficaciam suam declarabit. Alia liquida Bolæ inscripta, ad suffusiones. Fellis felis partem unam, mellis Attici duplum, succi hieracij parem mellis mensuram, misce & utere. Alia ad suffusiones celebris. Fellis coruorum recentium trientem, sagapeni perfici drach. i, succi cyrenaici unc. i, opobalsami unc. i, mellis dodrantem. Alia ualde celebris, ex cuius usu successum habui. Fellis capræ drach. iiii, opobalsami drach. ii, croci drach. ii, spicæ nardi, casia, lachrymæ oleæ æthiopicæ, aluminis scissi, medullæ struthocameli, myrrhæ, singul. drach. i, mellis unc. x viii, præparato diligenter, & reponito in pyxide æris cyprij, ac utere. Alia. Theriaces Andromachi drach. iiii, succi cyreniaci drach. vi, opobalsami drach. ii, mellis non summo si drach. v, Theriacam primum uino ueteri dulci dissolue, & opobalsamum ac mel adijce. Et utere. Alia liquida Apollonij, ualida compositio ad suffusiones. Sagapeni drach. ii, succi cyrenaici obol. ii, ueratri albi drach. ix, rutæ syluestris drach. i, spumæ nitrī obol. iiii, mellis quadrantem. Alia. Omphacij drach. i, myrrhæ drach. i, salis ammoniaci drach. i, opobalsami, lachrymæ oleæ æthiopicæ, ammoniaci thymiamatis, singulorū drach. i, fellis hyanæ drach. ii. Excipe

11. Excipe melle & utere. Alia. Fellis hyanæ, adipis uiperæ singulorum sesquidrachmam, croci drach. i. omphacij drach. i. opobalsami drachm. i. myrrhæ drach. i. i. & dimidiam. Mellis quantum satis est. Alia, ad suffusiones, etiā si fuerint diuturnæ. Lapidem Scythicum cum felle aspidis tritum illine. Breui liberat. Sit autem Aspis quæ Acontias appellatur. Fel eius reperitur ad dorsum hepatis annexū. Alia, ad omnem uisus hebetudinem ac suffusiones, facit etiā ad palpebras pungentes pilos producentes. Mellis sextantē, opobalsami drach. ii. myrrhæ drach. ii. succi cyrenæici drach. i. opopanacis drach. i. utere. Alia, ad suffusiones, ut æger intra quinq; dies uisum recipiat, adeo magnum ac admirandū auxilium est. Facit etiā ad asperitates palpebrarum. Et raro quis tale habere potest: Adipis uiperæ, fellis galli albi, floris æris, succi rutæ syluestris, lactis canini, opobalsami, æquis portionibus tritis utere. Aliquando uero pro æris flore, atramentum futorium coniicio. Alia liquida nigra. Ad hebetudines, & fluxiones, ac affectiones. Clauorum caligarum ueterum prelotorum ac probe siccatorū librā. i. in sextar. i. aceti acerrimi mitto, & per dies quinq; finito. Deinde in olla fictili aut ferrea, lento igne donec tēr ebulliat coquito & excolato, & mellis despumati & colati lib. i. adijcito, & ad mollem ignem usq; ad strigmētiam spissitudinem coquito. ramulis fortibus absinthij tribus simul colligatis agitando. Deinde ubi coactum fuerit medicamentum, atramenti futorij leuissimē triti unc. i. inspergito, ac utitor per spicillū nucleum angulos inde contingens. Alia repellens fluxiones, & detergens oculorum tunicas. Atte nuat etiā cicatrices, & forinsecus supernæ palpebræ illita repellit fluxiones, si statim ab initio illita fuerit. Melantheriæ, uelut iam diximus de clauis, præparata, & mellis parem mensuram, & succi fœnigræci tantundem, simul mixta & excolata, ad lentum ignem coquito, assidue agitando donec mellis compagem acceperint, & repositis utere. Cæterum fœnigræci succum præpara uelut dictum est in ulcerum oculorum tractatu. Sed & dum excolas fœnigræci succum, ne exprimas ipsū, sed sponte defluentem iniice. Si uero ubi paratum fuerit pharmacum & frigesactum, grumi in ipso fuerint, totū paulatim in mortarium transfundito, & dissolutis grumis reponito ac utitor. Alia liquida, ad siccas eminentias, & omnem carnis extuberantiam, & ad carnis in angulis incrementum, & ad incipientes lippitudines. Misys tostī drach. viii. myrrhæ drach. ii. mellis quod satis est. Alia. Misys tostī drach. vi. atramenti futorij drach. i. i. myrrhæ drach. i. i. mellis quod satis est. Oribasij liquida ad suppuratos ex ulceratione. Atramenti futorij drach. viii. croci drach. viii. myrrhæ drach. i. i. mellis lib. i. Alia liquida eiusdē. Mellis sextantē, opobalsami drach. ii. succi cyrenæici sesquidrachmam, opopanacis sesquidrachmam. Ex eodem liquida Bassi, ad suppuratos oculos. Croci, aloës, myrrhæ, singulorum sesquiunciam, uini quadrantem, mellis sexuncem: Crocus teritur cum modico uino: Deinde aloë et myrrha, & ubi ad compagem redacta fuerint, inspissata melli adijciuntur, & unita reponuntur, in uitreo uase. Vterē hoc bis illitens in die, aut si res urgeat, etiā ter, & oculum deliga. Repurgat, incarnat, cicatricem inducit, usque ad finem illita. In plerisq; uero post repurgationem, ad collyria transimus, & maxime id quod inscriptum est Scutulare, capræ faciem præferens. Alia liquida experimento constans. Succu uerbenacæ recte, lycij indiæ, equales partes, hoc est, sing. unc. i. mellis tantundem. Alia liquida ex adipe uiperæ. Mirificē facit ad incipiētes suffusiones, & hebetudines oculorū sanat. Succu rutæ, opobalsami, succi fœniculi, succi chelidonæ circa

sepes nascentis, adipis uiperæ in duplici uase eliquati, mellis non fumosi, singulorum æquas portiones simul mixtas per purū linteum excolato, & utere cōfidenter, ita ut aliquando mellis sesquiunciam, & reliquorum unc. i. conijcias.

Collyria ex croco, & ex succis diuersa. Cap. c

Collyrium ex croco ad initium lippitudinū. Glaucij drach. x xiiii. sarcocollæ drach. xvi. croci drach. viii. gummi drach. viii. tragacanthæ drach. iiii.

Arida omnia trita ac leuissima facta, tragacantha madefacta excipe. Aut sic prepara. Sarcocollam aqua terito, deinde glauciū cribratū adijcito, ac rursus terito. Deinde crocū siccum leuissimè tritum, & tragacanthā siccam in tenuissimū puluillū redactā, & gūmi similiter insperge, quo eadē die aut postera in collyria redigatur. Nā collyria diu in mortario manentia nigrescūt, et uires immutuant. Vtere aut ipso, aquosum infundēs per ouū, lippitudine incipiente. Incipiente uero declinatione crassum instilla. Constāte aut declinatione fiēte, cū aqua illine. Aliud ex myrrha, Glaucij drach. xlviii. sarcocollæ drach. xlvi. croci drach. xxi. opij drach. vi. myrrhæ drach. vi. tragacanthæ drach. xlviii.

lapidis hæmatitæ drach. vi. gummi drach. xvi. Excipe aqua. Vfus est per ouū.

Aliud Phosphorus appellatū, ad dolorē, & omnem inflammationē, & intortos humorū influxus. Glaucij drach. xxi. sarcocollæ drach. viii. croci drach. viii. opij drach. viii. myrrhæ drach. viii. misyos usti drach. viii. gūmi drach. xii. Excipe aqua. Aliud Euchrum à colore bono dictū, Facit ad ea quæ Phosphorus. Commodat & asperis palpebris. Est & pueris cōmodum. Glaucij drach. lxxiii. sarcocollæ drach. xxxii. croci drach. xxi. opij drach. vi. myrrhæ drach. vi. hæmatitæ drach. vi. tragacanthæ drach. xvi. gūmi drach. xvi. Excipe aqua, & instilla in principio per ouū.

Aliud dolorem eximens ex succis ad omnem doloris uexationē. Somnū inducit cōfestim. Glaucij drach. xlviii. sarcocollæ drach. xvi. croci drach. viii. opij drach. iiii. Lycij indici drachm. iiii. succi rosarum drach. iiii. succi mandragoræ drach. iiii. succi hyoscyami drach. iiii. succi cicutæ drach. iiii. tragacanthæ drach. xvi. gūmi drach. xlviii.

Excipe decocto meliloti. Componitur autem hoc modo. Accipe meliloti lib. i. aque pluuiialis sextar. vi. Coquito ad tertias, & excola liquorē ad pharmacoparationem. Collyrium ex succo polygoni. Succu polygoni sexuncem, lycij indici drach. vi. aloës drach. iiii. myrrhæ drach. iiii. thuris drach. iiii. opij drach. iiii. acaciæ nigræ primariæ drach. xii. Vini ueteris odorati quantum satis est. Facit ad omnes in oculis affectiones, reprimat fluxiōes, & sedat dolores.

Amat aut balneum. Quare ubi illeuisti, lauari iube. Facit & ad ulcera. Collyrium ex succo Rhamij, ad chemoses & dolores, de quo quidam magnopere gloriantur. Aeris sextantem, cadmiæ sextantem, opij sextantem, aloës scrup. xii. croci scrup. xii. acaciæ besslem, gummi besslem, succi fructus rhamni lib. i.

Aquæ quantū satis est. Si uero abundas, succū fructus totum inijsce, & gummi aqua macera. Collyrium ē succo uerbenacæ, quod maximas humorum influxiones intra secundam illitionem exoluit. Croci drach. iiii. meliloti drach. vi. glaucij drach. xii. opij scrup. iiii. amyli drach. iiii. gummi drach. i. terito, & succum uerbenacæ rectæ affundito, efformatoq; ac utitor. Est & alia efficax compositio, ut uix credi possit, facit ad lippitudinem, tumores laxos, & inflationes, omnemq; humorum influxionem, & desperatas in oculis affectiones intra triduum remouet. Croci drach. xiiii. amyli drach. xii. glauci drach. xvi. aluminis oui drachm. iiii. tragacanthi drachm. iiii. tere, & succum uerbenacæ rectæ affunde, efformatoq; ac utere, Collyrium ex succo fœniculi, Cadmiæ drantem,

drantem, stibij bessē, misyos crudi sexuncem, omphacij sesquiunciam, chalcitidis unc. i. croci sesquidrachmam, folij unc. i. succi fœniculi bessē. Et rursus aliud fœniculum cum aqua pluuiali decoquito, et cum eo decocto prædicta terito ac efformato, Hoc multi præparatum habent.

Collyria unius diei, monohemera appellata,

Cap. ci

Collyria unius diei cum cándido oui illita, plerumq; statim ab initio lippitudines absq; humorum multitudine factas curant. Reuera enim non parum sæpe hæc magnas inflammationes mitigauerunt, ut in uesperam quidem homo balneo usus sit, postera uero die collyrio nardino illitus fuerit ad instauratiōē ac corroboratiōem. Ammifcetur autem ad nardinum in prima illitione, parū quiddā de acribus ac sistētib; appellatis collyrijs. In secunda uero illitione, paulo amplius quiddā de iisdē. Sufficiūt enim duæ pharmaci adhibitiōes, & deambulatūcula aliqua nō multa ante balneū, ad perfectā restitutiōē. Collyria igitur unius diei, quæ priuatim seculenta nominantur, multam habent acaciā. Quædam uero aut omnino modicā, aut omnino non habent. Complectuntur autem in se, alia æris squamam, alia æs ustum modicum, cum multis alijs quæ moderatē adstringunt, & concoquunt ac discutiunt. Talia autem sunt, crocus, myrrha, lycium indicum. Sed & castorium ac thus citra adstrictiōnem concoquunt, simulq; discutiunt. In quibus igitur adstringentiā prædominantur, plurimum oui liquorem, & parum de pharmaco esse oportet, & præsertim si quid ex metallicis pharmacum in se complectatur. In quibus uero crocus, & myrrha, castoriumq; ac thus, & lycium præualent, paulo crassiore pharmaco utendum est. Fomentum præterea omnino adhibendum est ipsis per spongiā, si quidem mediocris sit dolor, semel aut bis in die: Si uero uehementior dolor urgeat, præstat ter aut quater, & sæpius uti, in longis præsertim astutis diebus. Fiat aut fomentū per meliloti ac fœnigræci decoctum. Oportet tamen horū collyriorum usum uitare, in quibus humorū multitudo in toto corpore adest. Nam monohemera quum sint facultate frigida, obstructiōem corporum, & densatiōem meatuum faciunt. Si uero materiæ multitudo in oculis fuerit, ruptiōis corniformis tunicæ causa fiunt. Nos autem in recentibus lippitudinibus, Theodotio Seueri illito ex aqua, & spongiā forinsecus oculo imposita egrum ab affectiōe liberauimus. Et plerumq; balneo uti iubemus statim post primam illitionem. Caterum Monohemera collyria hæc sunt.

Collyriū Monomelum appellatum, eo quod ex unica specilli inductione, inquit, curat. Est autem multi usus. Facit ad diuturnas ac ægre solubiles affectiōes, & maxime in quibus etiam palpebræ exasperatæ sunt, per subiectionem illitum. Oportet autem post illitionem diu claudere oculum. Facit etiam ad conuersiones oculorum, & ad staphylomata. Est etiam pueris commodum. Vtere cum aqua diluto in his qui mordacitatē ferre possunt, in alijs cū ouo. In omnibus aut per subiectionem palpebrę subline. Si uero uehemens fuerit inflammatio, cum ouo infunde. Habet hoc modo. Cadmię drach. xxiij. æris drach. xii. chalcitidis tostæ drach. xii. opij drach. xi. piperis grana. xxiij. mellis sesquiunciam, gummi drach. xxiij. Excipe aqua. Mel postremum adijciatur. Pelarium, quod in principijs aquosum cum aqua dilutum adhibetur. In uigore uero aquosum cum ouo. Ad diuturnas autem affectiōes crassius cum ouo. Deinde sensim progressu facto, etiam aqua ad ouum ammiscetur. Ad finem uero ex aqua sola diluitur. In ulcerationibus tamen minus efficax est.

Cadmię drac. xvi. cerusę drac. xlvij. acacię drach. xxiij. opij drac. iij. amyli,

amylī, tragacanthæ, gummi, singulorum drach. xii. æris usti sesquidrachmam, myrrhæ drach. iiii. croci sesquidrach. Excipe aqua. Aliud pelarium Antonicinus appellatum, Cadmiæ drach. xxi. cerusæ drach. xxi. acaciæ, opij, singulorum drach. xvi. gummi, tragacanthæ, amylī, singulorum drach. x. myrrhæ drach. iiii. æris usti sesquidrachmam. Excipe aqua. Hoc magis facit ad exulcerationes. Aliud pelarium, quod Comitum uia uocant, Cadmiæ quadrantem, cerusæ quincuncem, pompholygis quadrantem, opij sesquiunciam, acaciæ, myrrhæ, gummi, singulorum drach. vii. tragacanthæ quadrantem, amylī sexuncem, æris usti drach. iiii. croci drach. iiii. Excipe aqua. Est autem optimū ad chemosēs, et reliquas lippitudines etiam in uigore, et ad omnes ulcerationes in quibus densæ factę sunt palpebrę. Repurgat enim et replet ac cicatricem inducit. Maxime uero hoc utor, si pro pompholyge, cadmiæ ter uista ammixta fuerit. Pelarium Edeffenū: Tragacanthæ, gummi, acaciæ, amylī, sarcocollæ, singulorum drach. ii. opij drach. iiii. cerusæ drach. vii. cadmiæ drach. xvi. Excipe aqua.

De collyrijs sistentibus. Seueri.

Cap. cii

Collyria quoque quę sistentia appellantur, repulsoria sunt. Sistent enim inordinatum fluxionis impetum, Et quędā ex ipsis Hermolai uocantur, quędam uero Hexacontarchia, ex eo, uelut puto, quod uniuersus ipsorum apparatus sit sexaginta drachmarum. Quędam autem Hecacontarchia. Multę uero sunt etiā horum materię, ob quorū copiam medicus indignatus, uelut in pelago uertigine affectus, a scopo aberrat. Oportet igitur omnium facultates discernere, & ad unū finem horū efficacias adaptare. Nolle enim oportet quod omnia sistentia collyria frigefaciūt & adstringūt, alia magis, alia minus. Sed & resiccant aliquo modo. Proinde ad calidiores lippitudines, talia commodant, non tamen statim a principio, priusquā concoctio apparuerit. Optimum uero et admirandum nobis uisum est: Albū Seueri collyrium, quod ex sœnigręci succo præparatur, & cadmiæ, et cerusæ, ac tragacanthæ. Et quod post ipsum scriptum habetur. At ubi ad cōcoctionem perducta est affectio, rursus ex multis sistentibus commodum reperimus Hecatontarchium, & adhuc magis ipso, id quod post ipsum scriptum habetur. Recipit autem Hecatontarchium: Aeris drach. xii. cadmiæ drach. x. v. myrrhæ drach. iiii. acacię drach. xxi. opij drach. iiii. gummi drach. xxi. Quidam etiā croci drach. i. Excipe aqua. Hoc collyrium aquosum ad illitionem assumptum, ad complicatas affectiones commodum pertinet, in quibus est inflammatio, & distētio, & fluoris influxio. Attenuat enim palpebras, & ipsarum densitates ac aspritudines exæquat, cum aqua illitum. Sed & uisus hebetudines sistit, adstringens ac uelut exprimens incubentes oculo humores. In his tamen qui subtili oculorū sensu præditi sunt, cum oui candido collyrium diluere oportet. Si uero oui candidū desit, panem purū non aridum, neque multi salis participem, aqua maceramus, & aquā excolatā ad illitionē accipimus. Sin minus, farinā purā mades facimus excolamusque ac cremore utimur. Conuenit autem ut ne acruatim auxiliorū mutationes faciamus, neque aliud illinamus, & aliud superillinamus. Oculi enim a peregrina in nouatione magis perturbatus iniuriā afficitur. Itaque hecatontarchio, uelut dictū est, utrum est ad complicatas affectiones, ita ut aquosum ipsum faciamus in usu. Hic est admirandus ipsius ductus. Est & aliud collyriū sistens, ex eadē materia cōstans, sed dissonantiā solū in appōderatione habēs. Excedit autem præcedēs in sua actione. Vidimus enim operū ipsius euentū. Sed et hoc a uulgo medicorum ignorat. Accipit aut, Aeris usti quadrantem, cadmię quadrantem, opij, myrrhę, singulorum

gulorum drach. II. acacię gummi, singulorum septuncem & uncia dimidiū. Excipe aqua. Hoc collyrium in enarrabilem quandam vim habet, & tempestive adhibitur, desperatas affectiones sanat, & graues dolores mitigat ac sedat. Tempus autem adhibitionis eius est lippitudinis uigor, quando concoctio facta fuerit, & gramę in oculo conspecta, & uelut subcruentum quiddam in oculo apparuerit. Siue enim chemosis fuerit id quod affligit, siue palpebrarum inflammatio, congruum est ipsis hoc auxilium. Tantam enim quietem ex eius usu aegri consequuntur, ut quum antea diu uigilias tolerarint, statim ab illitione somnum assequuntur. Confidenter igitur ad pharmacum accurre, considerans num tenuis lachryma post collyrii illitionem defluat. Habebis enim & in hoc successus signum, si omnino non post illitionem lachryma defluat. In quibus enim ex prima illitione lachryma sistitur, sed in adstricti permanent, & uelut somnus succedit, in his statim sanitas expectanda est, ut non opus sit secundam illitionem. Si uero adstrictio fiat in prima illitione, infundendum est ipsis oui candidum per se moderate calefactum. Verum in secunda illitione aut tertia, ab eo symptomatis accidente liberabuntur. Primum enim oculus uelut re peregrina offensus, mordetur; Deinde uelut adfuetus, magis delectatur. Pruritus enim modicus ipsis oboritur cum quadam uoluptate. Atque hoc est signum successus. Nam corpora in profundo liberata, causas ad superficiem propellant. Præcipiendum est autem, ut quibus illitum est pharmacum, oculos ne aperiant ante collyrii concoctionem. Commoti enim meatus rarefiunt, et collyrium ad profundum condescendens, mordacitatem inducit. Post concoctionem autem collyrii spongas adhibere oportet, non magno facto fomento, & ipsum collyrium aquosius illinere. Distenditur enim palpebra in crassioribus illitionibus, ut aegre ferat ager, & palpebra grauentur. In principio igitur cum ouo illinatur aquosius dilutum. (At uero coactio eius fiat in feruida cote, calefactum enim crassius seipso euadit) Nam sic adhibitur in dolore admirandum collyrium compertum est. Etenim ex hoc ductu etiam paruam in ipso apparentem adstrictionem penitus excludimus. In uigore uero itidem cum aqua adhibeatur. In declinatione autem cum aqua, & sub palpebra illinatur. Etiamli enim densitas relicta fuerit, & hanc itidem sanat. Magnopere quoque pueris confert. Curat enim etiam horum ardores. Possemus porro plura auxilia recensendo, maiorem legibus difficultatem parere, uerum quia paruo labore susceperimus, imo potius experientia inuenerimus præscripta collyria, efficacias ipsorum simul cum præparationis modo candidæ exposuimus. Collyrium sistens ex oleo. Oribasij. Cadmię uisæ & lotæ drach. XL. aris uisæ & loti drach. VIII. opij, myrrhæ, singulorum drach. X. acacię drach. centum, gummi drach. centum uiginti. Terito ex aqua, & ad excipiendum adijce olei omphacini quadrantem, & drach. III. Adhibetur in principio aquosum cum ouo. Aliud ex oleo, uelut expertus sum, facit ad principia lippitudinis, & fluxiones, & ueteres affectiones, & ad corrosas palpebras. Cadmię drach. XXIII. eris drach. XXIII. myrrhę drach. VI. opij drach. I. acacię gummi, singul. drach. XLVIII. olei omphacini sextantem, Terito cum aqua. Collyrium Scutulare appellatum, caprę faciem præferens, & sistendi vim habens, in principio quidem cum ouo crassum, & ad declinationes similiter. Ad uigores autem aquosum. Facit mirifice ad suppuratos oculos, & sordida ulcera paulatim repurgat, & dolorem euestigio eximit. Cadmię sesquiunciam, aris sesquiunciam, croci drachmas III. aloës bessem, lycij indici sextantem, acacię sexuncem, opij sesquiunciam, myrrhæ drach. III. tragacathę unc. I. gummi sexuncem, Hermolaus

Hermolaus parvus. Cadmiæ unc. i, croci drachm. iiii. myrrhæ drach. iiii. aloës drachm. viii. acaciæ drach. viii. gummi drachm. xx. Excipe aqua. Vt re hoc ammixto alijs collyrijs lenibus, & infunde in principio cū ovo. Hermolaus magnus, Facit ad prædicta multo melius. Cadmiæ bessē, spicē nardi sesquiunciam, æris sesquiunciam, croci trientem, aloës bessē, lycij indicifexantem, acaciæ sexuncem, opij trientem, myrrhæ trientem, tragacanthæ unc. i, gummi sexuncem. Excipe aqua. Collyrium Olympionici. Facit ad maximas doloris uexationes, & chemoses, & in summa est ex collyrijs prosperi successus, statim enim liberat. Cadmiæ lotæ drachm. viii. stibij loti drach. viii. aloës drach. viii. myrrhæ drach. iiii. croci drach. iiii. opij drach. iiii. gummi drach. viii. Excipe aqua. Vfus est cum ovo. Temperatura uero crassior sit. Ego pompholygis drachm. iiii. & thuris drachm. iiii. adijcio. Collyrium Ericerum Achariston appellatum, ab erica, & dignæ gratiæ desperatione. Facit ad maximas humorum influxiones. Ex huius usu in Aegyptum successum sentiunt, præsertim in agrestioribus corporibus. Cadmiæ drachm. xvi. æris usti ac loti drachm. viii. opij drach. iiii. seminis ericæ drach. iiii. acaciæ drach. viii. myrrhæ drach. iiii. gummi drach. xvi. Terito cum aqua & excipe. Vfus est cum lacte muliebri. Temperatura sit mediā. Vbi uero circa oculos affectio est, a collyrio abstinere oportet. Ego porro hoc usus sum. Cadmiæ drachm. xvi. æris usti loti drachmas. iiii. seminis ericæ drach. ii. opij drach. ii. myrrhæ drachmam i. acaciæ drach. i. gummi drach. viii. Excipe aqua. Vfus in principijs sit aquosus, & lauato. In declinationibus autem crassum cum ovo illine. Aliud Ericerum, quod cum magno labore accepi, uelut magnum donum. Facit ad prædicta multo melius. Et ad asperas palpebras. Et ad ipsorum debilitatem. Si non prius mercedem acceperis, ne illinas. Cadmiæ drach. viii. æris usti drach. iiii. chalcitidis crudæ drach. viii. aloës drach. vi. opij drach. iiii. croci drach. iiii. seminis ericæ drach. iiii. acaciæ drachm. xii. gummi drach. xii. Excipe aqua. Aliud Ericerum celebre, quod appellatur fissum Achariston, eo quod digna gratia ipsi rependi non potest. Facit ad fluxiones antiquas, & dolores maximos qui sunt citra ulcerationem, ab initio usque ad finem cum aqua cohibet diuturnos fluxus in ulcerationibus aquosum cum ovo. Aspritudines autem attenuat cum aqua, & albugines deterit, & diuturnas uisus turbationes sanat. Et post sublata pterygia commodum est. Attenuat enim pelliculas, & cicatrices planas efficit. Valde utile est in suffusis post perpunctionem. Per lenem enim adstrictionem, robur oculo addit. Est etiam pueris commodum. Cadmiæ drach. xvi. æris drach. iiii. seminis ericæ, opij myrrhæ, singulorum drach. viii. acaciæ drach. iiii. gummi drachm. viii. Huius equidem periculum ego non feci. Quæ uero de ipso dicta sunt, præstat id quod ipsum præcedit.

De lenibus collyrijs. Galeni.

Cap. ciii

Ex collyrijs lenibus appellatis quædam terream essentiam habent citra frigiditatem aut caliditatem manifestam, in medio quodammodo horum consistunt. Et ex his ipsis aliqua, modica frigiditate aut caliditate participant. Aliqua uero omnino nullam talem uim præ se ferunt. Totum itaque genus ipsorum obstruendi uim habet, contrariam his quæ ab obturatione liberant. Qualis est Samius after appellatus, qui tenuiorum partium est quam terra simpliciter samia nominata. Et pompholyx lota, & cinis ipsius lotus. Et cadmia usta ac lota. Huic autem parum quiddam facultatis exterioriæ adest, siue post uisionem, siue

siue sine hac lauetur. Pompholyx autem & spodium modicam adstringēdi uim habent, quemadmodum etiam uisum ac lotum plumbum. Est enim mordacitas exors, habet autem & adstrictionis quippiam. Est & amyllum lene, & cerussa lota, uicina est facultati plumbi uisti ac loti. Lene est item fœnigræci decoctum. Et quod in ouis est album ac tenue. Et lac boni succi in horum genere esse putandum est, itemq; gummi ac tragocanthā. At stibium non lotum quidem, fortem adstringendi uim ostendit. lotum autem exoluitur, ut prope mordacitatis exors euadat. Alterum porro genus est eorum quæ paruam habent mordacitatem, ex eo quod ammixta sunt ipsis quædam ex modicè adstringentibus: qualia sunt rosæ & thus. quum modicam quidem adstrictionem habeant rosæ, & parum de exterioria facultate ipsum thus. Quum autem moderatè calidum sit thus, ob id quandam concoquendi ac dolores eximendi uim habet. Ex eodem uero genere cum ipso, in concoquendo ac moderatè discutiendo, putandus est crocus, & myrrha, quæ inter se differunt, eo quod crocus moderatè adstringit, myrrha uero citra adstrictionem discutit, & humiditates non instrennuè resiccat. Adhibetur à medicis lenissima ad affectiones ægrius curabiles, in quibus ulcus est aut solum, aut cum tunicæ corniformis corrolione, & uiformis prolapsu, sanie mordacissima effluente. In his enim nullum aliud pharmacum conuenire uidetur. Quum adstringentia quidem effluentē sanie detineant, & propter hoc ex mordacitate dolorem augeant. Acræ uero affectionem intendunt. Laxatoriorū autem ac discussoriorum pharmacorū facultas, euacuare quidem potest quod generatur, neq; autem ulceratum renutrire, aut cicatricem inducere, neq; quod prolapsum est reprimere ac concludere. Quemadmodū neq; concoctoriorum facultas, etiam si cōcoquere affectiones non parum possit. Quid uero dicere amplius opus est de pharmacis acidas aut amaras uires habentibus, quod huiusmodi affectiones mordent ac exacerbant? Ad maiorem autem malignitatem procedunt, quæ nitrosam ac salsam uim habent. Ad has igitur affectiones conuenire uidetur relatorum lenium pharmacorum genus, quod citra mordacitatē curare potest ulcera cum acri fluxione, per multum tempus uitiatos humores in affecta parte consumens ac resiccans, qui sanè uitiat humores bonum sanguinem locis influentem corrumpunt. Vocantur autem talia collyria à Medicis Libyana & Cygni, adhibentq; ipsa oculis trita cū lacte mulieris boni succi, eo quod uitare cupiunt obstructoriam uim ouorum. Quum enim serosa quædam exterioria pars in lacte contineatur, usus ipsius cōgruus fit ad propositam curationē. Vlcera enim quæ impletionē indigent, exteriorijs citra mordacitatem opus habent. Si uero non affuerit tale lac, per fœnigræci decoctū talia collyria terere præstat, quum etiam ipsum aliquam exterioriā uim habeat. Proinde quæ spodiaca ac tephrica collyria, à cinere & spodio appellantur, cōmunem habēt uim leniens diacritica facienti, & moderatè mordacitatis exortem.

De leuibus ac albis collyrijs.

Cap. ciiii

Aliud porro est album collyrium, quod multos latet, ob præparationis utilitatem, putatumq; est à plerisq; hoc nihil posse. Magnam uero ex hoc utilitatē percipi ad propositam affectionē. Egregiè itaq; facit ad omnem calidam lippitudinem. Efficax est etiā ad pruriginosas ac corrosas palpebras. Nos enim sæpe multis perpetratis in tali intemperie, nullū successum habuimus. serò autem aliquando huius copiam adepti, magnam uim comperimus in ipso, in ægrè curabili ac serè incurabili affectione. In tantum enim mitigatus est æger, ut ex deo esse collyrium diceret. Sed & ad suppuratos oculos eximè facit. Resiccat enim humo-

K rem

rem ipsorū citra mordacitatē in breui tempore, & oculum in perturbatū conseruat. Curat etiam compendiō rubores sub paruis angulis in albo oculi sientes. Adest autem ipsis iuxta medium, uelut pustula quaedā, à qua etiam totus rubor contigit. In prae dictis igitur affectionibus, inter quas etiā ulcerationē posuimus, eximie facit, ut neq; scenogræco opus habeamus. Nam & hoc in collyrij compositionem recipitur. Vtimur autem ipso aliās aliter, in doloris uexatione, cum cui candido: sic enim ipsum statim mitigat. In quibus autem dolor non prauales, palpebræ uero crasse factæ sunt, etiam cum aqua infundimus. Aliquando etiam illinimus. Et in summa ad omne lippitudinis principium, reliquam collyriorū materiam superflua ducimus. Excedit enim ui sua omnia eiusdē generis. Est enim lenius ac doloris magis mitigatiuū quā alia: alia enim opii recipiētia & amyli, & quandoq; etiam myrrhā, ad strictionē aliquam inducunt. Hoc autē collyrium ab his liberū est, nam crocū excedit in efficacia, & ad feruores ac ardores palpebrarum facit. Et ad solis æstus, Sed & tenues ac acres fluxiones obtundit cum aqua illitum, aliquādo & cum rosarū decocto. Et glaucos oculos habentes, & eos qui prominentē habent crystallini humoris situm, bene illustrat aquosum infusum. Et in quibus oculorum natura non fert ad strictionem, his omnibus optimū est auxilium. Compositio autem collyrij hæc est. Cerusæ lib. i. cadmiæ semissimæ, tragacanthæ quadrantem. Preparatur hoc modo: Cadmiā racemosam prunis ignitis obruimus, & flammā uentilando excitamus. Et ubi ignita fuerit cadmiā, ablatam lacte asinino extinguimus. Deinde rursus prunis ipsam obruimus, & ignitam rursus lacte extinguimus. Et tertio idem fecimus. Deinde tundimus & angusto cribro excernimus, & in profundum quoddam mortarium conieciam, aqua fontana pura affusa terimus. Et postea desidere sinentes, per aquæ fusiū instrumentum, aquam unā cum superstante concretionē extrahimus, & rursus aliam puram aquam infundimus, & ubi satis contriuimus, & rursus desidere sinimus, rursus aquam per idem instrumentum extrahimus. Et hoc sæpe facimus, donec non amplius concretio aquæ superstat. Postea uero cadmiā exactē desiccamus, & semissimæ siue sexuncem apponderamus, ipsamq; in mortarium collyriacum conieciam, aqua pluuiali purissima affusa, exactissimē terimus, ut nulla asperitas linguæ occurrat. Atq; sic ad cerussam indictō modo ablutam, cadmiā adijcimus, & ipsa ad dies x v. cum aqua pluuiali conterimus. Et tunc tragacantham ac lucidissimam accipimus, eamq; lotam, & reiecto quod in ipsa est arenoso, in scenogræci decocto maceramus, & per diem ac noctem solum macerari sinimus. Plurimum autem iniicere oportet de scenogræci succo, preparato uelut dictum est in principio huius Sermonis capite decimo quinto. Nam à tragacantha, uelut à spongia, absorbetur. Postera igitur die in mortario puro paulatim tragacantham leuigamus, & alia prius trita in mortarium adijcimus, & probe permixta patinis uitreis excipimus, & tenui linteo contecta, in locum humiditatis exortem, ubi uentus spirat, reponimus. Dehiscit enim collyrium, & efformationem moratur, si in humido depositum fuerit loco. Non enim tantum temporis postulat ad contritionem, quantum ad efformationem. Est itaq; hæc collyrij præparatio. Et poteris ex hac methodo, ad eiusdē generis materias transire. Talia autem sunt libyana, & tephra ac spodiaca appellata, itemq; cygnaria, & alba quæ ex rosis, & quæ ex coriandri succo preparantur. Quibus omnibus præferendū compertū est propositū collyrium. Optimū uero experientia indicatū est & hoc. Cadmiæ ustæ ac lotæ uelut dictū est trientē, cerusæ similiter lotæ unc. xvi. amyli recentis unc. xvi. opij dra. iiii. tragacanthæ trientē; reliqua cū aqua terito. Tra-

gacanthæ

gacantham autem foenigræci succo diligenter uelut dictum est preparato, macerato. Amylum uero neq; acidum sit, neq; graueolens. Aliud Nilamnon appellatum, tenerum, dolorem eximens, stupefactiuū, ex genere cygnariorum. Facit & ad ulcerationes, post primum uigorem dolore præsentē crassum illitum. Cerussæ lotæ sexuncem, cadmiæ ustæ & lotæ trientē, pompholygis per linteum lotæ sextantē, opij sextantē, tragacanthæ sextantē, gummi sextantē. Excipe aqua.

Aliud collyrium Asclepiadæ dolorem eximens, facit ad fluxionē omnis generis, ulcera, doloris uexationes, pustulas, prolapsus, chemoses, affectiones omnis generis. Cerussæ lotæ drach. vii. terræ Samiæ drach. vii. cineris pompholygis lotæ drach. ii. tragacanthæ drach. ii. opij drach. ii. gummi drach. iiii. Excipe aqua. Vfus est cum ouo. Aliud Athanasia appellatum. Cadmiæ ustæ & lacte aluino extinctæ, ac lotæ lib. i. opij quadrantem, cerussæ lib. i. succi mandragoræ lib. i. amyli ordeacei lib. i. Tere cum aqua, & ad efformationē adijce ouorum recentium albumina, quantum satis est. Collyriū Cygnus regine, ad maximos dolores ac affectiones: Cadmiæ lotæ dra. xvi. cerussæ lotæ drach. vii. acaciæ flauæ drach. ii. opij flauæ drach. ii. tragacanthæ drach. ii. gummi albi drach. ii. amyli drach. ii. Terito cum aqua. Et amyllum postremum insperge. Nam si moram traxerit in mortario, acescit, & collyriū acre facit. Ad excipiendū uero adijce ouorum recentiu quatuor candidum. Collyrium Bolæ, mitigat & concoquit omnem inflammationē. Cerussæ tostæ drac. xxxii. croci drach. iiii. opij drach. mas quatuor, amyli recentis drach. viii. gummi drach. xxxii. Excipe aqua.

Aliud collyrium ex spuma argenti quod Augustū uocant. Spumæ argenti ustæ ac lotæ sextantem, pompholygis lotę unc. i. cadmiæ ustæ ac lotę sextantem, amyli sextantem, gummi sextantem, tragacanthæ unc. i. Excipe aqua. Hoc maxime & dolores eximit, & fluxiones intercipit, & oculum imperturbatum seruat.

Collyria libyana & tephra ac spodiaca.

Cap. cv

Collyrium libyanum Asclepiadæ. Ad pustulas, epicaumata, ruptiones, cœlomatata, oculos suppuratos, chemoses, staphylomatata, doloris uexationes, & affectiones. Deterit etiam cicatrices. Cadmiæ ustę ac lotę drach. xvi. cerussæ ustæ ac lotę drach. xvi. stibij usti ac loti drach. xii. amyli drac. xii. cineris pompholygis drach. viii. plumbi usti ac loti drach. viii. tragacanthæ drach. viii. opij dra. ii. gummi dra. vi. Et ad excipiendū ouorū candida viii. Oribasij in exuperabile, collyriū inquit, Philumeni tenerum libyanū, ad suppuratos oculos, in uigore, ulcera, dolores, chemoses. Cadmiæ, cerussæ, pompholygis sing. dra. xvi. stibij drachmas duodecim, amyli drac. xii. plumbi usti, terrę Samiæ, tragacanthę, singul. drach. viii. gummi drach. vi. myrrhę drac. ii. opij dra. ii. Excipe aqua. Vfus est cum lacte muliebri, aut cum ouo. Aliud lybianum Oribasij. Ad principia, & ulcerationes, Cadmiæ ustę & lotę drach. xii. amyli drach. xii. plumbi usti & loti drach. viii. cerussæ lotæ drach. viii. tragacanthę drach. xvi. gummi drachm. xiiii. stibij usti ac loti drac. xii. terrę Samiæ, pompholygis lotę, sing. drac. viii. myrrhę drac. ii. opij drac. ii. Excipe aqua. Aliud collyriū, Aster Magni, quod preparari solet. Cadmiæ lotę dra. xxxii. plumbi usti ac loti drac. xxxvi. cerussę lotę dra. xxxii. stibij usti ac loti dra. xiiii. pompholygis lotę dra. xxxii. thuris drac. viii. terrę quæ aster appellat drac. viii. myrrhæ, opij, sing. dra. iiii. tragacanthæ, gummi, sing. dra. xvi. amyli dra. xxxvi. Excipe aqua. Asclepiadæ, aster in exuperabilis, dolorē eximens. Facit ad doloris uexationes, pustulas, staphylomatata, ulcera sordida & serpentia, facit ad inueteratas affectiones. Et cicatrices exterit. Cadmiæ ustæ ac lotæ drach. xvi. stibij usti drach. xii. cineris

K 2 pom

pompholygis lotæ drach. viii. myrrhæ drach. ii. opij, drachm. ii. tragacanthæ drach. viii. gummi drach. vi. Excipe aqua. Aliud collyrium Vranium, uelut Oribasius habet, ad ulcera, pustulas, ruptiones, inustiones, prolapsus, staphylo mata, oculos suppuratos, corrosiones, nomas, carbunculos, & ad omnes magnas affectiones. Maximè conuenit ad ruborem ac glaucedinem oculorum. In principijs aquosius infunditur. Quum autem tenuis fuerit & mordax & feruida fluxio, utere cum lacte. Vbi uero crassam fluxionem dissoluere uolueris, cum aqua. Cadmiæ ustæ ac lotæ sextantem, squamæ aris lotæ trientē, terræ Samiæ ustæ ac lotæ sextantē, cineris pompholygis lotæ unc. i. opij dra. vi. gummi trientem, stibij loti sextantem. Excipe aqua, & utere cōfidenter. Collyriū Spodiaceū Demosthenis. Facit ad inflammationes & fluxiones, cadmiæ drachm. x. xiiii. stibij loti drach. vii. cerusæ lotæ drach. x. xiiii. terræ Asteris dra. vi. thuris drach. iiii. opij drach. vi. gummi drach. v. Terito cum succo foliorum oleę. Succum autem sic facito. Tenera oleę folia laurato, deinde in pila tundito moderata aqua affusa, ut sufficientem succum remittant, deinde exprimito, & per linteam purum excolato, ac utitor. Aliud Spodiaceum admirandū, tenerum, faciens ad fluxiones & epiphoras humorū impetuofas, ulcera, inustiones, pustulas. Cadmiæ ustæ ac lotæ drach. viii. stibij usti ac loti drach. ii. terræ Asteris drach. iiii. opij dra. ii. gummi dra. ii. Excipe aqua. Collyriū Tephron, inspissat ac adglutinat tenues fluxiones uelut præcedens. Optimū uero est hoc ad calidas fluxiones. Cadmiæ ustæ ac lotę drach. x. x. v. stibij loti dra. viii. terrę Samiæ dra. vi. cerussæ, drach. vi. opij dra. v. gummi drach. viii. ouorū recentiu albumina sex. Excipe aqua. Collyrium Philagrij penitus lene. Obscurat enim fluxionum mordacitatē. Quapropter confidenter ipso utendum est in acribus ac tenuibus fluxionibus. Obtundit enim has & resiccat. Hoc Syricum aut Sandycem appellant. Pompholygis lotæ dra. x. x. v. cerussæ ustę ac lotæ drach. x. x. v. terræ Asteris, plumbi usti ac loti, singul. dra. x. x. v. gummi albi dra. x. l. aquæ pluuialis purissimæ non olentis quod satis est. Singula seorsim usta lota, siccata, ponderata, adijcito ac terito. Et in fine gummi addito, deinde amyllum. Aliud eiusdem, ad ulcerum repletionē, præsertim malignorū. Cadmiæ ustæ ac lotæ, drach. x. x. v. pompholygis lotæ dra. x. x. v. tragacanthæ drach. x. Excipe aqua.

Collyria ex thure.

Cap. cvi

Collyrium ex thure ad fluxiones, & chemoses, & caua ulcera. Cadmiæ drach. viii. thuris drach. viii. cerussæ drach. x. l. opij drach. vi. terræ Asteris drach. vi. gummi drach. vi. Excipe aqua. Vfus est cum ouo. Aliud Delicatum inscriptū, Ad inustiones, pustulas, chemoses, præsertim in his qui nullam omnino mordacitatem ferre possunt, Cadmiæ, lotæ drach. viii. cerusæ lotæ drach. x. l. viii. thuris drach. viii. opij dra. vi. amyli drach. viii. gummi drach. x. vi. Excipe aqua. Vfus est cum ouo.

Collyrium Cleonis.

Cap. cvii

Collyrium Cleonis uelut Demosthenes habet, ad ulcera pura & iam cicatrice indigentia, ex cuius usu nos ualde laudati sumus. Nam profundissima ulcera & pura celerrimè replet, & compendioso ad cicatricem perducit, tenuibus & obscuris cicatricibus relictis, & ulcera absq; inflammatione conseruat. Habet hoc modo. Spodij loti drach. iiii. plumbi usti ac loti drach. iiii. squamæ ferri stomomæ tis lotæ drachm. i. gummi drachm. ii. Excipe aqua. Et utere cum lacte aut ouo. Vtimur autē ipso, inquit Apollonius in profundiore ulceratione, cum cremore tragacanthæ aquoso. Quidā croci sesquidrachmā inijciunt, & pro spodio pompholygia

pholygis, cadmiam ter uistam accipiunt. Est autem lene quidem & mordacitatis exors, uerum graue. Quare nunquam crasso ipso utendum est, sed aquoso.

Collyria ex rosis uiridia ac alba.

Cap. CVIII

Collyrium Nili ex rosis, ad dolores, fluxionē tenuē ac multam, pustulas, prolapsum, & ulcera fordida, & palpebras asperas. Rosarum uiridium resectis unguibus drach. XXIII, croci corycij drach. XII, opij drach. I, spicæ nardi drachm. I, gummi drach. VI, Excipe aqua. Vfus est cum ouo. Temperatura sit liquosissima. Quidam etiam ad confusiones & pupillæ dilatationē ipso utuntur. Collyrium ex rosis Diagoræ, quod Magnum appellatur, aut uiride ex septuaginta duabus rosarū drachmis. Ad chemoses, & doloris uexationes, pustulas, epicaumata, siue inuisiones, staphylomata, prolapsus, oculos suppuratos, fluxiones antiquas, lipitudines inueteratas, & affectiones ægrè curabiles. Rosarū uiridium exunguiū drach. LXXII, cadmiæ lotæ drach. XXIII, croci dra. VI, stibij drach. VI, æruginis dra. II, spicæ nardi drach. II, opij dra. III, myrrhæ drach. III, gummi dra. XXIII, squamæ aris drach. II, Excipe aqua. Collyrium quo usus est Florus in Drusi matre, quæ parū abfuit ut ab alijs Medicis excacata fuisset, Acaciæ dra. XLVIII, rosarum siccarum drach. XLVIII, meliloti drach. XLVIII, spodij pompholygis drach. XXIII, croci drach. XXIII, malorum mandragoræ drachm. XII, seminis hyoscyami drach. VI, opij drach. VI, myrrhæ drach. III, aris usti drach. III, gummi drach. XL, Vini falerni heminas III, aque pluuie heminas III, Aquam & uinum miscetō. Et in hæc rosas, melilotum, hyoscyami semen, & mandragoræ mala, aut si hæc non adsint, corticem inijcito, & ad triduum macerari finito. Deinde expresso liquore ad pharmaci compositionem utitor. Vtere hoc uelut probatissimo. Aliud Philagrii ex rosis, ad inflammationes congruum si supra relato leni Philagrii collyrio fuerit ammixtum, Rosarum uiridium exunguium drach. LXX, aris usti drach. XXII, Tere cum uino odorato ueteri adstringente, & utere. Collyrium album ex rosis nostrum inquit Oribasius, ad uigores & ulcera, & oculos suppuratos, inuisiones crustas, & ulcerum sordes. Cadmiæ uistæ ac lotæ, stibij uisti ac loti, rosarum recentium exunguium, singulorum drach. XVI, cerusæ lotæ drach. VIII, croci drach. VIII, opij drach. III, gummi dra. XVI, Excipe aqua. Vfus est cum ouo aut lacte. In declinatione cum aqua. Aliud eiusdem. Facit ad uigores. Cadmiæ uistæ ac lotæ, dra. XVI, rosarum recentium exunguium drach. VIII, opij drach. III, lactis drach. III, gummi drach. III, tragacanthæ drach. III, amyli drach. III, Aliqui etiam samij Asteris dra. II. Collyrium ex rosis album, quod cum hyoscyami succo præparatur. Cerusæ uncias XXV, croci quincuncem, opij lib. I, myrrhæ quincuncē, rosarum uiridium exunguium lib. I, cadmiæ uistæ ac lotæ bessem, gummi libr. I, Cadmiam, crocum, rosas cum aqua terito. Deinde cerusam adijcito, Succos autem & gummi, in hyoscyami succo macerato, & efformato. Vtere ad tenuissimas ac acres fluxiones, & in his quæ sunt cum ulceratione: generose repellit. Collyriū uiride ex Galbano. Ad doloris uexationes & affectiones ueteres, Cadmiæ lotæ dra. VIII, spodij loti drach. VIII, aris usti ac loti dra. VIII, opij drach. VIII, galbani drach. VIII, myrrhæ drach. VIII, gummi drach. VIII, Excipe aqua. Quidam spodium non adijciunt, Cap. CIX

Collyria dialmyrna, & chiaca appellata ex uino. Collyriū dialmyrnum odoratum Synerotis, pharmacū accommodatū ad inueteratas affectiones. Facit & ad rhœadas, hoc est, angulos antrofos, siue carnis in angulo magno decrementū & ad ægilopas. Cadmiæ lotæ dra. XXVIII, lapidis hæmatitæ loti drach. XXVIII, spodij pompholygis drach. XXIII, myrrhæ

K 3 drach,

drach. XLVIII. croci drachm. XIII. opij drachmas VIII. piperis grana XXX. gummi drach. VI. Terito cum uino ueteri adstringente. Vfus est cum ouo in recentibus affectionibus. Temperatura sit aquosa. Aliud Asclepiadeū Pacci. Ad doloris uexationes, fluxum tenuem & multum, inuersiones, pustulas, pellicularum eminentias, aspritudines, diuturnas affectiones, & eos qui à multis illitionibus læsi sunt, confestim opitulatur. Cadmiæ lotæ drach. XII. æris usti dra. XII. croci drach. XII. squamæ æris lotæ drac. XII. myrrhæ drach. IIII. lapidis hæmatitæ drach. IIII. spicæ nardi drach. IIII. piperis grana XXXIII. rosarum siccicarum drach. IIII. opij dra. IIII. gummi drach. XII. Terito cum uino ueteri odorato adstringente. Vfus est cum ouo. Temperatura uero aquosa. Collyriū Isophoton, hoc est, uiro par, ab aliquibus autem Isotheon, hoc est, deo par appellatum. Facit ad oculos suppuratos, & ulcera impura, ac caua, & fluxionum principia, præsertim in corporibus repletis, in quibus grammarum copia crassissimarū in oculis reperitur. Est & pueris cōmodum, & ad aspritudines bonum. Cadmiæ dra. VIII. æris usti drac. IIII. rosarum siccicarū drach. IIII. croci drach. I. folij drach. I. lapidis scissi drach. I. myrrhæ drach. I. gummi drach. VI. Tere cum uino ueteri odorato adstringente, & utere in omnibus prædictis cum ouo aquosius per se infundens. Post perfectam uero restitutionem cum ouo dilutum illine per subiectionem, & lauato. Si uero adstringantur post illitionem, candidum oui infunde. Verum ad attenuandas cicatrices cum ouo aquosius illine. Quidam etiam piperis grana nouem scripturæ adijciunt. Nos autem in his piper reijcimus. Collyrium Dionysus. Facit ad myocephala, aspritudines, fluxiones, hebetudines. Maxime autem facit ad fluxiones inueteratas. Cadmiæ drach. XIII. æris drach. V. lapidis scissi drac. III. lapidis hæmatitæ dra. III. casia dra. I. aloës drac. II. croci dra. I. spicæ nardi dra. III. folij drach. II. lycij drach. I. piperis grana XXI. opij drach. I. myrrhæ drach. IIII. acaciæ drach. II. gummi drach. VI. Tere cum uino Chio, aut alio austero ueteri, & utere uelut efficacissimo, etiam ad oculos purulentos, & aspritudines, in principijs cum ouo, deinde cum aqua. Efficacia eius superat omnem pollicitationem. Collyrium Chiacum. Ex Demosthene, inquit Apollonius, & ad pura ulcera & proserpentia, & eminentias, & ueteres affectiones, asperas palpebras, sycoses, euerfiones, clauos, staphylomata, omnes doloris uexationes, lippitudines scabras. Facit etiam cicatrices obscuras, & recentes ac crassas cicatrices attenuat. Oportet autem modò crassum, modò mediū, modò aquosissimū sublinere. Et quandoq; ex interuallis, quandoq; assidue. Facit ad carbunculos & suppurationes: pus enim percolat. Et in summa ad omnia oculorū uitia optimū est. Spodij drach. III. æris usti drach. II. croci drach. I. myrrhæ obol. III. opij tantundem. piperis grana XII. gummi drach. I. Terito cum uino Chio, aut alio austero ueteri. Aliud Chiacū Oribasij. Ad staphylomata & oculos purulentos, ulcera pura & fordida, & ad antiquas affectiones. Cadmiæ, rubricæ sinopice, gallæ omphacitidis, croci, rosarum recentium exunguiū, gummi, singulorum quadrantem, opij unc. I. Tere cum uino chio, aut alio austero ueteri maris exorte. In principijs ad cygnarium aut pelarium quoddam miscetur. Cicatrice quoq; optimè inducit cum aliquo horum, & per se. Fuscum nostrum inquit Oribasius. Ad oculos purulentos, & magnas affectiones, & omnem ulcerationē, præsertim diuturnā: Rosarū exunguiū sextantem, cadmiæ teneræ drac. XXIII. cerusæ drach. X. VI. opij drach. XXIII. æruginis drac. XII. æris drach. I. seminis ericæ drach. XII. stibij drach. VIII. myrrhæ drach. VI. spicæ nardi drach. IIII. croci drach. IIII. acaciæ dra. IIII. nitri drach. IIII. lycij dra. IIII. aluminis scissi drach. II. chalcid

chalcitidis uſtæ drach. III. caſtorij drach. III. omphacij drach. II. gummi drachmas
 XXXIII. Terito cum uino auſtero ueteri odorato, & utere aquoſo, per ſœnt
 græci ſuccum, aut ouum diluto. In progreſſu uero craſſius adhibe. Collyrium
 Aromaticum, ex Demotheſene. Ad inflammationes ex humorum craſſorū mul-
 titudine obortas. Attenuat breui ac diffundit, & diſcutit humores. Facit & ad
 impura ulcera. Pompholygis drachm. I. æris uſti drach. II. myrrhæ drach. III. la-
 pidis hæmatitæ drach. III. opij drach. III. piperis grana XVIII. croci drach. II.
 gummi drach. III. Tere cum uino chio, aut alio auſtero. Collyrium Scylacium
 inſcriptum, ex ſemine hyoſcyami. Facit ad chemoſes, & affectiones fluidas diu-
 turnas omnigenas. Facit etiam ad ſtaphylomata, & repellit fluxiones. Primum
 cum ouo aquoſum, deinde etiam ſolidum illitum cum ouo. Cadmiæ, æris uſti, la-
 pidis hæmatitæ, chalcitidis uſtæ, ſingulorum quadrantem, miſyos ſeſquiunciam,
 ammoniaci thymiamatis ſeſquiunciam, myrrhæ ſeſquiunciam, opij ſeſquiunciam,
 hyoſcyami ſeminis unciam unam, aloës ſexuncem, gummi ſexuncē. Tere cum
 uino auſtero. Aliud collyrium mirificè faciens ad mycephala. Conſumit et-
 iam pterygia, & carnis in angulo magno incrementum deterit, itemq; cicatri-
 ces. Eſt & ad aſpitudines commodum. Cadmiæ unc. I. æris uſti unc. I. chalciti-
 dis crudæ unc. I. æruginis ræſæ drach. III. myrrhæ ſeſquidrachmā, croci drach. II.
 ſalis ammoniaci drach. I. gummi drach. III. Terito cum uino auſtero. Col-
 lyrium Philagrij, de quo ita ſcribit: Tertium ab his eſt meum collyriū, quod appel-
 lamus Præſeruatiuū, repellens in principio fluxiones, & roborare potens debi-
 les & læſioni obnoxios oculos. Quare non ſolum in principijs lippitudinis, ſed
 etiam ſanis, præſeruationis gratia ipſum adhibere oportet. Cytinorum, hoc eſt,
 florum mali punicæ, qui floribus anemones ſimiles ſunt, dra. XXV. acaciæ flauæ
 drach. XXV. glaucij drach. XVI. aloës drach. V. myrrhæ troglitidis drach. III. atra-
 menti Indici drach. VII. ſolij malabathri drach. I. omphacij ſicci drach. III. gummi
 drach. V. opobalsami ad excipiendum drach. V. Terito cum uino uetere auſtero.
 Collyrium ex Bdellio & Styraçe concoſtorium, Philagrij. Cuius multam ex-
 perientiam habeo, non ſolum probè concoquentis, ſed etiam læſiones ex frigo-
 re obortas citra inflammationem ſanantis. Bdellij drach. VI. thuris maſculi dra-
 chmas X. myrrhæ drach. X. ſarcocollæ drach. V. caſtorij drach. II. galbani drach-
 mas V. ſtyracis drachm. V. croci drach. V. lycij drach. II. ammoniaci thymiamatis
 drach. II. gummi drach. II. Excipe aqua.

Cap. CX

Collyria ad aſpitudines, & exteſoria.
 Collyrium ad aſpitudines Phoenix, appellatus. Facit & ad milphos, & diutur-
 nas affectiones, & ad eos qui palpebras & angulos exacerbatos habent. Lapi-
 diſ hæmatitæ uſti ac loti drachm. XXXII. æris uſti ac loti drach. XVI. lapidis ſciſſi
 ſi uſti ac loti drach. XVI. æruginis drachmas ſedecim. Cadmiæ racemoſæ drach-
 mas IIII. opij drachmas ſex, chalcitidis toſtæ drachmas quatuor, gummi drach-
 mas XVI. Excipe aqua. Collyrium ad aſpitudines Mono inſcriptum. La-
 pidis hæmatitæ ſexuncem, lapidis ſciſſi ſexuncem, æris uſti quadrantem. Cad-
 miæ lib. I. æruginis ræſæ quadrantem, chalcitidis toſtæ unciam unam, opij ſextan-
 tem, gummi ſextantem. Excipe aqua. Eſt & pueris commodiſſimū. Collyrium
 Theophilij, ad pueros mirificū, & aſpitudinibus cōmodum. Cadmiæ lib. I. æris
 unc. XIII. æruginis quadrantē, opij lib. I. gummi lib. I. Excipe aqua. Vſus eſt cū
 ouo in principio aquoſi. In declinatione uero cum ouo craſſius illinito. Aliud
 collyriū, Xyſter à deradendo appellatū. Facit ad albugines. Cicatrices attenuat,
 & oculum imperturbatum conſeruat. Ammoniaci thymiamatis, miniij ſinopici,
 K 4 ſinguloſ

singulorum quadrantē, cerussæ, gummi singulorum sextantē, pumicis tosti unciam unam, excipe aqua. Collyrium aliud ad aspritudines. Facit ad milphos, ulcera, fossulas, ualde uetusta uulnera, staphylomata, mycephala, Lapidis hæmatitæ trientem, lapidis scissi trientem, æris usti trientem, cadmiæ sextantem, æruginis sextantem, chalcitidis ustæ unc. i. opij trientem. Rosas uirides si affuerint, sin minus, siccas, per diem ac noctem aqua macerato, & cum expresso ac excolato cremore terito. Aliud collyrium Xyster appellatum, celebre ad aspritudines. Pumicis usti, ostreorum ustorum, misyos usti, gummi æquales portiones aqua excipe. Collyrium ad aspritudines Eutonum, ab efficaciæ periticia uocatum. Ex Oribasio. Aeris usti drach. xxiij, cadmiæ drach. xxiij, æruginis drach. ii, croci drach. iij, opij drach. iij, myrrhæ drach. iij, gummi drach. iij, chymas nouem. Excipe aqua. Egregiè facit ad asperas palpebras ac callosas, lippitudines scabras, euerisiones, fluxus diurnos, citra ulcerationem, ammixto cygnario, aut collyrio ex croco, facit ad uigores. Sit autem quod ammiscetur decima ipsius pars. In summa palpebras euertere non est opus, sed simpliciter illinere. Hoc alij Harmation, id est, currum. Alij opisthobares à grauitate. Nos autem Eutonum uocamus. Aliud eiusdem, collyrium exterforium inquit, Crysoli, ad aspritudines ex duobus lapidibus. Hæmatitæ lapidis drach. xviii, scissi lapidis drach. xviii, æris usti drach. ix, cadmiæ drach. ix, æruginis drachm. ix, chalcitidis ustæ drach. iij, opij drach. vi, gummi drach. ix. Tere cum aqua & ille line donec tolerarit æger, non confricans palpebras, neq; subiiciens specillum, sed per specilli nucleum explens oculum. Aliud eiusdem, ad multas affectiones. Chalcitidis drach. xxvii, cadmiæ drach. xxi, æris usti drach. xvi, lapidis hæmatitæ drach. xii, croci drach. xvi, misyos drach. xvi, myrrhæ drachmas sedecim, opij drach. xii, gummi drach. xii, Tere cū uino uetere. Collyrium ex oleo folijs. Facit ad diurnas fluxiones. Deprimit etiam aspritudines, & oculum corroborat. Syrici sexuncem, æris quadrantē, opij trientem, gummi drach. viii. Foliorum oleæ tenerorum à fibris depuratorum drach. viii. Cum uino spathite teruntur folia exactè fibris exemptis, ita ut per se in mortario bibe-
duum probè teras, uinum paulatim irrorans. Quum autem leuissima facta fuerint, æs adjicito, & simul diu terito, & sic uinum affundito. Si enim ab initio infusum fuerit uinum, folia innatantia in contrita permanent. Contrito autem ære, syricum adijce, deinde opium, postea gummi, & efforma, ac utere ab initio infundens. In declinatione uero etiam illinens. Ego uero, uelut Demosthenes iubet, folia in mortarium mitto, ac contundo, uino sufficiente paulatim instillato, exprimoq; ac excolo, & cum uino excolato reliqua tero, retrimento foliorum reiecto. Collyrium Harmation, id est, Currus inscriptum: Quo usus est Procleimæus rex. Exterit cicatrices. Acuit uisum, & ad aspritudines cōmodum est. Aeris usti ac loti drach. viii, ammoniaci thymiamatis drach. viii, corticis thuris drach. viii, gummi drach. viii, Excipe aqua. Vfus est cum aqua. Quædam descriptiones habent etiam æruginis drach. ii. Aliud ex lapide Hematite, ad uisum acuendū, cicatrices & callos exterit. Ammoniaci thymiamatis drach. xxiij, æris usti ac loti drach. xxiij, lapidis hæmatitæ drach. xxiij, æruginis drach. viii, gummi drach. xxiij, Excipe aqua. Exterforiū Oribasij. Facit in principijs, & ad chemoses, aquosum cum ouo infusum. Cadmiæ drach. viii, æris drachmas duodecim, croci drachm. iij, myrrhæ drach. iij, opij drach. vi, lapidis hæmatitæ drach. xviii, lapidis scissi drach. xviii, chalcitidis toste drach. vi, æruginis drach. xii, gummi drach. ix, Terito cum uino, & utere cum ouo. Collyriū exterforium Philæ

Philagri per se adhibitum, & cum collyrio suprascripto Philagri ex rosis. Aeris drach. VI. pumicis drach. XVI. testarum sepiæ drach. XVI. gummi drach. XXII. His ego inquit adjicio, squamæ æris drach. XVI. ubi fortius ipsum efficere uoluerō. Collyrium Rînama, hoc est lima inscriptum, Facit ad callosas affectiones, & cicatrices exerit. Facit etiâ ad suffusiones. Cadmiæ dra. XLVIII. ammoniaci thymiamatis drach. XLVIII. opij drach. XVI. lapidis hæmatitæ drach. XXIII. galbani drach. XVI. aloës drach. XVI. opopanacis drach. VIII. fellis taurini drach. VIII. salis ammoniaci drach. IIII. æruginis drach. XVI. myrrhæ drachmas XVI. gummi dra. XL. Excipe aqua. Temperatura sit aquosa. Collyriū extensoriū albuginum, per unam illitionē multam efficaciam ostendens. Facit ad pterygia, & carnis in angulo magno incrementū. Est aut collyrium lene & mor dicitatis exors. Conchylj purpuræ carnis ustæ drachmas decem, æris usti drachmam unam, squamæ æris drach. II. æruginis drachm. VI. atramenti sutoriū drach. III. aluminis scissi obolum unum, lapidis scissi drach. I. lapidis hæmatitæ drachmam unam, stercoris crocodili drachmā unam, lycij drach. I. succi omphacij sicci drach. V. chalcitidis obolos duos, myrrhæ drach. III. thuris masculi obolos duos, corticis thuris drachmam unam, florum mali punicæ drach. I. Excipe aqua. Collyrium Heliadæ, albugines tollens ualde citò, ut mireris. Lapidis armenij quo piciores utuntur, gypli, atramenti sutoriū, floris æris, æruginis, testarum sepiæ ustarum, ammoniaci thymiamatis, lapidis magnetis trahentis, lithospermi, gummi æqualibus portionibus utere, & excipe aqua. Aliud quod præparat Petrus Archiatros, & ipsi bonum testimonium præbet. Salis ammoniaci scrupulos sex, lapidis armeniaci scrupulos duodecim, seminis raphani scrupulum unum, seminis uiolæ albæ scrup. VI. ammoniaci thymiamatis scrupulos nouem, gummi scrup. XII. Excipe succo rutæ. Facit & ad suffusiones incipientes. Collyrium Pressum. De quo Apollonius dicit, optimum esse pharmacum ad cicatrices, & superexcrecentem carnem. Et ad asperas palpebras, & sycofes, & eersiones palpebrarū: calculos item ac grandines, & induratas affectiones, & pterygia, & carnis in angulo magno incrementa, & lippitudines scabras, & pellicularū crassitudines, & multæ ac crassæ fluxionis depurationē. Sed & aquosum ac multū fluxum cohibet: Consumit aut & depurgat securè, attenuatque ac exterit sufficienter mordens. Verum oculum imperturbatū seruat, iucundissimumque ac leuissimum est, & quod debet facit. Est autem hoc. Aeris usti ac loti obol. V. croci drachm. II. myrrhæ troglitidis obol. III. spicæ nardi obol. II. casia obolos tres, cinamomi obol. II. opij obol. II. piperis grana XV. gummi drach. I. uini Chij aut alterius austeri odorati quod satis est. Quod si ad hanc descriptionē spodij drach. IIII. addere uolueris, ad omnem fluxionem ac lippitudinem optimū euadet. Collyrium Isidori Memphitæ ad acuendū uisum. Inungebam inquit, non uidentes, & incipiebant uidere. Appellatur Rhinariū, id est, limula. Ego hoc præparauī. Ammoniaci thymiamatis drach. XVI. æruginis uermiculatæ drach. XII. testarum sepiæ quod molle est drach. VIII. sagapeni drach. VIII. opopanacis drachmas duas, succi cyrenaici drach. I. gummi drach. I. Omnibus aqua prætritis, succi foeniculi drach. XII. adijce, & mellis Attici drachm. XII. Et efforma collyrium ac utere. At uero quidam amicus ipsum nunc sic præparat: Ammoniaci thymiamatis unc. XV. æruginis rasæ deuncem, & drach. II. testarum sepiæ trientem, & unciē dimidium, sagapeni quadrantem & drachmas sex, opopanacis sextantem, succi cyrenaici sextantē. Excipe aqua. Gummi autē non recipit. Aliud, ad uisus hebetudinem, albugines, suffusiones, Hamatiū, id est,

CURTUS

Currus appellatū. Fellis hyenæ drach. IIII, spume nitri drach. III, gummi drach. II, æruginis drach. III, sagapeni drach. III, galbani drach. II, ammoniaci thymiamatis drach. II, baccarum lauri decorticatarum drach. LXX, aristolochiæ rotundæ drach. I, Excipe aqua. Collyrium ad incipientes suffusiones, ut aqua etiam ex auribus fluat, uocatur Aureum, Sagapeni persici puri drach. VIII, æruginis drachmas sex, ammoniaci thymiamatis drach. II, gummi drach. II, Excipe aqua. Tere & utere aquosum illinens, & intra quinque dies efficaciam suam tibi comprobabit: splendidam enim reddet pupillam ac clarā. Collyriū Martiani, quo inquit, in me ipso usus sum ad imminētē mihi suffusionē. Chelidoni capnitidis circa sepes nascentis, rutæ, foeniculi, coriandri, herbas singulas per se exsuccato & excolato, & de succo uniuscuiusque quadrantē coniūcito, & opobalsami drach. IIII, mellis Attici drach. IIII, adijcito, ac terito, donec strigmentitiam habuerint spissitudinē, & tunc succi conyzæ tenuia folia habentis unciam unam addito, ac terito. Et ubi probē habuerint ad excipiendum, gummi puri tulli ac cribrati quantum satis est pro tua uelut Medici coniectura adde quo collyrium fiat, efforma ac utere, ad incipientes suffusiones cum uino. Ad hebetudines uisus cum aqua, illitum autem ad solem locato. Collyrium Proteus. Cui nullum simile est ad initia suffusionis, & ad omnem uisus hebetudinem. Cicatrices etiam ac callos exterit. Cadmiæ drach. XL, cerusæ drach. XL, piperis albi drach. I, succi cyrenæici drachmas octo, croci drachmas sex, opij drachmas decem, sagapeni drachm. XII, lachrymæ oleæ Aethiopice drachmas duodecim, auripigmenti drach. VIII, myrrhæ drach. XII, ammoniaci thymiamatis drach. VIII, gummi drach. VIII, opopanaxcis drach. XVI, opobalsami drach. XII, Excipe aqua pluuiali. Vfus est cum aqua. Collyrium Hermophili Thalassærum, hoc est, marinum, ad omnem hebetudinem accommodatum, & ad omnem incipientem suffusionem. Estque odoratissimum. Cadmiæ drach. XVI, æruginis drach. IIII, atramenti Indici drachmas sedecim, piperis albi drach. VIII, succi Medici drach. IIII, opobalsami drachmas quatuor, gummi drach. XII, Excipe aqua, & utere cum aqua. Temperatura diuersa est iuxta affectiones. Collyrium Indicum Regium inscriptum. Facit ad principia suffusionum, & omnem uisus hebetudinem. Et cicatrices exterit. Cadmiæ ustæ & lotæ lib. I, & trientem, atramenti Indici sexuncem, cerusæ trientem, piperis albi sexuncem, fel hyenæ integrum quantum est, fel scarorum piscium decem, fel perdicum IIII, opij unciam unam, opobalsami sextantē, opopanaxcis sextantem, sagapeni sextantem, gummi lib. I, Excipe succo foeniculi. Collyrium fuluum Panchreston, ab omnimoda utilitate inscriptum, accommodatum ad scabros ac corrosos angulos, & intentos pruritus, & palpebras fricas, cadmiæ drach. LXXX, chalcitidis ustæ drach. XL, piperis albi drach. XL, gummi drach. XL, Excipe aqua. Quidam adijciunt his etiam croci drach. XII, myrrhæ drach. XII. Collyrium psoricum Ptolemæi, accommodatum ad scabros ac corrosos angulos, & intentos pruritus, milphos, hebetudines: Psorici drach. XL, sandarachæ drach. XXX, chalcitidis ustæ drach. XXVIII, croci drach. XXIII, myrrhæ drach. XII, opij drach. IX, casia drach. XII, piperis albi drach. XL, piperis nigri drach. XXVII, omphacij drach. XVI, misyos usti drach. III, folij drach. I, gummi drach. XXXVI, Excipe aqua. Collyriū Hygieni Aureū, ad corrosos angulos, & scabros affectiones, sandarachæ drach. XXXIII, piperis albi grana XII, myrrhæ drach. VI, croci drach. VI, gummi drach. XII, Excipe aqua, & utere cum aqua. Collyriū Dioscenteton. Ex Demosthene: Aeruginis obo. III, misyos tantundē, succi papaueris tantundē, gummi drach. IIII, Excipe aqua, Facit ad prædictas affectiones, & ad uisus

uisus hebetudinē, & incipientes suffusiones. Attenuat etiā cicatrices. Sit autē calidum. Collyrii Stratiotē cōpositio hęc est. Cadmię drach. viii. cerusę drach. xvi. piperis albi drach. ii. æruginis, opij, omphacij, sing. drach. ii. gummi drach. iiii. Facit etiā ad asperas palpebras. Collyrium exterforiū. Aeris usti, croci, ammoniaci thymiamatis, singulorum sextantem, gummi unc. i. Excipe aqua. Facit ad oculos purulentos, argema, nubeculas, caligines. Ad aspritudines uero cum melle. Collyriū celebre, priuatim ad cicatrices in oculis faciens. Facit etiā ad uisus hebetudines, aspritudines & pterygia. Testarū sepię, pumicis, squamę grīs, ammoniaci thymiamatis, æruginis, cornu ceruini usti, sing. lib. i. myrrhę sextantem, thuris sextantem, opij quadrantem, gummi bessellem, ossium palmularum ustorū dextantem, mellis sextantem. Excipe aqua. Hoc pręparabat Afer, & ualde ipsi confidebat. Nominabat autem ipsum Phœnicem nigrum, eo quod ossium ustorum palmularum, (quę phœnices appellantur) dextantem recipit.

Collyria enstacta, hoc est, instillatitia appellata.

Cap. cxi

Collyrium instillatitiū Paccianum appellatū. cadmię drach. lxxiiii. misyos drach. xxxii. stibij drach. xxxii. atramenti futorij drach. xxxii. piperis albi drach. xxxii. æruginis drach. xvi. opij drach. xvi. opobalsami drach. xvi. gummi drach. lxxiiii. Excipe aqua pluuiāli. Facit ad acuendū uisum, & callos exterit.

Collyriū Aromaticum inscriptū. Aeris usti drach. xvi. æruginis drach. iiii. myrrhę drach. iiii. spicę nardi drach. ii. piperis albi drach. iiii. opij drach. iiii. croci drach. iiii. opobalsami drach. ii. gummi drach. iiii. Excipe aqua. Aliud instillatitiū non perturbans. Oribasij. Cadmię drach. xvi. cerusę drach. viii. opij drach. iii. opobalsami drach. iii. æruginis drach. ii. omphacij drach. ii. piperis albi drach. ii. gummi drach. v. Aliud instillatitiū, uisum acuens, cadmię uste & urina pueri extinctę drach. x. stibij drach. vi. atramenti futorij sesquidrach. æruginis sesquidrachmā. piperis drach. ii. misyos drach. ii. opij drach. i. opobalsami drach. i. gummi drach. vi. Excipe aqua. Aliud nigrū, uisum acuens. Facit & ad corrosos angulos. Stibij usti ac loti drach. xl. acacię drach. xl. gummi drach. xl. cadmię drach. xvi. nardi celticę drach. viii. myrrhę drach. viii. croci drach. viii. omphacij drach. vi. opij drach. vi. Excipe aqua.

Collyria ex cornu ceruino.

Cap. cxii

Collyrium Asclepiadę ex cornu ceruino. Ad ulcera, & pustulas, & cicatrices exterit. Cornu ceruini usti ac loti drach. iiii. plumbi usti ac loti drachm. iiii. squamę æris lotę drach. ii. thuris drach. iiii. opij drachmā unam, gummi drachmas quatuor. Excipe aqua. Aliud, ad calidiōres affectiones, & acerrimas fluxiones cum ulceratione. Cornu ceruini usti ac loti drach. xvi. spodij pompholygis lotę drach. viii. squamę æris drach. ii. croci drach. ii. acacię drach. viii. thuris drach. viii. opij drach. ii. myrrhę drach. i. gummi drach. viii. tragacanthę drach. i. amyli drach. iiii. terito cum hyoscyami cremore. Collyriū ex cornu ceruino, uelut Oribasius habet, maximē quidem ad ulcerationes in uigore, claudens. Et ad ulcera ægrē recipientia cicatricem, & resolutas cicatrices. Cadmię drachmas sex, acacię drach. xl. stibij drach. xxxii. plumbi usti ac loti drachmas octo, cornu ceruini usti ac loti drach. viii. gummi drachm. viii. æris drachmas xvi. opij drachm. xvi. myrrhę drachmas quatuor, thuris drachm. iiii. Excipe aqua. Vtere uera ad caua ulcera cum lacte ad sordida, cum succo sceni graci.

Aliud collyriū ē cornu cerui, efficacissimē exterit cicatrices in oculis, cū aqua alitum. Vtere etiā ad exulceratos oculos, cum ouo instillans. Aeris usti ac loti deuna.

deuncem, & scrupul. vi. cornu ceruini usti ac loti tantundem, sibiſſi loti sextantē,
& uncia dimidium, testarum sepiæ trientem, & uncia dimidium, æruginis sex-
tantem, ammoniaci thymiamatis sextantem, & uncia dimidium, myrrhæ sextan-
tem, & uncia dimidium, thuris sextantem & uncia dimidium, Opj sextantem
& uncia dimidium, acaciæ quincuncem, & scrupul. x. v. gummi deuncem. Ex-
cipe aqua.

Collyria Nardina & Theodotia.

Cap. cxiij

Collyrium nardinum Zoili, ad ueteres lippitudines, & myocephala, & ulcera
uetera ac staphylomata, Cadmiæ drach. viij. æris usti drach. viij. sibiſſi drach.
viij. cerusæ drach. iij. castorij drach. iij. spicæ nardi sesquidrachmā, aloës ses-
quidrachmā, folij, croci, chalcitidis tostæ, atramenti sutorij, lycij Indici, opj sin-
gulorum drach. i. myrrhæ drach. ii. acaciæ drach. x. x. gummi drach. x. x. Ex-
cipe aqua. Collyrium nardinum Candidi leuissimum ac ualidissimè resiccans.
Facit ad myocephala & staphylomata mirificè, & maximè glaucis oculis conue-
nit. Vtere etiam in his qui nullam omnino collyrij mordacitatem sustinere pos-
sunt. Cadmiæ ustæ & lotæ lib. i. cerusæ septuncem, sibiſſi loti sextantem, croci
trientem, myrrhæ troglodyticæ trientem, aloës unc. i. acaciæ unc. i. opj sextantē,
spicæ nardi unc. i. gummi bessem. Excipe aqua. Theodotij nardinū. Cuius
multam experientiā habemus in myocephalis, & diuturnis ulceribus oculorū,
& confusionibus. Maximum exterforium est & uehementer corroborat debiles
oculos. Cadmiæ lotæ, sibiſſi loti, acaciæ, gummi, singulorum drach. x. x. v. rosa-
rum siccarum depurgatarum drach. x. ii. æris usti loti drach. viij. myrrhæ troglo-
dytica drach. viij. castorij, lycij Indici, croci, folij, spicæ nardi, chalcitidis tostæ, ce-
rusæ, glaucij, seminis ericæ, opj, gallarum omphacinarū, singulorum drach. ii.
Excipe aqua. Vtere in principijs cum ouo instillans. In declinationibus cum a-
qua. Collyrium Nicarium Zoili, ex lacte nardinum. Ad affectiones & fluxio-
nes diuturnas, ulcera, fossulas, myocephala, staphylomata, ueteres lippitudines.
Tingit etiam cicatrices, & ipsas inconspicuas facit. Cadmiæ ter ustæ & muliebri
lacte extinctæ ac lotæ drachm. c. viij. sibiſſi usti ac muliebri lacte extincti ac loti
drach. x. æris usti & extincti ac loti drach. x. x. x. vi. cerusæ lotæ drach. x. x. iij.
myrrhæ drach. x. ii. opj drach. x. ii. spicæ nardi drach. iij. aloës drach. iij. acaciæ
drach. c. viij. gummi drach. c. viij. Excipe aqua. Collyrium Hygidium, quod
quidam Am nonij dixerunt. Facit ad incipientes suffusiones, & inustiones. Et
ad omne ulcus, & oculos purulentos, confusiones, chemoses, prolapsus, & ad
diuturna myocephala staphylomata, ungues ulceris genus. Repurgat, replet, &
ad cicatricem perducit. Eos uero qui ob aliquam causam, aut propter capitis aut
oculi dolorem, dormire non possunt, præclare ad somnum perducit, uelut soma-
niferum medicamentū. Vtere cum ouo, aut lacte, aut aqua, temperatura sit me-
dia aut crassior, pro sensus ægrorum subtilitate. Habet autem hoc modo: Cade-
miæ lotæ drach. x. vi. cerusæ lotæ drach. x. vi. castorij drachm. vi. nardi Indici
drach. iij. sibiſſi loti drach. x. l. æris usti loti drach. x. v. rosarum drach. x. x. squa-
mæ æris ustæ drach. v. aloës drach. vi. calicæ drach. iij. myrrhæ drach. vi. lycij In-
dici drach. iij. lapidis scissi loti drach. iij. & dimidiā, croci drach. vi. plumbi
usti ac loti drach. viij. & dimidiā, opj drach. iij. acaciæ drachm. x. l. gummi
drach. x. l. Excipe aqua. Est ex ualde celebribus. Collyrium Indarium: Pipe-
ris drach. ii. cadmiæ drach. iij. costi drach. i. sibiſſi drach. viij. gallarum drach.
iij. spicæ nardi drach. iij. nardi drach. iij. acaciæ drach. iij. gummi dra. iij.
opobalsami drach. ii. Excipe aqua. Facit ad uisus hebetudinē, Exterit etiam
cicæ

cicatrices. Collyrium Theodotiū Placianum. Facit ad maximos humorum il-
 lapsus, & doloris molestias. Liberat citra uenæ sectionem. Cadmiæ ustæ ac lotæ
 drach. viii. aris usti ac loti drach. viii. stibij loti drach. xvi. croci drach. iii. ca-
 storij drach. iiii. æruginis drach. i. aloës drach. iiii. myrrhæ troglodyticæ drach.
 iiii. lycij Indici drachm. ii. opij drach. ii. acaciæ drach. xxi. gummi drach.
 xxi. Excipe aqua. Vfus est cum ouo. Temperatura sit crassior. Collyrium
 quod tumorem laxum palpebris inducit, appellatur Testamentū Aurifabri, re-
 liquit hoc moriens templo Ephesio dicatum, quo hi qui à Medicis relictī essent,
 in templo sanitatem consequerentur. Inuentum est autem ab Adriano Cæsare.
 Facit ad humorum illapsus, & aspritudines, & ad omnes desperatas affectiones,
 pustulas sanat, caua ulcera explanat, cicatrices inconspicuas facit, oculum imper-
 turbatū conseruat. Instillatur cum ouo aut lacte, prout necessitas expetit. Sit au-
 tem in omnibus dilutum aquosum. Optimū est insuper ad acuendū uisum. Ha-
 bet hoc modo: Cadmiæ lotæ drach. viii. stibij loti drach. xvi. spicæ nardi drac.
 iiii. myrrhæ troglodyticæ drach. ii. croci drach. i. castorij drac. ii. squamæ ferri
 stomomatis drach. iiii. aris usti ac loti drach. xxi. æruginis drach. ii. cerusæ drach.
 iiii. piperis, lycij Indici, opij, thuris, opobalsami, casie, sing. drach. ii. lapidis scissi
 si dra. iiii. æruginis uermiculatæ drach. iiii. atramenti futorij drach. ii. succi fœ-
 niculi drach. iiii. fellis capræ drach. iiii. gummi dra. viii. Terito cum uino Ami-
 neo aut Falerno, aut alio austero ueteri odorato. Collyrium Testamentū, ue-
 lut habetur apud Asteriū. Cadmiæ drach. lxx. stibij dra. lxxx. myrrhæ drach. v.
 & dimidiā, spicæ nardi drach. x. croci drach. x. castorij drach. vii. squamæ ferri
 stomomatis drach. xiii. folij drach. xxi. aris usti drach. v. & dimidiā, piperis
 drach. vii. cerusæ drach. xxi. lycij, thuris, casie, opobalsami, singulorum drach.
 xxi. opij drach. vii. lapidis scissi drach. xxi. æruginis uermiculatæ dra. viii.
 atramenti futorij drach. xiii. gummi drach. lxx. succi fœniculi drach. xiii.
 fellis caprini drach. xiii. Terito cum uino Aminæo. Collyrium Theodotiū
 Magnum. Cadmiæ lotæ bessæ, aris loti bessæ, stibij loti unc. xxv. rosarum
 siccarum, cerussæ, chalcitidis, gallarum, æruginis, lycij Indici, croci, aloës, spicæ
 nardi, myrrhæ troglodyticæ, ramentorum ebeni, castorij atramenti Indici, thuris,
 opij, sarcollæ, pompholygis, singulorū unc. i. cornu ceruini usti ac loti unc. i.
 acaciæ unc. xxv. gummi unc. xxv. Excipe aqua. Quidā uero etiam folij un-
 ciam unam adijciunt, & amomi unc. i. rosarum uero quadrantem, gummi ue-
 to & acaciæ, singulorum unc. xxi. Reliqua autem eodem modo. Facit ad
 incipientes lippitudines, & exulcerationes omnes, & fluxum recentem, ac uete-
 rem, inflammationes, carbunculos, oculos purulentos, nomas, puncturas, pro-
 lapsus, myocephala, staphylomata, palpebras asperas, & ad desperatas affectio-
 nes. Et ad ardores solis, aut calcis, aut pulueris, aut similis rei. Tollit etiam ptery-
 gia inflammata cum butyro. Ad ulcera uero cū ouo adhibetur. Ad maligna au-
 tem cum lacte muliebri. Theodotiū Seueri. Aliud quoddam collyriū etiam
 apud nos reperitur, inquit Seuerus, à ueteri quodam descriptum. Et hoc quidē
 compositā materiam habet, uerum efficaciam diuersam. Nam omnibus simul re-
 necessariū puto, quum neq̃ omnibus hoc sit notum. Recipit aut cadmiæ drach.
 xxi. aris usti drach. xxi. stibij drach. xl. cerusæ drach. viii. chalcitidis tostæ
 drach. iiii. misyos tostæ drach. iiii. ramentorū ebeni drach. ii. nardi celticæ dra.
 iiii. folij drach. iiii. spicæ nardi drach. iiii. croci drach. iiii. castorij dra. vi. aloës
 drach. viii. lycij Indici drach. iiii. rosarum siccarū drach. iiii. gallarum drach. ii.

L opij

opij drachmās duas, myrrhae drach. viii, acaciae drach. xl, gummi uermiculati drach. xl, Cadmiam prunis obruimus, & uentilamus, & ubi ignita facta fuerit ablatam, lacte asinino extinguimus. Stibium uero in fictile uas coiectum, ad dito operculo, foramen habente urimus, & similiter lacte extinguimus. Vsta uero singula per se tusa ac cribrata lauamus, & diligenter siccamus, & deinde ponderata ad preparationem adiicimus. Ceterum gummi non contusum inspergimus siccum, sed madefacimus: sic enim neq. lignosum quiddam, neque arenosum, cum ipso penetrabit dum excolatur, & optima coactio collyrij fiet. Quidā ad relatum preparationem adiiciunt etiam costi drach. viii, Et magis ita cicatrices exerit inquit, & pterygia ac carnis in angulo incrementum consumit. Verum ad inflammationes & ulcera incommodus est costus. Huius igitur auxilij actiones ac efficaciam dicere non est facile. Audientes enim uix crediderint. Nam desperatas affectiones ad naturalem statum reuocat. Et ut in summa dicam, omnia quae Theodotij appellatis ac nardinis, & his quae ex cornu ceruino parantur adfunt, multo plus in hoc comperiuntur: in recentibus enim affectionibus colluto, & spongia oculo imposita, agrum ab affectione liberauimus. In diuturnis autem ac desperatis, partim instillantes, partim illinentes, scopum attigimus. Nam in facili solubilibus oculi affectionibus ipsum illinimus. In cauis autem & sordidis ulceribus, diluto ipso utimur, cum ouo aut foeni graeci succo. Quandoq. etiam cum aqua mulsā. In myocephalis autem, crassius cum aqua sublinimus per subiectionem. Sed & cicatrices similiter attenuamus. Ad tantam autem tenuitatem perducit cicatrices, ut penitus non cognoscantur per sensum. Et in summa, inenarrabilem quandam uim possidet. Etenim in staphylomatis, brassicae succo dilutum collyrium, & crassa copia oculo adhibitum, unā cum spongiae deligatione, molem inconspicuam facit. Quin & carnis in angulo magno incrementum consumere potest hoc collyrium tenuiter tritum, & in siccum puluillum redactum, itemq. pterygia attenuare. Sed & ad alia mirificum compertum est collyrium. Et nos quoq. permittimus posteris per experientiam deductis, ut auxilij testimonium praebeant: iam enim quidā ad diuturna ulcera ac fistulas sedis ipsius, scopum attigerunt. Vnde non absurdum fuerit etiam ad polypos ac ozaenas narium ipsum adhibere. Collyrij ex succo foeniculi. Cadmiae dodrantē, stibij bessem, misyos crudi sexuncem, aeruginis sexuncem, piperis quincuncem, atramenti sutorij sesquiunciam, chalcitidis unc. i, croci sesquiunciam, folij unci. i, omphacij sesquiunciam, spicae nardi trientem & unciae dimidium, opij quincuncem & unciae dimidiū, opobalsami trientem, gummi sextantem, succi foeniculi bessem. Et rursus aliud foeniculū in aqua pluuiali decoquito, & cum decocto illa terito ac efformato. Hoc a multis preparatur.

SEPTIMI SERMONIS AETII FINIS.

INDEX

- A**d superciliorum ornatū. Caput i
De hypopijs, hoc est, ijs quæ sub
oculis fiunt suggillationibus. Cap. ij
Vngenta præservantia faciem ne à so-
le aut vento exuratur. Cap. iij
Vt ne rugosa fiat facies. Cap. iij
Ad faciei nigredines. Cap. v
Smegmata & medicamenta faciem ni-
tidam reddentia. Cap. vi
Cataplasmata æstiva odorū corpus red-
dentia. Cap. vij
Portiones ad eos qui tetrum habent cor-
poris odorem. Cap. viij
Ad menti scabriciem. Cap. ix
Ad faciei lentigines remedia, quibus
etiam ad maculas à sole prouocatas,
& ad uaros utilicet. Cap. x
De maculis à sole prouocatis, quas Gre-
ci *spalides* appellant. Cap. xi
De stigmatibus siue notis ex plaga illatis.
Cap. xij
De uariis faciei, qui tum Ionthi, tum Ac-
nae Græcis uocantur. Cap. xij
De ficosis faciei tumoribus. Cap. xij
Ad manantes menti papularū eruptio-
nes. Ex Critone. Cap. xv
De impetiginosis tum menti, tum reli-
qui corporis tumoribus. Cap. xvi
Ad molestum oris odorem. Cap. xvij
Ad labiorum fissuras. Cap. xvij
De dentium affectionibus. Cap. xix
Ad inflammatas gingiuas. Cap. xx
Ad cruentas gingiuas. Cap. xxi
Ad excrecentes gingiuas putrescen-
tes, & ac tumentes. Cap. xxij
Ad corrosas & ab ulcere serpente infe-
stas gingiuas. Cap. xxij
Ad parulidas, hoc est, gingiuarū inflam-
mationes. Cap. xxij
De epulide, hoc est, excrecenti gingiuarū
carne. Cap. xxv
De gingiuarum fistulis. Cap. xxvi
Cura dentium à calido morbo doloro-
so affectionum, ex Adamanto sophia-
sta. Cap. xxvij
- Cura eorum quibus ex frigidityte den-
tes dolore afficiuntur. Cap. xxvij
Cura dentium ab humiditate dolore
affectorum, & laxatorū. Cap. xxix
De dentibus lima atterendis. Cap. xxx
Cura dentium à siccitate dolore affec-
torum. Cap. xxxi
Cura dentium ob caliditatem & humi-
ditatem dolore affectorū. Cap. xxxij
Curatio eroforum dentium. Cap. xxxij
Vt dens citra dolorē, & absq; terro tole-
latur. Cap. xxxij
Smegmata uaria ad denigratos liuen-
tesq; ac rarefactos dentes. Cap. xxxv
De ancyloglossis, & qui uix loqui pos-
sunt. Cap. xxxvi
Ad ranunculum sub lingua. Cap. xxxvij
Ad linguam inflammatam, desquama-
tam ac tumore inflatam. Cap. xxxvij
Ad aphthas hoc est oris ulcera. Cap. xxxix
De gurgulionis affectionibus. Cap. xli
De ablatione columnellæ. Cap. xli
De oris inflammationibus. Cap. xlij
Illitiones ori commodæ. Cap. xlij
Summaria doctrina de usu omnium il-
litionum ad os apparatarū. Cap. xlij
De tonsillarum inflammationibus. Ca-
put. xlv
De crustosis & pestilentibus tonsillarū
ulceribus. Cap. xlv
De angina & eius speciebus. Cap. xlvij
De glandulis. Cap. xlvij
De suffocatorum reuocatione. Cap. xlix
De deuoratis in tonsillas spinis, atque
his quæ in asperam arteriā delabun-
tur. Cap. l
De arteriarum pharmacis. Cap. li
Ad inueteratas affectiones uariæ arte-
riarum. Cap. liij
De destillatione siue catarrho, & nariū
muco. Cap. liij
De tussi. Cap. liij
De pharmacis dolorem leuantibus &
conferentibus tussi. Cap. liij
De suffitionibus. Cap. lvi

| | | | |
|---|------------|--|-------------|
| De orthopnoicis, anhelosis, & aggrè spiritum ducentibus. | Cap. lvij | Cōmunes methodi exhibendorum auxiliorum in singulis reiectionis sanguinis speciebus post sanguinis inhibitionem. | Cap. lxiij |
| De cordis tremoribus. | Cap. lvij | De asperæ arteriæ ulceribus. | Cap. lxxv |
| De sanguinis reiectione. | Cap. lix | De pectore suppuratis. | Cap. lxxvi |
| Curatio eorum qui ob destillationem sanguinem expuunt. | Cap. lx | De peripneumonicis. | Cap. lxxvij |
| De his qui ob frigiditatem organorum respirationis sanguinem expuunt. | Cap. lxi | De phthisicis seu tabidis. | Cap. lxxvij |
| Curatio eorum qui iuxta alium quemcumque tandem modum sanguinem ex pulmone reieciunt. | Cap. lxiij | De pleuritide seu laterum morbo. | Cap. lxxix |
| | | De ea quæ pleuritis esse putatur, quum tamen non sit. | Cap. lxxix |

AETII MEDICI GRAECI CONTRA CTAE EX VETERIBVS MEDICINAE, TETRABIBLI, SIVE QVATERNIONIS SECVNDI, Sermo mo Quartus, & ex ordine Octauus.

De faciei, oris, & tonsillarum affectionibus: Cui annexum est, De destillatione, & tussi, asperæ arteriæ, pulmonis, ac thoracis affectionibus.

AD SUPERCILIORVM ORNATVM.

Cap. i.



QUANTVM quod ad hanc rem attinet, iam antè à nobis dictum sit, ubi de defluuio capillorum capitis, Sermone sexto, mentionem fecimus, dicemus tamen & hic, non importune, sed ut habet, paucis. Illitio augens superciliorum capillos, atque etiam aliarum corporis partium, eadem etiam eosdem nigros reddit. Nucum ponticarum interiora in uase figulis no torreta contere, & pinguedine capræ syluestris excipe, atque cum hoc ipso partes inungi præcipe. Aliud. Adianti unciam unam, ladani sextantem, passii cretici heminam unam, contunde ac subige cum passo: deinde ut dictum est, ac rursus cum pingui capræ syluestris, aut urli contere, & utere. Potes & huc accommodare ea, quorum meminimus Sermone sexto. Item ex armeniaco lapide de quo Sermone secundo capite duodecimo diximus, sicco trito supercilia insperge.

De hypopijs, hoc est, his quæ sub oculis fiunt fugillationibus.

Cap. ii

Quod hypopia sub oculis fiant, ipsum nomen indicat: siquidem hypopium Græcis hypophthalmium significat, quod Latinis, sub oculis sonat. Sunt autem hypopia ex genere suffusionum sanguinis in locum contusum: fiuntque ex plaga, quum tenuibus sub cute uenulis contusis, sanguis per fissuras sub ipsam cutem, affatim effunditur, neque id uno loco. In grumos enim coit statim, & liuet locus, progressuque temporis nigrescit. Quare medela occurrendum est, antequam nigrescat, cura potissimum ad hoc adhibita, ut concretus sanguis discutatur.

tur. Quod si tunicula quoque rumpatur uenularum, ex quibus effunditur sanguis, miscendum est his quæ discutendi uim obtinent, parum quiddam ex contriti-
gentibus. Nam si in principio sola discutientia exhibeantur, non tantum id quod
effusum est discutient, sed per ipsas uenarum contusarum fissuras amplius quiddam
elicient ex sanguine in ipsis uenis contento. Quum uero in naturam suam redie-
rint uenulae, etiam citra admixtionem costringentium, ad discussoria transeundum.
Atque ego sane in principio uxor Nili ex rosas collyrio, ex eo in aqua dissoluto, lo-
cum sugillatum illinens. Vxor autem pro fomento, decocto meliloti & fenigra-
ci. Deinde collyrium quoque in eodem decocto dissoluo, aut etiam in solo fenici
graci decocto. Quod si reliquiae quaedam resisterint ipsius adfectionis, dissolu-
tis ex myrrha collyrijs in fenici graci decocto, illino bis in die, prius tamen cum
spongia in decocto madefacta loco feto. Idem praestat in principio, non presen-
te ex rosas collyrio, glauci in illitum, & sex olei coquendo condensata. Inue-
teratum autem iam malum ex sandice collyria tollunt & quaecunque praclare
omnino discutunt, qualia Dioscorides inter facile parabilia enumerauit. Ea es-
sunt quæ sub oculis sunt sugillata, inquit, & liuores iam inueteratos tollunt, ra-
phani cortex cum melle illitus, bryoniae radix uino aut cerato excepta, bulbus
cum uitello oui impositus, aqua marina calida pro fomento, aut muria uel salu-
go, caseus antiquus cum decocto hyssopi impositus, statim autem tollit sepiæ te-
sta cum aceto illita, sinapi cerato exceptum, cucumeris syluestris radix contrita cum
melle, lini semen contritum cum lacte. Critonis compositio. Ad liuores al-
te infixos, & ea quæ sub oculis sunt sugillata, seminis uiticis albi drachmas tres,
radicis herbae lanariae siue radiculae drachmas tres, nitri rubri, corticis raphani,
hyssopi, farinae fabarum, uniuscuiusque drachmas tres, myrobalani drachmas XL,
cineris pulmonis agni exusti drachmas XL, bulborum rubrorum drachmas XL,
radicis thapsiae aut succi drachmas quadraginta, corticis thuris drachmam unam:
excipe cerato ex oleo rosaceo apparato, ac linteolo infartum impone. Oportet
autem assidue amouere, cum cautione, ne locus exulceretur. Ego autem exper-
tus sum, nucem pinguem, uetustate rancidam, certissimum ad liuores remedium.
Porro reclinato ac supino remedia adhibere conuenit, ut adhaereant spatio ho-
rarum trium quam optime contrita.

Circumlitioes praeseruantes faciem, ne a sole aut uento
exuratur.

Cap. III

Circumlitio faciei, quæ aurea appellatur: Lupinorum siccorum sextarios III. aquae
pluuialis sextarios XLIII. iniice in uas aereum, stanno obductum, sinasque mada-
fieri per triduum: quarta autem die decoque ad prunas usquequo dissoluantur
lupini: deinde per colum exprime liquorem, ac eum seorsim decoque, atque ubi co-
densatus fuerit, in uas uitreum repone. Vbi uero uti uelis, quantum satis uidebitur
accipe, & cum eo in modica aqua dissoluto faciem illine. Alia ualde laudata.
Similaginem totam & per pannum percolatam sinas desiderare, aquamque abijce, fecem
autem cum albumine oui permisce donec mellis crassitiem accipiat, & cum hoc
faciem obline uersaturus in sole: quum uero a sole recesseris, frigida multa ablue.
Alia. Boni coloris faciem hæc reddit, atque item uniuersum corpus. Mastichen
cum oleo omphacino dissoluta circumline: aliquando autem & olei loco medullam
ceruinam, aut uitulinam accipimus: aliquando ceratum liquidum. Alia. Cupressi
si acilicis scobem in oleo decoctam oblini. Alia. Solani succum cum oleo illine:
Alia. Noces pineas cum modico aceto contere, adiecto melle sufficienti,
ac oui crudi uitellis, atque hoc ipso faciem oblini: neque refert etiam si citra ace-

L 3 tum ed

tum eo utaris. Alia. Hæc in æstate conuenit, faciem præseruans: tragacanthi, ammoniaci thymiamatis, costi contusi, cuiusque sextantem, aluminis liquidi drachmas quatuor, thuris sextantem, amyli sexuncem, oua cruda recentia xiii, mellis libras tres, mulsi sextarios tres. Tragacanthū, ammoniacū, & thus in mullō madefieri per noctem unam, in uase uitreo finito; oua autem integra in aceto uetus & acre proiecta, per triduum macerato; alumen uero optimè lauato; deinde omnia simul in mortariū fictile cōiecta ac diligenter cōmixta, melle cocto excipito, atq; utere, faciē ex eis oblinendo. Ante ingressum uero balinei, medicamentum hoc tollatur, atq; id particulatim auellere conuenit leni tractu ex facie induratum; deinde aqua tepida abluere, & sponsia abstergere; quod ubi factum est, manna thuris in albumine oui dissoluta, faciem illinito.

Ut ne rugosa fiat facies.

Cap. iiii

Faciem corrugatā extendit medicamentū hoc: cornu cerui non antiquum in aqua decoque, donec succulentū quid remittat; percola deinde ipsam aquam, et cum ea farinam fabaceā subige, ac pastillos informa, eosq; in umbra aquam, et autem usus postulauerit, quantum opus fuerit in aqua dulci dissolue, ut ceratū quidi crassitiem accipiat, & cum eo faciem oblinere iube, atq; quum adglutinatum fuerit, faciem aqua tepida abluere præcipe.

Ad faciei nigredines.

Cap. v

Ad faciei nigredines his utendum est, iridis contritæ, farinæ prissanæ, farinæ fabaceæ, cuiusq; sextarium unum & dimidium, salis ammoniaci, cornu ceruini usti, ammoniaci thymiamatis, cuiusq; sextantem, in aqua dissolue, & pastillos informa, quos in umbra exsiccatos adserua, atque usus tempore, in aqua resolutos ante balineum faciei illini. Aliud. Farinæ prissanæ, thuris, iridis, farinæ fabarum, farinæ erui, spumæ nitri, costi, cuiusq; choeniceis partem quartam, amygdalas amaras xx, informa cum candido ouorū & lacte asinino, exsicca in umbra, ac utere ut dictum est.

Smegmata & medicamenta faciem nitidam reddentia.

Cap. vi

Quandoquidē post unguentorū ablationem pleriq; faciem extergere conatur, utendum ad hanc rem compositionibus infra scriptis. Smegma illustriore reddens faciem. Amygdalas decorticatas xl, thuris, spumæ nitri, gummi cuiusque drachmam unam, farinæ fabaceæ drachmas xii, excipe oui candido, & in pastillos digere, quibus cum aqua solutis, passim tum in balneo, tum citra balineum utaris. Aliud. Smegma faciei celebre & admirandum, quod & faciem illustriorem reddit, & rugas expolit, asperitates pellit, incipientem elephantiasin arcet, siquidem cum alijs remedijs adhibeatur; usus eius etiā reliquo corpori conueniens est. Mastiches, thuris, ammoniaci thymiamatis, iridis, cuiusque unciam unam, tragacanthi sesquunciam, succi uuæ acerbæ immaturæ dodrantem, seminis peponis unā cum concluso in ipso humore sextantem, candidum ouorum xxi, similaginis sextarios quinque; contunde omnia ac cum candido ouorum & humore peponis, succoq; uuæ acerbæ commisce, & in pastillos redige, ac exsicca, post uero contusos ac attritos, in uase uitreo ad usum adserua. Smegma faciei, quod simul & ipsam rubicundam reddit. Farinæ erui, fabarum, lupini, prissanæ, ciceris, bulborum narcissi, cuiusque sextarii Italici dimidium, similaginis sextarium unum, contunde ac cribro tenuissimo excute; deinde oui candido commixta, in pastillos digere, & in umbra desicca. Vsu uero expetente, quantum libet accipe, & in aqua dissolue, atque a balneo utere. Aliud, faciem illustans, & uniuersum corpus: dissipat autem & rugas, & cutem depurat.

Vitis

Vitis albæ radicem delibra ac in sole æstiuo exsicca; deinde contusâ ac cribratâ Italici chœnicis dimidium accipe, iridis contusâ tantundem, myrobalani siccæ decorticatæ tantundē, farinæ fabacæ chœnicem unum; hæc in uino ueteri odorato subacta, in pastillos digere, quos in umbra exsiccatos adserua: & usû expetente, contusis & cribratis cum aqua utere. Aliud Cleopatraræ reginæ, odoratum & preciosum. Costi, myrrhæ troglodyticæ, iridis, spicæ nardi, amomi, folij malabathri, cassiæ, floris iunci odorati, cuiusq; unciam unam, myrobalani libras quatuor, spumæ nitri libram unam, contundito, cribrato, utitor, confert uniuerso corpori. Aliud, efficax & odoriferum. Floris iunci odorati, iridis, cuiusque drachmas duas, mastiches drachmam unam, contere, & cum succo pûssanę crassissimo pastillos forma, & in umbra desicca. Vbi uero usus expetit, in aqua dissolutos illinito, & post horæ spatium frigida abluito. Aliud, splendidam & erugatam reddens faciē, ac totum corpus: Farinæ fabacæ Italicum modium unum, similaginis Italicos sextarios quatuor, trifolij contusi sextarios quatuor, myrobalani tantundem, iridis contusâ tantundē, ammoniaci thymiamatis libram unam, costi tantundem, candidum ouorum recentium crudorum sexaginta, seminis peponis unâ cum humore chœnicem unam, succi uuæ acerbæ tantundem, subige & informa pastillos, quos sufficienter in umbra exsiccatos à balneo illine. Præclare facit & ad eas quæ in collo sunt, & reliquo item corpore nigredines. Aliud, ad faciē nigredines, multo usu exploratū. Thuris sesquunciam, cerusæ probè lotæ, spumæ argenti in decocto cicero alborū, ad solem frequenter ablutæ, amyli recentis, scobis marmoris albisissimi, mastiches puræ, spumę nitri albens, testarum sepiæ, singulorum unc. i. saponis Gallici uncias xii. candidum ouorum decem appara, & utere, ut dictum est. Aliud mirabile faciē depurgans & illustrans. Farinę foeni græci trientem, terrę Samię quę Aster appellatur, quadrantē, amyli trientē, mastiches, sexuncem, medullæ ceruicę recentis sexuncem, tragacanthi trientem. Tragacanthū in lacte muliebri aut alinino macerato, ac cum eo dissoluto, reliqua tenuissimè trita in pastillos digerito: quibus in umbra desiccatis, ut prædictū est, utitor. Aliud smegma. Ricini seminis interioris drach. viii. bulborū narcissi siccorum ac decorticatorū drach. viii. similaginis drach. iiii. thuris drach. ii. candidū ouorum viii. appara ut dictum est, & utere. Sapo quo usa est Pelagiā patriciā, ad faciē illustrandā. Saponis Gallici sexuncem, cerusæ sextantē, mastiches uncie dimidiū, medullę cerui unc. i. spumę nitri albi trientem, cerę albæ quadrantē. Præmacera saponē in aqua in uitreo uase ad dies v. aqua pluuiali quotidie permutata, & sapone excolato. Postea in ollam nouam immitte saponē, & sexta die rursus affusa pluuiali aqua, ad lentas prius decoque, donec sapo dissoluatur. Deinde cerā & medullam adde, & ad dissoluta mastichen & spumā nitri insperge, olla amota, & assidue per spatium commota. deinde etiam cerusam modica aqua tritam adde, & medicamentū in testā missum contentē manu subige, & reposito in uitreo uase utere uelut dictum est. Smegma ex Rufi libris, ad totius corporis erugationē. Ficus pinguisimas, uitis albæ radicem siccā delibratā, sepiæ testam ustam, farinā erui: unumquodque seorsim contunde: deinde etiam simul, & modico adstillato melle, utere. Aliud smegma, quod uniuersum corpus odore imbuat. Terræ cimoliæ bessē, iridis tenuissimè tritæ drach. xx. iiii. nardi Celticæ drach. xx. iiii. cyperi, cardamomi, styracis flauī & pinguis, cuiusq; dra. x. ii. styracē in uino ueteri odorato dissolue; & in promptu habe: terram uero cimoliā in fictile uas coniectā carbonibus impone, atq; ubi satis canduerit ab igne, eam ad dissolutū styracem iniice, deinde re-

liqua sicca tenuissimè trita insperge, ac simul sufficienter unita in pastillos digere, quibus in umbra exsiccatis, post uero tritis & cribratis utere.

Catapasmata æstiva, odorū corpus reddentia, Ex Critone. Cap. VII

Quum sudores corpus uexant, magna oboritur ex eis molestia, præsertim in æstate. Nam & sordes multas inuehunt, & tetrum odorem de se præbent. Quare subscriptis remedijs uti conuenit, non ad mulieres tantum, sed ad ipsos etiam uiros. Non importunum enim esse putō & in hoc smegmatum tractatu harum rerum mentionē facere. Catapasma, hoc est, inspersio totius corporis odorē bonum efficiens, æstiuum. Rosarum siccarum quadrantē, cassiæ quadrantē, amomi, costi, spicæ nardi, cuiusq; drach. II, aluminis liquidi sextantē, dissolue in uino ueteri odorato, & in pastillos digere, quos in umbra exsiccatos usu expetere contundito, ac cribrato, atq; in balneo inspergendos exhibeto, ita ut diligenter perfricent, & cum frigida aqua abluant. Aliud. Spumæ argenti in decocto cicerum ad solem inalbate, amomi, cassiæ, folij malabathri, costi, spicæ nardi, aluminis liquidi, iridis, omnium par pondus, appara, & utere ut dictum est. Potes autem præscriptis catapasmatis uti quocunq; tempore uelis. Aliud odorum & lene, Rosarum uiridium & tamen siccarum drach. XL, myrrhæ troglodyticæ drachmas octo, iridis illyricæ, spicæ nardi, cassiæ, cuiusq; drach. VIII, uino odorato subige, & pastillos informa: quibus ubi uti uelis, cōtritīs & cribratis corpus insperge, maxime à balneo. Aliud. Amomi, cassiæ, spicæ nardi, costi, folij, myrrhæ, singulorum æquales portiones. Vini quod satis est, para ac utere uelut dictum est.

Aliud. Cassiæ, iridis, myrrhæ, aluminis optimi, pares portiones uino subige, & pastillos forma ac utere. Aliud. Iridis, spicæ nardi, floris iunci odorati, cuiusq; drach. IIII, amomi drach. II, myrrhæ drach. II, meliloti drachmas quinque, appara & utere similiter. Archigenes autem inquit: Ad omnes corporis terrosiores, atq; eos qui grassoniæ à Græcis appellant, ante omnia conducunt exercitia, inunctiones, siccæ fricationes, alui frequēs subductio. Sunt etiā cibi ad destruendum hoc malum cōmodi, itēq; illitiones. Cōueniunt itaq; oleū rosaceū, melinū, myrteum, iris sicca per se in puluerem redacta & intrita. Aut alumen liquidū in aqua uel uino dilue, & myrrham tenuissimè tritam admisce, ac ad mellis crassitudinem redige, & ex eo collum, locos sub alis, inguina, & reliquos exsudantes locos inunge. Aliud. Aluminis liquidi drach. IIII, myrrhæ drach. IIII, spumæ argenti loræ drach. II, cassiæ drach. I, contere, & cum eis sub alis locos, intermedia coxarum & inguina confrica: tollit enim euestigiō eorum foetorē. Aliud. Cassiæ drach. IIII, aluminis scissilis drach. II, utere cum uino per se. Aliud. Myrrhæ stiches quadrantem, aluminis scissilis unc. I, utere cum uino. Aliud. Myrrhæ troglodyticæ, iridis illyricæ, florum rosarum siccarum, æquales partes contunde, & cribra, ac forma pastillos cum uino, eosq; in umbra sicca, ubi uentus non spirat, Deinde cōtusos ac cribratos in pyxide repone coopertos, ut ne transpirent, & utere à balneo inspergens ac defricans locos leniter, atq; ita imbibi sine, & postea frigida ablue, & manet odor, de quo meritō mireris. Probē facit & alumen cum uino, & crocomagma cū myrrha. Et cupressi ramenta ac alumen cū uino.

Potiones ad eos, qui tetrum habent corporis odorem.

Cap. VIII

His uero qui foetentē habent corporis odorē, eiusmodi potiones exhibere conuenit. Cardui radicē in uino albo decoctā propina, & efficiēt urinā crassam & foetentē. Aliud. Resinā terebinthinā oliuæ magnitudine cū pari melle decoque, & quotidie deglutendā exhibe, & uinum insuper absorbendū. Aliud. Myrrhæ & serap.

& serpyllum paribus partibus terito, & in pilulas formato, quarū duas deuorandas dato, & uinum insuper absorbendū. Hæc etiam ad oris graueolentiā faciunt.

Ad menti scabriciem, ex Galeno.

Cap. 1x

Fiunt & in mento aspredines ut plurimum seroso humore à capite destillante, & præcedentibus furfuraceis in collo ac uicinis partibus squamis, aliquando autem usque ad auditorios pertingit ac perrepat meatus. Estq; omnino hæc affectio dolorosa, pruritus inferens ac distendens corpus: quare subscriptis remedijs est subueniendum. Critonis. Amurcam ex oliua prius quàm exprimitur destillante, decoque quousque cogatur, eaq; assidue locos inunge. Aliud. Myrrhæ unciam unam, ouorum crudorum uitellos quinque, myrrham cum lacte dilue, deinde adijce ei oua, eaq; simul passo excipe, ac assidue illini, & miraberis effectum. Aliud pharmacū efficax, quo multos hac affectione detentos liberauimus. Glaucij dra. xvi, gummi drachmas quatuor, lachrymæ olei tantundem, dissolue, & ad strigmentitiā crassitudinem cum passo redige, atq; assidue illine. Exulcerata autem cute & circumdolente, sequentibus utendum. Pinguis compositio ad faciei manantes & squamosas affectiones, ac asperitates, utilis etiā existit sedi, conuenitq; ambustis ab igne. Spumæ argenti unciam unam, ceræ tyrrhenicæ trientem, ouorum assatorum uitellos tres, adipis anserini bene subacti trientem: spumam argenti in farinā redige, ac adijce ei oua, deinde his simul unitis infunde quantū sufficit lactis, ut ad strigmentitiā crassitiē redigant, postea ceram liquefactā unā cum pingui, refrigeratāq; ac crassam, conijce, ac simul commisce, atq; in pyxide reconde. Vsu uero exigente, de eo quantum satis esse uidebitur accipe, ac cum rosaceo dilutum impone. Potes autem & sedis remedijs, & quæ ad ambustos ab igne descripta sunt, consimiliter in hac affectione uti.

Ad faciei lentigines remedia, quibus etiam ad maculas à sole

Cap. x

prouocatas, & ad uaros utilicet. Vitis albæ itemq; nigræ radices cum oleo decoque, donec succulentæ reddantur. Tollit etiam tum lentigines tum uaros, oleum amygdalarū cum cera, radix lilij cum melle. Maxime omnium autem lentigines delet gummi & nitrū æquali pondere, melle permixta. Aliud. Brassicæ semen aqua contritum illini, absterge tamen & confricato prius loco. Vbi uero exaruerit atq; cutis attollatur, proluet aqua multa frigida, & illinito pingui anserino, aut medulla cerui, aut etiā cerato ex aliquo huiusmodi apparato. Cauendū autē est, ne quis post excoarationē inciat in ea quæ faciē offendere possunt, qualis est aer frigidus, aut uentus, aut proliutio faciei. Aliud. Sandarachā attere cū melle ad strigmentū densitatē, & per dies sex illinito, arefacta autē cute atq; eleuata, utere galbano cū modico nitro & aceto dissoluto. Aliud, ad uibices ac lentigines: Columbe stercus cū aceti terē ac utere, & miraberis. Ad diuturnas autē lentigines his utere. Radicis cucumeris syluestris sextantē, cimoliæ unc. i. in puluerem redige ac repone. Vsu uero expectante, quantū suffecerit in aqua dilutū illini. Aliud, Bulborū depuratorū unc. i. thuris unc. i. contere, adiecto cochlearū terrestriū magnarū cruore. Oportet autem ipsas adhuc uiuas stilo pungere, atq; id quod effluit muccosum, pharmaco injicere: quod ubi usus tempore dissolueris, melle exceptum inunge. Eundem effectum præstat ari radix, sicca cum melle, & umbilici, ueneris radix, cerato lietas. Quandoquidem contingit aliquando sublati lentiginibus callosam reddi cutem, ac uix curabilem fieri affectionem: utendum est post lentiginum excoarationem huiusmodi smegmatis. Farina erui choenicis Italici dimidium, farina

rinæ hordeaceę tantundem, scillæ assatę sextantem, omnia in puluerem redacta, candido oui excipe, & in pastillos redige, quos in umbra deliccatos adserua: usui uero expetente cum aqua dissolutos illinito, & post modicam temporis interca pedinem frigida abluere iubeto: aut cremore in quo furfur maceratus est, maxima mēli adest inflammatio. Aliud. Spumæ nitrī drachmas octo, alcyonij drachmas tres, melle excipe, ac illitum sinas areferi. Deinde iube faba dentibus contrita extergi, ac ablui aqua moderatē frigida: cautosq; esse præcipe, ne aut à uento, aut à sole lædantur.

De maculis à sole prouocatis, quas Græci *ἑπλίδας* uocant, ex Critone, Cap. xi

Fiunt etiam in facie maculæ, quas Græci *ἑπλίδας* uocant, eo quod à sole prouocentur, maximē circa malas & nasum: & apparent sanē non in alto fixæ, sed instar flosculorum productæ, quare leniter eas confrictas attollere oportet, ac finire areferi, commonereq; ut uno aliquo ex sinegmatum genere extergantur. Discutiuntur enim ab illis, aut certē ita abscedunt, ut digitis auelli queant. Verum non uiolenter id facere conuenit, sed leniter & paulatim. Quod si adhuc inhaereant, nihilo leuiore reddat, subscriptis utendum est. Brasica contrita, & illita, ad maculas à sole productas, & lentigines, atque omnia alia quæ mediocri extersione ac repurgatione indigent, utilis est. Similiter autem & sepiæ testæ ustæ, aut testæ purpurarum, ac buccinorum cum melle illitæ. Oportet autem has testas in crudam ollam coniectas in fornacem immittere ac assare. Oribasij ad maculas à sole prouocatas, uarosq; & uutiligines. Farinæ erui libras duas, seminis cruce libram unam, amygdalarum amararum, cucumeris syluestris radices cuiusq; libram unam, in uino mulso dissoluta & contrita illini, ac post horæ spatium spongia absterge. Aliud ualde admirabile. Cere synthecę drach, x v, olei rosacei drachmas septem & dimidiam, pinguis anserini unciam unam, spumæ argenti loræ & dealbatæ unciam unam, cerussę unc. i. gummi drachmas quatuor, mellis Attici unc. i. dissolutis, illini faciem: & post spatium horarum sex spongia deterge, ac laua cum sapone. Aliud Oribasij. Lupinos in lixiuio per triduum maceratos contere, & cum eis lentigines illini, donec auelli possint. Aliud. Saponem Gallicum aqua tritum modico adiecto melle in unge, & per horas tres inhaerere sine, aut sterco columbinū linteolo exceptū ac in puluerem exustū, cum oleo contere, ac illine cōfidenter. Idem probē efficit myrobalanos contrita illita: itemq; bulbus crudus per se uel cū oui luteo & aceto aut melle. Exusti autem bulbi unā cum alcyonio illiti depurgant lentigines: quod facit elateriū quoq; illitum, & cassia cum melle, brassicæ semen cum aceto, hederæ folia uino decocta, radix umbilici ueneris cum cerato liquido illita: aut cucumeris syluestris radix: aut fici uirgulta in aceto decoque, ac cōtusis utere: quod idem & uutiligines sanat. Aut rubiā oleo contritā, aut costiū aqua cōtusum, aut nitrī spumam cerato liquidiorē exceptā, aut lupinos crudos cū lixiuio cochliariorū decoctos & contusos, cū melle illini. Aliud. Radices narcissi delibratas in aceto decoque, ac tere, iniecta farina erui sufficiente, & pastillos informa: quos in umbra exliccatos, in usum adserua. Qui ubi postulauerit contritos cū melle, ad uesperā illine: mane aut rursus ablui præcipe. Aliud. Lilij bulbos quinq; cōtere, & cōtere spumæ nitrī lib. i. deinde melle quantū suffecerit cōmistum illini, usquequo integrē curent, ut iam antea dictū est. Aliud. Amygdalarū amararū partes ii. melanthij torrefacti partem i, unumquodq; seorsim cōtere, & cū melle cōmiscere.

illinito autem ad uesperā, maneque abluito cum aqua dulci. Vtere autē uno aliquo ex smegmatis superius ad faciei nigredines praescriptis: itemque his quae sunt illis uicina, ac similia. Vtile autē est & hoc, praesertim si fuerint diuturnae, buccina exure, ac cum melle contere, & ad uesperā illine: mane autē ablui cum aqua dulci praecipue. Aliud ad solares maculas, ualde pulchrū. Oua integra in aceto macerato, donec testa quam tenerrima fiat, deinde superius perforato, ac extrahe ab eis candidum: post uero iridis Illyricę tuse ac cribratae, & melanthij in tenuissimū puluerem redacti, & thuris equas partes cum eis conterito, adiectoque melle sufficienti, ut dictū est, utitor. Quod si adhuc perseverauerit affectio, huiusmodi excoriatorijs utendum erit. Excoriatoriū macularum a sole prouocatar & lentiginū. Melanthij quadrantem, seminis ocymi quadrantem, radicis ari quadrantem, aqua subigito & imponito, ac finito adglutinari: post aliquantū uero interstitiū deirahito, atque aqua calida quam plurima proluito. Aliud. Quod ad callosam faciem conducit, siue per acetum, siue per continuā pharmacorū acriorū excoarationē calli sint cōtracti. Seminis eruce sexuncem, ammi, cardamomi, radicis ari, costi, cuiusque quadrantē, contundito, cribrato, ac reponito. Vbi uero necessitas exigit, quantū satis uidebitur accipito, acetoque subactum imponito satis condensatū: quum uero adglutinatū fuerit, acetum aut aquam per spongiā instillato. Faciā autem excoaratione, multam aquam calidā adfundito: a prolutione uero subiectam mixturam panniculo laneo exceptam imponito. Cerussae drach. viii. spumae argenti lotae drach. iiii. adipis anserini sexuncem, medullae ceruinæ sexuncem, celypi medicamenti quadrantem, adipis suilli recentis quadrantem, olei semini quantum sufficit. Oportet autē fomentū adhibere bis in die: eleuata autem cute, sequens ceratū est imponendū. Adipis caprini a fibris depurati & lori lib. ii. olei susini sexuncem, olei rosacei, & amygdalini, cere, mastiches, cornu ceruinū usti, salis ammoniaci, cuiusque unc. i. terrae cimoliae trientē. Ea quę eliquari possunt liquefacito & percolato: deinde rursus ad carbones lentē decoquito, & ad ea quę siccā sunt in mortariū adfundito, ac probe unitis utitor. De exulcerata menti scabrie. Vtendū est ad eam his, quę paulō post in capite uidelicet deacento quinto descripta sunt, ad manantes menti papularum eruptiones.

De stigmati siue notis a uerbere illatis.

Cap. xii.

Stigmata appellant, quę in facie, aut alia quapiam corporis parte infliguntur, notas, quales uidemus in manibus eorum qui militiam exercent. Atramento autem utuntur illi tali: lignorum spinæ Aegyptiæ & maximē corticis libram unam, gnis usti sextantem, gallarum sextantem, atramenti sutorij unciam unam, cōtundito ac cribrato, primumque æs ustum cum aceto terito, deinde & reliqua contrita coniuncto, affusisque aquae quidem partibus duabus, succi uero porri parte una, & probe unitis utitor. Oportet autem locis prius cum acubus punctis sanguinem extrahere, & primum porri succo illinire, postea uero ipsum adhibere pharmacas mixturas adhibebimus. Calcis partem i. nitri assati partem i. cum lixiuio cochliariorum terito, & nitro adperso locum prius preparato & extergito: deinde illinito continenter. Idem quoque ad uerrucas myrmecias dictas, efficax existit. Aliud, quod stigmata tollit. Piperis drach. ii. rutae dra. iiii. auripigmenti drac. iiii. contere, & adiecto melle, in pyxide figulina repone. Vbi uero usus expetit, supra stigmata prius nitro conficta, resinā terebinthinā impone, uinculo adhibito in dies v. postera autē die sexta solve, atque acu stigmata penetra, & cum spongia sanguinē exerge, salemque tenuissimū in ipsas puncturas insperge: quem tandem inhā-

inherere linas, donec stadia decem quis cursu confecerit: deinde prædictū phar-
macum linteum exceptum impone, neque solvas per dies quinque: sequenti vero ses-
ta solue, & stigmata scalpendo expoli, atque ubi quod nigrum fuerit detraxeris,
rursus pharmacum ipsum illinito cum penna. Eruit enim in viginti diebus cura
magnam exulcerationē, non relicto etiam uestigio cicatricis. Idem efficiunt mor-
dendo erodentia medicamina in uulnere tractatu descripta.

De uaris faciei, qui tum Ionthi, tum Acnæ Græcis uos
cantur.

Cap. XIII

Solet circa faciei cuticulam tuberculum oboriri, paruum quidem, sed durum,
quod uari nomine appellatur. Id sanè à crasso humore producitur. Quare cura
eius per ea quæ duriciem emolliunt, & tumorem discutiunt, medicamina perfici-
tur: quorum syluam eiusmodi tibi parabis. Lilij radicem tritam cum melle illi-
nito, aut cyclamini radicem cum melle, aut narcissi radicem cum melle, aut cal-
siam cum myrrha & melle, aut plumbaginem cum aceto, aut pulegium tenuissi-
mè tritum ac cerato exceptum impone. Aliud, Mellis & aceti acerrimi, cuius-
que æquales partes simul permixtas illini, ac digito circumtere. Aliud. Sepiæ
testæ uisæ sextantem, costii sextantem, myrobalani unciam unam, contere cum
aqua & illini, arefactum uero rursus humecta. Aliud. Costum contunde, &
cribratum in tenuissimum puluisculum redige, deinde cum felle caprino com-
mixtum in cerati modum effinge, & cum eo uaros ad uesperam illini: mane uer-
o à somno, lacte qualescunque adfuerit faciem abluere iube. Aliud. Alumen
scissile quàm tenuissimè contere, & resina terebinthina exceptū impone. Quum
autem diu persisterint uari, his utendum erit, Saponis Gallici drach. IIII, am-
moniacy thymiamatis drach. I, thuris drach. I, dissoluito in aqua & ad cerati densita-
tem reducito, sicque illinito, ac post horæ spatium ablui cum calida præcipito.

Aliud. Rhois culinarij, hysopi, pulegij, salis fossilis, seminis ocymi, cuiusque
æquales partes, cerato rosaceo excipe ac utere. Aliud, quod ad eminentiores
faciei affectiones, itemque pruritus efficax est, necnon ad principium elephantiasis,
Gummi albi & nitri æquas portiones, acri aceto dilue & illini. Vbi uero exarue-
rint, subscripta mixtura depurga, Saponis Gallici lib. I, ammoniaci, spumæ nitri,
thuris, mastiches, cuiusque quadrantē saponē, & ammoniacū in uase fictili cum a-
que choenice una decoquito. Vbi uero dissoluta fuerint, sicca cōtrita ac angustis-
simo cribro excussa, inijcito: deinde transfer in pilam, probeque cōtusum uitreo ua-
se recondito. Necessitate uero expetente faciem illinito, & post paruum interita-
tium multa aqua abluito: prius leniter facie confricta. Hoc pharmaco semper ad
uaros utere. Aliud ad uaros, celebre. Nitri rubri sextantem, cimoliz unciam
unam, thuris drach. IIII, farinæ erui unciam unam. Vtere autem hoc modo:
Accipe halcyoniū, ac per se optimè contere, deinde iniecto oleo simul tere, & ex
eo faciem ad uesperam illini. Mane uero à somno præscripta compositione ex-
terge. Aliud smegma, quo per omnem curam uarorum uti conuenit. Fari-
næ fabarum, farinæ sesami, medullæ peponis sicca, cuiusque drach. IIII, contere
& cum his exterge. Aliud. Nitrum cum myrrha tritum aqua permixtum
exhibe, eoque extergatur.

De ficosis faciei tumoribus. Ex Galeno.

Cap. XIII

Est & hæc una aliqua ex menti affectionibus, in hoc differens à uaris, quod non
solum crassus existit humor à quo producitur, sed serosa etiā tenuitate participat,
ob quā & citius exulcerat, siquidē non ut cōuenit cures, & siccorib. etiam in
diger remedijs, quàm ea sunt quæ uaris adhibent. Oribasius ad Eustathiu. Ficos
appellat.

appellant germina ulcerosa, rotunda, subdura, rubicunda, quæ consequitur etiã dolor. Nascuntur autem ut plurimum in capite, atque etiam reliquo corpore, de quibus Crito sic scripsit. Ad ficosas menti eminentias, Critonis, Spumæ argenti drach. iiii, thuris drach. ii, salis fossilis dra. ii, sandarachæ drach. i, contrita simul impone.

Aliud ualde præclarum, Elaterij drach. ii, salis fossilis tantundem, chalcæti drach. ii, sandarachæ drachmam unam, misce: & cum specilli instrumentis, quod melam Græci appellant, extremo admota impone, præhumectato prius loco quo pharmacum melius insideat: post impositionem uero cataplasmate seminis lini aqua dissoluti superne cõtege. Aliud, Archigenis, ad capitis & mentis ficos. Chalcæti assati, aluminis scissilis, glutinis, cuiusq; æquales partes, squamæ æris duplum: glutinum in aceto maceratum dilue, & cum eo reliqua trita committe. Vbi uero uti uelis in aceto rursus dilue, ac ex eo ficosas eminentias inunge, & rasura tenuis linteoli contege. Inhæret autem pertinaciter, atq; citra cicatricem ficos depurgat. Vtor aut & hoc ipso pharmaco ad callos fistularũ leniendos in collyria informato. Quod si humidi sint tumores nimirũ aqua effluente exeis, uelut à fonte, pura, subscriptis remedijs utendum erit. Pastillus ad ficosas menti eminentias. Reprimit autem omnes tumores qui accidunt illis, qui male cicatricem obduxerunt: quemadmodum uidemus in his, quibus palpebræ aut labia sunt confusa: Squamæ æris sextantem, misyos assati sextantem, auripigmenti sextantem, diphrygis drachmas tres, chalcitidis ustæ drachmas quatuor, æris usti drachmas quatuor, glutinis fabrilis drachmas quatuor: compone & utere ut dictum est in priore. Nam & ob eius usum, magnum nomen adeptus sum.

Ad manantes menti papularum eruptiones, ex Critone. Cap. xv

Conferunt quidem & his plurima eorum quæ antea ad capitis ulcera manantia præscripta sunt. Proprie autem profunt hæc: Spumæ argenti, chalcæti, mali corij, baccarum myrti, singulorum æquales partes cum uino et oleo myrteo tritas illinito. Aliud, Præclarum & hoc est: Verbenacæ supinæ drachmas octo, acaciæ drachmas octo, myrrhæ drachmas duas: cum uino tritis utere.

Aliud, myrrhæ unciam unam, thuris sextantem, acaciæ trientem, utere cũ uino. Aliud, Spumæ argenti, ladani, baccarum myrti nigratum, seminis hyoscyami, mali corij, æqualibus partibus cum uino & oleo myrteo aut rosaceo permixtis utere. Aliud, quod & ad ea quæ instar faui melle manant ulcera, melicerides Græcis appellata, conducit: siue ea in mento, seu in capite existant: quæ à Syris appellantur Sanalia. Spumæ argenti & baccarum lauri, æquales partes cũ aceto ac oleo myrteo illinito. Experimentum enim bonum de se præbuit saepe.

De impetiginosis tum menti, tum reliqui corporis tumoribus ex Galeno.

Cap. xvi

Præterea & hæc affectio ex mixto quopiam generatur humore, nimirum serosis & tenuibus acerbisq; humoribus unã cum crassioribus permixtis: quæ propter etiam facile in psoram & lepram transit. Indiget itaq; hæc affectio pharmacis fortiter desiccantibus. Quod si uero in psoram aut lepram trãsierit, ad hoc quod desiccantia remedia adhibenda sunt, necesse erit et repurgantibus uti. Itaq; Crito ita scripsit, ad eas quæ in mento prodeunt impetigines, lichenas appellatas: Affectio, inquit, est insuauissima, & pruritus inferens, & circumtensionem, & periculum non minus. Proserpit enim aliquando per uniuersam faciem, & oculos ipsos contingit. Quare diligentiori cura utendum erit, ubi ea quæ iam longotempore perseverarunt, ab his quæ recens prodierunt discreuerimus. Ad reccentes igitur impetigines conueniunt hæc: Perdicij herbæ folia continenter in lo

M co

co confrica, aut thus, aut ammoniacū cum aceto terito, aut etiā cum perdicij lue-
co, ac illinito. Aliud. Liquorem qui ex humidis oleæ lignis dum comburuntur
effluit, illini. Idem facit quod ex brassicę caule dum adurit, destillat, illitum.
Aliud. Maluę agrestis semen depuratum collige, contere, ac expressum in-
de succum reponē, eumq; assidue illine. Aliud. Portulacę succum conti-
nenter illinito. Aliud. Lachrymam sylvestris oleæ cum aqua diluito, & ad-
iecto modico styrace, unito ac imponito. Vbi uero iam diu durauerint impetigi-
nes, uiticis folia cum aceto trita illini, aut hastulæ regiæ radicem in aceto deco-
ctam & tritam adfrica. Aliud ad diuturnas impetigines. Chamæleonis ni-
gri radicē in aceto decoque, cōtere, et illine. Verū quū ad diuturnas impetigines
multa & uaria excogitata sint remedia, particulatim de singulis dicam, inuē-
mēs à pastillis. Pastilli. Pastillus ad impetigines in quacunq; corporis parte cō-
sistant: Alcyonij usti drach. ii. sulphuris uiui, thuris, pyretri, spumę nitrī, cuiusque
dra. ii. chamæleonis nigri radicis dra. iiii. hastulæ regiæ radicis dra. iiii. glutinis
drachmas quatuor. Glutinum in aceto dilue, et cum eo reliqua excipe, delicea, et
utere cum aceto. Pastillus ualde celebris. Foliorū fici siccorum dra. xii. chal-
citis crudæ dra. x. calcis uiuæ drachmas octo, misyos crudi drachmas quatuor,
thuris drachmas quatuor, sulphuris uiui drachmas octo, aceto subige, et cum
aceto utere. Pastillus ad impetigines. Qui & callos extirpat, & cicatrices su-
pra opinionem: Thuris, testarum buccinarum ustorum, fimi columbini, alcyo-
nij, gummi, singulorum æquales partes contere cum lacte, & informa pastillos,
ac utere cum aceto. Pastillus alius. Lachrymæ oleæ sylvestris drachmas quatuor,
thuris drachmas quatuor, sulphuris uiui, alcyonij, spumę nitrī, halicę con-
tusæ & cribro excussę, cuiusq; drachmas octo, halicam in acetum multum atque
acerrimum coniectam tam diu decoque, donec uiscosa reddatur: reliqua uero
cum ea ipsa commissa in pastillos informa, ac cum aceto utere. Circumlitio-
nes ad impetiginem. Ad impetigines maxime feras: Nitri, chalcitidis assatę,
ammonici thymiamatis, succi serapiadis tres testiculos habentis, æquales partes
contunde, & cum aceto illini: efficacis est & ad humentes impetigines, atque ego
sanē usus sum, & ex animi sententia successit. Aliud. Stercoris dorcadis unciam
unam, thuris unciam unam, contulis utere cum aceto, ita ut cum nitrī spuma
impetiginem prius confrices, & miraberis. Aliud, quod & ad impetigi-
nes & uiligines ac lepras ualde commodum existit. Stercoris muris, chalcana-
thi, sulphuris uiui, cuiusq; bessē, farinæ fabarum uncias xiiii. aceti sextarios
quatuor, Muscardam contunde, & cum aceto decoque: atque ubi bis aut ter ele-
ferbuerit, sulphur insperge & chalcanthum, animaduersione habita, ne efferve-
ant & effundantur: deinde ubi parum saltem concocta fuerint, etiam farinam
fabaceam iniice, & simul ad strigmenti crassitiem decocta redige, & ablatis ac
reconditis utere. Ad lepras quidem linteolo exceptum impone, ac post quina-
tum tandem diem abstrahē. Ad impetigines uero aceto dissolutum continen-
ter inunge. Illitio cocta, ad diuturnas impetigines, quæ citra exulcera-
tionem eas summouet. Halicę mola tritæ ac cribro quā arctissimo excussę
uncias quatuordecim, chalcitidis, cimoliæ, sulphuris uiui, misyos, cuiusque
sextantem, spumę nitrī, aluminis scissilis, alcyonij, radicis hastulæ regiæ, thu-
ris, lachrymæ oleæ, ammoniaci thymiamatis, myrrhæ, cuiusque unciam unam,
aceti choenicas tres, Alcyonium, hastulam regiā cum aceto decoquito: atque
ubi ad medietatem redactum fuerit, percolato. In colamento uero ammo-
niacum, thus, & reliqua sicca dissoluito: halicam uero in aceto quod superest
deco-

decoquito: deinde reliquis adijcito, ac simul cōmissis utitor. Aliud ualde præclarum. Aceti acerrimi sextarios octo, farinæ hordeaceæ uncias uiginti quatuor, mannæ thuris uncias quatuordecim, radicis rumicis syluestris drachmas octo, radicis albuci drach. VIII, ueratri albi drach. X, alcyonij dra. X, cardamomi drachmam unā, terræ cimoliæ drachmas octodecim, glutinis drachmas XVI, spumæ nitri drachmas XVI, uirgultorum halicacabi uiridium fasciculum quantum manu comprehendere potes, appara & utere ut dictum est. Quod si hæc affectio diutius producat extendaturq; & in callos transeat, nihilominus his quæ dicta iam sunt utendum est; maxime uero congruum est quod sequitur. Misys, myrrhæ, thuris, aluminis scissilis, cuiusque drachmas octo, aloës, sulphuris uiui, cuiusque drachmas quatuor: hæc cum passo ad strigmenti crassitudinem redige, & bis ac ter in die loco prius confrecto, illine; foris autem conseruandi pharmaci gratia pelliculam uesicæ, aut ex ovo suprapone. Oribasij lichenicum pharmacum, facit idem etiam ad pruritus. Chalcanti, sulphuris uiui, nitri, thuris, æqualibus portionibus utere: ad impetigines quidem, cum aceto: ad pruritus uero, cum uino. Aliud, quod impetigines in paucis arcet diebus, ualde commodum, quare præexigendam suadeo mercedem. Sulphuris drachmas octo, calcis drachmas octo, chalcitidis crudæ drachmas octo, thuris drachmas quatuor, misys drachmas quatuor, foliorum capparis uiridium depuratorum drachmas duodecim, cum aceto teré, ac in forma pastillos, & utere. Emplastrum liquidum, multi ad impetigines experimenti, cuius rei nuper adeo periculum feci. Picis siccæ, ceræ, resinæ colophonæ, ueratri triti, olei, æquales partes. Per experientiam commendatum hoc tibi habeo, propterea & mercedem præexige. Quandoquidem uero plurimi sunt, qui illitionum usum auersantur, maluntq; adhibere emplastra: utpote quæ neque per sudores obortos defluant, neque arefacta etiam cutem circumtendant, annexam & horum aliquot apparatus. Emplastrum ad impetigines, quod citra exulcerationem eas submouet. Ceræ, picis liquidæ, thuris, resinæ terebinthinæ, sulphuris uiui, cuiusque sexuncem. Quæ liquefieri possunt liquefacto, siccæq; cum eis committito. Aliud quod similiter citra exulcerationem opitulatur. Picis liquidæ libram unam, mannæ, sulphuris uiui, farinæ lupinorum, cuiusque unciam unam, galbani sextantem. Picem calefacto, & galbanum præmollitum adijcito: liquefactis uero, ac ab igne ablatis reliqua inspergito ac unito. Utere autem hoc ut uehementer commodo. Aliud, quod citra exulcerationem auxiliatur. Chryfocollæ siccæ qua aurifabri utuntur, chalcitidis assatæ, misys assati, squamæ aeris, diphrygis, salis ammoniaci, terræ cimoliæ, cuiusque drachmas quatuor, æruginis drachmas duodecim, chalcanti drachmas sex, lapidis asij, æris usti, utriusque drachmas sex, foreos drachmas quinque, aluminis liquidum drachmas quatuor, contunde omnia diligenter, & adiecto aceto sedulo in sole sub feruentis caniculæ aestu contere, donec ipsum pharmacum æruginem contrahat. Apparetur autem in alio quoque opopanacis uncia una: hæc in aceto diluta & ad strigmentitiam crassitiem redacta, illis quæ antea in æruginem commutata sunt iniice, ac rursus contere, atque his omnibus aristolochiæ contusæ & cribratæ unciam unam adijce, & rursus tere. Quum uero omnia in formam emplastri redacta fuerint, liquefabilia liquefacto ac affundito. Sunt autem liquefabilia hæc, ceræ drachmas centum, terebinthinæ drachmas CC, galbani drachmas nouem, olei libram unam, emollita

in usum adseruato simul omnia, Hoc ipsum pharmacum duplici aspectu se uti-
dentibus offert. Aliud, quod similiter ad dictas impetigines efficax est ut ea-
tiam ea quæ intus relinquuntur reprimere possit. Picis, bituminis, resinæ pie-
nus, cere, sulphuris uiui, mannæ, æquas portiones, olei cyprini quantum sat fue-
rit: Liquefabilia liquefacito, & inspergito siccat: in tenui autem pellicula excepta
imponito. Emplastrum aliud ad impetigines. Picis siccæ quadrantem, picis liqui-
dæ unciam unam, salis unciam unam, resinæ colophonix, ceræ, sulphuris uiui,
cuiusque unciam unam, nitri fului unciam unam, chalcitidis unciam unam, olei
sextantem: utere. Excoriatoria impetiginum. Verum ubi iam affectio
stabilis facta fuerit, & pharmacorum adhibitioni & molimini resistit: utendum
erit excoriatorijs. Ea enim ex facili superficiem auellunt. Excoriatorium im-
petiginum, quo Pamphilus usus est Romæ: & plurimum sanè profecit, quum in
urbe mentagra grassaretur, quæ impetigo fera existit. Squamæ grise drache-
mas octo, auripigmenti drachmas quatuor, sandarachæ drachmas quatuor, æris
ulsi, ueratri albi, cantharidum, reiectis alis & pedibus, singulorum drachmam
unam & dimidiam: unumquodque per se contere: deinde simul confusa cedria
excipe, ac in densitatem strigmenticiâ redacta, in pyxidem æris Cyprii reponere.
Vbi uero necessitas exigat, nitro ac modico aceto impetigine conficta, phasma-
cum hoc cum specillo lato, spathomelam Græci uocant, illine: atque ubi iam ada-
fricueris, modicumque temporis spatium intercesserit, cum specillo derade, ac
rursus aliud illine: bisq; ac ter eodem repetito: locos illitos cum pellicula uelice
bouillæ, aut alterius cuiusdam animantis contege: post pelliculæ uero im-
positionem fasciola leuiter colligato, ac finito pernoctescere, siquidem tam diu sua-
stineat: si uero non, ad horas aliquot, donec bullas excuscitet sanie crassa & gluti-
nosa repletas: quibus productis lauari iubebimus, atque remorari aliquandiu
in balineo: & enim hoc ipsum curam adiuuare solet. Sit autem calidius ipsum
balineum. Quod si prohibeat quid balineo uti, fomenti utendum est calida a-
qua multa: quæ ubi iam ad molestiam usque affusa fuerit, extergere conue-
nit, ac panem cum aqua multa subactum imponere. At ubi sordibus ulcera se-
tuerint, emplastrum uiride spleniolo exceptum adhibeto, modico itidem de
excoriatorio præscripto admixto. Exclusa autem sanie, & nullo amplius tecto-
rio ulcri incumbente, ex emplastro albo linteolum paruum illitum imponimus:
eoq; utimur donec omnino ad cicatricem perducatur, quotidie fomento adhi-
bito, ac nouo spleniolo ex emplastro albo illito. Porro ante admotionem ex-
coriatoriorum, uicinas impetigini partes munire oportet pharmaco quopiam
ex his quæ ab inflammatione locos tuentur, atque ita excoriatorium ad impe-
tiginem solam adhibere. Excoriatorium ad mentagras, ut citra cicatricis
uestigium ad sanitatem perducantur. Efficax est & ad alopecias ad solem
uel ad ignem illitum. Vbi uero bulla producta fuerit, eam acu penetrare oportet,
excluso autem humore, ceratis curare: cicatrice enim inducta, enascuntur
pili. Atque ita quidem ad alopecias adhibetur. Ad impetigines uero utendum
est eo modo qui prædictus est in excoriatorio primo. Pharmacum uero ipsum
huiusmodi est: Sandarachæ, auripigmenti, squamæ æris, ueratri nigri, cuiusque
drachmas duas, elaterij drachmas quatuor, uentrium cantharidum drachmam
unam, excipe cedria. Vfus autem iam antè ostensus est. Emplastra uiridia
post excoriatoria adhibenda. Post ipsum excoriatoriorum usum, subiecta
uiridia emplastra adhibenda sunt: nimirum ad ulcerum ipsorum repurgatio-
nem, Viride emplastrum, quo Pamphilus usus est ad mentagram; post
eruptionem

eruptionem scilicet bullarum. Cerae libram unam, resinae pinus siccae libras duas, æruginis quadrantem, olei ueteris besseni, aceti acerrimi quantum suffecerit, Aeruginem ad solem cum aceto conterito: liquefabilia liquefacito, & frigefacta, ac in mortarium coniecta simul unito. Aliud, Aeruginis drachmas II, mannae drachmas IIII, galbani drachmas III, adipis uitulini drach. XII, cere drachmas octo, resinae pinus drachmas octo, aceti quantum satis uidebitur, committe. Aliud, quod euehrum, hoc est, boni coloris, appellatur.

Aeris usti quadrantem, aluminis rotundi, æruginis, salis ammoniaci, mannae, cuiusque sextantem, cerae libras duas, resinae pinus siccae libras duas, olei dextantem, aceti quantum ad sicca conterenda suffecerit. Emplastrum alba ad cicatricem perducuntia. Verum ubi iam per præscripta emplastra uiridia, uel cera ipsa repurgata uideris, utendum erit emplastris albis, quo absque cicatricis uel stigis ad sanitatem perducantur, quare nequitiam hæc reliquenda censeo, ut quæ ea multa ad tactum lenitate committunt. Emplastrum album, quod a quoque appellatur. Hoc emplastro Magnus medicus usus est, post impugnum excoitationem. Cerussa, spumæ argenti, cerae tyrrhenicæ, aquæ puræ, singulorum libram unam, olei omphacini libras duas. Spumam argenti, cerussam, & aquam simul contere, atque ubi tenuissima facta fuerint, oleum guttatim instillatum simul contere, donec sufficienter fuerint cuncta: deinde in fistula uase ad ignem adhibe, ac continenter agita: quum uero aqua consumpta fuerit, injice ceram: Atque hoc modo in mortarium infusa emollito, ac utere.

Aliud. Cerussa libras duas, misyos crudi sextantem, terebinthinæ unciam unam, cerae sexuncem, olei libras tres, aquæ chœnicæ duas: compone ut prædictum est, ac utere. Licebit etiam uti ceratis sedis, & quæ ad ambustos descripta sunt tenerioribus.

Ad molestum oris odorem.

Cap. XVII

Ad grauem oris odorem, qui citra exulcerationem accidit: Irin in uino ueteri odorato maceratam, ad colluendum continuè exhibe, atque etiam in ore retinendam aliquandiu: aut myrrham in uino meraco dilutam colluendam præbe: aut acre acetum colluat quotidie, uespere dormitum iturus: mane uero spiritus nardi decoctum ore colluat, aut ipsam sub dentibus coterat: aut potamogetonis folia quotidie dentibus contrita expuat: aut rosarum floribus continuè confricato: aut fici syluestris radicem urito, & cinerem eius cum melle illinito: aut parum cyperi, aut floris iunci odorati contundito, & gingiuas continuè confricato: aut cimoliam cum sale terito et affricato. Aut ordeum cum sale, melle subactum & linteolo illigatum urito, & contritis utere: aut similaginem melle subactam ac exustam adhibe. Aliud. Salis albi, pumicis, origani, cuiusque unciam unam, iridis sextantem, floris iunci odorati sextantem: his simul contritis dentes fricatio & uniuersum corpus. Bonum enim odorem facit, & dentes dealbat.

Aliud, ad fetorem oris. Chalcitidis crudæ drachmas XII, ueratri albi drachmas octo, trita illine. Aliud, Chalcitidis drachmas XII, cadmiæ drachmas octo, in aceto tere, & per aliquot dies ad solem æstiuum expone, desiccatoque utere. Vtile est & ad sanguinolentias gingiuas, itemque putrescentes. Bibant autem & ipsi ea quæ præscripta sunt illis, à quibus per totum corpus teter odor transpirat, in hoc ipso Sermone, capite octauo. Aliud, ad crassitiem labiorum.

Prominet in plerisque superius labrum, aliquando etiam inferius, ex defluxu uementi à capite delato, ut præ densitate labrum intumescat, et ad sermonis promotione præpediatur: ultra hoc, quod aliàs indecentia quadam faciem dehonestet.

M 3 Quare

Quare curabis hos aut incisa uena, aut purgatos per cōsuetas excretiones. Post hæc aut adhibebis illitiones ac apophlegmatismos, quibus defluxus pituitæ à capite tollitur ac sedatur. Deinde illitionibus ad os descriptis illines palatum: quibus præmissis, porri succum cum oleo uetustissimo ad interna labiorū illini, aut foliorum brassicæ succum unā cum oleo ad affectum labrum continue admouet: aut glaucium cum uino, aut cimoliam, aut Musæ pastillum, aut pastillum ex hali cacabis cum uino.

Ad labiorum fissuras.

Cap. XVIII

Oui internam pelliculam fissuris labiorum adglutina, aut quod pelliculæ similitudine, circa palmarum ossicula adheret, aut araneorum à trabibus dependentium texturam maxime albam. Eas uero quæ in altum magis se extendunt fissuras, cum adipe anserino, aut caprino curabis, aut cū medulla bouilla, aut ceruina, ita ut cū semper uiuo atq; terebinthina unita, illinas. Aut gallā omphacinen tritam, terebinthina, aut œsypo, liquido, aut melle excipe, & impone. Aliud. Gallam et mastichen quā tenuissime trita, œsypo, id est, lanæ succidæ sordibus, in formam cerati redactis, excipe, ac utere. Aliud. Gallarum unciam unā, cadmiæ unciam unam, cerussæ quadrantem, contere cum rosaceo, & illine.

Aliud. Cyperi sextantem, gallarum unciam unam, aluminis scissilis drachmam unam, contere, ac siccum insperge. Aliud. Mastichen cum uino trita & dilutam illine. Aliud. Fecem acetī ustam, myrteo aut rosaceo cerato exceptam, impone. Idem etiam ad magnas in extremis ac summis corporis partibus inflammationes conducit. Aliud. Testarū ouorū ustarum, gallæ, myrthi, aluminis scissilis, singulorum æquales partes lanæ succidæ sordibus exceptas impone. Ad omnia labiorum ulcera, & ad ea quoq; quæ cacoëthe appellant,

Ostrea usta tenuissime trita insperge. Ego autem & non usta contriui, eisdem usus sum, neq; male cessit. Aliud, ad fissuras labiorum. Musæ pastillum cū sapa aut uino dilutum, satis crassum illinito. Optime prodest & id quod ex amurca, ad ulcera oris quæ aphthas appellant, aparatur. Idemq; similia remedia efficiunt, quæ ad fissuras sunt descripta, atq; etiam pastillus ex halicacabis cum uino.

Ad tubercula in labris. Utendum est & ad hæc præscriptis ceratorum formis, atq; etiam hoc ipso quod subieci: Radicis rumicis ustæ, nitri usti, terebinthinae ustæ, singulorū æquas portiones, cōtritas cerato excipe, & illine. Aliud. Adipem anserinum, melle ac solani succo mixto adhibe. Confrictis autem prius ulceribus, cum penna sepe illini. Repurgat enim tubercula in internis labris oborta. Colluat autem ea & ante illinitionem & post eam, cum lacte.

De dentium affectionibus.

Cap. XIX

Pars quædam ex tertia cōiugatione neruorum à cerebro utrinque delatorum, distribuitur quidem in pelliculam quæ ipsum os, & linguam, ac gingiwas complectitur ac ambit, sensum eis suppeditans. Ingenerat autem seipsam tum superiori, tum inferiori maxillæ iuuoluens, ac omnibus dentibus ad eorum radices substrata, ut ob hanc causam inter ossa soli dentes dolore afficiantur. Illi ipsi sanè nerui delatum ad se nutrimentum suscipientes: quod in ipso liquidius existit, sibi lucrifaciunt: quod autem siccius quā conueniat existit, tanquam alienum à se abijciunt. Ea ipsa uero à neruis redundans superfluitas in concauitatibus locellorū, in quibus ipsi dentes sunt infixi, aggregatur, paulatimq; tenacior ac densior seipsa facta, ob diuturnam isthuc conuersationem, in ossium formam transmutatur. Atque hoc modo nutrimentum dentibus accedit. Itaque dentes hac nutritione suscepti, usq; in senectutem auferunt. Vnde sanè in senibus ob

ob defectum connutrientis materiae, attenuantur dentes, mobilesque fiunt, ac excidunt. Caeterum quantum auferunt ipsi dentes, tantum ex attritione ciborum consumuntur. Impossibile est autem citra nutritionem augeri. In uniuersum itaque duabus affectionibus dentes sunt obnoxij, & his quidem contrarijs: Indigentia uidelicet, & abundantia eius quod defertur ad eos alimenti. Indigentia ergo sicciore, & alimentum non sentientes, atque ob id tenuiores eos efficit. Abundantia uero consimilem in eis dispositionem facit, ei quae contingit in caninis partibus inflammationi. Huius igitur affectionis cura iuxta eundem scopum fiet, quem propositum habent hi, qui inflammationibus medentur. Nimium ut abundantia partim discutiendo, partim repellendo euacuetur. Eius uero quae indigentia alimenti contingit, tenuitatis dentium nullum remedium existit. Necessarium est enim laxari ac commoueri dentes, ubi compages eorum flaccidiores reddantur, quum non solum ipsi dentes, sed & loculi eos continentes graciles fiant. Haec igitur affectio necessario accidit senibus, quibusdam citius, alijs serius. Auxilio autem eis erunt pharmaca adstringentia, quae gingiuas confirmant, et ad arctius complectendum dentes adiuvant. Qui uero facile exaruerunt dentes, eos, siquidem id ex mollicie eorum contingat, duriores reddere conuenit, & affectionibus minus obnoxios, per austera uidelicet & acerbata adhibita remedia.

Ad inflammatas gingiuas.

Cap. xx

Gingiuas autem ob inflammationem dolore affectis, optimum remedium existit oleum lentiscinum conduplicato uasculo calefactum, ac in ore retentum. Sit autem recens oleum, Nocium enim existit inueteratum. Repellit autem oleum lentiscinum circa asperitatem, & discutit absque mordacitate quibus maxime indigent inflammata. Atqui asininum lac in ore retentum, ubi maxime inflauerint dolores, eos mitigat, ac ex tempore sedat. Et hoc quod ex uino ad tertiam usque mensuram partem decocto, apparatus, quod sapam dicimus itemque heptema, & palmularum stillamentum similiter ore retentum calidum uehementer lenit. Oportet autem aquam calidam ad palmarum stillamentum adfundere, quo crassities eius diluatur. Valet etiam semperuiui minoris decoctum per se, aut cum rosaceo melle, aut cum sapa, aut palmarum stillamento in ore retentum. Conuenit etiam inflammatis gingiuas hyoscyami succus, aut decoctum per se calidum, aut cum sapa ore retentum. Supra opinionem autem lenit succus portulacae. Insensissimum uero inflammatis gingiuas est acetum, omniaque acerbata, et acria, & salsa.

Ad cruentas gingiuas.

Cap. xxii

Cruentis uero ob bilis acredinem gingiuas, praeter opinionem utilis est foliorum hyoscyami succus, aut decoctum cum sapa, aut cum palmarum stillamento calidum ore retentum. Folij autem ad manum non existentibus radicem eius decoque cum passo, & retinendum exhibe decoctum. Vtile est & alumen scissile cum myrto, si quam tenuissimè trita adhibeantur. Vbi uero adstrictas iam cognoueris gingiuas, colluendam sapam calidam exhibeto. Aliud, Asclepiadae, ad cruentas gingiuas. Balaustiorum, florum rosarum, ramorum myrti, singulorum aequales partes, cum posca dilutiore decoquito, & liquorem inde percolato, ac eum in ore retinendum exhibeto. Aliud. Ramorum lentisci, balaustiorum, radicis mali cotoneae, singulorum aequale pondus in posca decoctum exhibeto. Epithema ad sanguinem ex gingiuas erumpentem. Polentae partem unam, uinaceorum uix tantundem, succi sanguinarum quantum satis est, contere, & ad

et ad cerati crassitiem redacta, impone ad sanguinolentum locum, aut simul cum succo tamdiu tere donec arefiat, atque hoc modo trita insperge. Aliud, Spongiam nouam siccam in sanguine taurino madefactam in uase fictili exure, contere ac reponere. Vbi uero uti uelis, cineris ipsius drachmas quatuor accipe, thuris drachmas duas, chalcitidis crude drachmas duas, & simul trita insperge.

Aliud. Terebinthinæ aceto torrefactæ drach. iiii. æris drach. ii. tritis utere. Calidas uero in ore inflammationes et gingiuas corrosas, in quibus salis cutisulae aut mordacis humiditatis sensus percipitur, magnopere iuuant dulcium aquarum balnea, quæ superfluitatem quidem per sudores euacuant, sanguinis uero acredinem obtundunt. Quare si nihil prohibuerit, bis ac ter lauās, non laedēs. Illud nendum est autem caput oleo rosaceo cum aceto.

Ad excrecentes gingiuas, putrescentesque, ac tumentes.

Cap. xxii

Ad gingiuarum tumores, easdemque excrecentes et putrescentes, conueniunt tum colluta, tum ore retenta, oleum ex immaturis oliuis expressum, oliuarum comlymbadum muria, cedria cum aceto, gallarum decoctum, pruni folia ex aceto decocta, cytinorum decoctum, corticis mori aut etiam foliorum eius decoctum. Arida uero & trita, gingiuis ad moueri commodè possunt hæc: radix aristolochiæ, plantaginis semen tritum, bitumen tritum, sceniculi radix usta, pulegiū ustum, diphryges, rubigo ferri, chalcanthum assatum, gallæ, cytini, malicorium, balaustia. Optime autem prodest gingiuis à fluore affectis: aceti & mellis, cuiusque librā unā, aluminis sextantē. Decoque ad consumptionem aceti, & utere. Aliud. Aluminis scissilis, myrrhæ & thuris æquales partes cum melle illine ac postea uino collue. Medetur autem ex his gingiuis et humore prægnantibus, lac asininum calidum collutum: foliorum oliuæ decoctum, aspalathi decoctum. Platani folia in aceto aut uino decocta. Sicca autem adhiberi possunt, rubigo ferri, balaustia, & cytini. Aliud siccum: Quod ad putredines oris gingiuasque depastas ac cruentatas efficax est: ad tonsillas etiam, ac glandulas & cornu lumnellam siccum ad mouetur: ad quassatos uero dentes, aceto dilutum detinetur in ore. Gallarum quæ omphacitides appellantur, aluminis scissilis, æquales partes accipe, ac ut ualde efficaci utere. Siccum floridum, quod Græci antheron appellant. Cypripis dra. vii. crocomagmatis, myrrhæ, aluminis scissilis, iridis, cuiusque dra. i. croci dra. i. sandarachæ dra. iiii. permixtis utere. Alius siccus puluis, floridus Orbia si. Cyperi, croci, utriusque dra. ii. aluminis scissi, sandarachæ, iridis, gallæ, cytinorum, singulorum dra. iiii. floris rosarum, dra. vi. misce ac utere. Ad putredinem in ore. Foliorum oleæ ustorum, radicis lactucae, malicorium, singulorum dra. i. costi parum, utere.

Ad corrosas & ab ulcere serpente infestatas gingiuas.

Cap. xxiii

His qui corrosas gingiuas habent cum tumore atque etiam dolore, atque etiam am quibus à serpente ulcere depascuntur, summe auxiliatur somnium hoc. Specillo auriculario lanam innecte, ac in feruens oleum intinge, eamque donec exaquerenter gingiuis adhibe, & quousque undiquaque appareant albæ. Ita enim ulcus serpens sistitur, atque ex sana carne id quod corrosum est connutritur. Post hæc autem utere adfrictorij ad gingiuas descriptis. Proprie autem conuenit gallatenuissimè trita, acetabuli mensura, cum myrrha magnitudine fabæ, quibus tritis utere siccis. Præter opinionem autem ad corrosas, & quæ serpente ulcere infestantur gingiuas prodest id quod ex chalcitide & cadmia constat siccum. Sint autem chalcitidis crudæ drachmæ duæ, cadmiæ uncia una. Cadmia in aceto ad solem æstiuum aliquot diebus sufficienter coteratur: deinde adijcia quoque chalcitidis & similiter cum ea conteratur, adfuso saepe aceto: post uero ambobus exsiccatis, tritis & cribratis: utere siccis, sed cum cautione, ne quid ex pharmaco hoc deperglutiat.

glutiat. Præclare facit etiam in serpente gingivarum ulcere, id quod Heliocae
es, hoc est, sole ustum appellatur siccum, constans ex calcis partibus duabus, auri
pigmenti una & dimidia. Verū contere oportet & hoc ipsum in aqua, sub exo
rientis caniculæ ardoribus, ita ut ter aqua diffundatur, & postea pharmacum de
siccetur. Cauendum etiam, ne ex hoc quicquam deglutiat. Admirandam etiā
opem corrosis gingiuis affert, id quod ex charta usta constat siccum, siue per se
solum, siue cū melle adhibeatur. Aliud, ad ulcera serpētia gingivarū. Alumi
nis scissilis, florū rosarum, cuiusq; drach. II, salis fossilis drach. IIII, croci drach. I,
utere sicco, aut cum melle cocto. Floridum ad gingivarum abscessus, ac ul
cera oris profunda ac crustosa. Aluminis scissilis, cyperi, cuiusq; drach. III,
myrrhæ drach. VII, sandarachæ drach. IIII, iridis drach. III, croci drach. unam.
Aliud: Cyperi dra. III, sandarachæ dra. III, myrrhæ, croci, aluminis scissilis, iri
dis, cuiusq; dra. II, utere sicco, & cū melle. Denudatas autē gingiuas carne implet
pharmacū hoc. Seminis rosarū nō antiqui partes duas, calami odorati indici par
tem unā, siccū tritū adhibe. Aliud, Florū rosarū dra. IIII, calami dra. III, malico
tij drach. II, aluminis scissi drach. I. Optime autem carnem gignit et hoc quod ex
eruo constat, siccum capitale. Relatum est autem in his quæ uulneribus adhi
bentur remedijs.

Ad parulidas, hoc est, gingivarum inflammationes.

Cap. XXIII

Parulis est inflammatio partis alicuius gingivarum cum tumore, quæ ubi
non dissolvitur, suppuratur. Quare in principio adiuuare oportet quo submit
tatur, per dissoluentes uidelicet collutiones, quales sunt succus ptisanæ, deco
ctum seminis lini, aqua mulsa calida, aut mulsum. Deinde siccis deprimenda est
eminentia carnis. Conuenit autem eis hoc: Sulphuris uiui, piperis, aluminis scis
silis, partes æquales. Deprimit autem parulidas alumen omne ustum, aut etiam
sori, si trita adhibeantur. Quod si suppuretur, ferro uenæ incisio distrahatur &
excisam linamento imposito disparato, aut cum linteoli rasura. Amant autē ma
gis excisionem gingivarum abscessus. Simpliciter enim incisi, in fistulam profi
ciunt. Post excisionem medicandum est ipsum hulus per collutiones: & ca
uum quidem eius, eo quod ex eruo constat sicco capitali impleto: ubi uero ad æ
qualitatem peruenerit, eo quod floridum appellatur utitor.

De epulide, id est, excrecente gingivarum carne.

Cap. XXV

Epulis est excrementa carnis ab inflammatione consequuta, iuxta interior
rem dentem molarem, aliquando cum febre & uehementi dolore internarum
mandibularum, ut neque os ægro aperire liceat, contingens. Primum itaque in
flammationem soluere oportet per collutiones eam submittētes, qualis est aqua
mulsa, succus ptisanæ, decoctum seminis lini. Proderit autem & totam maxila
lam cataplasmate ex semine lini & aqua mulsa integere. Vbi uero inflammatio so
luta fuerit, & hiare iam poterit infirmus, medicari oportet epulidem sicco depri
mente: maxime eo quod iam in parulide dictum est, atque etiam eo quod ad
serpētia gingivarum ulcera descriptum est, ex chalcitide & cadmia. Imponen
da est etiam rasura linteolorum. Vbi autem serius caro cōsumeretur, siccū quod
carnem excedit apponatur: uelut est ærugo per se, aut cum æqualis ponderis
galla, aut siccum quod appellatur flauum: deinde rursus rasuram linteae impone.
Quod si adhuc morā traxerit epulis forcipe arepta, excindatur cum tenui scalpel
lo, aut si maior ensiculo paruo. Sequentibus uero diebus curetur hulus per col
lutionem aquæ mulsæ, et per capitale siccū, rasura linteoli adimposita. Postremū
florido sicco tota cura compleatur. Deprimit autē epulidas, galla per se, chalcitia

cruda

cruda & usta, fori ustum, alumen omne ustum, balauftia, squama aris in aceto ad solem aliquot diebus exposita, contrita, & rursus exiccata. Probe facit et hoc aluminis scissilis drachmas II, gallarum drachmas quatuor, salis torrefacti drachmam unam, Vtere sicco.

De gingiuarum fistulis.

Cap. XXVI

Gingiuarū fistulas dissecare ac explanare conuenit, atque post incisionem curare huiusmodi modo quem paulo ante diximus. Vbi uero usque ad radices propinqui dentis fistula ipsa extenderetur, conandum est, ut quantum possibile sit, per fistularia collyria explanetur, et per siccum, quod flauum appellatur, mele exceptum curetur, et consimili modo id quod constat ex eruo postea adhibetur. Quod si confusio & perturbatio aëri non comitetur aut potius libenter hoc ferat, priuabis eum dente affecto. Hocq; modo eruetur & fistula, & confidet gingiua: atq; omnino facilis erit, ea quæ deinceps requiritur cura.

Cura dentium à calido morbo doloroso affectorum, ex

Adamanto Sophista.

Cap. XXVII

Gingiuis dolore affectis propter inflammationem aut corrosionem, conuenientia ad hanc rem remedia locis affectis nudis adhibenda sunt, quæ sanæ aut omnis mordacitatis expertia sint, aut mediocriter acerbæ, & terrei temperamenti. Vbi uero dentes solum patiuntur, aut cum eis simul concreti nervi & pellicula: tum ipsis curatiuis pharmacis, ea quæ tenuium partium in sua substantia existunt adhibemus, quo uis ipsorum in profundum perferatur. Et si quidem frigidus sit morbus, calida tenuium partium adnectimus. Si uero calidus, ea quæ refrigerare possunt, & simul tenuium partium existunt, commiscemus. Calida itaq; existente affectione, & uigente ætate, & temperamento calido, & regione, & aëris statu consimili, ad collutionem oris præparabimus, in aceto albo decoctam radicem halicacabi, semperuium minus, portulacam, perdicium, & glycyrrhizam. Quod si intolerabilis existat caloris sensus, utendum est hyoscyami folijs, aut semine papaueris hortenlis, & semine lactuæ, decoctis in aceto albo. Si uero una cum dentibus gingiua ipsa doluerint & inflammata fuerint, acetum ut acutum & hostilem gladium deuicta: suo enim acore gingiuas corrodit: maxime itaque consolatorium eis existit, lac asininum. Ego autem aliquando cuidam huiusmodi temperamenti existenti, & in hanc affectionem delapso, oleum rosaceum & myrteum in ore detinendum exhibui, et sanè uri sibi uidebatur hic homo, tanquam à face accenderetur. Nivem itaq; cum melle rosaceo miscui, & moderate tepesci, quo frigoris uehementia frangeretur, & ore detinendum exhibui, & à dolore liberaui. Maximum etiam auxilium affert, ea quæ ex papaueris capitis apparatus antidotus soporifera, si tepida ore retineatur. Similiter et lac asinum assidue collutum: et sapa quoq; ore retenta. Optimum etiam remedium eis existit, pastillus qui ex seminibus constat soporifer, et consimiles, sapa subacta, et affesto loco obducti. Oportet autem et caput madefacere ex rosaceo cū modico aceto diluto: idemq; auribus instillare cū aceto. Aut terrenos uermes oleo decoctos in propinquā aurē instilla. Aut millepedes sub aquario uase stabulantes, quæ & alij à Grecis appellantur, eodē modo. Similiter et araneos, & blatte interanea oleo decocta in aurem infunde. Nutriantur autem ex ptisana, halica, ouis, lactucis, & curbita, & quæcunque tandem his potestate sunt propinqua. A uino autem abstineant. Ad commanducandum uero exhibe sub dolentem maxime dentem, herba perdicij radicem, aut hyoscyamum: præsertim in balneo, ita ut continetur in ore succū ex eo donec inde egrediatur. Suffire etiā conuenit ægro hyoscyami

mi senen, aut canis mortui dentem, Inde enim statim dolor sedatur, Eodem modo etiam terrenos vermes suffito.

Cura eorum quibus ex frigidityte dentes dolore afficiuntur.

Cap. XXVIII

Frigidus dentium morbus cognoscitur ex figura tum capitis tum reliqui corporis, & ex ea quæ præcessit diæta, itemq; exercitio, ac reliquis quæ ad hunc ordinem referuntur. Medeberis autem diæta omni ad caliditatem ordinata, Sint itaq; cibi, pitifana cum pulegio decocta aut cum ruta, aut cui post cocturam additum est piper, similiter & halica, olera, petroselinum, & similia. In potu exhibendum est uinum, modicum tamen, & mulsum, atq; etiam quod appellant Codditum. Sero uero ubi dormire uoluerit, confectionem ex calamintha cito perentransem, aut potu, aut linctu deuorandam exhibe. Ad oris collutionem, in aceto decoquitur origanum, calamintham, hyssopum, pulegium, dictamnium, saturia, tithymalli radicem, chamæleonis nigri radicem, uerbenacæ rectæ radicem, eryngij radicem, uerbasci radicem, ueratri nigri & capparis radicem. Vnumquodque enim eorum aceto decoctum ac ore collutum dolores dentium sedat, qui à frigidityte sunt oborti. Ad eos uero quorum sensus citius afficitur, hæc cum posca decoquatur. Porro ex uino si decoquas prædicta ac colluas ter aut quater in mense, præmuniunt ac conseruant eos qui frigidiore temperatura sunt ne dolore dentium afficiantur. Obseruatum est & pinguium lignorum, ueluti tedarum ac picearum, decoctum ipsis prodesse: contunduntur autem hæc ac cum caricis decoquuntur adfuso uino: collutum enim hoc ipsum dentium dolores mitigat. At uero & ipsas tedas contusas in oleo decoquere licebit, oleumq; calidum in ore continere. Quinetiam ipsas tedas conquassatas solas ore detinere commodum existit, circa affectum maxime dentem. Succus etiam balsami in ore retentus, non paruum de se præbet commoditatem. Itemq; castorei cum nardo auribus infusum. Quod si omnes ex æquo doleant dentes, in ingressu balnei cedriæ in os coniectam usquequo egrediatur contineat, & dolore liber erit. Commodum etiam erit manducandas et loco dolenti ad mouendas exhibere, radicem pyretri, radicem tithymalli, & ricini. Similiter autem & theriacem, aut Esdræ antidotum, sapia dilutum ore detinendū exhibe. Præclare facit & Philonis antidotus illa, & quæ appellatur Sotira. Suffito aut canis mortui dentem ita ut fumus inde progressus ore excipjatur. Post uero ipsum dentē uisum, & modico aceto tritū, calidum ore retinendum præbe, & dolore liber erit. Poteris & alcyonium suffitare. Capitis uero cura imprimis habenda est. Ad id ergo huiusmodi insperione utaris: helenij quadrantem, iridis sextantem, aristolochiæ longæ unciam unam. Quod si fortiter infestauerint dolores, fomentum adhibe ex milio, aut eruo, aut tritico torrefacto cum baccis lauri, modico adiecto sale. Ut ne putrescant molares immobilesq; conseruentur. Succum racemorum uitæ albæ libram unam et dimidiā, corticis radicis mori sexuncē, decoque ad dimidiū, calidūq; ore retinendū per septē continuos dies exhibe. Qui enim hoc utitur nūquā dentis dolore afficietur. Collutio, proprie ad dentes ualēs. Corticis radicis hyoscyami dra. viii. pyretri drach. iiii. spicæ nardi drach. i. mellis dodrantem, aceti libras tres: decoque cum aceto in fictili nouo, & percola: deinde adiecto melle utere.

Cura dentium ab humiditate dolore affectorum

& laxatorum.

Cap. XXIX

Affumamus aut mox alium egrotum, qui uniuersam corporis mixturā: imprimis uero capitis, habeat humidiorē, uiuatq; delicatius, et domū habeat in humidiorē

liore loco sitam: instet autem tempestas humida, & hora uerna, quum adficiat.
 Quis nam sanam mentem habens, his uisus, non dixerit à superabundante humore in hoc morbum esse productum? Etenim quum nerui qui se ad dentes inferunt, permadescunt, laxioresque fiunt unà cum circumadherentibus corporibus, necessariò dentes mobiles fiunt: uerum multis hoc citra doloris sensum accidit. Sæpe enim iam diximus, humiditatem per se nō solere dolores inferre. Et dictum quoque antea est, ob ætatem senilem quibusdā dentes laxari, & quod pharyngis macis adstringentibus gingiuas, ac densantibus easdem, senes queat iuari. Porro percussis etiam dentes laxantur, his maximopere prodest alumen scissile, cum myrrha troglodytica tritū, ac inspersum ad dolentem dentem, atque id ubertim et continuè facere oportet. Nam ipsum cōfirmat. Eos uero quibus ab humiditate uacillant, curare conuenit per diætā ad siccitē ordinatā, & cum diuturniore abstinentia ciborum. Cibi itaque eis cōuenientes sunt sorbiles, halica, panis ex iure madidus, aut oryza, aut polenta cū aqua mulsā. Neque male cōuenit eis milium et lenticula: pisces muria conditi: uolucres montanæ et sicciores. Ex oleribus, brassica, & similia. In potu aqua exhibenda est, sed nō multa. Quod si cōcoctioni non officeret, aqua mulsā danda esset: itaque si hanc ferre nequeunt, ad aquā modicum uini addatur. Tempore autem adflictionis, fouere cōuenit locum cum milio et sale. Collutiones exhibendæ adstringentes, et desiccantes, aut falsæ, nisi gingiue simul sint affectæ. Quare gallas, quas omphacitidas appellant, ex acri aceto decoctas, & alumen aceto permixtū exhibebimus: itemque spinæ Aegyptiæ semen, mali coriū, myrti baccas, cyrtinos, balaustia, oliuæ folia, platani folia, cupressi pilulas, rumicis syluestris radicem, lappæ radicem, folia rubi, & quæcunque alia accitā in se qualitatē complectūtur ita ut his cum aceto puro, aut etiam aqua mixto, aut uino, decoctis, os colluere præcipiamus, et in eo detinere adhibitum liquorem, sensui uidelicet ægri maxime gratū & conuenientē. Iudicata etiam & perpenla eorum quæ offerimus potentia. Nimirum plus ne an minus exhibere oporteat, iuxta exuperantis humoris multitudinē. Ego autē optimam ad collutionem oris expertus sum, oliuarum muria conditarū aquam, in quam uidelicet condiantur. Etenim omnem oris humiditatem muria ipsa extergit: corporū uero hiatum & laxitatem, oliuarum spissamentum coercens corroborat & firmat. Aliquando etiam oliuarum albarum contusarum & expressarum accepimus succum, eoque cū rutæ succo et melle permixto, confricauimus dentes: postea uero inspersimus in dicam nardum cum pari pondere aluminis rotundi, & salis duplo adiecto. Opime quoque faciunt ad hanc rem illitiones acerbæ: uelut est confectio de moris oris ualde conducens, maxime si alumen scissile habeat adiectum, & ea quæ ex nucum succo apparatus eodem modo. Aut alumē scissile, & misy pari pondere cetera excepta, in cerati liquidi densitatem redige, & cum eis dentes illine, ac pituita tam defluere permittit: deinde lacte asinino calido mordacitatem eluant, aut uino dulci. Aut alumen, & myrrham troglodyticen inspergito, aut cum aceto, aut melle illinito. Siccæ autē insersiones semper eis sunt conuenientes. Ultra hoc enim quod dentes commotos firmat, etiam ex humiditate hiantes gingiuas committunt. Itaque spodium cyprium lotum, et exsiccatum inspergens, os collui præcipue ex aqua myrti aut rubi, aut alicuius cōsimilis decocti. Postea rursus spodio insperfo, quiescere iube. Aut etiā rubiginē ferri siccā tritā admoue, aut fori usui.

Aliud, ad laxatos dentes & gingiuas humectas. Aluminis scissilis in ficili usui dra. vii. myrrhæ dra. iiii. gallarum, florum rosarum, iridis, singulorum dra. i. croci dra. i. utere. Aliud, Cornu cerui usui dra. vii. rhois culinarij dra. iiii. omphacij

phacij sicci drachmas II, balaustiorum drach. III, corticis pinus, myrrha, croci, singulorum drach. I. Aliud. Alumen rotundum cum duplo salis ponderitum, dentibus ob humiditatem labantibus inspergito. Aliud. Myrrha, aluminis scissilis, amyli, pompholygis, æquales portiones, sicce, tritæ, insperse, labantes dentes firmant. Aliud remedium, quod laxatis ac dolentibus dentibus præsentem fert opem. Aluminis scissilis sextantem, radicis struthij sicce tritæ unciam unam, contritis simul affectum dentem adsperge, teneatq; donec tritæ os impleatur: & tunc sanè ipsam expuat, & effundat, moxq; dolore liberabitur. Aliud, quod & dentes dealbat. Aluminis scissilis trientem, mastiches, unc. I, thuris drach. III, folij drach. III. Aliud, quod & firmat, & corroborat dentes. Aeruginis, aluminis scissilis, aut magis quod appellatur phorimon, minij, singulorum æquales partes: utere sicco, aut cum passo. Aliud. Florum rosarum, balaustiorum, myrrha, mastiches, cuiusq; unc. I, chalcitidis assæ, thuris masculi, corticis pinus, cuiusq; drach. III, salis ammoniaci unc. I. Vtere sicco. Aliud, quod & ad exulcerationes oris cōmodum est usurpare. Rubiginem ferri, aut ipsum ferrum multa rubigine oppletum, igni candefacito, & in aceto puro, aut cum aqua diluto, aut uino, in his quibus sensus facile læditur, extinguito, ac liquorem ipsum in quo extinctio facta est ore continendum exhibeto. Dentes enim firmat, & ulcera curat, præclare etiam facit siccū, quod floridum appellatur. Aliud, Galeni. Quo ego utor, inquit Galenus, polytrichij palcarum usturum sextarium unum: continet autem sextarius harum unc. XXVIII. aluminis scissilis quadrantem, aluminis rotundi quadrantem, spicæ nardi sextantem, folij unc. I, piperis unc. I, pyrethri drach. V, confusa et cribrata gingiuis usque ad dentium radices adhibeto. Vtile etiam existit his, thus cum pipere manducatum: itemq; rubus commanducata ac ricini radix. Prodest etiam Esdræ antidotus sapa diluta ac ore retenta, eodemq; modo theriace Andromachi. Quinetiam in uesperam potu accepta theriace magnificè auxiliatur. Scribit Archigenes, ut uerum & naturali modo ad labantes dentes accommodatum. Dentem, inquit, canis mortui in nomine eius, qui ægrè habet acceptū, super prunas pone, uaporemq; inde prodeuntem æger aperto ore admittat, & firmabuntur ei dentes. Similiter autem & exustum canis dentem cum aceto calido tritum, ore retinendum exhibe. In his uero qui facile ab aceti sensu offendentur præbe cum uino.

De dentibus lima atterendis.

Cap. XXX

Solent ferè dentes moti ac labantes reliquis esse prominentiores, maxime quum ex uerbere hanc affectionem incurrerint. Quare uisum est mihi eos lima atterendos esse, in quantum scilicet præ alijs prominent, ne in loquendo uel etiam manducando, eos qui obijciuntur, offendant. Adtestatur autem & experientum ipsum, quantum sanè ego eius rei periculum feci. Ferream namque limulā ad hanc rem apparui, quo citius ac efficacius res procederet. Nam multæ aggressiones cōcutiunt dentem, quiete opus habentem, si modo aliqua spes est, moti dentis firmandi. Sit autem caput ipsius limæ obtusum, forma nuclei, & quā leuissimum. Itaq; aliquando quidem inæquales quædam dentiū eminentiæ apparent, in quibus partes tantum aliquas lima atterere opus est. Aliquando autem æquali planicie extremitates prominent, quare equali etiam ac plana per limam attritione indigent. Oportet autem molle quoddam linteolū gingiuis ipsis usq; ad dentium radicem adhibere. Deinde leniter sinistra manus digitis apprehendere, cauteq; ac citra offensionem limā adfricare: ne dum

N limam

līmā tolerat, dens ipse cōcutiatur. Quod si omnino dolorem percipiat æger dum līma adhibetur, aut ob id quod uehementius dīgītis dentes apprehendantur, quiescere statim conuenit, interimq; collutiones, dolorem mitigantes, offerre: deinde rursus, ut dictum est, rem aggredi, & paulatim līma deterere. Atque hoc non prima saltem die bis aut ter conari, uerum & secunda repetere: ita ut ægro imperes, ut neq; sermone nimium utatur, neq; ullum aliquem duriorē cibum adsumat. Utatur autem cībis forbilibus, aut pane madefacto. Quod si citra laxitatem, quibusdam dentes præter morem auferant, eos similiter līma atterere oportet, ac collutiones eos cohibentes ac densantes offerre.

Cura dentium à siccitate dolore affectorum, ex Adamanto

Sophista.

Cap. XXXI

Quartus iam ex ordine subiiciendus est agrotus, qui uidelicet à sicca interperie afficitur. Eam aut efficiunt, autumnalis tempestatis cōstitutio imprimis, & uita erūnosa, tenui accedente diætā. Præterea regio sicca, & ambientis nos aëris status cōsimilis. Ad hæc accedit id quod nunc adest corporis ipsius temperamentum siccū, et maxime si caput eiusmodi sicca interperie est affectum. Si uero aut insidet semper, nisi adsit frigiditas unā cum siccitate. Minimum etiam spiritus eijciunt sic affecti. Et ob siccitatē dolor intolerabilis ferē eos concomitatur: austerorum & acerborū usus maxime cōtrarius eis existit. Quare cōfectio ex moris sæpe his uehementē dolorem induxit. Itaq; collutiones minime adstringentes, & mediocriter humectantes apparare oportet: aquam calidā per se, aut furum decoctum, aut radicis dulcis, aut ptisanæ succū, aut amyllum cū sapā aqua calida diluta: lac per se, maxime asininum, malū decoctū, & alia quęcūq; his sunt similia. Cibis aut his conueniens est succus ptisanæ, micæ madefactæ, cucurbitæ, maluæ, oua forbilia, & quęcūq; his profunt qui humectatione indigent. Atq; hætenus quidē simplicium intemperierum curā ostendimus. Manifesta uero & hinc fit ea, quam cōpositæ requirunt. Nimirum ex dictorū mixtura cognobiles, & ex tēperatura ostensorum auxiliorū curam accipientes. Verū propter eos qui se nuper ad hanc disciplinā contulerunt & inexpertos adhuc, age paucis unius tantum cōpositæ intemperiei mentionem faciamus, quę ut manifestum exemplum ad reliquas cognoscendas statuatur.

Cura dentiū ob caliditatem & humiditatē dolore affectorū.

XXXII

Sit sanè regio calida & humida, tempus aut anni uernū, et aëris quoq; status calidus & humidus, qualis est austrinus. Cōtingat itaq; eger, qui caput habeat, quod facile eiusmodi humiditate impleatur, cuiusq; coma plurima sit & subrufa, & totius corporis temperamentū calidum & humectum, & cōsimili quoq; utatur diætā. Quis aut, qui saltem probatus medicus haberi uelit, in hoc calidū & humidum esse morbū non imaginetur? Medeberis igitur ita affecto bifariā: Si enim excessus naturæ cōtigerit iuxta qualitates tantū, scopus curationis dirigendus est ad alterationem solam: Si uero unā cum qualitatū excessu, & humorum multitudo adfuerit, palam est primum oportere corpus euacuare, deinde ad temperiem reducere: cuius rei in omni corporis intemperie memorem esse conducit. Eum uero qui à calido et humido morbo affectus est, de quo nunc dicere institui, per uenā incisionē euacuare cōueniens est, utpote à sanguinis multitudine exagitatum. Calidus enim & humidus sanguis ipse existit. Incidere aut oportet uenam cubiti superiorē, quæ Græcis humeralis appellatur. quæ si non contingat, eam quæ mediā existit. Quod si quid prohibeat uenæ incisionem facere, modico & tenui uictu superfluum & non necessarium detra-

hito

hito humorē. Atq; hoc modo etiā circa reliquas compositas intemperies ope-
peraberis: ita ut eas quæ iuxta qualitatem tantum constiterint, alteres, et cōtra-
rijs qualitatibus permutes. Eas uero quæ cum substantia quadam cōsistunt, hu-
more per convenientes purgationes detractō euacues: nisi quid & in his pur-
gationem fieri præpediat. Reliqua autem quæ adferre oportet auxilia, ueluti
sunt collutiones, & uictus constitutio, facile ex prædictis inuenire licet. Qui e-
nim formam tractandi simplices morbos cognouerit, in promptu habebit &
circa mixtos convenientia remedia inuenire. Cognoscitur autem affligens hu-
mor, quum ex reliquis circa corpus signis, tum ex consequenti dolore. Flauæ
namq; bili dolor pungitiuus comes existit. Pituitam uero sequitur unā cum fri-
giditate distēlio locorum: & fece quidem sanguinis siue atra bile affligente, sen-
sus adest, uelut corpuscula quædam in profundo confringantur: ubi uero æqua-
liter omnes augetur, multitudine eorum in corpore coaceruata, grauitas cō-
comitatur. Verum enim uero & sapor ipse influentis humoris ægro specimen
sui ostendit. Aut enim amaritudinē, aut salsedinē, aut acedinē sensu perceptat.

Curatio eroforum dentium, ex Galeno.

Cap. XXXIII

Erosiones & cauernæ dentium ex influxu acrium & erodentis maxime na-
turæ humorum generantur: quemadmodum etiam ulcera in cute, citra aliquā
externam causam. Manifestum igitur hinc erit, quo modo sanandi sint erosi dē-
tes: nimirum per exsiccationem influentis uitiosi humoris, qui si paucus fuerit,
localia remedia ex desiccantibus pharmacis conflata suffecerint: si uero multus
fuerit influens humor, totius capitis respectum habere conuenit: contingit au-
tem aliquando caput affici, ob reliquum corpus affectum, quare in his uniuersi
corporis curam nos gerere oportet. Archigenes itaq; ad hos hæc remedia de-
scripsit. Sori resina, terebinthina exceptum, denti circumlinito, atq; in cauernā
indito. Præclare facit & hoc: Sulphur uiuum lycio exceptum cauernæ impo-
ne, & prius depurgatum dentem per orbem ex eo intege: aut gallam tritam ly-
cio aut resina terebinthina exceptam ad cauum intrude, similiterq; depurgato
denti appone. In maximis uero dentium doloribus summe prodest hoc: Sene-
cæ anguium uisam ac tritam cū oleo in mellis crassitudinē redige, eodemq;
modo, ut dictum est, utere. Aut senectam ipsam non uisam dentibus adfrica:
inde enim excident: aut melanthium torrefactum ac tritum cum oleo similiter
adhibeto: aut melanthium torrefactum & acri aceto adfuso tritum cauo denti
indito ac circumlinito. Sistetur enim erosio, neque quicquam addet ultra.

Aliud. Melanthij partem unam, allij dimidiam, & salis parum quiddam,
simul contrita circumponito. à dolore enim liberat. Proderit autem & ad ero-
siones dentium uti ea quæ supra ad motos dētes descripta est collutione, ex suc-
co uidelicet bryoniæ & cortice mori. Aliud. Veratrum nigrum tritum &
melle cocto exceptum in cauernam impone, & præmundatum similiter ex eo
integito dentem. Aliud. Thuris partem unā, atramenti futorij partes duas,
contere cum passo, donec cerati crassitudo fiat: utere ut dictum est, & cito seda-
bis dolorem. Aliud. Galbani partes duas, thuris partem unam, contere cū
passo ad cerati crassitudinem: utere ut dixi, & eo ipso die sedabitur dolor.

Aliud. Alumen scissile in caua intrude, & à dolore liberabit. Aliud. Fel
ursi indito, & ab erosione liberabis. Aliud. Rhododaphnes uirgultū exu-
stum & tritum, insperge cauernis, & medeberis. Andromachi compositio,
ad dentes molares, quæ eadem hora dolores sedat. Piperis, pyretri, succi tithy-
malli, galbani, singulorum equales partes, galbano exceptas, cauernis impone.

N 2 Aliud

Aliud Asclepiadae. Eo, inquit, usus adseruavi caua dentium citra dolorem. Gingiber in aceto mulso decoctum, & probè tritum, in caua imposito, similiterq; extrinsecus ad dentē admoueto. Præclare etiā facit ex duobus piperis generibus composita antidotus, cauis indita: atq; etiam oleo amygdalino aut nardino aut rosaceo diluta, & in uicinam affecto denti auriculā instillata. Aliud.

Ego autem ad caua dentium cum dolore affecta, Esdrae Antidoto utor, quā sapa dilutam, & calefactam ore retinendam exhibeo. Mirum enim quā dolores ea mitiget, uerum si ad manum non adsit, theriaca Andromachi eodē uero modo. Fomentum etiam affecto denti adhibere conuenit huiusmodi. Origanis sicci ramulos feruente oleo imbutos ægro denti apprime. Aut ricini uirgulto similiter utere; aut staphida syluestrem scalpello probè adaptatam, ac affixā, itemq; pyretū adhibe similiter; aut ceram super affectum dentem pone, eāq; cum specilli extremo ignito apprime. Id enim continuè facere nō ab re est. Est autem & hæc quædam fomenti species: primum optimè præmundato dente, hyoscyami semen suffito. exurgentemq; hinc fumum æger admittat infundibulo adhibito, ad affectum dentem: mirum in modum etiam erosiones dentium mitigat, canis mortui dens, quemadmodum & antè dixi, eodem modo suffitus & exustus in aceto tritus oreq; retentus. probè etiam auxiliantur uermes terreni suffiti, oleum quoq; in quo uermes terreni decocti sunt, in uicinā affecto denti aurem, tepidum infusum, dolorem uehementer lenit. Idem præstat blattæ domesticæ capite detracto adeps, cum rosaceo liquefactus ac auri instillatus. Eodem modo & hederæ albæ acinos quinq; cum rosaceo tritos & in punice coratice calfactos in aurem assiduè instilla. Auxiliatur etiam radice hastulæ regie succus, itemq; nasturtij similiter instillatus. Prodest quoque in uicinam affecto denti narem infundere anagallidis ceruleæ succum, aut radice betæ succum aut atramentum sutorium cum lacte. Apollonij. Cumini quantum tribus digitis apprehendere potes, myrrhæ, magnitudinem fabæ, interioris cucumeris syluestris, duplum cum lacte muliebri in collyria redige, eaq; in utraq; na rem immitte: atq; ubi tamdiu hæserint, donec quinq; stadia quis cursu cōficere possit, extrahere iube, fortiterq; ipsum pharmacum emungere. Idem etiam ad aurium dolores eodem modo sumptum prodest.

Vt dens citra dolorem & absque ferro extrahatur. Cap. xxxiiii

Quod si dentem tollere animus sit citra dolorem, hocce pharmaco auferendus erit uehementer ad hanc rem cōgruente, Pyretum acerrimo aceto in dies quadraginta conditum, deinde tritum, in usum adserua: qui ubi postulauerit, reliquos dentes cera præmunitos custodito: ipsum uero qui dolet circumcirca purgatum hoc pharmaco integito, & post horæ interstitium digitis extrahito, aut scalpello exigito. Aliud. Sori acerrimo aceto, ad dies decē, in sole assituo contritum ac exsiccātū, præmundato denti imposito & excidet. Aliud.

Sandaracham eodem modo apparatus, imposito. Aliud. Sori & tithymalli succum galbano excepta depurgato prius denti apponito. Aut cucumeris syluestris radicem, ut pyretum apparatus, eodem adhibe modo. Aliud.

Grana cnidia trita ac galbano excepta, circumponito, & excidet. Aliud. Præclare facit lappæ herbæ radix feruenti cinere calfacta, et denti assiduè apposita pauca enim mora dentes tollit. Aliud. Cucurbitæ syluestris radicem cauo impone, & dentem eruet. Aut ipsam cucurbitam tufam & cribratam per aliquot dies in aceto macerato, donec ad mellis spissitudinē redigatur: deinde in eo ipso pharmaco scalpello imbuto frequenter dentē circūadito, atq; os claudere

dere parumper iubeto: deinde dentem digitis apprehensum trahe, et sequetur.

Aliud. Vermes terrenos in testa exustos, in cineremq; redactos contere, & circumfuso prius dēti ubertim adspere, & per diem ac noctem excidet sua sponte. Itaq; eo confidenter utere: ut mysterium enim celebratum est iam sæpe. Poteris autem & citra scalpelli rationem inspergere, idemq; opus patrabit.

Aliud. Corticem radicis mori teneriorem tritum, ad dentem quem erutum cupis, solum impone, & excidet. Aliud. Sori, gallam, staphida sylvestrem, alumen scissum, sulphur uiuum, piper longum in puluerem redige, & adiecta cedria subige: deinde ceram modicam liquefactam adfunde, simulq; committe. Vbi uero uti uelis ex hoc, quantum opus fuerit emollito, ac depurgato prius denti circumponito. Aliud. Erucam ē brassica natā frequentius ad ipsum dentē adhibe, cadetq; sua spēte. Eijciet etiā dentem sylvestris oleæ lachryma cauo eius indita. Itemq; rhus qua coria inficiuntur, & lachryma & succus sylvestris fici, itemq; tithymalli. Cauernā autē supernē galbano aut cera obturato.

Smegmata uaria ad denigratos, liuentesq; ac rarefa-

ctos dentes.

Cap. xxxv

Liuent aliquando dentes per uniuerſam ipsorum substantiam, non dissimile quiddam inflammationi patientes, ob influxum uidelicet uitiosorum humorum. Quare consimili cum his qui erosionem passi sunt, indigent curatione: nimirum per desiccantia pharmaca: suntq; smegmata eis conuenientia. Apollonius itaq; ad denigratos dentes hæc præscribit: Sal fossile melle subactum in fictili uasē torreto, ac tritum modica myrrha misceto, eoq; dentes confricato.

Aliud. Pulegij ac salis æquales partes melle subige, ac aceto acerrimo adfuso exure. Aliud, quod gingiuas adstringit. Polentam aceto acerrimo subactam in olla exure, ac contere, cumq; ea dentes confrica. Hoc enim & gingiuas ipsas coërcet. Aliud. Cōmuniter autē ad omnes, eiusmodi dentifricijs uti mur: radice aristolochiæ exusta, aut ossē ceruino usto & trito, utere: nam & dentium doloribus medetur. Aliud. Cornu cerui urē, modicāq; mastiche admixta utere. Aliud. Talos ouillos exure, ac contritis utere. Ad eadem pollēt etiam buccina sale expleta & usta, pumex assatus & uiuo extinctus, sepiæ testa usta, cōchæ usta, cochlea terrestris usta cū melle: his autē singulis odoris cōmendandī gratia parum iridis illyricæ miscetur, aut floris iunci odorati, aut calami Indici, aut spicæ nardī. Optimē autem facit, inquit Archigenes, tum ad dentes a dolore præseruandos, tum ad gingiuarum erosionem, atq; etiam decorē dentium, pharmacum hoc: Lanas succidas linteolo illigatas ure, & salis torrefacti tertia earum parte admixta contere, & pro dentifricio utere. Aliud. Mel & salem in cerati formam contrita, linteoloq; ligata exure, deinde parum iridis illyricæ admisce, & dentes ex eo confrica. Aliud dentifricium. Sulphur uiuum tritum dentibus adfricato. Smegma Oribasij. Salis ammoniaci, cyperorum, iridis, singulorum æquales partes aliquandiu adfricato, postea uero gingiuas ex uiuo odorato colluito. Aliud smegma optimum. Pumicis trientem, testarū sepiæ, quadrantē, mastiches, aluminis scissi, foliorū malabathri, cuiusq; unc. i. Aliud. Pumicis usti quadrantē, testarum sepiæ quadrantem, cornu cerui usti sextantē, salis assati sextantē, spicæ nardī trientem, cyperorum unc. i. costi scrupul. iiii. Smegma pulchrum. Marmoris drach. iiii. foliorum malabathri, unc. i. amomi unc. i. cornu cerui usti sextantem, balaustiorum unc. i. iridis sesquunciam, mastiches drach. iiii. myrrhæ drach. vi. costi drachm. iiii. Bouis etiā talus ustus optimē dentes extergit, motos firmat, affectos a do-

N 3 lore li-

lore liberat. Aliud dentifricium, quod oris odorem commendat, dentes dealbat, & ab erosione ac labefactione custodit. Nitri, testarum sepiæ, myrrhæ troglodyticæ, æquales partes cōmitte, ac utere. Aliud optimū. Aluminis scilli solquūciam, mastiches unc. i. iridis unc. i. rosarū calyces siccos unc. i. contritis utere, & aqua calida inde os collue. Aliud dentifriciū. Buccinorum ustorum, salis torrefacti, testarum sepiæ ustarum, scobis marmoris præconesij, singulorū unc. i. costi scrupulos octo, cōtusis utere. Aliud, Timocratis, quod ad gingiuas humore prægnantes & cruentas: ad putredines, parulidas, hoc est, gingiuarum inflammationes, motos dentes, dolentesq;: omnia item oris uitia prodest. Accipe perdicij herbæ foliorum teneriorum modium Italicum, salis albi & tenuis sextarium unum, mellis sextarium unum, contunde simul ac in massam molliorem redige, quam in ollam coniectam luto obtura: ita ut circa os operculi foramen relinquo, per quod cum uirga agitur, tam diu autem super prunas positam torreto, quousq; fumus inde procedens purus uideatur, tum sanè ab igne ablata frigeferi sinito: atque piperis longi drachm. iiii. accipito, piperis albi drach. v. piperis nigri drach. vi. pyretri drachm. vi. aluminis scillilis usti & cum uino austero extincti drachm. ii. pumicis usti, myrrhæ, hyssopi, pulegij, seminis apij, singulorum drachm. ii. mentæ siccae drachm. iiii. iridis drachm. iiii. hæc omnia in sole prius exsiccata, cōtundito ac cribrato, siq; quæ in olla usta sunt admisceto, ac utitor. In aliquibus uero, utpote in frigidis dentium affectionibus, hæc magis conueniunt, siue ex potu frigida, aut potum frigidorum comestione sint obortæ. Conueniunt etiam his qui a frigido humore afficiuntur, ubi prius per collutiones ac manducationes pituita sufficienter fuerit detracta.

De ancyloglossis & qui uix loqui possunt.

Cap. xxxvi

Ancyloglossi quidam fiunt ex natiuitate, quidam uero ex aliqua affectione. Ex natiuitate fiunt, quum membranæ inferiores, quibus lingua innititur, duriores & mutilæ è natura sunt productæ. Ex affectione autem ancylosis & incuruatio linguæ contingit, præcedente ulcere, & cicatrice dura sub lingua relicta. Qui hoc modo affecti sunt difficulter loquuntur, quare etiam Moglali à Græcis sunt appellati. Qui uero ex natura ancyloglossi existunt, principio quidem tarde in sermonem prorumpunt, ubi uero loqui cœperint, citra obstaculum et satis festinanter loquuntur. Impediuntur tamen in prolatione nominum aut uerborum, quorum aliàs difficilis pronuntiatio existit, ueluti in quibus R, aut L, aut K, literæ, frequenter occurrunt: hos sanè adhibita manu per solam chirurgiam curare oportet. Ad eam itaque perficiendam ægrum desiderare oportet, eiusq; linguam sursum ad palatum attollere: & si quidem membranæ ipsæ curuitatis causa existant, incuruo uncino eas apprehensas & extensas excindere, animaduersione habita ne simul subiacentes uenas dissecemus. Si uero cicatrix curuitatis causa fuerit, similiter uncino apprehensa extendatur, & quicquid durum adest, & quod cum naturali carne non consentit excindatur. Ab opere autem patrato aqua frigida aut posca os colluant: postea inspergatur mænna thuris, imponanturq; linamenta conuulsa: sequentibus uero diebus curetur ulcus collutione aquæ mulsæ, aut illitione unguenti Aegyptij, linamentis conuulsis simul impositis, ut per eorum interstitium cicatrix diducta, coalescat, neque rursus eadem cicatrix relinquatur.

Ad ranunculum sub lingua.

Cap. xxxvii

Ad ranunculum sub lingua: est autem tumor earū quæ sub lingua sunt par-

tum, præcipue uenarum: utendū sanè ijsdem remedijs quæ ad aphthas oris ulcera describemus, maximè tamē his quæ sunt ex eis fortiora. Proprie autem eis profunt etiam hæc: æruginis rasæ, chalcitidis, gallæ, æquales partes insperge.

Cum passo potes etiam pro collutione usurpare. Aliud. Farinam erui cum melle, præfrictis locis, illine. Aut etiam gallam tritam cum melle, aut rosarum semen eodem modo. In corporibus autem molliori sensu præditis, rhoēm rubrū cum melle: aut rhois drach. VII, florum rosarum drachm. IIII, croci drach. II, costi drach. II, misyos, æruginis, æquales partes, commisce, & cum his locos sub lingua confrica. Decoctum uero foliorum oleæ colluant assidue. Aliud.

Nuces iuglandes ueteres integras, unā cum cortice exustas contere, deinde piperis grana XII, adijce, thuris grana mediocria III, hæc cum melle sufficienti mixta illinito, & miraberis. Aliud. In inueteratis uero & perfectæ ætatis, eas quæ sub lingua sunt uenas dissecato, Extrinsecus uero mento adhibendum ex ouis pharmacum. Magis autem conuenit id quod Græci uocāt Sphæron.

Aliud. Artemisiā maximè uiridem cum sale tritam ad locos sub lingua adfricato.

Ad linguam inflammata, desquamata, ac tumentem & ad palatum ac gingiuas.

Cap. XXXVIII

Glaucium in cote cum aqua dilue, eoq; locos illine, & eodem die sedabitur. Aliud, ualens etiam ad linguæ exulcerationem. Paliuri folia manducant & expurant. Vbi uero lingua infletur, dolorēque afficiantur eius partes uicinae, similiter & mandibula, ita ut loquela præpediatur, folia oleæ tenera trita, & oleo perfusa, illinito, egregie enim auxiliantur. aut origanum passo decoctū colluendū exhibeto: aut pruni folijs cum melle tritis utere. Ad linguam uero, cui superficies instar squamarū aut corticis decedit, optime facit, amurca æreo uase, donec cogatur, decocta, & illita. Ad linguam putrescentem, & ferè demortuam. Succum foliorum uitæ albæ cum misy permixtum illinito: deputat enim, & carne replet. Quidam etiam hic mel adijciunt. Vt uero ad cicatricē perducatur, radicem uitæ albæ, cōtritā & cribratā insperge. Melius aut erit eam melle permiscere, ne dissipetur. Ad linguæ abscessus. Quod si abscessus in lingua fiat, furfures in aqua decoctos donec liquor lubricus fiat, percolato, et huic succo mel adijcito. Simulq; calidum ore detinendum exhibeto. Hoc autem sepe facere oportet. Aut enim abscessum discutiet, aut rumpet. A ruptura uero florido sicco utendum est.

Ad aphthas, hoc est oris ulcera, ex Galeno.

Cap.

XXXIX

Quæ in superficie oris fiunt ulcerationes, Græci aphthas appellant, habentes in se quiddam igneæ caliditatis: fiunt autem ut plurimum infantibus, quum uiciosum existit lac nutricis, aut aliās puer non probè concoquit: facile autem medelam recipiunt, utpote quæ ex his quæ mediocriter adstringunt, ut plurimum contingit. Aliquando tamen diuturniores existunt, ob tempora uidelicet tractum, indissolubili quodam marcōre emergente, aut etiam ea quæ appellatur Nome, malo nimirum semper ulterius serpente. Fiunt etiam aliquando in his, qui ad perfectam ætatem perueniunt, tum propter uisum humorem ad os defluxum, tum propter acredinem eorum quæ bibuntur ac comeduntur. Cognitio omnium facilis est, utpote uisui ac tactui subiecta. Ad tactum quidem, calidiores quàm conuenit loci fiunt, tumoresq; excitantur. Visu uero cognoscuntur ob colorē, Quæ enim rubicundiores exi-

N 4 stunt,

stunt, sanguinei humoris dominium indicant: flauiores, bilis amarulentæ: albi diiores, pituitæ. Liuentes uero et nigrescæ, bilis atræ. Etenim qui ista probe discereuerit, singulorūq; simplicium uirtutem cognouerit, facile constituet modū utendi tum simplicibus tum compositis pharmacis: consideratione simul super corporum naturis habita: num ne molles sint, & humectæ: an duræ, & siccæ: Siquidem fortioribus corporibus, fortiora etiam remedia sunt adhibenda: imbecillioribus autem molliora: infantibus itaq; conuenientia sunt, ea quæ in cibus eis offerunt mulieres, uelut est lens cum modico pane, & medulla ceruina aut uitulina. Oportet autem miscere cibis aliquid ex malis acerbis, piris quæ ac mespilis: aliquando etiam lactucæ quiddam & intubi, ac portulacæ cibo admiscendum est, inflammata uidelicet ulceratione existente. Quod si infans ipse cibum capere nō possit, nutricem eius huiusmodi uictu curare oportet: nec non ora infantum pharmacis conuenientibus, illinire. Si quidem enim subrubræ infantū ulcerationes fuerint, à principio cum his quæ mediocriter adstringunt & refrigerant: consequenter uero his, quæ citra mordacitatem discutiunt. Si uero subflauæ ulcerationes fuerint, iisdem similiter est utendum. uerum magis frigidis. Si uero subalbæ & pituitosiores fuerint, extergētibus utendum est. Si aut nigra, his quæ generose discutiunt. Ad maiores uero pueros, pharmacis eiusdem generis facultate præditis utaris, uiribus tantum ipsorum auctis ac extendis. Ad eos autem qui iam perfectæ ætatis existunt, durioraq; corpora habent, efficacioribus remedijs utimur. Moderata itaq; remedia ad oris ulcerationes recentes hæc sunt, Omphacium in uino dissolutum aut mulso, rhus culinaris eodem modo. Pro infantibus in principio sufficit flos rosarum, ipsæq; rosæ siccæ cum mulso, aut melle roseo. Inueterato autem iam malo, in minoribus quidem pueris admirandam opem contulit hoc, inquit Asclepiades. Remediū Asclepiadæ. Gallas contusas aqua decoque, & cum decocto percolato paræ mensuram mellis permisce: rursusq; decoque, donec ad mellis crassioris spissitudinem redigatur: eoq; ut maximo remedio utere, ita ut locis illitum satis diutius adfrices, aut tomento lanæ purpureæ digito circumuoluto locis apprimas. In his uero qui perfectioris ætatis sunt, durioraq; corpora habent, in uniuersum satis mihi fuit crudo misy uti, cum uino adstringente: quod sanè tum intendit, tum remittit uires suas, iuxta uini uim aut magis aut minus adstrictoriam, atq; etiam secundum quod densior aut liquidior uini & misyos mixtura apparatur. Si uero sordidum apparuerit ulcus, misy cum uino mulso tero. Alijs autem & qui adhuc fortioribus indigent remedijs, ærugo & cum uino & cum mulso uilis existit. Neq; uero malū pharmacum his chalcitis existit cruda cum oleo trita. Illiniuntur autem ex his pharmacis, solæ particulae oris affectæ. Quod si colutiones obtulerimus, siue mediocriter, siue intese adstringentes, ea cautione utemur, ut fortioribus corporib; fortiores, mollioribus imbecilliores exhibeamus. Porro si in putredinē aphtha uertatur, nō cōuenit amplius aphthā, eam affectum onem appellare. Neq; enim ea quæ aphthas sanant pharmaca, his adhibemus, sed fortiora, qualia quædam in capite De crustis oris, paulò post dicentur. Atqui si putrescere incipiāt, maxime in infantibus, præclare facit præscripta ex decocto gallarū & melle illitio, et anthera stomatica cum melle illita, et id quod ex rosarum floribus constat: rhoë, croco, & costo, quod ad columnellas inflammas describetur, siccum pharmacum: oportet autem id illinire cum melle. Nec minus egregie facit centaureæ minoris ex uisæ cinis illinitus cum melle, & spheriis, hoc est, cupressus pilulas ferens, exusta eodem modo. Proprie inquit

inquit Archigenes, facit cornu ceruinum ustum, tritum, & adfrictum. Ad aphthas autem quæ proserpunt summe efficax est, fœniculi radix usta, per se & cū melle illita. Itemq; amurca in æreo uase, donec in mellis crassitudinem cogatur decocta, ac illita. Aliud, quod & ad aphthas & ad reliqua oris ulcera conducit, Aluminis scissilis sextantē, gallarū unc. i. cōterito, ac oleo subigito, aut digito in oleo madefacto siccum excipito, eoq; exulceratos locos quā plurimū extergito. Detrahit enim cutē, asperitates tollit, ulceraq; ad cicatricē perducit.

De gurgulionis affectionibus, ex Galeno.

Cap. XL

Gurgulionem quidam etiam columnellam appellant, uux uero nomine accipienda est quædam in eo affectio, quum scilicet uux acino simile, summum gurgulionis apparet. Lorum uero uocant aliam quandam eius affectionem, quum ex suffitu nimium ignitus gracilescit, & loro similis propendet. Verum hæc affectiones raro circa gurgulionem accidunt: inflammatur autem frequentissime. Euenit etiam aliquando, ut citra inflammationem nimium humectus laxior fiat: uelut in destillationibus continuis contingit: itaque inflammatione incipiente repellentibus pharmacis opus erit, quæ adstringentis facultatis esse oportet. Et si quidem moderatus fuerit humorum influxus, ea quæ moderate adstringunt sunt adsumenda: ubi uero fortius inualuerit, acerbæ etiam sunt adiungenda. Collutiones igitur moderatæ sunt, ex palmis decoctis, aliquando in sola aqua, aliquando etiam adiecto modico melle. Similiter autem & ex rosis, radice dulci, pampinis uitis, rubis, iunco rotundo odorato, terebintho, rhāno, cypero, & siliquis. Itemq; ex radice mori, hypocistideq; & malis cotoneis, ac piris austeris. His autem fortiores existunt, myrti, & baccarum eius decoctum, & uirgultorum mollium ilicis, & uniuerſi quercini generis, similiterq; & glandium: itemq; decoctum mespilorum & cornorum. Præclarissime autem omnium facit decoctum gallarum, rhois culinarij, eiusq; quo coriorum insectores utuntur, spinæ Aegyptiæ, myricæ, aut ericæ seminis siue fructus, utriusq; mali punici floris & putaminis. Horum unumquodq; & singulatim & cum alijs decoctum in aqua, gargarisandum exhibere oportet. Mirum uero quantum eorum mixturæ, simplicium & immixtorū usum excedunt. Vtilis est etiam affricus cochlearij frigidissima aqua repleti, et posca frigida in balneo colluta. Conuenit quoq; arida trita gurgulioni admouere: ita ut submisſe & paulatim ad superiorem & extrinsecam regionem adferantur, & per cochleare aut specilli cōcauum supra linguā immittantur. Itaq; ex aridis moderata sunt, rosæ sicca, & flos earum, & prædictarum plantarum germina exsiccata, hypocisthis, rheon ponticum, lapis coriariorum quo calciamenta ut resplendeant expoliūt, à Græcis ageratos, uelut non senescens, appellatus: & is quoq; qui samius alter appellatur, & omphaciū siccū. His imbecilliora sunt minorisq; acrimoniæ, gūmi, tragacanthus, sarcocolla, & amyli, quibus utendū erit ubi gurgulio à nimio adstringentibus remedijs fuerit cōpressus, aut à mordētibus ac discussorijs irritatus. Fortiora prædictis sunt, lapis hæmatites, necnō phrygius ustus, miniū sinopiciū, & terra lēnia, quæ appellatur sphragis, diphryges, fructus Aegyptiæ spinæ, rhus culinarijs. Adstringūt enim hæc euidenter, citra tamen exasperationē. Acerba aut sunt, balaustia, & cytini, & malicoriū, ac galla. Adstringūt etiā sufficienter omnia aluminis genera. Atq; hæc quidē simplicia sunt huic loco cōuenientia. Ex quibus & cōposita fieri possunt, quū uehementi molle et lene quoddā adiugemus, aut discussorio quiddā adstringēs admiscemus, iuxta tēperaturam corporis cui medemur. Diuturnę aut affectioni impossibile est per repellētia perfectū auxilium

auxilium adferre, maxime ubi ægroti corpus plurimo humore repletum, aut affecta particula natura debilior extiterit. Itaque sæpe in principio statim, aut paulo post omnino aliquid ex discutientibus ad adstringentia adhibere cogimur. Si uero uehemens adfuerit dolor, etiam ea quæ eum mitigant adnectemus, atque quum multa omnino sint quæ discussoriam uim obtinent, à mollioribus est incipiendum. Ab acris enim inflammata exacerbantur. Ob eam igitur rem composita in usum uenerunt, tum ad reliquorum membrorum inflammationes, tum ad eas quæ fiunt in gurgulione, ueluti quum alumen miscemus cum iride Illyrica, aut thure, aut myrrha. Tu uero perfecta caloris in ipsa inflammatione magnitudine, considerataque influxus ad eam multitudine, atque amplius in toto corpore humorum quantitate ac copia perpenſa, uel eorum quæ adstringunt, uel quæ discutunt augebis mixturam. Optimum autem pharmacum existit inflammatos gurguliones, tum in principio, tum in uigore adhibere existit hoc: rhois culinarij drach. vii, florum rosarum drach. iiii. croci drach. ii. colidrach. i. contusa & cribrata in uitro reponere. Vsu uero expetente dimidium cochleare in duobus aquæ mulsæ aquolioris cyathis dissolutum ad gargarisandum adsumatur. Vtilis est etiam eis pastillus ex croco, qui iris à quibusdam appellatur. Complectitur autem myrrhæ drach. vii, aluminis liquidij drach. ii. croci drach. viii. dissoluitur in uino. Quidam etiam aloë adijciunt, quàm nos reprobamus. Hic itaque pastillus fluidioribus, & magis humectis inflammationibus summe conuenit, dilutus in uino ac illitus. Miscetur etiam gargarisum. In corporibus durioribus prodest quoque pastillus Musæ. Prodest etiam efficacissime pastillus Andronis, facit & id quod Asclepiades descripsit, lapidis agerati drach. iiii, floris lapidis asij drach. iiii, terræ samiæ drach. iiii, aluminis scissi drach. ii, croci torrefacti drach. ii, gallarum drach. ii, cōtritū utere. Hoc etiam nos usumus, inquit Galenus, optimumque sæpe sumus experti: præter quàm quod statim à principio, & quum rubicundus & calidus existit inflammationis tumor, minime adhibendum uidetur. Vbi uero diutinum adest malū, & corpus prius est euacuatum, semel tantum in usum assumptum, magnam statim ostendit utilitatem. Ad laxatam columnellam. Gallarum drach. xxxii. diphrygis drach. xii, illini cum melle. Aliud philosophi. Apparatur temporis necessitate instante. Inueteratum enim uires amittit. Nuces uirides accipe & excucato, & palmarum ossa, atque de ipsis ubi uelis sufficienter exurito, & amborum æquales partes misceto, ac siccis tritis utitor. Sufficiens enim discussoria existunt. At uero quum in alijs adfectionibus, tum ad columnellas citra inflammationem laxatas, gallæ omphacine, salis ammoniaci, amborū æquales partes, per cochleare admota, præter opinionē auxiliantur. Præclare facit & in his, cyrenaicus succus tritus adhibitus: qui si non adsit, ipsum laser. Aliud, ad columnellas laxatas. Mellis libram i, florum rosarum sexuncem, aluminis liquidij bessem, succi hypocyſtidos quadrantem. Alumen & mel simul decoquito, deinde reliqua trita adijcito, ac rursus paululum decoquito, eoque utere aliquando aqua calida dissoluta, aliquando aqua mulsæ ad gargarisandum, aliquando quoque eius illitu ipsam columnellam reprimes ac eleuabis. Bonum hoc remedium esse adstruit Galenus, eoque uti iubet. Aliud, quod et colūnellas iam excidendas sanat: facit idē & ad ulcera gingiuas depascētia, omneque oris ulcus serpens. Fructus spinæ Aegyptiæ, gallarum, fructus myricæ, balaustiorū foliorum malabathri aluminis scissi, cassiæ, singulorum æquales partes. Vtere sicco. Aliud, Asclepiadæ. Rosarum siccarum nō madefactarum sextarium italicum.

licum unum, nardi celticæ cū radicibus ac circumfita ipsis terra, fasciculum manipularem unum: fimi columbini agrestis sicci ex ipsis nidis detracti drachmas III. myrrhæ drach. V III. gallarum omphacitidum numero XLV. contusa & cribrata per arundinem insufflato, & per specilli cauum adhibeto. Aliud, siccū ad ualde laxatas columnellas, itemq; tumentes. Piperis drac. I. myrrhæ drac. I. aluminis scissi drach. II. gallarum drach. II. contritis utere: euestigio enim eas firmant, ac resiccant. Aliud parabile, quod & ad laxatam & suffocantem columnellam ualet. Nitrum tritum digito excipe & adfrica, destillabit enim inde plurima pituita, eaq; cruenta & sanabitur. Aliud naturale, Philumeni. Picem liquidam accipe, eaq; extremum pollicis tui infice, alteraq; manuincipitis capillos distende, ac picem illine. Recurret enim statim uua. Quod si quis omnino ab adflicione uuæ & tonsillarum securus esse uelit, quotidie per morborum interualla quum lauatur, & à calido lauacro egreditur, modicam frigidam aquam sorbendo deglutiat. Quod ipsum & ad tussim, & lateris dolorem, humidisq; stomachi uitis multis utile fuit. Per ea itaq; quæ dicta sunt in naturam suam reducere gurgulionem oportet, omni conatu et molimine adhibito, neq; festinandum ad eius excisionem.

De ablatione columnellæ, ex Galeno.

Cap. XLII

Quod si cōtinuè adflicat columnella, periculumq; sit ne suffocatio aut tabes inde inferatur: aut quum gracilis & loro similis sit, propterea quod alimentum nō sentit, quod sanè aliquando accidere solet: aut quum resolutionem patitur: sit enim & hoc in aliquibus: tunc sanè refert utrum excidatur, an non. Optima eius auferendæ oportunitas existit, quum suffocatio urget, ut tum imminente periculo, ægroto auxiliū feramus: itaq; quo manum cōmodius adferas, æger in splendenti & claro loco collocetur: & tunc quidem os eius diducatur: mox uero immissio forcipe producat, ita ut uolsellam huic rei idoneā, iuxta mediū ipsius columnellæ, aut magis adhuc inferius adhibeamus: atq; ita producta obtorqueatur. Obtorta enim uelut stupida efficitur, & uelut illaqueata curuatur ac liuefcit, citra magnā sanguinis eruptionē. Quapropter immorari oportet aliquandū, ac eam detinere quousq; æger tolerare possit: tuncq; auferre non supra forcipem incisione facta, sed ad eius fundū. Quum enim pelliculis referta sit ipsa colūella, et ob productionē cedat, proluxa sanè inspicientibus apparet. Vnde multi in experti medici, siue per errorē, seu per ignorantia altius incidentes, eam funditus auferunt, maximiq; in cōmodi autores ægro existunt. Quare relinquere oportet fundū eius circa palatum. Ab excisione aut ægro offerenda est posca diluta, qua leniter os colluat, uehemens enim ipsius allabentis plaga, sanguinis eruptionē excitat. Quum aut hinc morsum percepat, aquā frigidam colluat, atque hæc uicissim fiant, donec sanguis sistatur. Sequentibus deinde diebus ex radicis dulcis & palmarum decocto gargarismus exhibeatur. Similiter & illitiones ad tonsillarum inflammationes descriptæ. Porro Galenus ait, ab excisione semper diphryge utor, donec cicatrix obducatur. Cicatricem enim tum huius mēbri, tum reliquorū omnium exulceratorū probè cōstringit ac cōmittit.

De oris inflammationibus.

Cap. XLIII

Quum uniuersum corpus multitudine humorum redundat, aut unius tantū alicuius noxi humoris multitudo in corpore augescit, conuenienter utimur incisione uenæ, aut purgatione, aut clysteri, & abstinentia ciborū. Quod si neutrum horū adfuerit ad localium auxiliorum opem statim confugimus: in principio quidē reprimendo per ea quæ adstringūt & frigefaciūt: Ex adstringentiū

sylua

sylva est atramentum futorium, & similia. Verum adeo fortibus, & quæ simul uim uenenosam complectuntur ac nociuam, minimè conuenit uti ad oris adfectiones sanandas, nisi magna cogente necessitate. Plurimum enim nocuum mentum infert, si quid ex his ad stomachum ac uentriculum fuerit delapsum, aut ad asperæ arteriæ extremum & pulmonem. Inest autem huiusmodi molemedijs & circa gustum insuauitas quædam, quæ quidem usus tempore molestiam infert, & permanet etiam totam diem. De sceminis quid attinet dicere: maximè opulentis, quæ ob delicias in totum pharmacorum ad os descriptorum adstrictum ægrè ferunt. Iam & uiros quosdam uideas, qui non ob delicias solè, sed ex natura fastidientem stomachum habent, atq; huiusmodi pharmaca non ferunt. Itaque ea quæ ex stomaticis appellatis pharmacis, hoc est, quæ ori cõueniunt, mitiora existunt, crocum complectuntur, & myrrham, & alumen. Ceterum confectio ex moris, & malis punicis, & similes quædã, cum solo melle dentur, habentq; gustum amplius suauem. Quin & confectio ex succo nucum cum solo melle apparata suauem exhibet saporem. At uero succus mororum pro debiliore habendus est pharmaco. Fortius uero, et quod nulli inferius existit, est succus corticis nucum. Inter hæc medium tenet, quod ad uim adstrictoriam attinet, succus mororum nascentium in rubo. His singulis admiscere potes, siquidem uehementius efficere uelis pharmacum, succum uuæ acerbæ, nondum maturæ, parè pondere; aut si id non uideatur, eius dimidium. Andromachus coniicit, croci, myrrhæ, succi uuæ acerbæ immaturæ, aluminis scilicet, singulorum drachmam unam.

Illitiones stomaticæ ori commodæ.

Cap. XLIII

Confectio ex moris.

Confectio ex moris sic adparatur, quemadmodum docet Eras: Succum mororum heminas v, uini austeri heminam i, mellis heminam i. Succum unà cum uino decoquito, donec ad strigmentitiam crassitudinem redigatur: deinde adiecto melle rursus decoque, donec probè cogatur: deinde in pila eis admiscere croci sesquidrachmam, myrrhæ sesquidrachmam, omphacii sicci sesquidrachmam. Optimum autem est omnibus oris illitionibus simul incoquere, radicis dulcis drach. vii, ad eiusmodi sanè mensuram, qualem præscripsi. Est enim radix dulcis natura mitis, & ob id asperitatem ex astringentibus illatam lenire potens. Facit, inquit Eras, hæc confectio tum ad tōsillas, tum ad inflammationes oris, illita, & gargarismi modo colluta. Poteris autem succum mororū cum solo melle adparatum, in usum recondere, ob dulcedinem ori commendandam.

Confectio ex malis punicis, Galeni. Accipe mala punica in uigore perfecta, matura, & recentia, ita ut ex triplici eorum differentia, dulcium, acidorum & austerorum, æquales partes unà cum corticibus in mortarium coniectas, cōtundas, & ab eis succum exprimas: deinde confectioem adpares hoc modo. Conijce succi heminas v, mellis heminam i, radicis dulcis drach. viii. Primum uero succum cum radice dulci decoquito, ac percolato, deinde adiecto melle si simul coagmentato, & utitor. Hæc confectio commodius exhibetur his qui oris inflammationem patiuntur, habentq; simul stomachum fractum & qui cibum auersatur. Vtilis est etiam bibita ad alui adfectiones. Expediit aut ei, ueluti reliquis oris remedijs adijcere. in principio quidem ea quæ adstringūt, circa uigorem, ea quæ concoquunt, iuxta inclinationem, ea quæ discutunt. Facit etiā ad oris ulcera, & quæ adpellantur Aphthæ. Confectio ex malis punicis, Asclepiadæ. Pharmacum ad os prosperè accommodatum, quod etiam ad ulceras ferpentia

pentia conducit: Succū mali punici Italicos sextarios VI, mellis librā I, croci drachmas IIII, myrrhæ dra, IIII, Succū per se satis diu decoquito: deinde adiecto melle rursus donec probe coagmetur, decoquito: postea in mortario crocū et myrrhā si mul cōmittito, atq; hoc, ut maximo remedio, utitor. Remedū oris ex musco, Andromachi: quo inq; ut pulcherrimo utor. Gallas numero XXX, ihois quo coria inficiunt choenicē I, musti optimi ex uua amingē alba sextarios V, gallas cōtusas unā cū rhoē per d:ē et noctē in musco macerato: deinde ad quartas decoquito, et per linteolū percolato: rursusq; succū donec mellis speciē accipiat, decoquito, & adiecta croci drach, I, aluminis scissi drach, I, myrrhæ drach, I, probē misceto & in usum recondito. Facit enim & ad aurium & sedis quoq; exulcerationes. Confectio ex succo uuæ acerbæ, ex serula medicamentario libro. Sorani.

Illitio ad os adparata ex succo uuæ acerbæ, incipientibus inflammationibus accommodata. Valet etiā ad humore prægnantes gingiuas, et ulcera pura tonsillarum. Succū uuæ acerbæ ad coagmentationē decocti sextariū I florum rosarum drach, XII, croci dra, IIII, mellis heminā I, adpara ut prædictū est. Eodem modo etiā adparatur confectio ex succo malorū cotoneorum, & pirorū, pirastirorūq; & mespilorum, ac mororū rubi, similiterq; ex aliorū pomorū succo, atq; item cor norū: nisi quod plus mellis inijcitur ad ea quæ magis adstringunt. Succus enim pirorū et reliquorum pomorū ac fructuū aliquando æqualē portionē mellis admittit. Eorū uero quæ plurimū adstringunt, ueluti est succus corni, aliquando duplum mellis suscipit. Confectio ex nucibus, Galeni. Fit etiā ex succo uiri dium nucū pharmacum ori commodū, hoc modo. Extrinsecum corticem nucis uiridem, quo tinctores utuntur, in pilam coniectū contunde, succūq; expressum per linteolū excola: eiusq; heminas V, mellis heminā I, & radicis dulcis dra, VII, hoc modo cōmitte. Succum unā cū radice dulci usquequo cogatur decoque, & percola: deinde adiecto melle simul decoque rursus, ac utere iuxta eam quæ describemus methodū. Est itaq; pharmacum ex nucibus omnīū efficacissimū. Verum stomacho utilissimum existit id quod ex malis punicis est confectum.

Summaria doctrina de usu omnium illitionum

ad os adparatarum.

Cap. XLIII

In principio inflammationū, omnibus oris remedijs utiliter quiddam ammiscetur ex his quæ restrictoriæ facultatis existunt ac repellūt. Quapropter commodum est solū succū cū melle adparare ac reponere: Sunt autē resstringētia parabilia quæ in principio miscere cōuenit: rosæ, flos earū, baccæ myrti, myrtus ipsa, lentiscus, rubus, omphaciū. Post hæc cytini & balaustia, mali punici cortices, galia, fructus spinæ ægyptiæ, omnia aluminis genera, rhus tū culinariū, tū quo coria inficiuntur: horū unumquodq; aqua decoquitur donec probe cogatur, atq; ita percolato decoctum illitionibus cōmiscetur. Optimus est etiā mali punici succus in principio ammistus. Frangēda autē sunt ipsa mala ac contūdenda in mortario unā cū corticibus suis. Deinde exprimēda ac percolanda decoquendaq; donec in totū cogantur, atq; sic in præsentēs illitiones ex eis ammiscendū est. Quod si sumptuosius adparare uelis pharmacū, nempe diuitibus utendum, adijcies corticem cassiæ, indicam nardū aut celticam, aut folium malabathri. Post principium autem ubi constiterit influxus, sufficit confectio ex moris, croco modico ac myrrhā adiecto, ad inflammationis concoctionem. Quum uero ad uigorem peruenerint inflammationes, parum utendum est illitionibus oris. Verum collutionibus & gargarismis mitioribus inflammationem concoquere oportet, ueluti est ea quæ ex fursutibus fit, & radice dulci. Aliquando etiā remedium oris

○

oris

oris ipsum decoctum ex caricis constans gargarissandum exhibere conuenit aqua multa permixtum, aut sapa calefacta, aut cum sola aqua calida, non praesente melle aut sapa. Optimū censetur circa inflammationū uigorem oleum lentiscinū con duplicato uasculo calefactū et ore retentum: uerū cauendum ne sit inueteratum. Vbi uero iam cōcocta fuerit inflammatio, & dolorū uehementia quieuerit: tum sane & discussoria ad oris remedia admiscemus, cuius generis sunt, hyssopū, pulegiū, thymus, calamintha, thymbra, mēta, in sapa, aut aqua multa decocta et percolata, ita ut ex decocto cuiuscūq; tandē istorū oris remediū permisceatur. Ex parabilibus discussorijs est decoctū caricarum ad mellis spissitudinē redactū. Nam singula praedicta efficaciora fiunt, si diutius coquantur. Fortius autē praedictis existit spuma nitri, & nitrū ipsum maxime Bernicarium uisum, atque nitro adhuc potētius est sulphur uiuū. Porro ad diuturnas & obduratas inflāmationes adhibenda sunt ea quae praeclearius discutere possunt: contusa uidelicet ac cribrata, de quorū numero haec sunt, Si diuites existant aëri, costus, & amomū, & quod appellatur macer, perquā calidū & adstringens: et succus sanē cyrenaicus ad dissolutionem obduratarū inflammationū aptissimus, aut aliquis eorū qui ei successerunt, uelut est laser. Pauperibus autē pro sumptuosius illis pharmacis adijcere conuenit dictamnū, aut acorū, aut meon, aut pyretrū, aut parū cardamomi, aut linapis. Sit autem pondus singulorum quae adijciuntur, iuxta eam quam in principio diximus apponderationem. Nimirum ut ad libras quinq; succi, una mellis adijciatur, & annexorum sint drachmae quatuor uel quinque.

De tonsillarum inflammationibus, ex libris Philumeni. Cap. XLV
Tonsillae frequentissime inflammationē incurrunt: calidi enim & humidī sunt earū loci. Verū hac adfectione magis arripiuntur hi qui plurimo sanguine abundant: & pueri, utpote mixturā habentes tenerā et multo cibo se explētes: et infantes adhuc lactētes ex haustu lactis id malū cōtrahentes. Inferitur autē hac adfectio plerūq; a nimia meri potione, & a multa ac auidiore deuoratione ciborū, maxime acritū et asperorū: acciditq; ita adfectis difficultas trāsglutiedī, et dolor aliquando etiā febris. Incipiēte itaq; inflāmatione, cibum subtrahere oportet, et aequē potum exhibere, praesertim febre simul irruēte. Exhibēdi etiā gargarismi adstringētes & repellentes, uelut est lēticulē decoctū, cum rosis, myxis, et palmis: reliqua quae in principio inflāmati gurgulionis adsumuntur. Cauendū autē ne mel in principio ad gargarismos cōijciamus, ne per acrimoniā malū irriteremus. Verum quā uehementius adfectio ipsa inualescit, et periculū suffocatiōis suspēctū est, uena cubiti incidenda est, repetita sanguinis detractione: maxime si iuuenis sit aeger, & multo sanguine abundet. cibi autē offerendi sunt sorbiles et uentri cōmodi: quod si uenter nō probē egerat, iniiciendus est clyster: infantū uero uentres glāde immisissā, et sedis illitionibus irritare oportet. Post euacuationē gargarissent decoctionē fursurū calidā, aut pissanā succū, in quo decoctę sunt uuae passae, aut sapa tepida, aut decoctū radiceis dulcis, aut passum cū decocto sicuū et hyssopī. Hęc oīa tepida exhibēda sunt: frigus enim nō tolerāt inflāmata, sicut neq; plurimū leniter. multū autē proderit oleum amygdalinū auribus infusum. Extrinsecus leniter fouere cōuenit spongijs expressis, et cataplasmata quoq; imponenda sunt ex farina ordei aut semine lini, aut foeni græci, aut his simul mixtis. Remittente autem iam inflāmatione & decrescente, mel in gargarismos admiscere conuenit: quod in principio & in augmento minime facere oportebat: quo tempore etiam calidiores gargarismi profunt. Extrinsecus autem lana mollis oleo tincta collo circumponenda. Quod si ex usu acriorū collutionum aut illitionum inflāmatio exasperetur, & mordacitas inde accidat, leniores gargarismi colluendi sunt, quae

quales sunt, succus pitisanæ, aut halicæ, et micarū siliginearum cremores, qui tepidissimi offerantur: lac etiā tepidum gargarissandū. Remittente autē inflammatione & dolore, prædicta oris remedia sunt illinenda, immisso digito medio, ita ut cum leni adhibita illitione partes tonsillarum, quæ intumuerūt, comprimantur, quo contentam in se materiam excludant. Verūtamen non uiolenter comprimere oportet, quemadmodum quidam faciunt, qui autores ob id fiunt, quo inflammatione amplius augeatur. Si tamen obtigerit aliquis ab eiusmodi curatione lesus, contenti erimus exhibitione gargarismatum lenientium, nihil illinentes. Permanēte uero ac immorante diutius inflammatione, atq; ubi tonsillæ ipsæ sub rubri coloris fuerint, neq; melius à prædictorum remediorum admotione habuerint, permutationē in pus expectare oportet: cito enim tonsillæ abscedūt. Abscessus autē factus, inflammationis signa augescūt, et exacerbationes ad uesperā fiunt fortiores, cum horrore & inæqualitate: aliquando etiā cum febre. Quare ubi suppurationē futurā speramus, coadiuuare oportet ut quā citissimē fiat. Sint autē gargarismi eis exhibendi calidiores, uelut aqua mulsa calida, & decoctū caricarū ac hyssopi. Verū ad molliendos et maturandos tonsillarū abscessus, maximopere auxiliatur unguentum quod appellatur ægyptiacū, quod ex resina terebinthina, & melle et oleo dulcissimo adparatur: & extrinsecus cataplasma impositū ex ordeacea farina & foeno græco cum decocto caricarū & altheæ ac melle. Quū autē pus perfectū fuerit, dolores minuunt, et inflammationis tumor mollior redditus digito cedit: tunc sanè acriores collutiones exhibendæ sunt, atq; prædictæ quoq; oris illitiones. In cibo accipiāt frustra panis aqua macerata quā maxima, et reliqua similiter quæ eis pro cibo offerūtur aceruatim ingerāt. Vehementiore enim ex his circa tonsillas obuolutione facta, cōsimili modo tumores adficiūtur, ueluti sectionem sustinerent. A ruptura autē aqua mulsa gargarissanda per se, postea etiā admixta lenticula & rosis, atq; his sanè immorandū est, donec penitus ad cicatricē perducatur. Neq; uetat sæpe adijcere quiddā ex prædictis oris remedijs. Quod si ruptura eis serius cōtingat, ob soliditatē uidelicet corpusculorū incumbentiū, inflammatione ipsa dolorē, diducere abscessum cōuenit ad proliciendā puris excretionem. Leonidæ. Itaq; si perfectæ ætatis sit æger, cum desidere facito, postea diducto ore linguā cum specillo lato, aut instrumento linguæ deprimentē apto, deprimito, ipsumq; abscessum cum scalpello aut acicula penetrante diducito. Si uero puer sit æger, caput eius intra genua eius qui manū admolitur cōtineatur. Deinde facta abscessus dissectione caput eius inclinetur ad humoris cōmodiorē exclusionē. Ab opere autē patrato aquā lactei teporis frequēter colluāt. Post multam autē intercapedinē ab opere patrato, & insequentibus deinde diebus aquam mulsam gargarissent: adhibeaturq; eis unguentū ad exulceratas tonsillas cōueniens: quale est quod ægyptiū croceum adpellatur, et quæ ei similia existūt. Est autem ægyptium hoc. Vnguentum ægyptium croceum. Croci dra. III. mellis sesquilibram, olei rosacei sextantem, succi foeni græci & seminis lini decocti quadrantem. Crocum in succo dissolue: deinde oleo adiecto, ea simul commisce, & mel prius despumatum conijce, & permixtis uterē.

Cap. XLVI

De crustosis & pestilentibus tonsillarum ulceribus. Crustosa & pestilentia tonsillarū ulcera ut plurimum nullo præcedente tonsillarum fluxu incipiunt, aliquando autē à consuetis fieri inflammationibus, maxime effertis perficiuntur. Fiunt autem frequentissime pueris, atq; etiam ætate iam perfectis, maxime his qui uitiolis humoribus abundant, in his quæ uere cōtingere solēt pestilentibus cōstitutionibus. In pueris uero oris ulcere, quod aphtham

tham uocant, præcedente omnino perficiuntur. Sunt aut partim alba, maculis similia, partim cinereo colore, aut similia crustis, quæ ferro inuruntur, accidit autem ægris liccitas in transglutiedo, & suffocatio coaceruatim incidit, maxime quæ rubor subeat mentum: aut ubi hæc acrimonia præterierit. Nome quæ depascitur, locos excipit, succeditque una putrefactio. Archigenis. Festinanter itaque auxilium adferre oportet, his qui sunt ætatis perfectæ, atque confidenter uenæ brachij incidere, siquidem nihil sit quod id fieri prohibeat. Multæ enim uirgines circa uigoris ætatem mensium purgationem appetentes, hac affectione apprehenduntur, quæ præcipuæ uenæ incisione opus habet. Incidende autem sunt in eis tali uenæ, et unica sanguinis detractione facta euacuandæ, non autem ad usque animi defectionem. Deinde glandulis et sedis illitionibus ac clysteribus utendum erit: itaque cucurbitulis iuxta lumbos, ac colligationibus extremitatum, atque omnibus modis conandum est ut diuersio ab affectu partibus fiat. Postea etiam gargarismis uti cõuenit: uelut est lenticulæ decoctum, & myxarum ac palmarum cum melle & prisanæ succo: deinde furfurum decoctum in decoquendo uiscosum factum, adiecto melle. Potest etiam medium oris ex moris, et maxime id quod ex malis punicis constat, colluendum exhiberi, hydromelite permixtum. Philumeni. Infarcitur autem hydromelitis & confusus et iris, ac aristolochia, et similia post principium. Probe autem facit id quod ad columnellas præscriptum est, siccum pharmacum ex rhoë, flore rosarum, crocoque & confecto. Foliorum etiam glaucij siccorum decoctum optime facit, quanquam gustus uehementer amari existat. Ego autem et glaucij succo, cuius ad collyria usus existit, in aqua mellis meraciore diluto, pro gargarismate utor, aut etiam cum iridis decocto. At uero fruticis ipsius sicci, glaucij inquæ, confusi & cribrati optimus usus existit si insuffletur. Conandum autem est in uniuersum ne digitum quidem locis admoueamus, aut leni saltu tactu manum admoliamur. Etenim inscij ad quos maxime in rebus dubijs homines confugiunt, uehementius illinunt, simulque inflammationem loci comprimunt, simulque crustam detrahunt: quod minime facere conuenit priusquam eleuatam, & uix innitentem crustam conspiciamus. Quod si enim adhærentem adhuc crustam auellere aggrediamur, ulcerationes magis in profundum procedunt, et inflammationes consequuntur, augenturque dolores, et in ulcera serpentina proficiunt. Itaque sicca quidem remedia insufflare cõuenit: liquida uero cum pinnula illinire, ita ut quantum licuerit quam penitissime pinnulam immittamus. Utendum est etiam compositione ex semine rutæ syluestris ad anginam descripta et ea quæ ex uistis hirsutidinibus constat, ita ut cum melle liquefactas illinamus, & cum hydromelite permixtas colluendas exhibeamus. Profuit etiam aliquibus aristolochia, et iris, & chalciditis adhibita cum melle. Aliquando etiam Andronis et Musæ pastilli. Mirabiliter autem crustas aufert caninum recrementum melle illitum, & ustarum hirundinum cinis, & centaureæ minoris uistæ cinis cum melle, & cochlearum terrestrium maxime nudatum uistarum cinis cum melle. His uero de quibus medici desperauerunt, fel crocodili exiccatum et tritum ad crustam insperge, aut illine cum melle. Oportet autem post irritationes à pharmacis eiusmodi factas, lenire cum radicis dulcis decocto, et qui ex uino scybelite, mastiche chia, myrrha & croco constat gargarismo, deinde cum amylo & tragacantho. Cohibito autem iam ulcere pascete, lac gargarisandum, samia terræ permixtum: et febrim quoque curam habere cõuenit: uehementes enim incidere solent atque in repurgandis explanandisque ulceribus maxime sollicitum esse: cõuulsionem enim infantes plurimi passi sunt in ulcerum repurgatione: aliqui uero uia transglutendi exiccati, sunt strangulati. Sunt etiam quibus corroditur gurguliones, atque ubi diutius persisterint ulcerationes, & in profundum proserpserint, cicatriscunt.

trice iam inducta, astrictiorem uocē edunt, reflectiturq̄ ipsi potus in ipsas nares, Nam & ego puellam noui quæ post quadragesimū tandem diem consumpta est, quā se iam à morbo recolligeret. Verū ad septimū usq̄ diem plurimī periclitantur. Vbi uero inflammationes & ulcera serpentina semper amplius extendantur, forinsecus fomentū adhibere oportet, & cataplasmatibus cōmunibus uti, cum cautione ne refrigeremus. Feliciter enim res procederet si intrinsecus dentam materiam extra queant transferre. Contegantur itaq̄ semper post cataplasmata, partes circa mentū, cum nardino & cyprino cerato, cū circumpositio nelanarū mollium. Vbi autē crustæ solutę fuerint, et ulcera ipsa mundata, antheris, hoc est, floridis remedijs utendū est. Sanant enim in totū ulcerationes ipsas, tum siccæ adhibita, tum illitæ cū melle. Sunt autē crustarū tum oris, tum tonsillarum, cōposita pharmaca huiuscemodi. Asclepiadæ illitio ad exulceratas inflammationes. Florū rosarū dra. vii. croci dra. iiii. balaustiorū dra. i. myrrhæ dra. i. nucū pinearū repurgatarū dra. iiii. Subactis melle ad illitionē utere. Asclepiadæ, ad oris putredines. Rhois culinarij dra. iiii. acacię dra. i. omphacię dra. i. mellullæ ceruinæ aut uitulinae dra. iiii. in uino dulci diluta, melle despumato excipe, & ad illitionem utere. Andromachi remediū oris odoratū ac tenerū, ad inflammationes ac crustas optimū. Nucum pinearum depuratarū drach. iiii. amyli dra. ii. aluminis scissilis dra. i. florū rosarum dra. i. croci dra. i. mellis quantum suffecerit. Aliud, ad omnes tum oris tum tonsillarū adfectiones. Rhois culinarij dra. iiii. florum rosarū dra. i. croci dra. i. costi dra. i. illine cū melle, aut cum aqua mellis gargariandū exhibe. Critonis ad crustas. Misy assatum aut crudum illine cum melle: statim enim eas tollit. Sint autē misyos dra. iiii. et libra una mellis, quo modo etiam uti poteris chalcitide. Archigenes autē inquit: Ad crustas optime conuenit sterco caninū cum melle: quod tum optimū erit, quū ossibus canes fuerint nutriti. Magnopere enim auxiliatur, neq̄ odium sui inducit in cibo oblatum. Licebit etiā uti plurimis eorum quæ ad anginam descripta sunt auxiliorum. Aliud Archigenis, ad crustas in ore. Hirundinū ustarum et stercois humani equalē pondus cum melle illine. Accipiendum est sterco nō quodcūq̄ obtigerit, uerum puerum biduo prænūtrire oportet pane & lupinis, ac uino modico, atq̄ deinde tertia die sterco eius accipere & exiccare, atq̄ repositum seruare. Vbi uero expetente contrito uti. Efficax enim & ad anginas existit. Experti etiā sumus, inquit Galenus, pharmaca à Sorano descripta præclare facere, quę sanē ille iuxta dictionū seriem descripsit. Remediū ad crustas oris, cōferens et ad gingiuas humore prægnantes et graueolentes. Misyos usti dra. vii. iridis illyricæ dra. iiii. croci dra. i. in puluerē redige, ac pyxide lignea reponere. Vtere autē per se uel cum melle. Florida cōpositio, ad prædicta similiter efficax. Iridis illyricæ dra. iiii. sandarachæ dra. iiii. cyperi drach. iiii. aluminis scissi dra. ii. myrrhæ dra. ii. crocomagmatis dra. ii. in puluerem redige ac utere. Quidam etiam flores rosarum, et gallas adiiciunt, singulorum dra. ii. Vtere autem ad putrefacta, et ad abscessus gingiuarum sicco: ad crustas uero cum melle. Philagrii, ad oris erosiones. Seminis lentisci nondum denigrati drac. iiii. gallarum dra. iiii. costi dra. i. folij dra. i. utere. Theodori, ad tonsillarum ulcerum, gingiuarūq̄ et pudendorū, ad putrefacta & carbunculos. Aluminis scissilis, sandarachæ, myrrhæ troglodyticæ, singulorum æquale pondus accipe, ac utere sicco. Hermi, ad omnes oris adfectiones, ab ulcere quod aphtha adpellatur usq̄ ad crustas & carcinomata. Ericę semen tritum, succo hyoscyami excipe, & utere cum melle. Aliud, ad ulcera quæ serpunt in ore, gingiuis, ac lingua.

gua. Misy cum succo foliorū uitis albæ, quā bryoniam adpellant, dilue, & coniecto simul melle tere, ac ad illitionē utere. diuinitus extergit ac repurgat. Vbi uero repurgata fuerint et carne expleta, bryoniæ radicem cōtusam et in puluerem redactā adhibe. Ea enī ad cicatricē perducit. Aliud eiusdē, ad oris putrefactiones, ulcerationes, & ulcera quæ serpūt. Foliorum uitis albæ quadrantem, aluminis scissilis trientē, misyos crudi dra. iiii. atramenti futoriij dra. ii. contere quousq; arida fiant, et in puluerem redactis utere siccis. Repurgat, explet, reprimat illatū fluxum. Ego uero præcedens expertus sum. Collutione autē utendum est ad oīa oris ulcera, & ea quæ serpūt putrefactionesq; et gingiuas denigratas. Verbenacæ rectæ decoctio ex uino, quod calidū ore retinendum exhibe. Aliud diuinum remediū. Oleæ uiridis folia aqua decocta colluenda exhibe.

De angina, & eius speciebus, ex Galeno.

Cap. XLVII

Anginæ quatuor differentiæ existūt. Vna, quū fauces fuerint inflāmatæ: fauces autē pharinga Græcis adpellatā, uoco intra os locū, ubi tū stomachi, tū aspergæ arteriæ extrema cōueniūt. Altera, quū neq; circa oris regionē, neq; iuxta fauces, imō nec forinsecus, quā adparet inflāmatū: & tamē suffocationis sensus infestat agrū iuxta asperæ arteriæ extremū. Tertia, quū exterior gutturi regio una cum interna fuerit inflāmata iuxta mentum. Ad hæc autem et circa ceruicē quædam adfectio oboriri solet, ex luxatione & diceflu cuiusdā in collo uerticuli in anteriore regionem: unde cauus adparet locus, et quū extra attingitur, dolore adficitur: quod cōtingit ob distracta intrō uerticula, & consistentē circa musculos fauciū aut extremitatis arteriæ inflātionē. Hæc autē species propriè cynanche à ueteribus est adpellata. Lingua enim à luxato uerticulo, iuxta radicē suam impulsā, ex proprijs locis excedit, et difficultas magis circa respirationē infestat, unde coguntur aperto ore semper hiare, atq; aërem adtrahere. Omnes autē prædictæ adfectiones cōmunem habent difficultatē transglutiendī: ita tamen ut in alia plus, in alia minus hoc malū augeat. Accidit etiā eis potū adsumptum ad nares reflecti. Atq; hæc sanē sunt adfectiones: curatio autē earum in paucis uariat.

Aretæus autē inquit, Anginæ causæ multæ existunt, maxime autē frigiditas magis quā ardor, & plagæ, & ossa ex piscibus ad tonsillas impacta, & potus frigide, ebrietas, nimia satietas, & quæ spiratione attrahuntur mala. Archigenes autē ait: Occultæ anginæ causam esse in quibusdā, nervos qui ad stomachū deferuntur, dum male adficiuntur, & post inferioribus mēbris pulmōni in quā & cordi respirandi principiū inflammant. Arterijs uero quæ carotides adpellantur, itemq; alijs adiacentibus inde inflātionem transmittunt. At uero quod hi qui sic adficiuntur nō fiant attoniti, inde est quod huius adfectionis causa in temperies sola existit, nō etiā coartatio locorū. Conueniūt igitur, inquit Archigenes, eis ea quæ uomitoriā uim obtinent, uelut est elateriū, & squama aris mliata cum melle. Ego autē, inquit, ab occulta angina præhensos ex sinapis gargarismo releuo, moxq; in balneū induco, atq; ita multos à periculo liberaui, quibus adfecta particula, obliuioni tradita fuit, per distributionem uidelicet in uniuersum corpus sanatos. Aretæus autē inquit: Cucurbita accipiat, primumq; infra umbilicum adhibeatur, mox ad latera deorsumq; & scapulas, ita ut assidue à loco uno ad alterū transferatur, & in admotione ex supernis locis deorsum trahatur. Quod si uehementer urgeat suffocatio, sinapi aqua tritū et uili pāniculo exceptum pectori impone. Ad delingendū uero conueniūt eis: sinapi, nitri, hyssopum, scilla assa, sulphur uiuū, omnia paribus portionibus cū mellis cochleario permixta delingēda exhibe. Archigenes. In principio igitur cōpendiarium & præ-

& præceptum auxilium omnis angina requirit, quandoquidē aut ferē iuuenibus accidit, euestigio cubiti uenā eis incidere oportet, nisi quiddā maioris periculi impediatur: auferre aut sanguinē parce, non usquequo animi defectio sequatur: citius enim hi animo linquuntur, et aliās sanē ex refrigerationib. et animi defectio ne per facile materia a faucibus ad pulmonē defertur, & inuitabile periculū infert. Curandū etiā ut modica fiat diductio uenæ. Nā quū in alijs, tum in magnis uenæ diductionibus acruatim animi defectus irruit: neq; tamē angustior rem facere uenæ incisionem conuenit, ne sanguis uelut percoletur, & crassior eius pars intus remaneat, quæ causā huius adfectionis existit. Vtilis est autem eis repetita detractio in sequenti die, nisi præpediat ægri timor, aut animi deliquium. Quod si quid uenæ incisionem fieri prohibeat, per clysterem infundendum est centaureæ, ablinthij, calaminthæ, & aristolochiæ decoctum, admixto melle et plurimo nitro: postea etiā purgatiua danda, quæ magis pituitam ducūt: conuenientissimum autem aliquando in angina esse uidetur, elaterium; uerum non oportet nisi cum sero lactis & cnico in sero cocto ipsum propinare. Conuenirent etiā eis ex aloë & colocynthide catapotia, si modo queant ea deglutire. Si uero cōfidentior contingat medicus, bonum est et hieræ Archigenis ex colocynthide drac. tres, cum aliqua ex prædictis decoctione per clysterem infundere, ubi prius aliquo stercorū eductiuo euacuauerit. Post uniuersales aut euacuationes, cucurbitas, adponere oportet, et siquidem tumor circa maxillas, aut sub mento persistat, in ipsum tumorē, & cum scarificatione plurimum sanguinem extrahere, saleq; respergere fissuras, et cōfricare, quod si nullus extrinsecus tumor adpareat, ueluti fieri solet in ea quæ occulta adpellat cynanche, retro sub colli neruo insigēda erit cucurbita iuxta primū uerticillū, et cōstanti adtractione utendū, & frequentius cucurbita auellenda. Ea enim instantia factis uertebratū discessibus, ac luxationibus probe se opponit. Deinde ubi paulisper à reliquorum remediis adhibitione quiesueris, cataplasmatibus utendum, tum eadem die, tum etiā in sequenti. Maiorem uero spem in sequentibus diebus in illitionibus & gargarismis reponere conuenit. Itaq; ubi initium sit cum multa inflammatione, ea quæ leniter adstringunt offerenda sunt primū: uelut est rosarum, lentium, palmarumq; decoctum, flos rosarum ex hydromelite, rhus cum hydromelite decoctus, & decoctum myxarum. Quod si excoctio contingat corpusculorum, panis cremor exhibendus est calidus, aut fursurum decoctum colluant, aut etiā lac solum. Ego autem, inquit Archigenes, siccum pharmacum in promptu habeo. Ex rhois culinarij drachmas viii, florum rosarum drachmas iiii, costi autem & croci, cuiusq; drachmas ii. Ex quo sanē in aquam mulsam inspergo, & in gargarismate utor, atq; inflammationes et ulcerationes tonsillarum facillime sano, etiamsi contingant quibus illæ ad summum progressum minentur. Quin & illitiones mansuetiores inflammatis cōmodæ sunt, uelut est ea quæ ex moris costat, & rhois culinarij cremor in hydromelitis coctus donec cogatur. Oportet autem præmacerare sufficienter rhoem ipsum, donec abunde aqua mulsa ex eo colorem accipiat, & in sapore uim eius repræsentet. Probe etiā facit mali punici integri unā cum corticibus fracti ac conculsi succus melle permixtus: ita ut ad succi partes tres una mellis coniiciatur, & donec cogatur decoquatur, ac illinatur. Quod si ad nullum dictorum remedium lingua incidendæ sunt, aut quæ sunt in fronte, aut etiā circa magnos angulos oculorū: forinsecus aut assidue lanæ circum collum ponantur oleo calido made-

factæ, aut ceratū ex oleo cyprino adparatum adhibeatur, aut si malis ex gleucæ no siue musteo. Quod si diutius moram traxerit, abscessum expectare oportet, & tum sanè conuenientius erit sicuum dococtū ad colluendū: multoq; magis si hyssopum ei coniiciatur. Neq; uero incōmodus fuerit in his qui aliquo modo sunt exulcerati, crocus cū aqua mulsa, & decoctū radicis dulcis. In vigore autē omniū utilissimus existit succus ptisanæ aut halicæ ore collutus: nam et à multis minis liberat, & abscessus metū eximit cōfestim. Qui si nō adsit, furfures probe cocti ei succedere possunt Atq; hæc quidē his cōueniūt. At in angina siue inflammatione ac ulcere, ubi sola multitudine ægri obturati periclitātur, in his quæ acriora sunt periculū est faciendū. Sunt enim tunc etiā in principio cōuenientiora, post uniuersales tamen euacuationes: itaq; hydromeli meracius profuerit, si cū eo hyssopū aut origanū decoquat. Si uero in superiorib; partib; aut iuxta fauces malū persistet, sinapi tritū cū aqua mulsa et percolatū gargarissandū exhibimus. Cōuenit etiā cassiæ decoctū, & iridis, & radicis panacis, gentianæ, centaureæ, aristolochiæ, agarici, & radicis cucumeris agrestis: unūquodq; aut cum hydromelite satis diu decoquatur, donec succulentū reddatur. Vsum sum etiā in occulta angina ex sinapi gargarismo, & sæpe à periculo ægros liberaui. Illitio aut his ualde conueniens, his inquā, qui citra exulcerationē anginā patiuntur, est ea quæ ex semine rutæ syluestris adparatur: & quæ ex uitis hirtudinibus constat: quarū adparatū paulo post unā cū alijs remedijs describā. Iuuantur etiā fortu uaporis intra os accepto, hoc modo. Origanū, hyssopum, satureiā, fœniculi semen, cū aceto plurimo et nitro feruefacito, in olla diligenter operta, operculo foramen habēte in medio, deinde arūdinē ori ægri et foramini adaptata, sinas foueri. Si uero ex feruore arūdinis os aduratur, ouū uacuum parū utrinq; perforatum ore cōtineant, et per ipsum arundo immittat. Mollius aut fomentum fuerit, si pro aceto poscā affuderis, aut aquā. Cæterū magis lancinantiā offerre illis oportet, quō rursus insurgat caro, & transmutare queat eam quam in profundo pertullit coarctationē. In dubiū enim sæpe uenit et ferē desperationē præferente morbus, ut et odiosa exhibere quibusdā necessarium fuerit: siquidē humano stercore quosdā usos esse cōstat pro illitione, et magnū sanè commodū reperunt. Alij aut recentī usi sunt, alijs uero exiccato et trito, ita ut cū nardo uel myrrha id permiscentes fœtorem cclarēt. Ab acrioribus aut et his quæ dilaniantem uim obtinent, ad mediocriā est trāseundū: uelut est Andronis pastillus, et similia. Utilia etiā his sunt, ea quæ uomitoriā uim obtinēt, maxime illis quibus grauitatis sensus circa uentrē hæret. Archigenis remediū, quo utor, inquit, ad occultas anginas: mirabiliter etiā cōducit anhelosis. Elaterij oboli dimidiū, spume nitri obolos tres, sinapis dra. i. contere cum aqua et informa. Mouet aut uomitū elateriū cum oleo aut melle tritū et penitissime illitū. Multo aut efficacius id prestat, si squama eris ei cōmisceatur, aut ipsum æs ustū, oleo cyprino tritū & illitū. Probe etiā facit fel tauri illitū, et nitrū cū aceto mulso potatū, et cetauræ succus cū melle, et aselli sub aquario stabulantes uase cū melle delincti. Quidā nasciturū semen tritū bibendū exhibuerūt quātū cochleari accipi potest cum aqua multa. Nec ita lōge post pituitā uomuerūt illi crassissimā & tenacē, statimq; a plurimis molestijs sunt liberati. Aliud, Stercoris gallinacēi albi, et colore cerusam referentis, bonā copiam exiccata & reposita adserua. Vbi uero usus postulat, quantum cochleari accipi potest, in aqua, aut aqua mulsa dilutū propina. Etenim desperatos etiā sanat: quod si bibere nequeant, tritū cum melle quā penitissime illini.

Aliud, ad idem. Cetauræ dra. vii. nitri dra. vii. salis cōmunis dra. vii. contere

tere & repone siccū. Vſu uero exigente melle imbue, & cum pinnula illine, aut quomodo uidebitur utere confidenter. Nam periculū eius factum est. Aliud. Ablinthiū contuſum & cribratū, adiecto nitro trito, illine cum melle. Aliud. Elaterium cum felle taurino & melle contritum illine. Compoſitio ex ſemine rutæ ſylueſtris ori cōmoda, Andromachi. Ad anginas & desperatos, inquit, hæc uitor, Summe etiā prodeſt ſtomachicis, & ad tormina inteſtinorum, fabæ magnitudine exhibita ex frigida: Seminis aniſi, ſeminis apij, floris iunci odorati, ammiſ, aluminis ſciſſi, iridis illyricæ, ſeminis rutæ ſylueſtris, quod quidā harmala, alij beaſa adpellant, cinamomi, myrrhæ troglodyticæ, ariſtolochiæ longe, ſingulorum unciam unā, caſſiæ, crocomagmatis, roſarū ſiccarū, cuiuſq; unc. i. coſti quadrante, cineris hirundinū recens uſtarū quadrantē, croci ſelquiunciā, ſpicæ nardi dra. iiii, amomi dra. iiii, gallas omphacitidas numero octo, cōtere et melle excipe ac utere. In principio quidē pharmacū hoc cū decoctione aliqua mediocriter adſtringēte, quales ſæpe diximus, dilue. Iuxta uigorē uero cū ptiſanæ ſucco. Iuxta remiſſionē aut et declinationē melle, aut hydromelite, aut uino mulſo. In ueterata aut & uelut indurata inſtāmatione, aceto mulſo. Philagrius aut ingit, Aliquando poſt prædictas uniuerſi corporis euacuationes, et adhibitiones curbitularum, et incisionē uenarū ſub lingua, miſcemus etiā alia quædā ad præſcriptū pharmacū, quæ partim quidē irruentē fluxū reſtringunt, partim aut omnia quæ iam inſidēt diſcutiūt. Cōijciūtur aut ex rutæ cōpoſitione dra. v. gallæ omphacitidis dra. viii, et ſtercoris canini albi, ac humani ſtercoris ſicci, cuiuſq; dra. viii. Verū quemadmodū et antē dictū eſt, ſtercus canū accipere oportet eorū, qui antea per biduū oſſibus ſunt nutriti: humanū uero ex puero biduō pane & lupinis nutrito. Vomitoriū Marciani, quod et ad opertas et manifeſtas anginas prodeſt: præexige, inquit, mercedē. Aeris uſti dra. xii, atramentū ſutorij dra. xii, myrrhæ dra. i, elaterij dra. i, ſpumæ nitri dra. i, fellis taurini dra. iiii, excipe melle & cū pinnula quā penitiſſime illine. Archigenes aut ingit: Stercus humanū quale prædiximus accipe et exicca, ac in uili panniculo ligatū exure, atq; cū aqua mulſa dilutū propina. Eſt enim remediū eorū, qui iam ſuffocantur. Antonius uero Muſa inquit: Stercus caninū quale prædiximus accipe et exicca, cōtuſoq; et cribrato utere ad anginas cū melle, quā penitiſſime illine, ut trāſglutire poſſint. Eo em̄ nullum potentius pharmacum noui, inquit Galenus, neq; ex angina laborantibus, neq; ad magnas tonſillarū inſtāmationes, neq; ad glandularū tuberculorūq; gutturis ſuffocationes iā periculum minantes, probē facit etiā cum aceto mulſo & pice liquida illitum caninū ſtercus. Summe etiā auxiliatur ad anginas, cōfectio ex uſtis hirūdīnibus, cuius cōpoſitio hæc eſt. Cōpoſitio ex hirūdīnibus uſtis. Cineris hirundinū ſylueſtriū uſtarū dra. viii, croci dra. ii, ſpicæ nardi dra. i, excipe melle, et permisce hoc modo ubi iā incubuerint adfectiōes. Oportet aut exurere hirūdīnes hoc modo: Pullos hirundinum uiuos nō deplumes, addito congruentis modi ſale in fictile uas cōjicimus, idq; obturatū ſuper prunas ponimus, donec puluis et cinis fiat, quo cōtrito utimur. Aliud, ex hirūdīnibus, itidē ualens ad anginas. Hirundinū uſtarū numero undecim, ſucci myrti uiridis cyathos duodecim, myrrhæ obolos. iiii, mellis cyathos. ii, hirundinū pullos exure et cōtere, deinde omnibus ſimul mixtis utere. Aliud cuius experimentum conſtat. Folij, coſti, careophylli, piperis, cuiuſq; unc. i, ſandarachæ trientem, excipe melle deſpumato, & illine. Aliud. Cochleas nudas citra teſtā in hortis repertas in ollula exure ac cōtere, cinereq; melle excepto utere. Eſt enim eiufmodi remediū, quod præſentē opem, affert.

affert. Simili modo etiā cancro cum ustorū cinere utendū est cum melle; & deco-
ctum quoq; cancro cū ore collutū utile existit. Ego autē cancrum in aque hemina
tritū percolo, ipsamq; aquā calefactam gargarislandā exhibeo: crassa enim edu-
cit multa, & releuatur cōfestim aeger. Aliud, Centaurēā minorem siccā exu-
re, cineremq; illine cū melle. Aliud, Maxillā porcelli ustā uncia i, stercoreis ca-
nini albi drach. iiii, malicorij unc. i, gallarū unciam unā, costi dra. iiii, pipēris
torrefacti scrupulos sex, misce cum melle, ac utere. Valde autē magna sollicitudo
ne ac cōtentione opus est etiā tum quū malum remittere uidetur: & enim ea que
iam ex profundo corporum circa fauces adtracta sunt, ex improviso in pulmo-
nem transferuntur, si negligantur, atq; ita repentina mors aegro infertur.

De glandulis.

Cap. XLVII.

Omnibus hominibus carunculae quaedā exigue naturales iuxta utraq; ton-
sillas extant, antiades Græcis, Latinis glandulae appellatae, quae quū naturale mo-
dum seruant, nihil molesti inferunt. Verū ubi iuxta affectionis proprietatem au-
gescant, et modi maioris quā secundū naturam suā fiant, tunc sanē & trāsglun-
tionis & spirationis difficilis causā existunt. Consistūt autē ferē in totū citra inflā-
mationem, & paulatim etiam augescunt, Aliquando autem & inflammatio-
nem patiuntur. Diducto itaq; ore manifeste adparent glandularum tumores ma-
iores, citra quidē inflammationem tonsillarum corpusculis concolores. In-
flammatæ uero rubicundæ & inferentes dolorem. Quare quum inflammatio
affuerit, gargarismis & illitionibus ad tonsillas inflammatas descriptis est uten-
dum. Quū uero citra inflammationem consistunt, conari oportet ut per com-
moda pharmaca paulatim deprimantur, & per admoti digiti compressionem.
Remedia autem ad glandulas absq; inflammatione auctas, talia cōueniunt. Gal-
læ omphacitidis, salis ammoniaci, aluminis scissi, cuiusq; uncia i, adhibe siccum.

Aliud, Myrrhæ sextantem, gallarū drach. v, misyos drach. ii, salis torrefacti
drach. ii, utere sicco. Aliud, Gallarū, misyos, myrrhæ, aluminis liquidi, equa-
les partes accipe, & siccis utere, uel cum melle. Aliud, Asclepiadæ. Remedia
um ad glandulas accommodatum: gallarum omphacinarū dra. iiii, diphrygis
dra. i, myrrhæ drach. iiii, croci dra. iiii, mellis quantū suffecerit. Hoc pharmacum
citra ulcerationē glandulas reprimat. Aliud, Apolloniadæ. Diphrygis dra. ii,
chalcitidis assatæ drach. ii, gallarū dra. i, croci dra. i, myrrhæ drach. i, excipe melle
& utere. Chirurgia. Verū si pharmaca uincantur, excindere glandulas oportet.
Quod ut commodius fiat, aeger in claro & splendido loco collocetur, et didu-
cto ore unaqueq; glādula uncino producat et excindatur: excinditur autē ex ea
id qd supereminet, iuxta mediū eius, quod præter naturam excreuit, qui em̄ dum
omnē que præter naturā accreuit carnē excindūt, etiā naturalē carnē ex fundo au-
ferunt, periculose sanguinis eruptionis autores fiūt. Post excisionē autē posca frigida
colluēda detur, ad sanguinis uidelicet inhibitionē, et post eā frigidissima aqua.
Postquā autē sanguinis eruptio cōstiterit, satis longa intercapedine tēporis facta
aqua mulsa tepida exhibeatur. Sequētibus uero diebus etiā cum ea illitiones ad-
ferantur, quales sunt ad ulceratas tonsillas descriptæ. Raro autem quando uideli-
cet ulcera eminentiora adparent, florido sicco ipsas tonsillas attingimus. Per hoc
enim eminentiæ deprimuntur, & cicatricis inductio perficitur.

De suffocatorum reuocatione.

Cap. XLIX.

Reuocātur aliquādo suffocati ac strangulati, aceto ori infuso cū pipere, & se-
mine urticæ, uerū difficulter tractari possunt ut admittāt: cogere itaq; oportet ac
ori infundere, ad uomitionēq; irritare, Rubore autē circa collū dissoluto, statim re-
spiciunt

spiciunt ac relaxantur: quare oleo multo calido & lana, aut cerato, collum affi-
due circū circa est amplectendum. Similiter etiā naufragos reuocare oportet,
siquidē respiratio adhuc in eis seruetur. prius autē in caput ipsos suspendere con-
uenit, ac cogere quo absorptā aquam euomāt, siue pinnularū, seu digitorū irrita-
tione: forinsecus uero manuum impositione iuuare oportet uentris firmitatem.

De deuoratis ac fixis in tonsillas spinis, atq; his quæ in
asperam arteriam delabuntur.

Cap. L

Si in asperæ arteriæ extremum, atq; ipsam adeo asperam arteriam, aliquid
eorum quæ deglutiuntur præterlapsum fuerit, tussis prouocanda est, per aceto-
sam aliquā qualitatem: & sternutatoriū quoq; naribus admouendū. Ex uehemē-
ti enim agitatione, & instantia, & spiritu simul cum uiolentiā quadā expulsionē
adiuuante, eiusmodi consueuerunt excerni. Si uero iuxta tonsillas, aut iuxta prin-
cipium stomachi seu gulæ spinæ aut ossa fuerint infixæ, ita ut oculis subiaceant,
atq; plurima sui parte extra tonsillas promineant, uolsella apprehensa extrahere
oportet. Quā uero in inferioribus gulæ locis quid adhæserit, hoc modo educa-
tur: Spongiam paruā resina terebinthina madefactam, aut carunculam crudam
recentem incisam, unā cū filo ualido ipsi alligato, deglutire coge, & mox coma-
prehensam per alligatum filum rursus extrahe, hoc enim modo sæpe etiā id
quod infixum fuit, simul extrahi consueuit. Conuenit etiā panis recentis inte-
rioris buccellas deglutendas exhibere citra commanducationem: aut caricam
aliquantisper circummanducatam, non tamen penitus dissolutam. Quum au-
tem ad fundum usq; ipsorum corporum penetrarit, neq; extrahi potuerit, aqua
mulla gargarissanda exhibeatur, & cibi forbiles, uelut præsana cum melle, aut ha-
lica similiter: aut micæ aqua mulla calida macerate offerantur, forinsecus uero
ceruicæ atq; uniuerso collo lanam oleo calido imbutam imponere oportet: simi-
literq; cataplamate calido laxante ac deprimente collum contegere cōuenit: ues-
tut est id quod ex semine lini cum aqua mulla adparatur. Hoc enim ductu tum
locus ipse suppuratur, tum spina commota, simul cum his quæ deglutiuntur, de-
ducitur. Aliud. Ad educationem eorum quæ in tonsillas deuorata sunt, sta-
tim te ad ægrum desidentem conuerte, ipsumq; tibi attendere iube: ac dic, Egre-
dere os, si tamen os, aut festuca, aut quicquid tandem existis: Quemadmodum
Iesus Christus ex sepulchro Lazarum eduxit, & quemadmodum Ionam ex cea-
to. Atq; adprehensio ægri gutture dic: Blasius martyr & seruus Christi dicit, Aut
ascende aut descende.

De arteriarum pharmacis.

Cap. LI

Asperæ arteriæ extremum & subiacentem ipsi asperam arteriam, cum suis
proprijs musculis, pellicula quædam fortiter complectitur & ambit. Quādo igitur
tur adfectio aliqua, siue iuxta eam ipsam pelliculā, aut circa extremi ipsius arte-
riæ musculos contingit: remedia quæ uim medendi eam obtinent arteriæ cōmu-
niter adpellantur. Afficitur autē pellicula hæc aut ob nimiam humectationē, aut aspe-
ritatē, aut ulcerationē. Vocis enim nocumenta, uidelicet eius interceptio, hoc est
nō posse loqui, & raucitas in loquendo, ad plures causas cōsequuntur: aliquādo
quidē propter diuturnos ex capite defluxus, aliquādo uero propter suppuratio-
nem thoracis & tabem. Ex uociferatione etiā magna & plurima raucedo uocis
oboritur, & ob frigidi & insueti flatus inspirationē, & ob plurimā ac insuetā po-
tionem uini meraciore. Verū hæc affectiones magnitudine inuicem distant. Ete-
nim uehementius humectis uocis instrumentis, uocis interceptio contingit: me-
diocrius autem rigatis, uox raucosa perficitur. Itaq; qui ex uehementi clamore,
amplius uoce uexantur, consimile quiddam patiuntur his, qui reliquis corporis
par-

particulis fatigatis & ex labore afflictis afficiuntur. Nam & pellicula quæ arteriæ extremum atque ipsam asperam arteriam ambit, per magnas uociferationes extrâ prolato spiritu perculsa, inflāmat. Et iuxta arteriæ extremū, ultra hanc plagam, musculorū ipsum mouentiū actio offensa, maiorem adfectionē operatur. Musculi enim illi uocē operantes, ob magnas uociferationes, nō solum ab erumpente spiritu perculsi læduntur: uerum etiam superextensi uehementer, maxime sustinent lassitudinem. Curatio autem horum cōcīdit cum his, qui alias particulas corporis habent fatigatas. Balneum enim dulcium & bene temperatum aquarum magnopere iuuat omnes phonscos Græcis appellatos, qui uocis exercitio magno utuntur: citharædos in quā, & præcones, & tragædos, qui contendendo oblæserint uocem. Quemadmodum autem oleum forinsecus illiū omne corpus à fatigatione refocillat: sic & cibi mordacitate carentes & depressi ac laxantes, tum affectam arteriæ pelliculam, tum ipsos musculos, & pharmaca arteriaca uim obstruendi meatus habentia, iuuāt. Quum igitur afflictiones ac lassitudines uelut distendētes circa extremi ipsius arteriæ musculos, & ipsam pelliculam generantur: in principio quidem lenissima edulia conueniunt: pharmaca uero obstruētoriam meatuum uim habentia. Sedata autē inflammatione alia quod ex modice repurgātibz est adhibendum: deinde rursum aliud, sed priore præstantius, ut paulatim ad medium repurgantium perueniatur: deinde ab hoc adhuc fortius discussorium adhibeatur, ut hoc modo semper ad uehementius progressus fiat, quādo uidelicet diutius ueluti indurata adfectio in uocalibus organis perstiterit. Primi itaque ordinis erit tragacanthus, & gummi, & asier famia us, amyllumq; & ex halica ac trago probe decoctis sorbitio: lac etiam conueniens est, & dulciarij panes, oua sorbilia, & nuges pineæ madefactæ, sesama, & fapa quæ sireon quoque & hepsēma adpellatur. Hac itaque inflammationis affectionibus circa arteriam arteriæq; extremum conueniunt: quibus utendum donec moderatior inflammatio fiat. A uini autem potu abstineant hoc tempore in totum. Postquā autem inflammatio moderatior reddita est, passum theræum exhibendum est, & sapa: butyrum quoque conueniens est, & amygdalæ unā cum sorbitionibus decoctæ, lac item ac mēl diutius cocta, amylo ipsis iniecio, quod si non adsit, panis siligineus siccus cōtus & cribro excussus, lacti dū coquitur infarciendus est. Manifestū itaq; est, quod per huiusmodi uicciū, tum pellicularum, tum musculorū circa arteriæ extremum atq; ipsam arteriā, inflammatio sedatur. Relinquitur autē humiditas multa, propter quā impossibile est uocem esse clarā, nisi rursus edulijz utantur & pharmacis mordacitate carentibus & repurgantibus, uelut est, faba elixata, & ptisana, & semen lini torrefactum. Hac enim medicum obtinent, inter ea quæ mediocri uī prædita sunt, & ea quæ meatus obstruunt pharmaca. His autē amplius repurgat resina terebinthina, & thus cum despumato melle, amygdalæ amaræ, brassicæq; et probe decocti porri. His uero adhuc prætiora sunt, farina erui, hormini semē, iridis radix & panacis. Omnibus autē dictis maxime mollibus, passum creticū, deinde theræū et scybelites cōuenienter miscentur: sapa quoq; quā sireon & hepsēma uocāt, ex musto ad tertiam partem mensuræ decocto adparata, omnium maxime meatus obstruit, citra etiā mordacitatem meatus lenit. Quod uero ex caricis adparatur decoctū ad mellis spissitudinem, magis discutit ac repurgat. Omnium itaq; simplicium pharmacorū uires nosse oportet, eum qui aliquod cōpositum est factururus. Qui enim eas nouerit, etiā eis quæ ab alijs composita sunt rectē utetur, maxime quū indefinitē fuerint descripta. His igitur præexplicatis, arteriacas cōpositiones à ueteribus descriptas subneceamus.

temus. Arteriaca ad uocis asperitates, in principijs exhibita lenissima: gummi drach. II, tragacanthi drach. I, sapa sextarium I. Gummi & tragacanthū confusa & cribrata, cum sapa conterere donec dissoluantur: deinde super prunas fumum non emittentes decoque, donec non inquinent testæ instillata. Exhibe autem ex ea sub lingua tenendū. Alia arteriaca. Gummi quincuncē, passi sextarium I, mellis lib. I. Gummi modica aqua dilue, & ad reliqua coniectum super prunas non fumantes decoque, ut prædictum est. Ante somnum uero delingendum exhibe. Antonij Musæ, ad uocis interceptiones. Brassicæ uiridis cauliculos depurgatos manducandos exhibe, & quod instar palearum exuccum est expuere iube: succum autē ipsum deglutire. Aliud. Succus eryngij aqua decocti heminam I. succi ficuum aqua decoctarum tantundem, gummi leuissimē tri drach. VII, decoque simul diligenter, donec ad arteriacæ crassitudinem redigatur, & delingendum exhibe ex eo ante somnum usque ad cyathi mensuram. Alia arteriaca, ad asperitates, raucitates, tussescq; & sputum sanguinolentum. Amygdalarū amararū decorticatarū numero XXXV, seminis lini torrefacti drachmas IIII, tragacanthi drach. II, oui in fermento assati uitellum, tragacanthum in modica aqua maceratam, unā cum reliquis omnibus passo excipe. Si uero sonus uocis sit fractus, mel pro passo ammiscce, maximē si ex pectore aliquid educi oportet. Aliud. Brassicæ succum cum melle decoctum delingendum præbe, & confestim auxiliabitur.

Ad inueteratas affectiones uariæ arteriacæ.

Cap. LII

Oribasij, ad asperitates & suppressam uocem.

Crocī drach. VII, radicis dulcis, spicæ nardi, cuiusq; drach. III, myrrhæ drachmas III, thuris drachm. III, seminis hyoscyami drach. I, mellis despumati unc. VI, piperis albi grana L, exhibe sub lingua tenendam magnitudine fabæ. Alia arteriaca sub lingua tenenda, ad suppressam uocem, raucosus & cruenta reiectantes. Tragacanthi drach. VI, gummi drach. V, myrrhæ drach. II, obolos II, thuris sesquidrachmam, piperis albi grana XX, croci drach. I, succi radicis dulcis drachmas VI, carnis phœnicobalanorū numero III, passi cretici quantum satis est. Gummi & tragacanthus confusa & cribrata passo macerantur cum radicis dulcis succo: quod si non adsit succus, radicem tufam, & donec cogatur decoctam conficimus quadruplici pondere. Alia arteriaca, quæ etiā ad tussim prodest. Seminis lini confusi & cribrati, uuarum passarum pinguiū sine uinaceis nucum pinearum tostarum, nucum auellonarū mundatarum, æquales partes in farinam redactas melle cocto sufficienti excipe, & cochleare exhibe ante somnū. Eclegma, quo utimur. Vini scybelitæ sextariū I, gummi sexuncē, mellis dodrantem. Gummi pauca aqua præmacera, deinde omnia simul cōtrita in diplomate decoque, ac utere. Aliud, Charixeni. Succus radicis dulcis drach. VI, tragacanthi drach. VI, croci drach. II, myrrhæ, thuris, cuiusq; drach. I, spicæ nardi drach. I, passi protropi choenices III, decoque donec in mellis modū cogantur, siccis probē cōmixtis, ac utere. Eadē enim potestate ualet qua & sequens. Aliud, sub lingua tenendū ad suppressam uocem, ac reliquas circa arteriæ affectiones, Tragacanthi drach. XII, gummi drach. XII, myrrhæ drach. III, thuris drach. III, carnis phœnicobalanorū numero VI, radicis dulcis drach. VI, passi protropi aut theraci quantū excipiendis his satis est. Sit autem passum ipsum præcoctum ad mellis crassitudinem. Exhibe fabæ Aegyptiæ magnitudine sub lingua detinendum, & dissolutum deglutendum. Alia arteriaca, faciens ad uocem fractam, raucosam, & suppressam, inflammationes tonsillarum: utilis est phonasceis & ante & post certamen exhibita: iuuat re-

P frigē

frigeratos: prodest ueteri & recenti tussi, spuentibus sanguinē, & sursum reie-
ctantibus, & coeliacis: conducit etiā ad anhelitus sc̄torē. Croci dra. iiii. myr-
rhæ dra. i. succi radicis dulcis drac. i. passi cretici sextarios iiii. passum ad tertias
decoque & cum eo prædicta excipe ac utere. Aliud, ad ulceratā arteriā, Chari-
xeni: cōuenit etiā phonaſcis, hoc est, qui uocis exercitio utuntur, ante certamē
& post exhibitā: facit & ad circūdolentes oculos, extrā imposita lana ex co ma-
defacta, & ad interaneorum adfectiones delincta. Gummi drach. x. ii. traga-
canthi drach. x. ii. thuris drach. iiii. myrrhæ drach. iiii. croci drach. ii. succi hy-
pocistidis drach. ii. passi scybelitæ sextarium unum. Gummi & tragacanthum
contundito & cribrato unumquodq; seorsim & cum modico passo diluito, re-
liqua uero fracta & præmacerata similiter cum modico passo conterito. Crocū
uero in raro lanco panno ligatum, in ollam appendito, in qua reliqua coniecta
ac assidue agitata decoquuntur: deinde extracto croco, & probe contrito, re-
liqua omnia in pilam conijciuntur, & ut cocta sunt cum croco uniantur, & uti-
tor. Alia arteriaca, ex cuius usu sepe magnam laudem adsequutus sum. Nu-
ces pīneas sexaginta, amygdalas amaras delibratas quadraginta, carnem phe-
nicobalanorū sex, succi radicis dulcis scrupulos x. ii. croci scrupulum i. myrrhæ
scrup. i. tragacanthi scrupulos vi. passi cretici quantum sufficit. Quibus uero e-
ductione ex pectore opus fuerit, mel & sapam adde. Alia, Andromachi.
Pinguēdinis gallinæ recentis quadrantē, mellis heminam i. decoque simul, &
cum rutæ ramulis agita donec cogatur. Exhibe eam ieiunis, & post cibum, &
ad noctem. Sorbitio ad suppressum sonum, maxime ab humore: conuenit e-
tiam phonaſcis. Porros in aqua ad tertias decoque, atque ipsos quidem absce,
aquæ uero halicæ succum ammisce, & mel, & ouorum lutea iiii. quæ ubi com-
miscueris ad tertias decoque, & excola: deinde adfusa sapæ optimæ sextario u-
no, rursus donec cogantur decoque, ac ramulis anethi circumagita. Da ex ea
mane & uesperī cochleare unum. Arteriaca necessaria, phonaſcis commo-
da: expertus sum etiam eius ualorem ad raucescentes ob humiditatem pluri-
mam. Costi, folij, spicæ nardi, amomi, piperis, cassiæ, mastiches, cuiusque dra-
chmas quinque, opij drachm. ii. mellis & succi mororum æqualiter mixtorum
quantum satis fuerit. Excipe pharmacum cum eis quo uiscosa coactio redde-
tur, & utere. Exhibe sub lingua tenendum magnitudine nucis auellanae: caue-
to ne nimis solidum facias, ut facilius sub lingua liqueſcat. Alia arteriaca, ad
affectiones asperæ arteriæ, & pulmonis, ad reiectantes sanguinem, & omnia
uitia manifesta: maxime uero prodest crebrum & rectum anhelitum ducenti-
bus. Scillæ depurgatæ coctæ drachmas sex, seminis lini drach. ii. seminis urticæ
drachmas duas, succi uerbenacæ exiccati drach. ii. thymi drachmam unam, sa-
rinæ erui drac. i. i. pulegij, iridis, betonicæ, anisi, nasturtij, apij, seminis sceniculi,
seminis anethi, piperis, sceni græci, cuiusq; dra. i. excipe melle attico: exhibe ma-
ne & uesperī quantum cochleari accipi potest. Alia, ad arteriæ adfectiones,
& pulmonis ulcera, reiectiones puris & sanguinis, destillationes ad pectus, &
ad educationem eorum quæ in pulmone coaceruata sunt ualde efficax. Resinæ
terebinthinæ, croci, thuris, myrrhæ troglodyticæ, terræ quæ Aster appellatur, ci-
namomi, nucum pinearum purgatarum, radicis dulcis, sing. drach. iiii. amo-
mi, tragacanthi, carnis palmarum pinguium, cuiusq; drach. i. i. spicæ nardi dra-
chmas duas, cassiæ drachm. ii. costi drachmam unam, galbani depurati obolos
quatuor, mellis attici libras sex. Mel & terebinthinam in diplomate decoque,
atque ubi condensari cœperint, galbanum præmollitum ammisce, ac donec
non

non inquinari amplius decoque, deinde agitādo frigefacito, & cum reliquis
 confusis in pila permiscero. Vfus eius est sub lingua detentæ. Alia, quæ simi-
 liter ad omnia prædicta efficax est. Spicæ nardi drach. IIII, croci drach. I, pîpe-
 ris grana triginta, radicis dulcis dra. I, nucum pinearū depurgatarū numero C.
 styracis dra. II, balaustiorū dra. III, tragacanthi dra. I, cinamomi drach. I, amomi
 dra. I, thuris drach. I, mellis sesquialibrā, aut passi cretici heminas VIII, passum in
 duplici uasculo siue diplomate coquitur ad mellis spissitudinem, & ad reliqua
 arida in pila trita affunditur. Tragacanthus autem tunditur, cribratur, & dilui-
 tur unā cum styrace in uino modico dulci, atq; ita ammiscetur, exhibe ex eo co-
 chleariū unum. Expertus enim sum ambo hæc adscripta magna celebritate pro-
 bari. Cōpositio ex capitibus papaueris uaria. Capita papaueris centum & ui-
 ginti in aquæ sextarios III, coniecta, ad dies quinq; macerato, deinde ad tertias
 decoquito, & abiectis capitibus ad aquā mellis sextarium I, ammisceto, quibus
 simul ad spissitudinē mellis decoctis, ita ut non diffuant, croci, myrrhæ, acaciæ,
 succi hypocisthidis sing. drach. I, infarcito, & ante somnum delingendum exhi-
 beto. Prodest reiectantibus sanguinem, coeliacis ac dysentericis. Ego autem ad
 huiusmodi ex capitibus papaueris cōpositionem, quādo scilicet ad lib. I, aquæ,
 decem papaueris capita inijciuntur, prædicta cōmisceo, & pro pharmaco flu-
 xiones sistente ac repressiuo utor. Alia, ex libris Asclepiadæ, panacea Mithri-
 datis. His qui uocis exercitio utuntur ante & post certamen utilis, facit ad glan-
 dularum inflāmationes, columnellam laxatā, & ad gingiuas humore turgē-
 tes, & ulcera serpentia oris, ad motos dentes, & destillationem, tussim ueterem
 & recentem sanguinem spuētes ac sursum reiectantes. Vtor ea aliquando ci-
 tra admixtionem, aliquādo autem passō aut scybelite uino, aut aqua calida di-
 luta. Etenim ad tonsillarum inflāmationes atq; consimiles adfectiones utendū
 est pharmaco hoc diluto; ad eas uero quæ in profundo hærent, immixto & pu-
 ro. Verum cōpositio ipsa hoc modo habet. Radices filicis quā crassissimæ
 diligenter lauantur, donec terrenæ sordes in totum discedant, deinde refrige-
 rantur, in frustra digitali magnitudine dissectæ: ex quibus lib. III, accipimus, &
 capita papaueris agrestis mediocria centum & quinquaginta, radicis symphy-
 ti depuratæ, corticis radicis mandragoræ, rhei pontici, rosarum siccarum, iridis
 illyricæ, radicis dulcis, balaustiorum, singulorum quadrantem, cassiæ trientem,
 nardi celticæ sesquinciā, aquæ pluuialis sextarios quindecim. Omnia prædi-
 cta crasso modo contunduntur, & per triduū madescunt, deinde sequēti die in
 diplomate ad tertias decoquuntur, exprimuntur & percolantur: in huius autē
 decocti parte, subscripta per diem & noctem maceramus. Sunt autem gummi
 puri lib. I, tragacanthi pellucidi lib. I, myrrhæ troglodyticæ sextans, succi radicis
 dulcis sextans, croci sextans, succi hypocisthidis sextans, mastiches unc. I. Se-
 quenti deinde die diligenter & paulatim hæc trita diluimus, & quod superest
 ex ipso decocto ac expresso liquore, paulatim adiicimus. Et postea uinum scibe-
 lites, aut theracum, aut aliud dulcissimum, sextariorum XXIII, mensura in uas
 fictile diffusum decoquimus, donec ad mellis crassitudinem redigatur: deinde
 adiectis etiam tritis omnibus, rursus ad coactionem decoquimus, & ablatis u-
 timur. Datur ex hac quantum cochleari excipi potest. Cōpositio ex capi-
 tibus papaueris, ad tusses humidas, dolore adfectā arteriam, & fauces, & ad de-
 stillationes à capite ad pectus: utilis est etiam ad uigilias. Capita papaueris
 Thebaici mediocria unā cum ipso semine decem, aquæ pluuialis sextarium u-
 num, radicis dulcis parum quiddam, per diem unum præmacerato, deinde do-

nec flaccida facti fiant capita, decoquito, exprimito & percolato, ac ad decoctum dimidium eius mellis adjicito, & rursus super prunas ad mellis crassitudinem decoquito, ac utitor. Accuratio huius antidoti adparatus, atq; etiam partim usus predictus est Sermone quinto de proprijs agrorum potionibus, loco. Quod si magis adstringens alui profluuiorum facere uelis, & sanguinem spuentibus commodum, succi rhois rubri drachmas duas adijce, & acaciae drachmas duas, haec autem in passo diluta, tum demum quum ab igne ablaturus es pharmacum, in ollam conijce, & parumper feruefieri sine, ac utere, cochleariū exhibens ante somnum.

De destillatione siue catarrho, & nariū moco, ex Galeno. Cap. LIII
Destillationis & muci causa est cerebrum, quod quidem à frigore ad frigidā intemperie deducitur, ab aestu uero calefit & repletur. Vinum quoq; ultra modum potatū caput replet, & balnea calidiora, & largior perfusio capitis ex aqua calida, maxime si aliās calidius caput existat: & cibus sanē qui in uētre incoctus perseverat, neq; infra excernitur, in caput impetū facit. Repletū itaq; caput rursus ad subiecta membra humores demittit: & siquidē ad nares hoc ipsum excrementum defluat, Coryzan siue mucum adpellare consueuerunt, & Latini amplius grauedinē: si uero ad gurgulionē, morbum Vuam appellatum generat. Est autem affectio circa gurgulionē consistens, aut aliās ipsum gurgulionē tumidum facit. Promptissima itaq; est ad nares & ad os defluxus delatio, quamuis aliquibus etiā ad oculos, aliquando & ad aures deferatur. Atqui delationem ad os etiā stomachus siue gula excipit, & aspera arteria, atque ipsum adeo arteriae extremum. Quod sanē extremū, ob ipsum ad se delatum à capite defluxum superhumectatū: in principio raucosam uocem producit, & progressu temporis etiā parua. Quod si amplius augetur malum, uox ipsa in totum perditur. Nam ipsa aspera arteria una cū suo extremo permadescit. At si acrior fluxus ipse existat, non tantum uocis damnum predictae particulae patiuntur, sed grauissima etiā erosio accedit, talis naturae, quales circa cutem accidere saepe uidemus citra ullā externā causam, eoq; modo etiā pulmo ipsis exulceratur, uocaturq; haec affectio tabes. Quod si ad gulam & in uentriculum fluxus deferatur, siquidem frigidus existat, in frigidā intemperie corpora perducit, calidus uero in intemperiem calidā: exulcerat etiā ea temporis progressu, in principio uero appetitioni nocet & concoctioni. Si itaq; frigidus fuerit defluxus, tardas concoctiones & cruditates, ac ructus acidos efficit. Si uero calidus fuerit, in corruptionem adiget cibos, unde nidorose, aut foetentes, aut acide cruciationes producentur, aut etiā alterius cuiusdā quae nominari non potest, aut etiā nomen habentis qualitatē. Vbi uero altius penetrarit nocumentum, etiā intestinum ieiunum adfici, & ad colum usq; pertingit, atq; ad mesenterij uenarum uasa, per quae ad hepatis distributio atq; digestio alimenti cōtingit, aliquibus itaq; deiectio appetitus accidit, aliquibus uero appetitiones praeter naturā, quas adpellāt caninas, aut etiā uitioforum ciborū concupiscentia, qualis mulieribus praegnantibus pica morbo infestatis contingere consueuit. Manifestum autem est & gurgulionem & tonsillas adfici. Quin & parulides & glandulae, & dentium erosiones, ulcerationesq; & putredines oris, ad ferofas ex capite in ipsum os destillationes sequuntur. Caeterum uulgus Medicorum aut gurgulionem refecat, aut pharaca exhibet quae per asperam arteriā sputi eiectione in pulmonem dilapsa educant. Alij uero uentris curam gerunt, quemadmodum alij dentium, & oris, aut etiam affectionum in naribus, aut oculis, aut auribus curam moliantur. Principium

eipsum inuentionis Galeni. Melius autem erat, mea quidem opinione, uelut
 fontem malorum excindere sanato uidelicet capite, quod si impossibile sit fa-
 cere, ob uehementiam naturalis intemperiei, omnino tamen eius saluti conser-
 uare oportet, indicatione ex figura ipsius accepta quomodo ei subueniri possit.
 non enim mox, ueluti aliqui Medici omnibus capitibus semper ex thapsia & si-
 napi cataplasmata adhibent, sic & te facere uolo. Etenim si a calida intemperie
 caput uexatur, omnia calida pharmaca nociua existunt. Oportet itaque ipsos bal-
 neis multis calidis potabiliū & dulcium aquarum consolari, simulque generatos
 in capite uapores calidos discutere, & temperaturā omnem in melius mutare.
 Nocuius autem est eis usus aquarū natura sua calidarū. Quæcunque enim sulphuru
 lentæ sunt & bitumen olent ob caliditatem suam contrariæ sunt capitibus natu-
 ra calidis. Quæ uero aluminosæ, coarctatione sua caput offendunt: uerū calidas
 dulces nō adpellamus sua natura calidas; neque enim inuenire est quæ suapte na-
 tura calidæ existant, ac non aliqua medicamentaria qualitate participant. Qui
 uero caput uehementer calidum & perustū habent, & ob id assidue à destilla-
 tionibus uexantur, his melius est hora æstiuā ex rosaceo ungi, ex solis rosis & om-
 phacino oleo citra spissamentorū adiectionem adparato. Quædā autē capita pro-
 pter calidiorem arteriarū temperaturā tum uertigine, tum dolore adprehē-
 duntur: in quibus etiā arteriarū incisione utimur. Quare considerare oportet
 præcedentem distillationis causam, & præhabitā diætā, atque ita remedia cōtra-
 ria afferre: in uniuersum autē pauco cibo & quiete utendum est, uitato etiā fri-
 gore & calore: si uero cibi incocti amplius in uentre innatent, ad uomitū ager
 est inhortandus. Philumeni. Valde utile est his qui distillationē patiuntur,
 si eorū plantæ pedis cum pice in oleo plurimo dissoluta cōstanter fricentur, ex
 eademque inguina & sedes perungantur, nares uero ex thure & myrrha cum ui-
 no & oleo cōtritīs, ac ad mellis crassitudinē redactīs illinantur, & unguentū iri-
 num simul naribus instilletur. Melanthium etiā torrefactū linteolo illigatū odo-
 rent, aut hedychroon manibus teneant & assidue odorent, aut cyphi eodē mo-
 do. Conuenit etiā inflammationē arcentia emplastra fronti imponere, uelut est
 Iceliæ, & emplastrū oxerum adpellatū, itemque barbarū cruentis uulnerib; desti-
 natū, & athena. Gargarissent autē assidue passum scybelites, aut sapā calidā: forbi-
 tionibus uero utantur decocto hysopi, ficuum & nucum pinearum, atque iridis;
 item halica ex passo decocta. Si uero ab his nihil leniatur distillatio, neque ta-
 men amplius augeat, sed eodem modo ad plures dies persistat, præsentissimū
 auxilium capitis irroratio existit, maxime in æstate, & capitis temperatura ca-
 lidiorē. Oportet autē in balneis ex alto frigida aqua delabente caput subdere, ut
 uolentum inde sustineat insultum: cūestigio enim densitatem dissoluit. Ani-
 maduersionē tamen habere oportet, an thorax inde facile offendi possit: cōsue-
 tit enim promptē à capite frigidatē transsumere ac fortissimas uexationes per-
 ferre. Porro diuturnas distillationes fortis clyster sanat, aut uomitus à raphanis
 ieiunis factus, aut purgatio exuberātis humoris, & irrigatio capitis ex unguetis
 irino, aut optimo nardino. His uero qui continua & inueterata iam distillatio
 ne adficiuntur, caput radere oportet, & factis scarificationib; bituminosa empla-
 stra imponere: pharmacis autē deglutitijs utendū huiusmodi. Edeigma ad
 distillationē. Mellis sextantem, butyri recentis un, i. decoque, & in duas partes
 diuisum delingendū exhibe, his qui educatione opus habent. Manducatio
 ad eandem. Semen hormini, semen papaueris nigri, semen lini torrefactum
 æquis portionibus contunde, & cribro excute, melleque cocto excepta cōman-
 ducan

ducendam mane exhibe. Probè etiam ad destillationes facit antidotus ex capitibus papaueris soporifera, ante somnum exhibita: etenim somnum dulcem infert, & reprimit influxum. Eius adparatus paulo ante inter arteriacas compositiones dictus est, & in quinto similiter Sermone de proprijs agrorum potionibus loco. Catapotium ualde celebre ac dolorem leuans. Styraçis dra. vi. myrrhæ drach. i. & dimidium, terebinthinæ drach. ii. opopanacis drach. ii. iridis dra. ii. piperis albi, spicæ nardi, nitri, seminis hyoscyami, opij, cuiusq; drach. i. arida contundito ac cribrato, reliqua uero in pila citra liquoris admixtionem contusa simul committito, & grana in erui magnitudinem informata ante somnum deglutienda exhibeto, neq; quicquam ultra sorbitionis admittito. Dantur ad summum grana iiii, medium iii, minimum ii. Aliud, quod etiam dolorem leuans, tum tussi, tum destillationi opitulatur. Styraçis, drach. iiii. myrrhæ drach. i. opij drach. i. galbani drach. i. contunde in pila, & sapa affusa subige, & catapotia erui magnitudine informa, quorum similiter ad summum iiii, exhibe, medium iii, minimum ii, absorbeant etiam insuper passi calidi diluticiya istos duos. Asclepiadæ remedium. Pyrethri, costi, utriusq; drach. ii. piperis albi drach. i. contusa & cribrata repone. Vsu uero expetente apprehensis naribus pharmacum adtrahere præcipe. Aliud. Piperis drach. ii. seminis urticæ drach. ii. croci, myrrhæ, costi, cuiusque drach. i. Vtere ut dictum est. Cæcus autem tener & recens comestus utilis est, & cauliculi brassicæ crudi à ieiunis comesti, similiter & brassica delicatior cocta & comesta. Qui uero calidiori præditi sunt temperatura, lactuæ cauliculos parumper seruefactos comedant, in posca uero ipsos intingant.

De tussi.

Cap. LIIII

Tussis causæ uariæ sunt. Nam & humor à capite ad asperam arteriā destillans tussim efficit, & asperitas sola pelliculæ asperæ arteriæ intrinsecus ambientis tussim irritat: qui præterlabuntur etiam cibi ac potus tussim mouent, & lumbrici stomachum infestantes, tussiculas paruas excitant: & acris humor stomachum perturbans, ac irritatiuam aliquam qualitatem ad fauces demittens, imaginariam tussim producit, quemadmodum etiam in his qui stomachi morsum sentiunt, & saliuæ ad eum influxu uexantur, euenire solet, quum nihil molesti iuxta asperam arteriā obuersetur. Intemperies quoq; frigida respirationis instrumentorū, tussis causa existit: uerum hi moderatè ac minimè uiolenter tussunt, adeo ut non solū per spiritus compressionē, retinere queant & impedire tussim, sed sanare etiam sapissimè, per respirationis inhibitionē frige factas particulas calefaciendo. Signum autem ob solam intemperiem frigidā tussientium est, si per crebras inspirationes irritentur, frigidityte uidelicet exinde intensiore facta & aucta. Quando igitur hi leniter inspirant ac aërem adtrahunt, & in calida domo uersantur, parum uel omnino nihil tussunt. Quæ uero cum titillatione capite ad asperam arteriam deferri, itemq; ad pulmonem, quod si nihil expuant sic adfecti, tenuem esse defluxum indicat, qui expulsionē spiritus dissectus, preternuitate sua rursus fluxum reflectit, id uero ex humore per sputum reiecto manifestè apparet: crassior enim priore habet compagem, etiā si sit à spiritus impulsionē reiectum. Manifestum autem est, quod humor in pulmone & thorace detentus, in morbo laterali, inflammatione pulmonis, & tabe, maxima tussis causa existit. Medemur autem tussi à tenui defluxu factæ, per antidotum ex papaueris capitibus inspissantes, aut per alterius cuiusdā pharmaci dolorem leuantis

quadrantem, cumini quàm tenuissimè triti drach. iiii. Mellis prius despumato butyrum ammisce, & simul calefactis cuminum insperge, & paulatim delingendum cochlearium unum exhibe. Aliud, ad tussiles pituita repurgas. Hyssopi un. i. pulegij sextantem, iridis, sinapis, seminis nasturtij, anisi, piperis, singulorum un. i. tula ac cribrata, melle despumato sufficienti excipe & cochlearium exhibe. Hyemis autè tempore, & febre non infestante accepturum: piperis sextantem adijce, & pro aniso, foeniculum aut cuminum, & pro nasturtio sinapis, ut sit sinapis sextans siue uncia duæ. Aliud, ad diuturnas tussiles. Comæ hyssopi, pulegij, de superiore anno, ammi, piperis, erui rufi decorticati, iridis cuiusque sex uncem, spicæ nardi dra. iiii. terebinthinæ trientem, butyri recentis sextantem, mellis despumati sextarios ii. Butyrum & terebinthinæ cum melle liquefacito, ac reliquis unito: utere exhibito cochleari paruo. Aliud, thoracis affectionibus comodum. Lomenti fabacei fricti ac tenuissimè triti septuncæ, seminis lini septuncem, iridis contritæ quadrantem, nucum pinearum torrefactarum dra. ii. pulegij triti dra. ii. seminis urticæ dra. i. piperis dra. iiii. mellis despumati chœnicem i. Mellis despumato lomentum insperge ac parumper decoque: deinde de reliquis in mortario ammixtis utere. Aliud, Acoholij, Hyssopi, pulegij, ammi, piperis, erui rufi, iridis, cuiusque dra. vi. terebinthinæ drach. iiii. spicæ nardi dra. i. ii. butyri recentis sextantem, mellis despumati sesquilibram, utere. Aliud, ad tussim ex styrace. Amomi sextantem, cassie sextantem, styracis sesquunciam, spicæ nardi sesquunciam, croci unc. i. piperis unc. i. mellis despumati sextarium i. exhibe cochlearium. Ad tussim siccam, Siccam tussim sanant etià paulo ante præscripta pharmaca. Aliquando autè & aquæ feruefactæ sorbitio. Qui enim ob pituitæ crassitudinē nihil educere possunt, ab humiditatibus plus emolumenti sentiunt: maximè eo quod quodammodo si simul extenuatoria participant facultate.

De pharmacis dolorem leuantibus & simul conferenti-

bus tussi.

Cap. lv

Hocce pharmacorum dolorem leuantium genus, hi qui ante ætatem nostrā fuerunt, cōposuerunt, tussientibus & sanguinē reiectantibus præcipuè cōducens, atque etiā his, qui ultra has affectiones tabescunt: itemque ad alios dolores & affectiones quæcunque circa pulmonē & pectus, ac asperā arteriā, reliquaque interiora membra consistunt, præterquā quæ propriè colicæ appellantur. Differunt enim hæc à colicis similiter anodynīs, hoc est, dolorē leuantibus appellatis, tum aromatum & odoratorum seminum, tum eorum quæ urinā cient admixtione. Colicæ autem facultates ac compositiones his uehementiores sunt, excellentē uim stupefactoriā complexæ, ob multitudinem uidelicet eorum quæ refrigerantis nature existunt, uelut est hyoscyami semen, & cicute, papaueris succus, & mandragoræ cortex: quibus sanè ad colicos necessariò ob doloris magnitudinem utimur. Atqui in thoracis affectionibus aliqui styracem & crocum ammisce-runt: aliqui autem calefacientia: alij etiā aromatica, & cum pauca ui adstrictoria exsiccantia: quidā etiam nobis familiaria, uelut anisum, apium, foeniculum, daucum, & fœli, quæ uehementiū pharmacorum uires & iniucunditatem ob-tundunt, ampliusque urinā expellūt: quidā etiam ea quæ asperitates leniunt ad-didere, uelut est tragacanthus & radix dulcis, ac uinum dulce. Quæcunque autē ex eis de pharmacis stuporē inducentibus, minus participant: ea etiam tabidis exhibemus. Sunt autem à ueteribus cōposita doloris leuamenta huiusmodi.

Cataportium. Pharmacum ad tussim accommodatum, in ueterata maxime existente affectione. Efficax est ad diuturnā desillationem, dolorē capitis diffi-

cultet

culter spirantes, & inflamationes pulmonis, ad vesicæ quoque ac utulæ affectiones, inscribitur Panacea, ab alijs etiã Stichus. Myrrhæ, opij, piperis, styracis, castorei, galbani, æquales partes cum sapa dulci subige, & in catapotij figuram redige, ac ciceris magnitudine exhibe: absorbeat autem à sumptione aquæ nullæ cyathos duos. Harmonia. Aliud pharmacum uehementer efficax quod harmoniæ adpellatione inscribitur; ualet ad destillationes, & inexuperabilem defluxum. Styracis, castorei, piperis, cardamomi, cuiusque drach. iiii, opij, myrrhæ, seminis hyoscyami albi, cuiusque drac. iiii, passo probe cocto excipe, & catapotia ciceris magnitudine informa, & ante somnum præbe deuoranda. Alia cõfectio, ad tussis diuturnas egregiè & cõcinnè ualens: itemque ad humentes & ob humoris crassitudinē diu durantes, quæ Symphonos adpellatur, & febrem optimè sedat. Ea omnes ueteres celebres usi sunt. Piperis, opij, cardamomi, cuiusque drac. i, croci, sulphuris uiui, myrrhæ, seminis hyoscyami albi, cuiusque drac. iiii, mellis cocti cochlearia iiii. Hoc enim modo nos apparamus: uerum sunt qui gentianæ, & dauci, cuiusque drac. ii, ammiscant. Alia, ad tussim & talem Isthathmos appellata. Folij, petroselinij, hyssopi, rosarum siccarum, anisi, opij, croci, costi, seminis hyoscyami, myrrhæ troglodytica, spicæ nardi, iridis, æquales partes cum melle sufficienti subige, datur fabæ magnitudine ad noctē. Alia, isotheos adpellata, ad tussim, tabē, omnes morbos internos, & certo circuitur affligentes affectiones. Spicæ nardi drac. ii, myrrhæ drac. i, croci, costi, piperis albi, cuiusque drach. i, galbani drac. i, ficis opobalsami, cinamomi, mandragoræ succi sicci, castorei, cuiusque drac. ii, seminis dauci sesquidrach. cassiæ sesquidrach, mellis despumati quantū satis erit. Facit ad dolorē stomachi, iecoris, pulmonis, oculorum, sanguinis reiectionē, abscessus dysentericos, uoluolum, renum ac coxendici affectiones, difficulter spirantes, dolores laterum, unicè tamen iliorum ac præcordiorum, profluuiū muliebri, & muliebres suffocationes. Prodest contra lethalia uenena ante & post cibum sumpta, & ad omnem sanguinis eruptionem cum frigida, ad uiperæ & phalangij morsus in uini cyathis iiii, quartanarijs ante febris accessionem dantur ex ea oboli ii, cum uini cyathis ii, sed præloti tamen antea ægro. Sanat ægrè spirantes, & qui nisi erecti spiritum ducere non possunt, & anhelosos, etiã si iam ad multos annos affectio durauit. Sanat quoque antiquas à capite ad pectus defluxiones.

De suffitionibus.

Cap. LVI

Quamquam antea sufficientissimè de suffitionibus dictum sit, in Sermonem De clysteribus & euacuantibus, ac alijs quæ ægris offeruntur, qui sanè tertius huius operis fuit, dicetur tamen nunc quoque sed paucis. Pastillus suffumigabilis tussientibus & orthopnoicis commodus. Abrotoni, sandarachæ, sinapis, cardamomi, æquales partes contundito & cribrato, & cum aqua in pastillos redigito ac suffito, ita ut æger ore fumum suscipiat. Alius pastillus. Sandarachæ sextantem, terebinthinæ sextantem, costi scrupulos sex, folij scrupulos vi, mastiches scrup. vi, laseris scrupulos iiii, piperis grana x. redige in pastillos ac utere eodem modo. Alius. Castorei, sandarachæ, galbani, sulphuris uiui, colophonis, propolis, terebinthing, mastiches, croci, chamæleuces æquales portiones, cum aqua in collyria redige, & ipsa per infundibulum suffito. Si uero non adfit chamæleuce, his conyzam parua aut capparis corticem adijce. Aliud bonum suffumigium, per experientiam à nobis inuentum, quatuor speciebus constans. Styracis, terebinthinæ, sandarachæ, mastiches, æquales partes excipe, ac similiter utere. Creditur anhelosos & purulentos sana-

fana-

sanare: itemq; tussim & laterum adfectiones, quemadmodū etiam ea quę paulo antē hic sunt pręscripta, atq; ea quoq; quę tradidimus in tertio Sermone.

Epithema ad tussim optimū, ex fertula campana, Samfuci, fertulę campanę, prasi, iridis, cuiusque sextantem, myrrhę unc. i, thuris quadrantem, resinę pinus lib. i, olei irini lib. i, utere.

De orthopnoicis, anhelosis, ac ægrę spiritum ducentibus.

Ex Galeno.

Cap. LVII

Qui frequenter respirāt citra febrem, quemadmodū solent à uehementi cur su fatigati, eos asthmaticos, hoc est, anhelosos, Medici uocare cōsueuerunt, ab accidente uidelicet, hoc est, anhelando: eosdem etiā ab altero accidente orthopnoicos adpellant: desident enim ac pectus erectum habere uidentur, ob timorem ne suffocentur, & stratum quoque iuxta superiores partes, ad quas pectus ipsum reclinetur, erectius sibi adparant, ne dormientes strangulentur. Inspiratio enim minor ipsis cōtingit, quā respīrationis frequentia expostulat, quam uis pectus plurimū ipsis diducatur. Ex quo manifestū fit, coarctationē locorum pręter naturā intrinsecus adesse, cuius etiā manifestē ægri sensum perceptant. Fit autē coarctatio locorū inspīrationis, quum aut crassorum & tenaciū humorū multitudo pulmonis bronchia obstruxit, aut tumor qui ipsā abscessui similis in ipso consistat. Similiter autem difficulter spirant, qui asperam arteriā à multā destillatione habent repletā, aut quadam defluxione ex uicinis locis accruatim in ipsas arterias delabente. Distinguuntur autē inter se hæc affectiones: nempe quod destillatio etiā sanis ex manifesta causa repente accidit, in totum serē citra febrem concomitantibus, etiā proprijs destillationis signis. Si uero tumor abscessui similis in pulmone fiat, necessariō febris cōsequitur, neq; ita diu post, inflammatione in pus transmutata, pus reijcitur cum tussi. Si autē crudū tuberculum gignatur, uelut Antipatro Medico contigit, iuxta leues pulmonis arterias, hi neq; grauitatē magnā sentiunt, neq; ab orthopnoea in tantū infestantur. Qui uero propriē orthopnoici & difficulter spirantes adpellantur, in totum febrem non habent: grauitatis autē sensus eis cōtingit, neq; quippiā purulentū per sputum reieciunt. Porro curatio prædictarū affectionum quiddā cōmune habet, quiddā etiā cuiq; propriū. Cōmune quidem ut superflua substantia humoris has affectiones generantis consumatur, & expendatur. Propriū uero ut si à crassis & tenacibus humoribus fiant, per extenuantia & incisiua pharmaca consumptio fiat: si uero à tumoribus abscessui similibus affectiones fiant, per extenuantia & desiccantia consumantur: quę curatio omnibus in profundo corporis abscessibus cōmunis existit. Vini autē potio ambabus cōuenit, tenuis saltem temperaturę, in uniuersum aut paucus potus cōuenit, quibus abscessus alicubi adest, multus uero, quibus bronchia tenacibus & crassis humorib; sunt obstructa. Etenim repurgantia hos humores pharmaca necessariō tusses commouent, uerum non facili per sputum reijcitur ob crassitudinē id quod repurgatum est, humectatione igitur multa indiget, quo facilius efferatur: & ob id salnē largior potus anhelosis est exhibendus. Pharmaca uero eis conueniunt incipientia citra uehementē calefactionē. Crassi enim & tenaces humores à uehementi calore uiscosiores redduntur, glutinosi q; & ut difficulter auelli possint: quapropter maximē prodest eis acetū scillinū, & ipsa quoq; scilla assa cū melle trita & delincta, & acetum mulsum ex ea adparatū. Maximū autem remedium inquit Archigenes, purgatio frequentior existit per pharmaca fortiora: & uoluntus à radicibus, per interualla suscepti, Cataplasmata uero ex ficibus & ordea

acea farina: magis uero ex loliacea habente resinā & mel ac cerā ammixta, infarci potest etiam ei iris & manna. Malagmata autem conueniunt, quæcunque exulcerant cutem & attrahunt saniem, quale est Cissophontis, & quod constat ex bacis lauri, & quod ex semine rosmarini constat, & emplastrū ex herbis, & quod icesium adpellatur, itemque quod uocatur Thraseæ. Quod uero cyzicenu emplastrū dicitur, si irini cerati æqualem sibi portionē assumat & uniuersio pectori imponatur, humiditates consumit, & habitum corroborat. Omnium autem conuenientissimū huic affectioni hocce est, inquit Archigenes. Emplastrum nigrum Archigenis. Ceræ lib. i. resinæ pinus sicca lib. i. iridis sesquilibra, bituminis lib. i. picis lib. i. æruginis unc. i. myrrhæ sexuncē, thuris sexuncē, radicis cucumeris syluestris, centaureæ, lapidis asij, styracis, cuiusque sextentem, misyos, crudi sesquiunciā, chalcitidis crudæ sesquiunciā, salis ammoniaci un. i. galbani, terræ cimoliæ, terræ ampelididis, cuiusque un. i. olei lib. i. i. acetil lib. i. aut ut ego so, leo lib. i. i. styracem cum modico oleo liquefactū in mortario probe contere, mellalica uero cum aceto dissolue, herbas autē contunde & cribro excute, liquefactis uero quæ eliquari possunt, & percolatis, ac ab igne ablatis, cōtrita adijce, atque herbas insperge, omnibus autem simul unitis & emollitis utere. Hoc sanē multos oculos abscessus discutit, & in uaporē resoluit, alios autē aperit, quicunque autem iam rupti sunt, & fluidi tamen adhuc permanent, eos mirabiliter exsiccat. eiusmodi enim pharmacis uix aliud præstantius reperiri possit. Cōueniens est etiā prædictis affectionibus Amythaonis epithema, atque eo adhuc magis Polyarchion, maxime tempore coarctationis locorū. Pectus uero cum urticis cōfricetur ac cædatur, ac seilla decorticata fricetur, deinde louacro ac oleo calido loci rubefacti curentur: assidue autē lenioribus solutiuis alium emollire oportet, quale est, cnici acetabula duo optime confusa, & cum sero lactis decocta, ita ut percolatum serum, & modico melle permixtum bibatur, utendum est etiam ex thymo, lasere, & pipere salis confectionibus, quibus addita est scammonia, aut etiā his quæ sunt ex rosmarino. Ego uero etiā herbæ sabinae optimū usum expertus sum, si per seipsam drach. pondere trita sumatur, & sequenti die duarum drachmarū pondere, tertia trium. In aliquibus autem & quarta die usque ad quartā drachmā pondus auxi. Quod si bene procedat purgatio, simulque cruenta educat, non est quem non melius spirantem in posterū reddat. Porro interiectis duobus aut tribus diebus, absinthium potandum exhibui, maxime si stomacho æger langueat, quod si non contingat stomachum languesceri, irim bibendam dedi, aut abrotonū, aut castorium ex aceto mulso. Mirum in modum autem efficax est, quod ex elaterio constat & octaobolon appellatur. Elaterij areolos ii. spumæ nitri obolos iii. sinapis drac. i. hæc in aqua diluta in octo catapotia informo: maneque duo, tantundemque uesperis exhibeo. Purgat enim citra molestiā supernē, aliquandiu quidem permanens & soluens. His uero qui robustiores sunt, post trium dierū spatiū rursus exhibeo. Atqui quæ ex colocynthide constat hiera nostra, hoc est, Archigenis, assidue præbita mitiorem spirandi difficultatem correxit sapissimē, atque id breui & perfecte. Verum si magis in profundo hæserit, auxiliatur cum aceto mulso scillitico potata. Aliud, ad difficiulter spirantes, qui etiā asthmatici adpellantur. Aristolochiæ clematidis, abrotoni, sulphuris uiui, seminis rutæ agrestis, cacuminum thymi, ammoniaci, thymiamatis, æquales partes cū aceto tritas in pastillos redige, & ex eis obolos iii. exhibe cum aceto mulso ad triduum. Alia remedia asthmaticis cōmoda ex Asclepiade & Dioscoride. Aristolochia rotunda cum aqua bibita, anhelos

lis auxiliatur: item centaureæ maioris radix, & minoris succus; & scæchas trita ac cum aqua potata, & sphondylii semen, & calaminthæ montanæ coma, & hyssopus, & iris, ac melanthum, & radícula & uitis alba, item afeilos, qui & millepedæ appellantur, sub aquario uase stabulantes, sextarii mensura in fictile uas coniectos, ad carbonem ignitos torrefacito, atq; ubi inalbuerint terito, ac melle excoptos cocto, ante & post cibum duorum cochleariorum mensura delingendos exhibeto. Aliud. Scillæ crudæ succum exprime, & cum eiusdem mensuræ melle permixtum ad prunas decoque, eiusq; cochlearia duo delingenda præbe ante & post cibum, Summè autem hoc prodest, euidentiq; eius rei periculum scèch inquit Archigenes. Aliud, Archigenis. Radicis centaureæ maioris drachmas vi. petroselinii drach. vi. ammoniaci thymiamatis drach. iiii. sulphuris uiui bituminis, cardamomi, radicis panacis, seminis urticæ, iridis Illyricæ, cuiusque drach. ii. thuris, myrrhæ, castorei, nitri, sagapeni, abrotoni, polij, chamæpityos, saluiæ, cuiusq; drach. i. piperis albi drach. iiii. Hæc omnia trita cum melle miscentur despumato, dantur ex hoc oboli iiii. Etenim assidue potatum hoc, quibusdam perfectè medetur, citra molestiâ autem efficax existit, dato hoc cum hydromelitis calidi cyathis iiii. Aliud, quo etiam ego utor, ad multos usus commodum. Scillam fuluam manum magnitudine sua implentem, fermento obducitam, in furnum conijcio ut quàm optimè assetur, deinde ubi mollissima facta fuerit, superficie eius exusta reiecta, reliquum optimè contero, atq; ei quantum trimembri sectione facta, duæ assatæ scillæ partes ponderant, tantum farinæ erui albi adjicio, & ammoniaci thymiamatis drach. iiii. radicis panacis drach. iiii. iridis, & abrotoni, & acori, cuiusq; drach. i. piperis grana x. hæc omnia simul trita & unita in orbiculos digero pondere sesquiobolares: ex eis autem drach. i. aut etiam obolos tres, aut duos, cum tribus cyathis lactis asinini recens multum, aut aquæ mulsæ exhibeo. Pueris uero tantum unum orbiculum præbeo. Aliud hæc mensura mouet: quod si hac amplius quiddam exhibeas, & urinam cies, & compactâ ac instantem mali irritationem dissolues: etenim & comitiales sanæ, & uulnam strangulatâ, & lumborum languidos dolores, & febres debiles ac per circuitum repetentes. Cum aceto menses ducit per crassitudinem suppressos, ad quos consequuntur uertigines, interceptiones uocis, contractiones, dolores articularum, pigricies, & spirandi difficultas. Euestigio enim sanguinem euellit, & ab omnibus molestiis liberat: quare tenuitatem huius pharmaci ne contempnas, sed abundantem uirium eius supellectilem, quasi per manus à maioribus traditam assumes. Alia potio ad suspiriosos. Polij, abrotoni, castorei, chamæpityos, ammoniaci thymiamatis, æquales partes melle excipe, & fabæ magnitudinis exhibe. Quidam spumæ nitri albi cochleare, in aquæ mulsæ cyathis tribus exhibuerunt. Aut hoc modo, Spumæ nitri drach. i. x. piperis drach. i. laferis drachmam unam, da cochleare cum aqua calidâ. Alia. Castorei drachm. viii. ammoniaci thymiamatis drach. viii. piperis grana xl. excipe passo, & fabæ magnitudinis præbe in aqua mulsâ. Alia. Abrotoni drach. ii. radicis bryoniæ drach. viii. rutæ hortensis drach. viii. castorei drachmas quatuor, artemisiæ drachmas iiii. epithymi drach. iiii. dantur ex ea scrupulus unus & dimidius cum aceti mulsi cyatho i. Alia. Iridis drach. viii. ammoniaci thymiamatis drachmas iiii. datur drach. i. cum hydromelitis cyathis tribus. Alia. Herbæ sabina, his qui integra ætate consistunt, scrup. vi. alijs uero scrup. iij. butyri scrupulorum xii. mellis sextantem. Præbe delingendam ad dies iij. & intermissione per aridum facta rursus præbe. Pastillus doloris leuamentum orthopnoicis & agri spirantibus

spirantibus præbens. Opij drachm. i. sulphuris uiui, plantaginis, seminis hyoscyami, succi radicis dulcis, styracis, myrrhe, thuris, terebinthinæ, cuiusq; drac. ii. croci drachm. i. cum uino maris experte contere, ac in pastillos trium scrupulorum digere, quos bibendos exhibe. Porro si radicis dulcis succus non adsit, ipsam radicem fractam ac tusam satis diu decoquito, atq; hoc totum cum decocto eius committito. Alius, Andromachi, ad idem. Scillæ assatæ, sulphuris uiui, bituminis, æquales partes, melanthij drachm. ii. castorei drach. ii. anisi obol. iiii. cum aqua pastillos informa trium aut quatuor scrupulorum: exhibe ante somnum, cum aquæ calidæ cyathis duobus. Catapotium, suspiriosis dolorem leuans. Rutæ uiridis sextantem, styracis sextantem, terebinthinæ sextantem, opij drach. iiii. ex his catapotia siliquæ pondere singula informa; triaq; ante somnum exhibe deuoranda, à sumptione autem ebibant aquæ calidæ cyathos duos. Remedium pulchrum Philagrii, ad anhelosos. Radicum symphyti in petris nascentis, radicis centaureæ maioris, iridis illyricæ, singulorum sextantem: aquæ sextarium i. radices fractas per biduum in aqua macerato, deinde ad tertiās decoquito, & percolato, & tantundem mellis decocto adjicito, rursusq; donec cogatur decoquito: deinde rheii pontici contusi ac cribrati unc. i. inspergito ac unito. Exhibe circa primam horā diei cochlearia duo. Quod si non adsit rheon, centaureæ maioris radicem contusam & cribratam uncia pondere iniice, aut eodem modo radicem symphyti. Hocce pharmacum pulmoni & thoraci firmitatem & robur præbet, simulq; humores ad eum delatos repurgat, desiccet, et expellit. Aliud, ad orthopnoicos. Bolii armenicæ drach. i. cum uino diluto bibendam præbe. Ad tussis autem inde sequentes antidotum, Isotheum appellatam, paulo ante inter tussis remedia descriptam, exhibe ante somnum nucis auellanæ magnitudine cum aqua mulsa. Assiduus enim huius antidoti usus in totum ab hac affectione liberat, etiam si fuerit inueterata: confidenter itaq; ea utaris. Quod si non adsit, pæoniæ antidotum præbe: quæ ipsa quoq; si haberi non possit, eam quæ zopyrios appellatur, quarum descriptiones in sermone De colicis, habentur. Suffusiones etiam eis sunt commodissimæ: de his in tertio Sermone plenissime dictum est, & paulo ante inter remedia tussis. In earum autem usu undiquaq; stragulis contegantur atq; ore sedulo hiantes sumum fortiter admittant: mucus enim & lachrymæ multæ spiritumq; ubertim ducuntur, & per uehementem tussim pituita uiscosa ex profundo effertur. Verum quod latere te nolim, antequam ad eiusmodi rerum ac lancinationum adhibitionem perueniatur, uentrē subducere oportet uel per clysterem, uel pharmacum solutiuum. Prosumt etiam suspiriosis fricationes pectoris, ex pumice cum nitro, fecē uini usta, cum flore iunci odorati. Cuius generis & hoc est. Auripigmenti, pumicis, spumę nitri, cuiusq; unc. i. alcyonij sextantē. hæc contusa & cribrata cum unguento aliquo calorfico commisceto, pectusq; & dorsum donec ignescant confricato, ex frequenti enim huiusmodi perfrictionis adhibitione spirandi difficultatem, et tussim, omnemq; purulentam pectoris affectionem propulsabis. Caterum inueterato malo, & medicina omni frustra adhibita, ad uisionem confugiendum erit: itaq; iuxta medium commissurę clauicularum, utrinq; una crusta inuratur, cum cautione tamen ad motis manibus & distenta cute, ne aspera arteria oblædatur. Deinde aliæ duæ paruæ iuxta carotidas colli arterias infligendæ paululum sub mento utrinq; una, incumbentis cutis tantum perustione facta. Infligendæ autem adhuc aliæ duæ sub mamillas, inter tertiam ac quartam costam: rursusq; aliæ duæ retrorsum uersus inter

Q

sis inter quintam ac sextā costas. In medio etiā pectore unam inurere oportet: & iuxta principium ossis pectoris (quod à capitis gladii similitudine Xiphoides Græcis appellatur) supra os ipsius ventris, unā simili modo. Et adhuc alias duas inter octauam & nonam costam, utrinque unam. Tres etiā retro inurendæ sunt crustæ, una iuxta medium dorsi, reliquæ duæ ab utraque uertebrarum parte, paululum infra mediā crustā. Omnes autem infra collum inustas, mediocriter latas esse conuenit, neque ualde in superficie consistentes, neque rursus nimium profundas. Vlcera autem crustarum satis multo tempore fluida permittere oportet.

De cordis tremoribus, ex Galeno.

Cap. LVIII

Cordis tremor siue palpitatio, multis tum adulescentibus, tum senibus inculpatè sanis accidisse uisus est. Dolent autem caput ita affecti, citra aliquam alteram externam causam; atque omnes hi ex uenæ incisione opem senserunt: aliqui etiā ex eis in totum ab hac accessione sunt liberati, per extenuatorem diætā & pharmaca consimilia, post uenæ incisionem adhibita. Noui autem & ego quendam qui singulis annis, ueris tempore, tremoris accessione afficiebatur. Hunc ubi expertus essem per triennium ex uenæ sectione iuuari: in quarto per uenæ sectionem euasit, antequam hoc malo apprehenderetur: atque hoc modo pluribus deinceps is agebat annis, consentanea simul utens diætā: ueruntamen & is quoque ante senectutem fato functus est, quemadmodum alij omnes. Aliqui quidem in febris acutis comprehensim animo destituti, similiter mortui sunt: aliqui uero etiā citra animi deliquium, stuporis attoniti modo affecti, repente uitam cum morte commutarunt. Plures autem hac affectione laborantes ad ætatem peruenerunt, minorem quidem annis quinquaginta, quadragesimum tamen ætatis annum exceperunt.

De sanguinis reiectione, ex Galeno.

Cap. LIX

Sanguis qui ex pectore & pulmone, aut aspera arteria educitur, omnino cum tussi reijcitur. Si uero ex locis circa fauces aut gurgulionem sanguis feratur, per excreationes excernitur. Si uero ex aliquo loco oris aut gingivarum, simpliciter expuitur. Aliquando autem à capite aut partibus gurgulionis delatus sanguis, ad asperæ arteriæ extremum incidit, et tussim commouet, imaginatio nemque facit uelut ex pectore educatur. Itaque si quis pluribus ex ordine diebus sanguinem excreat & emungat, neque capitis dolore, aut gravitate aliqua que etiamnum adsit, antegressis, neque plaga isthuc illata: considerare oportet diligenter omnem narium meatum, atque etiā oris locum illum ubi nares ad palatum sunt perforatæ. Contingit enim aliquando hæc accessio, hîrudine ad locum huc affixa. Ceterum aliqui per uomitum citra tussim sanguinem ex uentre reieciunt, aut ex uenis adiacentibus in ipsum delatum, aut hîrudine deuorata. Verum sanguis uenarum ex hepate aut splene in uentrem delatus grumofus est, niger que euomitur: qui uero ex hîrudinis præsentia procedit, tenuis est & saniofus, siue ex uentre, siue ex naribus, siue ex stomacho proferatur. Atqui & localis dolor qui concomitatur, affectam particulam ostendet. Si enim ex stomacho educio fiet, non magna sanguinis eruptio continget: graciles enim sunt stomachi uenæ. Sed & cum nausea ac uomitu sanguis effertur, & in deglutendo mordacitas percipietur, maxime si adstringentia aut acris deglutiantur: si uero ex uentre educatur nausea plurimæ comitantur & uomitus, & si à cibo sumpto educio contingat, sanguis cibus permixtus efferetur, aliquando etiā pituita ac bilis si mul euomentur. Si uero ex hepate & splene sanguis in uentrem deferatur, ade-

ritur

ritumor. Si uero ex pectore & pulmone, aut aspera arteria sanguis expuat, impossibile est eum citra tussim per sputum reijci. Fit autem sanguinis educio ex pectore, aut ob uenarum rupturam, aut oris uenarum apertione, aut ob corrosione. Venarum itaq; pulmonis rupturæ cognoscuntur ex eo, quod post aliquam præcedentem causam manifestam, statim sanguinis educio cõsequitur. Præcedentem autem causam dico, delapsionem ex alto, aut si grauius aliquod corpus pectori inciderit. Aliquibus autem ob clamorem magnum quomodocunq; editum uasis uenarum ruptura accidit: & citra manifestam externam causam copia sanguinis cum crudo ac flatuoso spiritu, distendens pulmonis uasa, rupturam efficit. Cæterum ob sanguinis multitudinē factæ rupturæ cognitionē exhibet sanguinis effusio repēte & coaceruatim facta. Magna enim pulmonis uasa existunt, ac arteriarum speciem habentia: sanguis aut in eis tenuis & calidus est, perq; saltum spiritus uī ac impetu excernitur. De uenarum apertione.

Venarum autem ora aperiuntur, siquidem dispositiones præcesserint calidæ: ueluti si calidis balneis plurimis usus sit homo, habitetq; in calida regione, consimili existente maxime anni tempore, cibis quoq; & potibus calidis utatur. Etenim multitudo sanguinis calida existens, uenarum pulmoni incumbentium ora aperit & dilatat, atq; hoc modo coaceruata effusio contingit.

De uenarum corrosione. Quibus uero ex corrosione uenarum pulmonis sanguinis euacuatio contingit, his per interualla modica sigillatim cum tussi expuitur. Ipsa autem uasorum corrosio ex acribus contingit humori bus, siue à capite in pulmonem delabentibus, seu in ipso pulmone generatis. Possibile est etiam propter corrosione, coaceruatam sanguinis educationem cum tussi fieri. Quum enim præcedenti tempore per modica interualla sigillatim, ut dictum est, & cum tussi sanguinem expuerit quispiam: & post sequentibus diebus neq; casus, neq; alia quædam externa uiolenta causa acciderit, & tamen sanguinis eruptio multa prodierit, magnam corrosione factam esse ostendit. Multi autē hoc modo affecti particulas pulmonis simul cum sanguine extulerūt, aut tectoria ulceribus obducta. Impossibile itaq; est latere educationē propter corrosione uenarum factam. Quare diligentem animaduersionem habere conuenit, num ne spumofus sit sanguis: nam & hoc firmissimum signum educationis ex pulmone existit: deinde num ne bronchi particula quædam, aut tuniculæ arteriæ seu uenæ simul efferatur. Horū enim nihil apparet in his, qui ex succingente thoracem membrana sanguinem spuendo educunt. Maximū etiam signum elationis ex pulmone est, si omnino citra dolorem effertur.

De educatione sanguinis ex alijs pectoris partibus. Sanguis autem qui ex alijs pectoris partibus educitur, nigrior est, et iam in grumos coactus, cū tussit etiam & dolore reijcitur particula affectæ, ac foetidum odorem de se præbet: aliquādo et pure ammixto effertur. Verum hoc signū cõmune est. Si uero iuxta asperā arteriā ulceratio fiat, paucissimus sanguis expuitur, paucissimo omnino pure permixtus, doloris autem sensum iuxta exulceratam arteriæ partem eger perceptat. De sanguinis à capite educatione. Si uero à capite sanguis deferatur, siquidem plurimus sit, plurima adest capitis grauitas aut dolor: si paucus, pauca, aurium sonitus iuxta proportionem affectionis, rubor faciei: uenæ frontis emicant, & uertiginēs accedunt, causa aut ista præcedens manifesta est, nimirum plaga, aut frigiditas, aut calor aut ebrietas. Vini enim potatio larga cumulatim caput replet, & cumulatim etiā ex rupto uenæ uase effundit. In parua autem ebrietate, modicum adest sanguinis sputū, & consueta fieri per

nares sanguinis excretio cohibetur: aliquādo etiam ad palatum cōuersa, imagi nationē exhibet, ueluti ex pectore sanguis ipse educatur. Si itaq; à capite sanguis deferatur, titillatio palati accidit, & frequens excreatio, atq; hoc modo expuunt: irritantur enim ad tussim, & tamen nō ualde tussunt. Si autē à palato ad asperam arteriā destillat, tum tussunt, & quod delapsum est educunt: & ob id quidam decepti, ex pectore educationem fieri autumant. Desluit autē aliquando à capite per gulam seu stomachum in uentrem, uomituq; reijcitur, atq; ob id putatur à stomacho prodire. Habet autem & suam figuram sanguis à capite delapsus. Est enim non adeo crassus, colore nigro, leuis, æqualis, immixtus, altero uidelicet aliquo, pure uel pituita, & cum excreatione statim se in linguam infert rotundus, facileq; reijcitur per sputum. Si uerō palatum cōsideraueris, densius atq; uelut exulceratum ipsum inuenies, & ut plurimū sanguinolentū, propter destillantē ad ipsum à capite sanguinē. Curatio autē his qui sanguinem à capite educunt, sufficit simplicior & exigua. Adstringentia enim per collutiones palato adhibita frigida sufficiūt: nam à calidis & rarefacientibus collutionibus plus sanguinis erumpit: quare signum id est adeo à capite prodeūtis educationis. Si itaq; à capite feratur, multumq; sit quod defertur, euacuatione opus erit. Quare citius per nares aut per uenā alicuius incisionem euacuare oportet, ne per negligentiam consuetudo fiat sanguini in hos locos delabendi.

Curatio eorum qui ob destillationem sanguinem expuunt. Cap. Lx
 Qui ob destillationem sanguinem expuunt, his uenam incidere oportet statim in principio, acri simul clystere adhibito & euacuata aluo: deinde confrictis quā plurimum manibus, brachijsq; ac cruribus per pharmacū calefactiorium ac extenuatorium, extremæ eorum partes colligentur: postea uero capiti raso pharmacum ex stercore syluestrium columbarum impone, & post horarū trium interstitium in balneum deducito, citraq; capitis cum pinguedine contactum lauato: post uero capite mediocri pileo contacto, forbitione multa ex foliis austeris pomis connutrito: deinde dormire uolenti, theriacen Andromachi ex uiperis recens adparatam exhibeto. Sequenti autem die omnibus corporis partibus capite tantum excepto, confrictis, in quiete adseruato, rursusq; in uesperam theriacē exhibeto. Quo si ex his destillatio sistatur, tertia die mane mel parum coctum præbeto, quiescereq; finito, ac totum corpus defricato. In cibo exhibe ptisanā succum, modicumq; panem madefactum. Quarta autē die mane post acceptum ex uiperis pharmacum, rursus plurimum mellis præbeto, capiti simul pharmaco ex stercore columbino imposito. Deinde lotis & medicriter nutritis, quinta die ea quæ humores qui in pulmonem defluerunt, uehementer repurgare queant exhibeto. Post uero per interualla ad caput cerato ex thapsia apparato utaris. Vniuersam autem curationem renutriendo ac refocillando corpori destinatam impendito.

De his qui ob frigiditatem organorum respirationis sanguinem expuunt, ex Galeno. Cap. Lxi

Qui uero ob frigiditatem membrorum respirationis, ruptis pulmonis uenis, sanguinem expuunt, his euestigio uenam secare conuenit, secundaria facta de tractione eadem die, & postridie similiter, uidelicet ut paulatim euacuationem faciamus, & ut ad contrarium diuersio fiat, quam antispasin Græci appellant. Eius enim gratia uenæ sectio adhibetur. Deinde fricatione extremarum partium, & ut dictum est, ligatione facta, in uesperam ex seminibus pastillum exhibeto. Sequenti uero die post repetitā sanguinis detractionem, uniuerso pectore
 ri cera

riceratum ex thapsia imponito: quod in uesperam rursus ne ulterius quam conuenit calefaciat, detrahito, atque iterum pastillos ex seminibus dato. Tertia autem die ex thapsia ceratum ad horas circiter tres rursus imponito, hominemque lauto. Cibum autem præbe primis diebus sorbitionem, tertia autem ad succum pti sana, pisces qui facile concoquuntur probeque conditi sunt adde: ante somnum etiam rursus pastillum ex seminibus exhibe. Nam & somnum conciliat, & dolores leuat, & exiccat. Inflammatione autem ruptarum uenarum sedata, & pariculis ad bonam temperiem reductis, ea quæ thoracem repurgant præbe, adhibito simul usu theriacis ex uiperis apparatus. Deinde etiam lactis potu aliisque cibis utaris. Hoc modo sanæ eos qui se mox eodem die medicandos exhibent poteris curare, non tamen similiter qui post duos aut tres obueniunt dies. Aliqui enim eorum immedicabile ulcus habent, maxime qui per uitiosos humores erosionem sunt passi. Quorum aliquibus sputum ipsum sanguinis aut murtæ saporem exhibere referunt.

Curatatio eorum qui iuxta alium quemcunque tandem modum ex pulmone sanguinem reieciunt.

Cap. LXII

Difficiliorem autem curam ulcera in pulmone consistentia habent: conari itaque oportet, quemadmodum nos fecimus, ita ut egro præcipiamus, ne respiret ualde, & ut sileat semper. Incidere autem statim uenâ oportet in cubito internam, ac sanguinis detractionem reiterare, bis aut etiam ter, paulatim, gratia diuertendi. Non enim euacuatione indigent tales, nimirum ab affectione ipsa euacuati. Quapropter etiam frictionibus utantur, aut etiam totius corporis membrorum cum latis linteolis constrictione. Posteaquam uero hæc exacta fuerint, primum quidem poscam dilutam & tepidam bibendam exhibere conuenit: ut si quis sanguinis grumus in uiscere hæreat inde dissolutus eiciatur, neque quicquam obstat bis & ter in tribus horis hæc potionem iterare. Post hæc autem phar-maca inductoria & obstruendi meatus uim habentia, simulque adstringentia exhibeantur, aut ex posca diluta in prima sanæ die, aut ex decocto malorum, aut bac-carum myrti, aut alterius cuiusdam adstringentis. In uesperam uero rursus exhibendum est pharmacum: abstinereque æger ab omni cibo, si uirium robur ad-sit: sin minus, satis erit sorbitionem præbere. Optimum autem est & secunda die rursus parum sanguinis detrahère ex eadem quæ prius incisa est cubiti uena, si modo uires ad id tolerandum sufficiant. Cibis etiam & pharmacis similiter utèdum usque ad diem quartum, pectore in orbem madefacto, æstate quidem ex uino, oleoque melino & rosaceo, hyeme uero ex unguento nardino. Si uero emplastris uti uelis, optimum pharmacum nostrum Barbarum appellatum habebis, Conducit etiam reliqua ex bitumine, aceto & pice apparatus, & maxime quod ex salicibus, & quod ex lolis constat. Maximè enim hoc est, cui diligenter attendere animus oportet, ac mox facta uasorum ruptura inde remedium offerre incipere, quo cruentum adhuc uulnus concreseat, prius quam inflammatio apprehendat: etenim si inflammatio præuenierit, parum spei est ad huiusmodi uulneris conglutinationem, quippe quæ se in multum tempus extendit. Eluere enim oportet, tum pus, tum serosum sanguinem ipsius ulceris postea quam inflammatio fuerit soluta: reliquam autem curam quemadmodum ad tabidos fieri solet ordinare. Ex Archigene. Porro si à stomacho aut uentre sanguinis reiectio nes cum uomitu procedant, uena incidenda est in cubito superior, humeralis appellata, etiam si ex hepate in ipsum uentrem deferatur. Si uero à splene sanguis feratur, quod ex tumore circa splenem confidente cognosces, incisa uena quæ

Q 3 inter

inter paruum & anularem digitum in sinistra manu est, probe ac proprie auxiliaberis. Ceterum & cibos & potus magis adstringentes dare conuenit his, qui ex uentre per uomitum, citra tussim sanguinem reieciunt, non tamen uehementer & actu frigidos: Ex uehementi enim frigidityte plagæ inferuntur: Quare suffecerit, si non calidi existant, neque nimiam humectationem inferant. fontana igitur aqua, non ualde frigida, neque multa, in potu exhibeatur: Et cibi paucissimi, mediocriter frigidi, ac naturæ quoque adstringentis.

Communes methodi exhibendorum auxiliorum, in singulis reiectionis sanguinis speciebus post sanguinis inhibitionem.

Cap. LXIII

Ex Galeno. Primum periculum in reiectione sanguinis, est ne ultra modum eius euacuatio fiat. Curatio autem post eius cohibitionem eiusmodi existit. Reiectionis quidem sanguinis quæ ob apertionem fit uenarum, per obturationem occlusionemque dilatati oris ipsius uenæ curatur: quæ uero ob uenæ rupturam fit, per conglutinationem sanatur: quæ ob corrosionem, per renutritionem, & ea quæ carne implent corrosa. Obturatur quidem dilatatum & apertum os uenæ ab adstringentibus. Conglutinatur autem rupta uena ab hisdem, ac quæcunque in compositione eis ammixta citra mordacitatem desiccant, ac glutinosum quiddam in se complectuntur, uelut est lemnia terra, & quæ famulus alter appellatur. & his similia. Renutritur autem corrosum à cibis boni succi, & pharmacis carne explentibus, siue sarcoticis à græcis appellatis. Conueniunt igitur adstringentia eis qui non tussunt, qui corpus boni succi habent, & qui ob apertionem oris uenarum, aut rupturam sanguinem reieciunt. Adstringit autem optime acetum, & portulaca comesta: succus autem eius bibitus efficacior existit: plantaginis succus cyathis tribus, aut sanguinariæ succus eodem modo: Succus uix acerbæ in sole probe desiccatus drachma una, rhois aut gallæ decoctum cyathi mensura, cortex glandis maxime castaneæ drachma una, radicis rubi decoctum mensura cyathorum trium, mora rubi, & flos, balaustrorum drachma una, acacia & hypocisthis eodem modo. Vinacea cochlearij mensura, similiter lapathi acuti semen. Efficacius autem operatur radices althææ decoctum, radices symphyti decoctum, atque ipsa quoque sicca trita potui inspersa, centaureæ radices drachmæ duæ, quas febricitantibus cum aqua, febre carentibus cum uino exhibebis: lapidis hæmatitæ drachma una cum mali punici succo, aut corallij lapidis eodem modo, radix equiseti. Mora ualde cruda & immatura. Forinsecus autem pectori irrigatio adhibenda ex uino adstringente cum oleo rosaceo aut myrteo. Si uero multa sanguinis eruptio fiat, maxime in æstate, & citra tussim eius reiectiones contingant, neque debilis sit æger, sed robustus & carnosus: Acetum pro uino adhibendum est, non in sordidis amplius laenis sed spongijs exceptum, fasciæque lata æger conuinciendus. Aliquando autem acaciam, aloë, aut omphacium aceto permiscere conuenit, & cutem ex oleo myrteo præillinare, ne mordacitas ex irrigatiōe succedat, aut etiam Emplastrum Barbarum, aut ex salicibus, aut aliud simile impone. Quod si æger ferre nequeat ex irrigatione prouenientem iniucunditatem & molestiam, neque toleret item emplastrorum incommoditatem, huiusmodi cataplasma est admodum: ex palmis uidelicet & acacia, alumine, malicorio in puluerem redactio, symphyto, polenta aut lentium farina apparatus. Si uero neque cataplasmatum grauitatem ferre queat, neque cal fieri sustineat, illitionibus utendum. Lotitaque aut mespili corticem, & rhoë culinariū, paucaque rhamni, aut sanguinariae folia

riæ folia in aceto decoquito; deinde in eo decocto aloës succum, aut acaciæ, aut
 omphaci, paucumq; gummi diluito, & pectus ac dorsum ex eo illinito: atque
 ubi exsiccatum fuerit, rursus inungito, quo crassitudinem accipiat illitio seu un-
 guentum, & ne denudati frigore circumueniantur. Illa uero hora qua arescit il-
 litum, ab agro multus aer est arcendus. Quod si inflammationes succedentes fe-
 bres inferant: solent enim uehementer acutæ irruere & periculosæ, aliquando
 etiam lenes & obtusæ, quum uidelicet in tabem sunt transituræ: tum omnis ue-
 luti in febribus est ordinanda diæta: non tamen acruatim, sed quiete & paula-
 tim: ut ne rursus rumpatur conglutinata, abstinendum à uino & sorbitionibus
 ammiscenda quæ leniter adstringunt, uelut sunt palmæ, & similia, Cataplasma-
 te uendū pane calido, deinde semine lini. Vbi uero perseveret malum, omnia
 ut ad tabidos facienda. Exsiccatoriam porro citra mordacitatem uim obtinet:
 succus ocyimi, qui si aceto commisceatur convenientior fiet, & est quoq; nobis
 in usu familiaris, citraq; formidinem eum porrexeris. Adstringit autem & de-
 siccatur simul, rheon ponticum. Assumere autem oportet hanc ipsam ponticam
 radicem ad recentes ac inueteratas sanguinis reiectiones, & ad pectoris flux-
 uiones, in principio quidem ex posca decoctam. Si uero per circuitus redierit
 reiectio, omnino parum quiddā bibendum præbe cū aqua. Quum uero aspe-
 ritas & tussis molestiam intulerint, passo cretico decoctam, deinde contritā præ-
 be. Magis autem desiccatur arefacta in potum inspersa. Exsiccatur etiam citra mor-
 dacitatem, samius aster, & minium sinopicum, & terra lemnia bis in die data
 drachmæ pondere ex aqua. Citra mordacitatem etiam & præclare omnino de-
 siccatur bolus armeniacus, ut nihil eo hac parte præstet: eius itaque drachm. i. ex-
 hibere potes cum aqua confidenter. Exsiccatur etiam coagulum hœdi, cerui ue-
 ro magis inspissat. Quod si stomachus æger sit, semel exhibe quod adstringit, et
 semel quod desiccatur. Aliquando autem mane adstrictorium damus, circa sextā
 autem horam desiccatorium: in uesperam uero quod inspissat. Quando uero
 inspissantibus opus fuerit, amyllum detur, & gummi, ac tragacanthus, quodlibet
 per se, atque etiam inuicem permixta. Simplicia ad sanguinem reijcientes
 pharmaca. Huius generis inspissantiū uidelicet, est & gluten piscium, & sym-
 phytum manducati ac deuoratum. Cibos etiā eiusdem cum prædictis pharm-
 acis facultatis exhibere oportet, tum his qui propter apertionem uenarum, tum
 qui ex stomacho sanguinem reijciunt: nimirum adstringentes, uelut est halica
 ex posca, aut mica panis eodem modo, aut oryza, oua mollia, rhoem culinariū
 tenuissime tritum infarctum habentia, plantago cocta, intubum, lens cum præ-
 dictis condita, aut lapathum acutum: in quibus uero inspissante materia magis
 opus est: lac coctū refrigeratur, daturq; tum ob corrosionem, tum à stomacho
 sanguinem educentibus. Hi enim adstringente materia & carnis expletione
 opus habent: aliquando autem lacti cocto amyllum infarcitur, ac modicum om-
 nino coaguli. Cauere enim oportet immodicum eius usum, neque statim post
 eius admixtionem lac ipsum exhibere, sed post aliquantulam dilationem: ual-
 de enim in uentre cœcretum mortem inferre consueuit. Conducit etiā palmas
 cum halica decoquere aut cum similagine. Inspissant autem simulq; adstringunt
 oua crassiora rhoem infarctam, maxime si sint affata, lens cū ptisana decocta, miliū
 coctū. Fugienda autē in omnibus uehemēter adstringentia, & excellēter inspis-
 santia. Eligēda uero simpliciora & minus molesta ex uniuerso genere eorum
 quæ sunt prædicta. De cōpositis ad sanguinem reijciētes pharmacis, Galeni.
 Iuxta primam quidem rationem ex adstringentibus & desiccantibus ac in-
 spissan-

spissantibus pharmaca componuntur ad curationem reiectionis sanguinis
convenientia. Quum uero adstrictoria, & tenacia ac desiccantia, uias præclu-
dant, & difficulter per corpora digerantur, ui quadam opus habent præpara-
te ac aperiente eis uias ipsas: & ob hoc ipsum calida & tenuium partiū eiufmo-
di pharmacis miscentur, quæ iuxta omnem ipsorum considerationem contra-
ria sunt sanguinis sistendæ reiectioni. Miscentur etiam eis stuporem inducen-
tia, quo profundior somnum inducât: quæ sanè commodissima sunt his qui
à tulle lancinantur omnibus, maxime tamen qui simul sanguinem reieciunt.
Hi igitur scopi sunt compositionis pharmacorum ad sanguinis reiectionē con-
uenientium: quæ uero per experientiam cognita sunt à priscis medicis compo-
sita pharmaca deinceps dicentur. Potio hæmoptoicis commoda. Lapi-
dis corallij, terræ samiae quæ aster appellatur, succini, mastiches, cuiusq; drach.
vi, amyli, thuris, gummis, cuiusq; drach. iiii, Exhibe cochlearium unum siccū
cum posca, aut cum aliqua prædictarum decoctionum. Alia potio. Terre
samiae asteris, lapidis agerati, terræ lemniae, æquales omnium partes accipe, &
ex eis cochlearium unum præbe cum cyathis duobus decoctionis plantaginis.
Alia. Terræ lemniae drach. xvi, terræ asteris drach. viii, sarcocollæ drach.
iiii, gummis drach. ii, præbe cochlearium cum decocti palmarum cyathis duo-
bus. Sit autem decoctum ipsum crassum. Alia, Andromachi. Coral-
lij torrefacti drach. i, thuris obol. iiii, acaciæ drachm. i, balaustiorum obolos v.
gummis obol. ii, candidum ouorum duorum. Huius quartam partem cū aquæ
cyathio uno & dimidio exhibe. Alia, Asclepiadæ. Radicis sanguina-
riæ manipulum, radicis symphyti tantundem, rhois rubri acetabulum, aquæ se-
xtarios iii, decoque ad tertias, & expressi, ac percolati liquoris cyathum unum
præbe, & ad singulas exhibitiones gummis triti drachm. i, conijce. Alia, ual-
de præstans, cui testimonium præbeo. Thuris, terræ asteris, cuiusq; drach.
viii, croci drachm. i, amyli drachm. i, succi plantaginis sicci drach. i, contuso-
rum & cribratorum cochleare unum dato cum posca. Alia, per experien-
tiam. Corallij drachmas octo, thuris drachm. viii, dato cochlearium cum
uino myrtiæ diluto. Eadem etiam ad fluxum muliebrem efficax est.
stillus ex electro. Præclare facit ad hæmoptoicos undecunque sanguis effusa-
tur, ad tussim ueterem & recentem, tabidos, cruenta reiectantes, suppurationē
pectoris, tormina intestinorum, uesicæ fluxiones, & ad inflatos: est etiam au-
rium affectionibus commodus. Psyllij drachmas quadragintaquinque,
ramentorum electri, iridis, mastiches, croci, cuiusque drachmas quatuor, opij
drachmas quindecim. Psyllium in aquæ calidæ sextarios tres coniectum, pa-
rumper macerato: atque ubi uiscosum ac lubricum factum fuerit, liquorem
inde exprimito, eoq; præscripta diluito: terito, ac pastillos informato. Ex his
obolos tres cubitum ituris exhibeto. Pastillus Dosithei, ualde celebris.
Virgultorum rubi sextantem, radicis symphyti, fructus spinæ ægyptiæ,
succu hypocisthidis, lycij, opij, thuris, rhei pontici, terræ asteris, singulorum
sextantem, rhois culinarij quadrantem, rosarum siccarum drachmas quatuor,
baccarum myrti quincuncem, croci, terræ lemniae, corticis qui macer appel-
latur, cuiusque drachmas duas. Excipe succo plantaginis, aut uino scybelite,
& informa pastillos. Eos cum decocto symphyti aut sanguinariæ exhibeto.
Alius pastillus, ex cuius usu magnam nominis famam sum adeptus.
Terræ asteris quadrantem, amyli recentis quincuncem, tragacanthi, selisquid
unciam, gummis quadrantem, glutinis piscium unc. i, aceti quātum suffecerit.
Gluten

Gluten more eorum qui arcus faciunt dissoluto, per triduum in sufficienti acetone maceratum, quarta deinde die exemptis ex eo pelliculis repurgatum paulatim tolle, & in mortario cum pistillo contunde, & quam diligentissime dissolue, aut super calidum cinerem pone. Difficulus enim solubile existit. Vbi uero solutum fuerit, rursus in aere, aut ferro, aut ut dictum est, cinere calido cum aceto decoque, et sufficienti tempore assidue agita, ut quam crassissimum fiat, deinde in mortarium coniectum satis diutere. Atque unum quodque prædictorum per se contusum ac cribratum in promptu habens, maxime tamen tragacanthum, in mortarium ad dissolutum gluten insperge, omniaque diligenter unita vitreis lancibus solidis excipe & exicca, pastillosque informa mediocres. Durant autem aliquandiu donec formentur. Eos cum posca exhibe, & utere ualde confidenter.

Pastillus ex Corallio, qui nunc celebris & in usu apud omnes empiricos existit. Terræ asteris, balaustiorum, corallij, succi hypocisthidis, acaciæ, myrrhæ, rhei pontici, dauci, omphacij, tragacanthi, cuiusque unc. i. thuris sextanrem, opij drach. iiii. amyli scrupul. vi. aluminis scissi scrupul. xii. terræ lemnisæ scrup. vi. rhois rubri quadrantem, radices dulcis sexuncem, symphyti radices trientem, gummis scrupul. xvi. croci scrup. vi. fructus spinæ ægyptiæ drachm. iiii. Digere in pastillos cum succo plantaginis, aut uino austero uetere, & exhibe ante somnum obol. iiii. cum posca. Facit etiam ad tormina intestinorum.

Pastillus ex ægyptia spina, quo plurimum utor. Pharmacum Clidion appellatum, quod prospere omnibus sanguinem reiicientibus conducit: itaque cœliacis, intestinorum torminibus, & stomachi fluxionibus, cœtinorum, fructus spinæ ægyptiæ, balaustiorum, acaciæ, succi hypocisthidis, singulorum drach. vi. lycij, rhei pontici, opij, cuiusque drachm. iiii. myrrhæ drach. iiii. Contusa & cribrata diligenter baccarum myrti aut rosarum decocto excipito, aut uino myrti, & in pastillos redigito, & iuxta cuiusque uires cum rosarum, aut baccarum myrti, aut pampinorum uitis, aut palmarum decocto exhibeto, aut cum frigida aqua. Quod si lycio, non abundes, hoc modo apparare potes. Rhus, quæ cœtinorum tinctores utuntur in quadrupla aquæ portione ad triduum maceratur, uirga frequenter agitata: quarta autem die decoquitur usque quo aqua ipsa rhois comam exæquet. Et tunc quidem rhus expressa abijcitur: aqua uero percolata, donec in mellis spissitudinem cogatur decoquitur, atque ita pharmacis adijcitur. Quum uero bibendum præbes hoc prædictum pharmacum, spongiæ posca madefactas stomacho aut pectori impone: atque ubi restiterit sanguis, peccus aut locos fluxione laborantes ex omphacio in aceto diluto & aliquantulum tepefacto inunge. Conuenit etiam sanguinem reiicientibus pastillus Philippi, qui in tractatu De intestinorum torminibus describetur. Potio ad sanguinem reiectantes. Succus saluæ cyathos ii. mellis unciam unam, exhibe ieiunis in potu, & euestigio sanguinem sistes. Quæ grumos sanguinis concretos dissoluant. Sanguinem in grumos concretum lixiuium ex cinere fici, & uitis, & quercinum dissoluit, similiter etiam thymus & saturcia, cum aceto. Coagulum leporis aut hœdi, ciceris magnitudine ex aceto: Itaque mox ubi quis ex alto ceciderit ac sanguinem reiecerit lixiuium per se bibendum exhibeto, aut cum modico aceto. Cap. LXIIII

Quæcunque in aspera arteria ulcera fiunt, iuxta pelliculam eam intus amolientem, & maxime prope eius extremum, aut in ipsa adeo arteriæ extremitate, sanabilia omnino existunt. Et nos non paucos hoc modo affectos curauimus. Reijciunt autem per sputum purulenta pauca ac cruenta, aliquando etiam tectoria quædam

quædam ulceri obducta, sensusq; doloris ab eis manifeste percipitur iuxta exulceratum locum. Hos itaq; in quiete adseruare oportet supinos reclinatos, atq; ijs quæ capiti subiiciuntur sublimius instratis. Admonere etiam ut quantū possibile sit renitentur, & Ne tussiant: Deinde forinsecus loco affecto desiccantia imponere. Veluti sunt Emplastra Barbarū, Ex salicibus, & ex lolijs adpellata, ac eis similia. Pharmaca autem eis exhibenda sunt, quæ supra ad ulcera inter arteriaca, & ad pectore suppuratos sunt descripta: Quæ etiam sub lingua detinere conuenit, ut paulatim liquefacta in asperam arteriam delabantur: Tum uero maxime obniti & non tussire. In potu autem exhibendum est lac quotidie recens mulctum ab adstante adhuc animali: adiiciendum etiam melis quiddam his qui lac difficulter concoquunt, & quibus in casei modum in uentre concreuit.

De pectore suppuratis, ex Archigene.

Cap. LXV

Empyici, hoc est pectore suppurati uocantur, quibus abscessus in succingente costas intrinsecus membrana, aut in aliqua alia pectoris pellicula factus, ac uatim ruptus est, & in uacuum pectoris locum effusus, inter pulmonem & membranam costas succingentem. Qui si non quàm citissime per sputum reijciatur, Tabidi fiunt, febricitant autem pectore suppurati indefinenter hecticen, hoc est habitualement febrem. Rumpuntur autem suppurationes, aliquæ quidem sursum uersus, aliquæ uero deorsum. Quæ deorsum rumpuntur, in aluum & intestina ac uelicam transfunduntur, per uasa quædam transmissione ad ea membra facta. Quæcunq; uero sursum rumpuntur in uacuum uidelicet thoracis locum, periculosiores existunt. Cognosces autem suppuratos hoc modo. Quum lateris dolor præcesserit, deinde uehementes febres quieuerint, & ex magna parte quoq; dolor, grauitatis aut sensus remaserit intus in lateribus in profundo thoracis, simulq; transfluere aliquid appareat, iuxta multiplices reclinationis permutationes, & maxime quum ab uno latere in alterum decumbunt: tunc sane multitudo puris manifestatur, & fluctuationis cuiusdam sonitus saepe sensibiliter in reclinationibus ipsorum auditur. Cognoscitur itaq; suppuratio facta tum ex prædictis, tum quod nihil relatu dignum per sputum reiecerunt in eo qui præcessit uehementi lateris dolore. Nouimus autem quosdam citra febrem suppuratos, ex seroso aut pituitoso humore ex reliquo corpore in uacuum thoracis delapso, isthicq; putrefacto. Itaque quibus ex gymnasiarum exercitijs, aut ex casu aliquo saepe sensibilis cõuulsio facta est, quæ dolorē circa profundū thoracis intulit, Nitrum, acetū, et oleum cyprinū coniiciantur, his addatur Rosmarini semē, Canchry appellatum large probeq; cōtritum, aut pyrethrum eius loco, seu staphis syluestris: hæc simul calefiant, deinde excolata ipsis locis ex lana succida repletis irrorentur, aut cum lana imponentur. Vtilis enim hæc irrigatio existit, saepeq; sola malū omne discussit. In quibus aut inflammatio præcessit, uel tro uenā cubiti incidere oportet, si nihil prohibeat, & mediocriter euacuare, ut alleuatio tantū aliqua cōtingat. Nutrire uero ex pituitosa succo et aqua mullā, excretionem cōsulendo, et in quiete diligēter custodiendo. Ac primū quidē ex oleo pingui irrigationes lana cōuoluta exceptæ ac impositæ cōducunt. Quod si febris absit passum etiā moderatū cum multo oleo cōmiscetur lanaq; succida excipiat. Hæc enim irrigatio in his qui febre carēt usq; ad tertiā sufficet diē. Si uero febres simul adsint, et ruptura cōsequatur ipsius puris: Rutaceo aut anethino oleo sceniculū aut flos cypri madescat. Aut quod magis ad hanc rē cōueniet, ipsi oleo incoquantur, cū radice maluæ, Coneniētius est aut oleū cyprinū, cū spissamento

famentis apparatus. Hæc autē calefacta & lana molli excepta imponantur. Post hæc autem cataplasmata adhibere conuenit ad febres quidem sedandas, ex pane in aqua mulla decocto, uiridi apio, aut fœniculo, simul decoctioni iniecto, aut apij aut fœniculi semine insperfo. Commodius autem ad hæc butyrum pro oleo adijcitur. Deinde cataplasma quoque ex semine lini adhibeatur: quod si maius malum sit, etiam scœnum græcum addatur. Quod si frigiditas suppurationis causam præbuit, irionis etiā semen cataplasmatibus indatur. Tardantibus autē suppurationibus, ordeacea farinae caricas coctas addere oportet, & althææ radicem, terebinthinamq; resinam ac sterces columbinum. Fit etiam ad tardantes rupturas utile cataplasma ex solo stercore caprino, quod & collectionē maturat & discutit. Optimum etiam discussorium est ex lolij cataplasma si bitumine permisceatur. Ablatis autem cataplasmatibus, ceratis affectæ partes contendantur ex butyro apparatus, & habentibus quoq; admixtam irin, parum de bacis lauri, & rutam. Etenim ad hoc quod à frigore tutantur, adiuuant etiam reiectionem. Tempore reiectionis congruit emplastrum ex succis constans, & mnafeæ, & simpliciora melina, postea uero icelij & quod ex lolij apparatus. Si uero fluxus timor imminet, id quod Thrafeæ appellatur erit aptū. Ego uero assidue eo quod ex syluestri cucumere constat utor, omnium enim efficacissimum existit, præscriptum autem hoc est in anhelosorum tractatu. Adiuuare igitur oportet puris excretionem quocunq; repere cognoscatur. Quod si ad aluum proruptet, magis emollientia sint ea quæ offeruntur: si uero ad uellicam ferat, ea quæ urinam magis cient adhibenda. Si uero per tussim puris repurgatio fiat, nihil convenientius aut familiarius exhiberi potest quam ptisana optimo melle permixta. Cæterum ea quæ urinam cient cibis commode ammiscantur, undecunq; tandem puris excretio contingat. Commoda est etiam faba cocta in omni suppuratorum differentia exhibita, si ei parum ex seminibus erui maceratis, et duplici ex aqua decoctione dulcoratis adijciatur. Alij comestio quoque utilis ad repurgationē existit. Inter potionū genera simplicissima est aqua mulla cum iride & plurima radice dulci decocta, utilis est et radicis dulcis succus commanducatus & cum ammixto sesamo temperatus. Conuenit etiā hyssopum aqua mulla decoctum. Eclegma autem prodest hoc, Nucum pinearū tum quæ pityides, tum quæ strobili appellantur, amygdalarum amararum, seminis lini, amyli recentis, æquales partes, mellis quantum suffecerit. Optimum autē est & piperis parum ac seminis irionis addere. Quod si tussis infestet, butyrū recens tepidū cum melle tepescitū delingendum præbe. Aliud eclegma. Internos abscessus repurgans, ut etiā pelliculas maximas educat. Cardamomi, drach. viii. sagapeni, drach. iiii. myrrhæ, drach. iiii. opij drach. ii. castorei drach. ii. piperis, drach. i. cū aqua in pastillos duorū obolorū pondere redige, et cum aqua calida pastillum unum pro una uice exhibe. Thespiana ad internos abscessus. Seminis apij, drach. iiii. opij, drach. iiii. melanthij, drach. iiii. castorei, drach. ii. seminis dauci, iridis, sinapis, cuiusq; drac. vii. excipe melle cocto, & præbe nucis auellanae magnitudine ex aqua. Eclegma ex eruo. Suppuratis commodum. Erui madefacti & inde torrefacti, decorticatiq; & in farinam redacti, drach. viii. nucum pinearum drach. viii. amyli, drach. vi. piperis, drach. v. succi rutæ, drach. i. mellis cocti quantum suffecerit. Eclegma magnum ex marrubio. Spicæ nardi, piperis, succi marrubij, cuiusq; unc. i. mellis, libras. i. uini ueteris dulcis, libras ii. Succum cum uino & melle decoque. atq; ubi ea coacta fuerint, sicca cōrussa & cribrata insperge, ac simul unitis utere. Aliud.

Aliud. Amomi, sextantem, caliae, quadrantem, styracis calamitae, sesquiunciam, spicis nardi, sesquiunciam, croci, unc. i. piperis unc. i. nasturtij, drachm. iiii, thuris, drach. iiii, mellis libras iii. utere ut optimo. Antidotus Pancrestus ab omnimoda utilitate appellata. Conducit tussi antiquae, suppuratis, orthopnoicis, tabidis, praecordiorum distensionibus, & omni inflationi. Mouet menses foeminarum, & quae ex abortu aut partu relinquuntur, secundas etiam ac partus educit. Et uesicae abolet affectiones, Terebinthing, drach. viii, styracis, drach. vi, myrrhae, drach. v, croci, iridis, galbani, cuiusque drach. iiii, seminis hyoscyami, corticis mandragorae, irionis torrefacti, opopanax, cuiusque drach. ii, piperis, drach. i, spumae nitri drach. i. cum passo coque in pastillos, ex quibus obolos ii. cum aquae mulsae cyathis iii. praebe. Alia antidotus Aristarchi, Paulina appellata. Vim habet admirandam. Prodest tussientibus, reiectantibus sanguinem, tabidis, suppuratis, pulmonis abscessibus, conuulsionibus, & rupturis: ad stomachi subuersiones, bilis per uomitum ac secessum eruptiones, coeliacos, dysentericos, uesicae affectiones, uteri stragulationes, & ad febres per circuitum repetentes, una hora ante exacerbationem exhibita. Facit & ad malum habitum corporis, & ad eos qui alimentum non sentiunt, ad exitia pharmaca, & uenenatorum morsus. Habet autem hoc modo: Cinamomi, costi, galbani, castorei, opij, piperis nigri & longi, styracis, singulorum unc. i. mellis sextarium i. Sicca contundito ac cribrato: galbanum autem cum modico melle decoquito ac excolato: deinde omnia simul unita in uase uitreo reponito, ac fabae aegyptiae magnitudine exhibeto cum aquae mulsae cyathis duobus, irrorato de pollice modico aceto. Vtere etiam his quae ad tabidos describemus. Exhibe quoque confidenter antidotum Isotheum appellatum, ad tussientes supra praescriptam. Licebit et pagonia appellata antidoto uti, quae in Sermone tertio et decimo cum alijs multis usibus antidotis describetur. Farinas quoque apparare conuenit ex eruis albis madefactis primum, deinde rescicatis ac decorticatis & mola tritis. Haec enim farina & lacti dum decoquitur adijcitur, ammixto etiam melle, & uehementer commoda redditur. Admiscetur etiam alijs sorbitionibus: & elegmata ad difficulter purulenta reijcientes apparata, ex hac confiunt. Commodum est autem & amygdalas amaras delibratas sorbitionibus infarcire. Facilem autem puris reiectionem facit porrum capitatum cum sorbitionibus decoctum, atque etiam per se aquae incoctum, & in cibo acceptum. In potu aqua offeratur probe cocta: si uero uino opus habeat, theracum detur aut aliud dulce paucum. Ab aceto autem & omni alio uinoso genere, & ab aqua quoque frigida abstineant. Tempore uero quo cicatrix obducitur, uinum scyllinum uel le est praepotatum, aut absinthites & oenanthinum in uomentibus & purgatis per uesicam: hyssopites uero & scyllinum, his qui per tussim: pulegiatum, aut per aluum purgantur: maxime si nigricantia subeant una cum purulentis, aut grumosa quaedam coactiones. Quoniam autem per interualla colligi solent & rumpi quoque suppurationes, curam adhibere conuenit ne post factam eorum curationem recurrant: id fieri potest per lactis potationem, & hierae ex colocynthide constantis purgationem. post etiam dropaces locis adhibeantur, & smeigmata seu exterforia aciora cutem rubefacere potentia, & epithe-mata eiusdem usus, uelut est id quod ex euphorbio fit: item quod ex bacis lauri. Assumenda etiam arenae ingestiones: & acrium ciborum comestio utililis eis existit per interstitia adhibita, maxime uero aliorum coctorum. Multos autem suppuratos post cicatricis obductionem illatos conseruauimus per

per fassamentorum comestione. Assidue etiam acetum mulsum præbendū est, sit aut ex scylla apparatus, pectus quoque assidue ex abrotoni decocto repurgandum; item ex centaureæ & hyssopi alijsque consimilibus decoctionibus frequenter potatis. Quod si sæpe puris collectio contingat, securius est crustas per cauteria pectori in orbem inurere, quæadmodum in anhelosis est prædictum.

De peripneumoniciis.

Cap. LXVI

Peripneumonia inflammatio est pulmonis, cum febre acuta. Cōsequitur aut affectos thoracis grauitas absque dolore. Quod si pelliculæ ipsius, quæ cum thorace secundū longitudinem ipsius sunt cōnexæ, sint inflammata, etiā dolorem percipiunt, & spirandi difficultas simul irruit, & surrecti sedere uolunt. Pulmo enim cordi incumbens suffocationem infert. Rubicunda eis est facies & maxime malæ, nasus in summo fit simus, uenæ tēporum eleuant, prostratus est appetitus, respiratio calida, lingua siccitas, aquæ frigide, magis aut æris frigidi cōcupiscentia, tussis sicca. Si uero quid efferatur, spumofum est ac biliosum, et aliquando cruentū & floridū uehementer, quod etiā pessimæ significationis existit, & siquidem mortale malū fuerit, uigiliæ amplius aderūt, aut somni breues stuporem ac deliriū inducentes: et imaginatione mentē uicissim perturbante nō sentit ualde præsentia mala: extrēmitates frigida, ungues liuidi incuruant, quarta aut summū septima die hī moriuntur. Verū si ad salutē permutetur morbus, sanguinis eruptio ex naribus abundāter sequit, aut alui exturbatio multis excrementis biliosis et spumosis humorib. Aliquando aut inflammatione in pus cōmutata, per uentrē aut urinā pus excernitur, statimque ab omni molestia liberantur. Quod si in pulmonē iriuperit aceruatim, aut suffocat, aut cum grauib. ac cessionibus in tabē permutatur. Itaque si nihil obstiterit, statim uena secāda est in cubito, & si sustinuerint uires ex utroque brachio sanguis extrahendus. Primum quidē modicus et non usque animi defectionē, ut uidelicet adseruetur ad repetendam detractionem. Si uero quid prohibeat fieri uenæ incisionem, acri clystere subluere oportet ex decocto hyssopi, & colocynthide, & ruta melleque ac oleo plurimo, iniecto etiā nitro ac sale. Eorum uero quibus uena incisa est, sedē illini re oportet his quæ flatu educunt & secessum irritant: ueluti est mel cū cymino et ruta, ac modico nitro. Post uniuersales autē euacuationes peripneumoniciis aqua mulsa in potu exhibenda est, in qua decoctum sit hyssopū, aut iris sicca trieta, mēsurā duorum cochleariū aquæ mulsæ inspergenda. Quod si suffocatio urgeat, etiam nitrum inspergere cōuenit ad decoctionem hyssopi. Cibus sit extenuatorius, ptisana cum origano aut hyssopo decocta, aut modico pipere trito ad eius succum insperfo. Aliquando aut sal pro nitro cōiiciendus est, prout expedit, et sustinuerint uires. Porrum etiā capitatum bis coctū prebeatur, et haud cocta ex aqua mulsa: quæ omnia inflationis sint expertia. Potus exiguus sit quantitate: humiditas enim noxia pulmonī existit. Sub lingua autem detinendum præbe mel in pastillos redactum, cui in decoquendo inspersa sint hyssopū & calamintha quā tenuissimē trita. Vti quoque conueniet eclegmatīs quæ in pleuriticis describuntur: atque uniuersa diæta eorū qui à peripneumonia cōualefcunt, eadem sit quæ pleuriticorum et suppuratorum. Pectus uero lanis cooperiatur cum oleo et nitro. Conueniet etiam cerato contegere tum pectus, tum latera, ex oleo rutaceo aut cyprino apparato, quod habeat simul iridem siccam tritam inspersam, aut epithema ex cera, & terebinthina, medulla ceruina, cefypoli liquido, butyro, et iride tenuissimē trita imponatur. Sint autem horum partes æquales.

R De

Phthisis proprie est exulceratio pulmonis, ad sanguinis spuitiones confluens, quum uidelicet sanguinis eruptione suppressa, ulcus non fuerit conglutinatū, neque cicatrix inducta consequitur etiam phthisis in suppuratis & peripneumoniacis, aliquando etiam in adfectionibus pleuriticis: difficilime autem curantur ulcera pulmonis, propterea quod citra tussim non repurgantur: tussientibus autem mutuo ulcus dirumpitur, ipsisque quasi per circulum reuoluuntur mala. Lancinatis namque a tussi inflammatis, altera rursus maturatione inflammatio opus habet, rursusque per tussim pus repurgare necesse erit: quare ex omnibus difficilis curatio ipsis subornatur, quod neque pharmacorum uires ulcus pertinere ualeant, prius quam in uentre permutetur: et quod iuxta respirationes pulmo semper mouetur, & tussiendo lancinatur. Progressu uero temporis cartilagine quoque asperae in pulmone arteriae aduruntur: quemadmodum in externis ulceribus ossa, quae sculpturam ad squammularum discessum ac detractionem non admittunt. Diuturna autem pulmonis ulcera etiam aliquando curentur, callosas tamen & fistulosas reliquias post se in ipso pulmone relinquunt, quae temporis progressu ex leui occasione facile refricantur: unde contingit aliquando & rectorium ulceri obductum, & modicas sanguinis guttas una cum alijs quae inde per sputum reijciuntur, efferri: ut alio plane principio opus sit ad ulceris curationem. Notae autem quae ex sputo sumuntur, in tractatu de febribus sunt praescriptae, nimirum quinto huius operis sermone: unde superfluum existimo hic de eis uerba facere. Medicari itaque pulmonis ulceribus oportet, eo apparatu quo facile sursum efferantur humores, cura simul adhibita ne alij congregentur. Itaque cataplasmata in principio assumenda sunt, ex semine lini & tenuissimo pollinis, cum decoctione foenigraci & althaeae, oleoque & melle: ammisceri possunt etiam ipsae althaeae folia trita. Adhibeantur autem haec omnia statim post exacerbationum remissionem. Post temporis deinde intercapedinem, ad cerata transeundum ex butyro et oleo laurino ac cera apparata. Repurgationis autem tempore, epithema utendum est, exterebinthina, et oleo cyprino, et butyro, et ex medulla ceruina, ac adipe taurino, iridisque farina, & oesypo, hoc est lanuae succidae sordibus, aqua libus omnium partibus commistis. Post etiam emplastro Mnaseae, aut aliquo ex simplicioribus melinis utendum. Locis autem fluxione laborantibus, id quod ex salicibus constat adhibendum, quod etiam, exsiccationis tempore conueniens existit. Sicut & hoc quod ex syluestri cucumere apparatur supra ad anhelosos descriptum, & quod ex lolijs fit eodem modo. Ne autem cutis ipsa distendatur primum locum ipsum inungito, atque ita glutinosa pharmaca imponito: sic enim facilius auelluntur. Optimum autem ad eos malagma tempore quo cicatrix obducitur, hoc est. Ceræ libram I, picis libram I, uisci quercini unc. I, ammoniaci thymiamatis trientem, gallae, hypocisthidis, aluminis scissilis, acaciae, malicorij, seminis apij, rhois culinarij, cuiusque unciam I, olei myrtini aut rosacei trientem. In hyeme autem paulo plus. Sicca cum succis in aceto, coctere, liquefactisque quae eliquari possunt & ab igne ablatis uiscum iniicere: ad quod deinde liquefactum in cacoabo etiam reliqua trita coniicere, ac simul unita in pilam transfunde, & emollitis utere. Inter pharmaca uero potabilia simplicissimum est aqua mulsæ per se, & cum amylo, aut iride & radice dulci in ea decoctis. Omnium autem conuenientissimum phthificis est lac asininum potatum: quod si non adsit, bubulum, aut caprinum: & cancri crudi triti cum lacte potati, aut cocti in cibo sumpti, assidue iure eorum insuper absorpto. Conuenit etiam eis adeps ceruinus recens in sorbitionibus eliquatus.

eliquatus. Quod si molesta tussis incubuerit, thymus tritus et hyssopū melle co-
 cto excipiuntur & sub lingua tenenda exhibentur. Congruit etiā butyrum re-
 cens cū mellis & terebinthinæ æqualibus partibus decoctis. In his uero qui to-
 lerare possunt plus butyri accipiatur, si tamen recens existat: optime enim re-
 purgat. De hac itaq; mixtura cochleariū unum ieiunis detur. Bonū est et amyg-
 dalas, amaras maxime cum pitana decoquere: & porrum capitatum cum pitana
 aut altera sorbitione decoctum, aut etiam per se bis coctum accipere. Vinū
 autem theræum & scybelites præbeatur, mediocri tamen ualde mensura. Ecce
 gma uero phthysicis cōgruum tale est. Mellis optimi libram I, uuarum passarum
 pinguium ex acinatarū sextantem, croci, iridis, seminis hyoscyami, tragacanthi,
 cuiusq; dra. IIII, styracis flauī unc. I, nucum pinearum dra. VI, amyli unc. I. Exhi-
 be ex eo cochlearium ieiunis. Tragacanthus in uino dulci modico teritur: sty-
 rax uero in pila dissoluitur reliquis coniectis ac permixtis. Aliud. Fœniculi
 succum cum pari melle decoquito, et ad sextarij mensuram croci dra. I, rhei pon-
 tici dra. II, aliquando etiam hypocisthidis dra. I, adijcito. Quod si iuxta aspe-
 ra arteriæ extremum asperitas adsit, conijce & radice dulcis tritæ dra. I, detur
 cochlearis mensura à cibo. Aliud. Scillam optime assato, eiusq; medium si-
 ue medullam terito, & ad unam scillæ sex mellis partes conijcito, & ieiunis in-
 de cochlearis exhibeto. Aliud eclegma celebre. Marrubij, hyssopi, iridis radi-
 cis dulcis, pulegij, dictamni, saluæ, caricarū, palmularum passarum, singulorū
 unc. I, crassius cōtundito, ac in aquæ sextarijs tribus ad triduum madefacito: dein
 de ad tertias decoquito ac percolato, mellisq; libra una adiecta, rursus donec co-
 gatur decoquito, & post farinæ orobi scrupulos XII, terebinthinæ unc. I, amy-
 li dra. IIII, mastiches tritæ dra. IIII, tragacanthi unc. I, adijcito Tragacanthū pri-
 mum in modico decocti madefactum cōterito: deinde adiectis ei reliquis sic-
 cis, etiā ea quæ decocta sunt affundito, simulq; coactis utitor, exhibito ieiunis
 cochleari. Licebit & ante somnum exhibere, experimento eius utilitas cognita
 est. Aliud, ad phthysicos fluxioneq; thoracis laborantes. Seminis cucumeris
 fatui desquamati drac. VIII, amygdalarum delibratarum drac. IIII, seminis lini
 dra. II, seminis papaueris albi drac. II. Contusa et cribrata cum tragacanthi cre-
 more cogito, et in pastillos digerito. Iuxta uirium autem tolerantiam alijs dra-
 chmam unam alijs obolos. II, præbeto: eis qui febre carent, cum uino dulci &
 myrti cremore: febricitantibus uero, cū cremore solo. Aliud, quod & ad phthi-
 sicos & suppuratos præclare facit. Farinam erui albi succo scillæ subactā exic-
 cato: aut scillam assatam ac tritam, farinæq; erui subactam eodem modo exare-
 scere sinito. Vsu autem expetente, pastillos ipsos exiccatos cōtundito ac cribra-
 to, mellēq; permixtos cochlearis mensura ieiunis dato. Optime enim repurgat.
 Aliud, multo usu cognitum, citra molestiam repurgans. Farinæ erui unc. I,
 hyssopi quadrantem, seminis urticæ quadrantem, iridis unciam, I, mellis quan-
 tum suffecerit, exhibe ieiunis cochleari, ac confidenter utere. Aliud, experi-
 mento cognitū, quod ad phthysicos & suppuratos facit: magis tamen frigidis tē-
 peraturis conducit. Iridis syllyricæ sextantem, farinæ erui albi sextantem, hyssopi,
 pulegij fumo non siccati, seminis urticæ, cuiusq; dra. VIII, piperis dra. XII. Exci-
 pe melle, ac præbe cochlearia duo: mane unum, alterum ad uesperam. Potes &
 catapotia inde formare, atq; alternis diebus exhibere. Aliud, phthysicis & tussis
 si ueteri aptum. Cardamomi torrefacti dra. X, thuris, galbani, iridis, piperis,
 cuiusque drachmas quatuor, cassiæ, croci, myrrhæ, cuiusque drachmas tres,
 opij drachmam I, cōtundito, ac cribrato: & cum aquæ cyathis tribus, ac passi-

R 2 duobus,

duobus, cochleare unum, aliquando etiā duo præbeto. Licebit etiā pastillos inde formare cum passō. Aliud coptarium, siue placenta, ad phthisin, ex elegmatum materia apparata. Ex amygdalis uidelicet amaris decorticatis, nucibus pineis recentibus, propter oleaginosum in eis saporem aqua præmacera- tis: semine lini, amylo recenti. Hoc modo. Nucum pinearum quæ pityides ap- pellantur sextarium I, seminis lini sextarij quartam partem, amyli, quincūcem, piperis drach. I, mellis boni cocti & despumati quantum satis erit. In his qui ca- put quod facile oblæditur habent, pityidas uitare oportet: proq; eis, semē urticę conijcere. Eclegma ex orobis apparatus Dionysio prætori. Erui albi torrefa- cti & desquamati ac triti unc. I, costi trientem, croci sextantem, iridis unc. I, nu- cum pinearum unc. I, piperis grana L, seminis lini, uuarum passerum à uinaeis depuratarum, terebinthinæ, singulorum unc. I, butyri drach. II, mellis quan- tum his cogendis satis erit. Summe hoc phthisicis auxiliatur. Antidotus ex orobo, ualde celebris, ad phthisicos, suppuratos, & inueteratam tussim: optime repurgat, & cicatricem obducit. Amygdalarum amararum delibratarum sextantē, farinæ erui trientē, hyssopi trientem, iridis trientē, amyli sextantē, pipe- ris, panacis radicis, croci, cuiusq; scrupulos VI, succi omphacij exiccati dra. III, nucū pinearum torrefactarū sextantem, mellis despumati libram unam, aceti unciam unam. Farina erui in aceto per diem unum maceretur, postea simul coactis omnibus, ex eis cochleare unum ieiunis præbeatur. Alia antidotus ad phthisicos, quæ etiā ad omnē tussim inueteratā conducit. Amygdalarū ama- rarum decorticatarū sextantem, seminis urticę torrefacti dra. III, succi radicis dulcis sicci, radicis symphyti, cuiusq; sextantem, terræ asferis, nucū pinearum torrefactarū, seminis lini torrefacti, sesami, uuarū passerū à uinaeis depurata- rū, singul. sesquunciam, farinæ erui albi sextantē, iridis unc. I, terrę lēniæ unc. I, sa- pē & mellis quantū suffecerit ad eorū coactionē. Exhibe ieiunis cochlearis mē- sura: aliquādo etiā ante somnū. Vtere et uaria ex capitibus papaueris cōpositio- ne, supra ad distillationes descripta, exhibēs ex ea ante somnū. Vtere & his quę ad suppuratos sunt descripta, itē arteriacis remedijs supra præscriptis. Cōueniē- tissima etiā eis est cōfectio isotheos appellata, ad tussim descripta: & antidotus pæonia, quæ in Sermone XIII, cū alijs multe utilitatis antidotis, est relata: ea cō- fidenter utaris, Prodest & Mithridatis cōfectio, & quæ Esdræ inscribitur miro modo: itē ex uiperis theriace Andromachi, per interualla exhibita: quę omnes in tertio et decimo Sermone sunt descriptę. Ultra opinionem autē efficax est, ho- lus armeniacus drachmæ pondere ex uino tenui albo. Catapotion phthisicis ualde commodū & bonum, cui nullū comparari potest: faciēs ad omnem tussim inueteratam, & purulentas refectiones: quod in tribus diebus utilitatē su- am demonstrat. Styracis flauī, piperis albi, myrrhæ troglodyticę, castorei, galba- ni puri, opij achaici aut asiani, omnium æquales partes, cum galbano & styra- ce subige, ac catapotia informa erui magnitudine, quorum tria aut v. ante som- num exhibe deuoranda: calida aqua insuper ad sorbendum data, & admiran- dam uim uidebis. Porro diutius perseverantē malo, ac iam inueterato, cauteria ad mouere oportet, pectore in orbem inusto, quemadmodum in suspirioforum prædiximus curatione.

De pleuritide, siue laterū morbo.

Cap. LXVII

Pleuritis exquisita & propria, inflammatio est membranę intrinsecus late- ra succingentis, dolorem pungitiuum uehementer inferens cum acutissima fe- bre. Consequitur hac affectos spirandi difficultas, & tussis aliquando quidem sicca:

ficca: aliquādo uero cū reiectione, ac primū quidē cruentorum: inflammatione
 uero matura facta, purulentorum: pulsus adest durus, & secantis quippiam mo-
 do habens. Si itaq; dolor circa mammas innititur ac usq; ad clauiculam se exten-
 dit, citra dilationem cōfidenter uena secanda est. Si uero deorsum ad præcor-
 dia uergat dolor, corpus purgandum. Quod si mediocris infestet dolor, & non
 gungitius: neq; adsit tussis, neq; febris acuta, non opus est magna remedia ad-
 hibere. Clyster enim efficacior eis primum infunditur, deinde euacuatione ali-
 quod operæ precium faciente, adhibetur etiam irrigatio ac fomentatio lateris
 affecti: item sacculi ex fursuribus et pulegio ac menta impleti: & diata extenua-
 toriam uim habens. Archigenes. In his uero qui acuto morbo, ut diximus, in-
 festantur: siquidē circa mammas ac clauiculā hēreat dolor: uenā incidere oportet,
 ut dictū est, in brachio, non eo quod rectā ab inflāmato latere procedit, sed
 opposito. Sanguinis autem multitudo extrahatur non usq; ad animi deliquiū,
 periculum enim ne in peripneumoniā morbus permutetur: siquidem refrige-
 rato ualde corpore, pulmo rarus & calidus existens lateriq; uicinus prompte et
 facillime morbū susceperat. Itaq; modicū extrahere oportet, & post sufficientem
 temporis intercapedinem, rursus repetita incisione modicū auferre. Quod si a-
 nimi defectionem timeamus usq; in sequentē diem eius repetita ablatio disse-
 rēda erit. Deinde clyster aluo adhibeatur, si non ut cōuenit, feratur. Clysteri aut
 cōfidenter uti oportet ex oleo rutaceo, eliquatis in eo terebinthina & butyro:
 deinde forinsecus latus ex oleo calido fouere in quo ruta, anethū, flos cyperi de-
 cocta sunt. Lanā item sulphuratā, aut ipsum sulphur inspersum habentem, adhi-
 be calido oleo imbutā, ita ut insperso modico thymo trito imponatur, leniterq;
 ac prouide colligetur atq; hac sanē irrigatione utendū est ad tertiam usq; diem:
 quarta deinde cataplasma adhibeatur ex polline ac lini semine, melleq; ac oleo
 rutaceo: sitq; uehementē leue ipsum cataplasma. Quod si liquidior reiectio exi-
 stat, farina etiā lolij, & seminis irionis ammiscēda, aut scēnū græcum ac nitrum
 inspergēdum. Si uero repurgamēto liquido prodeūte adhuc perseveret dolor:
 suppuratum fieri hominē spes est. Quare sinapi etiā in cataplasmata commiscē-
 dum, & nasturtij semen, ac rosamarinī semen canchry appellatū, itemq; pyretrū:
 aut farinā lolij, cerā, & bitumini, cum oleo eliquatis permixtā impone. Cura e-
 tiam adhibenda est ut calida permaneāt cataplasmata: quod hoc modo fieri po-
 test. Oleo calido uescicam bubulam semiplenam redde, eamq; frequenter cata-
 plasmati admove. Post septimum aut diem, si eodem modo dolor persistat, cu-
 curbīta lateri affigenda est, & cutis scarificanda. Manifestissima enim in pleuri-
 ticis utilitas ex cucurbitulæ appositione apparet. uulnuscula aut scarificati loci
 sale aut nitro inspergenda, siquidem sustinere queant: in alijs uero linteolū oleo
 madefactum ac sale conspersum imponatur. Sequenti deinde à scarificatione
 die optimum est rursus cucurbitā affigere, quo sanguinis saniosus ex impactis
 uulnusculis extrahatur. Hæc enim detractio priore commodior existit: non e-
 nim sanguis sed sanies in secunda detractioe aufertur. Tertia uero die post
 sanguinis detractioē, ceratum cyprinum aut rutaceū tum pertusæ cuti, tum
 uniuerso lateri imponendum: neq; unquā affectus locus nudus relinquendus,
 quod si permutati in pus humoris signa appareant, & non per exhalationem
 discutiat, coadiuuare permutationē oportet, althæa et caricis in complexum
 cataplasmatum cōiectis. Post uero etiā epithematis utendū: reiectionis maxi-
 me tēpore, huiusmodi mixtura apparatus. Butyri, terebinthinæ, œsypi, id est ex
 lanē succidæ sordibus pharmaci, ceræ, medullæ ceruinæ, iridis, omniū æquales

R 3 partes

partes cōijce, modico oleo cyprino aut rutaceo ammisso. Optimū est etiam salū phur tenuissime tritū cerato liquefacto inspergere. Admirabiliter quoq; eis auxiliatur brassicæ radix sicca unā cū cauliculis exusta, cinere eius axungia veteri suilla sufficiente excepto, ita ut ne perfluat in corpus, ipsumq; inquinet. Preclare enim discutit, & mitigat dolores. Probe etiā auxiliantur brassicæ itēq; cupressi folia tenera trita & cum axungia imposita, aut marrubiū eodem modo, aut cinis farmentorum, aut ficus pingues cum pari axungia cōmixtę. Eundem usum præstat stercus caprinum cum axungia impositū. Aliud epithema, pleuriticiis ualde cōmodum. Opopanacis unc. i. foliorum rutæ sextantem, olei cyprini librā i. ceræ sexuncem, terebinthinæ sexuncē, galbani sexquunciam. Opopanax in oleo cyprino dissoluitur: galbanum aut cum rutæ folijs cōteritur: que uero eliquari possunt, liquefiunt, & refrigerata tritis ammiscētur. Aliud, experimento cognitū. Rutæ sextantē, sulphuris uiui unc. i. nitri sexquunciam, adipis suilli trientem, ceræ sexuncem, olei cyprini, sexuncē, butyri, celsi liquidi, utriusq; sextantē, terebinthinæ unc. i. Aliud epithema ad pleuriticos, in quibus dolor diu perseverat. Ceræ, resinæ pinī, picis, baccarū lauri decorticatarum, singulorū libram unā, ammoniaci thymiamatis sexuncem, galbani trientē, pyretri sextantem, æruginis unc. i. nitri sextantē, euphorbię unc. i. alię tantum dimidiā accipiunt: olei laurini aut communis antiqui trientē. Appara et utere. Rubefacit cutem, & grauitatem leuiorem facit. Epithema foetidum, pleuriticiis commodum. Resinæ pinī libram i. ceræ sexuncem, rutæ uiridis trientem, olei cyprini sexuncē, sulphuris uiui, opopanacis, sagapeni, galbani, cuiusq; drachmas iiii. Depotionibus pleuriticorum. Potionibus iuuantur pleuritici in principio quidē aquæ mulsæ, in qua ruta est decocta, post etiā hyssopum, aut calaminthē, aut origanū, aut iris, aut radix aristolochiæ. Alia, euestigio auxiliat.

Radix phu fasciculū in tribus aquæ sextarijs decoquito: & expresso liquore ad sextarium unum, mellis trientē cōijcito, rursusq; decoquito, ac cyathos tres ante cibum exhibeto. Alia, Chamæpityos manipulum in tribus aquæ sextarijs appara, & utere, ut dictum est. Alia, Stœchadis tenuissime trita dra. i. exhibe ex aqua mulsā, aut simili modo chamædryn, aut chamæpityos modo apparatam præbe in potu. Prodest et dracūculi radix cocta in cibo sumpta, aut aristolochia eodem modo. Sub lingua uero tessellas ex melle cocto eliquantes deuorēt. Eclegma aut eis conueniens hoc est. Eclegma ad pleuriticos. Seminis urticæ, seminis lini, nucum pinearū, amyli, singulorū cyathum unum, amygdala amara decorticata x x v. piperis grana quinquaginta. Nuces pineas a lini semē paumper torreto, deinde alia trita ac cribrata simul cum his melle despumato sufficienti excipito, et ieiunis cochleare unum exhibeto. Aliud. Butyrū recens cum pari mellis mensura decoquito, ac inde cochleare præbeto. In pleuritide uero diuturna exhibe seminis balsami dra. i. ex aqua mulsā, aut etiam gentianę dra. i. radices cētaureę maioris dra. ii. ex uino, aut radices symphyti ex aqua mulsā. Quod si ligda et cruda reiectet, cōuenit hoc: myrrhę troglodyticę dra. ii. croci dra. i. piperis grana x v. mellis despumati lib. .i. cogito simul, ac inde cochleare dimidiū præbeto. Orisassi antidotus ad pleuriticos et omnes pectoris fluxiones. Seminis rosinarini, opopanacis, sagapeni, castorij, anisi, fœlilis, cuiusq; dra. v. myrrhæ, opij, cuiusq; dra. i. iiii. butiminis dra. i. iii. et dimidiā, piperis dra. ii. thuris sesquidrach. Vtere, araci magnitudine exhibēs cū hydromelitis cyathis tribus. Antidotus alia pleuriticiis ualde cōmoda. Baccarū lauri dra. v. seminis rutæ syluestris dra. v. aristolochiæ longæ dra. vi. myrrhę dra. i. iii. gentianæ

næ dra, IIII, mellis despumati lib. I. Dat nucis ponticæ magnitudine, aut fabæ, aut araci, Prodest suppuratis, cōuullis, itēq; ruptis, Caterū et antidotus quæ ex quatuor reb. appellat præclare facit, habet aut hoc modo: Gētianę, myrrhę, aristolochię, baccarū lauri, equales partes melle cocto excipe, & fabæ magnitudi-
ne præbe: his q; febre carēt ex uini cyathis IIII: febricitantib. uero cū aqua mulsa. Efficax est ad cōuullioes, rupturas, orthopnoeā, tormina interaneorū, et morbū regiū, et eos qui uenenū hauserūt: resistit etiā serpentiū uenenis potata: præstat idē & ad morsus locū imposita. Quidā eam mysteriū appellant. Alia antidotus ad pleuriticos pharvacū accommodatū. Extrahit mēles & partus & quæ a partu relinquuntur secundas. Dictāni, sagapeni, opopanacis, trifaginis, cuiusq; drac. IIII, myrrhæ, seminis rutæ syluestris, herbæ sabinae, comæ centaureæ minoris, piperis, cuiusq; dra. VIII, radices gentianæ dra. VI, baccarū lauri dra. XVI, aristolochię rotundæ dra. II, mellis despumati quantū cogendis his satis est. Datur nuci suellane magnitudine cū hydromelitis cyatho uno, cibiporro pleuriticis exhibendi sunt forbiles qui in principio uentrē subducant: uelut est pitisanæ succus cum melle, citra salem aut alterius rei admistionem. Post hæc etiam non colata integra pitisana exhibenda: deinde micæ quoque ex aqua mulsa. quod si a melle abhorreat æger, oleum optimum in principio pitisanæ affundes, decoquesq; simul capitatum porrum, deinde modico sale condies, & exhibebis. Remittente uero ac dedinante iam malo, in petrosis aquis degentes pisces exhibendū, & columbæ, omnisq; diætā tenuis constituenda. Aluus autem assidue subducatur, in maximis præsertim doloribus: sed tamen cauendum ne fortiora solutiua exhibeantur. Mastichen itaque tenuissime conterito, eiusq; scrupulos nouem cum aqua tepida, aut lactei teporis aqua præbeto. Soluitur enim a calida aluus. Vbi uero hanc potionem obtuleris, amygdalas amaras decorticatas uiginti in promptu habe: easq; tritas cum pauco melle delingēdas præbe, aquam etiā calidam modicam insuper bibendam. Profectu autem ex his consequente, etiam cum subscripta Asclepiadæ hiera purgabis, quo omnes morbi reliquæ extergantur: quæ enim relinquuntur a morbis recidiuas facere consueuerunt: & nō pura corpora quo plus nutries, eo amplius lædes. Hiera Asclepiadę, quę omnes abscessus in profunda corporis parte cōsistentes unā cum tuniculis ipsorum educit, phthificis ac pleuriticis comoda: facit et ad eos qui assidue reuomunt cibum. Colocynthis medullæ dra. XXXII, marrubij, stoechadis, trifaginis, cuiusq; drach. XIII, myrrhę, spice nardi, piperis longi, florū iunci odorati, cassiæ, cinamomi, cuiusq; dra. III, croci dra. IIII, radices centaureæ maioris drac. IIII, galbani drac. IIII. Excipe melle cocto, & pleuriticis duarum nucum ponticarum magnitudine exhibe ex aquæ mulsæ cyatho I. phthificis uero & suppuratis unius tantum nucis magnitudine itidem ex aqua mulsa.

De ea quæ pleuritis esse putatur, quum

tamen non sit.

Cap. LXVIII

Ex cruditatibus plurimis, et cibis humoris crassi ac pituitosis, ueluti sunt bulbi, ac fungi, & consimiles: crudi humores uiscosiq; & tenaces in corpore generantur: qui aliquando repente se in uacuum thoracis locum ingerunt, aut in ipsum etiā pulmonem. Multitudine itaq; sua succingentem latera intrinsecus pelliculam distendentes inferunt dolores: ut imaginatio factæ inflammationis inextertis exhibeatur: quin etiam uias spiritus intercipientes, uehementem spirandi difficultatē inducunt. Vnde quidā medici errore seducti, uena cubiti incisa, multoq; sanguine euacuato, mortis causam ægris præbuerunt. Quare interro-

gare

gare oportet, num eo cuius mentionem feci, usi sint cibo, diligenterq; perdiscere formam ipsius respirationis, cōtingere etiā pulsus, & tactu explorare caloris qualitatem. Etenim in his non ob dolorē respiratio ut plurimū intercipitur, sed quod uia spiritus sunt obturatae, et respirationis forma uelut laqueo collo circumdato contingit. Supini autem ferē in totum decumbunt semper, praē impotentia etiam, neq; probe loqui ualentes. Ut plurimum uero non febricitant hi: aliquando & frigidius solito corpus eorum inuenitur. Quod si febre afficiantur aliquando, debilissima ipsis febricula existit, minimeq; sunt siticulosi: & quod ad hanc uel maximum signum est, pulsus difficulter mouetur, minimus & tardissimus praeter solitum morem existens. Horum itaq; curatione suscepta, calefactionis, incisura, & repurgantia intrinsecus & extrinsecus offeremus: et primum quidem a simplicioribus incipiemus. Clysteri ergo consueto aluum a stercorebus repurgabimus: deinde etiam efficaciori utemur ex decoctione calaminthae, aliquando centaureae, melleq; plurimo ac nitro et oleo. Colocyathis autem in his quod ualde stomacho aduersetur deuītanda. Post alui euacuationem rutam & anethum in oleo decoquimus, & ex eis quā plurimum fouebimus affectos locos: lanas etiam oleo madefactas imponemus. In potu dabimus aquā mulsam, in qua hyssopū, aut pulegiū, iris, caricā plurimā sint decocta. Succum etiam ptisanā tenuissimū exhibebimus cum melle, quo inde ueter leniter subducatur. Elegma aut ipsi commodū huiusmodi est. Seminis urticae, hyssopi, iridis, nucum pinearum, amygdalarū amararum, singulorum aequales partes, modico pipere adiecto, optimo melle despumato excipe, ac inde ad summum cochleariū unum ieiunis prebe: deinde interstitio facto, exhibe aquā mulsam, ut dictū est, ac post horas duas succum ptisanā: tertia deinde die ex farina ordeī, ac semine lini, multoq; foeno græco cataplasma imponatur: adiciamus etiam sinapi tritum, & lauri baccas, ac parum nitri, & ex liquidis oleum rutae, aut cyprinū, aut anethinum. Apparandum aut est eo modo, ut thoracem & costas comprehendat. Ablato aut cataplasmate, thorax cerato ex butyro & cerebinthina, œsypoq; liquido, & cera, taurino adipe, ac iride, aequalibus portionibus acceptis contegatur. Aliquando etiam ex medulla ceruina & oleo cyprino. Sulphur quoq; uiuum cerato liquefacto infarciendū. Stomacho uero lanā contolutam, unguento nardino ac modico uino madefactā imponemus, eiq; incumbere semper sinemus. In his uero quibus suffocationis periculum imminet, uomitorijs ad anginam descriptis confidenter utemur, et maxime eo quod ex elaterio, sinapi ac nitro constat, primum quidem ipsum cum oleo & pauco melle quā penitissime illinendo: deinde etiā bibendum, quemadmodum illic diximus exhibebimus. Assidue etiam aquam mulsam absorbendam praebimus, in qua hyssopum est decoctum. Porro humoribus dissolutis reiectare eos incipient, & tussis in eis augetur: quare antidotum isotheum appellatum tunc eis ante somnum exhibebimus, nucis auellanae magnitudine ex aqua mulsā. Somnū enim dulcem infert, & humores quo facile sursum efferantur praeparat, ac tussim sedat, doloresq; dispergit. Est aut supra ad tussim descripta. Quando uero etiā uenter eis non bene excernit, mastiche tenuissime trita scrupulorū nouē ponderē cū aqua tepida aut lactei teporis bibēda offerat, deinde amygdalae amarae decorticae tritae ex melle praebantur delingendae, & aqua calida post eorum sumptionem absorbenda. Feliciter autem procedente curatione et columbarū pullos in cibo offeremus, cū porro capitato cocto, anethoq; et oleo, modico sale & pipere adiecto. Vinū bibant fuluum, uetus, mediocri mensura. Atqui

Atque eclegma prædictum ex semine uidelicet urticae quotidie ieiunis præbe-
bimus. Ante somnum uero isotheum antidotum alternis aut singulis diebus,
donec ab omnibus molestiis egri liberentur. Ceratum autem quod pectori ad-
hibetur singulis diebus renouetur. Et si quidē uenter adstrictus sit, mastiche cū
amygdalis & melle præbeatur. Eclegma Galeni, ad diuturnum pectoris
dolorem citra febrem. Fœnum græcum aqua macerato, deinde decoquito
et prima aqua diffusa, et palmarum pinguinū carne adiecta rursus coquito, ac
exprimito succum: quem deinde melle largius permixtum rursus ad prunas de-
coquito, donec ad mediocrem spissitudinem redigatur: & ex hoc multo an-
te reliquum cibum tempore delingendum exhibeto.

OCTAVI SERMONIS AETII FINIS.

INDEX EORVM QVÆ IN NONO AETII
SERMONE HABENTUR.

| | | | |
|---------------------------------------|------------|---|--------------|
| De cardiis. | Cap. i | ne contingit. | Cap. xxij |
| De his quibus atra bile stoma- | | De uitioso appetitu. | Cap. xxiiij |
| chus infestatur. | ij | De cruditate: Galeni. | Cap. xxiiij |
| Ad eos qui flauā bilē euomūt: Ca. | ij | De crapula: Philumeni. | Cap. xxv |
| Ad eos qui stomacho exurūtur, & si- | | Quæ cura aluo adstrictæ exhibenda: | |
| ticuloli sunt. | Cap. iij | ex Galeno. | Cap. xxvi |
| De singultu. | Cap. v | De inflatione: Galeni. | Cap. xxvij |
| De bulimo, hoc est ingēti fame. C. | vi | De uoluulo: Archigenis. | Ca. xxviij |
| De animi deliquio: ex Philumeno. | | De his qui ab acri humore coli dolore | |
| Cap. vij | | infestantur: Galeni. | Cap. xxix |
| De his qui in balineo animo linquun- | | De his qui à frigidis et pituitosis humo- | |
| tur. Cap. viij | | ribus, coli dolore infestantur. C. | xxx |
| De stomachi imbecillitate, & supini- | | Pharmaca ad colicos. | Cap. xxxi |
| tate, ac subuersione: ex Galeno. | | De antidotis dolorem leuantibus, in- | |
| Cap. ix | | fusisq; colicis accommodatis. C. | xxxij |
| De nauſea: ex Galeno. | Cap. x | Quæ colicis infundantur, & per anum | |
| Cataplasmata & epithemata ad nau- | | subdantur. | Cap. xxxiij |
| ſeas & uomitus. | Cap. xi | Cataplasma colicum: ex libris Seueri. | |
| De cholera seu bilis effusione. C. | xij | Cap. xxxiiij | |
| De stomachi adstrictione. Ca. | xij | Quomodo aluum fluxione laboran- | |
| De humoribus à capite in uentrē de- | | tem curare oporteat: ex libris Philu- | |
| ſillantibus. | Cap. xiiij | meni. | Cap. xxxv |
| Dietæ conueniens his qui stomachū | | Cura eorū qui ex debilitate, alui fluxio- | |
| habent dissolutum, aluum autem | | ne laborāt: ex Galeno. | Cap. xxxvi |
| adstrictam. | Cap. xv | De coeliaca affectione: Archigenis | |
| De stomachi inflammatione. Ca. | xvi | Cap. xxxvij | |
| De stomacho exulcerato. Cap. | xvij | De colliquatione. | Cap. xxxviij |
| De his qui à stomacho, cōitialis mor- | | De lūbricis: ex Herodoto. | Ca. xxxix |
| bi modo conuelluntur. Cap. | xviij | De lato lūbrico. | Cap. xl |
| Viridis iaspidis usus. | Cap. xix | De ascaridibus. | Cap. xli |
| De appetitus perditione. Cap. | xx | De abscessu in intestinis. | Cap. xliij |
| De appetitu canino. | Cap. xxi | De dysenteria, hoc est torminibus inte- | |
| De appetitu canino, qui ex immodi- | | stinorum. | Cap. xliij |
| ca transpiratione, ac cutis exolutio | | De tenasmi cura. | Cap. xliiij |
| | | Cura | |

| | | | |
|--|------------|---------------------------------------|------------|
| Cura dysentericorum | Cap. xlv | hibentur. | Cap. xlvij |
| Cura eorum qui aurum, aut aes, aut tale quippiā deglutierūt. | Cap. xlvi | Quæ infernè dysentericis infundantur. | Cap. xlix |
| Communia remedia dysentericorū, | Cap. xlvij | Epithemata dysenterica. | Cap. l |
| quæ supernè exhibētur. | | Delicenteria. | Cap. li |
| Cōposita pharmaca, quæ supernè ex- | | | |

AETII MEDICI GRAECI CONTRA

CTAE EX VETERIBVS MEDICINAE, TETRABIBLI,

sive Quaternionis Tertij, Sermo Primus, & ex ordine Nonus, Per

IANVM CORNARIVM Medium Physicum, latine conscriptus.

De stomachi, alui, ac interaneorum affectionibus.

DE CARDIACIS.

CAP. I



VOMODO eos qui cardiaci appellatur curare oportet, aut eos etiam qui aliter ob stomachi afflictionem animo linquuntur, iam absolutissime prædictum est in quinto huius tractationis sermone, ubi ad febrium curam hæc annexuimus. Nunc vero quum affectionem stomachi ac alui remedia oportune ex ordine describemus, necessarium est & hic paucis eorum mentionem facere. Cognoscimus igitur eos qui cardiaci dicuntur, quum acuta febris & maxime astuosa affliguntur hoc modo. Pulsus si inuenero densum & obscurum, & extremarum partium frigiditatem, sudores circa faciem et ad pectus usque glutinosos, & odorem corporis terrestrem nares percellentem, & pulsus circa ipsum cor uehementiores & magnos: & ad hæc accedant desperatio, angor animi, & corporis inactio. Hoc modo affectum, cardiacum esse dico. Os uentris primum est quod in ipsis afficitur, per consensum uehementer oblaesens cor ipsum, propter uiciniam. Porro ueteres os uentris cordis appellauerunt Cardiacum uocarunt, ab accessionibus nimirum quæ ex eo accidunt & inferuntur. Aeris itaque frigidi admissione & uentilatione eis auxiliari oportet. Spongia igitur ex posca frigida imbuta, facies permadescat, & aqua laetici teporis paulatim absorbenda præbeatur. Odoramenta autem uaria offerantur, malum cotoneum, pulegium, cucumer, & similia. Stragula eis incumbenda tollantur: operimenta uero quibus conteguntur mollia sint, & usu priore detrita: pauiumentum irroretur, ac folijs consternatur myrti, platani, ac quercus, maxime uero uitis, atque ipsis etiam rosas. Solem autem domus in qua decumbit non admittat, sitque minime alta, sed depressior, et non ualde lucida. Exudantibus uero partibus myrtus sicca trita inspergatur, aut cimolia, aut oenanthæ, aut ordeum: imprimis uero collo & thoraci, & locis sub alis ac inguinibus ea sunt adhibenda. Eodem modo auxiliatur malicorium cum manna inspersum: aut galla per se, & cum sulphure uiuò: aut samia terra admixtū habens gummi. Illinuntur etiam ad coarctandos sudores, oleum myrteum, oenanthinum, rosaceum, melinum, et liscinum. Circumlita autem sudores cohibent, manna & amylin candido oui excepta, aut bulbis albus, & piper, ac urtica semen, & gummi, modico cerato myrtico excepta.

excepta, aut oui candido subacta, quæ sanè crassius inungere convenit: adgustantur enim & exarescunt, & potissima in eis spes consistit naturalis caloris reexcitandi. Neq; uero pinguefactæ cuti huiusmodi inunctiones sunt adhibendæ: uerū linteolo probe prius extersæ inungantur, neq; mox ubi calor apparere incipit auferantur, sed postquā sufficienter extremæ corporis partes fuerint cōcalefactæ, quod ubi contigerit statim tollantur, et thorax cooperiatur, atq; sicubi uarosum quippiā aut ulcerosum ex inunctionis adustione circa thoracē appareat, blande tractetur, ac aliquo ex his quæ ad ambustos ab igne descripta sunt, pharmaco locus curet, maxime uero conveniet id quod ex hordeo cōstat. Extremæ uero corporis partes, siue ad genua usq; et cubitos, siue usq; ad locum subalis & inguina sint refrigeratæ, fece usta & sulphure uiuo conspergendæ, aut pyretro, aut piperi, aut bulbis tritis cum pipere illinendæ à brachijs usq; ad digitos, et à fœmore usq; ad extremos pedes, gracilibus linteolis simul circūpositis. Idem prestat sinapi & pyretum, ac adarce. Porro mollibus corporibus sufficit aliquando oleum sicyonium aut gleucinum illitū, cum multa fricatione ac concalfactione partium extremarum: quanquam nihil uetet piperis ac ceræ modicum his ammiscere, quo spissiora fiant & melius adhaerescant. Fasciculus quoq; ex lana pura in oleo calido madefactus incumbat semper circa uesicæ regionem. Capitis fomenta frigida sint, qualia ad phreniticos sunt descripta: frōs spongia ne madefiat, sed ex acacia, galla, terra samia, ac syluestris punici flore illinatur. Optime facit etiam omphacium, & gummi: uerum utrumquodque eorum ex rosarum decocto aut succo, aut aliquo cōsimili diluatur prius & deinde illinatur. Quod si quis sanitatis tempore nimium repletus existat, & stercora antiqua recto intestino insideant: tunc sanè clysteri simpliciore euacuare oportet: ex succo ptisanæ, & modico melle, paucissimoq; sale & oleo quoq; modico adiecto. Illinenda est etiam singulis diebus sedes ipsa ex cumino, ruta & nitro, cum modico melle commistis, ob inflationum uidelicet educationem. Si uero nulla stercora in intestino recto subsideant: neq; aliās etiam excrementorum multitudo insit intestinis: agri autem cibum non sentiant & tabescant, ptisanæ succum aut halicæ per clysterem infundere oportet tepesfactum, cōquassato cum eo ouo crudo. Ultra hoc enim quod ea quæ stomachum inferne molestia afficiunt, euocat & educit, etiam alimentum, optime corpori sufficit ex san guore ob non acceptum cibum misere affecto. Auxiliatur item cardiacis cataplasmatibus modo, stomacho ac sinistrae mammae imposita, folia rubi cum pane, aut myrti folia, ipsaq; myrti bacca, aut pampini uitis, aut plantago cum pane, aut mala cotonea & palmae, aut intubus cerato exceptus. Imbecillioribus polentam cum palmis imponere sufficit, aut palmas uino madefactas unciae unius mensura contere: deinde adiectis aloës drachmis quatuor, mastiches drachmas quatuor simul tere, & affuso eliquatæ ceræ sextante, & olei, siquidem hyems sit, neque multus caloris sensus agrum contingat, nardini: in aestate uero rosacei, aut melini, triente simul misce ac utere eodem modo. Quod si ex uisceribus quoddam inflammatum sit, panem cum modico uino & melle decoctum impone: admixtis in his qui imbecilliores sunt malis repurgatis aut cenanthe. Reprimit autem sudores stomachumq; & cor ipsum firmitatis autorem placat ac cohibet cataplasma ex palmis, & cenanthe, & acacia, rosæ alumine, hypocisthidae et rhoe rubro: ita impositū ut sinistra mammam atq; ipsum uentrem complectatur: sit etiā tactu molle & leue, ac assidue permuetetur. Reuocato autem ex accessione agro, si loci quidam circa præcordia sint infla-

mati

mati, prouidere oportet ut per cōmunia cataplasmata ab inflammatione liberentur. Cibi offerēdi, panis ex aqua frigida, aut ex uino albo & tenui frigidoq; ac diluto: pedes suilli, taliq; & rostra: ex uolucris macrae et non foetidae, in pituita decoctione eliquatae, aut etiam per se. Frigida autem haec exhibeantur, si caloris sensus circa stomachum sit, & aeger inflammatione nō uexetur. Alijs calida exhibenda, similiter autem & potus calidus dandus, uinum tenue, album, dilutum: immodicam autem uini exhibitū multitudinem pulsus aegroti ostendet. Eo usque enim exhibendum est uinum, donec pulsus subremulus esse desinat, & robustior fiat.

De his quibus atra bile stomachus infestatur.

Cap. II

Ex Herodoto. Quibus stomachus ab atra bile in febribus uexatur, similes accessiones cardiacis patiuntur. Accedūt autem ad haec, fortis stomachi morsus, cū eius exolutione, et capitis uertigine, ac frigidus sudore, paruusq; & obscurus adest pulsus, progressu uero temporis augetur morsus, atque hinc in dolore qui difficulter leniri potest, transit. Cæterum manifeste apparens flaua bilis uomitus has accessiones leuiore reddit, atra autem bilis soluit. Vomunt autem ferē in totum hoc modo affecti pituitam acidam in uentre coaceruatam ex assidua cruditate, propter ventris ipsius debilitatem. Qui uero citra febrem ab atra bile stomacho infestantur, his accedit tempore quo humor ipse generatur & producit, tristitia, & somnus cum accessione imaginationum alienarum, contritioq; & dolor poplitū ac surarum. Acutius quā antē consueuerunt, cernit, & deiectū habent appetitum: ructus autē & excreationes foetidas & pilices o-lentes. Coaceruata uero bile cum multa desperatione intolerabiliter ignescunt, ut omnia eis membra ardere uideantur: in primis autem stomachus, uelut à palis igne candelactis pungatur, afficitur. Sudores animi deliquium inducentes per omne corpus desillant, & ferē semper spūti influentis reiectione uexantur, quum morsum sentiunt, multamq; habent uomendicupiditatem. Et aliquando quidem frustra lancinātur, quandoq; autem pauca quāda biliosa aut acidam pituitam, quae in uentrem defluerunt euomunt, modicoq; tempore a malo leuati, rursus idē patiuntur, atq; in uniuersum his qui ueratrum sumperūt similes existunt. Pulsus aut aliquando densiores, aliquando etiam rariores & minores fiunt, plurimum uigiles permanent, & siquidem dormierint cum perurbatione aestuosiores exurgunt, ebulliente ut uerisimile est delato in uentrem humore. Sæpe etiā acceptum cibum unā cum atrae bilis humore euomūt: ferē in totū enim post duas ab accepto cibo horas accessione apprehendūt, maxime quā acrem aliquē aut salsum cibum aut potū ingesserunt. Excrementa alui retinentur, aut præter naturā incocta excernuntur. Effertur autem aliquando & bilis inferne per aluum, atque adiuvat affectionis dedinationem. Aliquantem ob retentam bilem, etiam atrae bilis affectionibus, & delyrijs mentem alienantibus sunt apprehensi. Quod si contingat, siue febris adsit, siue non: siquidem iuuenes sint sanguineq; abundent, & reliqui numeri ad uenę incisionē requisiti adsint: uena secanda est, repetita sanguinis detractione, et hoc tamē per infusum clystetris corpore prius euacuato. Atqui ad amini usque deliquium id facere non oportet, propter stomachi imbecillitatem. Colligandae autē adstrictę extremæ corporis partes, & ad paucum cibum aegri cogendi, stomachus uero lanis succidis fouendus est ex aceto plurimo, modicoq; rosaceo, aut melino, aut lentiscino. Quod si amplius permaneat stomachi imbecillitas, ex rosarum succo foueantur, siue intubi aut portulacæ cum rosaceo: adstringentia etiam & leniētia

tia cataplasmata imponantur. Qui uero unā cum morſu circa uentrē ac inteſti
 na inflantur, ijs conuenientiſſimū eſt acce acētū, in quo pulegium eſt decoctū,
 & culminum calidum forinſecus uentri per ſpongiā impositum. Doloꝛe uero
 perſeuerante, alumen liquidum cum atramento ſutorio trito, & aloē, melle ex-
 cepta imposito, & alumine in acetum cōiecto & calefacto, ſtomachū per ſpon-
 gias foueto: aut aluminis ac aloēs æquales partes cerato myrteo exceptas ad os
 uentris apponito, aut hederæ folijs in uino decoctis uentrem integito, aut plan-
 tagine cum ſale trita, aut marrubio cum pane & roſaceo ſubacto, aut bulbis ru-
 ſis cum pari pondere aluminis cooperito. Optimū enim hoc eſt, inueterato ma-
 lo remedium: quin & bulbi ipli cum nitro triti & impositi celerē curationē pre-
 ſtant. Optimē etiam conducit eis gregarij bouis ſtercus aridum uino decoctū
 & impositum. Epithema quoq; ex ſemīnibus adhibendū: item bulbi cum ſter-
 core bouis ac nitro permixti. Ex Dioſcoride. Cōuenientiſſimū omnium his
 qui atram bilem generant, inflatisq; & morſum ſentientibus pulegij decoctum
 exiſtit potatum, aut aqua in qua ferrum eſt extinctum: item intubi ſuccus pota-
 tus: bibant autem aquam, eamq; calidam. Si uero plurimi caloris ſenſum perci-
 piant, frigida danda, ſed modica, & maxime tempore exacerbatōnū. Aſtuan-
 tibus enim & in anxietate exiſtētibus, omniq; miſeria afflictiſ, frigida ad abſor-
 bendum cōcedenda, per interualla tamen, & non ultra cyathi meſuram. Nō
 enim hūmectatione opus habent, ſed refrigerationis tantum gratia, frigida per-
 mititur, & ut melior intrinſecus temperatura fiat. Vtilis eſt iſtis & mentæ ſuc-
 cus cum ſucco mali punici dulcis. Quod ſi aquam bibere nō poſſint, parum ui-
 ni aquoſi cōcedendum eſt inter cibos, calida aqua probē diluti. Cibus maxima
 ex parte ſit frumentaceus & optimi ſucci in omnibus: ſimplicior autē & qui faci-
 lius cōcoqui ac cōmutari poſſit in febricitantibus. His uero qui febre carēt adij-
 ci poſſunt ex olēribus, lactucae cauliculi ac maluae, piſces petroſis aquis degen-
 tes, & ex uolucrū generē, nō graue olentes, macrae & montanae: ex oſtreis quae
 teſta integuntur, herinacei recentes. A ſallis uero & acris in totū abſtineant.
 Moleſtas autē mordacitates & nauſeas, hauſta plurima tepida aqua per uomitū
 ſoluant. Si uero id nō bene tolerent, quieſcere iubeto, & extenſae manus palma
 ſtoſtachū, foueto: quo delatū ad iplum bilioſum infernē per aluū excernatur.
 Quod ſi uenae incisionē non faciamus, ſecunda ac tertia die per clyſterem eua-
 cuandum eſt, & modico cibo eger cōnutriendus, deinde in potu exhibendum
 pulegij decoctū ieiunis, reliquaq; ſuprà dicta. Fomentū etiā ex aceto adhiben-
 dum, & cataplasma ex ſtercore bubulo ammixtis bulbis & nitro. Porro poſtq;
 febris ceſſauerit, aut ubi etiā in totum nō febricitauerint: & tamen diutius ma-
 lum moleſtia afflixerit, & irritationes per longa interualla repetuerint, purgan-
 dum eſt corpus ex hiera Archigenis, aut Ruſi. Qui uero ſputi multitudine ſto-
 macho uexantur, his conyza arida maxime tenuis manducāda, aut pulegiū, &
 maſtiche chia ex aqua potanda. Exhibendū eſt etiā lac in potu iſſdem quemad-
 modum in proprio capite de iſtis ex profeſſo eſt oſtenſum. His uero qui ſtoma-
 chum ualde exolutū habent ſerum lactis per acetū muſum ſiſſi exhibeatur, ita
 ut ad primum ſeri hauſtum epithymi tenuiſſimē triti ſcrup. i. x. & ſcammoniae
 obolum i. aut ii. iuxta uſitū tolerantia inſpergamus. Deinde ſerum iplum
 per interualla paulatim bibant, ſitq; eiſ potati meſura ad minimum quinque
 cyathorum. Bonum eſt & cucurbitulam ad dorſum affigere, aliquando etiam
 ad ſtomachi regionē, & ſcarificatione facta, ſufficientem ſanguinem ex fi-
 ſuris extrahere. Quo uero penitus affectio hae deſtruatur, quotidie horam u-
 S nant

nam ante ciborum sumptionē exerceantur, ac frigida lauentur, maxime in mari, & arena sub caniculæ ardoribus obruantur. Abstineant autem ab omnibus atrā bilem generantibus, maxime carnibus bubulis, uino nigro, brassicæ & lenite. Diligentissime autem de ipsorum diata in sexto Sermonē, ubi de atra bile affectis egimus, est prædictum. Quod si inflatio eis augetur, ruta & cuminum in oleo decoquimus: indeque uentrem quam plurimum irrigabimus, ex eodemque oleo quincuncem per clysterē infundemus, si tamen clysteri stercorem educit: uo prius ipsos euacuauerimus, in quo decocta sint ruta & cuminum. Deinde splenium magnum aluo ac uisceribus imponendum ex epithemate quod ex seminibus constat. In cibo uero succus prisanæ detur, qui ex aceto, melle, cumino, & aniso sit conditus, post etiā gallina ipsidem condimentis apparsa exhibeatur, potus uero sit uinum rufum mediocri mensura.

Ad eos qui flauam bilem euomunt.

Cap. III

Ex libris Philumeni. Qui flauā bilem euomunt, siue in febribus, siue citra febres id contingat, eis conueniunt ea quæ ad nauſeā, ac nimiam stomachi humectationem describuntur. Quare omnibus ad illos descriptis odoramentis, manducatorijsque & fomentis utantur. Decubitus autem eorum, a cibo præſerim & potu supinus adornetur, & spongia ex posca imbuta ad os uentris imponatur, maxime si non uilis & contemptibilis sit dolor. Fricatio etiā & constrictione iuncturarum manuum ubi pulsus exploramus adhibeatur, & reliquarum similiter extremarum corporis partium. Cataplasmata autem ex palmis, malicio, & similibus accipiantur, quæ ex uino quidem aut posca sint decocta cum pane autem & acacia, & hypocistide permixta ac contrita: quin & rhus & syluestris punici mali flores commodè cataplasmati admiscantur. Atque uniuersi corporis curatio ex oleo fiat, modico nitro ammixto, quo sudor ex cute eliciamus, & fluores transferamus: & ob id etiāalui per inferna excretio plus quam oportet facta uomitus desiccet, quare ex absinthio & aloë portionem conuenienter exhibebis. At uero affectione diutius perseuerante, si agri uires non repugnent, etiam hieræ catapotia ex colocynthide ab Archigene descripta apparabimus, de quibus eis minimum drachmā, summum III, dabimus. Et si nihil obſtet cataplasmate ex sinapi præcordia rubefaciamus. Præclare enim sensum ipsum ad cutem transfert. Verum hæc diuturnæ affectioni remedia conueniunt. Tempore autem exacerbationis & circa accessionis acumen, cucurbitula plurimum auxiliatur cum multa flamma ori uentris affixa, fortiterque abstracta, rursusque secundo ac tertio adglutinata. Cibos quales uomentibus solemus exhibebimus, sæpe & paulatim sumēdos, & quotienscunque reuomuerint acceptos, toties alios postmodicum interuallū offeremus. Ante cibum aquā tepidā dabimus, & uomere cogemus: bilioso enim humore circum circa adhærente unā cum aqua reiecto, stomachus elotus ac leuior redditus statim retinet oblatum sibi cibum. Mitigat autem dolores & stomachi morsus portulacæ succus tum per se, tum cum unguento nardino aut melino mixtus. Qui uero stomachū habent uehementer exulſū, eis utile est lapathi acuti semen, trium obolorum pondere ex aqua: aut maliches tenuissime trita cochleare bibendum præbe ieiunis ex aqua. Maxime omnium aut morsus sedat lac asininum: aut si hoc non adsit, bubulum recens multum potatū, absque dilatione enim auxiliatur: si uero neque hoc adsit calidū, quam eius partē aquæ addere oportet, & feruefactū bibendū præbere. In balneo quoque & ad uini potationē celerius ducendi sunt qui bilem euomunt, quo uidelicet ad cutem materiā transferamus. Cæterū & uinū subadstringens firmitatem corporis.

corporibus addit, ac cibos retinere cogit. Utendū est etiā aliquando ceratis ex lentiscino aut cenanthino oleo, admixtis absinthio, aut aloē, aut galla, aut cenanthe.

Ad eos qui stomacho exuruntur, & siticulosi sunt. Cap. IIII

Sitis fit aut ob penuriā humiditatis, aut abundantia caliditatis: siccitatis remedium est somnus, caliditatis uigilia. Verum his qui ob multi uini potum sitiūt, frigida aqua potata auxiliatur. Quibus autem longo iam tempore stomachus aestuat, eis auxiliatur, simulq; sitim sedat, radices dulcis succus potatus, atq; ipsa etiā radix ex aqua, pampinorum uitis cremor, & portulacae succus. Ab imbecillitate aut uires recolligentibus sitim sedant, ficus siccae cibo acceptae, & symphytum in petris nascens cōmanducatum. In cataplasinatis uero ad stomachi ardores conducunt, sanguinaria, intubum, sonchus, apium hortense, pampini uitis, portulaca, unumquodq; cū polenta aut pane. Qui in superficie uruntur, his ramentorū cucurbitae succus opitulatur cum rosaceo, aut omphacij succo. Sitim autem quae in febris oboritur, lenire solet capitis irrigatio ex frigidissimo oleo, aut rosaceo, ex alto nimirū sincipite irrorato. Sitim etiā adimit stomacho exultis cucumeris semen cōmanducatum, decorticatū uero & tritum, ex aqua potatū ualde iisdem auxiliatur. Eodē modo prodest lactucae semen manducatum & potatū: item semen portulacae. Aliud adipson, sitim optime tollens. Cucumeris satui seminis decorticati dra. VII, tragacanthi dra. III, tragacanthum contundito & cribrato, semen uero conterito, eisq; ouorum crudorū recentium candida adijcito, & simul omnibus contritis catapotia informato, ac in umbra exiccato, ex his deinde unum sub lingua detinendū praebeo, ut paulatim dissolutū deglutiat. Aliud adipson, ad stomachi nimia humectationem commodum, in his praesertim quibus humida & calida dispositio adest. Rosarum uiridium unguibus earum resectis drach. VI, radices dulcis drac. III, spicae nardi drach. III, excipe uino dulci, & redige in catapotiorum formā, indeq; ciceris magnitudine sub lingua detinendum praebe, refrigerat, & firmitatem addit. Aliud, Seminis cucumeris, seminis portulacae uiridis, tragacanthi, cuiusq; drac. III, radices dulcis drach. II. Excipe portulacae succo, & in catapotia redige magnitudine fabae, & utere uno pro uice sub linguā exhibito. Absorbent etiam malorum cotoneorum cremorem, aut pirorum, aut omphacij succum cum aqua. Aliud adipson, Seminis portulacae uiridis, seminis peponis, succi radices dulcis, tragacanthi, singulorum equales partes, aqua subigito, & ad fabae magnitudinem reducto, ac utitor.

De singultu.

Cap. V

Singultus accessio stomacho accidere solet ob repletionem, aut euacuationē, aut frigiditatem: aliquando etiā ob humorū acrimiam & medicata qualitate praeditorum mordacitatem, quos ubi uomitu reiecerint, statim a plurimo singultu liberantur. Quin & hi qui pharmacū ex tribus piperis generib; biberunt, aut ipsum adeo piper, si statim uinū a sumptione eorū ingesserint, omnino singultuunt. Cuiusmodi in mordacē qualitatem corruptus aliquos singultu facit, & oris uentris frigiditas singultū inducit, maxime uero omnium pueris frequētes singultus accidunt ob stomachi frigiditatem, & alimenti corruptionē. Fit etiā in febris singultus, stomacho praesertim aut aliquo alio uiscere inflāmato. Frigiditate itaq; singultū praecedente, oleū lana exceptū stomacho imponendū, in quo ruta, cuminum, & absinthium sint decocta. In potu etiā ruta cum uino exhibenda, aut apitū in aqua mulsa decoctū, aut cuminū tritum, aut calaminthe, aut asarum, aut pulegiū, aut dictamnū, aut celtica nardus, quodlibet eorum per se aut simul mi-

S 2 xta,

xta. Vtile est & acetum scyllinum forbillando acceptum. Castorium autem eis qui integræ sunt ætatis, tum ob frigiditatem singultientibus, tum ob humorum multitudinem similiter affectis, drachmæ pondere ex posca dandum: quin & stomacho forinsecus impositum utrisq; commodum existit cum oleo sicyonio aut antiquo. Quando uero ex repletionem singultus oboritur, quomodo in totum frequentissimè consistit, uiolento motu opus habet. Vomitus itaq; remedio fuerit, & extremarum partium adstrictio, compressio spiritus, uociferatio concinna, cum plurimo clamore, deambulatio longa & concitata, gestatio atq; adhuc magis equitatio, cucurbitulæ cum plurima flamma pectori, stomacho, & dorso affixæ: sternutatio etiã cõuenienter prouocatur, eis qui ob humorum multitudinem singultiunt. Singultui autem ex euacuatione oborto maximè cõtraria sternutatio existit: sanantur autem hi per alimenti cõuenientis assumptionem, & per ea quæ defectum explent. Singultus in altiore sopore, aut animi deliquio, aut tetanis obortus, mortem nõ longè abesse præfagit. Ceteri & his aqua mulsam assidue bibendam exhibere cõuenit, aut aquam purã medicriter feruifacã. Conducit & castoriũ ex aqua mulsa potatũ pondere trium obolorũ. In his uero qui à malo uicti sunt præclara remedia recusanda sunt. Porro mordacitate singultu producente, primum sufficiens remediũ uomitum ipsum reperiemus: deinde etiã sensus stupefactione, & morsum inferentium alteratione ac discussione. Sape fiunt itaq; sensus per refrigerantia. Alteratur autem mordacitas per obtundentia. Eiusmodi mixtæ facultatis subiectũ pharmacũ existit, & quæ ei assimulari possunt. Habet autem hoc modo, Asclepiadæ pharmacum, ad eos qui stomacho exuruntur, & ad uehementes singultus, uolulosasq; stomachi affectiones. Costi, spicæ nardi, chrysobalani, croci, rosarum uiridum, mastiches, cuiusq; drachmas IIII, alari, aloës, cuiusq; drach, II, opij drach, I, subige cum psyllij cremore, & digere in pastillos, quorum tres pro uice dato. Ego uero chrysobalano reprobata, pastillo qui alter appellatur ad hos utor, qui paulò mox ad stomachi subuersiones describetur. Obtundit autem mordacitatem, & ex ea obortũ singultum sedat, intubi succus potatus, cucumeris semen decorticatum tritumq; bibitum: lactucæ semen eodem modo, item portulacæ succus potatus, ipsaq; portulaca in cibo sumpta: myxarum decoctum in potu acceptum: maximè omnium tamen præstat lac recens mulctum potatum.

De bulimo, id est, ingenti fame.

Cap. VI

Bulimos ex stomachi frigidityte oboritur, indigentiaq; ac uirium imbecillitate, & ab externo frigore ferè in totum initium capit. Vox ipsa Græca est, & à Latinis magna fames interpretatur. Fames enim in principio multa adest, quæ tamen non usquequaq; perdurat. Nam postea repente animo linquuntur, cum extremarum partium refrigeratione, & spiritus defectione. Et sanè quidã in locis desertis, aut in balneo in malum istud collapsi, ex instanti perierunt, auxilij facultate destituti. Peregrinationes autem & itinera longa, maximè per niuem facta, affectione hanc inducunt. Eos itaq; qui in itinere, aut aliàs fame magna citra febrẽ infestantur, refoebimus ac reuocabimus aceto aut pulegio ad odorandum exhibito, aut terra quæcunq; tandem obtigerit aceto cõpersa: item pomis ac alijs qui inueniri possunt fructibus. Auxilia & panis recens naribus admotus, & caseus boni odoris, caro suilla assata aut cocta: & in uniuersum omne quod ualde nutrit, maximè uero quod nidorosum ac probè conditũ habet odorem: his enim ut plurimũ multi refocillantur. Ceterũ & extremæ eorũ partes sacris cõstringendæ sunt, manuumq; ac pedũ summitates calidæ aque serueti ori impositæ.

imponenda, & ipsi quoque stimulis eorum maxillis, crinibusque ac auribus uellicatis excitandi. Reuocatis autem ab exolutione panem ex uino diluto offeremus, aut aliud quiddam eorum quae acuatim uires reparare possunt, uelut sunt, oua sorbilia, halica cum uino. Compendiosissimum enim auxilium ex cibo sperare possunt, quem etiam si oblatum acceptare non possint, ori indere oportet uiolenter, cogereque ut ipsum transglutiant. Euestigio enim & a fame & ab animi deliquio liberantur, & celeriter excitantur. Accedit etiam in febris, raro tamen, neque cito, uerum circa uigorem ac declinationem. Si itaque remissionis exacerbationum febrilium tempus, eius accessio irruat, aut circa exacerbationis declinationem, intrepide eis cibi sunt offerendi. Si uero in principio accessionis febrilis, aut in uigore apparuerit, per praedicta odoramenta conabimur eos primum reuocare, maxime per ea quae frumentacei generis existunt: uelut est, polenta aqua madefacta, aut posca, aut panis calidus uaporem adhuc emittens. Fricatio etiam extremarum partium adhibeatur, & cataplasmata ex palmis, aut malis cotoneis, aut polenta, in uino diluto decoctis, atque haec usque ad remissionem facere oportet, ut oportunum cibum offeramus. Quod si ex his nihilo melius habeant, audendum est per ciborum ingestionem auxilium adferre. farinae itaque crassioris cochleare unum ex aqua mulsâ, quae lactis speciem ac teporem in tactu de se praebet exhibeto. Buccellas item unam atque alteram uino madefactas. His enim refocillati ac respicientes, ex improviso deinceps usque ad remissionis tempus perueniunt, in quo tum corporis curationem, tum sufficientem ordinabimus cibum. Vitabimus autem omnino in his qui hac affectione sunt apprehensi, longiorem cibi dilationem ac inedia, & ne aliter tantum diebus cibum offeramus. Verum solerti rationatione facta, singulis horis simplicissimum modicumque cibum dabimus. Assidui enim bulimi & exoluunt & in animi deliquia incidunt, quibus agere auxilium reperitur.

De animi deliquio. Ex Philumeno.

Cap. VII

Animi deliquium siue in febris, siue citra febres contingat ex praemanifesta causa, uelut est, plurima sanguinis aut uentris excretio, aut assidua surrectio, aut motus, aut dolor, aut timor: auxilium fert ex causarum ablatione, de quibus absolutissime in februm tractatu a nobis est praedictum, quinto uidelicet Sermone. Dicitur autem summam & paucis etiam hoc loco de hisdem. Frequentes igitur surrectiones eis prohibendae sunt, & acuatim facta euacuatio cohibenda, doloresque mitigandi: causae etiam quae timorem inducunt soluendae, siue forinsecus accedant, siue ex humoribus in corpore oboriantur. Extremae corporis partes animi deliquiis irruentibus constringantur: cucurbitae etiam aliquando tum posterioribus, tum anterioribus stomachi partibus affigantur, & in latius etiam apponantur. Caput autem agitatū leui manus impositione cum coarctatione etiam comprimatur. Odoramenta quoque offerantur, & aperto ori digitus aut penna immittatur, facies uero ac stomachus uehementissime fricetur. Hoc enim modo praecipue refocillantur, uiresque recolligunt, neque in periculum animi deliqui incurrunt. Reuocatis autem siquidem febre careant cyathi III, aut IIII, frigidae aquae in potu exhibendi, quam tamen paulatim & per interualla absorbeant, aut cremorem palmarum, uuarum passerum, malorum cotoneorum, rosarum, aut pampinorum, aut alicuius consimilis, aut uuae acerbae nondum maturae succum cum frigida aqua. Aut mentae ramulos tres tritos cum mali punici dulcis siue acidi succo praebet absorbendos: aut polentam cum punici succo. Forinsecus autem stomacho ea imponenda sunt quae supra ad cardiacos & bilem uomentes sunt descripta.

S 3 De

De his qui in balneo animo linquntur.

Qui in balneo animo linquntur, aut magis animo linqi incipiunt, eos ce-
leriter educere oportet, neq; multa aqua infusione humectare. Qui autem iam
inciderunt, celerrimè exportandi sunt: & reliquum quidem corpus leui quo-
piam uelamine cooperiendū, facies uero spongia frigida imbuta madefiat, aut
frigida aspergatur, fricanda etiā facies, stomachusq; & pedes: os quoq; aperien-
dum pennarum aut digitorum immissione, omniq; modo conandum quo hu-
mor ipsius animi deliquiū autor euomatur, aqua tepida ori instillata. Etsi enim
nihil inde euomant, stomachus tamen irritatione firmatur quæ animi deliquiū
soluit: auxiliatur etiā ad oris apertionem auditoriorū meatuum compressio,
similiterq; ossium quæ à petræ duritia, lithoidea, hoc est, petrosa appellantur.
Qui uero uilioris sunt conditionis etiā alapis sunt cædendi, capillorum quo-
que facta euulsione. Et uociferatio quidem unius, utilis est: multorum autem et
simul edita, nocet. Cæterum à uehementi animi deliquio cōualefcantibus, tum
in calidam, tum in frigidam aquam demissiones, uelut mortis causæ timendæ.
Aut enim laxatis corporibus, calore discusso & resolutio pereunt: aut à frigidi-
tate adstrictis, extinguuntur.

De stomachi imbecillitate, & supinitate, ac subuersione.

Ex Galeno.

Quæ supinitas stomachi appellatur, ex intemperie quacunq; tandem obori-
tur, nullis humoribus uitiat. Oboritur etiā ex multitudine humorum, nulla ta-
men maligna qualitate accedente: stomachus enim à largo humore fortiter ma-
defactus, ad similitudinem amplitudinis totius uentris laxatur, adeo ut cibus ob-
uolui, eosq; contegere non possit: & propterea circa ipsum humores superna-
rant, quos ubi uentriculus abrumpere omni impetu annititur, anxietatis acce-
sionem perfert, ac prius quàm cibus præbeatur, extremæ imbecillitatis. Facili-
mè autem hæc affectio curatur, inter reliquas stomachi affectiones longo tem-
pore perseverantes. Opus uero habet pharmacis humorem desiccare ualenti-
bus, cohibereq; ac adstringere laxatum corpus. Itaq; si in profundū usq; humi-
ditas extendatur, & crassa tenaxq; existat, pharmacū miscere oportet extenua-
torium & ueluti consumptiuū, quale est acetū & acetū mulsum. Si uero ei-
usmodi humiditas non existat, neq; in profundum usq; corporū extendatur, adstrin-
gentia sola ad curationem sufficiunt. Magnum autem signum ad cognoscen-
dum, frigidane sit an calida hæc affectio, sensus ægri præbet: siquidem aut nuli-
lam, aut aliquā sitim perceptet. Supinitates igitur stomachi ex uitiatibus humori-
bus obortæ pica curantur, quemadmodū paulo post dicitur, utpote quæ celerrimè
uitiatum humorem repurgat. Subuersiones uero & nausæ ex imbecillita-
te stomachi factæ, per intemperiei correctionem sanantur, & per incumbens
humiditatis desiccationē. Siquidem aut calida affectio existat, catapota ad ipsa
& sitim tollentia exhibeant, quæ ad eos qui stomacho exuruntur sunt descripta,
& maxime quod ex rosis, spica nardi, & radice dulci constat. Ad frigidiores ue-
ro & humectiores affectiones conueniunt subscripta. Asclepiada, ad stoma-
chi subuersiones. Succī acinorum mali punici acidī sextarios IIII, succi mentæ
sextarium I, conijce in uas fictile, & decoque assidue agitando, & ubi coacti fue-
rint ablatis recondito, & ante cibum mystērū unum aut duo exhibeto. Aliud.
Vuam acerbā immaturā arefactā, contusamq; & cribratā in promptu habe,
& cochlearij mensura ex aqua frigida cyathis duobus præbe. Aliud, quod
calidioribus dispositionibus magis commodum est, sicut etiam præcedens:
Mala

Mala punica matura & in uigore perfecta quinque aut sex numero, integra una cum putaminibus contunde, & infulis aquae pluuiialis sextarijs tribus usque quo ad tertias omnis liquor redactus fuerit decoque, exprime, ac percola, liquoremque expressum rursus per se decoque, donec ad mellis spissitudinem redigatur: ac inde cochleare unum aut duo exhibe: his qui febre carent cum uino, febricitantibus uero ex aqua. Aliud ualde bonum. Succo mali punici acidi, ac intubi, aequalibus portionibus permixtis, mentae siccae tenuissime tritae, parum quiddam insperge, & cyathi mensura bibendum praebe. Idem facit oxylapathi semen tritum ex aqua potatum: similiter & semen portulacae. Vere etiam confidenter ad stomachi subuersiones, amazonum pastillo, & eo qui alter appellatur, quorum compositionem paulo post in nausea tractatu describo. Vere quoque cataplasmatibus & epithematis, quae mox post sermonem De nausea describentur.

De nausea, Ex Galeno,

Cap. x

Nauseae ex uitioso humore tum calido, tum frigido gignuntur. Qui in uentre continetur, aut in concauitate ipsius innatat, aut in tuniculis eius infartus instar uisci adheret, atque aegre auelli potest: aut serosior & medicatior existens in ipsis uentriculi tuniculis: uelut aqua in spongia, imbibitur. At qui cuiusmodi humores ex uentris intemperie tum calida tum frigida aliquando generantur, Aliquando autem ex alijs partibus prius affectis in ipsum uentrem, uelut excrementa illarum confluunt, utpote ex hepate, aut splene, aut capite, aut ex uniuerso corpore. Quando igitur aliae partes prius afficiuntur, omni modo uniuscuiusque propriae accessiones concomitantur: & ipse aeger primum affecti membri laesionem sentit: aut enim caloris sensus iuxta affectum membrum ipsi contingit, aut frigoris, aut grauitatis, aut etiam tactui nostro durum succumbit. Si uero uniuersum corpus uitiosis humoribus repletum est, id ipsum ex colore, & eruptionibus pupularum circa cutem cognoscitur, atque ex ipsa adeo urina. Quod si nihil horum adsit, certum est uentrem ipsum aliquo modo egrotare. Si itaque cibi in uentre nidore sunt, nullo huiusmodi cibo assumpto, uelut sunt pisces, aut oua in sartagine fricta, aut alij consimiles, necesse est ratiocinari causam calidam esse, quae hoc in uentre operatur. Si uero acescunt in uentre cibi, nullo huiusmodi cibo sumpto, uelut sunt pisces, aut oua in sartagine fricta, aut alij consimiles, necesse est considerare frigidam causam esse, aut atrae bilis humorem uentrem infestantem. Manifesta autem erit cognitio & scientia causae, quam habes suspectam: frigidis enim pharmacis cibisque ac potibus statim adiutum hominem uidebis, siquidem calida dispositio extiterit. Si uero frigida, calidis cibis & pharmacis iuuabitur, a frigidis uero laedetur: caeterum & sitis ad calidam affectionem concomitatur: sitis autem fere in totum caret, qui frigidam intemperiem habent, nisi falsa sit pituita. Atqui ex diligenti uocatus inspectione eiusmodi quoque cognoscunt affectiones. Si enim intemperie quadam uenter afficitur, assumptos cibos ad intemperiei naturam permutat, ut appareant uomitu redditi cibi, citra alicuius humoris complexum, in nidore aut acorem permutationem suscepisse. Si uero humor quispiam uitiosus amplitudini uentris innatet, & cibum corrumpat, ipsi cibi manifeste eiusmodi humore malefecti apparent, & in illius naturam permutati. Quum uero cibi amplitudini uentris innatent, humorem ipsum affligentem producunt, qui ubi infartus, aut imbibitus, ut dictum est in uentris tuniculis fuerit, siquidem calidus sit, siticulosos facit, & ciborum inappetentiam inducit: si uero frigidus sit, ciborum appetentiam excitat, & sitim extinguit. Nauseae autem utrisque accedunt, & inanes uomem-

S 4 di irri-

di irrationes, quæ lancinant tantum & nullum humorem educunt. Prædictum autem & antea est, quod si tenues humores & ueneni existant, quos etiam Greci *ixātes*, hoc est, serofos appellant, per profundum solidorum uentris corpusculorum procedunt, & uelut aqua in spongia imbibuntur. Si uero tenaces sint, circa internam uentris superficiem uisci modo adherent. Serofi itaque humores utpote tenuium partium existentes, non solum ante cibos, sed & post acceptum cibum, uomitum inducunt, perpetuo nimirum motu uersati. Qui uero superficiei uentris infarti adherent, ante cibum magis inanes uomitiones mouent. Diligenter itaque considerare oportet, num uentris tantum affectio hæc sit, aut alicuius alterius membri. Deinde qualis affectio existat, an calida, aut frigida, humidæ aut sicca. Et siquidem ex alia quadam parte, aut ex uniuerso corpore humores in uentrem confluant, priorem curam membri prius affecti habere oportet: ita tamen ut neque uentrem ipsum negligamus. Qui enim primum affectum particulam curat, uelut fontem omnium in uentrem influxionum excindit. Ventre autem solo affecto, dispositionis in ipso qualitate cognita medebimur. Calidam itaque intemperiem semper refrigerare oportet, in quocunque tandem membro existat, frigidam autem calefacere: eodemque modo humidam desiccare, & siccam humectare. Innatantes autem amplitudini uentris humores euacuare, siue per uomitum, siue inferne per aluum commodius id fiat. Qui uero in tuniculis uentris infartus adheret, aut imbibitus est uitiosus humor, per repurgantia ipsumque incidentia ac euacuantia pharmaca est curandus. Intemperaturæ enim in humoribus consistentes pharmacis humores euacuantibus opus habent. Qui uero absque uitio humore, ab intemperie sola quacunque tandem, maxime tamen calida & sicca infestantur, in tabem omnino perueniunt, pharmaco euacuante purgati, etiam si exhibitum pharmacum imbecillius existat: quale est ex aloë picrum appellatum. Quo modo igitur unquamque intemperiem, siue simplicem, siue mixtam curare oportet: iam prædictum est in quarto huius tractationis Sermone: dicitur tamen oportunè & hic de eadem re, sed paucis. De intemperie frigida. His itaque qui ex frigida intemperie afficiuntur pharmacum ex tribus piperis generibus, commodum existit, aut quod ex calamintha constat, aut aliud quoddam consimile, ex uino tenui aut aqua potatum. Forinsecus autem stomacho mastichen chian, unguento nardino dilutam & tritam, purpureamque exceptam lana imponito. Vinum uero exhibendum est rufum, subadstringens & uetustius, & consimiles etiam cibi.

De intemperatura calida. His uero qui a calida intemperatura afficiuntur cum mediocriter adstringentibus & refrigerantibus forinsecus stomacho ac uentri adhibitis, medebis, ita ut quanto magis calor excellat, eo amplius refrigerantia adaugeas. Cibum autem exhibebis halem ex uino albo & tenui, & subadstringente: ex uolucris, macras & non foetidas, ac quæ his consimiles existunt. Si autem humor tenuis biliosus aut serofus in uentris amplitudine contineatur, tenuissimo prisanæ succo exhibito uomere cogimus, digitis aut pinnis immisissis. Aut aloës pharmacum est aloë, & in una sæpe die stomachicos sanat: si uero pituitosi aut uiscosi & crassi humores amplitudini uentris innatent, aceto multo utendum est, in quo ex incidentibus, ac repurgantibus, mediocriterque calefacientibus quedam sunt decocta: his uero quibus uitiosus humor intrinsecus circa superficiem uentris infartus adheret, ut egre auelli possit, ex aloë picra appellata compositio utilis existit, quæ uiscosum humorem repurgare consueuit, crassumque extenuare, per uires eorum quæ cum aloë sunt comixta: quod si serosa humiditas tuniculis uentris sit imbibita.

bibita, quæ ut prædictum est, non solum ante cibum, sed post acceptum etiã uomitus mouet, primum Amazonũ pastillus conuenienter exhibetur, qui picra est subscriptus. Mediocriter em̃ per hunc uomitus prohibitis, deinde ex aloẽ picra appellata utimur. Cuius cõpositio hæc est: Aloẽs drac. c. xylobalsamĩ, mastiches, croci, spicæ nardi, asari, cinamomi, cuiusq; drach. vi. contere & reponere arida, & exhibe perfecto pondere scrupulorum xii. ex aquæ frigida aut calida cyathis xii. Andromachus ad prædicta etiã floris iunci odorati drac. vi. adijcit: & aloẽ lotã conijcere iubet. Verum quod cognoscere opere precium est, ad ventris subductionem illota aloẽ cõuenientiore existit: quæ enim lota est, multum à medicamentaria facultate deponit: quam cõfidentius etiã exhibere quis possit, eis qui non ualde febricitant, & quibus firmitatẽ uentri addere uolumus. Quare scire oportet ex uitiatis humoribus affectiones circa stomachũ & uentrem, per pharmaca ex aloẽ utiliter subduci & euacuari posse: quæ in maximã perniciẽ perueniunt per adstringentiũ eduliorũ, potionum, ac pharmacorũ exhibitionẽ. Asclepiades autẽ picrã eodem quo Themison modo apparare iubet. Habet autem hoc modo: Aloẽs dra. c. mastiches, croci, spicæ nardi, asari, cinamomi, cuiusq; un. i. & pro xylobalsamo carpobalsamĩ unc. i. contundito ac per angustissimũ cribrum excusito, siccumq; ne in aẽrem transpiret adseruato, & drac. i. tantum ex frigida præbeto, nisi menses ciere uelis, nam tum præstat præbere ex uino. Eductis menstrua foeminarũ: facit & ad uulvæ affectiones: propriẽ autẽ ad stomachi subuersiones: conducit hepaticis, affectionibus renum atq; omnino admirandã potentia habet. Ad refrigeratos autem & qui pituitã crassam & uiscosam in uentre habent, subiectum pharmacum cõmodum existit. Calcificat enim & extenuat ac diffecat crassiciem, uiscositatemq; repurgat. Habet autẽ hoc modo: Corticis radicis foeniculi uiridis sex unc.ẽ, aceti sesquiseptariũ, aloẽs quadrantem. Cortex cum aceto ad tertias decoquitur: deinde percolato aceto mellis attici unc. xv. adijcimus, & ad mellis crassitudinem coquendo redigimus, & contrita in mortario aloẽ paulatim hoc ipsum acetum multum coctũ affundimus: postea uero simul uncta tollimus, ac utimur. Datur ad summũ mensura cochleariorum trium. Alia compositio quæ dulcis appellatur. Aloẽs septuncem, iridis sextantem, mastiches sesquunciam, nardi celticæ unciam unam, piperis drachmas quatuor, myrrhẽ drachmas quatuor, aceti choenices septem, cyathos septem, mellis libras tres, sextarium unum, corticis radicis foeniculi libras tres. Corticem foeniculi in aceto præmaceratum ad tertias decoque & percola, residuoq; aceto mel adijce, ac rursus decoque usquequo probe cogatur, deinde sicca in mortario simul ammisce, & cochlearium unum exhibe. Conducit frigidioribus temperaturis, & aluum pituitosiores mediocriter soluit, & caput leuius reddit. Amazonum pastillus. Facit ad uoluulosas stomachi subuersiones. Voluulosas autem fortes stomachi subuersiones appellat. quemadmodum enim in uoluulis uomitus cum uehementi contentione fiunt, & stercorea reuomunt: ita etiam alios uomitus concitados uoluulosos appellare possumus. Consequuntur autem huiusmodi uomitus ubi magna molestia affectis membris à ferosis medicatisq; ac uenenosis humoribus est illata: & si aliquo modo imbecillior fuerit ueter, geminat malum ex mordacitate. Quapropter ita instruenda curatio est, ut simul odoras qualitates affectis membris offeramus: quales sunt aromatum quorundam & seminum in ciborum usum uenientium: uelut est anisum, & apium, & similia. Quemadmodum enim graueolentia omnia stomachum subuerrere consueuerunt: sic odora corroborant,

rant, maxime quæ nobis sunt familiaria & in cibo accipiuntur. In quibus itaq; coniectamus serofos humores in uentris tuniculas imbibitos esse, his hoc pharmacum magis conueniet. Quibus uero circa superficiem uentris tunicularum infarti adherent, eis picra utilius exhibetur. Quod si exhibitâ picrâ reuomant, coniectare oportet mixtâ esse affectionem, & tum tuniculis imbibitos, tum superficie infartos humores, in uentre abundare, quare utile fuerit pastillum præbibendum exhibere, ut mediocriter uomitû prohibeat: deinde aut pharmacopicro uti. Est aut pastilli cõpositio hæc: Seminis apij drach. VI, anisi dra. VI, comæ absinthij dra. IIII, myrrhæ drach. II, piperis drach. II, opij drach. II, castorij dra. II, cinamomi drach. VI, in pastillos redigito, & ad summum drac. I, exhibeto. Ego uero, inquit Galenus, præscriptum pharmacû citra myrrhæ admixtionem appropare cõsueui, ob medicamentariâ eius uim, piperis pro eo coniiciens dra. II, ita ut in uniuersum piperis drach. IIII, accipiantur. Datur stomachicis ex uini diluti cyathis III, Cholericis autem siue bilem effundentibus ex aqua frigida. His autem qui cibum reuomunt, siquidem siticulosi fuerint, & caloris sensus eos circa os uentris infestet, & sanitatis tempore frigidam bibere sint adfecti, similiter ex frigida præbe: si uero non ita habeat, ex calida. Coeliacis, & ad intestinorum tormina ex decocto myrti, splenicis cum aceti mulsi cyathis tribus.

Asclepiadæ pastillus inexuperabilis, alter appellatus. Pharmacû quod prosperè accomodatur, dolorem leuans, somnum inducens, multæ omnino utilitatis: etenim morbos circa stomachû mirabiliter sanat, acidus ructus & difficilis concoctione aufert, intestinorû tormina, & uoluulos, inflationesq; curat. Prodest hic pastillus ad capitis dolores potatus, & aceto dilutus forinsecus frontilitus. Ad dolores aurium facit perdicij succo liquefactus: facit & ad dentium dolorem tritus & galbano exceptus, aut fici succo, & cauerne inditus. Ad oculorû affectiones & fluxionû impressione passio diluitur, & lana ex eo irrigata imponitur. In tonsillarû affectionibus tepesfactus ac dilutus ex aqua multa præbetur gargarissandus. Vtilis est ad omnē sanguinis fluxum uino myrtite dissolutus. Ad destillationē inueteratasq; & recentes tussis affectiones, uino scybelite aut thereo eliquatus. Prodest suppuratis, & phthisicis marrubij decocto liquefactus, prodest dysentericis, cholericis, & sanguinē reiectantibus, sanguinariæ succo dilutus, prodest ad omnium reptiliû plagas ex rutæ decocto potatus. Soluit per circuitû repetentes febriles accessiones, si duabus horis ante aduentantē febrem ex uini diluti cyathis III, exhibeatur. Foeminarû menses ciet artemisiæ succo dilutus ac potatus, facit & ad uesicæ affectiones uino mulso solutus, quo modo & ad uulvæ strangulationes prodest potatus, facit ad articularû dolores & podagrâ gentianæ decocto dissolutus ac potatus. Compositio autē eius hoc modo habet: Castorei, opij, myrrhæ, cuiusq; drac. IIII, spicæ nardi, cassiæ, terræ lemnis, corticis mandragoræ, cuiusq; drac. IIII, croci dra. VI, dauci, styracis, anisi, seseleos, seminis hyoscyami, cuiusq; dra. VIII, myrrhâ, styracem & opium in uino odorato dissolue: reliqua autem contusa & cribrata insperge, ac simul unita in pastillos redige, ciceris magnitudinē æquantibus, quibus in umbra desiccatis utere. Et de pharmacis quidem quæ in potum sumuntur hæc Galenus. Decubitus autē sursum uergens in omnibus quomodocunq; nausentibus & uomentibus adornetur, in conuenienti & affectioni contraria domo. Quæ frigida quidem sit, affectione existente calida. Contrâ uero calida, ubi frigida affectio existat. Extremæ corporis partes fricentur, manibusq; calefactis palpentur, quin & uolentius adstringantur, deinde pedes & manus in aquâ solito calidiorē

diorem demittantur. Odoramenta autē admoueantur naribus olfacienda boni odoris: uelut rosæ, mala cotonea, pulegium, menta, malabathrū, spica nardi. Caput uero fomento olei dulcis frequentius irrigetur: in calidioribus uero ex rosaceo. Stomachus absinthij cremore irrigetur, rosaceo in calidioribus ammi-xtio: nardino autem in frigidioribus, apio insuper, aut cumino, aut petroselino adiuncto. Ex quibus si nullum cōmodum sentiatur ad cataplasmata ex palinis transeundum, quæ paulo pōst dicentur. Conueniunt etiā ea quæ aloēn, absinthium, & mala cotonea accipiunt, & aliquādo quoq; alumen. Idem præstant & cerata ex his apparata. Si uero inflāmatio circa præcordia existat, communia cataplasmata adhibeantur. His qui stomacho exuruntur, frigida etiā aqua quā plurimum decocta, deinde rursus refrigerata absorbenda præbeatur, ita ut cyathi unius mensura, aut duorum, aut etiā trium, paulatim tamen absorbeat. Colluta etiā & in ore retenta, nauseas tollit, his quibus propter obstaculum aliquod potus eius negatur. Eodem modo assumitur posca diluta. Portulaca etiā cōmanducata, & ossa myxarum, & cucumeris semē cochlearij mensura mirabiliter prodest. Porro affectione diutius permanente, & cibis præ morbo non retentis: cucurbita ad os uentris cum plurima flamma affigatur, donec locus rubefiat, atque ipsa adhuc affixa cibus præbeatur. Ad quotidianas autem nauseas, & acescentem cibum, ac uomitus: coriandri semen tenuissimè tritum, cochlearij mensura, ueluti farinā aqua inspersum bibendum præbe, aut mastiches cochleare ex frigida aqua, aut lactuce albæ semen cochlearij mensura ex aqua, præbe his qui stomacho exuruntur.

Cataplasmata & epithemata ad nauseas & uomitus. Cap. xi
Cataplasmata ad eos qui cibum non retinent, quos ueteres propriè stomachi eos appellauerunt. Farina fœni græci, & maluæ semen aridū tritum, melli commisceatur. Si uero præ duritie contundi non possit, maluæ semen, ipsum decoctum & tritum modico oleo adiecto in malagmatis formā reducito, & utitor. Aliud. Lolij & xirionis farinā subige cum melle, & pro oleo liquidā picem amisce. Ceratum autem conuenit ex olei irini fece, ceratq; ac modico castorio. Aliud ceratū. Cerae quadrantē, olei irini sexuncē, galbani unc. i. opopanacis dra. iiii, castorij dra. iiii. Opopanax aceto teritur. Manifestū est aut talia in frigidis dispositionibus adhiberi. Cæterū epithemata hæc ad prædictas affectiones per experientiā, ut Galenus inquit, conducunt: non modo eorum qui ea descripserunt, uerum nostro quoq; iudicio comprobata. Asclepiadæ epithema ad stomachi subuersiones & choleras, siue bilis effusiones. Oenanthes, croci, florum rosarum, fertulæ campanæ, mastiches, singulorum drach. vii, cum passis palmis subige, modico rosaceo affuso, & uestis detritæ panniculo excipe, stomachoq; ac uentri impone. Aliud. Oenanthes, omphacij, florum rosarum, mastiches, singulorū dra. iiii, aloēs, aluminis scissi, utriusq; dra. iiii, uini dulcis myrrei quod satis est. Trita excipe palmis passis, & utere. Aliud epithema, ad stomachi imbecillitatē, & dolorē, & ad eos qui cibum retinere non possunt. Palmarū passarū sexuncē, oenanthes unc. i. thuris unc. i. mastiches unc. i. cerae lib. i. unguenti nardini aromatis inspissati libr. ii, uini quantū sufficit. Palmas in uino ueteri maceratas optimè cōtere: deinde mastichen & thus unumquodq; per se optimè tritum adijce, ac rursus simul tere. Liquefactę autem cum unguento nardino cere oenanthem tenuissimè tritam insperge, simulq; unita et refrigerata ad reliqua in mortarium conijce, & probè remollitis utere. Aliud epithema, ad stomachi subuersiones, & circa ipsum uexationes, facit & ad par-

ticu-

ticulares inflammationes. Oenanthes bessem, croci, rosarū siccarum, fertula campanæ, mastiches, ramentorū electri, sin. dra. iiii. carnis phœnicobalanorū quadrantem, uini myrtitæ quantum sufficit. Arida contunde & per angustissimum cribrum excutē, & uino myrtitæ diluta ad cerati crassitudinem redige, deinde palmarum carnem adijce, simulq; contunde, & cerato ex oleo rosaceo apparato excipe. Post uero linteolo infartum ad os uentris impone. Prodest etiam oculorum inflammationi.

De cholera, seu bilis effusione.

Cap. xii

Cholera appellatur quum ob multas cruditates uomitus biliosus & nidorifus & acidus oboritur, ad plures horas continuè perseuerans, & uenter infernè eadem ex cernit: sequiturq; sitis, & exudatio, & impeditus pulsus, musculorūq; manuum ac pedum, maximè uero surarum contractio & tensio. Si quis igitur mox in principio, aut coaceruatim, ea quæ effeuntur cohibere aggrediatur, is maioris mali autor erit: inutilia enim quum sint, euacuatione opus habet, quare conuenit si non sponte ferantur, oportune irritare, aqua tepida exhibita, ac egro uomere iussu: aqua enim mulsa mordacitatē operatur, torsionesq; auget, aqua uero oleo mixta, auget fluxiones, quare aqua tepida potata uomant, quod tunc quicquid cibis nimium fuerint expleti, prius quam illi corrumpant. Ad uiuare etiā oportet per sedem excretionē: alienū enim uelut uenenū insidens, & uentrem ac intestina rodit, & humores ex uniuerso corpore adtrahit. Per uomitus itaq; oportunā prouocationē, uomitus ipse soluitur & cessat. Quum uero humorū excretio quieuerit: colliquamenti aut & tabefactionis signa in excrementis ipsis appareant, ueluti si sint rasuræ similia, strigmentitiaq; & mucosa, & gracilitas per ambitum corporis fiat, & maximè si uenter consadat & adstringatur pulsusq; imminuatur ac præter modum cōdensetur, tunc sanè uentrem cooperire & fouere oportet, membraq; & artus ac musculosos similiter locos, oleo multo calido impinguare, & uinculis adstringere extremas corporis partes, cataplasma quoq; uentri imponendum ex palmis & oenanthe, quibus hypocisthis, & acacia, & rhus ruber, & malicorium sint ammixta. In potu uero frigida aqua cyathi mensura præbeatur absorbenda: cauendum tamen ne nimis frigida existat. Aceruatim enim exhibita reuomitur: & quæ ualde frigida est, aliquando innatum calorem stupore suo extremè offendit, aut inflammationem stomachi aut uisceris alicuius efficit. Inspargantur autem aliquando aquæ forbendæ pampini uitis, aut mali punici succus modicus instilletur. Si uero & hoc reumat, crassa etiā sorbitio ipsa facienda est, per micarum intritionē, & per cochleare exhibenda. Etenim si aceruatim deuoretur, aut reuomitur, aut infra detrahatur. Annitendum est etiā ut priore sorbitione uomitu reiecta, rursus altera exhibeatur: dandus item mali punici succus cum mentæ succo absorbendus, micis minutissimè tritis adiectis. Sit autem acidus mali punici succus, excernuntur quantitate mentæ succum excedat. Quod si acriora sint ea quæ excernuntur: cucumeris semen maceratum, desquamatum & tritum ex aqua cyathis iiii. præbeatur: datur etiā utiliter cum amylo. Post uero somnus procurandus, in quo quies omni modo. At uero ubi intolerabilis effusio existat, & pulsus emollitur, apprehendatq; frigiditas & exudatio, aliquando etiā singultus, ad uinum transeundum est mediocriter adstringens, neq; uiribus ualidum, & quod dulce quidē sit, non aut odorum. Interant autem in ipsum micas, aut haliçā injiciant, si fieri possit, calidum, si uero non, frigidū: atq; ita paulatim & per interualla cochleare absorbeant. Sitis uero arcet polenta tenuis sine sale uino diluto inspersa &

sa & absorpta. Vini multitudo uitanda est, ac omni arte conandum ut ipsos sopiamus, ex rosis ac myrto domus pauimento constrato. Odoramenta quoque naribus ad moueantur, mala cotonea, & similia. Reliqua autem omnia eo modo adhibeantur, quo supra in aestuantibus febribus est praedictum. Illitiones etiam saporiferae circa frontem assumantur. Aluo autem adhuc egerente, amyllum cum decoctione capitum papaueris per clysterem infundatur: simul enim & cohibet & refrigerat, & somnum inducit. Ad uomitus uero coercendos commanducare conuenit, succumque deuorare, mespilorum, malorum cotoneorum, pyrorum crustum minorum, & uirae, maxime quae uinaceis interpositis seruatur, & pensilem quoque unam cum uinaceis expedit manducare. Ad contractiones autem in musculis factas, uestis deritae panniculi oleo calido madefacti conueniunt, contritis musculis impositi: & cerata humida aliquando castorium accipientia, & ex sicyonio aut irino oleo facta. Quibusdam eorum etiam maxillares musculi dolent: quos quum lana operire non sit facile (Est enim iniucundum, & sudor quoque inde elicitur) illitionibus leniter factis molliores reddere oportet. In cibo exhibendi sunt pedes suilli cocti, pulli columbini & gallinarum, perdices, palumbi, turdi, & consimiles his existentes. Aesclepiades autem cholerici eiusmodi electum planè remedium describit, inutilibus tamen omnibus prius sufficienter euacuat. Baccarum myrti nigrarum exacinarum italicum sextarium unum, florum rosarum tantundem, carnis palmarum numero uiginti, aquae potabilis sextarios sex, decoque ad tertias, & expressum ac percolatum liquorem rursus per se decoque, donec ad sextarium unum redigatur: cui deinde passi myrtinae sextarium unum affunde, rursusque decoque donec ad mellis crassitudinem coagatur, & utere. Datur ante & post cibum cochlearij mensura. Vtere etiam ad hos potionibus & epithematibus ad stomachi subuersiones praescriptis.

De stomachi adstrictione.

Cap. XIII

Oboritur aliquibus post cibum acceptum, circa concoctionis & digestionis tempus, stomachi adstrictio itaque alui. aestuat autem uniuersum corpus, maxime uero manuum ac pedum extremitates: & facies ipsa rubescit: pulsus autem in densitatem permutatur. Hos multi etiam febricitare existimant. Nocuentum autem omne circa digerendi alimenti difficultatem contingit: consistit enim ut plurimum in aridis & condensata habentibus carnem, spiritu circa uias concluso & coarctato: utpote qui per uapores ab alimento prodeuntes inspissatur, & ob id quod non effletur immodice concalescit. Curantur autem hi in principio quidem constrictione & colligatione extremarum corporis partium, frictioneque brachiorum, cruriumque ac coxarum: saepe etiam extremitatum compressione, ita ut praecipiamus ipsis ut desideant, & decubitus quoque formam erectiorem faciant. Quosdam & lectica gestare expedit, donec alimentum omnino subductum digeratur. Ante augmenti tempus diligentiore totius corporis curatione utendum est, studio adhibito ut carnem mollem & humectam reddamus. Vtilis itaque eis tunc ex oleo inunctio existit parum nitri habens admixtum. Inclinate autem morbo & uigore praeterito: aquae infusio ad manus pedesque lauandos commoda est, quo tempore aliquando & calida plurimum potum non improbo: nos enim remittente morbo, & paulo longioribus existentibus interuallis, plurimos ante cibum lauimus, & uehementer iuuimus. Perfectiore autem declinatione apparente, etiam uinum exhibendum est, quo tota affectio corrigatur. Cibi autem sint facile digestibiles, & quibus concoquendis corpus sufficit: quos diuidere etiam conuenit, maxime si bis cibum sumere sint adfueti. Quod si in uisceris inflammatione

T

flammatione

flammatione, adstrictionis stomachi accessio contingat, illam ipsam prius curatione aggredi ac demoliri oportet, per fomentorum & cataplasmatum adhibitionem. Ceterum hæc ipsa adstrictionis stomachi accessio frequentius in eis apparet, qui hepar præter naturam dispositum habent.

De humoribus à capite in ventrem destillantibus:
ex Galeno.

Cap. XIII

Capite ex intemperie affecto ut multa generat superuacanea recrementa, omnibus subiectis organis inde nocumentum infertur, recrementis uidelicet ad ipsa delatis, & promptissima quidē ad os et ad nares delatio existit, deferuntur autē et ad thoracē, aliquibus etiā ad aures. Delationē autē ad os, stomachus excipit atque aspera arteria. De aliorum sanē membrorum nocumento, iam prædictū est. Quia uero ad stomachum fluxus deferatur, & frigidus existat, ad frigidā intemperie corpora perducit, calidus contrā in calidam: hic exulcerat quoque temporis progressu: in principio uero appetitui nocet & concoctioni. Si igitur frigidus fuerit defluxus, tardas concoctiones & cruditates efficit: si uero corruptus, in corruptionem adiget cibos: unde nidorosa, aut foetida, aut acida eructationes producentur, aut etiā alterius cuiusdā quæ nominari non potest, aut etiam nomen habentis qualitatis. Vbi uero altius descenderit nocumentum, etiā intestinum ieiunum afficit, & ad colum usque pertingit, atque ad uenarum mesenterij uasa, per quæ ad hepar ipsum alimentum distributio contingit. Et quibusdā quidem deiectionis appetitionis accedit: aliquibus uero appetitiones rerum præter naturam, quas appellant caninas, aut etiā ciborum uitiosorum concupiscentiæ. Optimū itaque est in his uelut fontem malorum excindere: capitis uidelicet sanitati prospiciendo: aut si hoc impossibile sit facere, ob uehementiā naturalis intemperie: omnino tamen eius saluti consulere oportet: indicatione ex figura eius accepta, quomodo ei subueniri possit: non enim quemadmodum aliqui medici, qui ad omnes diuturnas capitis affectiones semper ex thapsia & sinapi cataplasma imponunt, sic & te facere uolo. Lauacris itaque multis calidis potabilium & dulcium aquarum consolari eos oportet, discussis simul calidis in capite uaporibus, & omni temperamento melius permutato. Nocuius autē est eis usus aquarum natura sua calidarum: quæcunque enim ex eis sulphurentæ sunt, ac bituminosæ, ob caliditatem suam capitibus calidis aduersantur. Quæ uero aluminosæ, coarctatione sua caput offendunt. Solis itaque dulcibus aquis citra læsionē uti poterint. Quicunque uero ualde calidum ac perustū habent caput, his melius est ut æstatis tempore ungantur optimo rosaceo, ex solis rosis ac oleo omphacino præparato. Aliquando uero caput euaporationes calidas ex uentre suscipiens, dolore ac intemporie afficitur. Et propterea uentris curā habere oportet, ipsique robur indere, ut biliosus humor aut omnino non confluat in ipsum, aut quam celerrime euacuetur, atque hoc per absinthij, et picræ ex aloë compositionis potum. At uero quæ forinsecus adhibent uentri in his ungenta, moderate sint adstringentia. Tale autē est æstate melinū, hyeme uero nardinū. Aut mulierum ungenta, quæ foliata et spicata appellantur. Nam et ipsa calefaciunt ac roborant uentrē. Vere autē idoneū est mastichinū. Quod si non solū caput calidos serofos humores ad uentris locos demittat, sed etiā ipse uenter propriā intemperie calidam habeat, refrigerantibus edulij ac potibus et illitionibus semper uti conuenit, ita ut plus aut minus permutatio saltem in his fiat. Similiter autē etiā ubi ambæ partes, uenter uidelicet ac caput, frigidā habuerint intemperiem, calidis quidē edulij ac potibus et illitionibus uti oportet, uerum uires ipsorum permutare, iuxta anni tempora temperamento ipsorum aucto, aut

aut remisso. Cæterum gravis mixtura est, quæ aut in uentrem calidum defluerunt ex capite frigidi ac pituitosi humores, aut in frigidum calidi. Intractabilior est autem ea, in qua in calidum uentrem pituitosi ac frigidi humores deferunt. Pessima uero ubi cum his etiam uenter supprimis. Corruptuntur enim humores in uentre moræ trahentes, ut & mordeant ipsum, & uitiosos uapores ad caput remittant. Etenim pituita in uentre defluens calefacientibus ac attenuantibus opus habet. Os autem uentris ubi natura calidum fuerit, à calefacientibus. Quare conari oportet in his, ut pituita in uentre defluent, per ea quæ non ualde calfaciunt secemus. Quale est acetum multum simplex, cuius præparationem inter cōcoctoria referemus. Quum uero pituitosus humor à capite in frigidum natura uentrem defluerit, huius affectionis medela facilis est, si mane simplex pharmacum ex tribus piperis generibus constans sumatur. Sed & solum piper exactè tritum, aquæ ammixtum bibere relict. At uero absinthij potus ita affectus ualde aduersatur. Pituitosum enim humorem ipsorum uentri infarcit. Sed neque aloë sola per seipsam his prodest. Biliōsi enim humoris attractoriam uim habet, non pituitosi. Et propterea bene inuenta est compositio picra appellata, quæ propter aliorum acrium ac calidorum ammixtionem, crassos ac uiscosos humores secat. Verum fieri non potest ut quis hac assidue utatur, quæadmodum ea quæ ex tribus piperis generibus constat, & similiter quæ ex calamintia. Etenim si omni hora etiam his utatur, qui frigida uentris intemperie laborat, nullum amplius nocumentum experietur.

Diæta conueniens his qui stomachum habent dissolu-

tum, aluum autem adstrictum

Cap. xv

Gravis & ægre tractabilis cōplexus, huiusmodi corporis apparatus ac dispositio existit, in quo dissolutum & nauseabundum est os uentris, quod stomachi quoque appellatione uenit; aluus uero est adstricta: quæcunque enim ipsam ad egerendum impellunt, ea omnia stomachum subuertunt, utque & in eo cibi innatent, & nauseabundus sit efficiunt, ad quæ necessario consequitur, cibum quoque non probe concoqui. Si uero rursus ea quæ stomacho grata sunt edulia eis exhibueris, ad tres aut quatuor dies aluus inde adstringitur. His igitur in tempore diæta constituenda est, ac in principio quidem exhibenda sunt olera ex oleo & garo condita, & alia quæ uentrem emollire consueuerunt. Postquam uero sufficiens nutrimentum ingesserint, ad extremum aliquid eorum quæ stomachum corroborant, accipiant: uelut sunt poma & pyra, & aliqua mali punici genera, quæ citra acorem adstringunt. Ipse autem homo affectus, omnibus his partim experimento cognitis, quodcunque tandem minime nocuum & iucundissimum repererit, eo deinde utatur: neque tamen multum ex singulis horum generibus acceptandum est, sed quantum imbecillitati stomachi curandæ suffecerit. Facile enim solubilis aluus ita adfectis fit, quando, ut dictum est, à cæteris cibis aliquid eorum quæ stomachum adstringunt comederint. His enim os stomachi corroboratum, ea quæ uentri innatant deorsum propellit.

Cap. xvi

De stomachi inflammatione.

Os uentris, quemadmodum & ipsum hepar, eorum quæ adstringunt completum semper quidem opus habet, multo maxime uero ubi fuerint inflammata. Si enim per laxantem diætam ac ductum, citra eorum quæ corroborant admixtionem curentur, periculum uitæ incurrunt. Medici namque qui laxante diætâ in eis utuntur, uelut est oleum dulce per se, animi deliqui ipsi autores existunt: neque enim ullum noui stomachicum aut hepaticum, qui in eiusmodi medicum inciderit, seruatum. Oportet itaque siue oleum sit, quo inflammationem patien-

T 2 tes

tes fouentur, siue cataplasma ipsis imponatur: semper aliquid ex adstringentibus amiscere: uelut est unguentum nardinū, aut melinum, aut ipsum malū cotoneum in oleo decoquere, mastiche simul ammixta, Ceratū autē quo affidue in stomachi inflammatione utor, hoc est, Cerę tyrrhenicę unciam unā, unguētī nardinī tantundem, uel quantū sufficit, aloēs dra. i. mastiches dra. i. Quod si maiori adstrictione indigeant, tanta nimirū imbecillitate & dissolutione existente, ut neq; cibos continere possint, omphacij succi sicci dra. i. aut succi absinthij tantūdem est ammiscendū: aliquando etiam ambos addere oportet, & tertium quod ipsis conuenit, hypocisthidis succus existit, & cœnanthes, & rhois rubri succus, iuxta eam quæ adest uidelicet dispositionem. Cerati autem amplitudinem augere oportet iuxta proportionem & mensuram reliquorum pharmacorum: ueluti si quatuor drachmæ aliarū rerum congregentur, cerati nardinī uncias quæ tuor esse conuenit, duas quidem cerę, duas reliquas unguenti nardinī. Quod si durius adhuc pharmacum ipsum appareat, apponendum est unguenti nardinī quantum omnino satis erit. Aliud ceratum, Cerę trientem, rosacei unci. x. gallarum, aluminis scissi, aloēs, florū rosarum, mastiches, singulorum dra. i. Vere in his qui uehementi adstrictione opus habent, Cataplasmata autem inflammationis conuenientia, fiunt ex hordeo & semine lini, mellæq; et unguento nardinō, modicoq; uino, adiecta mastiche et absinthij coma. Ad diuturnas autem inflammationes & iam induratas, magis uaria pharmaca adhibere oportet: quæ & emollientium generis & discussoriorum existunt: ueluti est quod fit ex lectula campana, seu meliloto. Compositio autem eius multorum modorum est, propterea quod omnibus iuxta præcordia inflammationis conducatur: magnaq; differētia eius sub alia atq; alia forma apparati existat: alius enim apparatus circa stomachum inflammationibus, alius inflammato hepatis, aut splenis utilior extat. Epithema stomachi, quod Philagrius composuit, & frequenter apparatur. Cerę quadrantem, cœnanthes unc. i. aloēs sextantem, mastiches sextantem, ammoniaci thymiamatis, bdellij, cuiusq; unciam i. adipis anserini trientem, styracis unc. i. cœsypī bessem, olei rosacei libras ii. uini quantū sufficit. Stomachicū contusum: Andreæ Comititis. Cypheos, styracis, terebinthinæ, cuiusq; quadrantem, bdellij, aloēs, mastiches, cardamomi, cuiusq; sextantem, comę absinthij unciam, i. propolis trientem, ammoniaci thymiamatis sex uncem, cerę unc. x. cōtunde et utere. Ceratum emmolliēs et relaxans ad induratas inflammationes. Olei festariū, i. aquę cyathū, i. adipis suilli recentis sex uncē, cerę trientē, chamæmeli quadrantē scillæ quadrantē, anchusæ sesquiūciā. Epithema ex meliloto: Oribasij. Meliloti bessem, ammoniaci thymiamatos quadrantē, bdellij quadrantē, myrobalanorum sextantem, cœnanthes sextantem, cardamomi unc. i. croci, cyperi, iridis, myrrhæ, zingiberis, aloēs, amomi, spicę celticę, cassiæ, cuiusq; unc. i. cerę libram i. terebinthinæ unc. xvi. melini, aut nardinī, aut rosacei lib. i. Aliquando & succi balsami sextantem, thuris unc. i. Arida contusa & cribrata cum modico uino in pila conterito: reliqua uero in uino diluito, & liquefactis quæ liquefcere possunt, affusisq; omnia simul unito ac utior. Aliud ex meliloto, ad omnem præcordiorum induratam inflammationem, & ad colicos ac dysentericos, quod et in Alexandria apparare cōsueuerunt, quo uti soleo, hoc est: Meliloti, cyperorum, myrrhę, nardī celticę, cuiusq; unc. i. croci dra. viii. cardamomi drach. viii. cypheos dra. xvi. ammoniaci thymiamatis drac. xl. terebinthinæ drachmas lxxx. cerę drachmas. clx. olei cyprini drachmas cxx. uini quantum sufficit, Epithema ex mastiche, Terebinthinę dodrantem, cerę

cerae unc. XVIII. mastiches dodrantem, adipis taurini dodrantem, mellis lib. II. rosacei libras II. Epithema aliud, ad induratas stomachi inflammationes, & ad omnem duriciem, ac diuturnam in ipso affectionem: in senibus praesertim & qui uergentis sunt aetatis, experimento clarum. Colophoniae pellucidae sextantem, cerae purae unc. I. mastiches purae unc. I. olei communis, cochleari tantum. Omnia depurata in ollam coniecta super carbonem liquefacito, assidue agitando, donec exploratum habueris quod in frigidam aquam destillata in pastilli modum emollire ac cogere possis. Vtere, non contempta ipsius uilitate. Epithema stomachicū ualde celebre, ad stomachi inflammationes et duricias, itemque debilitatē. Micarū siliginearum quadratē, carnis palmarū pinguium unc. I. meliloti unc. I. comae absinthij dra. IIII. mastiches unc. I. aloës dra. IIII. adipis anserini recentis sextantem, cere quincuncem, olei amari prae immaturitate acerbi sexuncem, styracis unc. I. pilularum chamæmeli unc. I. Palmas, melilotum, chamæmela, ad uesperam in sapam maceranda conijcito, et sequenti die lento igni decoquito, exprimito & percolato, atque in decocto micæ maceratas rursus decoquito ac conterito: styracem uero per se cum pauco oleo liquefacito, atque ita solutum micis tritis ammisceto, & ceratum affundito: post uero liquefactis quæ liquefieri possunt, aridisque inspergis simul omnia in mortariū diffundito, ac subactis & simul unitis utitor. Ante pharmaci impositionem stomachum ex oleo & modico uino irrigato, in quibus absinthium sit decoctū, Emplastrum ex micis emolliens, relaxans, ac diffundens: facit ad inflammationes in quocunque tandem loco induratas, emolliens, & discutiens, ac firmitatem addens. Radicis altheae lib. II. phoenicobalanorum lib. II. foeni graeci lib. I. seminis lini lib. I. chamaemolorum, melilotorum, singulorum sexuncem, uini ueteris odorati adstringentis sextarios octo, spumæ argenti, cerusæ, colophoniae, cuiusque lib. II. cerae lib. I. therebinthinae lib. I. olei ueteris lib. II. aquae lib. II. panis siliginis aridi contusi et cribrati lib. V. Herbae uino præmaceratae, deinde decoctæ exsuccantur, in succo uero panis contusis & cribratis maceratur. Sequenti deinde die spuma argenti & cerusa in aqua teruntur, & adiecto eis oleo, donec non amplius manus inquinent, decoquuntur, eisque liquefacta iniiciuntur: atque ab igne ablatis, fermentata panis farina emollita paulatim ammiscetur, assidue tamen omnibus cum spatula agitis: & post in mortarium coniectis, ibique primum pistillo, post etiam manibus fortiter emollitis utitor. Epithema Nilei, ad induratas tum stomachi, tum hepatis inflammationes, Cerae lib. I. croci drach. III. ammoniaci thymiamatis sextantem, rosacei aut nardini lib. I. Crocum & ammoniacum aceto trita diluito: ceratum autem liquefactum & refrigeratum eis affundito, ac counitis utitor.

De stomacho exulcerato.

Cap. XVII

Ulceri in stomacho aut uentre existēte, omnium acrium rerum comestione abstinere oportet: succo autem pituitosæ, aut halicæ uti modico ammixto melle, quo per ipsum ulcera repurgenter & extergantur. In cibis enim exhibere oportet, aliquando quidem ea quæ ulcera repurgant, aliquando autem & quæ dolores mitigant, & mordacitatem obtundunt. Post repurgationem uero quæ carne explēt, deinde quæ ad cicatricē perducunt: uelut sunt ea quæ adstringūt. Forinsecus aut epithemata his cōueniunt ex palmis, & malis cotoneis, ac polenta. Ceratum uero imponendum ex melino aut rosaceo, ammoniaco thymiamate, & thure ammixto. Epithema autem eis conuenit Nilei. Et tempore inductionis cicatricis emplastrum ex salicibus, & quod Icefeum appellatur.

De his qui à stomacho, committialis morbi
modo, conuelluntur.

Cap. xviii

Quidam homines ubi diutius ieiunij permanerint, praesertim quum tristitia interim affecti, aut ira concitati, aut curis anxie torti fuerint, committialis morbi accessione comprehenduntur, & concidunt conuulsi. Plures autem eorum qui hoc modo afficiuntur, gracilis habitus sunt, et assidue bilis in stomacho ipsis effluat. His sane stomachus subtiliore sensu praeditus existens, & cerebrum per committalem affectum, uniuersum corpus committionis modo lancinat. Commune autem consilium omnibus hominibus medicinae quidem ignaris, ratiocinatione autem non in exercitatis subiiciat: ne quemadmodum plerique est uulgo homines rationis expertum animalium more uiuant, eorumque modo se habeant: uerum per experientiam iudicet: qui cibi ac potus eis noceant: item quales ac quanti officiant motus. Si militer autem & circa rei uenerae usum obseruent, num innoxius eis existat: an contra nocuius, multos enim noui, qui ex rei uenerae usu maximum periculum incurrerunt. Oportet itaque hos ipsos bonam & exquisitam concoctionem sibi providere: & tertia aut quarta diei hora panem diligenter apparatus accipere, solum quidem non siticulosi existant: siti uero urgente, ex uino diluto mediocriter adstringente & albo. Haec enim uentrem corroborant, et caput non percellunt, quemadmodum fortia facere consueuerunt. Exhibere etiam eis oportet ex aloë pharmaceutum, bis aut ter in anno. A superfluis enim recrementis totum uentrem repurgat, & ad propria munia obeunda efficaciter corroborat. Vidi autem & alios in ore uentris committialis morbi modo conuulsos, quum uehementi cruditate laborassent, aut uino multo meracior se ingurgitassent, aut intempestiuius re uenerae fuissent usi. Quosdam etiam in febribus uidi repente conuulsos: qui bilioso uomitu succedente, euestigio ab omnibus afflictionibus sunt liberati. Quidam autem ex ita affectis fusca uomuerunt: quidam uero porri succo consummati: quidam à multitudine uitiosorum ciborum aggrauati, sensus ac motus priuati munere, à sopore grauissimo sunt apprehensi ac detenti, quousque ea quae os uentris compresserant omnia euomuerunt. Multis uero non insomnia modo, sed & somni perturbantes, & deliria, ob uitiosum humorem in ore uentris congregatum, accesserunt. De inflatio autem & praecordiali appellato morbo, nullus est qui non uerba fecerit, quomodo uidelicet tristes, & desperantes, & morsto aspectu reddat, & (ut in uniuersum dicam) nulla re ab ijs qui atra bile afficiuntur differentes aut inferiores. Apparet autem & hos uehementius post cruciatus praedictis accessionibus apprehendi: plerique autem ex ipsis splene uiciati sunt, quae res facit ut aestimemus et quendam ex splene confluere in uentrem uitiosum ac serosum humorem. Curatio uero his conuenit eadem, quae ad affectos ab atrae bilis delirijs est praedicta, in eo quo de capitis affectionibus egimus Sermone. Item ea quae paulo ante est descripta, de his quibus atra bile stomachus infestatur, & qui uentrem habent inflatum.

Viridis iaspidis usus: Galeni.

Cap. xix

Viridis iaspis lapis stomacho, qui & os uentris appellatur, utilis extitit pro amuleto appensus, cuius rei multum experimentum fecimus. Oportet autem filo innexos ex collo suspendere, eo modo ut lapides os uentris contingant.

De appetitus perditione.

Cap. xx

Ventrem natura promptuarium creauit, ueluti terram plantis: dedit & indigentiae

digentiae sensum, cuius impetu animalia ad cibum ac potum concitata, ipsi se ex-
 pleant: & uocatur quidem eiusmodi expletionis desiderium, Appetitus. Con-
 tingit autem ob indigentiae sensum, quum uenae ex cibis in uentre ad se adtra-
 hunt, uelut emulgentes & exugentes: quam exuctionem quum uenter ferre
 non possit, sed inde ueluti diuellatur, huius angoris remedium cibum exquirat.
 Itaque exuctionis sensus, ipsa fames existit, & Appetitus appellatur Naturale o-
 pus, non animale existens. Huiusmodi autem appetitum Euacuatio praecedat:
 & contingunt sane quinque accessiones ordine mutuo seipsas consequentes:
 Quarum prima, Euacuatio est: secunda, Appetitus naturalis membrorum eua-
 cuatorum: deinde, per uenas ex uentre Exuctio: post, Exuctionis sensus: & quia
 ta, Appetitus animalis, qui omnium postremus existit. Itaque appetitus perditio
 contingit, aut ob sensus exuctionis uenarum perditionem, aut quod ex-
 ctio non fiat, aut quod corpus non euacuetur. Contingit autem saepe etiam ob
 immoderatam uentris & intestinorum fluxionem, & ob biliosi humoris in uen-
 trem delationem, tenacisq; & acris, ac porri speciem habentis: & ob pharmaci-
 portionem: & ob sanguinis immoderatam detractionem: & in continuis ac ue-
 hementibus febribus, stomachicisq; & uentris inflammatione, item hepatis, uesi-
 cae & uuluae. Contingit etiam in colica & uoluuolosa affectione. Maxima au-
 tem quod quis non esuriat causa caliditas existit, quae solida corpora laxando
 exoluit, & ad attractionem imbecilliora reddit: humida autem diffundit, atque
 amplius extendit. A plurimis etiam alijs causis appetitus perditio contingit.
 Itaque si iuxta principium morborum accesserit, aut iuxta usgorem, quum
 uires adhuc sustinere possunt, nihil molestiarum infert: modico enim alimento
 aegri opus habent. Si uero in declinatione totius morbi appetitus perditio acce-
 dat, aut in diuturna imbecillitate, aut uiribus debilitatis, aut ex immodica eua-
 cuatione, periculo non uacat. Augetur autem affectio haec & ab aetate. Incom-
 mode enim hoc malo pueri afficiuntur, utpote qui natura uoraces sunt, & assi-
 duo fomite opus habent. Quare magnus praeter naturam excessus significa-
 tur, si pueri appetitus perditione fuerint affecti. Siquidem igitur ex uitiatu-
 rum humorum praesentia, appetitus perditio contingat: antequam aliam cu-
 ram adhibeamus, delatos in uentrem humores, uomitu reiciendos praordi-
 nabimus. Quod si aegre uomant, sorbitiones exhibere oportet, quae eiusmodi
 humores inferne expellere consueuerunt. Deinde per ea quae ad hanc rem
 comoda sunt, corpora ad bonum perducemus temperamentum. Si uero ex
 uirium imbecillitate appetitus perditio accedat, considerare oportet qualis in-
 temperies uires exoluit: & per contraria eam ipsam corrigere. Si uero ob in-
 flammationem, aut obturationem alicuius alterius membri, appetitus per-
 ditio concomitetur, tum & illius habere curam conuenit. Conandum est eti-
 am ut per odora menta appetitum reuocemus: per polentam uidelicet posca ma-
 defacta, aut uino odoro diluto, aut malorum cotoneorum decocto, aut pyrorum, aut
 cucumerum uiridum maturorum cremore. Inunctione item leni & non nimium sedu-
 la idem conabimur, ac moderata corporis frictione, atque etiam pedum ac manuum
 palpatione ac contretatione accuratiore. In sensus etiam lumbos ac pedes am-
 plectentes adhibendi sunt, & aquae affusiones, ac gargarisationes: absorbitio-
 nes quoque aquae frigidae modicae & dulcis. Ab istis enim moliminibus saepe ad
 accipiendos cibos profecerunt, quin & digitorum in os immisione stomachus
 lacinatus saepe ad accipiendos cibos est conuersus, quare hoc ipsum tum ante
 curationem, tum post eam est faciendum, quomuntur enim aliquando biliosa aut
 pituitosa

pituïtosa quedam, quæ perditū appetitū in quibuldā sunt causſa, atq; ita ab hac acceſſione eos liberabis. Cibi apparentur plures & uarij ac optimo apparatu, et ultra dulcedinem etiam illicientes & appetitū irritantes: frumentacei in primis generis, ac multi alimentū: uelut eſt halica ex decoctio palmarum, aut prunorū damascenorum lota, aut ex aqua mulſa diluta præparata, oua ſorbilia, panis ex calida aqua lotus, aut ſi ita adſueti fuerint, frigida. Diuitibus autem, galorum teſtes exhibendū ſunt, & ex uolucris non gaueolentes, & macræ ac montanæ, pedes ſuilli in decoctione plurimum eliquati. Eiufmodi enim cibos ſi guſtauerint tantum, ſufficiens alimentum deinde corpori offerendum eſt. Omnia autem quæ exhibentur eiufmodi eſſe conuenit, ut facile deuorari poſſint, quæ enim multa com manducatione indigent, iniucunditatem quandam afferunt, & appetitum auertunt. In his uero qui iam prompti ſunt, cupidūq; cibum accipiendū, coniectare oportet ne ſufficientem menſuram excedamus. Conſiderare etiam oportet, num ob naturalem infirmitatem, an conſuetorum ciborum cupiditatem ſimulent appetitus perditionem: quod ſi ita contigerit, quantum in nobis eſt, grauiter obiurgatos admonebimus, ne uilibus negligant obtemperare. Quod ſi non obtemperent, ſed præ alimentū negligentia contabefcant, uiciſſim contemnere ac negligere eos oportet, ac cibum parū deteriorem exhibere: poſtq; primos affectionis dies, cataplaſma ex palmis, malis, ænanthe, abſinthio, & aloë ſtomacho imponere: licebit & ceratis uti ex eadem materia apparatis.

De appetitu canino.

Cap. XXI

Contraria appetitus perditioni affectio eſt, quæ caninus appetitus appellatur: plures enim cibos appetunt, atq; quum appetitum cohibere nequeant, in ingerendis nimis cibis modum excedunt: deinde multitudine eorū aggrauati, & aſſumptos citra nocumentum ferre non potentes, ad uomitum diuertunt: deinde rursus cibo ſe explentes, rursus ad uomitum reuertuntur, quemadmodum canes, ex hoc autem aliquando & ad uomendi conſuetudinem delabuntur. Sapeq; etiā alijs affectionibus obnoxij ſiūt, coeliacis uidelicet & dyſentericis, atq; aquæ inter cutē: propterea quod prius quàm priores cibi ſint cōcocti, alios ingerant. Quod ſi huius acceſſionis cauſſa humor quiſpiam uitiatus et acridus exiſtat, qui os uentris mordeat et irritet, appetitumq; excitet: frigidus enim humor uitiatus exuſtioni conſimilem mordacitatē infert, ciborūq; appetitum nem exuſcitāt, & affectionis naturalis, quæ fames appellat, modo corpora ipſa uacua reddit, tuniculis eorū coactis & adſtrictis: quapropter & egeſtiones multæ ex ipſorum uentribus procedūt, crudis exiſtētibus nimirū cibis, aut ſemicoctis. Itaq; ubi cognouerimus ab humoribus pituitofis & acidis fieri hanc affectionem, qui in ipſum os uentris impacti, ac uelut aqua in ſpongiā imbibitū, cogantq; & irritent & ad appetitum exuſcitant, picrum appellatum pharmacū conuenienter exhibebimus, quod non tantum calefacere potest, ſed diſſecare, ac repurgare, extrahereq; ex profundo oris uentris imbibitū humorem, et per aluū inferne euacuare, quin & robur uentri addit, ut ne facile nocitum humorem ſuſceperet. Exhibeatur aut pondere drachmarum quatuor ex uino cum aqua calida diluto: ſi uero puer hac affectione laboret, & ob amaritudinem bibere nequeat, ſi quidem poſſibile fuerit, in catapotia drach, duas huius pharmaci digeremus, melleq; forinſecus oblinentes deuoranda dabimus cum ouis ſorbilibus aut ptiſanæ ſucco: quod ſi neq; ſic tolerare queant, ea quæ diſſecare et repurgare calefacereq; poſſunt in cibis annectemus: ueluti ſunt allia, porri, thyſus, ſatureia, origanum, pulegium, & quæ his ſimilia exiſtunt. Potum aut præbeimus

bebimus ante cibum multum ac acruatim bibendum, calidum sanè aut certe tepidiorem. Sorbitiones item appetitum destruētes, ueluti sunt pulres cum melle multo & oleo plurimo, aut adipe anserino, gallinaceo aut suillo, ex oleribus conuenit malua: cerebella item & pinguiōres uolucrum partes, pisciumq; eodem modo, & omnino quæ appetitum auertunt, ac satietatem inducūt, & quæ magno cumulo accepta, modicè alunt. Ammiscere etiam cōuenit panibus dū fermentantur acriora et urinam cīentia: similiter et uīno quod in potu sumunt, uelut est cuminum, anisum, petroselinum, & quæ eius generis existunt: ad uinum etiam piper & mel & spīca nardi ultra ea quæ dicta sunt, cōiiciantur. Panis uero nō sit recens, neq; ualde bene fermentatus. Vinum uero quod bibunt colore fuluum, substantia tenue, odorūq; & nō ualde uetustū, quod tum ieiunium sumpto cibo plurimū præbeatur, quantū uidelicet bibere possunt. Ventrem enim exalfacit, & humorum destruit acorem, ut saepe solum suffecerit cū pinguibus & oleosis cibis ad perfectam curationem. Abstinerē autem oportet ab omnibus acidis ac adstringētibz cibis ac potibus, maxime uero à fructibus, Bellaria eorum sint pistacia, amygdalę, nuces pineę, colymbades etiā oliuę exhibendę ex melle. Conandum est etiam, ut lac īplis exhibeamus, tum per se, tū cum passō aut melle: ita tamen ut obseruemus ac uitemus in eis, quibus in stomacho accescere consueuit: in his enim maius nocumentum quā utilitas consequetur. Probe uero concoctum non solum appetitum obtūdīt, sed & aluum obturatam emollit, fluxionesq; eius sistit, apparandę etiam ex ipso lacte potiones & placentę, ueluti sunt dulciaria & oryza. Viscera uero cataplasmate hordeaceę farine contegere utilissimum existit. Lauare autem per interualla oportet, cuticulamq; īplorum large pinguefacere.

De canino appetitu, qui ex immodica transpiratione, ac cutis exolutione contingit.

Cap. xxii

Est et alia canini appetitus species, quum uniuersum corpus rarius existēs, & per obscuram respirationem exhaustum, præter modum in assidua alimentū indigentia cōstituitur. Contingit autē id, aut ex facultatis retentiue in toto corpore imbecillitate, quæ cibis dominari nō potest: aut ob plurimi caloris fortitudinem, qui instar ignis cibos consumit, & cutē rarefacit, ac exhalationē efficit. His sanè uētris egestionēs lōge pauciores procedūt, quā pro eorū quę ingerūtur modo ac proportionē. Et stercore quæ egerūt, existunt sicciora. Itaq; phar-macū ex aloē eis insensissimū existit, item extenuatorij generis & discindentes tum potiones, tū cibi. Cutem em̄ magis rarefaciunt, exhalationē mouent, ac appetitum augēt. Quare eorū qui hoc modo affecti sunt, cutē condensare ac spissiore reddere melius est, cū oleo quopīa ex immaturis oliuīs expresso, in quo myrtus, aut rosę, aut eius generis quippiā ad lentū ignem sint decocta, admixto etiam alumine scisso in aceto acerrimo prius trito, intantū ut ad strigmētitiā formam unguentum reduci possit. Abstineant autē à balneis calidis, consimiliq; aērē, ac uini potu, & ab omnibus quæ tum extrinsecus, tum intrinsecus calefacere possunt. Ducantur ad lauacra frigida, siquidē nihil id fieri prohibeat: utpote corporis gracilitas, aut membrum aliquod refrigeratū, thorax nimirum, aut aliud quoddam. Cibi eis exhibendi sunt stabiles, & agre corruptibiles. Eius generis cochleę existunt, & totum ostreorum quæ testis integuntur genus, si ex duarum aquarum reiterata decoctione apparentur: & polypi eodem modo. Carnes suillę in uigore existentes, maxime uero uentres & uuluę. Bubulę quoque pinguiōres, & omnia simpliciter pinguiā, & quæ uentri innatant, tarte-

decq;

deq; concoquuntur, ac digeruntur. Ex ouis, ea quæ coquendo sunt indurata, aut sartagine fricta. Et similago absque melle ex pinguibus iusculis apparata, similiter & dulciarij panes, & oryza, & panes non fermentati. Iuxta proportionem autem quantum accessio imminuitur, tantum ex crassi humoris cibus est detrahendum, & ex adstringentibus forinsecus admtois imminuendum. Aliquando enim sedata uehementis appetitus accessione, in aliud grauius malum transitio contingit: nimirum quum corpus ex crudis & crassis humoribus repletur.

De uitioso appetitu: ex Galeno.

Cap. xxiii

Vitiosas ciborum qualitates concupiscunt, qui in tuniculis uentris superfluum uitiosum recrementum imbibitum habent: id autem maxime mulierculis uitioso humore repletis euenire solet, quum uterum ferunt, & uocatur hæc affectio pica. Concupiscunt autem in ea maxime quidem acida & acerba, aliquando etiam acris, quandoque etiam terram, aut testas, aut extinctos carbones, aut alios quosdam absurdos cibos: atque hoc affectu plures ex ipsis infestantur usque ad secundum aut tertium mensem completum: in quarto uero quiescere incipit malum, partim quidem uitioso humore per uomitum euacuato, partim uero concocto & per tempus consumpto, utpote quum mulier modico cibo usa sit, propter appetitus ab eduljis nutrientibus auersionem, quin et foetus in utero auctus plurimum alienum ad se trahit, adducto simul cum sanguine et uitiato humore. Porro idem affectus uiros quoque infestat, quum et ipsis uitiatum humor quispia ad os uentris fuerit delapsus. Conueniens autem eis remedium, Amazonum pastillus potatus existit: post uero etiam ex aloë confectio pica appellata. Euacuato autem plurimo uitioso humore, exhibendus est eis mali punici dulcis succus, menta sicca inspersa, aut aliud quippiam eius generis, quod est ad stomachi subuersiones ac nauas præscriptum. Conueniunt etiam muria condite oliuæ albæ, & quæ colymbades appellantur. Item amygdalæ amaræ à ieiuniis acceptæ, & antidoti ad lethalia pharmaca aptæ. Quomodo uero à pica appellato morbo mulieres infestatas curare oporteat, in muliebribus remedijs dicitur.

De cruditate: Galeni.

Cap. xxiiii

Concoctio, est iuxta qualitatem permutatio, quæ nutrire potest. Contingit autem à uentre sibi ipsi cibos assimilare: quapropter manifestum est, quod circa permutationem, offensæ concoctionis accessio continget, si itaque cibi in totum non permutentur, cruditas ea accessio appellatur, & est perditio & perfectæ priuatio actionis, si uero permutentur quidem cibi, uerum non ut oportebat, uita tam significat concoctionem, non autem ut antea eius priuationem, aut enim tardat, & nunquam propriam transmutationem suscipit, & difficilis concoctio appellatur: aut cibos omnino corrumpit, ac transmutat in alienam qualitatem. Atque hæc quidem concoctionis offensiones existunt. Causæ autem ipsarum sunt imperies uentris, inflammationes, scirrhii, abscessus, & quæcunque eius generis existunt. Aliquando autem uentre nihil male affecto cibi crudi permant, aut propter immoderatam ciborum ac potuum ingestionem, aut ob uitiosam ipsorum ciborum qualitatem, aut ex intempestiua, aut etiam inordinata sumptione, aut ob recrementum uitiosum, aut ob uigilias. Cæterum ex uitiosis ciborum qualitatibus, & recrementis quæ iuxta uentrem consistunt, cum corruptione cruditas oboritur: aliquando et ex inordinata sumptione, si quidem poma, aut mala punica, aut aliquid aliud tale primum comederint, deinde olera

olera assumant ex oleo & garo, aut etiam alia quæ uentrem emollire consue-
runt. Intempestiuā autem acceptionem appello, si prius quā prior probe suba-
ierit cibus, prandeant, aut etiam præter consuetam horam. Corruptiones au-
tem sunt, nidorosa quidem in calidioribus & biliosioribus: accida uero in
frigidioribus natura et magis pituitosa. Eodē modo et de excrementis quæ in uē-
tre præexistunt iudicandum erit: quæcūq; enim ex eis pituitosa & frigida sunt,
acidas corruptiones efficiunt: quæ uero calida & amara bile mixta, nidoro-
sa. Ipse quoq; uentriculus aliquo modo affectus, siquidem frigidus morbus exi-
stat, acidas permutaciones facit, calidus uero nidorosa. Tardas autem conco-
ctiones, cibi difficulter corruptibiles faciunt, & si ultra quā uires tolerant su-
muntur, itemq; uigilia. Quum uero citra corruptionem perfecta cruditas obo-
ritur, ut quales accepti sunt cibi, tales permaneant iuxta omnem suam qualita-
tem, ex hoc cognoscere datur uictum esse uentriculum, aut ab immoderata ci-
borum multitudine, aut per uehementem refrigerationem insiti caloris. Ut ne
quis igitur in cruditatem incidat, cautione in omnibus prædictis est utendum,
ut neq; in multitudine, neq; in qualitate eorum quæ in cibo accipiuntur, neq; in
acceptionis opportunitate neq; in ordine delinquat: & ut quæcūq; concoque-
re ualeat, ea tantū ingerat, & non quæ appetitus expositulat: mēsuræ enim ma-
xime omnium diligentem respectū habere oportet, appetitūq; refrenare, & neq;
plus quā uires tolerant accipere, neq; quæ natura difficulter cōcoquuntur, ue-
luti sunt carnes natura duræ: natura autē dico, uelut carnes bubulæ, & consimi-
les: ætate uero, si macrata animalia seniores existant. Cauendū est etiam a parti-
bus carniū multi nutrimenti existentibus, & pinguibus salisq; condimēto ser-
uatis, ac uictis. Ex oleribus, quæ igneæ sunt naturæ, ualdeq; frigida: item quæ
inflationē pariūt, incōmoda existunt. Ex piscibus, qui duras carnes habēt, et re-
positione arefacti. Abstineāt quoq; a cibis corruptis & foetidis ac graueolenti-
bus. Vitent fructus dulces aut flatus generantes & immaturos: bellaria quæ dif-
ficulter concoquuntur & olcaginosa, & quæ ægræ diuidi possunt, uelut est sesa-
mum, quod commanducationem ob paruitatem suam effugit. Non minus au-
tem uitandī cibi peregrini & in consueti ac medicamentariam uim habentes,
quales frequenter placentis ac panibus immiscentur. Iuxta tempus autē accipi-
endi cibi neq; impetuose, neq; acruatim, neq; solidis partibus aut absque com-
manducatione eos ingerere oportet: neq; etiam potus cibum interpellat: id e-
nim unionem ciborum impedit, singulosq; uentri innatare facit. Ex condimē-
tis uero oxyporon quoddam quod cito penetrat assumere non incommodum
neque iniucundum existit: maxime uero huiusmodi. Caroi drachmas xvi.
sceniculi drachmas sex, seminis apij drachmas octo, ligustici drachmas octo,
amij drachmas octo, piperis drachmas decem: aliqui autem et zingiberis dra-
chm. tres, in frigidioribus temperaturis, omnia melle excipiantur, & cū carni-
bus ac piscibus exhibeantur. Melius autem est cum cibo & piper, maxime lon-
gum exhibere, in his qui magis pituita abundant: uentosi enim flatus crassitudi-
nem dissoluit: & quæ circa præcordia consistunt, inferne ad aluum propellit. cō-
coctionem etiam omnium maxime piper adiuuat, quod si fortē non adsit, al-
bo utendum erit: quod si neque hoc adsit, nigro. Utendum etiam alijs cōcoctio-
nem iuuantibus pharmacis, quæ ad finem huius capitis sunt subiecta. Post ac-
ceptum cibum uexationes inæquales ac cōturbantes uitandæ, item æstus & re-
frigeratio: hæc enim concoctioni ciborum resistunt. Adiuuant autem eandem
frictio pedum, calidijs contuberniū, et calefactio præcordiorū. Quod si graui-
tas

tas adsit circa uentrem, & ex ea molestia quædam in uniuersum corpus diffundatur, expassa manu os uentris apprehendendum est, aut puerulus carnosus admoendus. Ex his enim sæpe alimentum corruptioni proximum est conseruatum. Cæterum quum ructus iniucundus proueniens manifeste corruptionem factam indicat, citra cunctationem ad uomitum ueniendum est, atq; aqua tepida ingesta, omnia corrupta ad excretionem cogenda, si enim in uentre permanserint, & torsionum, & dolorum, & grauitatis capitis causa existunt: aliquando autem bilis superne ac inferne effusionem, aut profluuium uentris, aut etiam febres inducunt. Quare eos qui difficili cōcoctione adprehendi solent, longo antequam tempore aduofaciamus ut facile uomant: cōmodissimus enim in plurimis periculis uomitus existit. Quod si quis natura difficulter uomat, aut ob aliquam aliam in cōmoditatem uomere impediatur, omni modo conandum est ut cibis subeat, & ex præcordijs deducatur. Ad hæc erectior decubitus appareatur, ut ea quæ capiti subiiciuntur sublimius insternantur, & reclinatio ipsa in sinistralatus fiat: atq; si quis uigilijs infestetur, citra corporis uexationem permanceat, eandemq; decubitus formam obseruet: frequentes enim agitationes cibos perturbant, intestinaq; inflata reddunt, flatus autem cibum sursum uergere facit. Si uero quis ob nullam causam male dispositus sit ad frigidæ potum, non inconueniens erit cyathum unum aquæ frigidæ puræ absorbere: corroboratus enim inde uenter celerrime quæ in ipso hærent extrudit, & ad subiectas partes demittit. Sequenti deinde die in quiete æger asseruetur, fricationeq; pedum utatur, & præcordiorum concalefactione, donec murmura & flatus circa intestinum rectum eruperint, eructationesq; cum qualitate māsuetiori recurrerint: et tunc sanè exurgere conuenit, primumq; alius ea quæ corrupta sunt egerat: deinde ad deambulationem moderatam æger procedat, atq; otium agat, propter commotos uapores ex corruptione in caput delatos. Post hæc autem ad quotidianas actiones mens applicanda est citra perturbationem ac indignationem: deinde rursus uenter cogendus est ad eorum quæ reliqua sunt excretionem, postea quiescere iubebimus, atq; aqua calidior pedes perfundere ac fouere: frigida uero purafacie proluta, in lecto quiescere omnibus conatibus somnum illiciendo: post quæmodica deambulatio, deinde balneum suscipiatur, quod calidius solito exudet, atq; cæterum relictis prius uiribus lauetur, corporeq; nitro conserpo exudet, atq; hoc modo in calidius solum descendat: deinde etiam in frigidum insiliens, largiore oleo uniuersum corpus pinguefaciat. Cōmodissimum est etiam aqua calida in balneo hausta uomere: uelut abluendo ea quæ in stomacho desident biliosa aut pituitosa, absinthij quoq; prælibatio à balneo quod conuenit moderatum, & cui concoquendo corpus sufficit, dabimus itaq; herinaceos marinos recentes, aut caneros fluuiatiles, ita ut ab eorum acceptione, malam aut oua forabilia, aut pisces in petrosis aquis degentes adsumant, & ex uolucris non graueolentes & macras. A reliquis autem carnibus abstineant, & à leguminibus ac cepis, salsamentisq; & quæ eius generis existunt. A bellarijs item, & omnis generis placentis, & à fructibus dulcibus ac facile acescentibus in uentre, his enim omnibus concoquendis egre sufficit uenter, ampliusq; infantis naturæ ipsa existunt. Non solum autem qualitates eorum quæ in cibo exhibentur permutatas esse conuenit: sed etiam multitudinis adhibere modum. ea enim quæ facile concoquuntur his quæ nō concoquuntur paria sunt, si præter modum ingerantur. Deinde uero somnus imperturbatus, & æqualis procuretur, illico uentre

tre ex unguento nardino. Pharmacū concoctionē adiuuans, ex malis cotoneis: Galeni. Pharmacū ex malis cotoneis cōueniens est apparando appetitū in his qui eum perdiderunt, cōuenit & cōcoctioni, in his qui non probē concoquant cibū, & ut summam dicam, uentrem robustiorē reddit, eisq; qui debile habent hepar, utile existit. Manifestum autē esse arbitror, quod ieiunis exhibere hoc oporteat, mystri mediocris mensura, quanquā nihil offendat, etiā si quis a cibo ipsum acceptet. Recte etiam exhibetur, si pranso atq; inde cōenare uolenti præsumentū detur. Oportunē uero duabus ante cibum horis datur. Apparatū autē hoc modo: Ex malis cotoneis maiora iucundioraq; & minus acerba, quę uidelicet struthia appellantur, eligito, expressiq; eorū succi sextarios Romanos duos accipito, ac mellis quā optimi parē mensurā ammisceto: aceti uero sesqui sextariū affundito, hisq; simul ad prunas arduentes moderatē decoctis ac despumatis, zingiberis quadrantem, piperis sextantem adijcito: atq; hoc modo rursus ad arduentes prunas, donec ad mellis crassitudinem perueniant, decoquito. Quod si magis adstringens ipsum facere uelis, etiā ex carne malorum cotoneorū appara. His uero qui intemperie uentris calida afficiuntur, & qui quomodocunq; tandem bile sunt referti, magis cōuenit, zingibere & pipere detractione exhibere. Quando uero medię temperaturę fuerit uenter, ut neq; biliosa neq; pituitosa in eo aggregentur recrēmenta, dimidium prædictę cōmensurationis tum piperis, tum zingiberis radicis iniicere expediet, ita ut piperis quidem uncia I, zingiberis uero sesquiuncia cōijciatur. Si uero frigidiore temperamenti fuerit uenter, zingiberis triens, piperis quadrans, aut unc. I, s, ammiscetur. Licebit etiam iuxta mediā cōmensurationē apparare, atq; ubi opus fuerit usus tempore reliquum adijcere. Pharmacū concoctionē adiuuans, Diospoliticū appellatum. Cōuenientior autē diospolitici pharmaci usus erit, in his præsertim qui assidue inflantur. Duplex autem compositio eius existit: aliquando quidem æqualibus omnium partibus coniectis, cumini uidelicet & piperis rutęq; & nitri: hoc enim modo magis aluum subducit. Aliquando autem reliqua singula inter se pari pondere miscentur: nitri uero dimidium aut quarta pars adijcitur. Præstat cuminum cōiectum æthiopicū esse, piper autem longum aut album. Cuminum in acerrimo aceto maceretur, deinde moderatē torreatur. Sint & rutę folia præarefacta. Recentia enim superfluo humore abundant. His autem omnibus tenuissimē tritis, mel despumatum sufficienti mensura ammiscetur. Aliquando tamen sola hæc citra mellis admixtionem trita & exsiccata, repositaq; adseruantur, ac pitisanę succo insperguntur, aut alijs etiam cibarijs, quibuscunq; tandem maximē conuenire uidentur. Ammiscetur etiam ipsum mel usus tempore, exhibeturq; inde cochlearij mediocris mensura ante cibum. Porro peregrinationis tempore præstat ipsum pharmacum aceto subactum in pastillos redigere, atque usu expetente similiter cum melle exhibere. Crasso autem modo contundere oportet ea quę ad huiusmodi pharmacorum compositionem conijciuntur, ea gratia ut ita uenter melius inde subducatur: tenuissimē enim trita & in puluerem redacta, ad emolliendā aluum inerta redduntur. Cæterum urinam non modicā cient. Crassiora uero iuxta uentrem persistunt, quum angusta uenarum ora penetrare non possint. Pharmacum ex tribus piperis generibus: Galeni. Hoc autē modo dispositis, frigidū uidelicet & pituitosum habitū hactis ac inflatis, ex tribus piperis generibus pharmacum conueniens existit, siquidem non nimis medicato ac uario modo ap-

V pare.

paretur, quemadmodum multi id conficere solent: ut satis operosum sit eis, qui hoc accipiunt, ea quæ ad eius compositionem ingrediuntur concoquere, uelut est ammiū, & fesele, & ligusticum, & quæ eius generis existunt. Talia itaq; ex pharmaco hoc sunt adimenda, ampliusq; & helenium, spicaq; nardī, & callia. In promptu autem duplicem eius apparatus habere conuenit, quemadmodū nos sumus confecti. Alterum quidem simplicē, his qui nō concoquunt conuenientem, & qui recenti circa uentrem frigore, aut pituitoso humore adfliguntur. Alterum medicamentariū, quo maximē in defluxionibus à capite ad thoracem utimur. Simplex igitur quo etiā ad crudos humores, circa primas & magnas uenas consistentes utimur, hoc modo habet. Ad quinquaginta drachmas uniuscuiusque trium piperis specierum, sufficit ammiscere anisi, cacuminum thymi, & zingiberis, singulorum drachmas octo, atque hoc sanē simplicius existit pharmacum; quanquam adhuc simplicius apparari possit, si circa zingiberis admixtionem paretur. Alterum autem ex iisdem constat; uerum ad quinquaginta uniuscuiusq; trium piperis specierum drachmas, singulorū ex his tribus, aniso uidelicet, cacuminibus thymi, & zingibere drach. xvi. coniungimus.

Pharmacum ex calamintha oxyporon, hoc est, citō penetrans, quod polyetes, id est, annosum, appellatur. Prædictorum quidem igitur pharmacorum caliditas circa primas uenas extinguitur, minime per uniuersum corpus se diffundens: quemadmodū id quod ex calamintha constat, solet, & ei similia. Neque enim uolumus ea quæ cum cibo cōcoctionis gratia exhibemus, in uniuersum corpus diffundi, sed tantum concoctionem ciborum in uentre adiuuare, itemq; humorum crudorum in primis ac magnis uenis contentorum. Quare quemadmodū in Diospolitico pharmaco dictum est, non nimis in puluerem redigere oportet ea quæ ad concoctionem solam adiuuandā apparantur. Hoc uero pharmacum in uniuersum corpus usq; ad cutem ipsam digeritur ac distribuitur: quare ijs ipsum exhibere conuenit, quibus crudorum humorum multitudo in solidis animalis partibus consistit. In talibus enim, omnium quæ ego noui optimum, id quod ex calamintha constat, existit. Attenuat enim crassa & uiscosa: discutitq; ea similiter, urinamq; & menses ciet. Compositio autem eius talis est. Calaminthæ montanæ, seminis petroselinī, pulegiī, fesele, cuiusq; drach. xii. seminis apiī, cacuminum thymi, sing. drach. iiii. ligustici drach. xvi. piperis drach. xlviii. mellis despumati quantum suffecerit. Aliqui & zingiberis unciam unam adiungunt. Lucundissimū autem est quod plurimum mellis amixtum habet. His uero qui dulcia auersantur, & à mellis usu abhorrent, parū in compositione ammiscetur. Quidam tamen mellis libras iiii. & dimidiam ammiscunt. Potest & absq; melle siccum adseruari, eodemq; ut reliqua modo salibus cōmisceri, edulijq; ac liquamentis inspergi. A cibo uero nunquā, neq; hoc, neq; aliud quoddam pharmacum, quod uehementem penetrationem facit, accipiat: distribuitur enim ac digeritur simul cum ipso aliquid crudorum ciborum, & obturationē operatur. Vfus eius conuenit post matutinā fricationem, duabus ante exercitium balneumq; horis. Aceti mulsi apparatus ac usus: Galeni. Pituitosis in uentre humoribus etiā acetum multum conuenit, quod hoc modo apparare oportet. Melle optimo ad prunas decocto ac despumato, dimidia eius mensura acetum affunditur, atq; ita rursus ad prunas decoquitur, quo ipsorum qualitates optimē permisceantur, & ne appareat gustantibus aceti acor. Ad eos uero qui aceti multitudinē auersantur, hoc modo apparato. Aceti pars una accipiat, despumati mellis duæ, & aquæ partes quatuor. Quod

Quod si fortius facere uelis, tantum aceti, quantum mellis coniicias, & absque aqua apponabis. Prestat autem iuxta sensum eorum qui accepturi sunt mixturam congruentem modum iudicare, non uero secundum quod nostri sensus percipiant. Quod enim naturæ accipientis familiarissimum est, id iucundissimum existit, & ob id etiā utile & accommodatum. Nocentissimum autem contrā est, quod minime iucundum. Ceterum usus tempore aqua calida mixtum, uelut uinum exhibendum est, prout agro iucundius uisum fuerit. Pharmacum ex malo citrio, tardè concoquentibus cōmodum. Carnis mali citrij lib. i. hyssopi, rutæ, origani, cuiusq; fasciculum exiguum, aceti heminas iii. per quinque dies ac nocet acetum macerata ad tertias decoquito, & expressa reijcito: ad acetum uero mellis sextarium i. ammisce, rursumq; ad mellis crassitudinē decoquito, dein de asari, mei, piperis, cuiusq; sextantē inspergito. Mane & uespere exhibetur.

Pharmacum ex uino scybelite: Archigenis. Vini scybelite sextarios iii. succi rutæ sextarium i. sisonis, piperis, cuiusq; unc. i. zingiberis sextantem, petroselinum unc. i. mellis sextarium i. Liquida ad compagem crassam decoquito, aridaq; inspergito, ac cochleariū unum aut alterū exhibero. Efficax est ad tardas concoctiones, ac inflationes, itemq; colicos. Vinum autem scybelites est, quod sua sponte ex passis uuis destillat, utpote uinum ultro effluentibus uuis. Sales Iamblichii. Salis ammoniaci libram unam, salis cappadocici sexuncem, piperis quadrantem, zingiberis quadrantem, seminis cniçi scrupulos xviij, seminis erucæ scrupulos xvi, ammi scrupulos xviii, hyssopi scrupulos xviii, silphij scrupulum i, cacuminum thymi, phylli, seminis apij, petroselinum, cuiusq; scrupulos xviii, origani unc. i. Contundito ac cribrato, indeq; dimidium cochlearium, cum ouis forbilibus, aut cum pitana ieiunis exhibeto, potes & cum carniū aut piscium liquamento exhibere, aut quomodocumque tandem uelis. Huius medicamenti auxiliarem facultatē nemo pro dignitate laudare potest. Quare ut breuiter dicam, ad frigidiores temperaturas non reperias aliud pharmacum, quod convenientius crudos humores concoquat: unde & colicis prodest, uentrem citra molestiam mediocriter mouens. Sales Poletis, aluum emollientes, pituitā à capite dissoluentes, per palatum transpirantes, reliquasq; distentiones attenuantes. Salis torrefacti splendidissimi drachmas cxliiii, floris chamæmeli aridi & contusi trientem, conyzæ tenuis trientem, calaminthæ montanæ trientem, radices eryngij montani, origani, cuiusq; trientem, silphij trientem, piperis trientē. Cōtusis & cribratis utere.

Sal dodecatheos, hoc est duodecumanus, seu duodenarius. Hyssopi trientem, pulegij quadrantem, cumini sextantē, ammi unc. i. salis torrefacti uncias triginta. Contudito & cribrato, proq; quotidiano sale, utcumq; placet, utitor. Qui enim eo assidue utitur, nullis morbis per omne uitæ tēpus infestatur. Precepit tamen caput alleuat, & uisum acuit, pituitāq; in thorace congregari non finit: concoctionē bonam operatur, & mesaraicas maximē uenas ab obturatione liberat, & renes repurgat. Quidam & origani sextantem adiiciunt. Ego uero semper spicæ nardi unc. i. annecto. In hyeme amplius piperis unciam i. addo. Ad eos quibus alimentum in uentre accescit, utiliter hoc remedium adhibetur. Piperis drach. iiii, seminis anethi drach. i. cumini drach. iiii, contere, ac exhibe cochlearium ante somnum ex uino diluto. Embamma optimū ad intinētus, concoctionem adiuuans. Cumini, piperis, foliorum rutæ, mentæ uiridis, anethi uiridis, cuiusq; drach. iiii. pulegij sesquidrachmā, salis unc. i. gari albi cochleare i. mellis cochleare i. Vtere, ualde enim cōmodum existit.

Posca, concoctioni ualde comoda: Cyrilli Archiepiscopi. Pulegij, seminis sceniculi, seminis apij, cuiusque scrupulos sex, caroi, sesquiscrupulum, seminis coriandri sesquiscrupulum, baccam lauri unam, cyperi, folij malabathri, costi, cuiusque scrup. i, salis sex uncem, aceti sextarium i, Sicca contundito & cribrato, acetoque ammixta ad paucas horas macerato, ac utitor.

De crapula, Philumeni.

Cap. xxv

Cruditates ex uino multo obortas, crapulas appellamus, easque consimilimethodo tractamus, quali ad difficultatem concoctionis praescripta uti solemus. Itaque his qui ad frigida potum adsueuerunt, aliasque stomachum habent aestuosum ac exustum: aquae frigidae purae cyathi duo aut tres per interualla ad absorbendum exhibendi sunt. post uero per somnum meridianum turbationibus depulsis, confestim eos in balneum inducemus, prolixioreque exudatione procurata, ab aquae tepidae haustu ipsos uomitum facere cogemus, aut digitorum tantum immisione eundem laceffemus. Deinde praedictos cibos exhibebimus, dilutiores ac pauciores addito potu, donec caput a grauitate liberetur. Statim uero a principio caput ex olei omphacini fomento irrigetur. Sequenti autem die bonae concoctioni consulatur. Optimum autem fuerit, si quis uinum absinthites ad plures dies a balneo praebibat, itemque post matutinas deambulationes. Prodest & acetum scillinum absorbere, i. myltri mensura: deinde in quiete breui sane tempore degere, atque ita ad reliqua facienda procedere, quemadmodum in capite De cruditate est praedictum.

Quae cura aluo adstrictae adhibenda: Galeni.

Cap. xxvi

Recrementorum iuxta uentrem retentio, aut propter acceptos cibos accipitur contingit, aut propter uentrem ac intestina. Et propter cibos quidem, aut ob ciborum ac potuum acceptorum tum qualitate, tum quantitatem, aut propter ordinem, & utendi modum contingit. Ob qualitatem quidem, si acerbis & austera ac sicca temperatura & commixtione consent, ea quae accipiuntur. Ob quantitatem uero, si plura aut pauciora & citra conuenientem exhibeantur mensuram. Circa ordinem autem retentio excrementorum contingit, si arida & acerbis prius, humentia uero pinguiora & dulcia postea ingerantur. Circa modum uero utendi, si his cibum accipere conueniat, & semel omnem assumat. Quae uero circa uentrem ac intestina consistit recrementorum retentionis causa, ea & ex natura ipsorum, & ob acquisititiam contingit dispositionem. Causae itaque citae naturam ipsorum sunt uitiosae corporum constitutiones. Octo autem existunt uentris acquisititiae intemperaturae. Quatuor quidem simplices, caliditas, frigiditas, humiditas, siccitas: reliquae quatuor commixtae, caliditas simul cum humiditate, caliditas cum siccitate, frigiditas mixta humiditate, frigiditas mixta siccitate. Oportet autem unamquamque intemperiem in eam magnitudinem excedere, ut euidenter excretiuam facultatem imbecilliolem reddat, aut in uentre solo, aut in gracilibus intestinis, aut etiam crassis, aut simul in omnibus praedictis, quemadmodum in uoluulis fieri consuevit. Ad haec amplius & in febrilibus aliquando aluus adstringitur, ob acrimoniam uidelicet resiccantibus & consumentibus humores: aliquando autem materia ad alios locos diuersa, perque illos ipsos exclusa. Sudoribus enim multis per cutem exclusis aluus coarctatur, & stomacho ex fluxione affecto stercus cohiberi contingit: propter inflammationem item intestino recto uicinam, ipsumque deprimentem, uelut est uelice, aut uulua, & propter ulcerationem aut dolorem circa eas partes obortam, excrementa recurrunt. In his uero qui a morbo uires recolligunt, uenter cohibetur, praeterea

pterea quod plurima digestio ciborum in corpus fiat, & ob id exiguum & aridum, & quod difficulter excerni potest, stercus relinquitur. Ad hæc etiã uenter adstringitur ob flauæ bilis cohibitionẽ, quæ ad intestina delabi consuevit: ea ipsa enim in animali, quod secundum naturã habet, confluens intestina mordet & irritat, & ad excretionẽ excitat recrementorum. Quapropter etiã semper cibum uacuum ieiunum intestinũ reperitur, in quod procedit meatus, qui ex bilis susceptrice uesica bilẽ ad intestina deducit, atq; ob has sanẽ causas uenter adstringitur. Cõmune autem in omnibus præceptum est, ut causæ noxam inferenti contrariã curationem opponamus. Propriũ uero ut secundum singulas causas cuiq; quotidie contrariã remedia exhibeamus. Et siquidem ex pauciorũ ciborum acceptione homo aluum habeat adstrictam, plures simulq; humidiores ei offerantur: si uero siccioribus sit usus, humidiores quidem dentur, non autem multi. Si uero austeri & acerbis cibi retentionis fuerint causæ, dulces & pingues exhibeantur. Si uero ob permutatum ordinem adstrictio fiat, in eum qui conuenit, reducat. Si uero semel cibum accipiendo, quum bis id facere oportuerit, uenter cohibeatur: non solum bis, sed & sæpius conuenientes cibi dentur. Eodem etiã modo recentes intemperaturæ per contrariã curentur: ita ut excata corpora humectemus, humecta uero resiccemus, & calefacta quidem refrigeremus, refrigerata uero calefaciamus, atq; in coniugatis siue mixtis qualitatibus eadem iuxta proportionẽ faciamus. Cohibita autem quæ ad intestina deluere consuevit bile, aut ob crassitudinẽ, aut ob biliosorum meatuũ obturationem: extenuatoria diætã utendũ est. Similiter autem omni conatu instare & reniti oportet, ad reliquas alui adstrictæ causas tollendas, atq; uiscerum quidẽ inflammationem soluemus, ubi per ipsam cohibitio contingat, materias uero ad intestina conuersas deducemus, siquidem aliõ proreptent: qua autem medicinali materia id fieri possit, in simpliciũ pharmacorũ Sermonẽ est prædictũ in principio huius tractationis, atq; in eo qui hunc sequitur De purgantibus pharmacis inscripto. Cõmunis autem omnis quomodocunq; euenierit, adstrictionis alui curatio talis est. Ex decubitus figuris erectior eis conuenit, & ad sinistrũ latus reclinatio. Et silentium quidem ac quies uentrem cohibet, motus autem & decubulatio impellunt. Paucus potus, & non præpotare, neq; inter medios cibos potum accipere, uentrẽ resiccant: præpotatio uero & multa potio stercora humectant. Somnus cõcoquit, & recremẽta fluida facit: uigiliæ uero materias distrahunt, & suspensas tenent. Plurimũ autem ciborũ qualitates possunt, quare eas quæ uentri gratae sunt exhibere oportet, quanquã omnino melius fuerit abstinẽti succum dare, aut ex aloẽ catapotia deuoranda. Quibus si nihil proficimus, durisq; adhuc stercoribus insidentibus, & lumbis aggrauatis, circũtensq; & inflato uentre superiore, humectantibus immorari cibis absurdũ. Sæpe enim lapidis modo recrementa indurantur, & in intestino recto condensantur, quare accepti cibi stomachũ quidem & uentrẽ humectant & effeminant, ad intestinũ uero rectum peruenire non possunt: ut inde aliæ quædã molestiæ consequantur. Melius igitur in istis fuerit aluo ptisanæ succum per clysterẽ infundere, ammixto oleo & melle, aut maluæ aut sceni graci uel fursurum decoctum similiter cum oleo & melle: utendũ etiam glandibus ac illitionibus sedis. Alumen autem liquidũ melle tritum donec indurescat decoquitur, ex eoq; sedes illinitur, & faciliẽ quidẽ plurima stercora prolecat, quanquã inde aliquandiu dolore afficiantur. Optimẽ autem facit & cyclamini succus cũ melle illitus, & in tomento quoq; appositus. Mercurialis etiam uiridis contrita, & ad glandis

dis modum redacta, exsiccat & supponitur, ualdeq; comoda existit. Alia glans, purgatoriâ uim habens. Comae absinthij contusae ac cribrate drac. iiii. nitri drach. iiii. elaterij drach. i. melle cocto excipito, glandesq; informato ac subindito: fomento tamen prius ad locum adhibito. De his autem absolutissimè in tertio huius tractationis Sermone est prædictum, ubi etiam pharmaca purgantia quæ circa umbilicû illinuntur, descripsimus, eorumq; etiam quæ per os exhibentur ac uentrem emolliunt, tum simplicium, tum mixtorum remedium mentionem fecimus, quare superfluum existimo hic de eis producere sermonem.

Absinthati emollientis utilis apparatus. Costi un. i. spicæ nardi scrupulos iiii. folij scrupulos iiii. mastiches scrupulos ii. mellis sextarios duos, uini sextarios decem. Absinthatum bonum, emolliens, & dulce. Sisonos unam, floris iunci odorati scrupulos vi. mastiches scrupulos duodecim, folij scrupulos ii. spicæ nardi scrupulos duos, mellis sextarium unum, uini sextarios quinque. Absinthatum amarum pituitosis magis conueniens. Agarici, folij, amomi, spicæ nardi, cassiæ, cuiusque scrupulos tres, costi scrupulos ii. rosarum siccarum scrupulos ii. aloës scrupulos vii. mastiches scrupulos duodecim, mellis sextariû i. uini sextarios v. Aliud, atra bile abundantibus, & pituitosis similiter commodum. Folij scrupulos vi. spicæ nardi scrupulos sex, agarici scrupulos quatuor, epithymi scrupulos xii. mastiches scrupulos xii. aloës scrupulos quinque, mellis sextariû unum, uini sextarios v. Aliud optimum. Folij, spicæ nardi, cassiæ, amomi, cuiusque scrupulos iiii. costi scrupulos iiii. agarici scrupulos iiii. mastiches scrupulos ix. aloës scrupulos xii. mellis sextarium i. uini sextarios quinque.

De inflatione: Galeni.

Cap. xxvii

Inflationis principium cibus male concoctus existit. Cōtingit autem flatuum generatio in uentre, ex humorib; in ipso pituitosis, aut ex cibis in uapores per mediocrem caliditatem resolutis. Perfecta enim frigiditas nullum omnino uaporem efficit, propterea quod neq; omnino attenuat, neq; consumit, neq; dissoluit etiâ ipsum cibum: uehemens autē caliditas cibum attenuat, si flatuosa natura existat, & tunc sanè nebulosus flatus generatur, uerum paucus, adeo ut per unum aut alterum ructum euacuetur. Mediocris uero caliditas minoris efficacitæ existens, cibos quidem dissoluit, non autem perfecte consumit: unde sanè flatus generatio contingit. Vna autem eademq; ratione quemadmodum extrinsecus frigidissimæ & aquilonares in hyeme constitutiones, & calidissimæ æstatis tempore consistentes, purum aërem reddunt: quæ uero inter has mediæ existunt, nebulas gignunt: sic eodem planè modo, in animalium corporibus, neque in extrema caloris debilitate, neque quum uehementer calor intus lescit, sed quum inter hos excessus medio modo habet, flatuosum recrementum generatur, atque hoc ipsum ubi per stomachum excluditur, ructus operatur: per sedem uero aut strepentem, aut absque strepitu flatum. Quum uero neque per os, neque per sedem excernitur, inflationem appellatam producit.

Archigenis. Accedit affectus stomachi grauitas & distentio, multosq; fallit tanquā in ipsum solum dolor innitatur: etenim malum ipsum aliquando quidē iuxta totū pectus, aliquando uero retro iuxta collum ac dorsum, atq; ipsa uentribula irruit: sæpe autē & utrinq; occupatos tenet: aliquando autem & tumorem circa os uentris efficit, ructusq; inanes fiunt modicè alleuantes, inhibitiq; flatum qui per aluum excerni cōsueuerunt. Succumbit autē & tumor ipse iuxta uentrē, ad manuum impositiones sublaxus cedens. Quibusdā eorum & dolores

res accidunt, & appetitus perditiones, ac capitis dolor: si uero ante perfectam restitutionem cibum accipiant, amplius membra ipsa inflantur, & cum dolore amplius distenduntur, qui saepe ad claviculam usque defertur ipsasque scapulas ac uniuersam spinam, ultra hoc quod & ructus cohibentur: ut aliqui iam non dissimile quiddam suffocationi se perpeti aestimarint. Leuantur autem alimento inferne subeunte, & flatibus siue per ructus siue per intestina exclusis. Eos igitur qui non ita diu ante cibum sumpserunt, primum uomere praecipere: deinde uero fouere oportet cum lana in fasciculum conuoluta & leuiter calido oleo madefacta. Si uero dolor urgeat, fomentum fiat per uesticam bubulam aqua & oleo calidis semiplenam. Glandes quoque confidenter & citra dilationem supponendae sunt, ex rebus flatus prolestantibus informatae, uelut est ruta semen & cuminum aequali pondere cum melle cocto, ac modico nitro coacta. Inedia etiam affectioni necessaria existit, per unam quoque atque alteram horam tempore irritationis, irrigationes ex oleo conueniunt, in quo absinthium, ruta, & anethum sint decocta. Lanae uero conuolutae cuminum tritum, aut apij semen, aut sisonis magis inspergatur. Deinde & cucurbitae adsumantur inanes multae, & cum multa etiam flamma admotae. Perseuerante autem diutius affectione, cataplasmata ex semine lini, ordeacea & loliae farina imponantur: ex cumino etiam trito, semineque anethi, aut apij aut foeniculi, aut chamaelae, aut tragorigani, aut centaureae coma, aut eryngij semine, uel radice: ex hydromelite etiam & oleo in quo ruta, baccae lauri, & melanthii sint decocta. Ammiscendum est & bitumen, oleumque laurinum. Si uero inflammatio una cum inflatione adest, pro calefacientibus ea quae relaxant ammiscere oportet, uelut est anethi oleo in coctum ammixto adipe gallinaceo aut anserino. Cibus uero frumentacei generis sit & paucus: post multum etiam assumpti cibi tempus, potus tandem praebeatur: a cibo fricationes extremarum corporis partium adhibeantur. Aluus uero tum per cibos, tum per aloem subducatur. Cerata etiam imponantur ex oleo apparatus, in quo cucumeris syluestris radix sit incocta. Ad finem uero malagmatis utendum, quae ex seminibus aut lauri baccis constant. Marciani irrigatio siue fomentum, ad eos qui ex morbo circa septum transfuerum inflationem habent, & murmura circa interiora, aut quibus uiscera inflammata sunt, aut inflantur. Ruta uiridis trientem, foeni graeci sex uncem, meliloti trientem, absinthij trientem, foenum graecum in pauca aqua diem unum praemacerato: deinde reliquis ei adiectis, atque olei sextarijs III. affusis, ad non fumantem ignem decoquito, percolatoque, ac in eo lanam conuolutam quam plurimum madefacito. Si uero dolor intendatur, in solum ex oleo apparatus eos imponemus, si tamen nihil id fieri praepediat, althaeae itaque radicem, lauri folia, foenum graecum, pulegium, rutam, in aqua decoquemus, & oleo ad decoctum affuso, eos inscendere faciemus: quod ubi feliciter processerit, cibum accipiant, panem ex aqua, & pisces teneras carnes habentes. Qui uero se iam recolligunt, diata restitutionis uiribus apta utantur: sinapismis & cucurbitulis cum multa flamma post exercitia admotis, uomant. Si uero fixa perseverauerit accessio ipsa, tempore exacerbationis cataplasma ex sinapi imponendum est, & paulo post aloes drachma una propinanda, aut smyrnij semen ex uino. Aristolochia autem longa siue rotunda drachmae pondere porata flatum dissoluit, & tarde concoquentes iuuat: quod & calaminthae decoctum, aut etiam polium decoctum cum melle modico & paucissimo pipere tenuissime trito, facit. Ouillus autem talus uisus & potatus torminibus ac inflationibus medetur. Aut rhamni folia uiridia

ridia trita in pastillos redige, eosq; in umbra exsiccatos drachma pondere exhibe: non febrientibus, cum uino diluto, febrientibus uero, cum hydromelite. Facit & ad uoluulos affectiones, omnesq; inflatuos dolores miro modo: per ructus enim ac flatus inferne prodeuntes discussio & resolutio malo sani sunt, inquit Dioscorides, Vtile etiam eis castorium ex posca bibitum existit, drachma pondere acceptum. Idem quoq; forinsecus cum oleo sicyonio impositum, etiam si cum torminibus & inflationibus praedictae affectiones contigerint, eas sanat. Acetum uero scillinum tum ante, tum post cibum absorbeant, aut ante somnum. Apparatur autem simplicissime hoc modo. Scillae repurgatae & dissolutae libras v, acetum sextarios xlviii, sub caniculae ardoribus ad dies quadraginta insolato, ac utitur. Oxyporion etiam quod cito penetrat eis conueniens est huiusmodi. Foliorum rutae drach, xxxii, cumini drach, xiii, ligustici, caroi, seminis apij, piperis, zingiberis, helenij, nitri, cuiusq; drach, viii, exhibe cochlearium quomodocumq; uelis congruenter. Exhiberi etiam potest ad noctem ex tribus piperis generibus pharmacum, erui magnitudine: robustioribus uero, Aegyptiae fabae. Aluo autem adstricta citra dilationem clyster infundendus: balneo uero ex interuallis utendum est tempore remissionis. Praefricent autem istis tum dorsum, tum stomachum, conspergantq; nitro affato: solijs etiam calidioribus utantur, & a balneo cibis detur, minime inflans, & post omnem cibum uinum meracius exhibendum. Cibus autem ipsorum diuidatur, ita ut in prandio tertiam, in coena uero reliquas duas accipiant partes. Fructuum uero atq; olerum humidorum esum semper habeant suspectum. Multum autem potum tanquam infestissimum hostem deuient.

De uoluulo: Archigenis.

Cap. xxviii

Voluulus, affectio est intestinorum, letalem dolorem inferens, causa affectionis, continua ciborum corruptio existit, praesertim si multi accipiantur, uarijque, & ad quos non adsueuimus, & maxime ex pinguibus carnibus. Oboritur etiam ex plagis quibusdam, & frigore uehementi, & ex aceruata frigida potione, maxime si ab exudantibus accipiat. Contingit & his quibus intestinum in scrotum una cum stercore delapsum est: indeq; uiolenter retrusum, ex eoq; inflammatum existit. Fit etiam ob ueneni potionem, & ob induratum stercus circa tenuia intestina impactum, in uno loco dolore innidente circa tenuia uel delictet intestina, ut admota manu durities tactui succumbat, quam adfectionem chordapsium ueteres uocant, hoc est, intestinorum emollitionem. Et multi saepe ex dolore statim intereunt. Alijs uero inflammatio suppuratur, rursumq; intestinum ipsum denigratum ac putrefactum excidit, eoq; modo deficient. Familiaris autem haec affectio aetati puerili est, euadunt tamen naturalis beneficium infiditatis. Senibus uero non ualde familiaris est: si tamen ipsi hanc adfectionem incendant, ferè nunquam conualescunt. Accedit aegris dolor circumuolutus, stomachi nimia humectatio, exolutio, ructus inanes nihil alleuantes, murmura intestinorum cohibitio perfecta stercoris & flatus. Si uero intendatur adfectio, omnia sursum feruntur, ob idq; & uomitus pituitae ac bilis accedunt, frigiditas totius corporis, dolorq; plurimis etiam spirandi difficultas. Morituris autem amplius sudor frigidus, urinae difficultas, podex ita adstrictus, ut neq; specilli extremum suscipere possit: aliquando & stercus uomitu reijcitur. Siquidem igitur cibus crudus uentri insidere uideatur, aqua mulla cum nitro exhibita uomere cogemus: deinde rursum aquam calidam puram dabimus ut mordacitas obrundatur. Si uero nihil crudorum ciborum in uentre contineatur, omni conatu eni-

scendum

tendum est, quo tum flatus tum stercore infra trahantur: idque per glandes illitionesque, & clysteres, magna diligentia in singulis adhibita perficiendum. Glandes itaque conveniunt ex semine rutæ & nitro, cuminoque ac melle. Valent etiam quæ ex brassicæ cauliculis apparantur cum melle cocto: ex profundo enim attrahunt. Cæterum sphincterem Græcis appellatam, transire queant, quibus appositis, podex per spongas calidas foueatur, quibus sanè cyclamini succus utilissimè excipitur, quanquam cum melle etiam ac nitro idem illitus efficaciter opitulatur. Idem facit centaurea cum melle & nitro: verum in his conandum ut quam penitissimè illinantur. Per clysterem autem oleum infundatur, in quo cuminū, ruta, althææ radix aut folia, fœnum græcum, centaurea, cucumeris sylvestris radix, sint decocta: adiciatur autem & butyrum, & resina terebinthina, ut inde crassitudo infuso ipsi accedat, per ampliorem etiam fistulam largius infundatur, iuxta corporum rationem aliquando usque ad duarum heminarum mensuram. Quin & clysteres ex prædictis apparentur. Probè facit & sylvestris cucumeris radix contusa, & in aqua satis diu decocta absinthio adiecto: siquidem ad decoctum ipsum mel & nitrum, oleumque ammisceantur. Si vero sterces durius intestinis insidere coniectamus, aut inflammationis obstructio adsit, althæam ac fœnum græcum cum caricis decoquamus, butyroque & anethino oleo plurimo ad decoctum adiecto, per clysterem injiciemus, & quamdiu quidē queat, retinere præcipientur. Optimum autem infusum hocce est. Bituminis drach. IIII, nitri drach. I, aloës unc. I, olei rutacei dodrantem. Commodum est etiam cuminum, rutam aut absinthium cum oleo coquere, deinde percolato modicum salis injicere, aut opopanax drach. I, aut galbani drach. IIII. Profunt & caricæ ac ruta in oleo decocta. Eiusmodi autem infusa ante cibum infundere oportet, & maximè quod ex asphalto apparatur: urgente uero malo etiam à cibo. In solium etiam aqua & oleo refertum desiderare eos convenit: in aqua uero althæa, ruta, & conyza decoquantur. Fomenta quoque adhibenda sunt ex furfuribus, & per pyriateriam phacota, id est, uaporatoria uasa lenticulata, & per uesticas bubulas ex oleo semiplenas. Conveniunt etiam fomenta ex lanis oleo madefactis, in quo cuminum, anethum, ruta, conyza maximè parua & nasturtium sint decocta. Cuminum quoque per se tritum ventri inspergendum est, deinde lana imponenda. Convenit enim ab irrigationibus incipere, ipsisque etiam inter cataplasmata uti. Cataplasmata uero ex melle sint appadata, aut hydromelite meraciore: assument autem semen lini, fœnum græcum, pollinem hordeaceum, loliaceam farinam, & fabarum. Infarciendum est etiam ipsis plurimum rutæ & cumini, anethique semine aut apij, aut rutæ semen siccū: inspergantur aut hæc crassa, & post impositionem calefiant, posteaque assidue permulentur. Post hæc cucurbitæ affigantur, primum quidem ad remotos locos, inanes: deinde ad ipsos etiā dolore affectos, scarificationesque profundiores fiant, saleque impacta uulnuscule contutendum, aut eo quod ex lauri baccis constat. Potus eis conveniens est anethi decoctum. Est enim usitatum & accommodum. A potu panem in aquā feruentem conijce, eiusque frusta calida confestim edenda præbe. Hoc enim modo servabitur, etiam si iam instet ei suffocationis periculum. Oribasius autem inquit: Anethum in aqua & oleo decoquatur, atque ita bibatur, deinde frusta panis ex aqua feruenti præbeantur. Mirum in modum enim inde iuuantur, inquit, etiam si iam sterces uomant. Ruta etiam ac cuminū trita & potui inspersa com-

moda

moda existunt, & sinapis arida trita inspersa. Comodum est etiā maluae semen tritum ac porui insperium. Balsamum quoque non adulteratum, in potu uile existit. Alius potus. Bituminis drachmas quatuor, cum modico nitri contere, & ex aqua bibenda confidenter praebe. Alius. Radicis panacis drach. ii. nitri drach. i. cumini drachmas ii. excipe melle, & nucis ponticae magnitudine ex aqua calida praebe. Alius. Castorij, anisi, piperis, cuiusque aequales partes commisce, atque inde sesquidrachmā ex aceto mulso praebe. Asclepiadae potus, qui & recrementa multa soluit. Elaterium sufficienti terebinthina exceptum, in catapotiaque redactum, deglutierendū praebe, aquamque insuper bibendam. Aliud ad uoluulum remedium, quod uentrem soluit: confert etiam anhelosis, splenicis, aquae inter cutem, ex lapide laborantibus, urinae difficultati, paralyticis, tremoribus, comitialibus, uuluae strangulationi, mensescque ducit. Medullae scillae crudae, ammoniaci thymiamatis, iridis, cuiusque drach. l. galbani drach. x x v. opopanacis drachmas x ii. Scillam seorsum contere, deinde ammoniacum cum acerrimo aceto tere: postea etiam galbanum & opoponaca, simulque mixta omnia in catapotia redige: ex quibus drachmam unam deuorandam praebe, & uinum dilutum insuper bibendum, aut aquam nullam, aut acetum mulsum, sit autem liquoris mensura cyathorum quatuor. Concoctionem adiuuat, si ante cibum deuoretur, ultra hoc quod aluum facillime soluit. Feliciter usi sumus, inquit Archigenes, ad uoluulos absque inflammatione, hiera nostra ex colocynthide pondere drachmarum duarum, aliquando etiam trium in catapotia redacta. Aut enim uomitu reijcitur ipsum pharmacum cum multa bile ac pituita, aut infra ad intestinum progressum omnes causas adfectionem operantes secum subducit. Doloribus uero perseuerantibus, & maxime quibus infusi clysteres non infra rursus prodeunt, etiam ea quae dolorem leuant exhibenda, itemque conuenientes antidoti ante somnum. Communissima igitur & optima, ea quae ex piperibus constat, & Andromachi ex uiperis theriaca existit, post eam uero quae Mithridati nomen debet. Proprie autem in his colicae antidoti faciunt, qualis est uel in primis quae zopyricos, & quae Praenonia appellatur, quarum descriptiones in xiii. Sermone continentur. Si uero a uenenofo pharmaco quis in uoluulum incidat, aquam tepidam multam bibendam dabimus uomereque cogemus, deinde oleum calidum in potu dandum, aut pinguia iuscula, ut rursus uomant ex moderato eorum potu dissolutam. Cibi eis exhibeantur boni succi: alius uero lacte scisso euacuanda. In eo autem uoluuli genere, quod chordapsium appellari diximus, in quo in uno loco dolor innititur, ut ad mota manu durities & tumor tactui succubatur, circa tenuia uidelicet intestina, subito periculum instat, ut plurimum tertiam aut quartam horam non excedens: quando uero ad suppurationem inflammatio uergit, aut longior remoratio contingit, neque ea ferè citra periculum existit, quanquam sint qui ex eis sunt seruati. Venae igitur sectio ante localia remedia assumenda est, deinde cucurbita, & reliqua cura quemadmodum in inflammatione fiat. Danda uero & his assidue ex uiperis theriaca ciceris parui magnitudine ex aqua calida infusum etiam immittendum ex his quae inflammationibus conducunt, uelut est feni graeci & maluae decoctum, cum oleo & butyro. In potu exhibeatur rosmarini decoctum. florisque iunci odorati, mei, foeniculi, & maxime omnium anethi. Probat etiam ad eos facit, foliorum rhamni uiridum tritorum, & in pastillos redactorum, exiccatorumque dra. i. ex calida aqua exhibita, porro ex conuulsione aut ruptura

obortos uoluulos uenæ sectione curare oportet, locosq; ubi dolor insignitur profundioribus fissuris impactis scarificare & diducere, lanisq; succidis irrigare: antidos totâ dolorem leuantes bibendos præbere, uerum clysteres omnino deuitare. Si uero uoluulus propter intestini in scrotû delapsionē contingit, cōsistim tentandū est, ut decubitu sursum uersus uergente adornato, delapsum intestinum ad inguinum partes retrudatur, atq; post leniter citra uolentiā ac compressionē, ligamento adhibito contineatur. Si uero iam ex compressione inflammatio oborta sit, torminaq; ac inflationes accedant, etiā hos ipsos uenæ sectione curandos censeo, in inediaq; ad tertium usq; diem seruandos. In principio uero lanis succidis ex uino & oleo madefactis irrigandos: adhibito postea etiam cataplasmate crudæ hordeaceæ farinæ. Aliquando autem & inflammatae partes cōmodè per ambitum scarificantur, per althææ quoq; ac fœni græci decoctum & oleum utiliter irrorantur ac adsparguntur.

De his qui ab acri humore colî dolore infestantur:

Galenî.

Cap. xxix

Quibus in colo & intestinis acris & mordax insidet humor, hi à calidis cibis & pharmacis itemq; infusis læduntur, & à cibis abstinentes magis irritantur. Melius autem habent ex temperamentû inducentium & mordacitate carentium usû. Tenuēs enim & acres humores uehementissimū inferunt dolorem, aliquando uero & cōuulsiones, maximè ubi circa os uentris fuerint aggregati. Accedunt quandoq; & animi deliquia, & humiditates sudoris frigida. Hoc itaq; modo affecti, calida potata ac uomitû reiecta, biliosum humorē excernunt, quiq; etiā ærugini aliquando in colore similis existit, hic quidē igitur humor ubi in uentre constiterit, mordens, & animi deliquia inferens, per uomitū expurgare ipsum oportet. Vbi uero in intestinis aggreget, per sedem infundere conuenit ea quæ humores eluere atq; citra mordacitatē repurgare possunt, cuiusmodi est ptisanæ succus. Cibi uero boni succi & qui non facile corrumpantur eis exhibendî, attenuantibus & calefacientibus uitis. Oportet enim infestantem humorē aut euacuare, aut temperare. Exempli uero gratia mentionē faciam quorundā à nobis curatorum. Quidā etenim quadraginta annorum, qui colicus esse putabatur, à perfusionibus & fomentis, cataplasmatiscq; & acrioribus infusis non modo nō iuuabatur, uerū & magis exacerbabatur, & ubi mellis cum pipere accepisset, extremū dolorem incurrit, & ubi fœni græci succū cum melle sumpisset, plurimū fuit irritatus. Coniectationē igitur feci, mordaces in ipsis intestinorum tunicis imbibitos esse humores: non facile corruptibiles exhibui cibos: deinde ubi uidissem eum minus à dolore infestari, uitiati humoris purgatione ei opus esse cognoui: cæterum pharmaco ex aloë amaro hominem acerrimè purgare minimè ausus fui: nimirum ob dolorem ac indigentiam, temporisq; diuturnitatē uiribus attenuatis, per interualla itaq; mediocria paulatim purgatione per picram ex aloë facta, in paucis diebus ipsum perfectè sanauî, nullo altero remedio admoto. Alter quidā adolescens non paululū antea à colicis doloribus uexatus, accepta scamonia purgatus est: quumq; pro ratione accepti satis multū fuisset euacuatus, illa maximè membra quæ prius habuit imbecillia morfu infestata sensit, ut inde quasi fluidā quandā & dolorosam cira intestina haberet affectionē. Itaq; & hunc curauî, colica remedia reijcere iussim, & ex halica cū aqua calida decocta nutriri, granis mali punici simul incoctis. Quumq; totā noctē absq; dolore dormisset, mane exhibuimus ei rhois succū dilutiore bibendū: ut si qua ulcerosa adfectio circa intestinū esset oborta,

cam

eam adstringeret, siue quippiam ex superioribus partibus ad affectam influeret, id ipsum repelleret. In prandio etiam halica similiter cum mali punici acinis & aqua decocta uti iussimus. In uesperam uero panem ex uino quopiam austero ac ueteri madefactum dedimus. Concessimus etiam ut ex austeris fructibus pro libitu, modicè tamen, caperet. Tertia autem die quum eodem modo fuisset reffectus, in quarta hausta theriaca perfectè sanus euasit. Alium autem quendam similiter affectum aestatis tempore quum plurimum sitiret, eodem uictu curauimus, ampliùsque frigidum potum ei indulimus. Caeterum euacuato humore, & remanente adhuc dolore, ad stupefacientium usum confugere oportet. In huiusmodi enim affectionibus non solum quod sensum stupefacit, sed & quæ humores tenuès inspissant, caloremque refrigerant maximè opitulantur.

De his qui à frigidis & pituitosis humoribus colic dolore infestantur.

Cap. xxx

Quum uero crassi & lenti fuerint humores, qui doloris causa existunt, nequaquam stupefacientia erunt offerenda: etenim alleuantur quidem ex eorum usu, ob sensum uidelicet stupefactionem, uerum rursus peius inde habent, quod amplius per ipsa humores inspissentur, & difficulter omnino excerni possint. Atqui nausæ unà cum uomitibus magnæque & frequentiores illis oboriuntur. Vomuntur autè pituitosa & corrupta, retinentur excrementa adeo ut ne flatu quidem ex cernatur, neque ructus etiam procedat. Sape enim ueluti sursum redigressus uehementius augetur. Manifesta uero cognitio colicæ affecti est, quando aliquando quidem altius dolor infestat, quàm pro renum situ, aliquando uero tem longe inferius: si enim iuxta renū situm dolor innitatur, atque id in uno loco cum dolore ac grauitate, renum affectionem eam esse censendum est. Considerandè autem ad hæc urina: aquosæ enim & puræ in principio à nephriticis mutantur: quemadmodum in sequenti tempore subsidentia habentes asperæ, deinde exquilitè arenosam. In colicis uero etiam si egerat aliquando uenter, tamen flatuosiore excernit: sæpeque stercora aquæ inuehuntur bouum stercorebus compare non absimilia. Contingit etiam quandoque humorem aliquem frigidum cum ipsis excerni, quo facto cōsestini melius habent. Per fomenta autem & cataplasmata nephritici quidè doloris mitigationē accipiunt, laxatis uidelicet mixta obstructū lapidem corporibus. Colici uero parumper quidem uidentur mitiores redditū: paulo post uero uehementius intenduntur eis dolores, diffusus uidelicet per adhibitarum fomentationum calorem humoribus, generatisque flatibus, qui plurimam distentionem operantur. Quomodo igitur oportet dolores ex frigidis in intestinis humoribus abortos curare, ita ut neque uehementibus irrigationibus, neque cataplasmatibus caleant? A calefacientibus enim distenduntur & inflantur omnes frigidi ac crassi humores, qui intestina distendendo augent dolores. Conuenit itaque ipsos diffecare & concoquere citra uehementem calorem, & per minimè instantiū usum. In exacerbationibus igitur consimilis colicorum cura fieri debet, qualis ad uoluuolos est prædicta, irrigationes uidelicet ex oleo rutaceo & sicyonio & anethino, inediaque & fomenta ac cataplasmata, infusa item & glandium admotiones, illitionesque sedis. Vomitus uero ante coenam, si quis facillè uomat, præ omnibus auxiliatur. Vbi uero malum ipsum producit ad plures dies, infessio in solum ex oleo repletum adsumenda est: aut si hoc fieri non potest, ex aqua & oleo repleatur, in quibus althæa, pule-

pulegium, ac lauri folia, similiaque sint decocta, Fomentum uero siue uaporatorium adhibeatur ex fufuribus & milio, & cataplasmata quoque ad uoluuolosos praedicta. Post dies uero septem purgatio ex hiera Archigenis suscipiatur, Licebit tamen & non purgare, uerum ab acrium ciborum esu inchoare. Quando uero alium ipsum omnium minime inflat, nisi febris adsit confidenter ipsum afferemus. Sitis autem sequitur acrium rerum comestionem, Praealleuetur itaque praecedente uictu eger, ubi ad acrium rerum esum procedere uolet; aqua quoque potuatur. Flatu autem uentofo infestante, egregium remedium cucurbita saepius affixa, cum largiore flamma existit: ut incantationi similem effectum praestare uideatur, & in quacunque corporis parte apponatur, confestim a dolore liberare ac perfecte sanare cognoscatur. Quod si humor quoque una cum flatu adfuerit, euestigio quidem a dolore leuantur, mox uero rursus redeunt dolores maxime ubi quippiam peccati circa dietam fuerit admissum; aut si plus quam oportuit, calefecerint ipsa membra. Maximum autem signum & hoc tibi fuerit ad affectionis cognitionem, Ne calefacito itaque manifeste, sed dieta attenuatoria utaris. Oportet autem & ante infusorum usum, cucurbitam dolentibus locis adhibere: indeque oleo rutaceo, & huiusmodi cunctis iusculis uti. Multi uero accepto dyslere uehementer dolent, & uitreo humore excreto statim liberantur. Febre autem ut plurimum carent, sitis quoque in totum non infestantur. Nascuntur et in colo lapides, sed raro: quare oportet eos urinam cientibus, & stomacho gratis uti, sanitatisque tempore etiam uenam secare, & catapotius ex aloë gratia praefere uandi uti. Quando quidem autem colum ipsum in quibusdam, debilitatum ex leui occasione, & per interualla quaedam dolores inferre consueuit: melius utique fuerit exquiritore dieta uti, & curam quoque adfectioni conuenientem subornare. Qua de causa ubi a somno surrexerit aeger, uentrem exonerare tentet: deinde ad deambulationem procedat. Deambulet autem & hyemis tempore, nisi frigidior sit aer, aut ipsius debilitas hoc non permittat: idque faciat in loco sub dio, aëri exposito, & patienti: primum quidem lentius, post uero concitatus. Quiescat quoque ubi crura incaluerint fuerintque delassata. Deinde domum reuersus habet aliquod pharmacum affectioni conueniens, modiceque quiescat: & ubi quotidianam alicui ac consuetam actionem uacauerit, per horam equo uehatur, assidue ei insidendo: quod si facere non possit, in curru: si autem imbecillior sit, per nauigium. Iacens enim uectari poterit, quum omne corpus una cum nauigio commoueatur. Post uero ubi molestiam ex uectatione obortam modica deambulatione excluderit, leniter exclamet, aut concinne cum uociferatione procedendo legat: deinde rursus modice quiescens ad inunctionem ac frictionem exuat. Exercitatione itaque facta, & cura admota cibum accipiat circa sextam horam, ut & ad coenam sufficiens interstitium fiat. partiatur autem cibos, maior remque eorum partem in coena assumat. Vtilissima enim colicis ciborum partitio existit: praepotato igitur absinthite uino, panem in clibano coctum recentem probe apparatus accipiat cum oliuis colymbadibus muria conditis, aut paucis uuae pensilis acinis, aut ficis uiridibus tribus aut quatuor: deinde a potu, nisi ualde urgeatur, abstineat. Si uero siticulosus sit, modico potu uehementiae sitis medetur: otioque & iucunda animi uoluptate fruatur. Deinde per circuitum affectione repente, deambulet: ciboque probe disposito, ad coenam accedat. In coena si siticulosus sit, modicum praebat, & post paruum interstitium coenat: ex uarijs quidem pauca, et commoditatibus abunde referta. Potus medius cibum non dirimat, sed post ipsum reseruetur, qui sufficit etiam potus exhibeatur. multa enim

X potatio

potatio inconueniens affectioni existit. Non longo deinde à cœna intervallo facto, ad somnum diuertat: & si quidem noctu sitis urgeat, ei parce medeatur, aqua paulatim absorpta. Atque de quotidiana quidem diætæ ordinatione hæc genus. Cæterum paucis subnectam etiam commodos ad affectioni cibos, potionesq; & pharmaca. In uniuersum igitur omnia quæ colicis exhibentur attenuatoria sint diætæ. Panis itaque neq; sit aridus, neque calidus, in clibano coctus, aut si is non adsit, in furno. Olera autem cruda quidem non sunt danda, cocta uero conueniunt, cichorium, intubum, rarius autem cauliculi lactuca, cucurbita in calido cinere assata, cocta enim stomachum lædit, malua cocta: uerum nihil horum absque pane exhibendum. Dandæ etiã colymbades oliuæ cum aceto mulso ac ruta præparatæ. Ab alijs uero abstinendum. Legumina omnia per se quidẽ affectioni incõmoda sunt. Verum uarietatis gratia aliquantũ adsumantur lenticula cum beta colliquata, optimeq; contrita, aut cum ptisana: aut faba cum ptisana diligenter subacta. Cæterum rarum leguminum usum probopptisana excepta: commoda enim hæc est, lapathum cum ea colliquato. Conuenientiam salsamentum piscium petrosi locis degentium: itemq; limaria non interrata, nec muria condita. Piperem autem & ruta cum aceto mulso condita exhibeantur. Ex carnibus conueniunt in primis uolucrum, secundo loco piscium numerantur, tertium ordinem terrestrium carnes habent. In unoquoq; genere omnia inconsueta reprobanda. Inter ea uero quæ pro consuetudine in cibũ nostrum accipimus, uitanda sunt dura, siue natura, siue ætate talia existant: item quæ neruofam ac fibris refertam habent carnẽ, graueolentiaq; ac foetida, & quæ aliàs mali sunt succi, aut grauioris qualitatũ, & pingui, atq; ea etiam quæ omnino macra sunt & infirma, & quæcunq; præ humiditatis multitudine diffiunt. Quapropter ex piscibus, hi qui in fluminibus & stagnis degunt uitandi sunt. Ex marinis autem, qui in petris degunt, his qui intra pelagi profundum uersantur sunt præferendi. Qui tamen in profundo maris degunt, littoreis præstant: & littores rursus, potiores sunt his qui in marinis paludibus nutriuntur, etiamq; his qui in magnarum urbium stagnis uictum quærunt. Eligendi autem sunt maxime lupi & aselli mediocri magnitudine: scari autem & turdi ac gobij tenerissimi quidem sunt, & facillime secedunt: alimentum autem paucum, roburq; corpori addunt. Scaros autem hic non magnos intelligere oportet. Mulli autem & scorpij & passeres, nutrimenti quidem ac roboris gratia omnium gratissimi existunt grauiorem autem omnem habitum reddunt, ut ob eam causam frequentior eorum usum uitare oporteat. Murenas autem & loligines, sepiasq; & polypodas, omniaq; simpliciter mollia, ut quæ difficulter cõcoquantur, inflationes pariunt, noxios humores generent, censeo reprobanda. Ex his uero quæ testa integuntur, squilla omnium minime noxia existit: cancer turbationem inducit. gammaro autem siue astaco pro uoluptate fruatur. Ex ostreorum porro genere, purpuræ, & buccina reliquis præferenda: deinde pelorides præstant: postea herinacei recetes: deinde quæ propriè ostrea appellatur: reliqua uero relinquenda. Ex uolucrum genere, gallinæ omnibus præstantiores. sint autem feræ, & in montanis altæ, deinde perdices, & palumbi, debilis nutrimenti gratia exhibendi, turresq; feri ac per agros nutriti et columbæ: Fugienda omnia uolucrum genera, quæ in aquis degunt, tanquam graueolentia, & quæ superfluitatibus multis abundant. Ex quadrupedum animantium genere præstant carnes suillæ, tum cõcoctionis & alimẽti roborisq; quod inde corpori accedit, gratia, tum quod facile secernatur, secundo loco hœdinæ habendæ: reliquæ uero domesticæ fugiendæ.

Ex syl.

Ex syluestribus & feris pauca, uarietatis tantum gratia dentur. Omnes autem carnes quas exhibere uelis, ad duas dies promptas & paratas habere oportet, in hyeme praefertim, ut friabiles reddantur: ex aqua etiam omnes coquantur, quae enim in sartagine fricta sunt, quantum fieri potest uidentur. Cauendum etiam a uisceribus omnibus, sunt enim frigida, & turbationem mouent: difficulter concoquuntur: grauiasque sunt, et saniosa, ac foetida, nimiasque humectationes ac naufeas producant: maxime tamen omnium cerebrum, Pulmo sane hoc diu bis affatus, ac in cibo acceptus superabundans alimentum subtrahere uidetur. Qui uero cum lacte replent, deindeque coquunt, aut assant, uoluptatis gratia non utilitatis respectu id faciunt: multoque magis qui eum frustatim concisum in sartagine torrent. Sale conditi arietis pulmo maxime uetusti, dissulter & grauius a uentre exuperatur. Cochleae autem terrestres succulentae in cibo sumptu oblectari & sese opponere colicae affectioni uidentur. In liquamentis & condimentis conueniunt, cum inum, menta, ruta, sison, foeniculum, origanum, ammiu, thymum, piper, zingiber, daucus, succus silphij, acetum, mel, garum, uinum. Pyrethrum uero & ligusticum, ac helenium, similiaque magis medicamentaria uis praedita sunt: & ob id in quotidiano usui ac diata uitanda. In uniuersum autem, ut summam dicam, unius coniectationem facere oportet, ut scilicet accepti cibi optime concoquantur. Particulatim uero, ut ne siccitas excrementa apprehendat, neque fatigetur uenter in multis cibis conficiendis: ne ueter ciborum qualitatibus oblectetur, ueluti si aegre eas conficiat, & nimiam humectationem ei inferant, ne noxii humores generentur, neque in uentre, neque in uniuerso corpore. Omnia enim inutilia recrementa ex leui occasione ad affectum ac infirmum membrum detruduntur. Quare uitare conuenit omnia dulciaria & placentas: plurima etiam ex bellarijs ac fructibus: iucunditatis tamen & gratificandi stomacho gratia, uua alba dulcis praeparata ariditate corrugata cum pane praebetur: ficusque maturae cuticula auulsae: uua etiam uinaceis exemptis. Reliqua uero omnino sunt fugienda. Vinum sit subadstringens, album, tenue, pellucidum, mediocri aetate, temperatura dilutiore, modiceque bibatur. Quod si sitis a cibo accedat, aqua calida praebetur. Insensissima enim ipsis frigida existit. Dulces autem praelibationes ex uino & melle apparatus, propomata Graecis appellatae, eo quod ante cibos biberentur, omnes deuittandae. Atque hoc sane modo ea quae ad colicorum diatam pertinent, dijudicantur. Colicum remedium ex stoechade, nephriticis commodum. Hoc omnes ueteres interiorum membrorum affectiones curauimus. Datur autem ex ordine diebus xxx. & perfecte ab omnibus affectionibus liberat. Stoechadis drach. xviii. radice panacis drach. v. agarici drach. ii. cinamomi, myrrhae, seminis brassicae syluestris, iridis, mandragorae, hyoscyami albi seminis, costi, nardi cretici quod phu appellat, spicae nardi, piperis, opij, cuiusque drach. xii. (Accipio autem piper longum) mei drach. xviii. seminis eicuae drach. xxiii. dauci drach. viii. Contusa excipe melle despumato, ac exhibe robustis scrup. ii. reliquis, obol. iii. febre carentibus, ex uino mulso: febricitantibus, ex aqua. Infusum quoque nucis ponticae magnitudine cum oleo in quo scenum graccum & ruta cocta sunt, colicorum dolores sedat.

Pharmaca ad colicos.

Cap. xxxi

Conuenientissimum ad colicos pharmacum uinum absinthites existit, si praelibatione a balneo aut exercitio opus habent: estque etiam non sitientibus ualde commodum, si laxiore ac debiliore apprehendente aluo, cyathi temperati mensura ante aridorum ciborum comestionem accipiat. Apparatur autem uinum ab-

X 2 sinthites,

linthites, & pro occasione, uirgis recentis & pleni absinthij quindecim numero, per diem ac noctem in fictili uase uini tenuis & adstringentis mediocriter uultu maceratis: mensura autem uini sit sextariorum trium, Decoctum etiam herbarum ipsius, ubi semel tantum ebullierit, pari modo ad uinum quod alias pro consuetudine bibunt, admixtum, utiliter à balneo ac exercitio præbetur. Melius autem est quod ubi otium sit sic præparatur. Selibra absinthij in amphoram uini optimi recentis, quod mustum appellamus, conijcitur, oblinitur, in eaq; permittitur, donec mustum cessauerit feruere: deinde absinthium quidem abijcitur: uinum uero reponitur ac inueterascit. Habet autem omnino amphora sextarios octo & quadraginta. Vinum absinthites aluum corroborat potenter, & quicquid lubricum inferne in aluo ac intestinis hæret, citra animaduersionem detergit: bilis generationem præpedit: flatusq; alios quidē depellit, alios uero auertit: quodamq; modo spiritum dispensationi præfectum defecat. Aloë etiam optima trium drachmarum pondere deuorata aptissima est, ubi non pro ratione ciborum egestio excrementorum fiat. Quemadmodum autem optima aloë etiam sola sanitati restituere potest: ita uitiosa medicamentaria superfluitate uentrem replet. Intercidentes uero obiter inflationes syluestre cuminum, quod & æthiopium appellant: cochlearij mensura ex aquæ calidæ cyathis duobus aut tribus potatū dissoluit: aut sison simili modo: aut rutæ ramuli in aqua ipsa seruescunt. Castorium etiam assidue potatum totius affectionis apparatus demolitur, omnibusq; medicamentis præstare repertum est: datur eius drachma una in tribus cyathis optimæ aquæ mulsæ. Lupi autem sterces maxime album ex aqua, aut uino albo & tenui summe colicis auxiliatur, inquit Galenus: non solum in accessionibus & irritationibus, sed tempore etiam interualli. Aut enim perfectio morbum sedat, aut ita præparat, ut ad tempus aliquanto mitius adfligat. Melius autem sterces censetur, quod non in terram delapsum reperimus, uerum in fruticem aut herbam excretum. Ossa quoq; in ipso stercore inueniuntur, quæ ipsius animalis concoctionem effugerunt, quæ si trita bibantur, magnopere colicis auxiliantur: quare mundioribus hominibus repurgatoria exhibenda sunt cum sale ac modico pipere mixta, aut alio quopiam ad commendationem odoris. Mirum in modum etiam manifeste colicos iuuat, instar amuleti alligatum illis agroti idem lupi sterces: oportet autem filum quo amuletum colligatur ex oue à lupo discerpta sumere, cum stercoreq; ipso in pelle ceruina excepto, ac filo colligato, illa præcingere. Si uero non suppetet lana ex ouicula à lupo discerpta, ligamentum ex ceruina itidem pelle accipere oportet. Corydalis item passerulus, qui & corydalis, hoc est galerita, appellatur, simplici iure coctus, assidueq; una cum iure acceptus, summiopere colicis prodest. Utilitatem enim ex eo expertus sum, inquit Galenus. Cæterum passerulus, quos pyrgitas à turribus, & troglitas ab antris & cauernis appellant, similis est, qui sanè circa urbium muros uersantur ac degunt: uerum his maior est corydalis ipse: habetq; in capite ueluti cristam siue galeam ex pennis sponte naturæ enatam, & circa uias reperitur hyemis præsertim tempore. Aliud. Talum suillum ustum & tritum, totum ex aqua bibendum præbe. Aliud. Thymi cacumina in aqua ad tertias decoquito, & ad percolatum decoctum mel despumatum adijcito, bibendumq; præbeto. Aliud. Radices uerbenacæ recte tenuiter concisas in aqua ad tertias decoquito, ieiunisq; per quinque dies bibendum decoctum hoc præbeto: & colicis medeberis. Vtere, est enim experimento cognitum. Aliud. Hoc itidem experimento constat, eoq; ipse liberatus sum. Mentam uiridem aliquandiu decoquito,

coquito, decoctumq; bibendum ad dies tres exhibeto, & nunquam dolore afficietur. Cauendum autem ne olla in qua mentam decoquis per tres dies terrā contingat. Remedium uero hoc eiusmodi est, ut praesentē opem ferat: estq; multo usu cognitum. Lauri etiam teneriora uirgulta arefacta comedenda praebere per tres dies, quibus mentae decoctum potant. Aliud mirabile. Marrubium in uino mulso decoctum bibendum praebere. Liberabiturq; a dolore, neq; unquam postea incidet in affectionem. Aliud. Rhamni folia uiridia trita in pastillos informa, & exsicca: drachmamq; unam inde exhibe febre carentibus, cum uino: febricitantibus uero cum hydromelite. Facit & ad uoluitosos, omnemq; dolorem flatuosum miro modo. Per ructus enim ac flatus exoluti a malo, sani fiunt. Aliud. Rhamni succum poculi mediocris mensura tantundemq; passii cretici misceto: dumq; in solium in balneo descendit bibendum praebeto: plurimumq; tolerare id iubeto. In frigida autem aqua solui nequaquam conscendat. Experimento cognitum est. Ex apparatus uero pharmacis hocce nobis familiare est, inquit Archigenes. Castorium & ammium tenuissime trita duorum cochlearium mensura praebere ex aqua multa. Secundum uerolocum hoc habet. Castorei drach. iiii, ammi, seminis api, foeniculi, cuiusque drach. i. exhibe eo modo quo praecedens. Aliquando autem pro apio panacis radicem adijciens praebere, assequorq; rite quod uolo. Praestabile est & hoc.

Anisi, castorei, & quales partes misceto, indeq; drach. i. ex uino mulso exhibeto. Aliud. Gladiolum una cum radice exsiccatā, contusā, & cribratā cum piperis granis undecim bibendā praebere, diuturno malo hoc medetur. Ceterū duo efficacissima ex multis omnino colī pharmacis usus approbatione praestantia, inquit Archigenes, unicuiq; cōmunicabo. Sagapeni, piperis, galbani, pyrethri, croci, spondylii, myrrhae, cuiusq; drach. i. radices panacis drach. v. iiii. excipe melle, & ad cerati crassitudinem redige. Vbi uero usus expetat manipulum i. chamaeleucas aut chamaepityos in uino optimo, leui, anniculo heminarum quindecim mensura, usque ad tertias decoque. In hemina deinde decocti una, ex pharmaco ad fabae magnitudinem dissolue: idq; semel primo mense bibendū praebere: secundo deinde mense bis: & tertio ter: atq; hoc modo usque quo quinque exhibueris, secundum menses auctione facta procedes: nisi alui ramenta inde succedant, ea enim leniter detrahare hoc pharmacum consueuit.

Alterum uero ad dissoluendas accessiones, ualde efficax existit. Myrrhae stactae, opopanax, succi cyrenaici, croci, pyrethri, galbani, sagapeni, cuiusque drach. vii. olei picini drach. i. mellis despumati quantum suffecerit, ut ad cerati crassitudinem redigatur. Ex hoc pharmaco drachma una, in tribus cyathis passii cretici diluti calidi liquefacta exhibetur. Neq; uereor haec etiam in accessionebus, nisi ex cruditate laboret aeger, praebere, atq; etiam in interstitiis per aliquas dies ex his affectionem expugnare ualdeq; mihi ex sententia res procedit. Theriace porro Andromachi ex uisperis constans interualli tempore assidue accepta, prohibuit ne facile ab accessionis irritatione rursus impeterentur. Antidorus Zopyrios appellata, praesens auxiliū in debilibus doloribus existit: facit ad colicos & alui inflationes, & incipientes aquae inter cutem suffusiones, maxime eā quae tympanites appellatur: ualet etiā ad iocineris affectiones: prodestq; his qui uenenū hauserūt. Myrrhae troglodyticae drach. v. spicae nardi drach. v. croci drach. iiii. floris iūci odorati drach. iiii. & dimidiā, cassiae drach. iiii. cinamomi drach. iiii. thuris drach. i. piperis albi sesquidrachmā, costi drach. i. Excipe melle despumato, ac nucis pōticae magnitudine praebere ex uini mulsi, aut passii ueteris

cyathis duobus, aut ex aqua. Exhibeatur etiam in colica diuturna, habita tamē prius corporis cura, paululum ante horam cibi sumēdi, ad dies ex ordine quindecim; deinde ubi ab eius exhibitione per quinque dies quieueris, rursus exhibe ad dies decem; iterumque post multorum dierum intercapedinem, parum præbe, donec ea amplius opus non habeat æger. At qui propria sua efficacia corpus se melius repræsentaturum promittit, tum carne, tum colore, tum sensu, tum firmitate, Archigenes porrò Zopyrium antidotum sic parare iubet. Spicæ nardi drach. VI, floris iunci odorati drach. V, myrrhæ drach. V, croci drach. IIII, cassiæ drach. IIII, cinamomi drach. III, piperis drach. VI, costi obolum, thuris obolum. Cæterum præter opinionem colicis conueniens antidotus est, quæ præonia appellatur. In ipsis enim uehementibus accessionum irritationibus ante somnum exhibita compescuit dolores, somnumque dulcem simul produxit, ac morbum dissoluit. Quidam etiam ipsam cum oleo infundentes scopum attigerunt. Descripta autem habetur in tercio decimo De theriacis Sermōe huius uidelicet tractatus: quare ea ipsa censeo confidenter esse utendum. Aliud ualde bonum oxyporium, cito penetrans, tum colicis, tum inflatis commodum. Cumini trientem, piperis albi, cacuminum thymi, foliorum rutæ, nitri, singulorum unc. i. cōtere cum aceto, ac redige in pastillos pondere unius aut duarum drachmarum. Exhibe iuxta cuiusque uires cum aqua calida. Aliud. Sifonis, cassiæ, foliorum lauri in umbra exicatorum, singulorum drach. VII, petroselinum drachm. IIII, spumæ nitri albæ drach. V, excipe melle, ac utere. Aut cochleare eius sicci ex aqua mulla, in qua ruta decocta est, præbe. Aliud. Cumini syluestris cochlearia III, seminis coriandri, foeniculi, anisi, apij, seminis rutæ, cuiusque cochleari, piperis grana IX, uini sextarium I. Hæc tenuissime contrita uino permisce, & quotidie cyathum unum bibendum cum aquæ cyathis tribus præbe. A potu autem eger deambulet, & probe concoctionem iuuabit. Poteris & ipsum uinum calefactum præbere. Aliud Asclepiadæ, quod ab omni affectione penitus liberat. Corticis salicis uiridis drach. V, zingiberis drach. IIII, piperis drach. II, palmas passas III, rutæ uiridis ramulos V, aquæ pluuialis sextarios III. Omnia simul ad tertias decoquito, atque ad horas siue dies tres pro qualibet uice cyathos duos exhibeto: et post triginta dierum spatium idem rursus facito, quo per anni spatium unius, triginta & sex potiones contingant. Hoc enim pharmaceutum hoc modo totam affectionem aufert. Aliud. Cornu ceruicæ recens enati adhuc capillis obsiti, tenerrimi que ac uisti, cochlearia maioris modi III, piperis albi grana IX, myrrhæ parum quid, ad commendandum odorem, Contempe omnia, eisque cochlearum terrestrium magnarum unam cum testis suis tritarum, quantum uisum fuerit adijce: omniaque simul trita, & uino falerno mari mixto tritum cyathorum mensura permixta, & ad mites prunas in uase fictili calefacta, ac sedulo; ne quid in fundo resideat, agitata, præbe bibenda, ita ut nihil reliqui maneat: atque id maxime tempore accessionis, et ieiuno adhuc ægro fiat. Deinde uero cibum qui facile conficitur præbe, atque hoc ex ordine ad dies tres exhibe. His uero qui cochleas sumere non possunt, reliqua præbe sicca cum uino. Potio ad colicos, quæ etiā inflatis, & difficulter concoquentibus, uoluitosisque est accommodata. Absinthij, pulegij, piperis albi, cumini syluestris, baccarum lauri decorticatarum, omnium æquales partes exiccatas ac tritas, cochlearij mensura præbe ex aqua calida. Vtereque eo confidenter. Aliud colicum remedium per experientiam receptum. Baccas lauri IX, piperis grana VII, opopanax magnitudine ciceris, coijce in aquæ cyathos III, totumque simul feruēfactum bibendum præbe,

præbe, quiescatq; inde æger, & perfectè sanitati restituetur. Oportet autem, inquit Galenus, ad viros masculi, ad fœminas muliebris sexus herinacci internâ membranâ accipere, exiccareq; ac contundere: eiusq; partes tres prædictis ammiscere. Aliud, ad colicos præclarû. Colocynthida maximam non solum ferro perforatam, sed & semine eiecto euacuatâ, ita tamen ut id quod instar tometi in ea est relinquant, uino ueteri dulci quantû eius capere potest exple, eâq; per noctem integrâ repone: mane uero uinû ipsum per panniculû diligenter exprime, ac percola, ut nihil ex medulla eius in ipso potu residuû maneat: uinûq; ipsum calefactum bibendum præbe, quo facto æger deambulet & liberabitur.

De antidotis dolorem leuantibus, insusisq; colicis accommodatis:

Galenî.

Cap. XXXII

Pharmacis dolorem leuantibus, medici uti consueuerunt, ubi magnus adest dolor, aut uigiliæ, aut ne ob uiolentam tussim lancinentur ægri, uelut in sanguinis refectione, & destillationibus à capite cõtingere solet. Verû in illis medicis exhibere solemus: quales sunt ex seminibus constantes tussi accommodatæ facultates, quæ & ipsæ omnino aliquid ex soporẽ inducentibus pharmacis admixtum habent: uerum modicum id est inter multa adeo semina, quæ & boni odoris sunt, tenuiumq; partium, & urinam cient: cuminum dico, daucumq; & anisum, & quæ his similia existunt. Cæterum quæ ad colicos apparantur pharmacis dolorem leuantia eiusdẽ quidem generis cum illis sunt, uerum longe maiori facultate prædita, atq; id ob magnitudinẽ in eis doloris. Opium igitur fortissimum est stupefactiuum: ammiscere autem ei oportet, ea quæ aut dolorosam affectionem concoquere possunt, aut humores ab ipso factos discutere, aut secare & attenuare, aut secundum totam ipsorum substantiam permutare. Scopus enim nobis in his est, primû quidem ut sensum stupidum reddamus, deinde ut nihil in posterum ex stupefactiuo pharmaco relinquamus, quod mēbro nocuum inferre possit. Amplius autem ut, quod maximum est, affectioni opitulemur. Ad hæc itaq; respectu habito, uidetur mihi debito modo & iuxta rationem propositum componere pharmacum: ex hyoscyami quidẽ et opij permutatione, quicumq; altiorẽ somnum ac soporẽ, sensitiuaq; facultatis stuporẽ inducere uelit: quo uero citius digeratur, omnẽq; profunditatem affectorũ corporũ penetret, calefacientia ammiscere oportet, piper uidelicet ac euphorbium & pyrethrum, quæ nociuos humores discutere possunt, & repurgare uiscosos, secareq; crassos: & flatibus uentosos attenuare, concoquereq; & euacuare. Neq; uero parum concoctoriæ facultatis frigidorum præsertim humorũ in indica nardo existit: quemadmodum autem ex aromaticis nardum coniecit Philo, sic & hi qui ei successerunt, alij aliud adiecerunt: florem iunci odorati, cassiam, amomum, ac costum. Quemadmodum aut rursus crocum coniecit Philo concocto pharmaci ad humorẽ & affectionẽ cruda: ita alij myrrhamq; & castoreum ammiscuerunt: plurimiq; ex ipsis, neque id male, etiam familiaria nobis semina, apud uidelicet & cumini, anisiq; ac dauci, & petroselini, & quæcunque eius generis existunt, adiecerunt, quo uidelicet amarorum pharmacorum iniunctionem lenirent, ad digestionemq; & urinæ expulsionem totum pharmacum attenuare oporteat, et hoc ipsum per ea contingit. Prima itaq; ut apparet, ex omnibus uetustioribus præclara Philonis antidotus existit, de qua ipse hæc scribit. Philonis antidotus. Philonis Tharsensis medici magnum mortalibus inuentum ad multarum affectionum dolores, siue colum quis doleat se-

mel datum, siue iecur, siue etiam urinæ difficultas, aut calcularis morbus, aut orthopnoea, aut tabes infestet. Sanat & conuulsionem & pleuritidem, ac sanguinis reiectionem, aduersusq; mortem se opponit, omnes uiscerum dolores sedat, tussimq; & suffocationem, singultumq; & destillationem. Hanc etiam Andromachus in suis commentarios retulit, hoc modo de ea scribens. Colica antidotus admirabilis, qua utor & ad uoluulos, & ad eos qui stercora per uomitum reiiciunt in maximis doloribus: datur magnitudine fabæ ex cyathis tribus aut quatuor aquæ frigidæ. Compolitio autem hoc modo habet. Piperis albi drach, x. l. opij drach, x. x. croci drach, x. l. seminis hyoscyami albi drach, x. l. spicæ nardi, euphorbij, pyrethri, cuiusque drach, ii. excipe melle cocto; ac utere.

Alia antidotus colica, Nicotrati llotheos appellata, duobus talentis emptæ, faciēs ad stomachicos qui cibū continere non possunt, oculorū affectiones, & magnas uexationes, & dolores uulvæ, ex hydromelite in quo ruta sit incocta. Croci sesquidrachmam, myrrhæ drach, ii. spicæ nardi drach, ii. costi, piperis albi, piperis longi, galbani, cuiusque drach, i. cinamomi, succi mandragoræ, castorij, cuiusque drach, ii. seminis dauci sesquidrachmam, alij drachm. iiii. & dimidiam eius conijciunt, opobalsami drachm. iiii. sagapeni drachm. iiii. cassiæ drachm. iiii. excipe melle despumato, & fabæ magnitudine præbe.

Quæ colicis infundantur, & per anum subdantur.

Cap.

xxxiii

Huius generis sunt etiam, quæ sedî applicantur, quæq; ad leuandum dolorem per anum, tum subduntur, tum infunduntur. Opium itaq; ex genere eorū est, quæ fortiter sensum stupidum reddunt, ac somnum soporiferum inducunt. Atq; hæc facit tum per se solū, tum cum pari castorio in sapa aut oleo rutaceo imbutum, tomentoque exceptum, & ano inditum. Miscere enim hæc pharmaca oportet quopiam vires ipsius opij mitigante, nocumentumq; quod inde membrīs infertur impediēte, ampliusq; affectionem iuuante. Aliud, quod subditur colicis, ad dolorem leuandum, Castorij, croci, opij, myrrhæ, styracis, æqualis partes in collyria longa redige cum aqua, & utere. Infusum ad colicos mirabile. Cedriæ quadrantem, picis liquidæ semissem, castorij sesquiunciam, piperis grana lx, unito cum digito medio, uel eo qui index appellatur, usq; ad primam flexuram uncto, & simul cum olei rutacei cyatho iunquinato, ammixtaq; butyri unc. i. terebinthinæ sesquiuncia, tepesactum per fistulam ampliorem infundito: subsidet enim & dehiscit, ac ab unione discedit.

Aliud infusum, quod ante somnum acceptum, somnum conciliat, dolorem lenit, concoctionemq; probe iuuat. Succus absinthij drachm. iiii. opij drach, iiii. aloës drach, xii. picis liquidæ unc. i. cedriæ unc. i. myrrhæ unciam unam, centaureæ drach, iiii. castorij drach, x. costi drachm. vi. mastiches unc. i. foliorum rutæ unciam unam, styracis unc. i. mellis & terebinthinæ liquidæ quantum ad coactionem sufficit, quo ad mellis crassitudinem redigatur. Vt uero expetente ex pharmaco hoc drachmas plus minus quatuor, iuxta ægri vires ac ætatem, in diplomate cum oleo cyprino, gleucino, anethino, telino, in quibus cuminum contusum coctum est dissolue, modicumque butyrum ammisce. Et ubi aluum per clysterem stercoris eductiuum prius euacuaueris, deinceps laueris, & cibum exhibueris: ac caput ex anethino aut omphacino illeueris, ante somnum infunde. Vtere, experimento enim constat. Aliud, quod inferne infunditur, quo ego usus magnū nomen assequutus sum. Castorij drach, iiii. croci sextantē, alij tamen drach, ii. tantū habet, opij trientē, myrrhæ drachm.

drach. iiii. succi rutæ drach. ii. nitri rubri drach. ii. quidam uero pro nitro spicæ
nardi scribunt, excipe melle despumato cocto. Vfus uero tempore nucis avel-
lanæ paruæ magnitudine, aut fabæ tantum accipe, ac in uini mensura una dis-
solue, affusaq; olei rutacæ mensura una, ut uidelicet duæ mensuræ sint in totum
permisce, ac præloto ægro, ante somnum infunde. Caterum præscriptas ad do-
lorem leuandum antidotos & infusiones uitare oportet, ne in nimis assiduam
usum conuertamus; sedant enim cõfestim dolores, causas uero intus referuât;
& aut paulo post animi deliquium inferunt, & mortem, aut diurnas & indif-
solubiles affectiones reddunt. Aliud infusum mirabile. Butyri quincun-
cem, adipis anserini, adipis gallinacæ, medullæ ceruinæ, terebinthinæ, cuiusq;
sextantem, adipis ursini unc. i. cumini, foliorum rutæ, castorij, cuiusq; quadran-
tem, euphorbij recētis drach. vi. opobalsami septuncem, nardi celticæ trientē;
unguenti nardini lib. ii. olei rutacæ sextarios iiii. Vtere hoc ipso in uehementi-
bus doloribus: euacuatione tamen prius per clysterem facta, & post horæ spa-
tium mensuram unam mediocris poculi tepefactam infunde, quiescereq; iu-
be, ac aliquandiu pharmacum retinere; atque ita diuinam eius uidebis faculta-
tem. Aliud infusum, quod etiam causas euacuat, ac dolorem leuat, facit &
ad diurnam renum affectionem, & ad calculosos, eosq; qui inuoluntariè uri-
næ eijciunt. Allij capita magna tria, rutæ uiridis manipulares fasciculos duos;
olei dulcis lib. iiii. Allia decorticato, & cum ruta ac oleo donec torrefiât coqui-
to, atq; id ad prunas fumū non emittentes facito, ac deinde percolato, ad oleūq;
butyri lib. i. affundito, picis liquidæ sextarij italicij quartam partem, cedriæ tan-
tundem: unito, ac in uitreo uase recondito. Vsu autem expetente, sextantem
inde, aut minus iuxta ægri uires accipito, oleoq; & uino pari mensura acceptis,
ita ut totum hemina una fiat, cõmisceto, tepefactumq; infundito. Aliud in-
fusum. Olei cyprini lib. v. castorij sextuncem, antidoti regię quæ etiam tetra-
pharmacum appellatur, sextuncem: emplastri ex succis sextuncem, terebinthingi
sextuncem, butyri sextuncem, baccas lauri centum & unam, baccas allij magnas
quingaginta unam, cumini lati unciam unam, rutæ manipulum unum. Bac-
cas lauri & allia mundato: latum uero cuminum & rutam in pila tundito, & in
hemina una uini ueteris dulcis macerato. Sequenti uero die affuso oleo & bu-
tyro, in diplomate decoquito, percolato, ac reliqua ammisceto, pariterq; casto-
rium cum oleo tritum. Vtitor. Vbi uero usus postulauerit, pharmaci huius se-
xtantem accipito, & adipis anserini liquefacti itidem sextantem ammisceto, te-
pefactumq; inijcito. Infusum colicum admirandum. Fœni græci ac lini se-
minis æquales partes, quantum satis uidebitur accipito, & in aqua præmacera-
ta decoquito, atq; ubi succus inde prodierit, quantum ad usum satis uidebitur
percolato, ac in eo ipso quod percolaueris lanas succidas eluito, expressis que
lanis, ad aquam salem & oleum moderate adijcito, simul que unito, ac te-
pefacta infundito.

Cataplasma colicum: ex libris Seueri.

Cap. xxxiiii

Farinæ cicerum nigrorum, seminis brassicæ, farinæ sceni græci, singulorum
æquales partes decoque cum melle, oleoq; cyprino, modico uino affuso. Est
& alterum admirabile remedium, cuius efficaciam experimentum ipsum ap-
probauit. Accipit autem fœni græci partes ii. baccarum lauri contusarum,
mastiches chiæ, & terebinthinæ, singulorū partem unam. Coquitur cum uino
& melle. Epithema colicis, inflatis. Silphium plurimū cerato cyprino ex-
cipe, & impone. Ego uero, inquit Archigenes, etiā castorij paululū admisceo,
efficax

efficaciusq̄ redditur ad stomachi præsertim inflationes. Aliud epithema ad colicos, inflatos, coxendicum dolores, pleuriticos, ac stomachicos, & diuturnū uomitum cibi: attrahit etiā, ac duritiās emollit. Cerae, picis, resine pinus, adipis taurini, baccarum lauri: singulorum quincuncem, ammoniaci thymiamatis trientem, galbani quadrantem, piperis sesquiunciam, Aliqui etiā canchryos quadrantem, ammiq̄ tantundem coniiciunt. Aliud. Cerae libras 11, celtici nardi, floris iunci odorati, cassiæ, cyperi, cuiusq̄ sextantem, colophoniam libras 11, terebinthinæ sesquilibram, thuris, pyrethri, cuiusq̄ sesquiunciam, euphorbij unc. 1, costi drach. x x x. unguenti irini quātum suffecerit. Arida in uino rigata ac exsiccata contundito & cribrato, atq̄ ita liquefactis inspergito. Ad finem etiā opobalsami sextantem aut quadrantem ammisceto. Facit quæcūq̄ etiā polyarchion: maxime tamen inflatis conducit. Utendum quoq̄ ad colicos paulo mox subscripto polyarchio appellato, atq̄ eo quod ex bacis lauri cōstat, quod ad hydropicos describetur, & si qua his similia existunt. Propriè autem colicis conueniunt, inflammatisq̄ & inflatis, quod in epistolis Archigenis refertur, ex seminibus constans. Cerae drachmas centum, terebinthinæ drach. 1, ammoniaci thymiamatis drach. 1, opopanacis, iridis illyricæ, anisi, melliloti, nitri, adipis taurini, fœni græci, seminis apij, cuiusq̄ drach. x x v. mellis sexuncem, aceti cyathos duos. Arida contundito & cribrato, ammoniacum autem in aceto mulso per noctem unam maceratum reponito, postera die liquefibi lia feruefacito, in mortarioq̄ cum pistillo tusa commisceto. Hoc epithema hoc modo purum citra aliarum rerum admixtionem impositum, cutem exasperat, eisq̄ qui uitiosis humoribus amplius abundant serpiginosum pruritus excitat: quare in his qui teneriores carnes habent, ex cerato rosaceo quantum tibi fatis uidebitur pro curandi corporis ratione, ammisceto. Dropax etiā assidue super omnem uentris amplitudinem iniiciatur, atq̄ etiā super dorsum. Componatur autem is ex pice & resina, modica cera, sulphure, bitumine, māna, nitro, adarce. Intenditur autem usus eius si calidiori & non pinguefactæ cuticulæ admoueat, atq̄ etiā inter exercitia incumbere sinatur. Aliquando etiā balneum suscipiatur, ex nitro assato toto corpore large conserpo. Huiusmodi enim dropacis usus uiolētius adfectionē destruit, sicut & sinapismus & thapsigæ usus multis qui antea exquisita diata sunt usi, & per aluū, siquidē adstricta fuerint, sunt euacuat, affectionem omnem excidit. Porro dropacum & sinapismorum apparatus in tertio Sermonē sunt descripti. Aliud, Archigenis, uile quiddem, uerū ob efficacem ipsius lenitatem in precio habendum. Picis liquidæ libras 11, cerae sexuncem, sulphuris uiui, nitri, aluminis scissilis, cuiusq̄ quadrantem. Ad picem liquidam præcoctam usquequo non amplius inquinata maneat, ceram iniicito, qua liquefacta ab igne tollito, aridaq̄ tenuissime trita inspergito, unito, emollito, ac utitor. Flatus inferne educit, cutem uellicando iuncunde afficit, ac per omnia colicis auxiliatur. Prodest etiā coxendicum doloribus, & articulis refrigeratis, lieniq̄ indurato. Epithema ex bacis lauri, ad colicos. Cerae, colophoniam, picis siccæ, spumæ nitri albi, ammoniaci, cuiusq̄ dextantem, baccarum lauri decorticatarum sesquilibram, piperis sextantem & unciam dimidium, ammiq̄, canchryos, iridis, cuiusque sesquiunciam, galbani sesquiunciam, unguenti irini libram unam. Quod si canchrys non adsit, pyrethrum cōijce, & liquefacta cum siccis permisce. Hoc etiā approbat Oribasius. Polyarchion, quod in Alexandria præparatur. Cassiæ, amomi, rosarum, cyperi, cardamomi, spicæ nardi, nardi celticæ, solij, iridis, cenanthes, compo-

compositionis hedychroi, mastiches, croci, meliloti, succi absinthij, ammoniaci thymiamatis, aloës, bdellij, myrrhæ, cuiusque unc. i. xylocinamomi, piperis communis, helenij, styracis, cypheos, thuris, cuiusque sesquiunciam. Succos cum aridis committito, ammilcetoque xylobalsami scrup. xii, floris iunci odorati scrupulos xii, terebinthinæ sextantem, unguenti nardini bessem, rosacei lib. i, hederæ unc. xvi, opobalsami sextantem. Succulenta uino diluta terito. Polyarchion, quod dialemma, id est intermissio, appellatur: quod ipsum & in Alexandria præparatur. Castorij unc. i, piperis longi sesquiunciam, myrrhæ, opobalsami, hedychroi, foliorum malabathri, cassiæ, radicis panacis, spicæ nardi, cuiusque quadrantem, costi sextantem, amomi sextantem, cinamomi sesquiunciam, aut pro eo cassiæ quadrantem, floris iunci odorati trientem, croci sextantem, cyperi, cardamomi, iridis, aristolochiæ lōgæ, aristolochiæ rotundæ cuiusque sextantem, pyrethri trientem, ammoniaci thymiamatis quadrantem, aloës quadrantem, ceræ lib. iiii, terebinthinæ lib. iiii, resinæ trientem, unguenti nardini lib. iiii, quidam etiam styracis sextantem addunt, uini uero quantum omnino sufficit. Polyarchion multo experimento cognitum, quo confidenter ad omnes diuturnos frigidiores, præsertim circa uiscera morbos utaris: ego sanè eius usu semper clarus euasi. Styracis pinguis dextantem, foliorum malabathri sextantem unciam que dimidiam, malorum cotoneorum repurgatorum uncias xv, masuaphij uncias duas & dimidiam, spicæ nardi, croci, cuiusque sextantem dimidiamque unciam, micarum purarum dextantem, cypheos dextantem, cœnathes quincuncem, carpobalsami sesquiunciam, comæ absinthij unc. ii, & dimidiam, mastiches unc. ii, & dimidiam, careophylli unc. i, scrupulos vi, ammoniaci thymiamatis unc. xx, colophonis unc. xvi, opobalsami unc. xii, & dimidiam, olei gleucini deuncem, nardini dextantem, melini unc. xx, propolis dextantem, rosacei sextantem unciamque dimidiam, mellis cochlearia uiginti, terebinthinæ chiæ unc. xx, ceræ unc. xv, uini spathitæ quantum sufficit ad reliqua cum eo conterenda, & ad rigandas micas. Arida quidem omnia contundito & cribrato, mala uero cotonea concisa cum uino spathite coquito, ac per se terito, deinde ammoniacum & mastichen cum uino conterito. Styracem uero cum opobalsamo in altero mortario dissoluito, atque omnia trita ac dissoluta simul unito, liquefactisque que lique fieri possunt, & ab igne ablatis arida infarcito, ac donec refrigerentur agitato: deindeque ad ea que in mortario trita sunt adijcito, ac unito, adiecto etiam simul melle, post uero emollito ac optime subacto, tanquam ualde probato utitor.

Aliud epithema præter opinionem efficax ad omnes præcordiorum uetustissimas etiam affectiones, præsertim in stomacho ac uentre. Quibusdam etiam quibus aqua inter cutem iam suffundi incepit, profuit. Duritias enim in stomacho unice dissoluit, supra hoc quod uisceribus robur & firmitatem addit.

Compositio hoc modo habet. Resinæ pinus libras xx, ceræ libras quinque, terebinthinæ deunces duas, olei lentiscini uncias xvi, gleucini uncias xvi, thuris quincuncem, ladani quadrantem, ammoniaci thymiamatis, nardi celticæ, succi absinthij, mastiches, bdellij, cassiæ, cuiusque quincuncem, cardamomi, floris iunci odorati, iridis, balaustiorum, singulorum trientem, carpobalsami quadrantem, careophylli quadrantem, herbæ sabinae quadrantem, stactæ albæ quadrantem, piperis sextantem, suffimentorum subscriptorum libras iiii, cœnantharij quantum sufficit. Suffimentorum uero quæ ad huius epithematis compositionem coniunguntur, apparatus hic est. Liliorum alborum depuratorum lib. ii, styracis pinguis libras duas & dimidiam, folij lib. i, careo-

phylli

phylli trientem, costi trientem, spicæ nardi trientem, mastiches quincuncem, amomi sexuncem, onychum aromaticorum ustorum & extinctorum, opobalsami, singulorum bessem, carpobalsami sexuncem. Apparato ac redigito in pastillos, eisq; ad præscriptam compositionem utaris.

Quomodo aluum fluxione laborantem curare oporteat: ex libris

Philumeni.

Cap. xxxv

Aluus tum in febris, tum citra febres, fluxione laborat, maiori uero difficultate eorum qui febricitant cura perficitur, coniecturaq; exquisitior opus habet. In principio enim aliena à natura salubriter euacuare consuevit, ipsa uidelicet natura undiquaque ad superfluum & incommodum reiiciendum cogente, quemadmodum in febrilibus morbis frequenter fieri uidemus. Conuenit itaque rebus sic stantibus, aut usquequo natura omnem curam suam impendit expectare, aut ipsius etiam motus adiuuare. Etenim oblucri & excretionis cohibitionem moliri, maiorem morbum facit: siquidem quæ cohibentur sursum perlata dolores capitis, aut phrenitidas, aut lethargos, aut parotidas inferunt planè perniciosos. Quare in principio ea quæ in corporis commoditatem utiliter excernuntur, minime inhibere oportet. Postquam uero iam diutius perseverauerint fluxiones, non solum superflua euacuantes, uerum habitum ueluti colliquantes, uiresq; consumentes: tunc sanè resistere eis oportet, ut per ea quæ per os sumuntur, tum quæ per annum infunduntur, atq; ea quæ forinsecus imponuntur. Si itaq; biliosa pura recrementa prodierint, in magis salubria permutare ipsa oportet, non tamen per cohibitionem eos curare. Biliosum enim tum in uentre, tum in ieiuno intestino aggregatum, atq; post coacervationem retentum maximo opere lædet: nam & stomachum subuertit, & uisceribus inflammationes infert, & sitim accendit, & febres instaurat, omnesq; prædictas affectiones in capite efficit, atq; in totum grauiorem affectionem reddit. Lac igitur in tali incommoditate bubulum aut caprinum tepidum, recēs multum ac potatum auxiliatur, aut ad ignem decoctum, assidueq; agitatum, donec ad tertiam sit reductum: quod ipsum & per fluuiales silices, ferriq; laminas igni candefactas ac in lacte extinctas fieri potest. Ceterum in decoquendo superstantem coctionem siue spumam mystro aut pinna auferre oportet. Hoc enim nullum compendiosius remedium ad fluxiones biliosas reperire possis. Quandoquidem autem febricitantibus lac ipsum in nidorem aut etià acorem conuertitur, maiusq; nocumentum quam commoditatem inferre: tunc sanè in præfens ipsum exhibere uitabimus: aquæ uero quarta parte ad lac ipsum affusa, decoctionem faciemus donec dimidium totius consumatur, atq; hoc modo exhibebimus. Et hæc quidem ab biliosas fluxiones sufficiant: ad alias uero ubi sufficiens iam euacuatio sit facta, fluxioq; ipsa adhuc perseveret, irrigationes adhibeantur ex oleo omphacino, aut rosaceo, aut melino cum uino: efficacius autem his myrteum est, si uehementiori indigeat adstrictione, tertia aut quarta uini parte ei admixta. Quod si robustiora corpora contingant, gallæ, malicorium, compressi pilulæ, in ipsa irrigatione incoquantur. Cum inum etiam tritum lanæ couolutæ infarciatur, & apij similiter semen pari pondere: urinâ enim irritat, fluxionesq; ad intestina eò diuertit. Cæterum & sedes ipsa ex decocto quopiam prædictorum adstringentium foueatur. Perseuerante autem adhuc fluxione, etiam cataplasmatibus ex palmis & acaciâ & alumine erit utendum: ceratis item ex oleo myrteo apparatus. Conueniunt quoque emplastra ex eadem materia apparatus. Parabile uero & efficax hocce est, Mora præ immaturitate acer-

acerbiora, & albicantia, septem accipe, probeq; contere: deinde ceratum ex oleo omphacino apparatus, ita ut ceræ in eo uncia sit, olei uero sextans, adijce, uni, & utere. Idem faciunt cruda mora exsiccata cum ouo trita ac illita. Porro inueterata iam affectioni epithema ex oenanthe conuenit: & ex micis emplastrum in stomachicis descriptum, quod spumam argenti & cerusam admixtam haberet: reliqua quæ in sermone de cœliaca affectione describentur. In potu uero accepta uentris fluxus, post sufficiens in utilium euacuationem, sanant: capilli ueneris decoctum, paliuri folia, uinacei uue triti, spica nardi, spinæ albæ radix, quin & cœliacis & stomachicis eadem opitulantur. Mora etiam immatura & adhuc acerba ad solem pluribus diebus desiccata, deinde trita & repolita, usq; expetente bibita, magnum pharmacum alui restrictiuum fiunt, ut ad diuturnas etiam cœliacas affectiones cōmode exhibeantur, aliasq; omnes quæ fluidæ existunt, atq; etiam dysenterias. Contunduntur quoq; & obsonijs amiscuntur, quemadmodum rhus culinarijs cōsueuit. Magis tamen alui cohibent rubi mora immatura & acerba eodē modo exsiccata, & in potu exhibita. Illitione autem optima ad fluidam aluum eiusmodi utaris. Acaciæ, mastiches, oenantes, cuiusq; æquales partes accipe, ac unūquodq; per se cōtere, deindeq; permisce, ac sicca adserua. Necessitate uero exigente ouo subacta aluo illinito, fasciculumq; lanæ purpureæ imposito & obligato. Malo uero adhuc perdurante, etiam dorsum inde illinito.

Cura eorum qui ex debilitate alui fluxione laborant:

ex libris Galeni.

Cap. XXXVI

Vnum quodq; membrum propria actione perfungitur, quum temperamentum suum iuxta naturam adseruat. Seruabitur autem temperamentum, si refrigeremus ubi ad caliditatem fuerit diuersum: contraq; calefaciamus refrigeratum: humectemus uero exsiccatum, & rursus desiccemus humectū. Iuxtaq; eandem proportionem etiam tractemus eos, qui ex harum intemperierū complexu & coniugatione afficiuntur. Oportet enim semper excessui contrarium opponere, usquequo ad moderationem, & in id quod iuxta naturam habet, membrum ipsum reducat. Ratione igitur edoctus sum etiam octo differentias curationis imbecilli uentris esse. Calidæ intemperiei cura. Vidisti namq; & tu ipse aliquos quidem per diem unam, quosdam autem ampliori spatium, frigidæ potu curatos: quorum aliquibus non solum recentem frigidam fontanam exhibui, sed etiam coctam & postea niue adobrutam & refrigeratam. Edulia etiam hoc modo refrigerata eos accipere, uidisti me concedentem: maxime si a plurima caliditate uexarentur. Dedi autem & lactis spumam similiter refrigeratam, & frigida iuxta ipsorum uires poma eodem modo refrigerata: pitifanam quoq; citra salis aut alterius rei admixtionem probe coctam, aliaq; eius generis infinita: unicum scopum refrigerandi propositum habens. Prohibui autem ne absinthium aut aliqua adstringentia contingerent. Frigidæ intemperiei cura. Alios autem ex frigida intemperie laborantes, similiter adstringentium usu prohibui, omnibus uero modis calefeci: uino ueteri facultatis plurimum calidæ exhibito: itemq; cibis calefacientibus cum pipere.

Humidæ intemperiei curatio. Quibusdam uero humidam uentris intemperiem habentibus, medicationis scopum in exsiccando feci, dedi q; eis edulia ex natura sicca: carnes probe assatas, & paucum potum: omniumq; adstringentium usus his convenientissimus existit, in quibus enim humiditas multa ac uoluti mador circa affectum membrum adest, citra tamen humorum uitiationē,

Y ita

ita ut quantitatis tantum excessu adfligant, ac ueluti perstillantem ipsum uentre reddant: in his commodissimus existit ciborum ac potuum, itemque pharmacorum adstringentium usus: exoluto nimirum ac languido tunc facto aegroti membro. Cura uentris ob siccitatem immodice fluidi. Alium autem siccissimum iam factum, ut tabidis similimam figuram haberet, in contrarium omnino habitum deductum curavi. Huic quum in principio exigua intemperie uexaretur, a siccitate uidelicet humectatione indigente, medici qui eum curandum susceperant, absinthium bibendum dederunt: malaque cotonea, ac similia in cibo, extrinsecusque similiter adstringentia adhibuerunt, atque hoc modo totum aridum hominem reddiderunt. Hunc ipsum nos curauimus uniuerso corpore eius omnibus modis humectato. Qualis autem est senectus in sanis, talis est sicca intemperies in aegris: ut etiam incurabilis existat, ubi perfecte complectatur. Perfectum autem complementum in hoc est, si solida substantia simularium corpori aridior fiat. Est autem & altera quaedam siccitas eorum corporum, quae ex substantia humore compacta constant, uelut est caro & pinguedo. Alia etiam tertia siccitas est, quam humiditas ex qua membra connutriuntur est deperdita. Circumfunditur autem ea ipsa humiditas circa omnes animantis partes, instar rosis in ipsis dispersa, quam impossibile est ipsis membris apponere citra nutrimentum: quare difficilima omnium huius affectionis cura existit. Alia autem siccitas est, quae circa paruas arterias ac uenas cuiusque membro proprias consistit: haec ipsa ob sanguinis penuriam contingit. Omnes uero has siccitatis species extreme offendunt austerorum ciborum ac potuum pharmacorumque exhibitiones. Consumunt enim etiam si quid in ipsis innati ac insiti humoris relinquatur, partim quidem exhaurientes, partim uero exprimentes per meatus in interiorum latitudinem alui, partim etiam ad alia membra depellentes. Curare igitur has siccitates conuenit, tum conclusos meatus laxando, tum quod ad circuitum partes depulsum est attrahendo, per humectantemque cibum unumquodque simile membrum propria humiditate replendo: quemadmodum nos arefactum penitus a medicis hominem curauimus. Balneum itaque temperatissimum his conuenit: ita ut aeger aliquandiu in temperata aqua moretur. Praestat autem prope exteriores balnei fores calidam solum locari: neque enim aere omnino adiposum digemus. Oportet etiam gestando ipsum in balneum inducere, atque inde educere. Deinde ex oleo antequam induatur inungere. A balneo uero statim lac alinum recens multum exhibendum, asina in domum in qua decumbit aeger deducta: paucissimo enim tempore in ambiente aere lac ipsum morari oportet. Parum etiam mellis optimi tepidi lacti ammiscendum, atque ita usque ad secundum balneum quiescendum. Postea uero mediocriter & accurate fricatum, secundo lauabimus diligenti coniectura, tum ex ructibus, tum ex uentris tumore facta, an exhibitus cibus sit rite confectus: modicum uero tempus a primo balneo usque ad secundum intercedat, horarum IIII, aut V, puto, maxime si tertio etiam ipsum lauare uelis: id si non uelis, non refert etiam plurimum. Lauabis autem tertio si adfuetus sit balneis plurimis uti: & hoc sane minime negligamus, quo a singulis balneis priusquam induatur, oleo eum inungamus. Ceterum si lactis usu delectetur, etiam a secundo balneo ipsum propinabimus: si uero non, ptisanam probe decoctam, aut halicam instar ptisanae decoctam dabimus, indeque statim rursus quiescere iussum, postea ad tertium balneum ducemus: aut contra, ad cenam si lauare non uelit, Panis ei praeparetur clibanites, purus, recens, probe assatus, fermentum & salem mediocriter admixta habens, Pro obsonio sit piscium quicquid pe-

petrolis aquis degentiū, aut asellus ex iure albo. Atqui & alæ & testiculi gallina-
 ceorum lacte nutritorū conueniunt: perdices item ac passeris montani ac mol-
 les carnes habentes. Verū quæ in palustribus ac fluminibus degunt uitāda: om-
 niaq̃ duras habētia carnes, et graueolentia, pinguiāq̃ & fibris referta: et ut sum-
 matim dicam, caput cibi sit ut bene nutriat, & facile concoquatur, minimeq̃ ui-
 scosus sit, neq̃ superfluitatib. abūdet. In potuumat uinum albū colore, tenueq̃
 substantia, & modice omnino adstringens, purūq̃ & parum aquæ ferens, quo
 nomine accipi uolo, id quod quū temperatur modicā omnino aquæ admixtio-
 nem perferre potest. Scopus autem quantatis potus in hoc sit propositus, ut nū-
 quam uentriculo innatet, neq̃ fluctuationis aliquem sensum faciat. In cibis ue-
 ro spectetur, ut quantum possibile sit, uentrem non grauent, celeriter conco-
 quantur, et inflationem non pariant. Atq̃ hoc sanē modo maxima corporis sic-
 citas curatur. Quū uero mediocris siccitas existit, utpote quū uires non extre-
 me sunt collapsæ, pleniorē diætā sufficere expedit. Proponatur autē siccitas si-
 milis quidem predictæ cum qua tamen frigiditas sit coniugata, intantum igitur
 predictis ex calefacientium sylua miscbimus, quantū membra fuerint refrige-
 rata. Ponatur autem primū mediocriter ipsa esse refrigerata, apponemus itaq̃
 paulo antē dictis, in lactis quidē usu plus mellis: in uini uero usu, idē quidem ge-
 nere dabimus, minus autē priore aquosum, et plurimum annorum. Cæterum et
 edulia omnia calidiora exhibenda, nō solum ex naturali temperatura, sed à re-
 centi etiam qualitate. Ex unguento etiam nardino assidue uētre inungemus
 ut nunquam aridus fiat: si uero nardinum non adsit, mastichino erit utendum.
 Sed et ipsam mastichen cum nardino unguento terere licebit, lanamq̃ purpu-
 ream ex eis imbutā uentri adhibere. Si uero frigiditas multa intēperici sicce co-
 puletur, ut coget ferē ad uberius calefaciendum, primum quidem affectionem
 grauissimam esse scito, & quæ difficulter corrigi potest, multaq̃ diligentia opus
 habet. Vbi uero ipse usi fuerimus, quæ ad mediocrem frigiditatem sunt descri-
 pta, speramus sanē quamquam longiori temporis tractu nos affectionem sana-
 tuos: ita tamen ut à uehementer calefacientibus abstinemus. Demus autem
 amplius quiddā ex melle despumato unā cū lacte, atq̃ etiā ipsum per se amplio-
 ri modo: itemq̃ decoctum ac in pastillos redactum. Vinum uero uetustius eis
 eligendum. Optimum autē pharmacum in omnibus his quo frequenter pica-
 tores utuntur, existit. Eo itaq̃ uniuersum uētre illinire oportet, atq̃ mox pri-
 us quam refrigerescat auellere: uerum hoc non sæpe in die, quorundam more, fa-
 cere oportet. Discutit enim hoc modo, non uero bono sanguine membrum ip-
 sum replet: nos autem non discutiendi gratia, sed ob sanguinem bonum ex ui-
 cinis partibus attrahendum, eius usum approbamus. Auxiliatur etiā omnibus
 his puellis carnosus dormientibus acclinatus, ita ut superiorem uentrem sem-
 per contingat. Quod si ex ordine multæ siccitati caliditas non ualde multa mi-
 sceatur: in hac primam uictus rationem seruabimus: ita ut mel prorsum nō gi-
 stent: uinum uero minime uetus accipiant, quod sit album et tenue, & etate an-
 num non excedat. Edulia etiam tepida exhibebimus quæ lactosa, hoc est lactei
 teporis appellantur, si hyems adsit: in æstate uero, uelut aquæ fontanæ conue-
 niūt edulia, quæ nō summe frigida sunt. Ventrē quoq̃ omphacino aut melino
 oleo illinemus. Si uero maior caliditas adsit, etiā dilutiorem uini temperaturā
 faciemus, frigidumq̃ dabimus, quemadmodū fontana aqua in medio uere ef-
 se solet. Nolle tamen operæ pretium est febrium similem hanc affectionem ef-
 se, atq̃ si quis contentiosius eos refrigeret periculo non uacare.

De coeliaca affectione, Archigenis.

Cap. xxxvii

Non omnis uentris fluxus coeliaca affectio proprie appellatur: neque enim si cibi crudi & incocti inferne prodeunt, neque si corrupti ac in peregrinum habitum mutati sunt, coeliaca affectio uocatur: uerum tunc solum quum leuia & humecta excrementa egeruntur: uentre prae imbecillitate ea digerere nequeunt. Sequitur autem ipsos assidua egestio, aliquando foetida cum animi deliquio sensu, aliquando uero etiam sanguis flauus ac tenuis una cum his quae egeruntur destillat: & ob eam causam cibum auersantur, decoloresque & uehementer graues fiunt, corrugata insuper eorum uniuersa cute: & uenae sane quae in uentrem deferuntur, liuescunt: et ad magnam omnino desperationem res deuenit, si morbus diutius duret, aegris ad conuenientem dietam pigrescentibus. Si itaque morbus autumnio incipiens ad hyemem usque se extendat, difficilius omnino curatur. Causae autem affectionis sunt, assidua cibi corruptiones, & peregrinorum eduliorum ingestiones: amplius autem si frigiditas aut uehemens ardor insistat, similiter etiam plagae uentrem laedunt: & in morbis quoque longis, uenter male affectus adfectioni huic obnoxius fit. A medicina quoque purgantis potione quidam coeliacam affectionem inciderunt. Nosse tamen oportet, quod aliquando quidem per circuitus malum hoc adfligit, temporibus quibusdam alio resitante, quibusdam uero ordinate per certas horas fluente: aliquando uero incessanter apparet. Quin & hoc nosse oportet, quod sepe non solum perit appetitus, uerum etiam amplius augetur: & ob id corruptionibus acerbioribus uatim perque uices factis, omnia mala augetur. Recente igitur morbo, siue igitur corruptiones praecesserint, cauendum ne amplius fiat, simulque uitioli humores ex eis generati euacuandi: siue peregrinorum eduliorum ingestio causa existat, ea ipsa auferre oportet: siue labor, aut fatigatio, aut aliud quippiam ex praedictis, ab eis similiter abstinendum est, aegrique in quiete adseruandi, atque si ferre queant, in inedia, aut certe omnino modico cibi usu. Aliquando autem etiam larga potione utendum, aegerque ad reuocandum cogendus, maxime si humores in uentre collectos perceptemus. Deinde attente exquisita diata insistentum, donec affectio in totum tollatur. Consistit autem exquisita diata in electione qualitatis ciborum. Quod si tamen in principio difficilis appareat morbus, etiam reliquis praesidijs utendum. Primum igitur media inspicienda sunt, atque si inflammatio, aut similis inflammationi dispositio circa uentrem reperitur, cataplasmatum utendum est, quae ex professo inflammationem solunt, ac fluxus retrahunt: quae in re, palmae commode semini lini ammiscuntur. Caeterum cataplasmata ipsa minime calida apponere oportet: sed tepida saltem: atque si intendere eorum uim uelis, acaciae quippiam & hypocisthidis, aut malorum cotoneorum, aut aluminis recte ammiscueris. Magnifice autem profunt lentiscus & rubus simul cocta: acetum quoque mulsum apposite in cataplasmatum cocturam assumitur. Summe uero commodam utrique affectioni nouimus loliaceam farinam simul cum eis incoctam. Inflatione autem plurima infestante, cuminum aceto mulso inspergimus, rutaeque & anethum. Manifestum est autem quod ad cataplasmatum retentionem, quo contentius inhareant, etiam rosaceum adhibemus, ac parum uini: ampliusque lentiscinum, aut oenanthinum, aut myrsinum. Oportet autem lana excepta ipsa imponere. Caeterum optimum ad ipsos tale cataplasma existit: Malis maxime cotoneis & palmis, absinthijque coma in uino decoctis, uinum ipsum percolatur, ac sapae creticae tertia pars ei affunditur. deinde

deinde simul calefactis polēta tenuis inspergitur, & absq; oleo decoquitur. Oleum vero quo uenter stillinitur sit melinum. Post cataplasmata conueniēt ceratū ex myrsinino aut lentiscino oleo apparata: quæ tamē ex adstringentibus quædam habeant admixta, ex acacia dico, & quæ eius generis existunt. Aptissimū etiam his ceratū est ex oleo myrsinino apparatus, quod mora immatura ac acerba trita, parumq; sanguinariæ habet admixta. Porro ubi diuturnū fuerit malum etiam ad malagmata transeundum est: summopere uero concinnum eis uidetur, quod ex seminibus constat, & ad colicos est præscriptum: itemq; quod ex lauri baccis, quod ad aquam inter cutem describetur. Postea etiam adhibenda ea quæ uehementer rubefaciunt cutem. Quod si adfectio adhuc intendatur, etiam dropaces adhibendi medicamentaria uel præcellentes, bitumenq; habentes & adarcen: post dropacem uero, morsum balneo secundum caliditatē mor daciore curare oportet: duabusq; post dropacis amotionem horis sinapismi adhibēdi ex sinapi & caricis: ita ut modico tempore impositos sinamus, oleoq; inde ad locum circumfuso, ad balneum ducamus. Atq; id semel facere non sufficit, sed bis ac ter, neq; enim hoc ipso aliud efficacius remedium in prædicta corporis constitutione apparari potest: & ob hoc non multo tempore inharere id oportet, ne loco nimium exusto, secunda & tertia huius præsidij admotio prohibeatur. Mirabiliter etiā uomitus efficaces sunt, tum à cœna, tum ieiunio facti, nimirum quæ corrupta sunt euacuantes, & quæ ad intestina dilapsa sunt attrahentes & cōuerrentes, ac proprias uentris actiones reuocantes. Si uero liceret ab his ad eos qui à raphanis sunt transire, maiore compendio affectio ipsa expugnaretur. Quidam etiam ueratri albi purgatione usi sunt: et si subiectæ uires eius auxiliij sint capaces, præ omnib; huius usus eligatur. Ego uero ad coeliacos prius quàm uires extreme deficiant, purgatione humori cōuenienti utor. Aliquando autē medicati quidam et acres, aut etiā serosi humores tunículis uentris aut magis intestinorū infarti aut imbibiti rodunt et irritant, atq; ex omni corpore humores ad locos circa uentrem & intestina aduocant, diuturnarūq; fluxionum causa fiunt. Caterū ex egestis recrementis & ex cōsequentibus accessionibus, assilgentis humoris speciē coniectare oportet, atq; ita cōuenientē exhibere purgationē. Præstabilius tamen est picræ ex aloë cōpositioni scammoniaæ scrupulum i, aut amplius si uires tolerent, ammiscere, & cum aqua multa præbere. Quod si ex atra bile sit humor infestans, epithymū adijcere oportet, & post assilgentis humoris euacuationem, eis uti, quæ affectis mēbris firmitatem adde repossunt: cuius generis sunt ex malo punico eclegmata, ad stomachi subuersiones descripta. Illud etiā notatū dignum, quod aliquib; fluxiones ex adstringentiū usu oboriuntur: uētre nimirum ab ipsis læso propter imbecillitatem aut mollietatem sensus. Vtimur autē, inquit Archigenes, ad alui fluxiones hiera mea, dra. i. ex ea exhibitis, ad eorū quæ in uentre ac intestinis insident deterfionem, ut nullū enī aliud hæc ipsa quàm rectissime emendat et corrigit, deinde theriaca uitor. Vtor etiam, inquit, zopyrio mea ad colicos descripta, ad fabæ magnitudinem ex ea præbēs cum duobus cyathis passi ueteris, aut aceti mulsi boni paulo antè horam cibi sumendū, ad dies ex ordine x. deinde ubi ab eius exhibitio ne per v. dies quie uero, rursus exhibeo ad dies x., atq; hoc tādū facio donec nō amplius opus habeat ager. Præstat etiā exhibere quæ ex duob; piperis generibus cōstat compositionē. Omnino igitur simplicia pharmaca & facile digestibiles cibos exhibere oportet debili existente aluo. Si uero febricitent etiam, eo magis adstringentiū sylvia erit uitāda. Quod si tamē prædicta remedia circa affe

ctionis solutionē nihil efficiant, ustio adsumatur. Perurere autē superiorem uentrem oportet, interuallis duorū digitorum mensū aut ampliorib. etiā factis ulcerationesq; seruare ad multū tempus ad fluxionū in uentre transitū ac deriuationem. Licet autē & per pharmacū crustas infligere, si quis ignis admotionem formidet. Postremum quidem igitur locū inter prædicta remedia ustio habet, propter nimiam seueritatē: si quis tamen uirili animo præditus sit, prius quā concidant uires, post præsidiorum firmitatem addentium usum, quodam modo uisione uti potest, quæ sola se affectionis difficultati opponere cōsueuit. Atq; huiusmodi quidem est quæ forinsecus cœliacis adhibetur cura. Operæ precium est autem & per adstringentes potus auxilium ferre, ubi humiditas imbecillitatis causa existat ac fluxionū. Plantaginis itaq; semen siccum tritum ac potatū præclare facit, tum per se, tum alijs etiā admixtis. Quidam etiam gallinarum uentriculis utuntur exiccatis ac tritis potui inspersis. Eandem efficaciam & strutho camelorum uentriculi habere creduntur. Proderit & lapathi semen tritum, maxime uero oxylapathi. Cornu item cerui tenerrimum ustum cum modica galla præbe bibendum: aut nucum iuglandium corticem quo tinctores utuntur, siccum tritum cochlearij mensura ex aqua præbe: aut quercinam glādem contusam ac cribratā cochlearij mēsurā instar farinæ uino austero insperge, ac exhibe: aut cancri marini uel fluuiatilis testam ustam cochlearij mēsurā præbe cū aqua: aut thuris granum fabæ magnitudine in uini nigri cyatho uno dissolutum, sanguinariæ succo parī mēsurā ammixto præbe, aut gummis albi uermiculati unciam unam tritam ex uini nigri cyathis tribus præbe: aut uuarum pasfarum uinaceos, siue etiam uuarum torrefactos, exhibe cum polenta aut canis sterco siccum, cum quodam odorato: aut plantaginem siccam contusam ac cribratam dato: aut bituminis quantū satis esse existimas deglutendum præbe. Bonum est etiā corticis quercinæ glandis decoctum: itemq; pelliculæ decoctum, quæ sub cortice quercus reperitur. Castaneæ corticis decoctum, aspalathi decoctum, radicis pgoniæ decoctum, atque ipsa etiam radix sicca, trita: potui inspersa. Corticis loti arboris decoctum. Calicum item papaueris torrefactorum drachma una ante somnum cum uino diluto potata, quin & semen capiti papaueris tritum exhibitum egregie auxiliatur. Mirabiliter autem acerba & immatura mora profunt sicca trita in potu exhibita: quemadmodum de alui fluxione est prædictum, eodem modo & rubi mora immatura & acerba exhibenda. Utendum & simplicioribus ad dysentericos descriptis medicamentis, maxime his quæ ex pomis sunt adparata. Cōmoda sunt quoq; ea quæ urinam cient, fluxionem sepe transferentia: uelut est, apium, sceniculum, anisum, adiantum, acorus, damasonij foliorum dra. i. & quæ his potestate assimilantur. Ex compositis prodest pastillus Thrasyandri, & qui ex seminibus constat, ad dysentericos scripti. Pastillus item ex spina, & ex electro, ad sanguinem per sputum reiiciētes descripti. Omnium uero maxime antidotus theriace ex uiperis cōstans prodest: multoq; adhuc magis quæ Esdræ inscribitur, efficaciter enim auxiliatur. Mirifice quoq; cœliacis conducit antidotus desposynos appellata: cuius cōpositio hæc est. Spicæ nardi, cinamomi, piperis, costi, hyscyami, croci, seminis papaueris, opij, omnia æquali pondere accipito, cōrundito et cribrato, ac cū melle unito. Datur ex ea duorū scrupulorū pondus ex uino. Oris balsam, ad cœliacos. Baccarū myrti nigrarum cochleare unū & dimidium, rosarum siccarum, cōnāthes, singulorum cochleariū dimidium, palmarū carne sufficiens excipe, & pastillos informa, ac exhibe drac. i. cum aqua, aut uino diluto.

us temperato his qui febribus carent. Aliud, ad coeliacos. Lauri uirgulta
 III. piperis grana XXXIII. cumini grana quinquaginta unum, contere, ac præ-
 be febre carentibus cum uino, febricitantibus cum aqua, pro una autem uice hæc
 in potu sumuntur. Cæterum simplicia et antidoti oportune ante cibum exhibe-
 tur. Pastillus autem dolorem leuans, ante somnum. Malagmate uero concocto-
 rio in alui fluore per omnia, huiusmodi utaris. Bdellij ammoniaci thymiamas-
 tis, canchryos, cuiusque sesquiunciam, opopanacis dra. VI. styracis dra. VI. myr-
 rhæ sesquidrachmam, piperis grana centum & triginta, galbani dra. VII. tere-
 binthinæ dra. VII. ceræ drach. tredecim & dimidiam, adipis suilli drach. XVI.
 Siccissima conterito & cribrato; molliora uero in pila tundito, ac sicca insper-
 gito: pila itemque pistillo ex unguento irino illitis, ut molle ad tactum & glutinò-
 sum reddatur. Vermes autem terreni in testa ad cinerem exusti, & ieiunis cum
 uino exhibiti, uentris fluxiones sistunt: eorum itaque tres aut quinque exhibeto.
 Porro cognitu dignissimum & hoc est: infinita scilicet remedia hoc nomine præ-
 dicata esse, quod aluum sistere possint: uerum seri profectus est omnium memi-
 nisse: & cauendum etiam ne nimium largus fiat eorum usus: quanquam pluri-
 mi omnino morbi ab aceruata pharmacorum uicissitudine delentur, qui alias
 non facile hominem relinquunt, si diæta solum exquisita utatur. Vna autem tutis-
 sima & cõpendiosissima uia ad affectionis extirpationem diæta existit. Diæta
 coeliacorum. Coeliacum oportet mox ubi a somno surrexerit, faciemque proluerit, ad
 deambulationem prodire, ita ut pro uiribus progrediat. Deinde frictionem simpli-
 ciorem adhibere, parce uidelicet & minime cõtente fricando maxime uentrẽ.
 oleo uero quo confricatur, canchry et pyretrum incoquantur, quo postea deter-
 so, corpus ex oleo dulci impinguetur. Balneo autem ut plurimum renunciamus,
 aliquando tamen ad lassitudinis uel alicuius alterius rei medelam ipso utimur. In
 balneo uero simegmate quopiam utatur, quod cutem lancinare ac pertundere po-
 test, uelut est nitrum assatum, fex uini usta, et quæ eius generis existunt. Ab in-
 unctionibus & balneo prandendum est: perspicendum uero si quicquam aliud
 ut cibum diuidamus. Duas itaque tertias partes cibi in coenâ referuet, atque ipsum
 etiam qui in prandio exhibetur panem dimidiatum per se sumat: reliquum uero
 cum obsonio simplici. Frumentaceum enim alimentum naturæ homini maxi-
 me conuenientis existit. Oleribus autem raro uestatur: inflationes enim pa-
 riunt, minime apti sunt etiam omnes arborum fructus, insuauibus humo-
 ribus uentrem & stomachum replentes. Cæterum a prandio deambulatio-
 nibus indulgendum, & animi aliqua laxamenta adhibenda, somni enim
 diurni nocentissimi sunt, nisi lassationis sensus adsit, aut nox uigilata præ-
 cessit: uesper autem a coena dormiat. Ex frumentaceis igitur conueniunt pa-
 nis clibanites, halica, oryza: uerum sorbitiones ex milio non probo, quum
 non inepta est lenticula assata, & cum plantagine cocta: utile est & palmas
 concoctu difficiles & uitiosos humores milium producat. Ex leguminibus
 sorbitionibus incoquere, malaque cotonea, eisque simili uiprædita. Ex o-
 leribus brassica eligatur duabus aquis decocta, cum oleo ac modico garo: pau-
 cissimoque aceto: intubus item coctus & cichorium, pastinacæque ualde ex-
 hibendæ, ex gallinis, columbis, aut passerculis montanis, ex pedestribus etiã
 tenerimæ & friabiliore coctæ omnes, concoctis simul quibusdam fructibus
 aut pomis, aut myrri baccis. Bellaria modice præbenda, uelut sunt amygdæ
 la, palmae, nuces, atque ea uoluptatis gratia tantum ac dulcoris degustanda. Fructus
 sint

sint minime inflantes: uua modica pensilis: in pomis ac piris similibusq; medio critas seruanda, atq; hi ipsi cum pane exhibendi. Vinū conuenit subadstringens. Omnis autem liquor qui in potu exhibetur paucus sit, & post omnem cibū praebeatur. Multus enim potus uentris fluxionibus infensissimus existit. Nosse tamen oportet quod in his qui cum mordacitate fluxionibus infestantur, optime facit lactis potus: ita ut in principio calidum ac recens mulctum detur: postea uero ad medietatem decoctum aut etiam ad tertias quemadmodum in alui profluuiō est praedictum. Hoc enim modo exhibitū simul sistit ac temperat fluxiones. Ceterum in quibus lac ipsum in nidorofam aut acidam qualitatem permutatur, quartam partem aquae affundito, praedictioque modo decoquito, ac exhibeto.

De colliquatione.

Cap. xxxviii

Quum uero per uentrem quiddam excernitur, quod non ab accepto cibo aut potu prodit, sed ab humoribus ex corpore in uentrem defluentibus, assimilaturq; ei quae tum per uomitum reijcitur, tum inferne procedit. Flauebilis: differt autem ab ea tum graueolentia, tum quod flauis quodam modo excrementum apparet, strigmentitiamq; crassitudinem habet, aliquando uero & oleosum aut adiposum existit: Colliquatio morbus is & syntexis uocatur. Recens enim compacta substantia pinguedinis ac carnis ab ardenti febre resoluitur & colliquatur. Diutius uero perseverante malo, ex ipsis etiam solidis partibus aliquid colliquescit. In qua pessima febricula frigida purissima frequenter remedio existit: eiusdem etiam qualitatis cataplasmata & epithemata adpetus & praecordia adhibere oportet: cibi quoque refrigerantes exhibendi: reliqua q; quemadmodum in estuantibus, ac in habitum conuersis febris diuersa est, facienda. Quod si in uiscerum inflammatione hoc contingat, ualde periculosa adfectio est, & cum praedictione remedijs praedictis uti oportet. Porro si acris sit ac mordax quod excernitur, intestina q; inde ignescant, mordacitatem lenire oportet per infusiones, ubi urgeat malum, nullo exacerbationum respectu habito, praeter quam circa initium accessionis. Infundatur aut succus oryzae ad tactū tepidioris, itemq; lac tepens. Si uero mordacitas cum tormine contingat, pituitae succus infundendus est cum ouis crudis ac conquassatis: admixto rosaceo, aliquando uero bituminis etiā dra, i. ammiscenda. Quod si dolor adhuc perseueret, bis ac ter etiam praedicta infundantur. Conuenit quoq; his lac potatum, ad quod quarta aequa pars est affusa, quemadmodum dictum est, decoctio ne ad tertias facta.

De lumbricis: ex Herodoto.

Cap. xxxix

Lumbrici & in febris, & citra febres nascuntur, tum multitudine, tum magnitudine, tum colore, tum temporibus etiā differētes. Circa initia enim morborum generati, substantiam suam ex subiacente corruptione capiunt: circa uigorem uero ex malitia morbi: circa declinationem autem ex permutatione omnium in melius, qui sanē citius separantur: natura enim ipsos, reliquorum excrementorum instar, foras propellit. Censentur autem peiores ex ipsis maiores minoribus paucis multi, & albis rubri. Viuentes etiam mortuis deteriores. In infantibus autem & pueris, atque his qui ad pubertatem accedunt maxime abundant: Ceterum hoc malo affectos incredibilis morfus stomachi ac uentris concomitatur, tussiculæq; tenuissimæ ac frequenter irritantes, quum tamē nihil reijciatur. In somno tremūt, & praeter rationem exurgunt. Quidā uero et linguā foras protrudūt, oculosq; claudūt, ac taciturni sunt, excitatesq; moleste ferunt.

ferunt, ob imbecillitatem uigilare nequeunt. Quidam autem oculos sanguine suffusos habent, & pulsum inaequalem, obscurum, deficientem & recurrentem. Quibusdam etiam appetitus perditio accedit. Pueris insuper dum dormiunt manducatio linguae, cum exertione, cui accedit conformatio oris in modum lactentium aut accipientium cibum: uerum haec pauco tempore & per intervalla fiunt. Aliqui uero infantes cum clamore praeter rationem exurgunt, citoque rursus collabuntur. Aliqui etiam dentibus frendunt: quod contingere uerissimile est, animalculis attrahentibus cibum, mordentibusque uentrem ac intestina. Iam uero & ad stomachum quosdam processisse constat, nausearumque & morbum fuisse causas. Saepae etiam per se sursum reieciuntur: aliquando uero cum pituitoso quopiam humore. Quidam etiam infantes neglecti motu pulsus destituitur, ac refrigerantur, atque eorum instar qui animo liquuntur, tenuem quandam ac frigidum sudorem exudant, & ut plurimum liuescunt. Contingit autem aliquando faciem fieri rubicundam, maxime circa malas: uerum color hic rursus in pallorem solito maiorem transit. Alij autem instar delirantium peregrina in somnis loquuntur. Alij decubitu transmutant continue dormientes, angoreque uexantur, ex locoque ad locum sese uicissim proieciunt. Verum paucos omnino ex ipsis morbum confiteri constat. Plerique enim in mentis inopia ac taciturnitate degunt. Porro qui a rotundis lumbricis infestantur, etiam cibum auerfantur, & si quid acceperint reuomunt, aut nauseabundi uix deglutire possunt: febres in eos cum uehementi extremarum partium refrigeratione irruunt. Quibusdam autem uenter ad tympani modum inflatur. Ex Hippocrate. Lumbrici circa aluum his signis deprehenduntur: si somnolenti sint non permittente morbo, & extremae partes frigidae, & cordis siue oris uentriculi dolor, urinae conturbatae, & lingua humectatur. Item qui animalculis in uentriculo abundant, sputo replentur: & si tenuis quispiam prodierit lumbriculus, amplius non spuunt. Quicumque igitur in ore uentriculi lumbricos habent, ferè in totum ipsos uomitu reieciunt. Quibus uero in intestinis insunt, ipsos infernè excernunt. Omnes autem nauseabundi sunt, uomuntque quaecumque acceperunt. His qui punguntur similes sunt: totoque corpore contrahuntur, et repente acuatimque mouentur, ac tormina accusant, interaneorumque dolores. Euaporationes quoque ad caput delatae, uertigines inducunt. Quin & diata quae praecessit, ostendet tibi lumbricorum generationem: ex crassioribus nimirum & quae difficulter conficiuntur, et largius ingestis, & maxime frumentaceis, contingentem: quos item balneis a cibo usos fuisse comperies. Ceterum cura ipsorum, alia communis est, & cum ea quae febricitantibus conuenit coincidens. Alia uero eis proprie conducit. Quum igitur ambigua adhuc affectio existit, & rationalis quidem suspicio adest, incerta tamen, neque planè comperita: mitioribus sanè remedijs uti oportet. Ab acrioribus enim febres magis exacuuntur, si adfectionem falsò habuerimus suspectam, ubi uero constans ac euidentis cognitio contigerit, ad tempora morbi animū intendere oportet. Ad eos enim qui circa primas horas nascuntur, acrioribus remedijs est utendum: & magis utique si iuxta declinationem totius morbi adparuerint: eos uero qui uigente morbo apparēt, mitius curabimus: atque id eo magis, si inflammationes & tensiones uiscerum concomitentur. His igitur cataplasmata adhibeantur ex semine lini crassiore lupini farina, pari mēsurā admixta. In potu pueris ante cibum myxarum decoctum ammixta menta praebetur. Eis autem qui ad integram aetatem peruenerunt, absinthij aut abrotoni cremor. Vtrisque uero etiam si febricitent, etsi trimestres tantum infantes existant: uermes terreni cum sapā confidenter exhibeantur: si

uerq

uero sapani non admittant, cum hydromelite, aut ut libet, præbeto, nihil uerius, neque uilitate contempta septem numero dato. Quod si non nuda sit suspicio, sed certa deprehensio lumbricorum, cataplasma ex lupinorum farina, in hydromelite decocta inponendum, cui aliquando etiã bryoniæ radix adijciatur. Vmbilicus autẽ felle taurino expleatur, aut melanthio cum lacte muliebri trito, aut absinthio, aut abrotono, aut bryonia, pinguis sicubus admixtis. Spina uero uniuersa ex medulla ceruina inungatur. In potu etiã his uermes terreni septem cocti ac triti cum sapa præbeantur, aut ut libet alias tenuissime triti. Efficax est abrotonum, & santonicum, & absinthium decoctum, unumquodque aut cum sicubus aut palmis exhibitum. Aliquando aut hæc contusa & cribrata, & cum melle in catapotia redacta, deglutienda præbemus. Dari potest etiam chamaemelorum decoctum cum modico rosaceo, uehementer enim efficax existit. Egregie quoque facit cretica sapa cum rosaceo potata. Aliud. Noces pineas in aqua calida macerato, teritoque, ac rosacei cyathum unum affundito, & cum uino optime temperato tribus horis bibendas præbeto. Inde enim enecati, tum uomitu, tum secessu eiciuntur. Comode quoque in cibo sumitur senetio uiridis, ac barba hircina. Eosdem etiam auriculæ muris succus, & calaminthæ ac mentha decoctum, citra molestiam educit, quod & brassicæ semen ac petroselinifera cere perhibentur. Superior aut uenter cerato integatur ex absinthio oleoque cyprino adparato: aluo autẽ adstrictæ glans immitenda præsertim pueris, quæ si nihil profecerit, clyster adhibendus morbi uigore remittente, ex absinthio, aut abrotoni, aut centaureæ decocto, cum melle ac nitro. Cæterum lumbricos, qui circa uigores febriles nascuntur, quosque malignos appellamus, per simpliciora remedia subducere conabimur. In cataplasmata igitur absinthiũ, abrotonum, ac santonicum miscebimus, aliquando etiã lupinum. Olei aut omphacini propinabimus eis, qui facile id ferunt, cyathum unum. In sorbitiones uero mellis plurimum coniiciendum: & ptisanæ quoque oleum plurimum omphacinum incoquendum, halicam item in myxarum decocto præbebimus tum per se, tum cum aqua mulsæ: præbitiones uero ex oleo semper augebimus: multæ enim comoditates existunt. In uniuersum enim omnia quæ lumbricos educunt aut per acredinem occidendo, aut per amaritiam subducendo, aut ad excretionem irritando, aut per consequentem ad ea quæ exhibentur lubricitatem, effusio cognoscuntur. Extrahuntur enim simul, ut uerisimile est, per sorbitiones lubricas uias reddentes, aut etiã per innominatam aliquam efficacem qualitatem. Viuentes equidem uicinas intestinorum partes adprehendunt: mortuæ uero unã cum stercore euacuantur. Prodeunt aut quædam adhuc uiuæ, uerum uertigine affectæ, & si ita dicere libeat, seminecatur. Profunt aut et his uermes terreni. Porro per pharmacorum potiones enecatos lumbricos, citra dilationem per glandulas extrahere oportet: uitiosa enim ex ipsis exhalatio procedit, quæ & appetitum & digestionem lædit. Atqui ad nauseas ex lumbricis obortas, lancinationesque stomachi, salis granum in ore detineant, deglutiantque liquefactum. Acredo enim ut apparet, eos statim infra subsidere cogit. Oboriuntur aut & in alui fluxione lumbrici: eos fluorem inspissando, & concoctionem tum per cibos, tum per cataplasmata, in melius permutando, curare oportet. In quantum enim fluxiones inualescunt, tantum etiam lumbricorum generatio augetur: uicissimque fluxu cessante, lubrici interquiescunt: quare diligenter conabimur ut alui adstringamus, firmitatemque ei adijciamus. Conijcienda itaque in cataplasmata aliàs ad fluxiones sistendas coccinnata, ea quæ ad lumbricos sunt prædicta, & quæ fluores non

non exacerbant: uelut est absinthium, abrotonum, fantonicum: iamq; etiā malicorium, acacia, & balaustia, eisq; similia, cum cruda hordeacea farina. Cerata quoq; imponenda ex his apparata. Utendum & prepotationibus, inter quas reliquis omnibus plantaginis succus est præferendus. Ad utramq; enim affectionem, ueluti dixi, efficax existit. Licebit autem et in hoc casu uermibus terrenis, quemadmodum antea dictum est, uti. Ceratum ad lumbricos. Farinę lupi norum, absinthij, farinæ hordeaceæ tenuissimę, cuiusq; drach. vii, fellis taurinę unc. i. scobis cornu ceruini drach. iiii, ceræ quadrantem uncięq; dimidium, olei secundarij sexuncem.

De lato lumbrico.

Cap. xli

Lumbricus qui latus appellatur, in his qui febre carent abundat, & in longis ac diuturnis nascitur morbis. Est autē latus lumbricus, si ita dicere libear, permutatio pelliculæ intrinsecus tenuia intestina ambientis, in corpus quoddā uiuum, quod continuos stomachi morsus infert, & ad cibos incorrigibilem appetitum: ceterū ea quæ accipiuntur non succenturiata digeruntur, sed cito excernuntur. Consequitur affectos corporis gracilitas, & imbecillitas cum tarditate, assiduusq; famis sensus. Quod enim uiuificatū est in intestinis, ubi recēs exhibitum cibum cōsumpsit, postea ipsa solida corpora arrodit. Minime uero lax signum erit, si cum recrementis quædam cucurbitæ semini similia excernantur. Porro cura penitus cum præcedenti cōcordat: præpotationes enim conueniunt amaræ & acres: alij item comestiones. Aut enim integræ excernuntur, ut incredibile magnitudinis de se præbeant adspectū: aut etiā prodeūt in partes concisæ. Et semel sanē exolutæ non amplius secundo congregantur. In potu igitur etiā his uermes terrenes, ut dictum est, exhibebimus. Proprie autē ad ipsas auriculæ muris succus facit, duorum cyathorum mensura, cum uno zythi cyatho potatus: celerrime namq; ipsos educit. Aliud, ad latus lumbricos, quos cærias, hoc est institas, uernacula uoce appellant. Nitri, cardamomi seminis, piperis, singulorum æquales partes commisceto, & coclearij mensuram inde præbeto: confestim enim educit. Aliud, Corticis radicis mali puniceæ acidæ in suprema parte delibratæ, piperis, cuiusq; drachm. quatuor, cardamomi dra. sex, marrubij dra. duas, mellis despumati quantum sufficit, præbe ex eo cochlearium post alij comestionem.

De ascaridibus.

Cap. xlii

Ascarides etiam lumbricorum species sunt, circa extremas intestini recti, ac primam internam adstrictiorē ani partem, sphincterem Græcis appellatam, consistentes, uehementemq; pruritum his locis inferentes. Et pueri quidem assidue ad egerendum irritantur, à contraria uero instantia, et aduersus eas contentione, ac ut plurimum ab excretionē melius habent. Qui uero ad integram ætatem perueniunt caussarum molestiam inferentium animaduersionem habentes, digitos in anum immittunt, ac procidentes educunt: quin & ignitis lapidibus, aut littoreis calculis à sole perustis fouendo, mordaces pruritus leniūt. Ceterum quum quidam præ pusillanimitate nihil horum auxiliorum admittant, minime malum ipsum negligere oportet, sed citra dilationem curare, atq; his qui falsi diuersum sentiunt caussas indicare, ac curandi uiam demonstrare. Porro causæ huius accessorij mali, cibi sunt, & frigiditates, alimētūq; corruptio nes, quas præstat prius uitare. Huius uero signa potissimū ex recremētōrū gra uolētia sumunt. Postea pueri quidē acri muria infusa sunt euacuadi, aut absinthij decocto oleo ammixto. Calidiorē quoq; sublationem esse conuenit, à qua ubi

ubi prodierint recrementa, affecti loci illinendi, ex simplicibus quidem acacia & hypocistidis succo, rhoisq; succo cum alumine liquido. Compositis uero Andronij pastillo, & sphragide polydæ inscripta, & lanæ succidæ pastillo, ac quæ his similia existunt. Coacta enim ab adstringentibus caro corroboratur, aptitudinēq; ad animalculorum generationem amittit, atq; ascaridas ipsas excludit. Perfectiores etiam ætate similiter euacuandi acrioribus ac calidioribus infusis, uelut est muria & centaureæ decoctum: deinde cedria eis infundenda: ad quam rem corneam fistulam undiquaq; perforatam apparare oportet, circa fundum amplam, ac magnitudine locis conuenientem, quam ultra adstrictiorem ani partem inditam cedria explemus, ita ut cedriæ immissio palam tum per amplitudinem, tum per transuersa, undiquaq; contingat: post uero quiescere iubemus, sæpe eundem curationis modum repetentes. Aliud, quod & pueris & qui perfectæ sunt ætatis conuenientissimum & efficacissimum existit.

Carnem ueterem salitam, pinguedine derafa, sublongam & rotundam formabimus, atq; ita adaptatam podici atque adstrictiori ani parti intrudemus, ligamentoq; adhibito, quam diu sustinere possint, inditam sinemus: deinde soluemus, prædictaq; infundemus atq; illinemus: idem etiam remedium sæperepetemus. Cibi uero frumentacei generis, boni succi, ac qui facile concoquantur, præbeantur.

De abscessu in intestinis.

Cap. XLII

Oboritur aliquando abscessus in intestinis, ad cuius eruptionem eliquationes aquosi puris cōsequuntur: quare ignari ac inexperti hoc uiso decipiuntur dysenteriam hanc affectionem esse putantes: & sanè ut uerum fatear, si post eruptionem diuturna sit exulceratio & perseveret, eo modo quo dysenteria curatur, uerum in principio neutiquam consimili curatione subducitur. Vnde etiam quosdam ægrotos periclitatos esse cōstat, male ab indoctis medicis tractatos, qui statim in principio dysentericas infusiones adhibuerunt. Pro uiribus itaque affectiones hæc inter se distinguantur. Iudicatu enim faciles existunt. In abscessu enim semper dolor pulsatilis præcedit iuxta affectum locum innitens, neq; morsus, neq; decursus adfuit, quales in dysentericis præcedere consueverunt. Deinde mutatione in suppurationem incipiente, rigores inæquales consequuntur, febresq; circa uesperam maxime irruentes: postea ubi perfecta humidi mutatio fuerit facta, omnes molestiæ minores fiunt, uehementescq; dolores remittunt: deinceps eruptionis tēpore accedente, rursus dolores intenduntur, aliquando aut perfecta uentris adstrictio adest. Post eruptionē uero humor, qualē prædiximus, excernitur, quū nihil tale in dysentericis oboritur. Cataplasmatibus igitur ad eos uti oportet ex semine lini, adstringētibus aliquod simul amixtis: ueluti sunt palmae, mala coronea, & similia. Atq; ne fluxus augeat infusis utēdum erit, ex ptisanæ succo aut halicę cum quodam mediocriter adstringente. Vehementem enim adstrictionē in his facere ueremur. A cataplasmatibus uero ac prædictis infusis inflammationem mitigamus. Et si quidem eruptionem suspectam habeamus, epithematis utimur quæ eam adiuvant, althæamni mirum ac caricas, simumq; columbinum admiscentes: si uero discuti posse ac euanescere inflammationem speramus, ea quę discutere ac digerere prædicatur epithemata adhibemus. Quæ in re egregie facit eni plastrum anicetum, hoc est insuperabile appellatum. Si uero eruptio obuiam ueniat, infusis utendū, primum quidem ptisanæ succo: cui deinde modicum mellis, ad ulcerum repurgationem, est ammiscendum. Quod si sordidiora recrementa appareant, etiā lenticulæ

lenticulae decoctum ac malicorij, ad ptisanæ succum & mel affundatur. Repurgatis deinde ulceribus à melle abstinendum, parum uero quiddam ex pastillo de halicacabo ad infusum coniiciendū, quo ulcera ad cicatricem perducantur. Post hæc autem prospiciendū, ut corpora instauratione suscepta, subdant ac molliora reddantur: sæpe enim identidem humoris collectiones fieri consueuerunt. Quod si uero sinus quispiam relinquatur, rursus eadem quæ prædicta sunt adhibeantur: si uero ea quæ ex ulceribus promanant serpendo depascant, ad ea quæ ad dysentericos in principio conueniunt, trāseundum.

De dysenteria, hoc est, torminibus intestinorum: ex Archigene.

Cap. XLIII

Dysenteria propriè, exulceratio est intestinorum serpendo depascens, ab externis causis producta, ueluti frigidityte, ardore, uenentorum pharmacorum potu, & quæ his similia existūt. Iam uero & à cruditatibus, peregrinorumq; & acrium ciborum acceptione: ab aliqua item acrium humorum impressione, cōsimili quæ circa externam cutis superficiem contingit, à qua papulæ quædam seruide ac exulcerationes perficiuntur. Primum uero egestio malum aspiciatur cum rugitibus subpinguibus ac biliosis, pingui nimirum quod intrinsecus intestinīs adheret paulatim circumliquefacto, & quibūdā quidem cum torminibus, quibūdā absq; his excretiones contingunt. Quum uero superficiēs intestinorū perfectè fuerit denudata, exulceratioq; supernè consistit, seculenta ac cruenta biliosaq; excernuntur. Vbi autem altius penetrarit ulceratio, etiam sordes pelliculas admixtas habentes expelluntur, & si non celeriter cohibeatur, compendio uicinos locos depascitur: saniosa uero quædam excernuntur, qualia ab occisorum corporibus defluere consueuerunt. Atq; hæc sanè est quodammodo acuta dysenteria. Si igitur ab acribus cibis, aut à flaua bile dysenteria oboriatur, serè in totum ipsam curamus. Si uero ab atra bile initium sumat, si quidem ratione iudicationis febrilium morborum atra bilis excernatur, transituq; suo intestinum distendat, etiam hanc curare non desperamus. Si uero sua sponte, nullo præcedente febrili morbo, neq; concoctione bona apparente, atra bilis excernatur, immedicabilis dysenteria ex ea oborta existit, nihilq; à cancro exulcerato differt: estq; omnino lethalis. Consueuerunt etiā exulcerationes aliquæ diutius perseverare, serpendo nequaquam depascentes, uerum causis ulceribus forinsecus consistentibus similes, quibus cicatrix tardè inducitur, labris nimirum ulceris in callum induratis, in huiusmodi etiam infusa infelicitèr adhibentur. Atqui in plerisq; dysentericis tenesmus præcedere uidetur. Est autem tenesmus egerendi promptitudo quæ differri ac deuitari non potest. Nosse tamen oportet quod aliquando quidem aliqua sui parte intestinum rectum in dysentericis exulceratur: aliquando uero totum, & cum ipso etiam superiora. Si quidem igitur circa colum, hoc est, circa intestina crassa ulceratio contingat, stercora quæ egeruntur multa sunt, & coaceruata, & cum flatribus prodeunt, aliquando etiam spumosa. Pingui quoque & cruenta recreationis ammixta adparent, inexplibilisq; edendi appetitus oboritur. Tenuibus autem intestinīs exulceratis, dolores circa umbilicum consistunt, biliosaq; & porri colorem habentia, atq; omnino uariiegata, stercore commixta plurimū excernuntur, citra tamen ramentorum complexum, cum torminibus & morbiditate, desperationeq; ac exolutione, ut non procul ab animi deliquio agri absint, à sitiq; infestatur, & febricitant, stercus quoq; crudius ab eis prodit. Exulceratur autem, uerum raro, & ieiunum intestinum. quod si contingat, egestiones

Z

stiones crudiores apparent, sanguinem nigriorem vehementer implicatū habentes, bilemque abunde flauam, litis multa itemque nausae affligunt: uomunt etiam aliquando, ac cibos auerfantur, dolor quoque uehemens supra umbilicum confidet, quandoque & febres malignae oboriuntur. Atque ita affecti decoloris fiunt, & ad animi deliquiū usque exudant: uires etiam ipsorum cito deficiunt, neque procul ab interitu absunt. Antylus autem scribit, Tunc equidem ieiunum intestinum exulceratū esse putamus, quum sanguis qui cumcrementis egeritur, niger ac uetustus apparet: necesse est enim huiusmodi, in omnibus infra ieiunum litis intestinalis decoctū excerni. Pituitosa etiam ac subpinguia simul excernunt: pituita enim, inquit, in ieiuno abundat, ipsumque etiam adiposum exilit: biliosa item abundanter in his excernunt, sitisque infestat, utpote uentriculo ob uicinitatem ex affectione intestini ieiuni concallescito: quapropter & februnt & dolent. Ceterū tenui intestino exulcerato, egestionis minus quidem biliosae ac pituitosae sunt: neque enim pituita, nec pinguedo in hoc uelut in ieiuno abundat, subcruenta autem magis & rasurae similia excernunt. Quae enim deferuntur, pelliculas intestini in superficie radunt, quamobrem sanguis etiam in eis minus niger adparet. Si uero circa colum exulceratio fiat,crementa multa erunt, & fluxu comitante coaceruata, & aliquando spumosa, quod uero cruentū in ipsis prodit, flauum erit: cibum plurimū expetent, crudioraque egerent: minus etiam a sit infestabuntur, & non multum februnt, nisi magnū sit ulcus, aut malignū, & si febricitare eos contingat, difficilius alijs febre summovent & excludunt. Magna autem causam subesse oportet, si febris ex colo accendatur. Quod si rectum intestinum sit exulceratū, concocta eruntcrementa & sanguis floridus, et sordes plurimae excrementis ammixtae: tenesmi etiam aderunt uiolenti, sepiusque ad excretionem incitantur, quum tamen nihil excernant: neque ualde esuriunt, neque sitiunt, neque februnt, nisi ulcus sit cancerosum. Porro primū periculum exulceris serpente ac depascente dysentericis impendit: secundū uero ex sanguinisruptione, tertium autem ex fluxu à locis ab imbecillitate affectis consequenti. Ceterū ab ulcere serpente ac depascente pueros magis opprimi adparet, usque ad aetatis uigorē calidum, namque & humidū huic aetati corpus est, quare ad putrescentes morbos perferendos magis sunt parati. A sanguinis autem eruptione, magis hi qui in aetatis uigore consistunt, infestantur, & qui à natura multo sanguine habundant. A fluxionibus autem seniores amplius laeduntur, & qui malo corporis habitu sunt praediti. At uero ubi ulcus proserpturū est dolor comitatur. Actria enim et liquida cum torminibuscrementa egeruntur: deinde & odoribus & coloribus uariata una cum mordacitate. Febres uero quoque praeuaccedunt, indeque ac corporis iactationes consequuntur: aestus item cōtinuus ac sitis. Iam uero ulcere serpendo ac depascedo in peius procedente, ramenta excernuntur: feculentaque multa ac nigra efferentur, & sordes magnae intestina ambientium pellicularum, si in crassis intestinalis exulceratio consistat. Quum autem sanguinis eruptio futura est, exolutio totius corporis, animi deliquio similis praecedit, ac grauitas loci. Ea uero quae egeruntur lenta sunt ac uiscosa, deinde cruenta. Postremum etiam grumi multi excernuntur, primum quidem flauī, ad finem uero nigri & graueolentes. Manifestū autem est quod uires quoque eorum subuacuantur, sudoresque effundentur: aliquando autem & conuulsiones ad plurimam euacuationem consequuntur. Atqui fluxione laborantes, curationis tempore compacta stercora excernent, deinde non longè post ulceris rectorium splendidum una cum stercore effertur. Modicè namque ab infusis fluxus sistitur, dein de pau-

de paulo post ulceratio ex coriatur. Cæterū si alicubi certe in intestino recto ac colo cōsistens dysenteria facile curabilis existit: quæ uero in tenuibus intestinis heret, difficulter curat, maxime uero in ieiuno. Iam uero & hæc quæ post abscessum eruptiones sūt dysenterię, graues sunt, propterea quod uires deiectione iam sint per coincidentes inflammationibus febres ac dolores. Graues sunt quoque quæ cum uehementi inflammatione oboriuntur, quæque cum febre ac perditione appetitus. Pessimę uero dysenterię sunt, in quibus quæ excernuntur porri ad spectum habent, suntque nigra, plurima, uaria, graucolentia, & quæ unā cum excrementis sordes pelliculis magnis commistis excernunt. Veruntamen & mulieres, quā uiri, senes & pueri, quā iuuenes & in ætatis uigore cōsistentes, difficiliter curam accipiunt. His prædefinitis à tenesimi affectione curam dysenterię incipimus, quum plerisque inde dysenteria initium sumat.

De tenesimi cura.

Cap. XLIII

Quemadmodum iam prædictum est, in plerisque dysentericis tenesimus præcedit. Est autem adfectio hæc ad excernendum promptitudo, quæ differri ac deuitari non potest, nihil tamen præter quā pauca cruentum ad spectum habentia propellens, & post ea quædam mucosa. Vbi uero stercus fuerit excrementum, ægri alleuantur. Iam uero & inflammationem cum laxo tumore, ex continuis distentionibus circa locum obortam esse constat, quæ stercoris insidentis suspicionem præbet, quod exitum quærat. Cæterū recrementa in ipsis concocta & cōpacta ferē in totum excernuntur, pauco sanguine post recrementa destillante, stercore minime admixto. In principio igitur si grauis distentionis sensus circa anum uentrem fiat, & maxime circa dextram partem, coniectare oportet stercoreū multitudinem in cæco intestino insitam esse, quam furfurum ac feci graci decocto infuso eluere oportet, melle oleoque ac modico nitro amixto. Quod si huiusmodi nihil apparuerit, statim in principio ex oleo myrsinino aut rosaceo, cum uino & cumino, pectinem, inguinæque, ac inter anum & scrotum intercapedine, perinaeon Græcis appellatam fouere ac irrigare oportet. Deinde lac caprinum recens multum heming mensura, & nequaquam minus præbendum: uerum non acruatim, sed sigillatim partitum. Sequenti deinde die lac ipsum ad dimidium decoquatur, ablato eo quod in decoctione concretum superstat, atque ita exhibeatur. Si uero pituita sit quæ ægrum infestet, aut præcesserit frigus, rutam in uino albo decoquito, atque uinum ipsum calidum meracum bibendum dato, ac assidue bitumen, picem siccam, coriandri semen & cyperum suffito: undiqueque autem ægro cōrecto suffimentū supponatur. Est autem & pastillus suffumigabilis ad tenesimos ac intestinorum dolores approbatus: hic. Picis sicca sextante, bituminis unc. i. sulphuris uiui unc. i. bitumen ac picem cum modico aceto liquato, sulphur autem uiuum tenuissime tritum adijcito, hisque simul unitis pastillos informato. Vsu uero expetente in calidum cinerem coniectos suffito. Bitumen autem in refrigeratis, etiam cum ptisanæ succo infundito. Glande quoque supposititia in eis huiusmodi utendum est. Oleo raphanino si adsit, aut cōmuni, si non illud haberi queat, allia decoquito ac conformato: deinde ladanum & ceram paulatim adijcito, quibus liquefactis & ab igne ablatis, modicum lycij addito, unito, ac tomento excipito, sedique quā penitus indito. Ad anum uero uentrem ac lumbos hoc adhibeto. Ladanum & styracem unguento nardino, oleoque suffumigabili appellato dissoluito, ac laena exceptum imposito, ac colligato. Efficacissima autem sunt in tenesimi affectione fomenta sedī admota. Gallas igitur in aceto decoctas cum spongia ad-

Z 2 hibe.

hibeto, aut glomis texturæ gynæciorum per successionem foueto. Efficax est & malicorium similiter decoctum, myrticæ bacca, ac rubus, quæq; his similia existunt. Furfures quoq; in aceto decocti, ac feruenti ligamento excepti, comode sedi adhibentur. Infectiones etiam ex prædictis utiliter suscipiuntur. Verum cui per nostram experientiam cognitio testimonium merito præbemus tale est. Later perquam uetustus & à fumo denigratus unà cum contentis in eo paleis tunditur: deinde feruenti aceto subactus, linteoloq; illigatus sedi subditur. Hæc autem statim ab excretionem admoveantur, & maxime si dolor infestet. Iuuantur etiam per spongitidem herbâ sede extersa. Si uero exulcerationis principium oboriatur, inflammatioq; adsit, pitisanæ succus infundatur, paucis rosis simul cum eo decoctis. Quod si acria sint quæ effervunt, lac tepidum infundatur. Vehementiori autem inflammatione infestante, oleum rosaceum leniter calidum infusum ac pluribus horis detentum, doloris uexationem dissoluit. Si uerò laxius intestinum rectum fiat, lentium ac malicorij decoctum infundatur. Similiter autem & si exulcerationis principium adsit. Si uero uigiliæ unâ cum dolore consequantur, sedi collyrium soporiferum subdetur, quod ad dysenterias est descriptum. In eis autem quibus iam ulcus serpendo depascitur, subiecta ad dysentericos cura utemur. Epithema dysentericis. Croci, myrrhæ troglodyticæ, cyphij, mastiches, succi absinthij, aloës, palmarum, acaciæ, masucha, ladani, malorum cotoneorū, cumini torrefacti, candidi oorum assati, panis usti & in uino macerati, olei melini aut rosacei.

Cura dysentericorum.

Cap. XLV

Principium curationis dysentericorum à quiete & modico cibo fiat, unde cunctq; tandem fluor procedat, & mediæ corporis partes lana oleo modico dulci imbuta cõtégantur. Vehementi autem mordacitate infestante, rutaceum sit oleum, & cuminum tritum lanæ conuolutæ inspergatur, maxime ubi inflammationes & tormina affligant. Quod si hæc augetur & intendatur, ad cataplasma ta confugiendum erit, & hoc maxime si inflammationis sensus percipiatur. Multis enim non dolorum tantum, uerum etiam totius mali obliteratione cataplasmatum comoditas induxit. Adparentur autem hæc ex polline in posca usque quo cogatur decocto: quem deinde linteolo complicato illigatum totis illis impones: fluorem enim ipsum cocoquit, quandoq; autem & palmas, malaq; cotonea, ac malicorium cum aceto cocta ammiscemus: quod si ardor adsit, symphyti radicem tritam, aut solanum, aut perdicium, aut plantaginem adijcimus. Stomacho uero imbecilli & exoluto, polentam cum cœnanthe, aloëq; & omphacis annectemus: inflatione autem simul infestante, anisi, sceniculi, apij, ac irio-nis semen addimus: & si lumbrici simul cum recrementis excernantur, melanthium, aut cornu ceruini ramenta, aut adeps ceruinus, aut coriandri semen non incommode admiscuntur: quod si dolor uehemens adsit, prædicta cum lini semine commisceantur, & aceto mulso decoquantur. Si uero sanguis multus effusetur, acacia, hypocisthis, & alumen cum palmis ac malicorio decoctis & tritis apte concinnantur: si autem liquida & cruda prodeant, quod eis qui uires debilitas habent euenire solet, mel coctum per se, aut polenta ammixta, pelle exceptum imponitur. Aliquando autem & opij parum, aut hyoscyami semen, hypocisthidemq; & acaciâ ac myrrham, apijq; semen satis largum, itemq; sceniculi & anisi inspergitur. Quod si frigoris sensus adsit, pellem agnina leuicolligida pice imbuta, calefactamq; aluo imponito. Ego uero, inquit Archigenes, superioribus quidem intestinis adfectis, pastillum aliquem ex eorum genere

nere qui supernè per os exhibentur dissoluo ac melle probè cocto, aut palmarū pinguium carne exceptum impono. Neq; enim impensè parcendū est in his qui de uita periclitantur. Inferioribus autem intestinis adfectis, ac mucosis multis infernè prodeuntibus, et eiusmodi etiam occupante madore: ex pastillis qui infernè per anum infunduntur, tres aut quatuor palmarum carne exceptos impono; semperq; mihi iuxta uotum res acta succedit. Mirificè etiam emplastra quæ cruentis uulneribus adaptata sunt, conducunt, postquam quieuerint inflammationes, uentri ac lumbis totis usq; ad dorsum imposita: qualia sunt Barbara appellata, & quæ ad fracturas apparantur, uelut est quod Iſis uocatur. Atq; de his quidem quæ forinsecus imponuntur hæc tenus. Dicendum autem deinceps de his quæ intra corpus assumuntur. In principio igitur post tertiam diem permittentibus febrilibus, lacte recens multo adhuc calido utendum est, melle tepido ei ammixto, atq; in eius usu ad trēs diēs perseuerandū, quantū nutriendo corpori suffecerit exhibendo; sequentibus deinde diebus melle adempto, et modica aqua (quartē nimirū lactis partis mensura) affusa, paulum decoquimus ac exhibemus. Deinde post alias tres diēs ad dimidium decoquimus, & post alias tres, ad tertias, similiter per tres diēs, atq; ita eis præbemus. Primum enim lac depurgat, simul ea quæ in corpore sunt contemperando: postremum uero aluum sistit. Non scio enim an aliunde grauior molestia dysentericis oboritur, quam ex eorum quæ egeruntur acredine contingit. Oportet autem insuper & panem madefactum à lactis acceptione offerre. Pulses etiam ex lacte apparate, tum pharmacum, tum nutrimentum, optimum præbent: uelut est oryza cum lacte, dulciarij panes, amyllum, & oua lacti commista. Quod si adhuc fluxus perseuerat: inde ad eorum quæ aluum sistunt syluam transeundum est. Ex quorum genere, alia quidem influentes humores obducunt & inspissant: alia uero, corpora plus iusto rarefacta & laxata adstringunt, alia aut reliccant. Pulses igitur ex halica apparentur: nam hæc & probè nutriunt, & aliquo modo obducunt. Condiuntur autem paucissimo sale, ac modico oleo & anetho, aut pro oleo magis adipe gallinaceo, aut anserino recenti. Quæ uero ex oryza eodem planè modo parantur, præcedentibus magis reliccant. His autem adhuc amplius quæ ex milio fiunt. Quæ autem ex rhoë apparantur pulses, magis adstringunt. Ego uero, inquit Archigene, eas hoc modo adorno. Rhoëm culinartum in aqua pluuiâ per noctem macero, deinde diligenter expressum aque committo. Farris apparatus: ex Archigene. Quod uero Latine in regionibus Romæ uicinis far appellant, hoc modo apparatur. Frumentum modico tempore aqua madefacito, indeq; extractum ac in pilam coniectum, ueluti psitanam à cortice repurgato. Vbi uero corticem exuerit, tollito atque in sole siccato: deinde manibus tritū donec penitus à cortice fuerit mundatū, crassissime molitō, ita ut granum unum in quatuor aut quinque partes redigatur, & siccum adseruatō. Vſus autem tempore halicæ modo coquitur & à sanis in cibo sumitur. Pro ægris uero uariè apparatur, & epithematis quoque ammiscetur. Quidam spicas frumenti adhuc uirides tollunt, ex ipsisq; far concinnant, quo modo & suauius & iucundius redditur. Far quod clusinum appellatur, porro frumentum ipsum rursus madefactum, manibus sedulo confrico, atque ita percolatum ipsius succum coquo, anethi ramulis assidue agitando: coit autem celerrimè, uelut glutinum quo ad librorum compactionem utimur: quo facto ipsum sale, ac paucissimo oleo siue adipe cōdio, fitq; hoc modo non solum comodum, sed etiam iucundū. Apparatur autem puls ex siccis item panibus,

quos aliquando quidem posca, aliquando uero palmarum, aut malorum cotoneorum, aut pirorum, aut siliquarum, aut rhois, ut dixi, cremore contusos quoque, eisque aliquando ex fauo albo ac optimi mellis pleno aliquid admisceo. Ex adstringentium numero lenticula quoque proditur, quae probe affata cum plantagine aut malis punicis contusis decoquatur, acetoque ac modico oleo conditur. Utiliter etiam lenticulae farculinum ammiscetur. Olera quidem non ualde probo, decentem tamen eorum degustationem non prohibeo, uelut seridis coctae, plantaginis, brassicae his coctae, ad quam post primam atque item secundam decoctionem aqua diffusa, poscam feruentem affundimus, rursusque donec liquefcat decoquimus. Intubum quoque ac sisarum cum liquamento simplici exhibemus. Damas & ouorum assatorum lutea tantum cum modico aceto ac rhoe, paucissimo oleo ammixto. Carnes autem dysentericis non ualde commoda existunt, danda tamen eis qui diuturno malo uexantur. Ex his uolucrum eligenda, deinde syluestrium ferarum; uerum ex his omnibus facile solubiles & non graueolentes, teneramque carnem habentes ac adstringentem, reliquis praefenda, uelut eadistinctae, lucres perdix, palumbes, et similes. Ex pedestribus, uero carnes dorcadis, capreae, ac leporis. Ex marinis, aselli, percae, loliginis ac mulli: singulae uero in posca ebulliant, myrti baccis cum eis incoctis, deinde affatae cum familiaribus edulis praebentur. Fructibus quoque parce utantur: si tamen stomachus languet, pirum coctum, aut coroneum malum concedemus, aut uuam quae in cado, siue olla, aut etiam interpositis uinaceis adseruatur: mespila item ac punicum malum. In potu a principio quidem aqua pluuia quae non sit ex domibus plumbo interiectis delapsa, utendum est. Talis enim aqua potata etiam fanis dysenteriam propinat, quod si pluuia optima non adsit, fontana utemur: puteorum aqua semper deuitata, utpote quae subsalsa est, ac uentrem perturbat. Cum aqua autem fructus adstringentes coquere oportet, maxime uero acinos. Post uero ubi uires fuerint deiectae, etiam uinum praebendum, quo stomachi sanitas firmetur: sit autem uinum adstringens, & non ualde uetustum. Ante cibum uero corpus inunctionibus, & faciei prolutione, similibusque curetur, quae in febrium tractatu sunt relata. Atque haec quidem de dieta. Iam uero ad remedia quae inferne adhibentur transeundum. Magnis igitur intestinis affectis etiam infusa adhibeantur: & si quidem tenesimus infestet, ptisanae succus infundatur, adipe caprino aut hircino admixto. Vbi uero corpora excoriationem incurrant, halicac aut oryzae succus magis appositus erit: triticea etiam ptisana ad tenesimos ac excoriationes accommodata censetur. Aliquando in uehementi tenesimi ad egerendum promptitudine, muriae usu agrum ab omni dolore liberauimus, sufflato alicui eam ammiscueris drach. viii, in iecto. Praestantius tamen oliuarum albarum muria conditarum liquamen censetur, tepidum hemine mensura infusum, & sane per assiduum eius in tenesimi cura usum optime successit. Si uero ex ueteri chirurgie perpeffione, aut alias subtiliore sensu praedita existant circa sedem aegroti loca, anus assidue & maxime ante acrum aut adstringentium pharmacorum infusionem, adipe anserino aut suillo perungatur, & fistula quoque clysteris crassius illita immittatur. Ceterum post distentionum exolutionem, asperitates quae circa intestinum sunt, quae quidem mediocriores, per muriam resiccantur: quae uero relinquuntur succis magis adstringentibus curantur: ueluti gallae in uino decoctae, aut triteae & uino insperse, malicorij item ac corticis pinus, & baccarum myrti nigrarum. Quod si ardor consequatur, oia cruda duo cum

cum uino modico, ac largo rosaceo conuassata infunduntur. Qui uero caput quod facillè adficitur habent, in his seminis lini succum recusamus, utpote caput replentem. Portulacam autem cum ptisana (si possibile est) decoctam, aut cum aqua: si id fieri non queat, succo eius cum rosaceo & ouis crudis permixto infundimus, in his præsertim qui ardoris adfectionē circa intestina habent, aut qui aliàs à calidorum infusorum ardore sunt læsi: ex rosaceo uero quarta ipsius succi pars sumatur. Mirificè etiam seminis lini succus facit, cum candidis ouorum, & lacte asinino sesquicochlearij mensura, permixtus: pro quo si non adsit, bubulum accipere non incōmodum erit. Porro inflammationibus erysipelatis, ciborum ac potuum citra mordacitatē adstringentium usus conueniens existit. Infusa uero eis conueniunt, plantaginis succus, malicorij, perdicij, portulacæ, semperuiui: uerum singulis acaciæ aut hypocisthidis succum admisce-re oportet. Efficacius autem in erysipelatis glaucium infunditur cum aliquo ex prædictis succis, aut Andronis pastillus, aut Musæ inscriptus. Quod si sanguis deliquit, sanguinariæ succo utendū aut plantaginis cum acaciā, hypocisthide, aut balauftio. Si uero sanguinis impetus uehementer urgeat, quemadmodum etiā si maxima inflāmatiō subest, præsertim in his qui plurimo sanguine abundant, uena incidenda, si uires non resistent, & maxime in quibus consueta sanguinis excretio cohibetur. Auferre autē oportet neq; multum neq; coaceruatū, ab utroq; enim uenter cōturbatur. Omnium uero maxime cauebimus ne animi deliquit fiat, quare desidenti etiā dysenterico uenam secabimus; hac enim desidentes forma dum secatur uena, minus reliquis animo linquuntur. Secare autē oportet in dextro cubito uenam humeralem appellatā: neq; enim similiter hac uena incisa, uires labefactantur, & insensibiliter quodammodo furtimq; sanguis auferitur. Quod si hæc non appareat, necessariò mediā secamus. Inferiorē autem incidere ob subiacentem arteriā uitandum: ceterum fissurā omnino reuissimam infligimus: non enim ob multitudinē sanguinis euacuandā sectionem facimus, sed ut materiā quasi per riuos transferamus. Paucus autē sanguis etiā multo tempore emissus, inflammationē mitigat, & sanguinis ad intestina delationē reuellit, innatumq; calorē sensim refrigerans, somnum magis quam animi deliquitū inducit. Est autem optimū dysentericis remediū somnus. Si uero quid uenæ incisionē fieri prohibeat, ex eorum quæ sanguinē sistunt amixtione infusionē facio. Qua in re lanarum succidarū cinis optimè facit, aut ex spongia noua uista. Spongiā autem ipsam liquida pice imbuiere oportet aut sanguine taurino, cineremq; eius in olla exustā in aliquē ex prædictis succis inspergere, atq; hoc modo infundere. Succū autē in his ad infusiones apti sunt, ex plantagine, sanguinariā, ac similibus. Quin & linteolū alumine liquido imbutum, deinde ustū, præclare sanguinis eruptiones sistit. Summè autē conducentē cognouimus asinini stercoris succū, maxime si à pastura prodeat animal montana & adstringente: quod si non sufficit ipse succus, stercus plantaginis succo madefacito, exprimito ac infundito. Adhibeantur autē simul & epithemata, & quæ per os accepta sanguinē sistunt, & qui sanguinē spuentibus cōmodi sunt pastilli. Præter opinionem uero eis profunt, maceris cortex, & mali punici flores, æquali pondere contusa & cribrata, si inde scrupuli duo cum uino adstringente propinentur. In his etiam frigida, citra offensionem tamen, infusa apparentur. In reliquis uero dysentericis tepidiora, aut leniter calida. Vlceribus enim frigidum infestum est, nisi sanguinis eruptio simul adsit. Si uero exulceratio absque fluxione relinquatur, plura ne infundantur, quàm lac bubulum,

Z 4 aut

aut caprinum, cui lycij drachmæ tres sint ammixtæ: optimè faciunt & terræ samia drachmæ IIII, aut amyli drach. IIII, cum plumbi usti drachmis II, triticæ ptisanæ ammixtæ ac infusæ. Aut cerusæ drach. II, cum succo inijsio, ægerq; sanatur, ubi uero fluxione adficiatur & nimium humecta sit exulceratio, charta usta, aut lentiscus usta, aut cinis pompholygis, aut aridum ex charta constans pharmacum, similiaq; cum succo plantaginis infusa, aut etiam cum altero con simili succo, ægrum a malo adseruat. Quod si uehementior sit fluxus & humectatio exulcerationis, ea quæ a callis indurata corpora leuigare ac a callis liberare possunt adsumantur: itemq; ea quæ humecta resiccare & exurere, exolutaq; adstringere possunt: uelut est sabina herbæ decoctum, item saluiæ, polij, acipitularum cupressi, ex pastillis uero Musæ inscriptus, & qui ex lanis succidis uisus constat, & consimiles. In potu uero Thrasymandri pastillus, & qui croceus appellatur, consimilesq; qui supernè per os sumuntur, præbeantur. Cibi etiam magis resiccantes eis exhibendi. Si uero serpendo depascant ulcera ipsa, si quidè in intestino ieiunio consistant, paruum omnino salutis spem promittunt. Si uero circa tenuia intestina fiant, minus graue malum est, attamen periculo non uacat. Si autem in colo fiant, ut plurimum sanabilia existunt. Verum quemadmodum in externis ulceribus, depascentibus: ita & in his statim in principio, ubi depastio apparuerit, crustas inducentia & exurere ualentia adhibere oportet: ceterum enim ad magnitudinè peruenierit exulceratio, inutilis horum usus fuerit, ceterum ulcera circa ieiunū ac tenuia intestina, per potiones curantur, ea uero quæ crustas inducūt in potu accipi non possunt: quare sorbitiones & eclegmata extergerè ac repurgare potentia, his sunt exhibenda: estq; ptisanæ succus cū melle absorptus his aptus, atq; ipsum adeo mel per se induratum, & in decoquendo in pastillum coactum, quod comestum ulcera potenter repurgat. Sorbitiones item ex eruo apparatus, cōuenientissimæ sunt eis qui in superioribus partibus ulcus depascens habent. Apparantur autem hoc modo. Eruum in aqua calida sepe permutata ad horas octo madescere sinitur, deinde donec testam omnem abiecerit, manibus in aqua confricatur: post uero coquitur, & prima itemq; secunda, tertiāq; & quarta aqua diffusa, semper ubi prius decoctum diffunditur, rursus alia aqua feruens affunditur, quæ ubi post quartam tandem decoctione fuerit diffusa: acetum mulsum ad ipsum sufficienter infundatur, & cum quintæ aquæ affusione ad cōpagem succi ptisanæ decoquendo reducatur, atq; hoc modo absorbeat. Halica etiā cum lacte bubulo decocta nō incōmoda efficitur. Maximè uero omnium prodest eis lac bubulum recens mulctum ac potatum. Quicquid uero tandem eis datur, ualde modicū sit. Hi enim præ alijs dysentericis paucio cibo indigent, sitiq; uexantur. Pharmaci aut loco exhibeantur quæcunq; aristolochia rotunda participant; radiceq; panacis, ac iridis, alumine scilicet, moris, & mali punici florè. A uino uero abstineant, depastione enim dilatat. Quod si circa intestina crassa ulcus serpendo depascens cōsistat, ea quæ per se dem infusa crustas inducūt, adhibeantur: cuius generis sunt pastilli Paulini, & consimiles, & maximè qui Nymphodoro est inscriptus, quo etiā nos utimur: item qui ex thallia, id est, oleæ ramulis constat, quorum omnium cōpositiones paulo post dicemus. Ceterum cum attentione crustam inducentibus uti oportet, excellentem ipsorum facultatem reuerendo. Porro cancerosa & maligna, quæ cacoethe Græci appellant, intestinorū ulcera ferè in totum incurabilia existunt, neque tamen citrà auxilium relinquere oportet, sed uehementes potius mitigare: optimum autem & his est asininum lac recens mulctum potatum,

tum: si quis enim eius usum sustinere possit, nullumq; aliud nutrimentum accipiat, plurimā salutis recuperandæ spem habebit. bonum est & bubulum ac caprinum recens mulctū, si illud non adsit, bonū est & scissile lac cum amylo. Præbeantur autem eis & oua cruda, ac iuscula gallinarum & perdicum. Succī etiā præbeantur omnes qui facultate obtundendi dolores præstant: infusa quoque eiusdem generis sint: pharmaca item his cōueniunt omnia, quæ ad dysentericos à uenenatorum acceptione factos, conducunt. Cæterum irrigationibus & cataplasmatibus neque curantur cancerosa & maligna ulcera, neq; mitiora fiunt. Viere autem & ad eos infusis ad cancerosam uulnam describendis, & pharmaco ad cancos mammarum, ex uino adriano & rhoë qua coria tinguntur, appurato. Porro si à uenenati pharmaci potione, ubi mortis periculum fuerit deuitatum, dysenteria oboriretur, his quæ à uenenorum potu conueniunt erit utendum. Triplicis autem modi remedijs in his qui uenenum biberunt utimur, uomitorijs uidelicet, & obtundentibus atq; extinguentibus: in quorum numero etiā acria cōprehenduntur. Vomitoria itaq; remedia mox à ueneni potu sunt accepta. Extinguentia uero quæ acria sunt, tanquā ulceribus minimè conuenientia, recusamus. Alterum igitur tantum genus extinguentiū, hoc est, aromatica adsumemus: itemq; ea quæ obtundendi uim habent. Ex cibis itaq; conueniunt ptisanæ succus, aut halicæ succus cum anetho decoctus, aut palmis aut mali punici acinis. Item radicis dulcis succus: cum his etiā tum gallinæ, tum perdicis decoqui possunt donec eliquefiant: cerebella item ac pedes eliquata præbeantur, & sorbitiones ex amylo & lacte, quibus anserinus aut gallinaceus adeps est ammixtus. Ex pharmacis autem eis cōducunt quæ de uenenis referuntur in tertio decio Sermone. In potu uinum non inconueniens est tenue & album, nisi febris aut inflāmatio adsit. Cæterum cataplasmata & fomenta in eis quibus ex bilis acredine dysenteria oborta est, uitabimus. Quod enim leue & bene succulentum in intestinis est, id distrahunt ac diripiunt: quod uero nulli usui est, & mordax, in ipsis relinquunt.

Cura eorum qui aurum, aut æs, aut tale quippiam deglutiuerunt.

Cap. XLVI

Si quis auro, aut ære, aut ferro, aut aliquo alio huius generis deglutito, sanguinem per uentrē egerat, maluæ aut seminis lini succo multo, in potu exhibito, laetum facies deglutiti, supra hoc quod & in intestinis obortam lenies asperitatē. Ego uero, inquit Antylus, quum quidā per iocum anulum aureū deuorasset, & ramentosa ac cruenta infernè egereret, ob sculpturæ uidelicet asperitatē: in ipso enim auro capiteillum inerat asperè concinnatum: non sum immoratus his quæ lubricas uias reddunt, sed confidenti animo ad ea quæ fortiter purgant pharmaca sum progressus: quare contigit unā cum recrementis anulum excidere: quo facto, homo ipse ex ptisanæ succo, ac sorbilibus ouis nutritus, tertia die sanus euasit.

Communia remedia dysentericorum quæ supernè exhibentur.

Cap. XLVII

Porro ubi memor fueris remediōrū iam antè in unaquaq; dysenteria specie dictorum, expeditè inuenies, iuxta eundē planè modum, quomodo & communibus remedijs, quæ nunc dicenda supersunt, utaris. Commixta enim reperies hic remedia omnia simpliciter scripta quæ dysentericis cōueniunt: nimirū adstringentia, obtundentia & resiccantia. Et simplicia quidē quæ tum dysentericis, tum coeliacis in potu dantur: alia quidem adstringendo, & firmitatē ad len-

do, humoresq; inspissando, uentrem cohibent, alia autem obtundendo, alia etiam urinam ciendo, ac fluxionē transferendo. Quae itaq; urinā ciunt omnibus sunt manifesta, & saepe in hoc opere descripta, quibus etiā hic uti oportet. Quae uero adstringunt cōmoda eis haec sunt: lapathi syluestris maximē semen, alterius aut lapathi tum semen tum radix, trita aquae inspersa ac potata, siliquae aridae comestae, rhus culinariū, gallae, spinae Aegyptiae semen, malicorium aridū tritum, rubi radix, unumquodq; eorum cum aqua ad tertias decoctum, aut tritum potui inspersum, ladanum cum uino austero, acaciae succus, hypocistidis succus, lysimachia, balaustiū, sideritidis heracleae folia & radix, salicis folia, symphyti radix & folia & semen, rheon ponticum, althaeae radix, gnaphalium cum uino austero, hippuridis succus cū passō, loti arboris baccae, et ligni lotini scobs, potui inspersa & potata praeclare faciunt, cortex thuris tritus potatus, lemnia terra quae sphragis appellatur, minium sinopicum, cenanthe polentae modo potata, holoschoeni iunci fructus torrefactus, uerbasci radices drach. II. mora acerba in sole desiccata ac trita liquori potando atq; obsonijs inspersa, mora rubi acerba similiter exhibita: acini uuae, ac uuarum passarum tum aridi triti, tum in cinerem exusti, plantaginis semē aridum tritum, similiter folia & radix, maceris cortex. Ex eorum autem numero quae aliquo modo adstringunt, uerum magis obtundunt, est aster samius, & amyllum. Obtundit autem tragacanthus & gummi. Resiccat coagulum leporis ex aqua, cornu ceruinum ustum, herinacorum testae ustae, itemq; ostreorum, & cancrorum maximē fluuiialium, atq; etiam marinarum testae ustae ac tritae: egregie facit & saluiae decoctum.

Composita pharmaca quae supernē exhibentur. Cap. XLVIII

Vinum uetus adstringens ad tertias decoquito, mellisq; optimi aequale pondus adijcito, rursusq; donec in compagem cogatur coquito, & ante cibum mystri mensura exhibeto. Aliud Asclepiadae. Ouum recens in uas quoddam euacuamus, putamineq; eius mel optimū ac uinum uetus adstringens, malicoriumq; tenuissimē tritum demetimur, piperisq; granis x. adiectis, haec simul in sartagine torremus, atq; tertiā inde partem ieiunis cum pane praebemus. Summē etiam prodesse quod sequitur scimus, corticis thuris, seminis plantaginis, & equalēs partes tritas, uino diluto ad triū cochleariorū mensuram insperge, ac ante cibum exhibe. Caninum etiā stercus album, tritum, lacti scissili & per silices decocto inspersum, summē dysentericis auxiliat, si lac ipsum in cibo sumatur. Ceterū canem ipsum per praecedens triduum, nullo alio cibo quam ossium comestione nutrire oportet. Aliud ualde approbatum, cuius usu scimus multos à morbo liberatos. Gallarū tenuissimē tritarum, piperis, rhois culinarij, malicorij tenuissimē triti, singulorū aequales partes misce, ac cū uitellis oui subige, & in mali punici uacuā testam conijce, ex eodemq; sumpto putamine os testae contege: deinde totā mali testam fermento forinsecus oblini, & ad prunas asiat post uero ex hac ipsa mali punici testa repurgata cochleariū ante cibum edendum praebe. Aliud quod & coeliacis prodest. Baccarum myrti nigrarum cochlearia III, anisi, rosarum siccarum, cenanthes, acaciae, singulorū cochlearium unum, Palmarum carne subige, ac drachinā unam praebe. Si cenanthe haberi non potest, uuas immaturas siccatas cōijce. Aliud Marciani, ad eos qui neque potum, neq; cibum accipiunt, sed pro desperatis habentur. Baccarū myrti albarum quincuncem, malorum cotoneorum mediocrium ac pulchrorum numero duo, aquae sextarios III, scobis corticis arboris loti sextantem & unciam dimidium, Decoquito simul donec sextarij duo reliqui supersint, ac quantum possint

possint bibendū praebe, idemq; etiam per clysterem infundito. Eiusdem facultatis est loti scobes potatus, atq; amplius adhuc eo praestat eius decoctū. Quod si lotus non adsit, cortice pini utaris. Aliud Marciani. Aloës ad carbonum formam exusta unciam i. malicorij usti unciam i. seminis lini usti unciam i. contere & praebe cochlearia duo, his qui febre carent cum uino antiquo. Ego uero, inquit Marcianus, quotiescunque hoc exhibeo, duorum terrestrium herinaceorum membranam internam, quae cibum complectitur desquamatam adijcio. Quare hanc membranam illotam accipito, siccato, ac adseruato. Per se enim huiusmodi pelliculae potatae uentris fluxiones sistunt. Aliud Marciani, cuius uilitate ne cōtemnas: seminis anethi, apij, foeniculi mōtani, piperis, sing. un. i. in testaceā pilam cōijcito, atq; ubi probe cōtrieris, herinaceorū terrestriū internā membranā illotam, ac per se cōtusam & cribratā unc. i. pondere immisceto. Deinde uinum purum uetus quantū satis uidebitur, in nouum uasculum infundito, & laminā ignitam ex ferro quod stomoma uocant, nō minorem libra in uino extinguito, & adiectis aridorum drachmis duabus bibendum praebeto. Tantum enim ad summum datur, atq; hoc medicamine multos ille desperatos seruaui. Aliud multa experientia cognitum. Cochlearū terrestrium, maximē montanarum, ustarum, carnem trium drachmarum pondere accipito, piperis scrupulos viii. simul cum aereo pistillo in puluerem redigito, & uini ueteris sex uncem, tantundemq; gari affundito, ac simul unita omnia in tres partes diuidito, & per tres horas exhibeto. Oribasius autem sic: cochlearum unā cum testis exustarum unc. i. alij trientem habent, gallae sextantem, piperis unc. i. in puluillum redige, ac obsonijs insperge, aut cum aqua, aut uino albo tenui praebe. Praclare auxiliatur hoc dysentericis, quibus ulcus nondū est putrefactum. Aliud Marciani, quod Phemus appellatur. Myrrhae, opij, balustij, rhois rubri, cuiusque unciam unam, anisi sesquunciam, spinæ Aegyptiæ quadrantem, lentisci quadrantem. Cum decocto corticis lotini ligni subigito, & nucis ponticæ magnitudine praebeto, cum lotini corticis decocto: quod si lotinus non adsit, melpilino pro eo utaris. Catapotium dysentericum ualde pulchrum, Asclepiadae. Radicis symphyti, seminis ericæ, malicorij, gallarum aequales partes subige, & in catapotia digere, ex quibus obolos tres cum uino aut aqua deuorandos praebe. Aliud eiusdem. Gallarum drachmas quatuor, opij asiani drachmas duas, petroselinī drachmam unam, aqua subigito & catapotia formato, exq; eis ad ciceris magnitudinem praebeto, aut quantum uires tolerare possint. Aliud. Thuris, acaciae, opij, gallae, æquale pondus singulatum cum succo intyborum subige: indeq; ad ciceris magnitudinem aut pro uirium tolerantia praebe. Aliud. Florum rosarū, opij, acaciae, gummi succi hypocisthidis, cuiusq; trientem, seminis & succi plantaginis, cuiusque sextantē, succi rosarum un. i. In catapotia redigito, ex quibus obolos tres dato. Pastillus ex seminibus, qui in Alexandria preparatur. Anisi unc. i. foeniculi unc. i. seminis hyoscyami, quadrantem, seminis apij quadrantem, alij tantum drach. ii. habent, opij unc. i. dauci unc. i. aqua subigito. Oribasius autem hoc modo. Anisi, ammi, foeniculi seminis, apij seminis cuiusque drachmas tres, petroselinī drach. ii. opij drachmas duas. Valet coeliacis, dysentericis, cholericis, & tussientibus. Pastillus trigonus, hoc est, triangularis appellatus. Seminis apij sextantem, seminis hyoscyami unc. i. opij unciam unam, anisi unciam i. aqua subigito. Aliud Andromachi, ad coeliacos & dysentericos. Rhois culinarij drac. iiii. piperis drac. iiii. myrrhae, croci, acaciae, scobis corti-

corticis loti, ammi, cuiusq; drach. i. i. spicae nardi, lycij, gallarum, succi hypocisthidis, opij, aloes, anisi, cuiusq; drach. i. cum rubi succo subigito, & ante somnum iiii. obolorum pondus ex aqua praebeto: non febrientibus ex uino frigido. Pastillus Philippi, ad diurnas dysentericorum affectiones leuans dolorem, & bibitur & infunditur, & forinsecus quoq; imponitur, melle cocto aut palmis passis subactus. Acaciae, balaustiorum, hypocisthidis, rhois rubri, opij, thuris, myrrhae, croci, gallarum, lycij, aloes, rhei pontici, baccarum myrti nigrarum, malicorij, singulorum drach. iiii. uino ueteri adstringente subacta in pastillos digerere, & non febrientibus obolos iiii. ex uino praebere, febrientibus uero ex hydromelite. Ego autem hoc pastillo utor & feliciter mihi succedit, omnibus quidem praedictis ad eius compositionem adiectis, praeter thus & rhoem. Ad haec autem omphacij, floris mali punici, cassiae, castorij, aluminis scissilis, rosarum repurgatarum & siccatum, singulorum aequale pondus addo. Catapotium bonum, Abrotoni sextantem, sarcocollae unc. i. gummi parum, ut ex eo cogi ac formari possint. Catapotia ciceris magnitudine formato, & ieiunis unum deuorandum praebeto, similiter unam ante somnum. Aliud Oribasij, ad dysentericos & haemoptoicos, fluxumq; muliebrem. Succum hypocisthidis, terrae samiae, gallae omphacinae, acaciae ruffae, cuiusq; drach. viii. cum aqua pluuiali subigere, & pastillos formare, ac utere. Ad dysentericos quidem in potu exhibitis, ac per clysterem cum succo oryzae, aut lentis, aut aliquo consimili, infusis. Ad haemoptoicos uero, cum aquae frigidae sesquicyathos eius drach. i. Ad fluxum autem muliebrem, cum succo solani, aut sanguinariae, aut plantaginis lana exceptos subde. Aliud parabile. Alumen liquidum tritum cum ouo absorbendum praebere, & rursus aqua calida dilutum bibendum exhibere, & admiraberis. Sed ad diurnas dysenterias, & in quibus cruenta excernuntur. Aliud. Pumicem in tenuissimum puluerem redactum, cum ouis forbilibus, cochlearij mensura praebere, & miraberis. Aliud exquisitum. Fici folia arida confusa cochlearij mensura cum uino austero dato. Aliud. Macer, mali punici florem, aequali pondere contunde, & ex eis scrupulos duos cum uino adstringente praebere. Valde commodum hoc est in his qui cruenta egerunt. Pastillus hypentericis & coeliacis. Anisi, seminis apij, ammi, balaustiorum, succi hypocisthidis, seminis hyoscyami albi, singulorum drach. viii. opij drach. iiii. Excipe his qui integre sunt aetatis drach. i. cum aquae calidae cyathis tribus. Polydarachae drachmas vi. uini austeri sextarios iiii. Vinum ipsum per se coquitur, donec tertia pars reliqua fiat cum qua arida in mortario teruntur, donec in compagem terendo redigantur, ex quibus deinde pastilli drach. iiii. aut trium siue duarum etiam formantur, quorum usus iuxta aegri vires adhibetur; cum uino autem & aqua infunduntur, ita ut cum aqua lenticula, rosae siccae, ac cor-

Quae inferne dysentericis infundantur. Cap. XLIX
Pastillus Nymphodoti, ad dysentericos, & ulcera depascendo serpentes: omnibus praestantior, quemadmodum experti sumus, inquit Archigenes: compositus quidem ut Faustinus, dissonans autem in auripigmenti apponderatione: opere uero longe efficacior eo, cognitus. Cuius compositio haec est. Charitae usae drach. xxx. auripigmenti drach. viii. calcis uiuae drachmas x. sandarachae drachmas vi. uini austeri sextarios iiii. Vinum ipsum per se coquitur, donec tertia pars reliqua fiat cum qua arida in mortario teruntur, donec in compagem terendo redigantur, ex quibus deinde pastilli drach. iiii. aut trium siue duarum etiam formantur, quorum usus iuxta aegri vires adhibetur; cum uino autem & aqua infunduntur, ita ut cum aqua lenticula, rosae siccae, ac cor-

tex loti decoquantur: cum uino uero baccae myrti, ut ex utrisq; hemina mensura super sit. In uniuersum autem, non solum in huius pastilli, uerum omnium qui crustas inducunt usui, stomachum hora una ante eorum exhibitionem, ex oleo myrteo ac uino ueteri irrigare oportet, itemq; caput ex oleo largo. Quae enim crustas inducunt, si infundantur, & stomachum & caput offendere conueniuerunt. Ante infusionem autem frusta panis duo aut tria agro exhibenda, ex aqua frigida aut lactei teporis, si uehementes adsit febris: aut uino diluto, si parua fuerit febris & nullius pensi, pane madefacto. Quod si ab infusione stomachus exuratur aut subuertatur, aquae frigidae cyathi tres confidenter in potu praebeantur, exhibendus & lactuca caulis cum pane & aceto: oliuae item albae ex aceto. Ceterum his qui statim ubi infunditur pharmacum, rursus reijciunt, imò penitus infusum retinere nequeunt, muriam praeinfundere oportet: aliquando etiam salis ammoniaci cochleare i, aut amplius tritum, pharmaco est ammiscendum, nullo habito mordacitatis respectu. Utilitas enim omnem dolorem exurperans inde procedet. Vtuntur autem frequenter oliuarum albarum muria conditarum liquamine, hemina nimirum una ex eo infusa, semihoraeq; interstitio facto, aut paulo diutius, pastillum ipsum consequenter infundentes, quo modo facile ipsum continent. Et pharmacum sane magis efficax fit ubi nuda ulcera contigerit. Si uero neq; sic continuerit, iterum atq; iterum infundito: munitum est enim pharmacum ne crustas inurat. Porro ubi efficacius fuerit pharmacum & uicerit affectionem, multa cum ipso mucosa ramenta prodibunt, & a multis molestiis, egerendiq; promptitudine distentionibusq; liberabit. Infusum autem ipsum non ultra duas horas retinendum est, neq; infra unius horae spatium. Atq; hic cation uniuersalis tibi in omni crustas inducente infuso proponatur, una cum hoc quod & stomachus & caput sit praemunitum. Ante infusionem etiam anus ex oleo dulci illinatur, maxime uero adipe quopiam ipsa fistula crassius perlinitur. Post infusionem cum spongijs aut glomis decocto quopiam adstringenti imbutis, sedes foueatur: adiuuat enim hoc ipsum infusi retentionem. Mirabiliter etiam prodest Andronis pastillus duarum aut unius drachmae pondere infusus. Pastillus ad dysentericos, cuius multam experientiam habemus, admirabilis enim in ulceribus serpendo depascentibus existit, non solum dysentericis, sed oris etiam gingiuarum, & ad omnem nomen serpentem. Calcis, auripigmenti, chartae ustae, squamae aris, aequales omnium partes ramulorum oleae decocto seu succo subigito ac utitor cum oryzae succo. Exuccatur autem olea hoc modo. Ramulos oleae contundito, eisq; congruentis mensurae aquam affundito, atque donec quater efferbuerit decoquito, expressoq; succo utitor. Faustini insignes pastilli: quorum alter constat ex chartae ustae drachmis xxx, calcis drach, xxv, auripigmenti dra, xii, sandarachae drach, vi. Infunditur duarum drachmarum pondere cum rhois & baccarum myrti decocto. Si uero diuturna sit affectio, salis etiam drach, ii, adijciuntur. Alter uero constat ex calcis drachmis decem, sandarachae drach, vi, auripigmenti drachmis octo, chartae ustae drachmis triginta, haec in pastillos redigito, ac utitor, quem admodum in Nymphodoti pastillo est praedictum. Alter adhuc pastillus Faustinus, qui in Alexandria praeparatur. Auripigmenti trientem, sandarachae trientem, calcis uncias duodecim, acaciae uncias xii, subige cum uino. Pastillus Philadelphus, ad dysenterias, & sanguinis eruptiones, & omnes nomas. Sandarachae, auripigmenti, cuiusque quadrantem, calcis sexuncem, acaciae sexuncem. Excipe plantaginis succo, aut uino austero, & pastil-

A a los

los drachmarum quatuor, aut trium, aut duarum informa, atque pro ægri uiribus infunde cum uino myrtite. Eras autem hoc modo ipsum praparat. Auripigmenti besslem, acaciæ trientem, calcis trientem. Pastillus alius, dysentericis commodus, qui euestigio aluum sistit, quod multo experimento constat. Bituminis, auripigmenti, sandarachæ, aluminis scissilis, squamæ æris, cuiusque drachmas quatuor, chartæ ustæ drach. x., calcis drach. viii., succi hypocisthidis drach. iiii., balauftiorum drach. iiii., opij drach. ii. Cum uino myrtite subige, ac utere ueluti in Nymphodoti pastillo prædixi. Pastillus ex subere appellatus, quo ueluti præter opinionem admirando utor. Gallæ ustæ, chartæ ustæ, suberis ex uase uini ueteri accepti ac usti, panis aridi usti, singulorum drach. x. v., auripigmenti drach. x. x., sandarachæ drach. x., calcis uiuæ drach. x., acaciæ drach. v., cerusæ drach. v., spumæ argenti drach. iiii., omphacij drach. iiii., fecis uini ustæ drach. v. Cum uino adstringente subige & informa pastillos drachmarum iiii., & iiii., & ii. In principio autem hos cum plantaginis aut sanguinariæ, aut perdicij succo infundito; aut cum aqua tepida, si hæc non adsint: si uero morbus fortis sit & in uigore consistat, cum fœni græci aut lini seminis decocto infundito; in declinatione autem cum myrti & rubi decocto ex uino. Et in pueris quidem cyathorum duorum mensura; in fœminis, trium: in uiris uero qui ad perfectam ætatem accesserunt, quatuor infundatur. Pastillus Alepiadæ, dolorem summouens, somnumque inducens. Diuturnis dysentericis adfectionibus euestigio auxiliatur, si absit febris. Chartæ ustæ drachm. iiii., auripigmenti, sandarachæ, squamæ æris, aluminis scissi, omphacij, lycij, acaciæ, succi hypocisthidis, calcis uiuæ cuiusque drach. v., opij drach. ii., croci drach. ii. Vino myrtite excipe & in pastillos redige, quatuor & trium & duarum etiam drachmarum. Iuxta ægri uires cum passi cretici cyathis vi., his qui integre sunt ætatis infundito. Pastillus alius dysentericus. Auripigmenti sextantem, sandarachæ quadrantem, squamæ æris unciam i., calcis trientem, aluminis scissilis sextantem, chartæ ustæ quincuncem, omphacij sextantem, acaciæ sextantem, succi hypocisthidis sextantem, thuris unciam i., opij quadrantem. Vino myrtite aut aliquo alio austero excepta subigito. Quod si quis infusum non cōtineat, sed statim ipsum reiecit, omnino morti propinquum iudicato, quemadmodum sæpe iam sum expertus. Infundito autem ex eo uelut ex præcedente drach. i. tantum. Pastillus, thronus Marcellius appellatus. Auripigmenti quadrantem, sandarachæ trientem, lentisci trientem, balauftiorum quadrantem, alij sextantem habent, opij sextantem, calcis besslem, omphacij sextantem, succi hypocisthidis quadrantem. Vino austero subige, & utere ut pastillo Nymphodoti. Pastillus, Lycos appellatus, ad dysentericos. Sandarachæ drachmas sex, auripigmenti drach. x. ii., calcis uiuæ drach. x., æris usti drach. x. x., acaciæ drach. vi., cadmiæ drach. x. ii., chalcitidis crudæ drach. x. ii., rhois culinarij aut quo coriarij utuntur drach. iiii., succi hypocisthidis drach. iiii., baccarum myrti nigrarum recentium drach. vi., foreos drach. i., misyos crudi drach. i., gallæ drachmas viii., omphacij drach. i., lycij drach. viii. Vino myrtite subigito, affuso etiam plantaginis succo, & pastillos drachmarum iiii., & iiii., & ii. formato: cum uino uero adstringenti infundito, ægri habita cura, uelut in Nymphodoti pastillo est prædictum. Pastillus magnus, dysentericos præclare & feliciter uauans, etiam si extremè sint affecti ac desperati, utpote in quibus carnosæ & feculentæ prodeunt egestionēs. Infunditur autem cum succo oryze, ita ut adeps hircinus & myrtus cum ipso decoquantur. Ceterum in his qui retinere non possunt,

sunt, muria oliuarum albarum præmittenda, & post horæ interstitium pastillus infundendus, stomacho & capite præmunitis, uelut in Nymphodoti pastillo est prædictum, anus item ab infusione fomentis integatur, Prodest etiam ad caua ac profunda crustosaq; ulcera, itemq; nomas pudendorum. Verum in dysentericis præstat, ut cum reliquis prædictis remedijs, manus ægri latis & longioribus fascijs cōstringantur, supernè ex humeris exordio facto, & in summos usq; digitos ligamento protenso: non parum enim hoc ipsum ad fluxus repressio- nem facit. Porro ipsius pastilli compositio hoc modo habet. Balaustiorū re- centium, malicorij, rhois quo coria tinguntur, phyllorum, singulorum drach- mas IIII, isatidis tinctoriæ drach. III, alij dra. VI, habent, spinæ Aegyptiæ dra- chmas IIII, seminis hyoscyami drach. III, farinæ lentium drac. VIII, suberis ex uale uini ueteri accepti ac usti drach. IIII, gallæ omphacinæ à teredinibus non corrofæ drach. IIII, rosarum siccarum drach. VI, floris recentis rosarum drach- mas sex, croci drach. IIII, myrrhæ drach. VIII, lycij drach. VIII, bituminis dra- chmas sex, picis siccæ drachmas sex, acaciæ drachmas octo, hypocisthidis dra- chmas octo, gummi drach. XX XII, thuris masculi drach. VIII, omphacij succi sicci drach. IIII, opij drach. II, amyli drach. II, solearum ueterum ustarum drach- mas quatuor, cornu cerui usti drac. IIII, ossiculorum oliuarum ustorum, ossicu- lorum palmarum ustorum, fecis uini ustæ, spongiarū nouarum liquida pice & cedria imbutarum ac ustarum, ostreorum ustorum, æris usti, squamæ æris, ling. drac. II, lapidis gagatæ, coralli, rubiginis ferri, aut scoriz, cuiusq; drac. IIII, alu- minis scissilis in testa exusti drach. II, aluminis quo tinctiores coriorum utun- tur drach. II, auripigmenti drachm. III, chalcitidis crudæ drach. III, sandarachæ drach. II, gypsi loti drach. II, calcis uiuæ drach. III, minij sinopici sesquidrach- mam, atramenti communis drach. II, diphrygis drac. II, & dimidiam, spumæ ar- genti drach. II, & dimidiam, ochræ drachm. II, & dimidiam, atramenti Indici drach. II, & dimidiam, plumbi drach. III, cerusæ sesquidrachmam, terræ samiz drach. III, terræ cimoliz drach. II, pompholygis drachmas duas, succi mandra- goræ & plantaginis quantum ad hæc suffecerit. Compositio quidem igitur pastilli hæc est, in qua totus ille simplicium pharmacorum cumulus, ex quin- quaginta quinque rebus constat, præter herbarum ex aqua decoctionem, quæ ad huius pastilli subactionem accommodatur. Cæterum apparandi modus huiusmodi est. In pilam thebaicam primum æs, & æris squamam, & spumam argenti, calcem, lapidem gagaten, corallium, rubiginem ferri conijcito: ostrea etiam contusa & cribrata probè & contentè terantur, donec in puluillum redi- gantur: deinde adiecta chalcitide, sandaracha, auripigmento, cornu ceruino, oliuarumq; ac palmarum ossiculis, spongiæ & alumine, rursus terito, affusis etiam spissamentis, quæ stymmiata Græci appellant. Alumen autem hoc mo- do uritur. Alumen in ollulam nouam coniectum super prunas ponito, & ubi diffunditur ac liquefit tollito, & frigefieri finito, & hoc modo tritum adijcito. His deinde tritis, minium, diphryges, atramentum indicum & commune, o- chran, plumbum, terram samiam, cimoliam, cerusam, pompholygē, reliquaq; omnia metalla addito, & contentissime sub caniculæ aestu conterito, donec ex spissamentis quartam aut quintam addideris partem. Postquam uero quo- dam modo ad collyrij formam fuerit redactum, arida contusa & arctissimo cribro excussa adijcito, ueteribus soleis simul cum aridis contusis: deinde ad- ditis spissamentis rursus similiter ut priora terito, sæpe instillatis spissamentis. Vbi autem trita inauerint, in altero mortario primum crocum cum duobus

succis, mandragoræ uidelicet & plantaginis, terito: atque ubi tritum fuerit, reliqua adijcito, myrrham scilicet & thus, omphacium, acaciam, hypocisthidem, gummi, lycium, opium, picem, bitumen, & lentium farinam, quodlibet eorum prius per se aridum in tenuissimum puluerem redactum. Cæterum ubi optimè in mortario fuerint trita, duobus succis largè affusis, quo etiam ad aliorum exceptionem sufficiant: de cætero iam antè trita metallica sic arida terito ac admisceto: omnibusq; probè permixtis ac subactis, pastillos ad duarum magnarum fabarum magnitudinem formato, & utitor aliquando quidem cum oryza succo, aliquando uero cum uino, aut aliquo conveniente liquore. Ego uero ob mandragoræ uiridis succi inopiam, aridi succi drachmas quatuor addo. Porro spissamenta cum quibus pastillum conteris, hoc modo apparato. Rubi, myrti, florum mali punici, radices symphyti, radices capparis, foliorum salicis, comæ cupressi, omnium æquales partes cum aqua coquito, & utitor. In his ipsis uero spissamentis, aut etiam alijs, spongiam aut glomos rigato, cumq; eis sedem foueto, assidue quidem, maximè uero à pastilli infusione. Siccum dysentericum. Terræ lemnia quæ sphragis appellatur, terræ asteris, amyli, gummi, thuris, æquales partes omnium in puluillum redactas, cochlearij mensura infundito, spissamentis etiam quibusdam adiectis. Indus autem Medicus hoc utitur. Terræ lemnia quæ sphragis, buccinorum ustorum, thuris, singulorum æquales partes commisce, indeq; cochlearia duo cum lotini corticis decocto, aut pinus, aut mespili, infundito. Quæ dysentericis subdantur. Glans quæ dysentericis subditur. Theosebij. Opij drachmas x i, myrrhæ, castorij, croci, thuris, hypocisthidis, cuiusque drachmas sex, styracis drachmas tres, uino excipito. Alia glans, siue collyrium. Opij, croci, myrrhæ, aluminis scissilis, singulorum æquale pondus cum uino ueteri subige, & collyria drachmae unius pondere informa, ex quorum usu & subditiōe diuinam efficaciam admiraberis. Optimè facit & ad dysentericos opobalsamum tomento exceptum & subditum. Spissamenta, quæ dysentericis cataplasmatibus uice impōnuntur. Florum mali punici, gallarum, malicorij, myrti sicca, lentisci, mannae, acaciae sicca, æquales omnium partes in puluerem redigito: quem sic cum adseruato ac utitor, ita ut usu expetente cum uino decoctum imponas: magis uero mitigatorium fiet, si sapa pro uino accipiat. Illitio, ad coeliacos & dysentericos. Acaciae quadrantem, gallæ, cœnanthes, malicorij, balsamiorum, aloës, succi hypocisthidis, mastiches, aluminis rotundi, omphacij, singulorum unciam unam, cum uino subigito, ac formato pastillos: quibus cum uino aut succo aliquo conuenienti utaris.

Epithemata dysenterica.

Epithema dysentericis commodum, Marciani. Mala cotonea repurgata decem, in uino decoquito, diligenterq; terito, ac tritis aloës unciam unam, mannae sextantem, myrrhæ siccae trita quadrantem infarcito, deinde cere sextuncem, unguenti nardini libram unam addito. Ceratum ipsum liquefacito, & refrigerato, tritisq; adijcito, ac utitor. Epithema ex cœnanthe, Philumeni, stomachicis, & coeliacis dysentericisq; in principijs commodum. Cœnanthe sicca drachmas x viii, gallæ, acaciae, rosarum siccarum, omphacij, singulorum unciam unam, aluminis rotundi sextantem, aloës sextantem, rhois syriaci trientem, olei myrtei libram unam, ceræ libram i, picis libram i. Quidam uero singulorum libras duas accipiunt. Arida uino ueteri adstringente rigato, deinde liquecibilia adijcito, ac simul emollita excipito, Efficaciter auxiliatur ad in-

Cap. l

ad interaneorum fluxiones, & stomachi fastidia ac exolutiones, & ardores.

Aliud, per multam experientiam. Rosarum, cœnanthes, acacię, gallę, aluminis scissilis, singulorum quadrantem, aloës sex uncem, rhois culinarij libram unam, cerę, picis, olei myrtei, cuiusque libram unam, uini quantum sufficit.

Epithema ex lixiuio. Ammoniacy thymiamatis, nardi celtici, croci, cardamomi, bdellij, cyperorum, singulorum unciam i. lixiuij ex cinere lignorum uitis sesquiunciam, cerę quadrantem, unguenti nardini sex uncem, uini quantum suffecerit. Apparatur autem & hoc modo. Croci unciam i. aloës quadrantem, styracis quadrantem, cerę sextantem, lixiuij ex cinere lignorum uitis, unguenti nardini, cuiusque uncias xii, uini quod satis est. Illud superius apparatus, & præ cœnanthes inopia, folia uitis conieci, in æstate quidem uiridia, in hyeme uero eiusdem uirgulta, reliquis siccis, contulis & cribratis. Epithema, Clidion appellatum: Cyrilli. Acacię, gallarum, thuris, aluminis scissilis, aloës, rhois culinarij, hypocisthidis, myrrhę, balaustiorum, cœnanthes, rosarum siccarum, singulorum unciam unam, cerę dodrantem, picis, olei myrtei, cuiusque dodrantem, uini spathitę quantum satis est. Ex libris Philumeni, epithema Mnaseę, clidion appellatum, ad cœliacos & dysentericos. Gallę omphacinaę, succi hypocisthidis, aluminis rotundi, acacię, rhois rubri, malicorij aridi, seminis apij, singulorum unciam i. uisci quercini drachmas quatuor, ammoniaci thymiamatis drach. iiii, picis siccę drachmas xx, cerę drachmas viii, olei myrtei aut lentiscini drach. xx, gallas & malicorium confusa ac cribrata in uini cyathis nouem decoquito, assidue agitando, donec tertia pars relinquatur: deinde in mortarium coniecta terito, ac reliqua similiter in puluerem reducta inspergito: ammoniacũ uero aceto diluito, & uiscum cum modico oleo emollito, picis uero ac cerę liquefactis cum residuo oleo, & ab igne ablatis, uiscum adijcito, ac unito, & simul tritis affundito, fortiterque contundito, ac utitor.

Andromachi epithema, ad dysentericos & cœliacos. Seminis hyosciami albi, seminis apij, cuiusque drach. iiii, anisi, floris rosarum, succi hypocisthidis, balaustij, rhois rubri, cuiusque drach. ii, opij drachmam unam, croci drachmam i. contere, ac uino myrtite excipe, informaque pastillos, quos in umbra siccabis: usus uero tempore, ex eis quantum suffecerit contundes ac cribrabis, & subiges, linteoque infartum uentri impones. Dropaces. Dropax ex tertio libro placitorum Sorani. Resinę libram i. picis siccę lib. i. nitri, bituminis, sulphuris uiui, cuiusque libras ii. pyretri libras ii. ueratri sextantem, olei hemina unam. Si uero efficacius reddere uelis, adijce & piperis trientem, adarcę sextantem, staphidis syluestris sextantem. Alius dropax. Picis sex uncem, resinę pinus torrefactę sex uncem, myrrhę, sulphuris uiui, nitri, cuiusque unciam unam, pyretri quadrantem, adarcę unciam unam, euphorbij sextantem, alij drachmas duas tantum habent, adipis taurini sex uncem. Utendum autem & ad hæc rubefaciētib. cutem, phœnigmis a Græcis appellatis, itemque sinapismis, in tertio Sermonē descriptis, in declinatione præsertim dysenterię, quo totum malum penitus destruat.

Cap. LI

De lienteria, seu intestinorum leuore.

Lienteria, quemadmodum ipsum nomen indicat, leuor quispian intestinorum est, qualis etiam forinsecus in corporis cuticula, ex cicatrice cōtingere solet. Oboritur autem frequenter, dysenteria magna præcedente, & ex profunda ulceratione, cicatrice densa & leui succedente: quę deinde ob densitatem quidem suam, ciborum per corpus digestionem fieri non permittit, quum sa-

Aa 3 nè ue

nē uenarum ora sint ueluti obturata: uenarum inquam, quę alimentum ex intestinis ad se auellunt, Ob leuorem uero, cibum statim prius quā permutatio nem & perfectam concoctionem admittat, dilabi sinīt. Cāterum lienteria ipsa propriē ex permutantis cibos ac digerentis facultatis debilitate contingit, cuius signum est, quod cibi crudi & nihil immutati excernuntur, quę ratio & ex hoc amplius corroboratur, quod non solum ā dysenteria hęc affectio oboritur, sed & post frequentia uoluulosa tormina, & post longum profluuium uentris: aliquando etiā aqua inter cutem per uentrem euacuata, lienteria confecti solet. Ex quacūq; igitur causa lienteria orta sit, aēri cibum non sentiunt, & malum corporis habitum acquirunt, quod utrunque malum incorrigibile existit. Succedit enim aēris assidua excretio cruda, colore subalbida, inaequalis, & aquosissima, citra sanguinis ac bilis complexum. Adest autem simul & ardor per tota pręcordia se dilatans, quem cibi fastidium concomitatur. Videtur autem bonum & amicum signum in eis ructus acidus esse. Indicat enim tunc quiddam quippiam factum esse, & uentrem ac intestina nō uelut inanima cibum finire pertransire. Itaq; quum eiusmodi sit affectio, facile est intelligere, quod uim retentiuam, ac concoctoriā facultatem tum uentris, tum intestinorum, omni modo refocillare oportet, quod sanē per ciborum conuenientium exhibitionem fieri potest, perq; diætā restituendis ac refocillandis uiribus aptam, & ut simpliciter loquar, eodem medicatiōis ductu utendum est, quem ad cōliacos & dysentericos habes pręscriptum. Cāterum quod dignum indicatione hic uisum est nobis: acrium rerum comestiones frequentiores eis aptę existunt, & maxime quibus cicatricem factam esse coniectamus: acrium enim rerum comestio uelut refractionem quandam cicatricum operatur: quin & insitum calorem reuiuificat, & concoquendi facultatem quodammodo refocillat. Porro uomitus ā cœna uentrem etiā in melius transmutant, & actionis suę commonefaciunt: frequentes quoque dropacum admotiones ad manus ac crura, thoracemq; & uentrem, itemq; rubefacientia ex malagmatis & ex sinapi eis commodę existunt. Potiones etiā quasdam ad dysenteriacos & cōliacos pręscriptas lientericis prępotandas exhibere conuenit, quale & hoc catapotium existit. Catapotium dysentericum, maxime uero lientericis conueniens. Malicorij, myrrhę, cuiusq; drachmas octo, aluminis scissilis drachmas quatuor, succi hypocisthidis drachmas quatuor, cum aqua catapotia ad erui magnitudinem ex his formato, indeq; quinque aut septem iuxta aēri uires exhibeto.

NONI SERMONIS FINIS.

INDEX CAPITVM DECIMI AETII SERMONIS;

| | | | |
|--|------------|--|------------|
| De debilitate iocinoris, & his quibus sanguis per uentrem defer- tur. | Caput i | De ictero seu morbo arquato. | Cap. xvij |
| De oppilatione hepatis. | Cap. ij | Cura arquati. | Cap. xvij |
| De hepatis inflammatione. | Cap. iij | De malo corporis habitu. | Cap. xix |
| De hepatis abscessu. | Cap. iij | De hydropeliue aqua inter cutē. | Cap. xx |
| Cura hepatis exulcerati. | Cap. v | Ascitæ ac tympanitæ hydropis cura. | Cap. xxi |
| De hepate in scirrhum indurato. | Cap. vi | Epithemata hydropica. | Cap. xxij |
| De lienis affectionibus cognoscendis: | | Malagmata quæ euacuant humorem. | Cap. xxij |
| ex libris Philagrij. | Cap. vij | Epithemata quæ post euacuatos hu- mores adhibita, pro glutino sunt. | Cap. xxij |
| De intemperiei splenis cura. | Cap. viij | | |
| De inflatione splenis. | Cap. ix | | |
| De splenis inflammatione. | Cap. x | Aquam ducentia remedia hydropicis ualde commoda. | Cap. xxv |
| Cura splenis in scirrhum indurati. | Cap. xi | Quæ ad ciendam urinam hydropicis bibuntur. | Cap. xxvi |
| De splenicorum uisione. | Cap. xij | Cura post euacuationes. | Cap. xxvij |
| Splenicorum diæta. | Cap. xij | Cura hydropis qui propriè subtercus appellatur. | Cap. xxvij |
| Cura eorū in quibus splen frigida, uen- ter uero calida affectione laborat. | Cap. xiiij | Cataplasmata ex lib. Asclep. | Cap. xxix |
| Cura splenicorum quos tussis infestat. | Cap. xv | Chirurgia hydropis subter cutē. | Cap. xxx |
| Cura eorum quibus splen in magnitu- dinem excreuit, simulq; durus est. | Cap. xvi | Reliqua prædictorum cura. | Cap. xxxi |
| | | Communis diæta omnium hydropi- corum. | Cap. xxxij |

AETII MEDICI GRAECI CONTRA

CTAE EX VETERIBVS MEDICINAE, TETRABIBLI,
siue Quaternionis Tertij sermo Secundus, & ex ordine Decimus.

De dispositionibus iocinoris ac lienis, eorundemq;
affectionibus.

DE DEBILITATE IOCINORIS, ET HIS QVIBVS SAN-
guis per uentrem deferitur: Galeni. CAP. I

INTEMPERIES quidem causæ sunt, ex quibus iocinoris debi-
litas producit, dispositiones autem diuerfas in ipso faciunt:
quum enim citra inflammationem aut scirrhum circa hepar,
propter solam debilitatem, sanguinis effluxio contingit: tunc
sanè propriè hepaticos ipsos agros appellant, quemadmo-
dum coeliacos & stomachicos uocare consueuerunt, eos qui
neque inflammationem, neque aliquem alium præter naturam tumorem in
uisceribus habent. Calidæ itaque intemperies, tum eos qui prius adsunt humo-
res, tum etiam hos qui per uenas mesenterij ad ipsum hepar deferuntur, adas-
tant ac comburunt. Frigidæ uero intemperies, humorē, qui iam in ipso conti-
netur,

Aa 4

netur, crassum & lentum ægreq; mobilem reddunt; eum uero qui defertur, pituitosum ac crudum & semicoctū. Ceterum sicca intemperies, licciores & densiores humores facit. Humida autem tenuiores & magis aquosos. Itaq; ubi calida intemperies circa hepar constiterit, colliquationes fiunt, primum quidem humorum, deinde etiā carnosæ ipsius hepatis substantiæ, bilisq; per uentrem euacuatur foetens ac crassā, abundeq; colorata, uelut in pestilentibus febribus fieri solet. Vbi uero frigida intemperies affuerit, neq; assidue excretiones, neq; multæ fiunt. Diuturnum autē fit malum, & per dies aliquot acceruatim eis profluet uenter: ceterū egesta non similē putorē habent his quæ per calorem sunt colliquata, neq; colorem etiā, neq; cōpagem, sed speciē præ se ferunt sanguinis putrefacti & in grumos congelati: & si quis diligenter inspiciat, uelut limus & fex sunt sanguinis crassioris: cōsimilia enim atræ bili colore apparent, quin & plures & iudicatu difficiles colores iuxta eandem dispositionē in excrementis apparent. In sicciore autē intēperie, recrementa adhuc sicciōra uidebunt, egrigiq; magis sitient. In humida uero, humidiora & plura crunt recrementa, sitisq; minus infestat. Quodcumq; igitur egesta uideris loturæ carnis recens maciati animalis similia, ueluti si quis cum aqua sanguinē confudisset, certissimū signū debilitatis ipsius hepatis habebis: eodē modo si uelut fecem sanguinis conspexeris per sedem excretā, hepaticum & hocce signū esse scito. Si igitur sanguis tenuis & serosus destillat, ægrī uisceris signum iudicato: sin uero uelut fex fuerit, supercalefacti & sanguinē superaffantis: incipit enim aliquando etiā circa febrem in frigida scilicet intemperie ipsa adfectio, quo tempore tenue sanguinis serum primum excernitur: temporis autem progressu, corrupto circa uiscus sanguine, leues febres accedunt, quarū quum inexperti medici negligentes sint, atq; egrum omnino febri carere putant, quum nihil per uentrē excretū sit, ipsum ægrū lauant, cōceduntq; negligētiori diætā uti, atq; ita uenter rursus corruptū sanguinē excernit. In huiusmodi igitur affectionibus primus curatio nis scopus sit, ut intemperie ad contrariū deducamus. Calidā enim dispositionem semper refrigerare oportet, frigidā uero calefacere, similiterq; humidā resiccare, & siccam humectare. Ceterū omnibus hepaticis remedijs, tum quæ per os sumuntur, tum quæ forinsecus imponuntur, aliquid ex adstringentibus ammiscere oportet, quo firmitas uiscerū cōseruetur. Atq; in stomachicis idem facere non similiter cōducit, quum in ipsis adstrictoria qualitas aliās dominet. Fomenta igitur in hepatis debilitate cōuenientia ex oleo sunt, in calida quidē affectione, ex chamæmelino, rosaceo, et lentiscino, absinthio, aut palmis, aut ali quo alio consimili in oleo decoctis. In frigida uero dispositione, ex unguento nardino, cui thus & samfucus sint infarta. In humida autem intemperie, isdem oleis magis discutientia ac resiccantia incoquenda: uelut est iris, cuminū, ac ruta. In sicca demum intemperie, balnea sufficiunt dulcium aquarū, & humectas diætā cōmoda erit, cerata etiam atq; epithemata fomētis similia sint, ex palmis scilicet, malis cotoneis, styrace, mastiche, ac aloë: in frigidioribus etiam polyarchia conducunt, similiterq; in humidioribus. Porro in potu uti conueniet plerisq; eorum quæ in hepatis inflammatione sunt relata, siquidem calida intemperies fuerit: uelut est seridis ac intybi succus, senecionis succus aut decoctum, perdicij succus, mel rosarū, & quæ his similia existunt: quin & Philonis antidotus semel tantū exhibita, omnē aliquando calidā hepatis intemperie mirabiliter sanauit, quod etiam Philo de ea testatū reliquit. Vbi uero frigida in hepate intemperies fuerit, calefacientibus ac firmitatem addentibus utendū est, uelut

est nardi spica, capniū, quæ & chelidonia herba circa sepes enata, semen pelecini, & quæ his similia existunt. Vtilissimū & his nardinum unguentū, quotidie mane cochlearij mensura ieiunis potatū, & à cœna ante somnum eodē modo. In humida autē intemperie, simpliciora ex eis quæ ab oppilatione liberāt, exhibenda, & quæ à proprietate totius substantiæ efficaciam existunt, uelut est, lupinū hepar, quod sanè diligenter tritum drachmæ unius pondere cum uino dulciaqua calida diluto præbetur. Hoc enim multiplici experimento cognitū omnibus hepatis intemperiebus cōmodum existit; utpote proprietate totius substantiæ hanc efficaciam habens, non calefaciendo, aut refrigerando.

De oppilatione hepatis, in quibus plurima remedia.

Cap. II

A flatibus nebulosis & cōcoctu difficilibus; aliquando autē & à crassis humoribus uiscosisq̃, in finibus uenarū ex sima hepatis parte enatarum, per quas ex uentre ac intestinis alimēti digestio ad hepar cōtingit, oppilationes fiunt. Consequitur autē ad ipsas, grauitatis circa dextrum ilium cum dolore sensus, aliquando quidem obtusa, aliquando uero uehementis, & quandoq̃ quidē absq̃ febre, quandoq̃ cum febre. Crassa enim & uiscosa ac multa, omnino amplius reliquis oppilant, & maxime si ægri à cibo uehementiori motu utantur: si uero acris sint & multa quæ in cibo sumunt, dolor ex oppilatione uehementior fit, quum obstrata corpora simul & tensionem perferant, simulq̃ pungantur. Caterum quum uaporosi & crassi flatu multitudo coaceruetur, quæ exitum non habet, & grauitatis solum, sed & distentionis sensus oboritur. Quare attenuantium & oppilationē dissoluentium quàm celerrimus requiritur usus: oppilatio enim inueterata non tantum in hepate, sed in omni membro putrefactionē operatur, febremq̃ accendit. Præclarè autem & citra molestiā ab oppilatione liberat, simulq̃ firmitatē tum hepatis, tum stomacho addit, pelecini qui in frumentis nascitur semen, tritum cochlearij mensura, cum uino aut aqua mulla in potu acceptum, capniū item, quod & chelidoniæ nomen inuenit, succo eius expresso & desiccato: reponitur autē is in pastillos reductus, & semel quidē exhibitus dolorem omnem adimit: ter autem præbitus, in totum ab affectione liberat, ultra hoc quod & firmitatē uisceribus addit: decoctum quoq̃ huius herbe potatum similem efficaciam habet, etiam si ualde febricitent ægri: aliquando autē herba ipsa exiccatur, contusaq̃ & cribrata cochlearij mensura exhibetur. Aliud, Lupi hepar siccum drachmæ pondere, cum piperis granis 1x, ac myrrhæ magnitudine fabæ, in passo calido datum, confestim auxiliatur. Aestatis autē tempore, alternis diebus, ter potandum præbeto. Liberat ab oppilatione etiā eupatorium, simulq̃ firmitatem addit, similiter quoq̃ stœchas, tum cocta, tum sicca tritaq̃ data: plantaginis item radix, & semē, foliaq̃ sicca trita, siue per se unum quodq̃, siue simul exhibeatur. Lauri cortex tritus potatus, spica nardi, fructus pistaci, amygdalæ amaræ, anthemis siue chamæmelum, anagallidis quæ carum leum florem habet, succus, radices acori, eryngij, radices dulcis decoctum urinā ciet, & aluū emollit. Radix dracunculi uiscera omnia repurgat, crassosq̃ & infar uiscitena cēs attenuat humores. Filicis succus cochlearij mensura ex aqua mulla potatus, hepar repurgat, oraq̃ meatuum ac uenarum aperit, citra manifestam calefactionē. Præscriptū autem iam antè est de his quæ tum simas, tum gibbosas, hepatis partes ab oppilationem remouens. Radices chamæpityos drachmas IIII, radices cichorij dra. IIII, cōtundito, ac melle cocto excipito, nucisq̃ pon-

ponticæ magnitudine præbeto: aquæ etiam calidæ cyathos tres ab eius exhibitione absorbendos dato. Cæterum non modo radices horum hepaticis opitulantur, sed & succus & decoctum. Pastillus hepaticus, ex amygdalis amaris. Seminis anisi, apij, afari, amygdalarum amararum decorticarum, comæ absinthij, singulorum drach. iiii. apparato, & cum aqua pastillos formato, ex quibus drach. i. febre carentibus cum uini diluti cyathis iiii. præbeto: febricitantibus autem, cum aqua mulsa, Vrinam ciet, & placide calefacit. Aliud hepaticum ualde commodum. Seminis pelecini, capni, costi, cuiusq; drac. v. contundito ac cribrato, & cochleare i. ex aqua mulsa dato. Præclare enim summovet oppilationem. Aliud hepaticum pulchrum, cuius uilitatem ne contemnas.

Lenticulam torrefactam ac probe tritam cochlearij mensura ex uino bibendam præbe. Commodum est hoc & lienis, ex posca, aut aceto mulso. Aliud, experimento constans. Comæ absinthij, piperis, costi, cassiæ, radices gentianæ, amygdalarum amararum, singulorum unc. i. fœni græci sextantem, seminis pelecini sextantem. Exhibeto cochlearium quomodocunque uelis. Aliud, ad hepatis oppilationem. Cacanij scrupulos duos, alij octo habent, costi scrupulos sex, spicæ nardi, iridis, phylli, lupinorum siccorum, baccarum lauri, fœni græci, rhei pontici, singulorum scrupulos sex, piperis, phur, afari, cuiusq; drachmas quatuor, quod si picis siccæ scrupulos tres ammisueris, efficacius operatur.

Aliud simplicius, quo assidue utimur, ualde admirandum. Cacanij sextantem, fœni græci sesquunciam, piperis unciam unam, cyperi unciam unam, costi unciam unam: contundito & cribrato, ac cochlearium unum cum condito præbeto. decumbat autem æger super affectam partem. Aliud. Potamogeronis sicci drach. ii. comæ absinthij drachm. i. crôci, costi, spicæ nardi, cuiusque drachmas duas, amomi drachmam i. datur cochlearij mensura aridum.

Aliud. Piperis drach. iiii. dorcadiadis herbæ, quæ & muscij appellatio nem habet unc. i. costi trientem, alij drac. iiii. contundito, cribrato, & cochlearium in potu exhibeto. Aliud Philagrij. Rhei pontici unc. i. castorij scrupulos tres, farinæ lupini scrupulos iiii. piperis grana vii. contundito, cribrato, & mane cochlearium unum præbeto ex condito.

De hepatis inflammatione, & cognoscendo utrum hepar, an musculi eius sint inflammati. Cap. iiii

Galenus, Hepar consimiliter ut splen & inflammatur & abscessu suppuratur, uerum raro scirrhus, hoc est, abscessu duro afficitur. Inflammato itaq; hepate, dextri illius tumor consequitur, & maxime si gibbosa parte inflammatus fuerit, facilius per tactum cognoscitur tumor, grauitasq; coincidit illi totum distrahens, & dolor in dextram usq; clauiculam ac scapulam pertingit, ut conuelli penitus æger uideatur: linguæ color in principio quidem rubicundior fit, postea uero denigrescit: appetitus deiectio, fastidiumq; cibi uehemens, & implacabilis sitis: uomitus quibusdā contingit bilis puræ atq; etiam uirellinæ, post autem & æruginosæ: aluus autem ipsis est adstricta, si sanè cum uisceris debilitate inflammatio est oborta, febris adest acuta inæqualis, quæ plerumq; ad uesperam & noctem exacerbatur: sequitur & spirandi difficultas, tussiculæq; paruæ, ut plurimum siccæ, per quas nihil omnino reieciatur. Aliquando autem per uomitus biliosa pauca quædā reieciuntur, quæ res plerosq; decepti, qui ex pleuritide hanc educationem fieri putauerunt. Cæterum & costæ nothæ ut plurimum cōdolitant, & color corporis subuertitur in arquati morbi speciem permutatus: singulus quoque conse-

consequuntur. Accessionis autem tempore quidam delirio apprehenduntur, & acrioriorum excernunt; & sanè inflammationes quæ iuxta simâ hepatis partem cōtingunt, plus fastidij, & nausæ, & uomitus biliosos, ac uehementē sitim inducunt: quæ uero in gibba parte fiunt, dolores circa respirationem intendunt, tussiculasq; irritant, clauiculamq; magis cum dolore conuellunt. Quandoquidem autem musculis hepatis incumbentibus inflammatis, quidā decepti hepatis eam inflammationē esse suspicantur, necessarium fuerit distinguere inter has affectiones. Hepate etenim inflammato, tumor secundum lineamenta rotundus, figura uidelicet ipsius hepatis, succumbit, quiq; ad corporis decubitus simul conformatur: maior enim apparet corpore ad sinistrum latus reclinato: minor aut rursus ad dextrum deuoluto: nimirum hepate sub nothas costas cedente, neq; uisui, neq; tactui similiter succumbente, amplius autem in hepatis inflammatione, incumbens cuticula, naturali modo habere cōspicitur, musculis autem inflammatis, cutis circūdenditur, ut si quis digitis apprehensam attrahere uelit, ea minimè sequatur. Propriissimè autē tactus discernet siue in alto, siue in superficie inflammatio ipsa cōsistat. Porro hepate inflammato, sanguinis de tractionem experiri oportet à cubito, si nihil id fieri præpediat. Incidenda autem in dextro cubito uena interna, ita ut substratam arteriam obseruemus, quæ si non appareat, media: si uero neq; ipsa appareat, superior. Multitudinem autem extrahendi sanguinis, ex corporis reperies qualitate, ætateq; & natura, horumq; temporis, ac regione, ampliusq; ex uiribus ægri: quæ si id ferre queant, semel quantum satis est, detrahendum, si uero non, per uices partitum. Ceterum incisio ipsa oportunè in prima & secunda die cōtingit: si uero urgeant dolores & adsint uires, etiā septima uenæ incisionē facimus, qua facta post modicū interuallum, simplici clystere euacuamus, maximè si non sponte egerat aluus. Sequenti à uenæ sectione die, cucurbitæ cum scarificatione affigendæ, rursusq; post unam diem cucurbita apponendæ: non pauci enim à secunda earum adhibitione opem senserunt magis quàm à priore. At uero ante uenæ incisionē & post eam, fomentis utendū est ex lanis succidis oleo imbutis & impositis: cōuenit & ex passo cretico fomentū cū rosaceo aut lentiscino aut melino aut cœnathino. Optimū aut fomentū hocce est. Chamemeli, anethi humidi, si adest, rutæ uiridis, seminis lini, cuiusq; unc. i. calicum papaueris numero x. olei sextariū i. semen lini contusum in linteolo colligato, & cum alijs in cacabum cōiectū ad prunas decoquito donec uires suas distribuat, deinde olla in feruētī cinere collocata, ex ea multo tempore cōfidenter foueto. post fomentorū irrigationes cataplasmatis uti oportet, ex semine lini & sœni græci, farinaq; hordeacea aut triticea, his uel omnibus uel uno aliquo ex eis, aut quibusdā in aqua mullā decoctis, ammiscendū etiam absinthiū & mastiche ac melilotū. Quod si uehementior sit ardor, etiam ea quæ astringunt sunt ammiscenda, uelut sunt mala cotonea. Oleū uero quod additur rosaceū sit, aut melinū, aut lentiscinū. Si uero feruor adhuc perseueret, cotonea mala cum polenta imponenda. Remittente autē uehementi calore ficus optimas & althææ radicē decoquito, & decocto eorum semen lini, farinasq; hordei, sœni græci, ac lolij infarcito: quod si durior inflammatio succumbat, etiam chamæleonem aut chamæpityn, aut polium, aut asafœtida, aut daucum, eryngijq; tum semē, tum radicē ammiscere oportet, aliquantulum autem & ficus cum althæa decoctæ acritæ cataplasmatis cōnectuntur. Cæterum calidius & magis emolliens reddideris cataplasma, si terebinthinæ, aut resinæ pinus, aut picis quadrantē addas. Brassicæ autem crudæ folia cum mellē

tritā

trita ac impofita, omnes induratas inflammationes diffoluunt. Hinc ad cerata tranfeundū ex oleo cyprino aut glaucino apparata, althææ radicibus fimul admixtis. Vtendum etiam ex palmis cerato, hepatis inflammationibus fimul ac commodato, maximè fi ftomachus per confenfum fimul fit affectus, & colicæ coafflictæ. Habet autem hoc modo. Palmas interiore medulla exempta, diligenter contundito, ac cum pari cerato rofaceo in mortario probe cōmittito, ac unito, affuloq; modico oleo rofaceo imponito. Aut myrrhā in uino ueteri adstringente maceratam, palmis ammifceto, & panniculo uestis detritæ excepta imponito. A ceratis ad epithemata ex ftyrace, & ex meliloto, & ea quæ polyarchia appellantur, & iam ante ad colicos & ftomachicos defcripta funt, tranfeundum. Compositio autem epithematis ex ftyrace hæc eft. Styracis pinguis, carnis palmarum, cofti, maffiches, calliæ, fingulorum trientem, fampfuci sextantem, croci femunciam, uux paffæ femunciam, ceræ sexuncem, unguenti nardini beffem. Porro in inflammatione hepatis ubi magni circumftent dolores, etiam pharmaca dolorem leuantia in potu eis exhibere conuenit, ita tamen ut affiduum eorum ufum deuitemus: fimplicibus autem potionibus frequentius utendum: fenecionis itaque decoctum tanquam maximè commodum, aut fucci radiciſ dulcis obolos duos cum aqua calida exhibeto. Aliud. Picridis feridis, aut intybi fucci cyathum unum cum aquæ calidæ cyathis tribus præbeto, mellis etiam cochlearijs duobus affufis. Ad hoc enim quod refertur, ac firmitatem uifceri addit, etiam ora uenarum hepatis repurgat, neq; tamen frigidas intemperies magnopere lædit. Potest autem feridum ac intyborū fubftantia hepati cōmodare, tum fi line humorum, aut ferofi ac uitiatī ſanguinis complexu, intemperies in ipſo fiat, tum fi humiditatis cuiuſcūq; tandē adſit cum intemperie complexus: mellis uero ammixtio humiditatem per urinam excludit. Quapropter etiam exiccata ac cōtuſa utiliter potui inſperguntur, eorum quoq; decoctum potatum magnam cōmoditatem præbet. Quod fi nō in feſter calida aliqua intemperies, ſed obturatione tantum uifcus ipſum uexetur, ex uino albo, tenui, ac uetufto, cum aliquo urinas ciente pharmaco, potata magnificè auxiliantur. Magni etiam pretij in hepatis inflammatione capnij herba, quæ etiā chelidoniā appellatur, ſuccus habetur aut eius decoctum. Auxilia tur & præſcriptus ex amygdaliſ amariſ paſtillus, niſi penitus magna caliditas adſit. Aliud. Cochlearum terreſtrium carnem optime conterito, & uini nigri cyathos tres affundito, calefacito, ac bibendum præbeto. Cæterum hæc iuxta omnem ſuam ſubſtantiam efficacia exiſtunt, quale eſt hepar lupinum, cuius rei magnum periculum fecimus, inquit Galenus, uſus autem eius idem qui cochlearum exiſtit: optime enim cōteritur, & drachm. i. cum uino aliquo dulci præbetur. Hæc enim pharmaca omnibus hepatis intemperiebus conuenire uidentur, quum neq; calidas neque frigidas intemperies lædant: febrientibus tamen lupi hepar melius ex aqua, aut feridis ſucco, aut aliquo conſimili exhibetur. Epithema ex ſtyrace. Coſti unc. i. croci, thuriſ, aloës, ammoniaci thymiamatiſ, maffiches, ſtyraciſ flauī, ſpicæ nardi, cuiuſq; drach. iiii. terebinthinæ unc. i. opobalfami drach. iiii. ceræ trientem. Vtere.

De hepatis abſceſſu: Archigeniſ.

Quod ſi inflammatio ad permutationem aptè ſe habeat, hoc eſt, principium permutationiſ ad ſuppurationem iam ſuſcepit, omnes prædictæ de inflammatione acceſſiones augebuntur: dolores (inquam) & febres, & deliriū, anxietas, deſperatio, cibi faſtidium, & diſplacencia maximè ab eius acceptione. Cap. iiii

bus autem ferè in totum febriles accessiones initium sumunt, præsertim si ad uesperam exacerbationes fiât. Adiuuare igitur permutationem ac puris eruptionem oportet, ut quàm celerrime fiat, ne maiora inde corpora corrûpantur, per usum uidelicet cataplasmatû ex semine lini, aut hordeacea & fœni græci farina apparatorû, admixtis etiâ resina, manna, pice, althææ radice, stercore colûbino, stercore caprino, caricis, et quæ his similia existunt: fomētis aut utendû ex cruda hordeacea farina, & spongijs decocto absinthij, abrotoni, cetauræ, similibusq; imbutis ac expressis: neq; uero inconuenienter emplastra quæ puris permutatione iuuare queunt, adhibentur. Quum aut perfecta suppuratio fuerit, dolores remittent, omnesq; accessiones mitiores apparebunt: cæterum rupturæ tempore dolor rursus magis augetur, quare etiâ tunc rupturam adiuuare oportet, per cataplasmatum ad superficiem attrahentium ac subadstringentium usum, & per portiones calorificas: quales sunt quæ ex pipere & zingibere ac myrrha apparantur. Porro post eruptionem, aliquando quidem per aluû, aliquando per urinas, puris transumptio contingit. Quidam etiâ per os, puris educationem factam tradiderunt: uerum periculosior alijs per os transmissio existit: id uero quod excernitur nigrû est, quâquam et album reperiatur, quod sanè salutare iudicatur. Aliquando aut humor qui ex abscessu promanat, inter pelliculâ uentræ ac intestina amplectentem, peritonæon Græcis dictam, atq; ipsa intestina colligitur: et facile sanè curatur, si quis diducta citissime cuticula humorẽ ipsum excludat, ea maxime parte qua tumor attollitur: aliquando aut rursus post factam isthuc collectionem, transumptio per intestina contingit. Cæterû in his quibus tumor foras prominet, sectionem obliquam supra inguen infligere oportet, ac per eam ipsam humorem euacuare, atq; etiâ ulcus ipsum eluere, et pharmaca liquefacta inijcere, donec perfecte curetur. Neq; uero negligendû, quo & hepari post factam abscessus rupturam, remedia auxiliaria adhibeantur. Primum quidẽ igitur emplastra emolliëntia imponantur, deinde etiâ resiccantia, quale est quod lcesum appellatur, quodq; ex salicibus constat, & quæ his similia existunt. Si itaq; per urinas puris transumptio fiat, consimilibus epithematibus utendum est circa totû ile, & iuxta pubẽ, & tum per cibos, tû per pharmaca urinæ cientia, repurgatio eius adiuuanda. Pepones igitur in cibo eis conueniunt, & cucumeres cocti, pastinacæ & sion. Ex pharmacis uero, meon & asarû, spica, cassia, cinamomû. Sunt & cõposita quæ huc pertinent, quorû cõpositiones pau post dicemus. Per interualla autem etiâ humores ipsos dulcorare oportet, uini scybelitæ, theriei, ac protropi, similibusq; potu. Commoda est etiâ ipsis potatio lactis. Si uero per sedem humoris transmissio cõtingat, epithemata quidẽ eiusdem materiæ approbamur: uerum prospiciendum est, ne aluus cohibeatur, neq; etiâ amplius humectetur: nam hoc ipsum tum per cibos, tum per pharmaca, ac epithemata fieri potest. Utimur autẽ & ad hos infusis per clysteres, quo intestina illasa conseruemus: ad quam rem ptisanæ, ac tragi, & oryzæ succi appositî existunt. Quod si tamen per os puris educio fiat, maximam ad hoc curam adhibere oportet, ut humores prius euacuentur: deinde cibus præbendus adstringens & stomacho gratus. Utendû & uino tenui & odoro. Ven tri uero epithemata ex palmis apparata, atq; ex œnanthe, ac eis similia imponenda, de quibus in stomachicorum ac dysentericorû tractatu est prædictum.

Ad hepaticos. Folij malabathri, careophylli, spicæ nardi, costi, piperis, lupinorum siccorum, singulorum unciam i. contundito, cribrato, ac scrupulos iiii. præbeto cum uino. Aliud Philosophi: hepatis, inquit, abscessus discutit.

Bb

Radicijs

Radiciis graminis decoctum bis in die potatum, similiter & foeniculi radicem decoctum, & dauci. Myrrham item & picem siccam contundito ac cribrato, praillitoq; hepati ex oleo cyprino, inspergito, & lanam puram oleo cyprino calido imbutam superponito, uehementer prodest hoc: utere confidenter.

Cura hepatis exulcerati: Archigenis.

Cap. V

Si exulceratio ex abscessu circa hepar relinquatur, aut illic ex acris humoribus ac erodentibus fiat, colliquatio hæc adfectio appellata est. In his sanè uenter cruenta, & putrefacta, ac saniosa excernit: atq; omnino consumilia ex hepatis ulceribus promanare solent, his quæ à mortuorum corporibus destillant: quare quidam inexperti decepti, dysenteriam hanc affectionem esse putauerunt. Ructus aut foetidi consequuntur, et à ciborum acceptione grauitas præcordiorum: & pulsus eis est depressus ac densus, fiuntq; agri amarulenti et iracundi: dolor circa locum sit ulcerosus, usq; ad clauiculam ipsam pertingens: multis aut una cum uentris recementis etiã lotium excernitur saniosum sandarachæ colore: non parum uero frequenter ea quæ in urinis continentur aquæ inter cutem significati- nem portendunt. Caterum omnium periculosissima est hæc affectio, & modica omnino agris est spes salutis: & tamen nihilo minus aggredienda est eorum cura, cõsimilibus remedijs, eis quæ paulo antè dicta sunt etiã his adhibitis, epithematisq; ex materia leniter adstringente, similibusq; fomentis. Liqueoribus autem tum qui ad fomenta, tum qui in cataplasmata adsumuntur, cortex pinus, palmæq; ac cyperi, similiaq; sunt incoquenda, proprie aut ulcera repurgat lac scissile expe acceptum: cui aliquando parum mellis addere non ab re est. Post repurgationem citissime ad ea quæ carne replent festinandum: præstant aut id cibi moderati & boni succi, ac gestationes: quod si molestia id fieri permittant, etiã exercitamenta cõueniunt & uinum. Post cataplasmata uero, cerata & emplastra apta erunt, quorum sæpe in præcedentibus fecimus mentionem. Plurima præterea pharmaca quæ ulceribus cõueniunt in potu sumuntur. Quale & hoc est. Andromachi ad hepaticos cõpositio, cyphoides appellata: quæ etiam ad omnia thoracis uitia cõducitur. Vuarum passerarum carnis dra. x. x. v. croci dra. i. calami indicis dra. ii. bdellij dra. ii. & dimidiã, cinamomi dra. x. cassiæ dra. x. floris iunci odorati dra. ii. & dimidiã, myrrhæ dra. iiii. terebinthinæ dra. iiii. scobis aspalathi dra. ii. spice nardi drach. iiii. mellis dra. xvi. uini dulcis quantum sufficit. Adstringit mediocriter et resiccat ac discutit serosos ac uitiatos humores, inquit Galenus, corrigit malitiam humorum, & putrefactioni se opponit, intemperies sanat, extergit ac mundos facit, apperitq; meatus, cit urinam, atq; ea propter internas ulcerationes curare consuevit, & eos qui hepatici appellantur. Sunt aut hepatici proprie, qui ob hepatis debilitatem per sedem cruenta liquidiora excernunt, quales sunt loturæ carniū animalium recēs maceratorum, quos ipsos ignarum uulgus dysentericos esse putat. Alia cyphoides Andromachi: facit & ad tussis, & ad liquidorum per os reiectiones. Croci, cinamomi, myrrhæ, cuiusq; dra. i. bdellij dra. iiii. aspalathi obolos iiii. floris iunci odorati dra. iiii. calami indicis dra. ii. cassiæ dra. i. spice nardi dra. i. terebinthinæ dra. x. vi. mellis heminam dimidiã, uuarum passerarum pinguium numero clxx. carne earum optime mundata, uini ueteris adstringentis, quantum ad uuas passas, bdellium ac myrrham maceranda ac cõterenda sanis est. Mel aut prius despumato, in eoq; resinam liquefacito: & cum reliquis committito ac utitor, aliquando quidē instar eclegmatis ad nucis ponticæ magnitudinem aut amplius exhibeto: aliquando uero aqua mulla dilutū bibendū præbeto. Inuenies & inter arteriaca remedia, ad tussientes item & phthisicos phar-

maca

maca plurima his similia, quibus ipsis & ad ulceratum hepar uti oportet: proderrunt etiam ea quæ ad renum ac vesicæ ulcera sunt descripta. Alia cyphoides, quæ usus est comes Andreas, & Menas chirurgus. Croci dra. iiii. calami drach. vi. bdellij drach. ii. & dimidium, cassiæ scrupulos iiii. spicæ nardi sesqui drachmam, floris iunci odorati scrupulos ii. & dimidium, myrrhæ dra. iiii. terebinthinæ drach. iiii. aspalathi scrupulum unum, mellis sextantem, carnis uuarum passarum quadrantem, uini quantum ad hæc satis erit.

De hepate in scirrhum indurato: Galeni.

Cap. vi

Non solum aut à prædictis affectionibus apprehenditur hepar, sed & in scirrhum induratur, inflammatione uidelicet præcedente. Manifestiorem aut cognitionem hepar induratum ex hoc habet, quod tumor circa ipsum scirrhum multo durior quam in inflammatione existit, multo etiam minore dolore uexatur. In huiusmodi quoque dispositionibus corpuscula hepatis insita attenuantur. Ceterum temporis progressu, maiore tumore circa scirrhum facto, difficulter eius cognitio per tactum cognoscitur, propterea quod iam aquæ inter cutem suffusio sit consequuta: unde his qui negligentius notas perscrutantur, tumor ad tactum laxus succumbit: color aut uniuersi corporis in nigredinem pallore permixtam commutatur, uenter & pedes intumescunt, supernæ corporis partes gracilescent, & corpus ipsum tepefcit: aliquando aut aluus multa & tenuia excernit: urinæ uero à principio quidam multæ, uerum ubi iam ad aquam inter cutem dilapsæ sunt omnino paucæ. Porro incipientem hepatis scirrhum sæpe curauimus ipsi: eum uero qui temporis diuturnitate est extensus, neque ipse curauimus, neque alium quempiam qui curare eum posset uidimus: in totum enim sic affectus aqua inter cutem accedit, & in longiori tempore corumpuntur. Itaque ad prædicta de inflammatione cataplasmata & fomenta, fortiora quædam (inquit Archigenes) sunt annexenda. Constant aut ea quæ inflammatis adhibentur ex absinthij coma, nardoque tum in dica, tum celtica, croco, œnanthe, unguento nardino, lentiscino, et mastichino. His igitur althææ radicem ammiscere oportet, & sterus caprinum, ammoniacum thymiam, bdellium, medullasque & adipem: hæc enim incipientem in hepate scirrhum, conuenienti simul adhibita diata, sæpe curauerunt. Post fomenta autem & cataplasmata, cucurbitæ hepatis affigendæ cum scarificatione, & emplastra adhibenda: primum quidem simpliciora, uelut est Mnaseæ, & quod ex succis cochion appellatur, & similibus, quorum aliqua in colicis præscripta sunt: aliqua uero in splenicis & arthriticis referuntur. Quod si neque sic proficiat, hirudines ad mouendæ: plurimum enim momenti habet ad curationem, sanguis earum succi extractus. Commodus est eis & dropax & sinapismus: si uero neque hoc modo per succedat, ustio per frequentia interualla adhibeatur: ita ut aut per ferrum, aut per pharmacum crustæ infligatur, & post earum casum, ulcera multo tempore fluere sinamus. cõferunt etiam potiones conuenientium pharmacorum, uelut est zopyrios ad colicos præscripta, & quæ eupatorium habent admixtum. Cõplectuntur & urinam cientes antidoti aliquam in se commoditatem: uelut est quæ Bestia na uocatur. Scirrhus enim induratus particula, ob crassos & uiscosos humores in solidis corporibus imbibitos, necessario frigidam habent dispositionem, quare & calefacientibus simul & tenuium partium pharmacis opus habent: uerum his, quemadmodum dictum est, emollientia sunt præmittenda. Si enim uehementer calida, antequam scirrhus induratus corpora præmollescant, exhibeantur, ita

Bb 2 tim

tim quidem manifestam diminutionē fecisse apparēt, uerum immedicabile fit quod relinquitur, utpote nimium resiccatum. Quapropter facile est cōiectare in hepatis scirrho necessariam esse emollientium admixtionē. Simplicia igitur quæ ad hepar induratum bibuntur sunt: anagallidis quæ caruleum florem habet succus exiccatus, itemq; liquidus ex aqua mulsa, in moderatis autem febribus, ex aceto mulso: & scillæ assatæ medullæ oboli .i. seminis uiticis torrefacti dra. i. radix eupatorii, radix dracunculi, cortex radice lauri. Aliud, quo Aegyptius curatus est, quum iam aquam inter cutem incidere promptus esset: Herbae sabinae, picis siccae, quæ in fundo doliorum uini reperitur, eorum præsertim in quibus uinum dulce uetustatē est adeptum, utriusq; æquales partes singulatim contundito & cribrato, atq; ex ambobus pariter cochlearij mensuram cum uino diluto præbeto. Aliud. Croci, spicæ nardi, cassiæ, cuiusq; dra. ii. costi, floris iunci odorati, cinamomi, myrrhæ stactes cuiusq; dra. i. mellis despumati dra. x. v. Ex hoc dra. i. cum uino mulso præbe. Optimum est hoc pharma cū in incipientib. duris scirrhi dispositionibus, cuius rei plurimū periculū feci.

Aliud, ad omnes inueteratas hepatis affectiones, atq; ipsum etiā scirrhum. Picis siccae, costi, piperis, æquales partes contundito & cribrato, & ex eis cochlearium præbeto. Aliud. Myrrham troglodyticen optimam, & piper, paripondere tundito: indeq; scrupulū unum cum uino meraco ueteri calefacto, ad dies tres aut quinq; exhibeto. Oribasij ad hepaticos. Glaucij dra. iiii. aloës dra. ii. hæc arida conterito, & cochlearij mensura statim à balineo exhibeto: febre carentibus cū uino diluto, febrientibus aut cum aqua mulsa. Aliud Oribasij, ad diurnas hepatis affectiones, et circa sima ipsius dispositiones, in quibus stomachus tum uenter simul affecti sunt. Comæ pinus uiridis decoctum ad tertias redactum, cyathorum trium aut quatuor mensura præbe. Quin et sicca comæ dra. i. in potu exhibita, simili efficacia præstat. Verū ad multos hæc exhibenda sunt dies. Aliud, Oribasij. Chamæpityos, petroselinū, cuiusq; dra. vii. baccarum lauri, piperis, costi, singulorum dra. iiii. cyperi, foeni græci, cuiusq; dra. ii. præbe cochlearium ex aqua mulsa. Aliud. Anisi, gentianæ, amygdalarum amararum, absinthij, æquas portiones permisce: indeq; cochlearium ex calida præbe. Aliud. Thuris unciam unam, ammi, acori, cuiusq; drachmas quatuor, præbe cochlearium ex aqua mulsa. Oribasij antidotus hepatica. Cassiæ drachmas octo, aloës, costi, corticis pinus, cuiusque drachmas quatuor, glycyrrhizes siccae drachmas octo, spicæ nardi, croci, anisi, hyssopi, rheipontici, cuiusque drachmas duas, mellis sesquilibram. Mel decoque ac reliqua eo excipe, & nucis auellanae magnitudine præbe. Aliud Oribasij, ad hepaticos, ictericos, splenicos, & præcordia eleuata. Croci drachmas decem, floris iunci odorati drachmas quatuor, cassiæ drachmas duas, spicæ nardi drachmas octo, myrrhæ, cinamomi, costi, cuiusque drachmam unam, mellis costi quantum his excipiendis sufficit. Præbe ad fabæ ægyptiæ magnitudinem cum uini mulsi cyathis tribus. Facit & ad thoracis dolores, atq; eos qui plumbeum colorem habent. Aliud hepaticum pulchrum. Seminis pelecini, capnij herbe, costi, æquale pondus contundito ac cribrato, et drachmam unam ex aqua mulsa præbeto. Aliud. Foeni græci unciam unam, trixaginis sextantem et unciam dimidiam, costi albi quincuncem, petroselinū quincuncem, eupatorii quincuncem, mellis despumati quantum satis est. Datur sesquidrachmæ ponderis. Eius utilitas experimento constat. Aliud. Castorij, costi, cyperi, amomi, cuiusque drachmas octo, piperis drachmas quatuor, petroselinū drachmas quatuor

quatuor. Datur cochlearij mensura. Aliud, ad diuturnam uexationem & duriciem. Costi, sceni graeci, piperis, foliorum rutæ uiridis, picis sicca; æquales partes commisce, indeque cochlearium cum aqua mulsa aut uino præbe. Aliud. Ammoniaci thymiamatis drachmas triginta duas, croci drachmas quatuor. Crocum tundito, cribrato, & cum aqua diluito: deinde ammoniacum adijcito, simulque terito, ac in pastillos redigito, ex quibus alijs drachmam unam, alijs duas, præbeto. Aliud. Ammoniaci thymiamatis, costi, polij, sceni graeci, æquale pondus misceto: indeque cochlearium siccum cum aqua mulsa dato. Aliud. Ammoniaci in tenuissimum puluerem redacti cochleariū unum, mastiches grana decem, præbe ex aqua mulsa, & admiraberis. Efficax est ad hepaticos iam desperatos. Aliud, Asclepiadæ: quouitumur, inquit Philagrius: quod ad hepar scirrhus induratum, atque etiam oppilatione obturatum, prospero successu accomodatur, ad aquæ inter cutem quoque suffusiones incipientes, & ad alias internas affectiones, citra tussim continentes, optime facit. Habet autem hoc modo. Radicis gentianæ, chamæpityos, marrubij, petroselinij, radicis scolopendriæ, radicis panacis, terræ lemnis quæ sphragis appellatur, sifonis, rubiæ, seminis brassicæ, radicis eryngij, baccarum iuniperi, seminis fraxini, trixaginis, seminis dauci, dictamni, cestri siue heronice, singulorum drachmas octo, fellis ursi sicci, sinapis, seminis cucumeris, aristolochiæ, piperis, spicæ nardi, costi, seminis eruce, singulorum drachmas octo, hoc est omnium æquale pondus, echij, eupatorij, polij, cuiusque similiter drachmas octo. Quidam etiam lupini hepatis, achelenij tantundem adiecerunt, quod & nos facere solemus. Oribasius autem neque fraxini semen, neque betoniam, neque trixaginem, neque dictamnium, neque daucum adscripsit. Mellis quantum his omnibus excipiendis sufficit. Datur ad nuncis auellanae magnitudinem cum passi cyathis duobus. Pharmacum hoc experimento cognitum est. Semen autem fraxini, arboris est ex qua fraxinea ligna quocunque in opere apta ac operæ obedientissima cæduntur. Epithema ex melilotis ad hepaticos. Meliloti sextantem, croci unciam unam, ammoniaci thymiamatis librā i. ceræ lib. i. terebinthinæ trientem, cyprini, aut nardinij, aut gleucini unguenti plus minus quincuncem. Ammoniacum & crocum in aceto dissolue. Porro in diæta totum situm esse existimandum est, siquidem omnis diuturnus morbus maiorē ex diæta opem sentit. Quare cibi qui facile concoquuntur, eis exhibendi sunt, quiq; & incisoriā uim & repurgantē complectuntur. Neque uero ineptæ eis acrum rerum commestiones sunt si per interualla, & post exercitia ac gestationes sumuntur. Caterum pro ratione motuum & exercitiorum, tum quantitatem, tum qualitatem ciborum augere oportet. Vinum eis conuenit tenue, odorum, moderata quantitate acceptum. Dulcia enim omnia nocentissima sunt hepatis affecto. Vitandum & uinum multum, fructusq; ac bellaria omnia, præter amygdalas & pistacia: ex his enim moderate à reliquis cibis accipiendum. Vitanda etiam crassa et uiscosa edulia, atq; ea quæ difficulter concoquuntur.

De lienis affectionibus cognoscendis: ex libris

Philagrii.

Cap. VII

Quibusunque sub sinistro ilio dolor, aut distensio, aut grauitas, aut tumor subiacer, & dum conuertuntur, uelut aliquid ex illis locis conuellatur, imaginatio contingit, his lien affectus est. Quemadmodum autem reliqua corporis membra iuxta octo intemperierum genera affliguntur, ita & splen afficitur:

Bb 3

uerum

uerum frequentissime frigidam & humidam sustinet intemperiem, ex consili maxime diæta, atque ex his quæ uoluptatis gratia accipiuntur, ueluti sunt crassi succi placenta, itemque potiones. In his igitur omnibus calor tempore debilitatur. Substantia enim splenis laxa & rara est, promptissimaque ad suscipiendum crassiores humores: etenim fecem ac uelut limum sanguinis ex hepate ad sese trahit, hoc modo sanguinem repurgans, ex qua fece confecta & attenuata per maximas in ipso arterias seipsum nutrit. Signum autem certum & compendiosum intemperiei in splene, ea quæ eduntur ac bibuntur exhibent, & quæ forinsecus cuticulæ iuxta sinistrum ilium accedunt. Si enim frigida intemperies iuxta ipsum fuerit oborta, omnis cibus & potus qui efficaciter refrigerare potest, facile & manifeste splenem lædit: pallium item frigidum extrinsecus admotum, maxime si in frigida aëris constitutione amiciantur, uentus etiam & aqua frigida tum in lauando, tum aliàs quoque adhibita, frigidam arguit splenis intemperiem. Eam uero ipsam intemperiem omnia calida consolantur. Quod si calida fuerit splenis intemperies, à nullis quæ in cibo aut potu exhibentur, aut etiam forinsecus accedunt, dolorem perfert: & si quidem caliditas augeat, non solum nihil tumori apponitur, sed & contractionem amplius sustinet, præsertim si exurens simul adsit febris. Cæterum & cibi & potus calefacientes, & quæ extrinsecus corpori calorem addunt, calidas etiam intemperies augent & exacerbant. Solatio autem sunt eis omnia refrigerantia. Si enim hi qui calidam habent dispositionem per interualla frigida potu utantur, statim splen corroboratur, & minuitur, ægrumque melius spirantem reddit: & uenter aliquando ex frigida potu flauam bilem profundit. Atqui tristitia adfectis, aut ira concitatis splen dolet, si calidam habeant intemperiem. Similiter etiam sicca intemperiei in splene signa colligere oportet, maxime quum pro magnitudine propriæ naturæ non eminet. Ea item quæ forinsecus corpori adueniunt, atque intra ipsum deuorantur si arefaciendi facultate prædita sunt, splenem exiccant, quemadmodum etiam reliqua animalis membra delicare consueuerunt. Qui enim laboriosam uitam degit, assidueque circa marinas aquas uersatur, aut bituminosas, aut aluminosas, aut sulphureas, quicunque phar-maca assumit hanc habentia naturam, facillime exiccatur. Porro ubi humida affectione splen fuerit detentus, atque ea amplius inualuerit, in tantum eius incrementum facit, ut etiam uentrem pertingat ac hepar. Consueuit autem humida dispositio circa ipsum consistere ab immodice humectantibus, diæta, & exercitio, aëreque & locis. Oboriri solet & his qui circa palustres regiones frequenter uersantur. Amplius autem & humidus morbus præcedens, hanc affectionem producit: aqua item largior potus, & holera humectandi ui prædita. Species quoque doloris unà cum prædictis signis infestantem intemperiem demonstrabit. In calida enim & frigida intemperie dolent. Minus uero, aut nihil omnino, in humida: minimum uero in sicca. At uero ex prædictis coniecturam facere licet compositarum in ipso splene intemperierum. Fere enim in totum ubi calida intemperies fuerit intensa, sicca eam consequitur: & ad frigidam inueteratam humida concomitatur. Quandoquidem autem & humores in splenem confluentes, tumores producant: eorum quoque diligentem considerationem facere oportet, quales nam sint tandem, atque id non solum ex prædictis iam dispositionibus est faciendum, sed ex his quæ iam dicuntur. Bilio-oso enim fluore existente, uniuersum corpus calidius apparebit, etiam si non adsit febris, oculique & urinæ per bilem colorata: siccitatem semper acculabit æger.

æger, & de siti conqueretur ac bili os infestante, cibum fastidit, & uigilijs infestatur, & frigidam desiderat unâ cum hoc quod linguam subflauam habet: exacerbationes tertianæ fient: suntq; ipsi ægri moribus iracundi, & qui præcipitanter excandescant. Si uero atræ bilis sit fluor, materiæ ipsius atræ bilis scilicet, color tum in lingua, tum in reliquo toto corpore apparebit: & appetentiâ aderit ciborum: moesti q; ac subtristes ægri sunt, reliqua q; atræ bilis signa eis ad sunt: exacerbationes uero quarto quoque die affligent. At uero ubi pituitosus humor in splenem deferatur, consimilis pituitosis aderit color, ægri q; minime sument, & cibum appetent, nisi falsa fuerit pituita: tunc enim cibum fastidiunt ægri, poculorum q; magis sunt appetentes: quin & coloris cutis nitentis speciem demonstrabit tibi pituitosum esse humorem: & quod singulis diebus exacerbatur, urina quoq; pituitosæ sunt: ipsi uero ægri secundum mores pigri sunt & legnes. Quidam uero ex eis qui frigidam affectionem habent, magnum & durum splenem acquirunt, atq; ubi parum saltem consuetam edendi horam fuerint transgressi, & impacti manserint, dolore afficiuntur, propterea quod neq; plenum, neq; firmantē, neq; sustentantē ipsum habeant uentrē, quiq; amplius obinediâ refrigeratur, & cōcalescentiæ opus habet. Quod si sanguineus existat in splenē confluens humor, possibile est ipsum colorē tum iuxta linguā tū circa cutē permutari: inter appetentiâ autē ciborum & fastidiū mediō quodā modo habet egri: reliquisq; magis languent, etiā si non parē uisceris tumorē habeant. Venæ autem uniuersi corporis, sanguine plenæ apparent, & urina subfuluæ.

Cap. VIII

Intemperierum splenis cura.

In uniuersum quidem igitur splenis intemperies ferè citra tumorem sunt: eas autem tum per cibos ac potus, tum per simplicissima pharmaca ac fomentorum irrigationes, quæ intemperiei contraria sint, corrigere oportet. Calidæ intemperiei cura. Calidam itaq; intemperiem curabis per irrigationis usum ex rosaceo, aut melino, & per simplicia ex his composita cerata. Amplius autē & per uiræ acerbæ immaturæ succum & portulacam & pampinos uitis, ac consimilia. Cibis uero & potibus utendum, quibus calida intemperies castigatior reddatur: lauacris etiā temperatarū aquarū. Quod si pharmacorū usū opus sit, rumicis acuti semen in potu exhibeas, aut radicū aut foliorū eius decoctū: aut plātaginis, similiterq; limoni, quod cynoglossum appellat decoctū. Sūt autē hæc in posca diluta coquenda. Frigidæ intemperiei cura. Frigidæ in splene intemperies sanant irrigationes, & unguenta, ac cerata, itemq; epithemata, quæ moderata calefaciēdi facultate prædita existūt: uelut est unguentum nardinū et cyprinum ac gleucinū, et cerata ex eis cōflata. Poteris & epithemā pentamæron appellatū, cū modica cera liquefactū adhibere. A balineis in principio abstinēdum, nisi quid obster: cibi & potus moderate calefacientes exhibendi. Quod si medicamentis opus sit, cōuenit eis calaminthæ, pulegij, scordij, trifolij, uitis, ac similitū decoctū. Exhibēda etiā rumicis acuti radix, aut semē. Humidæ intemperiei medela. In humidâ splenis intemperie optimum pharmacum habebis salis florem, siue per se solum, siue cum aliquo simplici cerato imponere uelis. Solus enim calefactus & aliqua uesica exceptus, spleni adhibetur. In epithemata quoque ammiscetur quemadmodū est prædictum. Quin & falfugo & spuma salis, cum cerato aliquo ac modico aceto permixta, cominodum pharmacum erunt ad humecti splenis affectionem. Proderit & quinq; folij radix, & plantago sicca, et alumē scissile in testa exustum. Poteris etiam ex plantaginis folijs, radicibusq; quinq; folij, & spuma ac flore salis, pari uel impari

modo permixtis, sufficienti affuso aceto, & pice sicca in posca liquefacta, exceptis, cera item alba, ammoniacoque thymiamate, ac modico rosaceo ammixtis, pharmacum usui reservare. Melius autem compositionem facies, si & salicis succum addas, hic enim cum uno aut altero ex praedictis permixtus, efficacius pharmacum reddet. Eius autem collectio facile contingit. Lachrymam enim arbor incisa emittit. Conuenientissimae autem his sunt fricationes, quae discutiendae cultatem habent. Siccæ intemperiei remedia. Siccam splenis intemperiei balineum dulcium & calidarum aquarum curat: inunctio item ex oleo dulci. Cibi citra refrigerationem humectantes, uelut est prisanæ succus, & post eum qui ex halica est acceptus. Irrigationes forinsecus profunt ex rosaceo, & cerata itidem ex eo apparatus.

De splenis inflatione.

Cap. ix

Quum inflatio circa splenem est, tumor loci consequitur qui imposita manu ad tactum cedit, & distensionem loci infert. Verum inflatio ipsa aut in uentre oborta ad splenem transfertur, aut in ipso adeo splene generatur. Ventris igitur flatus generatio ex frigidityte membrorum ipsum producentium contingit. Quare tum uentrem, tum splenem concalefacere oportet, praesertim his quiibus utrumque membrum est affectum: atque id tum his quae forinsecus imponuntur, tum cibis ac pharmacis quae intra corpus deuorantur, perficiendum est. Ventri itaque auxiliabimur, siquidem per consensum sit affectus, diosporiticam confectionem exhibendo, atque etiam alias quae huic similes existunt. Panis uero ac edulia, uinumque quod in potu sumit, ex petroselino, aniso, cumino, ac sisone, similibusque conspergenda sunt. Foris autem epithema ex seminibus quod paulo post referetur imponendum. Haec enim pariter utrique uisceri auxiliantur. Proprie autem inflationes splenis dissoluere solent, tum ea quae iam dicta sunt, tum uiscis seminum torrefactum, & melanthium, serpillumque & thymus, pulegium, origanum, ruta semen, Pelecini autem semen & stomacho gratissimum, & omnibus uisceribus aptissimum est: similiter & rheon ponticum, & scordium. Haec enim una cum hoc quod stomachum repurgant, etiam hepatis profunt, neque stomacho molestiam inferunt, ceterum unumquodque horum & per se, & alijs commixtum exhiberi potest, in posca decoctum, aliquando autem & mel eis adiciendum. Porro quae his fortiora sunt, ea uitare oportet in his in quibus uenter per consensum cum splene est affectus, maxime si inflatio sola infestet: quae enim his praestantiora sunt, spleni in scirrhum indurato conueniunt, ubi uero solus splen inflatur praeter uentris laesionem, epithema ex seminibus in principio est imponendum. Postquam autem flatus crassities fuerit attenuata, ammiscenda sunt ei ea quae noxam depellere possunt, qualia sunt epithemata ex alumine & sulphure apparatus, quorum compositiones paulo post dicentur, ubi de splenis in scirrhum indurati tractabimus cura. Epithema ex seminibus: Asclepiadae. Epithema quod Asclepiades ex seminibus composuit, hoc est, quod ad aquam inter cutem prosperè accommodatum pharmacum existit, & ad omnem inflationem conducit. Cardamomi, meliloti, herbae sabinae, baccae rulauri, nardi celtici, samoluci, iridis, radice panacis, radice cyperi, nitri, cassiae, foeni graeci, seminis apij, anisi, thuris, singulorum drachmas xxv. styracis quadrantem, myrrhae quadrantem, terebinthinæ libras ii. ceræ libras ii. ammoniaci thymiamatis lib. i. mellis optimi lib. i. olei cyprini lib. i. uini quantum satis est. Facit & ad stomachi & splenis inflationes, itemque hepatis: estque omnino pharmacum magni faciendum.

De

De splenis inflammatione.

Cap. x

In splenis inflammatione uenæ incisio adhibeatur, si nihil id fieri ueter: uenæ etiam per clysterem assidue eluatur, & maxime si uenæ incidendæ medela relinquantur. Quocumq; aut tempore siue per uenâ incisam siue per clysterē euacuamus, semper aliquid adstringendi facultate præditū spleni imponemus, in principio præsertim, quum differimus euacuationem: quo id quod influit reprimatur, & quod influxione sua præuenit, à loco depellatur: atqui & ad splenis firmitatem conseruandam utilis adstringentium sylua existit: quæ quidem robusta sint, ubi fluoris impetus fortis cōtingit: moderata uero, ubi mediocris. Cognosces aut irruentis humoris magnitudinem, ex magnitudine & uelocitate generationis ipsius inflammationis. Itaq; si moderata fuerit inflammatio splenis, uinum uetus ac austerum tenuiūq; partium oleo dulci permixtum et lana succida exceptum imponemus. Si uero maior sit caliditas, rosaceum sit oleum, aut lentiscinum: quæ si non adsint, oliuæ folia, aut rubi, aut mali arboris in oleo decoquantur, atq; ipsa etiam mala, in decoctione etiam quædam tenuiū partium addantur, uelut est absinthium & pulegium. Quod si forti impetum fluxus feratur, acetum pro uino affundendum est. Post irrigationes ad cataplasmata transeundum. In quorum compositionem hordeacea & loliacea farina assumantur, cum posca et mellis ac olei paucissima omnino mensura, in quibus absinthium ac pulegium sint decocta: aliquando & myrobalani infarciendi. Optimum & hoc est. Hordeaceam farinam & salicis folia cum aceto imponito, adipe caprino in aceto colliquato: uerum melius redditur cataplasma si carica adijciantur. Optimum autem est & ex lini semine cataplasma, maxime ubi affuerit dolor. Accipitur autem seminis lini pars una, farinæ loliaceæ pars una, adipis taurini in aceto & sapa liquefacti, cuiq; deinde oleum cyprinum sit affusum, quantum his subigendis satis est. Caterum cauendum ne locus post irrigationes & cataplasmata denudetur, sed ubi hæc fuerint ablata, mox ceratum ex cyprino aut nardino unguento imponatur. Commodum est autem feruentibus inflammationibus Nilei aut Nili epithema, cum cerato chamæmelino & acetato emollitum: idoneum est etiam Philagrii stomachicum epithema: sunt autem ea integra ad stomachicos descripta, utimur autem aliquando, ob cataplasmarum penuriam, ad splenem inflammatum, furfuribus in uino, aut posca & oleo decoctis: quibus etiam absinthium & pulegium, aut thymum, aut origanum, aut lauri folia, aut artemisiā, et reliqua incidendiæ attenuandi uī prædita adijcimus: non feruente uidelicet inflammatione, & corpore præeuacuato. Si enim corpore non euacuato, quis calidioribus utatur, ipse sibi scirrhi autor fiet. Quod si ad permutationem in suppurationem ipsa splenis inflammatio repat, quod tamen raro contingit, adiuuare eam oportet, ne plura corpora putrescant, per cataplasmata uidelicet quæ pus producunt: de quibus in hepatis abscessu manifeste est prædictum: hepar enim frequentissime abscessum perfert ac exulceratur. Quare ex his quæ de hepate diximus, ad splenis curationem exempla transsumes.

Cura splenis in scirrhum indurati: Galeni.

Cap. xi

Iam antea prædictū est splenē quā celerrime solere in scirrhum indurari, sanguine circa splenitides in ipso uenas obturato, ut neq; excerni, neque digeri ob crassitiē facile possit. Quare attenuantiū pharmacorum usu opus habet, citra tamen manifestam caliditatem: ne uehementius inspissetur crassus humor in eo obduratus. Amiscendum est autem eis quippiam ex adstringentibus et austeris, quo

quo ipsius actio & robur conseruetur. Si enim præ debilitate feculentum & attractibilis humorem, ex hepate, quemadmodum consuevit, non attraxerit, vitiosum humorem uniuerso corpori affricabit. Immedicabilia enim ulcera hoc modo affecti habebunt, et maxime circa crura, & colorem corporis uitiatum ad nigredinem uergentem. Diutius autem durante malo etiam aquam inter cutem incurrunt. Ob id igitur in ipso splene naturalem firmitatem custodire oportet, quo conueniens sibi alimētum attrahat, & sanguinem repurget, superfluaque in ipso generata retrimenta ad uentrem demittere queat, quæ postea cum ciborum recrementis excernuntur. Ad hanc itaque rem amara ipsi spleni offerimus, quibus aliquando ex austeris quippiam ammiscemus. Amara quidem ut humoris crassitiem secent ac repurgent; austera autem ut robur & firmitatem eius conseruent. Quale uero pharmacum hepati est absinthium, tale existit spleni capparidis cortex. Et quale est hepati eupatorium, tale spleni est scolopendrium. Similibus enim secundum genus pharmacis utraque uiscera opus habent. Verum splen tanto fortioribus indiget, quanto crassiore utitur alimento. Ceterum a ueteribus plurima potabilia pharmaca ad induratum lienem sunt descripta. In curando autem animaduersionem habere oportet, num curandi agri uniuersum corpus frigidius sit, an calidius, num humidius, an siccius. Eis igitur qui corpora natura habent calidiora, citra molestiam myricæ folia dantur, uirgulaque & radix: scolopendrium item, & rumicis syluestris, maxime uero acuti semen, foliaque & radix: optime autem facit radicis uiridis contusæ succus cyathi unius mensura potatus. Probe facit & lycapfos, quæ & anchusa appellatur: danda autem radicis eius drachma una, aut cacumina hederæ tria, aut folia eius, uel etiam radix: item polytrichon, & capnij, quod chelidonium uocatur, decoctum ad tertias reductum, folia salicis & cortex, itemque radix limoni, quod & cynoglossum uocatur: folia & radix, & semen quoque pelecini. Hæc enim neque uehementem in se habent caliditatem, neque si calidior temperatura addit, ei molestiam inferre solent: quapropter his tum ad prædictos, tum ad reliquos utendum in principio adfectionis: a mitioribus enim auspicari oportet. His autem efficaciora sunt, quæ in ueteratis scirrhis conducunt, & corporibus agrestioribus, et qui omnem corporis habitum habent frigidiores: trixago, gentianæ radix, calamintha, pulegium, & cyclamini radix, scordium, & solij bitumen olentis semen, hypericoma, acori, asari & eryngij radix, uiridis semen torrefactum, centaureæ radix, anagallidis quæ cæruleum habet florem succus, glycyldes aut pæoniæ, itemque dracunculi radix tum uiridis tum sicca. Aliud. Caroi ex terra suscepti, radicis rubiæ, bryoniæ, ammoniaci thymiamatis, cuiusque drachmam unam horum unumquodque aliquando tritum ex posca datur, aliquando autem unam partem eorum præbetur: quod si sicca dare uelis, sufficit drach. plus minus unam exhibere. Conducit item hoc. Ammoniaci thymiamatis sextantem, castorei unciam I, conterito, et drachmam I, ex posca aut aceto mulso præbeto. Aliud. Scillæ assatæ drac. I, corticis radicis capparidis drach. I, præbe ex posca, uel aceto mulso. Mouet enim crassos & uiscosos humores, inquit Archigenes: aliquando & cruenta non per urinas tantum, sed & per uentrem educit. Aliud. Thuris obolos duos, seminis fœniculi cochlearium unum, præbe ex uino. Aliud. Marciani, præfens remedium: quod etiam si sit induratus, citra dolorem suffusionis laxiorem reddit, ut neque significationem, neque etiam suspicionem suffusionis aquæ inter cutem relinquat. Seminis uiridis cotuli & cribrati per angustissimam cribellum

cribellū dra. v. his qui perfectæ sunt ætatis ex posca bibēdas præbe. Aliud eiusdem, ad splenem & hepar indurata, & principium aquæ inter cutem, et ad alui, & intestinorum, ac stomachi inflationem, simplex & periculo uacans. Bryoniae radicem contusam & cribratam, repositam, ab aëre & uento intactam ne quid inde transpiret, adserua, & pro uiribus ægri præbe. Perfecta mēsurā exhibitionis est cochlearium unum, hydropicis quidem et splenicis ex posca: hepaticis ex hydromelite aut uini dulcis cyathis tribus. Pastillus ad splenicos, Asclepiadæ: liquefacit splenem, ut multo experimento constat. Seminis ericæ dra. viii. pipēris albi drac. iiii. spicē nardi drac. iiii. ammoniaci thymiamatis dra. iiii. scolopendrij dra. ii. costi dra. ii. cum aceto scillitico subigito, & dra. i. cū aceto mulso aut posca præbeto. Conuenientissimum autē spleni in scirrhum indurato remedium existit ferrum aqua, aut uino, aut posca extinctum. Ea ipsa enim aqua, aut uinum, aut posca in principio exhibita iucūda & utilissima existunt, & per plures ex ordine dies dantur. Itaq; febrientibus aquam, aut poscā dilutam præbeto: eis uero qui teneram carnem habent ac febre carent, uinum. Sit autem ferrum quod in ipsis extinguitur stomoma. Ipsi autem stomomatis ferri squama, (quam in fabrilibus officinis ferrum dum ignitur & malleo tunditur, abijcit) postea agrestioribus hominibus utiliter exhibetur. Præclare enim hæc splenem liquefacit, utpote quæ consumendi facultatem præstat, quare aliarum rerū cōplexu opus habet, ne inde stomachus male afficiatur. In calidioribus igitur temperaturis, pelecini semen ei ammiscere cōuenit: aut si id nō adsit, scolopendrium: aut si neq; hoc haberi possit, absinthij comam, aut rumicis acuti radicem aut semen. In frigidioribus autem temperaturis, ad squamam ipsam, calisiam, aut amomum, costum, anisum, aut serpillum montanum, & similia addere oportet. Quanquam tum in his, tum in omnibus pelecini semen maxime cōueniat. Omnia autem nunc dicta, itemq; ea quæ paulo antè sunt relata simplicia pharmaca, in principio cum posca diluta coquantur, postea uero etiam meraciora. Progressu uero temporis etiam ipsa contusa & cribrata cum aceto aut aceto mulso exhibentur. Verum certam unicuiusque horum mensuram definire difficile & periculosum est, quum diuersæ eorum qui ea accipiunt sint nature: quare in principio parum quid ex unoquoque exhibendum, & pro ratione deinde exhibitionis mensura mēdanda, iuxta ipsius pharmaci, atque etiam ægri uires. Omnia igitur prædicta quomodocunque tandem potata, aut semel saltem deglutita permanere solent: uerum glans unguentariorum, quam myrobalanon appellant, nisi cū posca bibatur, facile uomitu reijcitur. Licet igitur singulis prædictis simplicibus pharmacis per se uti, & duo item uel tria aut quatuor, permixta æqualiter uel inæqualiter præbere. Ex compositis autem ferè pulcherrimum est, id quod ex ossibus constat, ad podagricos descriptum Philagrii pharmacum. Efficax enim reperies ipsum, inquit Philagrus, & conuenientissimum ad omnia splenis uitia, præsertim cum tumore magno & duritia oborta. Sensibiliter enim huiusmodi affectionibus auxiliatur: utpote quod in sua emollit & cōcoquit, ampliusq; diffundit & purgat, ultra hoc quod paulatim discutit & resiccet. Est aut tum gustui, tum odorati suauissimū, maxime si plurimo de spumato melle mixtum, delingēdum præbeat. Secundo aut loco inter ea quæ ego noui est & hoc, inquit Philagrus, ipso sanè usu probatum. Corticis radicis capparis drachm. vi. foliorum myricæ drachm. vi. squamæ stomomatis ferri drachmas vi. myrobalani drach. x. aut vi. ammoniaci thymiamatis drachmas viii. seminis pelecini drach. v. stœchadis drach. iiii. comæ absinthij drach. iiii. scolopendrij

scolopēdrij drach. x. Excipe aceto et informa pastillos, ac exhibe drach. i. ex posca aut aceto mulso aut uino. Hoc itaq; robustum est pharmacum, ut etiam ad duriora corpora quadret. Aliud eo imbecillius tale est. Pulegij drach. x. ii. radice rumicis acuti drach. vi. seminis eiusdem drach. vi. capnij iuxta sepes nascentis sicci drach. vi. pelecini drach. iii. scolopendrij drach. iii. spicæ nardi drach. ii. rheipontici drach. i. corticis capparis drach. ii. Excipe aceto ac redige in pastillos, exhibe q; drach. i. quemadmodum in precedenti dictum est. Pastillus ad splenicis, splenem liquefaciens: Asclepiadæ. Seminis ericæ drach. ii. piperis, ammoniaci thymiamatis, spicæ nardi, cuiusq; drach. ii. Quidam etiam costi drach. ii. & scolopendrij drach. ii. Arida contundito & cribrato, ammoniacum in aceto dissoluito, ac simul in pastillos digerito: ex quibus drachmam unam cum aceti mulsi cyathis iii. propinato. Qui huius pharmaci compositionem docuit, per triduum hoc suis catulo se exhibuisse dixit: postea ubi catulum dissecuisset, ipsum sine splene repertum. Aliud, ad spleneticos & hydropicos, quod optime urinam ciet, & ventrem emollit: Archigenis. Scillā magnam luto oblitam afflato, deinde repurgatę internę libras ii. accipito, dauci unc. i. anisi, seselis, radice panacis, iridis, cuiusq; unc. i. seminis urticę sextantem, cedridum, hoc est, fructuum cedri sextantem, myrrhę drach. ii. farinæ erui unc. xvi. cum uino informa pastillos, & præbe drach. i. cum aceti mulsi cyathis ii.

Aliud. Radice panacis, ammoniaci thymiamatis, corticis radice capparis, radiculæ scillæ afflata internæ, æquales omniū partes committe, & obolos tres aut quatuor præbe: cōducit anhelosis & hydropicis. Pastillus summæ utilitatis. Cacuminum hederæ nigræ drach. ix. spicæ nardi drach. v. seminis rutę sylvestris drachm. iii. castorij drachm. i. iridis drachm. vi. Cum succo uerbernacę rectę, pastillos informato, & per quinque dies mane drachmam unam ieiunis ex uino ueteri præbeto. Mouet urinas cruentas. Atq; hætenus quidem de pharmacis potabilibus. Cæterum ad splenem in scirrhum induratum etiam sanguinis detractionem commodam esse scimus, quæ inter paruum sinistræ manus digitum, & eum qui medio proximus est, sit facta. Quidam autem uenam retro sinistram auriculam sitam diducunt, inquit Archigenes, & ex profluente inde sanguine splenem illinunt, ac magnum commodum sentiunt. Idem etiam hepate affecto faciunt, incidētes retro auriculam dexterā uenam. Quare neq; absurdum fuerit etiam his auxilijs uti: animaduersione tamen habita ne arteriam pro uena dissecemus. Nos autem in his qui multo sanguine abundant, inferiorem in sinistro cubito uenam secare consueuimus, uerum & hic cauendū ne subiacentem arteriam simul dissecemus. A uenæ incisione, etiam cucurbitulæ spleni affigendæ sæpe & cum scarificatione, extrahendusq; per ipsas plurimus sanguis: quin & hīrudines summa commoditate in ipsum splenis locum affiguntur. Loci etiam amplius per spongiā acidā muria imbutā fouendi, furfuribus quoq; in aceto decoctis, absinthij coma, ac pulegio, & lauri folijs, similibusq; adiectis. Quidam autem lapidem molarem aut gagatem longitudine octo digitorum, & latitudine sex digitorum, secundum crassitudinem leuē, igniunt & aceto adspargunt, panniculq; in aceto calido madefacto circumposito, locis imponunt, & quā diu calidus sit incumbere sinunt, atq; huic fomento testimonium præbent, inquit Archigenes, tanquam quod insensibiliter deprimat tumorem. Post fomenta ad cataplasmata transeundum, ex farina ordei ac lolij, absinthij coma, myrobalano & althææ radice, cum aceto mulso. Aut panem aridum cum capparis cortice, & myrobalano contusum, cribratū & cum

& cum aceto mulso decoctum imponito. Optime facit & sterus caprinum cum farina ordeacea ex posca cataplasmate impositum. Lupinorum item farina ex posca, & fabarum eodem modo. Cinis quoque ex officina fabrilis, & bryonia radix cum caricis, aceto, & cyclamino, eodem modo. Brassica etiam sylvestris cum melle imposita auxiliatur. Similiter & folia isatidis, & marrubium cum ordeacea farina ex posca. Cardamomum cum caricis. Cyclaminus cum caricis ex aceto decocta. Cataplasma optimum. Foenigræci trientem, farinæ ordeaceæ quadrantem, cardamomi unc. i. caricarum pinguium lib. i. uerbenacæ herbæ unc. i. ficus in aceto acerrimo macerato, fortiterque in mortario contundito, reliquisque adiectis ac simul unitis utitor. Optimum cataplasma & hoc est. Seminis raphani partes ii. foliorum salicis partem i. farinæ araci partes ii. seminis pastinacæ partes ii. in aceto cum pari sapæ mēsurā decoquatur. Aliud, ad inveteratum malum, & corpora dura. Corticis radicis capparis, radicis struthii, sinapis recentis, omnium æquales partes, farinæ tritici duplum ad omnium trium mensuram. Vtere ueluti prædictis. Aliud præclarum ad duritias. Stercus gallinarum aibum, siccum, contusum, ac cribratum cum aceto mulso decoquito, confidenterque imponito. Unguentum optimum. Ammoniaci thymiamatis, thuris, foliorum rutæ uiridum, sing. æquales partes cum aceto contere, & quam crassissime illita exiccari permitte. Aliud, quod antea quam me deatur non abscedit. Ammoniaci staterem i. thuris staterem i. piperis staterem i. Ammoniacum cum aceto contere, eodemque etiam reliqua modo. Aliud. Ammoniaci staterem i. acaciæ stateres ii. aloës staterem i. thuris stateres ii. Apparatur autem hoc modo. Ammoniacum & aloën ac thus in aceto macerato, acaciam autem contundito, cribrato ac prædicta cōtrita omnia ammiscero. Crocogramma etiā utiliter cum aceto illinitur: sæpe enim nō abscedit priusquam medeat. Ceterum epithematum medelæ magis fidendum. Pleraque enim eorum quæ in medicamentarijs libris referuntur ex alumine & sulphure composita, prædominantem habent adstrictoriā facultatem. Quare in eis animaduersionē habere oportet, non modo simpliciter facultatis eorum pharmacorum quæ ammiscuntur: uerum etiā quantitatis ipsius mixturæ. Etenim in plagis quæ flatuosum habent tumorem, & maxime in quibus tumor latus est, nihil peccaris etiā si plurimum ex alumine adieceris. In tumoribus uero in scirrhum induratis emollientē & discussoriam facultatē præcellere oportet, quibus parum quiddam ex adstringente sit admixtum. Vnum igitur ex simplicibus & naturalibus, ac nulla arte apparatis, discussoriæ & adstringentis simul est facultatis, ipse uidelicet salis flos, qui splenē in scirrhum induratum sanat, inquit Galenus, calidus in uesicā bubulam coniectus, & forinsecus impositus. Oportet igitur medicum ad affectionē respicere, & pro eius ratione tum addere, tum adimere ex eis quæ in epithematū cōpositionem cōiunguntur, ueluti exempli gratia, si duriciem emollire uelit, ammoniacum et bdellium pingue, ac styracem optimum æqualiter unicuiusque dra. iiii. ammiscere debet. Si uero crassos humores dissecare uelit, opopanax et costi tantundem addet. Quum autem humores diffunduntur, etiā discussoria ac digerentia sunt ammiscenda: aut sterus caprinum in aceto dilutum addendum. Hoc enim & crassitudinem dissecat, & simul discutiendi uim habet. Quod si discutere tantum uelit, humoribus uidelicet antea sufficienter attenuatis, nitrū pro stercore caprino ammiscet. Capparis autem cortex ammixtus ultra hoc quod dissecat et repurgat, etiam splenē corroborat. Habito igitur ad ea quæ ubilibet accidunt respectu, aut emollientia augebis, aut attenuantia, aut etiā ea quæ discutiunt & robur addunt.

Cc

Opti.

Optimum aut epithema emolliens & discussorium hoc est. Cerae quadrantem, propolis sextantem, galbani dra. iiii, opopanacis dra. iiii. Vtere: contumetur hoc pharmacum, & strumas recentes, omnemque duriciem recens oborta dissolvit. Aliud malagma Asclepiadae, quod articulos incuruatos relaxat.

Bdellij pinguis, adipis uitulini, ammoniaci thymiamatis, iridis, cuiusque drac. xvi, opopanacis, galbani, thuris, canchryos, styracis, cuiusque dra. viii. piperis grana clx, cera dra. xlviii, fecis olei irini sextantem ac unciae dimidium, vini quantum satis est. Arida contundito, & cribrato. Ammoniacum, opopanaca, thus, bdellium in uino dissoluito, liquecibilibus aut liquefactis, adfusus, ac simul emollitis utitur. Extreme emolliendi facultate praestat hoc, inquit Galenus, neque enim aliud magis eo emolliens repereris: quod si irini olei inopia sit, cyprino aut lycio nio eius loco utor. Aliud malagma Amythaonis, ad praecordiorum distensiones: conducit & articulis qui difficulter mouentur, omnemque duriciem dissolvit, & priore quidem minus emollit, magis aut digerit ac discutit. Compositio sic habet. Ammoniaci thymiamatis dra. xxxvi, cere dra. xxxvi, terebinthinae dra. viii, bdellij dra. viii, myrrhae dra. iiii, thuris drach. iiii, galbani drach. viii, olei cyprini sexuncem. Myrrham, bdellium, thus, uino praemacerata conterito: ammoniacum in aceto dissoluito: liquecibilia autem liquefacto, affundito, ac utitur. Aliud praedicto longe efficacius, & fortius, inquit Philagrius: discindit enim & attenuat inspissatos humores, & uiscosos repurgat.

Habet autem hoc modo. Malagma Asclepiadae. Ammoniaci thymiamatis sexuncem, galbani, myrrhae, cuiusque sextantem, cerae sesquilibram, thuris quadrantem, opopanacis quadrantem, radices panacis sexuncem, propolis quadrantem, aceti sextarios ii, stercoris caprae quadrantem. Ammoniacum cum aceto terito, deinde etiam thus, galbanum, opopanaca, & myrrham. Propolin autem cum modica cera in mortario tundito: ceram uero cum olei triente liquefacito paulatim donec cogatur decoquendo, & deinde propoli adiecta, ab igne tollito, percolato, ac frigefieri finito, perpollitaque tritis adijcito, unito, ac utitur. Caterum epithema quod ego composui, inquit Philagrius, optimum ad diuturnas & frigidiore affections existit. Myrobalani dra. xlviii, ammoniaci thymiamatis dra. xlviii, bdellij dra. xlviii, scythicum uero bdellium maxime probo, corticis radices capparidis dra. xlviii, mannae dra. xlviii, opopanacis dra. viii, styracis dra. iiii, uisci drac. xii, cerae drach. xlviii, floris salis dra. xlviii. Ammoniacum cum salis flore dissolue: capparin uero, myrobalanum ac mannam cum aceto: reliqua autem iuxta ignem emollito & in mortario tundi to, & tria eis adijcito, unito, ac utitur. Hoc pharmacum splenem consumit.

Aliud. Verbenacam uiridem cum manna terito, atque axungia suilla ueteri excepta imposito. Dura enim corpora & diuturno malo affecta quam maxime inde iuuantur: reliqua uero integre sanat. Prodest etiam uerbenaca per se imposita, itaque trixago. Aliud epithema Asclepiadae, ad splenicis. consumit tumores. Foliorum sambuci tenerorum lib. iiii, aloes pinguis lib. i. cum aceto terito ac lenito, linteoloque excepta imposito. Verum si malum recens est, uniuscuiusque par pondus conijcito. Aliud. Seminis ericae libram i. galbani lib. i. Semen contusum & cribro excussum galbano excipito, rursumque tundito olei irini feces addita, quo malagmatis formam acquirat, et linteolo inditum imposito. Vniuerso aut uiscere, recrementisque eius, atque meatibus, oportunis, per emollientia, repurgantia, diffecantia, attenuantiaque et diffundentia humores, ampliusque etiam per ea quae uias dilatant, tum in potu accepta, tum foris imposita preparatis, efficacius

euacuare potētibz est utendum, ac primum quidem simplicioribus, postea uero etiam fortioribus, ueluti exempli gratia: primum quidem epithymi drachmas IIII. cum seri lactis heminis V. præbeto. Dato autem eas epithymi drachmas IIII. tenuissime tritas cum modico sero, atq; ubi uenter operari inceperit, serum per se paulatim absorbendum exhibeto. Cæterum post aliquot dierum interstitium, ubi uires recollerint, hieram. Archigenis ex colocynthide præbeto, aut quæ Iusti appellatur. Post horum autem omnium usum, farinæ tenuissimæ radicis cyclamini siccæ drach. III. aut IIII. ex aqua mullâ dato, atque quo sudorum exclusionem iuues ægrum uelamentis contegito, & in lecto concalefacito. Epithemata discussoria & resiccantia. Postquam corpus fuerit repurgatum, epithematis quæ digerere siue discutere & resiccare possunt, utendum. qualia sunt quæ ex auripigmento & alumine componuntur: ex quo rum numero est etiam id quo ego, inquit Philagrius, utof. Cera tyrrhenicæ drach. XCIII. resinæ pinus siccæ drach. XCVI. resinæ pinus liquidæ drachmas XCVI. auripigmenti drach. XVI. aluminis scissilis drach. XII. Metallica terito, & liquecibilia cum modico oleo liquefacito, ac refrigeratis sicca adijcito, unito, & utitor. Aliud aurei coloris. Asclepiadæ. ualde pulchrum. Cera libras duas, resinæ pinus siccæ libras duas, auripigmenti sextantem, aluminis scissilis sextantem, calcis uiuæ unciam unam, olei cyprini uncias sedecim, aceti uncias sedecim. Aliud, ad splenicos & hepaticos. Aluminis liquidî, sulphuris uiuî, nitri, ammoniaci thymiamatis, mannae, radicis capparis corticis, singulorum sex uncem, picis libram unam, resinæ pinus siccæ libram unam, olei cyprini sex uncem, aceti quantum sufficit. Aliud epithema hepaticum, Ipoterium appellatum. Resinæ pinus siccæ libram unam, cera libras duas, picis libras duas, aluminis liquidî, nitri, sulphuris uiuî, mannae, cuiusq; libram unam, aloës sex uncem, pyretri, aristolochiæ longæ, bdellij, ammoniaci thymiamatis, amomi, uiscî, cardamomi, olei, cuiusque quadrantem, aceti sesquiseptariû. Ammoniacum, alumē, sulphur, nitrum, cum aceto diluta terito: reliqua uero arida quicquid contundito, ac tritis admisceto: liquecibilia autem liquefacito, atq; reliqua cum eis excipito. Optime faciunt & ex caprino stercore apparatus: item plurima eorum quæ ad hypdropicos sunt descripta: & Machæionis emplastrum, & emplastrum ex rumice, quæ in decimo quinto Sermone referuntur. Phœnigmi, cutem rubefacientes. Efficaciter aut in ipsis phœnigmi auxiliantur, tum qui ex sinapi apparatus, tum qui eis consimiles existunt. Cæterum copore prius à superfluis humoribus euacuato, eos adhibere oportet. Pulcherrimus autē phœnigmus talis est. Phœnigmus Asclepiadæ authemeris, quasi eodem die auxilians inscriptus: qui sanè ab uniuerſa affectione liberat. Pyretri drach. octo, myrobalani, cardamomi, seminis urticæ, piperis, cuiusq; drach. octo, sinapis trientem. Omnia conterito, & aceto subigito, & tepesacta ex interuallo per horas tres imposito, si saltem tam diu sustinere possit: deinde ablato pharmaco lauati præcipito, in feruentioris solij defessu. A balneo autem cerato ex rosaceo apparatus utendum. Alius. Lepidij folia trita cataplasmatîs modo imposito, atque ubi morsum sentiunt, in balneum inducito, & ablato pharmaco, in feruentem aquam immittito & perfundito. Difficulus enim ferunt nimiram mordacitatem. Sani autem exeunt, inquit Archigenes. Idem remedium & ad coxendicum dolores efficacissimum reperitur. Summe etiam auxiliantur myrobalani cortices & nitrum. Nitrum per se terito, & parum aceti ammisceto, deinde resinam ac ceram cum paucio oleo liquefacito, affundito, emollito, ac utitor,

acutior. Cæterum quod operæ precium est cognosse, fortia pharmaca non nisi corpore prius à superfluis humoribus repurgato, & probe concoquente, adhibere oportet. Smegmata, siue repurgatoria. Oportet autem locū ipsum sensim ad phœnigmorum rubefacientium tolerantiam irritare, quod per repurgatoria smegmata commode fieri potest. Componantur autem smegmata ex staphide syluestri, pyetro, pipere, ac alcyonio, pari uel impari modo prout uidebitur coniectis. Quod si teneram carnem habeat æger, iridis, et cyperi, & herbarum fabinæ aliquid his ammiscebis: aut farinam aliquam, ueluti erui, aut fabarum, aut cicerum. Quod si etiam odoratum reddere uelis pharmacum, cassiæ quippiam & phylli ac amomi adde. Si uero durius contingat curandum corpus, ex pumice addes, atque adarce. Postremum autem phœnigmis ex sinapi consimilibusque uteris: corpore prius uniuerso à superfluis humoribus repurgato: ne uidelicet uehementia caloris alia adtrahat recrementa, durioresq; reddat ipsum locum.

De splenicorum uisione.

Cap. XII

Quod si prædicta auxilia irrita sint, inefficaciterq; adhibeantur, ad uisionis patrocinium confugere oportet: ita ut uel per cauteria, uel pharmaca crustas inuramus, & multo tempore saniem effluere sinamus: corpore tamen prius per uenarum incisionem, & purgationē euacuato. Etenim quum ferè in totum uiciatis humoribus splenici sint referti, & non præuacuetur uniuersum corpus, maligna ulcera ex crustis fieri consueuerunt.

Diæta splenicorum.

Cap. XIII

Porro diæta ipsorum splenicorum tempore inflammationis simplex sit & que facile concoquatur: uelut est halica lota, & ptisanæ succus, panis madesactus. Si uero inflammatio diutius remoretur, etiam auicularum carnes eis concedende & pisces petrosi aquis degentes. Vbi uero scirrhus sit perfectus, diæta attenuatoria exhibeatur, & acrium rerum comestiones per interualla. Proprie autem splenicis cōuenit capparum comesta ex aceto mulso. Vinū sit non ualde uetus, quod aqua permisceatur, in qua ferrum sæpe ignitum sit extinctum. Plurimum autem fiducia in exercitamentis ponendū, quibus ante cibum uti conuenit, corpore superfluitatibus non abundante. Ex eorum autem genere ex superabundanti faciunt deambulationes & cursus: & noui sanè aliquos, qui ex his solis ab omni affectione sint liberati: gestationes etiam omnes conueniunt, proprie autem quæ sit in equo. Manifestum autem est quod uociferationes quoque oportuna et in tempore assumptæ eis summe opitulantur.

Cura eorum in quibus splen frigida, uenter uero calida affectione laborat.

Cap. XIII

Cognitu uero necessarium est, quod in aliquibus splen frigida intemperiem habet, & ob id calefacientibus opus habet: uenter autem bile agitur, & contraria spleni sustinet intemperiem: aut etiam citra priuatam affectionē, ex meatu quibilem suscepat, flauam bilem assumit: & absq; hoc etiam, sæpe ob ægram concoctionem & ciborum in uentre corruptionem splen afficitur: etenim aliquando quum frigiditatis sensus cum grauitate circa splenem percipitur, uenter biliosum uomitū reiecit: tunc equidē difficilis cura nobis instat, & quæ difficiliter procedit: nimirum splene caloris fontem expetente: uentre autem atq; etiam uniuerso corpore refrigeratione indigente, atq; id uno & eodem tempore. Quo igitur quantum possibile est utriusq; membri affecti effugiāt lesionē, pro uiribus conabimur ut eos à tristitia & cura, iraq; et uehementibus moribus, multa item in diæta ac cibi

cibi auersatione auocemus simulq; per ea quæ citra molestiam purgant phar-
maca biliosum humorem euacuemus. Os uero uentris firmemus ac corrobore-
mus, ne quid eorum quæ ex reliquo corpore ad ipsum influunt, susceperit. Ca-
terum corroboratio ipsius per ea quæ difficulter corrumpuntur, contingit, de
quibus in secundo mentione fecimus Sermonem. Suffecerit autem ipsis exhibitio
modici panis cum oliuis albis aut colymbadibus appellatis, citra potum, si bal-
neum & prandium differant, ne bilis efferatur. Melius autem est si priusquam
bilis efferatur ieiuniauent. In prandio cibi eis præbeantur tum quantitatis tum
qualitatis moderatæ: uerum ut splen illæsus permaneat, conuenit primum bo-
ni succi & actui calidos præbere, ac deinde postremum tum actui, tum potentia
frigida porrigere, ueluti lactucam & frigidum potum, ac similia: non frigida e-
nim frigidis præsubstrata splenem illæsum ab his quæ postea ingeruntur frigi-
dis, conferuant, ex quibus os uentris corroboratur, & calida ipsius intemperies
corrigitur. Optimum igitur fuerit postremum omnium mala punica, aut etiam
alia, aut pira, aut quædam quæ stomacho grata sunt acceptare: atq; eodem om-
nino modo etiam cenam instituere. Conuenit etiam per ea quæ forinsecus im-
ponuntur hoc modo affectis opitulari. Refrigerant autem uentrem citra nocu-
mentum forinsecus imposita, oleum melinum & rosaceum: cerata item ex ipsi-
dem apparatus, modica mastiche ammixta, aliquando etiam oleo addito ompha-
cino. Calidus itaq; uenter per prædicta lenitur. Ad splenem autem calefacien-
tia adhibenda sunt, qualia sunt epithemata polyarchia appellata.

Cura splenicorum quos tussis infestat.

Cap. xv

Quod si tussicula splenicum infestet, sintq; eiusdem generis adfectiones cir-
ca utraq; uiscera, ueluti si contingat & splenem & pulmonem eodem tempore
crassis ac uiscosis humoribus, aut aliquo alio frigido morbo detineri, tunc sanè
podagricum pharmacum ex ossibus constans, uehementer utile tum spleni, tum
eo modo tussientibus existit, & antidoti quæ ei similes habentur. Si quidem igi-
tur similes contigerint adfectiones, similia remedia adhibere oportet: ubi uero
diuersæ erunt adfectiones, diuersis pharmacis utendum est: utpote si splen à cras-
sis & uiscosis humoribus, & frigidis liquoribus afficiatur: tussis autem à tenui
& acrida destillatione contingat, si modo possibile fuerit, & destillatio non urgeat
uehementer, à pharmacis fluxum cōdensantibus abstinere conducit, ueluti est
quod ex papaueris calicibus constat, itemq; ex seminibus pastillus, & quæ his
similia existunt. Vehementiore autem & acriore existente destillatione, et quæ
periculum exulcerationis pulmonis minetur, utendum quidem ex papaueris
calicibus confectio, uerum spleni epithemata attenuatoria imponantur, at-
qui nisi magna impendat necessitas, ea quæ stupefaciunt uitanda, capiti autem
aliquis ex seminibus pastillus cum aceto rosaceo ad strigmentitiam crassitudi-
nem redactus imponatur: præstat autem ex ipsis in hoc præsertim usu, hi qui
tudinem redacti, lanaq; conuoluta excepti, ac sincipiti impositi tenuitatem de-
stillationis inspissant, simulq; exurentem & acrem in capite qualitatem refrige-
rant, tussis sedant, & somnum suauem inducunt. Post hæc autem theriace per
opium recens apparatus in potu accepta, tussientibus quibus simul splen affe-
ctus est, auxiliatur.

Cura eorum quibus splen in magnitudinem excreuit,
simulq; durus existit.

Cap. xvi

Quidam ex splenicis immodice auctum splenem habent, ut non solum hepar
& ingul-

Cc 3

& inguina contingat, sed & ob soliditatē attollatur, vitalesq; cordis vires maxime moperē lædat, ac imbecillitatē inducat, utq; ex eo uniuersum refrigeretur corpus, ipsumq; adeo hepar tenuissimum & aquosissimum in ipsis fiat & eiusmodi quoq; sanguis. Horum sanè qui hoc modo sunt affecti curam recusare oportet: quod si cogamur tamen, à dubijs & hebetibus remedijs auspicabimur, periculo eis incumbente prædicto. Verum neq; intra corpus sumendum, neq; forinsecus adhibendum, ullum aliquod uehemens pharmacum offeremus: neq; euacuationem etiam coaceruatim faciemus, sed paulatim et per simpliciorum medicaminum usum. Cæterum tum per os exhibitis, tum foris admotis, & quantum possibile fuerit conuenienti diæta, uirium imbecillitate resocillata, si in melius proficere ipsos uidemus, fortioribus omnino remedijs utemur, ita tamen ut sensim aucta ipsa apponamus.

De ictero, seu morbo arquato: ex libris Ruffi & Galeni.

Cap. xvii

Icterus à similitudine ad animalculum, quod ictis, id est, uiuerra appellatur, nominatus est: est autem mustela syluestris, quæ auricolores oculos habet. Verum icterus morbus biliosus humoris circum corpus effusio est, ob secernentis eum facultatis debilitatem, quæ eum segregare et ad proprios excretionis locos demittere non ualeat. Errare autem eos credendum est qui hepatis affectionem in omnibus ictericis adesse putauerunt. Conspicitur enim sæpe quum hepar nihil male est affectum, flauæ bilis ad cutem effusio facta in iudicationibus morborum. Conspicitur etiam citra febrem aliquando sanguis in bilem exagitatius per corruptionem uidelicet aliquam peregrinam: qualis quoq; à uenenatarum bestiarum moribus contingere consuevit: etenim quum quispiam à uipera morsus esset, uniuersum corpus prasinum siue porracei coloris habuit, & quum assidue theriacem bibisset, celerrime sanatus est: quare nihil mirum est: talem aliquando contingere humorum in corpore per mutationem, ut uniuersum corpus ictericum colorem assumat. Quin & fieri potest ut propter naturalis temperiei ipsius hepatis mutationem, eiusmodi humorum corruptio contingat, ut aliquando herbis pallore albicantibus totum corpus manifeste assimiletur, aliquando etiam plumbi colorem induat. Quemadmodum etiam eiusmodi colores nigricantiores fiunt, si ob splenem quàm si ob hepar affectum contingant. Splenem licet ad attrahendum ad se ex hepate atræ bilis humorem, & ad repurgandum sanguinem pro more suo debilitato. Fit autem aliquando icterus ob imbecillitatem uesicæ bilis susceptricis, quæ biliosum humorem, ueluti consuevit, in se se ex hepate non attrahit, & ob id impurum sanguinem relinquit. Possibile est etiam eam nimis repleti, aut repletam propter repletionis multitudinem non posse euacuari: Aliquando autem & propter obturationem aut debilitatem uenarum, quarum ora ex ipsa ad hepar deferuntur, biliosum humorem non attrahit. Quare in ictericis affectionibus recrementorum figura necessario consideratur, quum in aliquibus multum colorata per flauam bilem appareant recrementa, quemadmodum etiam in alijs urinæ. In quibus enim ratione iudicationis bonæ in febribus, biliosus humor ad cutem prorumpit, his & recrementa & urinæ naturali modo se habere uidebuntur. Quibus cunctis uero citra febrem, unà cum grauitatis alicuius aut doloris sensu circa dextrum ilium, arquatus est. Quibus autem neq; grauitatis neq; doloris sensus circa ilium adest, in his splenem uitiati humoris causam esse iudicabimus: Si autem neq; dolor neq; grauitas circa

tas circa illa infestet, neque febris praecessit, & tamen sanguis in uniuerso corpore in bilem mutetur, atque ita arquatus contingat, his pruriginosior cutis fiet & magis etiam arefcet. In quibus uero atrae bilis humor una cum sanguine ad cutem est delatus, hi omnino grauius afficiuntur. Consequitur enim ipsos tristitia praeter rationem, & mordacitas eorum quae circa uentrem sunt, difficultasque spirandi, & cibos auersantur, & nigra lotia excernunt. Aliquando autem & per interualla quaedam corpora ipsorum tepescunt: stercora uero chalcanti colorem referunt, & aluus magis his resiccatur. Ceterum eos qui ex pallida bile arquatum contrahunt: nulla mordacitas eorum quae circa uentrem sunt consequitur, neque etiam in tantum auersantur cibos: sed obtusior tamen aliquando fit in eis ciborum appetitus, & stercora quidem albida egeruntur, urinae autem crocei coloris, turbatae tamen & tenebras referentes permanent. Communiter autem omnibus ictericis pigricies & tumor grauians ad motum corporis contingit, & ad dulces cibos animum habent alienatum: amaros uero non admodum auersantur, et uariis imaginationibus uexantur. Pruritus etiam uniuersi corporis committatur, & difficulter exudant. Porro alba oculorum & partes faciei temporibus propinqua, itemque malae pallorem ostendunt: uenae etiam sub lingua repletae reperiuntur, & abundantem humorem significant.

Cura arquati.

Cap. XVIII

Arquati igitur qui ratione bonae iudicationis febribus perfecte solutis fiunt, facillime sedantur: si aegri lauacris aquarum dulcium utantur, ac olei dicussorij perfrictione, omnibusque quae rarefaciunt cutem: qualia sunt oleum chamaemelinum, anethinum, irinum, gleucinum, amaracinum & rosmarinus herba oleo incocta ipsum plurimum discussorium facit. Dietam quoque uniuersam humectiorem in his constituere oportet, & ut mediocriter humorum crassitudinem attenuare possit. In reliquis autem ictericis duo maxima remedia principatum obtinent, sectio uenae, & purgatio. In quibus igitur multitudo sanguinis una cum bile in toto corpore abidat, et quos circa hepar aut splenem dolor aut distensio infestat, nihil uenae incisione commodius fieri potest, si nulla alia re id facere praepediaris, particulatim autem & per uices sanguis est detrahendus, ne per coaceruatam euacuationem vires egri prosternantur: neque uero inepte clyster adhibetur, si uenae sectio impediatur. A uenae autem incisione etiam commode clyster assumitur, qui propter stercorum euacuationem spirandi facilitatem inducit, intestinaque irritando ac mordendo, humores ad cutis superficiem delatos, ad ipsa retrahit & reuellit. Purgationes autem magis propriae & familiares huic morbo existunt, inquit Rufus. Ceterum edulsi ac potionibus itemque pharmacis, humores prius attenuare oportet, obturationesque deopillare, atque deinde pharmacum exhibere quod flauam aut nigram bilem ducit. Sint autem purgationes ictericis exhibendae fortiores: ob uentris enim siccitatem, imbecilliores, inefficaces in ipsis cognoscuntur: quare in principio purgare non oportet, priusquam per deoppillantiam bilis attenuetur, & quodam modo ad intestina reducat, maximi namque malae causam, purgationes in principio datae praebuerunt. Itaque conuenit primum deoppillantibus mox dicendis uti, atque ubi attenuatio humorum ac deoppillatio fuerit facta, tum demum conuenientis, & forte (ut dixi) pharmacum purgatiuum est exhibendum. Quod si primo purgatiuo pharmaco nihil proficias, rursus forte aliquod deoppillatorium pharmacum bibendum praebe, & post triduum rursus uiolentius pro secunda uice purgato inquit Rufus, ut etiam ad finem purgationis una cum uehementissima mordacitate

Cc 4 bilis

bilis excernatur, quæ carulea magis sit quam flaua. Ego itaque euphorbium, epithymum, aloë, petroselinum, & dauci semen misceo, ac ictericos purgo. Optime etiam ipsos purgat hoc, Piperis longi scrupulos nouem, piperis nigri scrupulos quinque, scammoniae scrupulos sex, ammi scrupulos quatuor, seminis feniculi sesqui scrupulū, seminis apij scrup. ii, et dimidium, caroi scrup. iiii, anisi scrup. iiii, mellis quantum satis est, quo ad strigmentitiam crassitudinem redigatur. Datur nucis ponticæ magnitudine cum cochleari aceti albi & aquæ calidæ tantundem. In melancholicis autem ad prædictum dimensum farinæ epithymi scrup. iiii, addere oportet. Vehementer commodum & hoc est. Colocynthidem magnam superne perforato, ciecitoq; semine, id quod instar tomenti in ea est finito, ac uinum uetus dulce infundito, et pernoctare in ea permittito: mane uero per panniculum detritæ uestis diligenter percolato, & uinum calefactum his qui flaua bile abundant bibendum præbeto. Ad melancholicos autem epithymi scrupuli sex in uino dulci præcoquantur, id ipsumq; uinum colocynthidi infundatur, ac ut dictum est, bibendum præbeatur. Cyclamini quoque radix trita potata, post deoppilantia remedia, aptissima est ad uiscera repurganda, & ad bilem in uniuersa cute excludendam per sudorem: quare post eius positionem, sudorum exclusionem per uelamenta ac concalescentiam in lecto iuuare oportet. Dantur autem ad summum ex ea drachmæ quatuor ex aqua mulsa. Quod si inflammatio circa partem aliquam uiscerum subiaceat, primum irrigationibus & cataplasmatibus utendum est, & post ea ceratis & epithematis ad uiscerum inflammationem præscriptis. Præstat autem farinæ ammiscere rosamarinum herbam, florem iunci odorati, absinthium, artemisiam, abrotonum, rutam, cardamomum, chamæpityn, scordium, polium, ac chamædryn. Hæc enim singula ammixta urinam cient, quod morbo maxime conducit, & uisceribus inflammatis prodest. Cucurbitulis etiam utendum, hepate quidem affecto inanibus, & aliquando cum scarificatione: splene autem adfecto omnino cum scarificatione: inanes enim splenem nihil iuuant. Pharmaca autem quæ in potu accepta ab obturatione ictericos liberant, maxima ex parte urinam cient, uelut est apij decoctum, & adianti, ac similia: Vtilis est & absinthij cremor per se, & cum nardo indica, ac iunci rotundi odorati flore. Item pulegij decoctum, & calaminthes & uerbenacæ rectæ ac oxallidis. Est autem oxallis rumex acrisapocæ: hæc sanè per se comesta, & radicis decoctum ad tertias redactum ac potatum celerrime auxiliatur. Prodest etiam rumex satiuus, & anchusæ radix, rubiæ radix, chamæpityos, rosamarinus, & aristolochiæ. Mirifice etiam prodest, serpillum, hypericum, & eius generis plurima alia. Singula hæc in aqua ad tertias decocta cum uino dulci bibenda præbeto, aut contundito & cribrato, ac singulorum drach. i. dato. Præclare quoque facit corticis raphani succus, uino meraco dulci permixtus aut uino mulso: ita ut succi cyathi duo, uni uini cyatho contemperentur. Datur item ualde commode cichorij et seridis succus, febrientibus quidem per se, febre carentibus cum uino: brassicæ item succus eodem modo, et cornu ceruini ramenta cochlearij mensura, petroselinum, anisum, asarum, rheon: commodissimum autem est chamæmelon quæ & leucanthemos adpellatur, itemq; bupthalmum. Aliud multi experimenti. Spumæ nitræ albæ drachm. duas, in uino ueteri dulci macerato trium cyathorum mensura, et per totam noctem sub diuo posito, & ad triduum aut quatrimum bibendum præbeto. Aliud præter opinionem. Vermes terrenos coctos ac cum myrrha

troglodytica tritos, in fabæ magnitudinem ex passo aut uino mulso dato, & postera die icterum per lotium efficiunt. Idem faciunt & absq; myrrha dati. Exhibe hoc ad triduum, ac utere cōfidenter. Pastillus ictericus, qui ictericis, & hepaticis mirabiliter cōducit. Amygdalarū amararū repurgatarū dra. iiii, anisi, comæ absinthij, cuiusq; dra. ii, spicæ nardi dra. i, asari dra. i, contundito & cribrato reliqua, amygdalas autē cum aqua terito, & pastillos informato: ex quibus dra. i, febre carentibus ex uini mulsi cyathis iiii, præbeto. Cæterum pharmaca quæ in potu accipiuntur omnia si fieri potest, in balneo exhibeantur, ubi ægri in calidum lauacrum conscendere parant. Plurimum autem diætæ uirium refocillatrici intentum esse oportet, per quam uis discretiua reparatur, & si quod membrum læsum sit corroboratur, ac præsens coloris corruptio repurgatur: quapropter conueniunt exercitamenta, & gestationes, et inunctiones ac exudationes ita ut ad pyriateria, hoc est, uaporatoria sicca, & ad solem, & in balneis quoq; corpus niri puluere ulti, ac uini fece arida usq; ac tenuissime trita defricemus. Optimum autē & serpyllum et thus pari modo cum oleo illita. Rosmarinus item herba in oleo decocta, si oleum illinatur prodest. Cibi autē omnes incisorij sint & attenuatorii, & quicunq; inter attenuatoria edulia prædicti sunt in secundo Sermone: ex uolucrum quidem genere, mōtanæ: ex piscibus uero, qui petroselinis aquis degunt: ex ostreis, herinacei recentes. Olera uero sint quæ magis urinam cient, præsertim seris, intyba, asparagi palustres, smyrnium, carduus, eryngium; ex satuiis autem conuenit brassica & asparagus eius, raphani, allia cruda & cocta. Carnes autem ferinæ mansuetis magis sunt aptæ: pro liquamine seu embāmare, ualet acetum in quo scilla & aristolochia sint macerata. A fructibus abstinentum. Bellaria sint amygdalæ, sed modice sumantur, & cicer modicum torrefactum. Ex leguminibus cicer assatum, & maxime decoctum ipsorum assidue potatum. Ieiuni autem citrium comedant repurgatum. Vinum conuenit album & subadstringens, neq; ualde uetustum: ubiq; autem mediocritas optima censetur. Quod si quippiā ex ictero circa faciem & oculos relinquatur, urinæ autem appareant puræ, aliusq; consueto more egerat, & appetitus in nullo re obstat, neq; infestet sitis: & ut compendio dicam, quum omnes prædictæ accessiones fuerint sedatæ, & tamen circa oculos uitiatus color relinquatur: narium infusis utendum: fortissimum autem omnium est elaterium cum lacte muliebri infusum, facit & cyclamini succus, & melanthium cum aceto: debilius his est anagallidis succus, & succus radicis betæ. Depurgat autem cyclaminus crassissimum mucum: elaterium autem pituitam & bilem. Omnium autem efficacissimum ad eos reperi atramentum futurium lacte muliebri dissolutum ac naribus infusum: inde enim bilem large ex naribus destillantem uidebis. Oportet autē poscam probe dilutam in ore detinere dum infunditur hocce pharmacum. Præstat tamen primum cyclaminum infundi, quo crassa per eam euacuentur, et postea ipsum futurium atramentum.

De malo corporis habitu: Archigenis.

Cap. xix

Quum corporis habitus in aquositate diffunditur, cachexia, id est, malus habitus à Græcis appellatur, in quo uniuersa corporis miscella laxior fit ac emollescit, quod maxime ex somno inæqualiter contingente fit manifestum: corpūsque ipsum totum cum uirore albicans redditur ac inuolidum, ita ut crura inter eundem uacillent, & in principio quidem concoctiones impediuntur manente etiamdum appetitu: postea uero & fastidium accedit: & respiratio ipsis fit rara ac debilis, quæ motibus & actionibus condensatur, Alius etiam inæqualia

inæqualia recrementa excernit. Hæc affectio ut plurimum ex longo morbo congregatur: iam uero & ex uiscere quopiam in scirrhum indurato consequitur, maxime hepate & splene: neq̃ raro in dysenteria diuturna et affectionibus coeliacis contingit, ob consuetam item aliquam cohibitam excretionem. Capiuntur aut̃ hac adfectione maxime senes, qui etiã maxime liberantur: imo et pueri, qui facile pereunt, propter uitalis firmitatis debilitatem, & quod ob cutis raritatem succi in eis facile transpirat. At uero qui in uigore sunt, raro incidunt, & facile se inde extricant. Quod si diutius adsit malum in aquam inter cutem transit. Quod uero ad curam attinet, siquidem ex consuetæ excretionis cohibitione affectio contingat, admonere ac irritare eã ipsam excretionem oportet. Aut uenam incidere in cubito, si nihil sit quod id fieri præpediat, paulatim ac partitis uicibus per triduum sanguinem detrahendo. Si uero uenæ incisio impediatur, conuenienti medicina depurgante ipsos purgare oportet, et maxime ex hiera Archigenis ex colocynthide apprata. Quod si hepar sit adfectum aut aliquod aliud ex uisceribus, medelam adhibere his ipsis conuenit, per auxilia ad singula ipsorum supra præscripta. A localibus autem remedijs, ad diætam uiribus reparandis aptam transeundum, per quam spes est eos qui huic malo sunt implici ad restitutionem in integrum peruenturos. Diætæ autem qua uires refocillantur in moderatis deambulationibus consistit, gestationibus, uociferationibus, & defricationibus siccis per linteola ex lino crudo, deinde per inunctionem ex oleo, cui quædam quæ humorem resiccant sint infarta, ueluti sunt nitrum & sales. Postea uero & exercitamenta moderata conducunt. Ad lassitudinis autem curationem balneum per interualla quædam adhibeatur: quod si quis ad frigida lauacrum aduersari possit, compendio ad omnem mali curationem peruenerit. Aquæ item quædam naturales calidæ robori ac uiribus reparandis conducunt, quales sunt aluminosæ, sulphurentæ, ac nitrosæ. Mirabiliter autem ipsos iuuat assidua absinthij præparatio & adhibiti dropaces. Cibi eorum sint simplices, & qui facile concoqui possint, parum conditi olerum uidelicet gratia: si quidem opus sit per ipsa urinam ciere, & aluum submollire. Vinum conuenit eis album, tenue, odorum. Bellaria omnia uident, omnia item nidorosa, & graueolentia: humoris crassi, & uiscosa, & quæ diffiçulter concoquuntur à cibis eorum sint aliena.

De hydropæ, siue aqua inter cutem.

Cap. xx

Hydropis differentia tres sunt: alius enim ascites, ab utre appellatur: alius tympanites, à tympano: & tertius sarcites, aut iuxta carnem, hoc est, subtercutis, à Græcis etiam leucophlegmatias nominatus. Ascites igitur fit, quum inter pelliculam peritonæum appellatam, et intestina plurima aquosi humoris collectio contingit, ut uere utris modo pellicula ipsa repleta esse uideatur: aliquando uero ubi peius habent ægri usq̃ ad fœmora tumor producit, quando sanè ascites et sarcites hydropis complexus factus apparet: unde aliquando quidem pedes inflantur, aliquando naturali modo habent. Tympanites uero flatus aëre repleti, ac superflui plurimam collectionem in iisdem uentri incumbētibus locis faciunt, ut in principio sola inflatio esse uideatur: postea tamen flatus inspissatur, & ueluti nubilus redditur, atq̃ ita unã cum flatu, quasi nebulosus humor consistit ac congregatur. Infert autem tympanites multam circumtensionem, atq̃ in ipso etiam usq̃ ad fœmora & pedes tumor procedit. Porro sarcites per omnẽ corporis coagmætationem ac miscellam humorem disseminat, ut instar spongiarum aut papyri uniuersa caro permadefacta appareat: atq̃ ob id totũ corpus similiter ut

ter ut illa intumescit, ac mortuo simile euadit. Communiter autē omnis hydrops spirandi difficultatem, & tumorem, & grauitatem, & uitiatum colorem inducit, ex uirore nimirum albicantibus ægris: fastidiunt etiā cibum, potum autem largiorē plurimū appetunt, maxime qui ex ascite laborant. Etenim humor qui in locis detinetur falsus est & putrefactus, quare & sitis & febris augescit: se re enim in totum plurimi ex hydropicis febriunt, Consequitur autem aqua interius omnes morbos qui habitum corrumpunt: una est enim ad hydropē apertitudo, coagmentatæ corporis miscellæ demolitio & ruina. Contingit autē hæc aut ob super excellentem hepatis frigiditatem, aut ob aliqua alia membra uehementer refrigerata, quæ hepar in eandem dispositionem deducere ualent: citra enim hepatis refrigerationem impossibile est aquam cōgelari et aliquem in hydropem incidere. Coafficitur autē hepar spleni refrigerato, aluoq; & intestinis; maxime his quæ iuxta ieiunū intestinum sunt, pulmoniq; & renibus, ac septo transuerso. Congregatur etiā ex immodica hæmorrhoidum euacuatione, aut ex fluxu muliebri, aut ob menstruorum retentionem, aut ob aliam quandam magnam uulvæ affectionem. In his enim omnibus nullum præter naturam tumorem hepar habere conspicitur, & tamē aquæ inter cutem morbo corpus apprehenditur, ex sola refrigeratione hepate in his in principio affectio: post uero aliquādo et durū fit, quod palam in illis uidere est, qui ex intempestiua frigida aquæ potione hepatis acuatim refrigeratū habent, ut statim aquæ suffusionē operetur, priusq; ipsum in scirrhum tumore eleuetur. His autē qui ex frigida potu aquam inter cutem incurrerunt, uehementiores ciborum appetitiones fiunt, propter oris ipsius uētris frigiditatem. Multi autē & à podagra & coxendicū dolore uexati, aquā inter cutem inciderunt. Frequentissime autē eos qui cibum nō sentiunt, & malo corporis habitu præditi sunt, itemq; ab arquato infestatos, hydrops consequitur, celiacā item affectionē & dysenteria. Nouimus etiā quosdam qui ex recta spiratione quā orthopnoeā uocant, in aquā inter cutē sunt deducti. Ceterū huic affectioni nō minus scēminæ quā uiri fiūt obnoxij: pueri uero ut plurimū ab hydropē sarcite apprehenduntur. Est autē tympanites omnino periculosus, minus eo ascites: adhibetur enim in eo pertusio siue punctio, quā paracētesin Græci appellāt, et reliquis quoq; remedijs promptius quā ille obedit. Sarcites quoq; aliquando curabilis fit per ea quæ cuti adhibentur humorem detrahētia ac resiccantia pharmaca. Omnes autē inueterati hydropes et qui iam habitū corrumpunt, sunt periculosi. Fiunt etiā aliquando bullæ inter peritonæum pelliculam & intestina, figura uesicæ similes et serosum humore continentes: hæ ipsæ sanē per fluctuationes quasdam inæquales deprehenduntur: nimirum propriū locum secundum lineamenta quædam distributum ac uelut circumscriptum, ipso humore tenente.

Ascitæ ac tympanitæ hydropis cura.

Cap. XXI

Quoniam itaque difficilis sit, quemadmodum prædictum est, aquosæ affectionis cura, plurimo artis auxilio opus habet: in his igitur qui febricitant hydropicis febre intermittente curam faciemus: itaque cataplasmata ex farina ordeacea, altheæque ac caricis ipsis adhibebimus, ita ut in tympanite quidem magis ex seminibus flatus discutientibus commisceamus: in ascite uero magis ea quæ euacuant humorem. Cæterum post principium efficaciora sunt cataplasmata quæ pro ordeacea, fabaceam farinam suscipiūt, itemq; eruinā, cuiusq; partem mensuram, coquuntur autem cum muria aut aceto mulso. Prestat etiam loliaceæ

loliacea farina cum caricis, & absinthio, hyssopoq; & origano ex aceto mulso: item bulbi cum melle: aut armentariae bouis stercus ex posca siue aceto mulso: habeat autem quartam partem sulphuris uiui inspersam, admirandum hoc est, ac minime praetereundum. Valet & caprinū stercus in pueri incorrupti, & uenerem nondum experti urina impositum: humorem enim per uentrem euacuat. Valet & lupini farina, aut hederæ folia trita & uino decocta: aut ficuum partes duæ cum cupressi coma, & nitro: aut lens palustris in figulino uase decata, trita & imposita: aut cochleæ crudæ cum carne sua trita impositæ, non enim priusquàm humor desicetur discedunt: aut alumen plurimū sæuo caprino exceptum imponere: aut caricas, nitrū, castorium, marrubiū, aut filicem in pipila cōtundito, et raphanos donec colliquefiant coquito, deinde simul terito, et farina ordeacea adiecta, cataplasmatibus modo imposito. Cataplasma optimum ad asciten. Lathyridum partes III. squamæ aeris partē I. radices chamaeleonis partes III. coquantur in aceto mulso in quo adeps taurinus sit præliquatus.

Aliud optimum ad asciten. Stercoris columbini partem I. stercoris caprini tantundem, buphthalmi herbe tantundem aut leucanthemi, hæc tusa in acerrimo aceto ac melle coquatur. Aliud Salis fossilis partem I. salis cappadocici partem unam, lathyridum contusarum partes tres, coquantur simul aqua marina aut sulphurenta. Optimum est hoc pharmacum. Sensibiliter enim uidetur materiam euacuatam, & tumorem discussum. Aliud. Rhois quo tinctores coriorum utuntur sextarium I. pollinis frumentacei aut loliacei aut farinæ fabaceæ sextarium I. thuris quadrantem, aluminis scissi quadrantem, imposito cum aceto mulso hydropicis, splenicis, dysentericis, ac coeliacis. Aliud. Radicis cucumeris agrestis unc. xvi. ficuum pinguiū unc. xvi. radices altheæ unc. xvi. Radicem unamquamq; per se tundito ac cribrato: ficus uero cum uino coquito, ac probe terito, siccaq; trita inspergito. Vtitor, per alium enim humorem educit. Aliud. Elaterij, staphidis syluestris, succi hyssopi, fellis taurini, ficuum, Omnia in mortario tundito, subigito ac utitor. Poteris et prædicta in secundo Sermone cura uti, de diuersis uidelicet terræ differentijs. Cataplasmata, quæ magis ad tympaniten faciunt. Farinæ scœnigraci, farinæ ordeaceæ, uirgultorum rubi, comæ absinthij, foliorum rute, seminis apij, cumini, sisynis aut ligustici, mellis, & uini, & olei. Aliud, ad hydropicos inflatos. Panis contusi sextarium unum cumini sextarij quartam partem, famulci quadrantem, pyretri sextantem, euphorbij unciam unam. Cum uino mulso uersam spinam & alium usq; ad mamillas & pudenda contegito, alternisq; diebus soluito, atq; id quinquies aut sexies facito. Ego pro euphorbio struthion cōieci. Vnguentum Apollonij. Stercus accipitris cum syluestris brassicæ succo assidue illinito, mirifice facit: uerum melius fuerit si aquilæ stercus ammiscueris. Aliud. Laterem diligentissime instar uasis figulini assatum cum hyoscyami aut plantaginis succo terito, & quàm crassissime ad solem frequenter illinito. Vnguentum ad hydropicos. Radicis cucumeris syluestris, radices bryoniæ, utriusq; libras duas, staphidis syluestris sex uncæ, nitrī sex uncem, olei libram unam, aquæ marinæ sextarium unum. Quod si non adsit aqua marina, pro ea muriam cōiicito, resinæ à nauibus unā cum cera derafæ, apochyma Græci appellant, libras tres. Radices tenuiter contundito, nitrum & staphidem terito & per triduum madefacito, deinde usq; ad aquæ consumptionem coquito, percolato, & apochyma adijcito, quo liquefacto utitor, ex eo saepe illinens tumorem.

Epithē

Epithemata hydropica.

Cap. XXXII

Asclepiadae. Epithema hydropicis ualde commodum, quod adiacentem humorem absorbet: quo etiam priuatim, inquit Archigenes, utor. Farris cluſini appellati mola triti sextarios duos, floris lapidis aſij sextariū unum, alij autem duos habent, mannae sextarium unum, diligenter terito, & adipe ſuillo ueteri probe ſubacto, & per noctem in uino macerato excipito. Eius autem quantitas tanta ſit, quanta ad hoc ut ad tactum molle reddatur pharmacum ſuffecerit. Aliud. Seminis rutae ſylueſtris, quod beſaſa & harmala quidam appellant, contuſi & cribrati sextarium unum, mannae sextarij dimidium, adipis ſuilli ueteris quantum ſufficit, ut praedictum eſt apparato. Aliud, cui teſtimoniū praebet Oribalius. Foeni graeci trientem, farinae ordeaceae quadrantē, ſtercoris columbini trientem, reſinae pinus ſiccaē lib. i. picis libram unā, cerae lib. i. axungiae ueteris libras duas: quae eliquari poſſunt eliquato, et ad alia in mortario cōtuſa & cum aceto trita adfundito. Aliud ex farinis epithema. Picis ſiccaē libras duas, reſinae pinus libras quatuor, cerae libras tres, olei ueteris libram i. farinae tritici, ordeci, foeni graeci, baccarum lauri, aniſi, ſalis, farinae radicis chamaeleonis nigrae, ſingulorum beſſem, uini auſteri sextarium unum, apparato ut praedictum eſt, ac utitor. Facit & ad hepaticas diſpoſitiones. Ego autem, inquit Aſclepiades, & chamelaeae quadrantem adieci, & pro triticea farina, irinam amiſcuī. Pharmacum, quod omnē tumorem genereſe reſiccat.

Cimolię quadrantem, cerae quadrantem, olei quadrantem, ſalis unciam i. reſinae à nauibus cum cera deſaſa drach. centum & ſexaginta, farinae foeni graeci drachmas uiginti, foliorum braſſicae uiridum quincūcem. Liqueſacta reliquis tritis in mortario adfunde. Aliud epithema ualde pulchrum. Stercoris capri ſextantem, ſtercoris bubuli ſextantem, ſtercoris columbini ſextantem, farinae fabaceae ſex uncem, calaminthae, ſalis nitri, ſeminis apij, ſeminis daucis, ſeminis foeniculi, cumini, cuiuſq; unc. i. panis aridi quadrantem, mellis ſex uncē, terebinthinae quadrantem. Vtitor. Epithema ex ſtercore caprino ad hydropicos, qui hepar induratum habent apparatum. Olei cyprini, aut ſi hoc non adſit uetuliſſimi lib. vi. cerae lib. ii. & dimidiam, ſtercoris caprini beſſem, baccarum lauri decorticatarū beſſem, irridis beſſem, terebinthinae lib. i. ſinapis, nitri, cyperi, pyretri, ſeminis raphani, corticis radicis capparis, cuiuſq; quadrantem, medullae colocynthidis unciam unam, foeni graeci unciam unam. Aliqua do quidem arida liquefactis inſperguntur: aliquando uero aceto prius ſubiguntur. Ego autem, inquit Aſclepiades, colocynthidis ſextantem adiſcio. Quod ſi alius fluat, omnino colocynthidem amoueto: ſtercus autem caprinum ſiquidem aridum ſit, tunditur & cribratur: molle autem & recens aceto dilutum teritur. Malagma, quo Eras uſus eſt: quod imponendum eſt; neque prius amouendum quā ſua ſponte decidat. Viſci lib. i. lapidis aſij ſex uncem, calcis uiuae quadrantem, olei cedrini lib. i. Viſcum et oleum ad calidum ac ſeruientem cinerem coquito, inſperſiſq; aridis tritis, remollito ac utitor. Aliud. Caricarum pinguiū lib. vi. aut iii. ſpumae nitri lib. i. organi lib. i. ſulphuris uiui quadrantem, cochlearum aſfricanarum libram unam. Arida contundito & cribrato, ac ficis cum carne cochlearum contuſis excipito, & melle cocto ſufficiēti adieſto utitor in linteolum inſartis. Aliud. Radicū braſſicae tenuiſſime tritarum libram unam, calcis uiuae lotae libram i. elaterij quadrantem, axungiae ueteris libras tres. Ad formam malagmatis reducito, et in linteolum inſarcico, ac per omnem aluum imponito, alterniſq; diebus ſoluito. Vrinam prolicit.

Dd Malagma

Malagma ipoterium Inscriptum: pharmacum accommodatum, ac prosperi successus, cuius periculum feci, inquit Philagrius, in hydropicis, splenicis, & affectionibus inueteratis: deprimit enim tumorem. Resinae pinus torrefactae lib. III, ceræ lib. II, picis lib. I, I, aluminis liquidi, nitri rubri, sulphuris uiui, mannae, cuiusque libram unam, aloës sex uncem, pyretri, aristolochiae, ammoniaci, bdellij, amomi, cardamomi, uisci probe subacti, myrrhae, radices cucumeris sylvestris, succi sycomororū, cuiusque quadrantē, olei libras tres, aceti sesquiseptariū. Quemadmodū moris est apparato. Arida aceto diluuntur. Malagma ex baccis lauri aridis, ad hydropicos et splenicos, omnem duritiā dissoluit, abscessus in profundo sitos abforbet. Ceræ, resinae pinus, picis brutiae siccae, nitri rubri, baccarū lauri aridarū, ammoniaci thymiamatis, adipis uitulini probe subacti, singulorū lib. unā. Arida cōtundito, ac per tenuissimū cribrū excutito: quæ uero eliquari possunt liquefacito, eisq; arida inspergito ac unīto, deindeq; ammoniaco cū aceto dissoluto affundito. Ego etiā nitrum cū aceto dissoluo. Emplastrū Tonforis appellatū, ad splenicos & hydropicos. Hoc tonfor ex Bithynia usus, multos a coxendicū dolore in totū liberauit. Picis siccae lib. IIII, ceræ lib. II, resinae pinus lib. I, farinae sceni graeci, pollinis radices herbae chamaeleonis nigrae, cuiusque bessem, cumini tenuissime triti trientem. Apparato, & ut dictū est utitur. Emplastrū pardalis appellatū: Andreae. Pharmacū inueteratis hydropicis prospere accommodatum.

Grani cnidij depurati, rhois rubri, spumæ nitri, salis ammoniaci, aristolochiae tenuis maxime corticis, radices cucumeris sylvestris, terebinthinæ, cuiusque drach. III, piperis cōmunis, piperis longi, ammoniaci thymiamatis, iridis, bdellij, thuris, cardamomi, xyloballami, cassiae, myrrhae, amomi, adipis taurini, adipis caprini resinae pinus siccae, cuiusque drach. X, ceræ sesquilibrā. Visci probe subacti sextantem, unguenti irini aut potius fecis sexuncē, succi sycomororū sextantē si haberi possit. Cerā, resinā, adipem caprinū, liquefacito, refrigerato, & cerati modo leuigata ac cōtectā asservato. Bdeliū autem & ammoniacū & succi sycomororum sextantem, præcedenti die in uini quincunce macerato, sequentiq; in sole terito, et cōiecto in mortariū cerato bdelliū et reliqua cū eo adiuncto et diligenter tūdito, deinde arida trita paulatim addito. & per biduū tusa in densam pellē recondito, ne quid inde transpiret. Quidam autem hyssopi drach. IIII, addunt, & irinū largius affundunt, quo modo usus est Eras Cappadox & Asclepiades. Facit ad multas & uarias affectiones, facit ad hepaticos, splenicos, suppuratos, & arthriticos, podagricos qui a calefactorijs iuuantur, è coxendicum dolore laborantes, pleuriticos, præcordiorum affectiones, & omnia quæ concalescentia opus habent. Vtere & ad strumosos, emplastro ad strumæ magnitudinem facto & imposito: suppurat enim, perforat, rumpit, eademq; attrahit, & cicatricem inducit. Cōducit & ad ossa contrita, educit spinas, & omnia in profundo fixa: facit & ad suppuratos præclare. & ad omnes duritiās internas. Inflammationes autem internas eadem die soluit. Utitur & ad tubercula, dissoluit & cancerata & panos. prodest cōuulsis & a scorpio percussis: summe autem hydropicis cōfert. Quod si & ad lassitudinem neruorum adq; dolorem leniendum uti uelis, ad unam emplastri partem, irinum, nardinum, cyprinum, fusinum, butyrum, lentiscinum, adipem, caryopum, mel, singulorum æquales partes misceto, & ad solidi strigmenti crassitudinem redigito, ac utitur. Epithema hydropicis, splenicis: abscessus & furunculos sanat: humores in profundo & in articulis resiccant: hydrocephalis, hoc est quibus aquosus humor in capite consistit, itemq; herniæ quæ hydrocele appellatur, pro glutino existit, prodest & hemicraniae, tubercula quoq; atheromata ac steatomata

to mata Græcis à spicarum, siue ut alij uolunt, pulticulæ, itemq; pinguitudinis in se complexu appellata, curat. Nitri, chalcanti, salis, spumæ nitri, cuiusque quadrantem, cerusæ septuncem, ceræ septuncem, olei lib. i. in estate aut dextantem. Oleum cum cerusa donec non inquinet amplius coquito, ceramq; eis adijcito: qua liquefacta, reliqua in mortario terito, ac ad mellis compagem redigito: eisq; cocta infundito, ac utitor. Est enim experimento cognitum.

Malagmata quæ euacuant humorem: ex libris

Asclepiadæ.

Cap. XXIII

Grani cnidij repurgati drach. x. medullæ colocynthis drach. viii. succi cyclamini sicci drachm. xvi. scamonix, elaterij, piperis albi, myrrhæ, cuiusque drachmas iiii. polypodij drach. viii. absinthij drach. xvi. amurcæ drac. xvi. fellis taurini drach. xvi. sagapeni drach. viii. cerati cyprini quantum his excipiendis satis est. Sufficiunt autem ceræ dextans, olei cyprini uncia xvi. hæc linteolo infarta peccini ac lumbis imposito, ita ut os uentris custodias illasum. Summe prodest, inquit Archigenes, adeo ut quidam hoc solo se hydropicos sanatos confidunt. Aliud, quod largè cit urinam, toti q; affectioni opitulatur.

Radiciis cucumeris syluestris, radicis chamæleonis, aristolochiæ longæ, corticis radicis rubi sicci, singulorum libram unam, æruginis uermiculatæ, recremæ tibi, aluminis scissi, seminis apij, sulphuris, acori, alari, petroselinij, nardi celticæ, cardamomi, singulorū trientem, ceræ libras duas, terebinthinæ liquidæ, picis brutiæ, adipis taurini, cuiusq; libram unam apparato, & imposito ut prædictum est. Aliud. Veratri nigri, nitri, piperis, fellis taurini, singulorū æquale pondus melle cocto excipe, & utere ut dictum est.

Epithemata, quæ post euacuatos humores adhibita

pro glutino sunt.

Cap. XXIII

Mellis libras duas, myrrhæ sextantem, thuris unciam unam. Mel usq; quo uiscosum fiat decoquito: ei q; myrrham ac thus tenuissime trita adijcito, simulq; subigito, & spongiæ nouæ infarta per omnem aluum imposito, colligatoq; cute quodammodo constricta, & tertio die soluito. Aliud. Thuris dra. viii. gummi dra. octo, rosinarini herbæ exiccate drac. decem, mellis libras duas, apparato, ut dictum est: similiterq; utitor post euacuatos humores. Aliud epithema, quod post humorum euacuationem, toti affectioni se opponit. Lapidis alij sextantem, farris mola triti unciam unam, thuris trientem, chamæleæ confusæ & cribratæ drachmas quatuor, adipis suilli ueteris quantum sufficit. Vtere ut dictum est. Emplastrum Magus appellatum: quod quidam etiam Hephæstiadis nomine insigniunt: facit ad sinus, & fistulas conglutinat ac resiccat præter opinionem. Egregium censetur & ad hydropicos & ad herniam hydrocelen appellatam. Spumæ argenti sexuncem, lateris furno assati sesquilibram, scorix argenti, quæ helcysina Græcis appellatur libram unam, olei libras tres, ceræ sesquilibram, succi coriandri sesquiseptarium, alij sextarij dimidium accipiunt. Oleum, spumam argenti, helcysina & laterem tenuissime tritum, itemq; succum, donec amplius non inquinet decoquito, deinde ceram liquefacito, & percolatâ adijcito, ac unitis utitor. Quæ difficulter aliâs sanantur ad cicatricem perducit. Prestat aut arida prius cõtundi, et cū succo in mortario teri, ac deinde decoqui. Quidâ aut pro cera, pentatheton pharmacu coniecerunt, & ad hydropicos usi humorē resiccarunt. Epithematis igitur perseverantius & pròptius utimur, si ablit febris: quod si febres sint coniunctæ, per interualla quædâ affimur. Cæterum ad tumores crurium hydropicorum, panem in ad facere oportet.

Dd 2 tet

ter, terereq̃, ac sale tenuissime trito ammixto, illinire, ac quatuor horis sinere. Quod si aquosus humor defluat, spongia mundare, ac panniculo uestis detritę extergere, oleoq̃ myrteo, aut melino, aut lentiscino inungere.

Aquam ducentia remedia, hydropicis ualde commoda.

Cap. xxv

Smilacis quę iuxta aquas in sepibus reperitur, ac filiquas producit quem admodum hortensis similax, quę lobia appellatur, huius foliorum succum sextarii unius mensura accipe, & ad tertias decoque, indeq̃ cyathum unum bibendum præbe. Aliud. Smilacem accipe & donec flaccescat in aqua decoque, deinde unā cum decocto folia ipsa tere usquequo succus inde exprimatur: et ex eo cyathum quotidie bibendum præbe donec sanetur: in his autem qui perfectę sunt ætatis plus omnino exhibendum est. Aliud, quod aquam ducit.

Seminis cnici drachm. iiii, aloës unciam unam, grani cnidij scrupulos vi, scammonię scrup. tres, cum succo scorpiuri cæruleum colorem habentis catapotia informato, & ex eis his qui iam primum inciderunt inciderunt scrupulos iiii, exhibeto: quibus autem in tumorem malum processit, scrupulos vi, ieiunis.

Quę ad ciendam urinam hydropicis bibuntur.

Cap. xxvi

Porro toto curationis tempore, aliquo istorum potuum utendum erit. Cancrī fluuiialis decorticati interioris exiccati, manibus, ac pedibus, auullis lib. i, asari lib. i. In aqua permisce ex ipso flumine unde cancrī sunt extracti, ac bibendum præbe: aliquando pro asaro, opobalsami par pondus coniicitur.

Aliud, Corallij drachmam unam, aluminis scissi drachmam unam, cum calaminthę succo aut decocto in pastillos digerito, et ex ipsis obolum unum, cum calaminthę decocto bibendum præbeto. Summe (inquit Archigenes) & nephriticis conducit. Laueris item decoctum exhibeto, idemq̃ lauer edendum dato, aut trifolij bitumen olentis drachmam unam, ex uino, aut iunci odorati, aut nardi, aut asari, aut phu, aut mei decoctum, aut corticis radicisari, aut ipsius radicis drachmam unam, ex uino, aut seminis uiticis drachmam unam, ex uino, aut radicis bryonię concisę decoctum, aut anagallidis cęruleę succum per se, aut arnoglossum ab aridorum ciborum comestione quotidie paucum comedendum præbe, ita ut inde reliquo cibo utatur: aut seminis hyperici drachmam unam, ex uino, aut cicerum decoctum, aut scillinū acetum assidue forbeant. Etenim ex eorum numero quę citra grauitatem urinam ciēt, est scilla assata delincta ex melle: aut scillam assatam terito, eiq̃ farinę erui albi par pondus ammisceto, siccato, ac drachm. i. ex uino dato: aut polium, aut samfuchum ex uino decocta bibenda præbe. Egregie etiam commodam myurum herbā perhibent, quę folia alimo similia habet, uerum per terram strata est, ac uelut corymbos in summo oblongos habet: hanc itaq̃ decoctam assidue bibendam præbeto, experimento constat. Aut herinacium terrestrem ex coriato, eiusq̃ carnem in sole exiccato, ac drachmam unam ex uino tritam præbeto. Præter opinionem etiam faciunt uermes terreni cocti triti ex uino potati. Est & compositum pharmacum quod urinam ciēt ipsis conuenientissimum, hocce: Carpobalsami, spicę nardi, cassiæ, cumini, radicis dulcis, hyperici, floris iunci odorati, asari, amomi, dauci, sinyrnij, petroselinij, calami aromatici, piperis, seselis, spondylii, omnium æquale pondus. Conducit etiam unumquodque per se.

Orybasi pharmacum aquam ducens. Salis ammoniaci drachmam unā, mastiches drachmas duas, euphorbij drachmam unam. Hęc pro una uice datur: est autem ex fortissimis remedijs. Potiones aquam ducentes, ex Asclepiade,

piade. *Cæterum per intervalla longiora uti convenit pharmacis aquam ducentibus, nam incommodus est assiduus eorum usus, utpote qui vires ipsas dissolvit. Similiter autem & his quæ urinam cient per modica interstitia utendum est. Ducunt autem aquam, quemadmodum, convenit inter Eran, Dioscoridem, Asclepiadem, & Archigenem hæc. Radicis struthij decoctum, polypodij decoctum, corticem radicis tithymalli characitæ appellati contusum & cribratum scrupulorum quatuor pondere in vino per integram noctem macerato, ac mane vinum ipsum bibendum præbeto: euestigio enim aquam educit. Aliud.*

Radicis cucumeris sylvestris contusæ & cribratæ obolos duos in vino adstringentem per triduum macerato, ac per dies tres ex ordine præbeto, factoque interstitio rursus eodem modo, dato quousque tumor demittatur. Inde enim aquositas leniter secedit: neque stomachum hoc lædit, & vires conservat. Aliud, quod multam aquam per alium ducit. Ex solano hortensi succum exprimito, & quotidie donec perfecte curentur cyathum unum bibendum præbeto. Aliud.

Salis fossilis mellis subacti & assati drachmas duas, piperis longi drachmas II, conterito, & cum succo psisanæ totum præbeto. Hæc enim est perfectum dimensum. Aliud. Radicis umbilici veneris drachmam unam, scillæ repurgatæ drachmam unam, contere, & cum vini mulsi cyathis duobus per horam pro una vice ieiunis bibendum præbe. Aliud. Euphorbij drachmam unam, salis communis drachmas tres, castorij drachmas quatuor, alij drachmam unam habent, contundito & cribrato, dimidiumque ex aqua calida exhibeto. Aliud.

Chamelææ, petroselinæ, piperis, æquales partes omnium contundito, & cochlearium ex aqua calida dato. Eclegma ad hydropicos. Seminis ricini ex herba quæ cici appellatur depurati numero grana triginta quinque, spumæ nitri cochlearia duo, probe contrita melle excipito, atque id totum delingendum præbeto, & aquæ mulsæ calidæ cyathos tres, ab eius sumptione bibendos porrigito. Evacuat adhærentem humorem citra læsionem: & purgat aliquando usque ad dies aliquot. Oportet autem ante eius sumptionem commoda diæta uti.

Aliud inexuperabile. Grani cnidij repurgati drachmas quatuor, lathyridum mundatarum dra. quatuor, euphorbij dra. duas, aloës dra. II, gummi drachmas tres, aqua subigito, & catapotia erui magnitudine formato, ac perfectis ætate septem præbeto, & vini meri immixti cyathos quatuor inde bibendos dato. Reliquis autem iuxta virium tolerantiam exhibendum. Aliud Xystici, siue Spiculatoris, ex cuius solius usu sanabatur. Grani cnidij repurgati drachmas octo, probe conterito, squamæ aris drachmas sex, lapidis magnetis drachmas sex, seminis ricini drachmas quatuor, succi scillæ mundatæ cyathos duos, mellis cyathos duos. Succum & mel usquequo cõgatur cõquito, ac reliquis adfectis catapotia ciceris magnitudine formato, eaque pro viribus exhibeto: ita ut aqua mulsæ ab eorum sumptione bibatur. Pueris autem unicum tantum præbitum sufficit. Aliud. Aeris usti drachmam unam, foliorum rutæ drachmam unam, stercoris columbini drachm. unam, salis communis parum. Hoc totum cum dimidia hemina vini tenuis præbeto. Aliud potabile, lagenium appellatum, commodum his quibus uenter plurimum tumet, & reliquum corpus molle est & laxum.

Radicis bryoniæ repurgatæ drachm. XX, myrrhæ drachmas octo, cumini æthiopici drach. VI, anisi drach. VI, seminis capparis drachmas sex, vini adstringentis sextarios II. passli cretici sextarios IIII. Radicem bryoniæ cum reliquis in mortarium cõijcito, atque citra myrrhæ admixtionem contundito, omniaque in uas vitreum recondita affusis liquoribus macerato, & post

septimum diem percolato, ac myrrhā simul dissoluito: indeq̃ cyathos quatuor ante cibum exhibeto, & rursum interiecta die cyathos quinq̃ prabeto: ac rursum interposita die, cyathos sex offerito, atq̃ deinde rursum carnem ferinam assā tam edendam dato, & uinum austerum meracius in potu. Aliud phar-
macum, quod prospere accommodatur, & aquam multam per sedem educit, opti-
me etiā cit urinam: Grani cnidij depurati drachmas quatuor, radices bryo-
niae drachm. quatuor, scillae crudae mundatae drach. x. cumini aethiopici drach. iiii.
lathyridum drachmas ii. myrrhæ drach. iiii. uini adstringentis sextarios. iiii.
Arida tusa per dies septem macerato, ita ut quotidie bene circumagites: dein-
de percolato, ac dissoluta myrrha, prima die cyathos tres prabeto, secunda du-
os, tertia unum. Facta autem purgatione, uirium refocillatrice diata uitior.

Aliud, urinam ciens, aromaticum, Crunion à torrentis similitudine appella-
tum, quo usus est Eras & Asclepiades. Oportet autē purgatiuo quod ei præ-
scriptum est præpurgare, atque ita ipsum quod urinam ciēt pharmacum exhibe-
re. Purgatiuum autem quod præexhibetur hoc est. Succitithymalli recentis
cyathos ii. aloës drachmas. iiii. Aloëm in succo dissoluito, & in catapotia ma-
gnitudine ciceris redigito, indeq̃ duo, aut pro uiribus dato. Porro ubi probe
purgaris, ipsam urinam ciens pharmacum propinabis, cibo bis aut ter per di-
em exhibito. Cum animaduersione autem utaris, & ubi urinam profluam ui-
deris, ne amplius dederis: quod si non feceris, urinam cohibere nequibis. Com-
positio ipsa hæc est. Seminis apij drach. x. i. myrrhæ drachmas vii. dauci drach.
vii. croci drachmas vii. mei drachmas vii. phu drachmas vii. acori drach. iiii.
floris iunci odorati drach. iiii. seminis fœniculi drach. iiii. aut vi. asari drach. vi.
spicæ nardi, cassiæ, cinamomi, fœlis, fabinæ, singulorum sesquidrachmam. Ex-
cipe uino odorato, & pastillos, quosdam triobolares. quosdam diobolares, alios
etiā unius oboli pondere formato, eosq̃ pro uiribus prabeto. Facit & ad cal-
culo laborantes cum uini diluti cyathis tribus. Aliud, urinam ciens. Semi-
nis fœniculi, cardamomi, radices eryngij, corticis radices capparis, cuiusq̃ drach-
mam unam. stercoris columbini cochlearia duo, contere, & cum aqua catapo-
tia ciceris magnitudine informa, & v. ex eis quotidie præbe. Potus hydro-
pici commodus experimento constans, qui tum per urinas, tum per uentrem
euacuat. Caroi scrupulos uiginti septem, fœniculi uncias tredecim & dimidi-
am, anisi scrupulos xiii. & dimidium, cumini lati scrupulos v. mei sesquicru-
pulum, iridis siliquas tres, mellis sesquilibram, uini libras sex, exhibe mensu-
ram mediocrē ieiunis in infessu solij balnei præcalectam: est & suaue gustui.

Alius potus ciens urinam, ex cuius usu insignem uirum tympanite deten-
tum, seruatum uidimus, etiā si à multis medicis iam esset detritus. Ammo-
niaci thymiamatis sextantem, radices herbæ lonchitidis sextantem, petroselinii
sesquiunciam, calami indici, costi, cinamomi, spicæ nardi, piperis longi, myr-
rhæ stactes singulorum unciam unam, seminis rutæ quadrantem, phu drach-
mas quatuor, styracis drachmas quatuor, phylli quadrantem, mellis despuma-
ti quantum sufficit. Excipe melle, & fabæ ægyptiæ magnitudine præbe, cum
& ad lumborum dolores facit, itemq̃ eos quibus pituita in uniuerso corpore
abundat, ad pleuriticos, peripneumoniacos, quartanarios, articularum mor-
bum, ac tetanicos, quibusdam cum uino, aliquibus cum aceto mulso, alijs uero
cū aqua mulsa. Habet autē hoc modo. Aristolochiæ, myrrhæ, absinthij, abroto-
ni maxime seminis, iridis, canchryos, singulorum drach. iiii. anisi, cedridum,
radicis

radicis panacis, pyretri, ammoniaci thymiamatis, cardamomi, singulorum drach. i. cumini drach. ii. & obolum i. Digerito in pastillos, quorum aliqui tres, aliqui duos, aliqui unum obolum habeant: eosq; pro uiribus exhibeto. Orisibasi, ad hydropicos. Amara ex aceto mulso confectio, paulatim euacuat, nihil ex uiribus subuertens: est aut in stomachicis relata. Aliud urinam ciens, Orisibasi. Aluminis liquidum ad fabae magnitudinem in aqua dissolue, & per linteum excolatum bibendum praebe. Aliud. Opobalsami, spicae nardi, carpobalsami, cassiae, cumini, radice dulcis, hyperici, floris iunci odorati, asari, amomi, dauci, seminis simyrnii, petroselinii, calami aromatici, piperis, seselis, spodiij aut umbilici ueneris, omnium aequale pondus, praebe cochlearium cum uino mulso. Conducit etiam unumquodq; per se. Pessus siue talus ad hydropicas mulieres. Anisi, cumini, cardamomi, nitri, aristolochiae, pulegij, foeni graeci, medullae ficus, omnium aequales partes cum uino subige ac utere.

Cura post euacuationes.

Cap. xxvii

Post auxilia quae humores euacuant, ligamentis aegrum mplecti & constringere oportet, ab extremis autem partibus incipiamus, ac ligamentorum distributionem ad supernas partes faciamus: ita ut sepe super ipsa ligamenta spongiae posca imbutas imponamus iuxta tumefactas maxime partes. Ventri uero uniuerso quaedam ex praescriptis epithematis imponantur, quae post euacuationem humorem adhibentur. Reliquum diatae concedendum: quae sane in moderatis deambulationibus sita est, exercitationibusq; ac frictionibus. Adhibeantur aut & inunctiones & exercitamenta: si sol adsit, in sole, capite tamen uelato: si frigus sit, in domibus per subiectum ignem concalescentis, aut iuxta ignem: obvoluendi etiam aegri in pellibus sole ustis, aut in arenam defodiendi. Post exercitia extergantur, aliquando etiam lauentur propter fatigationem: in balneo aut siue inperione, siue confricatione huiusmodi utantur, Samiuci, nitri, cumini, melanthij, seminis rutae syluestris, singulorum unciam i., foliorum rhododaphnes siccorum, sextantem. Utendum quoq; in sole luti oblitione, quemadmodum praedictum est in secundo De terrarum differentiis Sermonem. Porro quum res feliciter processerit, & tumor fuerit imminutus, & uires aliquantulum in integrum restituae, praeter omnibus ex frigida lauatio fiat. Neq; uero balnea sponte naturae calidae inepte hoc tempore ipsis exhibentur: ab extersione autem cibi offerendi: qui sane communes sint cum his qui post hydropis super cutem curam describentur.

Cura hydropis qui proprie subtercus appellatur.

Cap. xxviii

Hydrops subtercus, qui aliquibus etiam leucophlegmatias appellatur, maximam curandi rationem in insolationibus habet: itaq; tumefactae partes ad solem exponantur, capite saltē uelato, cauendo etiam ne tumor uehementius supercalescat. Si enim corpus supercalescat, febres accedunt, unaq; cum ipsarum febrium generatione tumores duplicantur, atq; id multo magis quam febres remittant, ac tu mor refrigerationem capiat. Utendum igitur frictione prima quidem die per modicum oleum moderate ac molliter facta: in progressu aut & sicca & multa & cum intensione magis appressa: deinde etiam per lintea asperiora. Oleum autem quod ad inunctionem apparatus, scillam mediocri magnitudine ad tres olei sextarios habeat incoctam, aut canchryos uncia una ad heminam olei addatur, et facta percolatione utitor. Ab inunctione aut exercitijs utantur ac pro uiribus currant: indeq; sudorem per lintea asperiora extergant, & post hoc oleo dulci ungantur. Caeterum post dies aliquot nitro tenuissime trito per uniuersum corpus

Dd 4

corpus large conspergantur, sustineantq; ex eius morfu exudationem, deinde
 rursum sudorem extergant ac oleo dulci ungantur. Optime autem facit & fri-
 catio ex sale in aqua aut oleo trito donec viscosum reddatur, si cū eo in sole aut
 iuxta ignem fricentur. Valde enim celeriter & sudores elicit plurimos, & car-
 nem cogit, siue in sole, siue iuxta ignem defricentur, modo caput habeant pro-
 be contextum, Utendum & in puluere uolutionibus, si aut cū molia tenuissi-
 me trita substernatur, aut super asium lapidē deuoluatur. Aliquando autē & are-
 na probe à sole ignita, aut pellibus similiter à sole seruescētis agrū oculere o-
 portet, capite tantū uelato, & facie cum spongia assidue extersa. Post hæc autē
 aqua marina, aut etiā aluminosa aut sulphur uolenta lauetur. Aliquibus enim qui
 ad huiusmodi lauacra adfuerunt, ea ipsa tum ad deterendū morbum, tum ad
 habitū ualentiorē reddendum fuffecerunt. Adhibenda etiā his obliuio ex-
 luto, ueluti prædictū est in secundo De terrarum differentijs Sermonē.

Cataplasmata ex libris Asclepiadae.

Cap. XXXIX

Optime conuenit & his cataplasmatum admolitio, eorum præsertim quæ
 resiccare simul & uisceribus firmitatem addere possunt, pueris maxime ac alijs
 qui mollem carnem habent: qualia sunt ex malis cotoneis, myrti bacis, pampi-
 nis uitis, malicorio, ac lenticula decocta, aliquando quidem per se, aliquando in
 uicem permixtis. Efficacissima sunt etiā corna ex acinata tenuiter trita: item
 rhus culinarijs cum polentæ flore, & quæ eis similia existunt, & alumen sanè
 cum duabus adipis caprini partibus subactū. Neq; uero in cōueniens ruta ipsa
 censetur si per interualla adhibeatur, neq; bulbi cū melle triti. Plurimū etiā co-
 hibent ac adstringunt tumore origānus, aut thyma, aut absinthiū, aut hyslopū,
 aut nitrū cum caricis diligenter trita: aliquando hæc ipsa lolia cææ farinae in po-
 sca decoctæ permixta adhibentur. Stercus item bubulū conuenienter resicca-
 tum, non inepte cum posca aut aceto mulso imponitur infarcta sulphuris quar-
 ta parte. Caseus quoq; recens multum coaguli habens, optime ad omnes tumē-
 tes partes impositus facit. Similiter & cochleæ crudæ tritæ & impositæ: adglu-
 tinantur enim neq; discedūt priusquam uniuersus humor resiccet: fermentū
 etiā sale multo permixtū cōmode locis adhibetur, aut panis cum puluere hys-
 sopi: aut fabacea farina aqua marina & melle cocta, parī absinthij modo adie-
 cto: aut farinam halicæ fermentato, & cum raphani emollito cortice imponi-
 to: aut lentem palustrem in figulino uase siccato, ac terito, & cum prædictis ca-
 taplasmatīs uice imposito. Porro ex eorum quæ tumores cohibent numero,
 est & id quod byne appellatur: est autem ordeum madefactum, quod germen
 ponatur. In principio igitur adstringentibus cataplasmatīs utendum est, dein-
 de paulatim ad resiccantia transeundum, postremum etiā ea quæ firmitatem
 addunt adiicienda. Cæterum omnia impinguantia & resinosa cerata ac ma-
 ligmata similiaque uitanda sunt, ueluti quæ inflent & tumores distendant.
 Assidue autem & crura, & manus, aliæque tumefactæ partes in sole aut iuxta
 ignem, ex his inungantur. Sulphuris uiui, thuris, aluminis scissi, æquales
 singulorum partes aceto contere, ac utere. Experiri etiā Herodoti reme-
 diū conuenit, neque enim minus quā ipsa fricatio auxiliari potest: uescis
 itaque bubulis aut etiā alijs magnis omnino, ac probe inflatis, & uacuis, tu-
 mentes locos pulsato, atque id auctoritate tum Archigenis, tum Herodoti faci-
 to: inde enim citra molestiam caro condensatur, neque dolore, neque reperi-
 sione duriore resultante.

Chirurg.

Chirurgia hydropis subter cutem.

Cap. xxx

Omnibus prædictis efficacius auxilium in hac hydropis specie chirurgia præstat, Aſclepiade autore. Fiſſuras aut circa internū talū inſligere oportet in loco quatuor digitorū ſpatio ſupra talū eminēte, ea profunditate, qua quis in uenæ ſectiōe utatur, Pauco enim ſanguine in principio euacuato, per reliquum tēpus indefinenter aquoſitatis excretio procedit, citra omnem inſlāmationem, ut neq; claudi fiſſura poſſit, niſi humore omni ante expenſo, & homine gracili reſiſto, atq; id cito cōtingit, nulla inſlāmatione ſciſſurā occupāte, ſed ipſa in qua dam cōgruenti temperie permanēte, quo omne aliēnū per ipſam excoletur, et ut nullo opus ſit extrinſeco pharmaco. Præterea periculū hic nullum uerendū eſt, uelut in hydropis aſcitæ pertuſione; non enī m coaceruatim quemadmodū illi euacuantur, at uero ſi quis uelit, excretionē plurima facta, eam cohibere, niſi uetuerit ipſas in talis fiſſuras linamentis obturare, ligamentisq; cōſtringere, atq; ubi rursus prodire quid uelimus, laxatis ligamētis, & ablatis linamentis, geſtatoq; ac moto agro, excretionē irritare. Leonides aut inquit, Quod ſi excretio fiſſuræ ſupra talos tardius prodeat, neceſſe eſt etiam alias corporis partes ſindendo diducere; ueluti ſcrotum tumefactum, ſcēmora, pudenda, locus ſupra manūū iuncturas. Quidā enim uulnuſculis pluribus ac altioribus incuſſis, plurimam aquoſam ſubſtantiā exhauſerunt. Et Hipocrates ſanē non ſupra talos adhibet chirurgiā, ſed iuxta ſcrotum & ſcēmora uulnuſcula inſligere iubet, atq; ſale maxime conſtricare: hic enim modus paulatim & inceſſanter humorē educit, & ualde celerē compreſſionem tumores ipſos recipere, ipſe tradit. Porro ſi aliquibus excretionē ampliū mouere uelimus, poſt impaſta uulnuſcula, & talorū lancinationes, eos ipſos pro deambulatione, ſerculo geſtamus aut leſtica ſublimēs circumuectamus. Cæterum Archigenes ita prodiit, Non ſunt audiendi, inquit, qui per huiuſmodi lancinationes nihil excerni dicunt, quin potius cum fiducia hæ ipſæ incutiendæ; nam et nos, inquit, his cutis fiſſuris ſumus uſi, & per ipſas quā plurimum excluſimus humorem, ut & ſcēmora, & ſuræ, & ſuperior uenter euidenter ſint demiſſa ac compreſſa.

Reliqua prædictorum cura.

Cap. xxxi

Maximum hydropis ſubter cutem auxilium uomitus præſtant, quod ipſum difficile eſt inſtate puerili adhibere, propterea quod non facile ut id admittant perſuaderi poſſunt: quare varias excogitabimus artes, quibus uomitū concitemus: tonſillas uidelicet pinnulis aut digitis oleo illitis irritādo: aut ficus aſſata oleo imbuta & piperis puluere cōſperſa, poſt deambulationes à ſomno exhibeatur. Butyrū etiam cum melle guſtandū præbeatur: aut raphanus coctus adipoſe cōditus detur, aut ſaſſamentū pingue cum oleo multo offeratur, aliquādo etiā aceto ammixto. Sunt et alia plurima quæ uomitū mouent, relata in tertio Sermone. Amplius autem tum uentrem, tum inteſtina ligamentis adſtringant, itidemq; omnem cutis coërceant tumorem. Fiant autem ligationes ab extremitatibus incipiendo, & ad ſupernas procedendo. Vinciendæ etiam partes, manus uidelicet & pedes, oleo cyprino prius illinantur: ſpongiæ item imponantur latæ ab acida muria optime expreſſæ: poteſt & iuncus odoratus, aut roſmarinus, aut pulegium, aut calaminthe, & maxime omnium abſinthium in ipſo aceto decoqui. Poſt uero ligamenta ipſis ſpongijs circumdantur. A uomitu proſpiciendum ut inferior aluus inclinationem ad uomendum permouet: ueteri ſaſſamēto crudo ante cibū reliquū accepto. Mercurialis item cocta ſaleq; ac oleo codita in uino tincta ſumatur: aut decocti ipſius ſeſquicyathū cum ſale

sale dato: quædam etiã in ascite dicta his exhibeto. Præbenda et quæ urinã cient, uelut est daucus, seseli, cardamomum, radicem asparagi decoctum, trixaginis, radicis trifolij decoctum, aut ipsius radicis drach. i. ex uini cyathi iiii. radix eryngij sicca cum uino, item decoctum eius in potu acceptum, seminis uitis drachma una. Commode etiam seminis hyacinthi bulbi drachma una cum uini cyathis tribus potatur: urinam enim ducit. Quidam aut hyacinthi flore coriã tingunt. Inter omnia autem pharmaca quæ omnibus hydropicis, maxime tamen eis qui subtercutaneo dicto laborant, exhibentur: præstantissimi sales theriaci censentur tumi cibis ammixti, tum in liquamenta additi eorum qui ad perfectã ætatem perueniunt. Eorum autem apparatus in xiii. reperies Sermone.

Communis diætã omnium hydropicorum: Archigenis.

Cap. xxxii

Post quotidiana exercitia communis omnibus hydropicis diætã hæc sit. Ab aridarum rerum comestione initium faciemus: quod si tamen intensa sitis insit, parum quid delibandum dabimus solati tantum gratia, & leniendæ sitis. Sit autem uniuersus cibus facilis concoctus & sufficienter coactus: exolutus enim aptus est ut in aquositate commutetur: sit itaq; panis optimus cibantes, qui salem, ammiũ, & fœniculum habeat admixtum, conueniunt etiam cochleæ assatæ, oua assata, & auiculæ sicciore, uelut perdices, coturnices, turres. Ex terrestribus, lepus, capra syluestris, dorcades. Ex mansuetis, extreme sunt partes: ex aquatilibus, cancri, locustæ, herinacei recentes, squillæ: Olerum rus sit usus: quæ uero ex eis exhibentur acriora sint, & magis syluestria, uelut est coronopus, eryngiũ, pastinaca, porri capitati, allia cocta. A leguminibus uero abstineant in totum. Pro liquamine utantur aceto cum pipere & lasere, aut quibusdam ex oxyporis cito penetrantibus ad colicos descriptis. Sales sint ex rosmarino, fœniculo, hyssopo, sulphio, ligustico, & apij semine compositi. In potu tantum præbendum quantũ ad infringendam aliquo modo sitim sufficit: in comodus est enim eis plurimus potus. Porro maximam ciborum partem in cœna accipiant: omnes autem placentas ex similagine & passo apparatus uident, plurimos itidem fructus & secundas mensas. Concedendæ tamen palmulæ, nuces, amygdalæ, uua pensilis, mala punica, pira cocta, ac carica, oĩa uero rate, neq; omnia quotidie. Vinum aut sit tenue, et quod ciet urinã. Dulcia uero uina & uinum mulsum uitanda. Lectus non ualde mollis sit, præsertim his qui hydropes subter cutem laborant: substernantur autem arundinum folia, & herbæ resiccantes, uelut est uitex, pulegiũ, calaminthe, & similia. Mirum est enim quantum huiusmodi per somnum resiccent, ut constet iam quosdã frumeti aceruis obuolutos et absconditos à somno surrexisse firmos ac resiccatos. O percula etiam ipsa quibus teguntur, apparentur duriora. Moderata autem sit & probe temperata ipsa domus secundum anni tempus.

DECIMI SERMONIS FINIS.

INDEX CAPITVM VNDECIMI AETII SERMONIS.

| | | | |
|---|---------|------------------------------------|----------|
| D E diabete hoc est profluuiũ urinæ. | Cap. i | De calculosis renibus. | Cap. iij |
| De renum cruentam urinam excernentium debilitate. | Cap. ij | Cura renum calculosorum. | Cap. v |
| De his qui per circuitum quendam sanguinem mingunt. | | Diætã p̄seruã nelapides renascant. | Cap. vi |
| | | Vnguentũ renale: Oribasij. | Cap. vii |
| | | | Diætã |

- Dieta eorum quibus renes è lapide laborant, reliqui uero totius corporis habitus gracilis est. Cap. viij
De calculosa uesica. Cap. ix
Pharmaca lapides uesicę atterentia et urinam ducentia. Cap. x
Communia remedia uesicę & renũ calculosorum. Cap. xi
De hircino sanguine. Cap. xij
Antidoti uarię ad calculosos. C. xij
Cura eorum in quibus lapis atteri nõ potest, neq; item per lotium excerni. Cap. xiiij
Dieta post exactos lapides, adseruãne ali; renascantur; & de affligẽtis humoris cognitione ex lapidis colore. Cap. xv
De renum inflammatione. Ca. xvi
De duritie renum. Cap. xvij
De suppuratis renibus. Cap. xvij
De disuria, id est, emittendi urinã difficultate: et stranguria, id est, stillicidio urinę. Cap. xix
De difficultate emittendi urinam in febribus. Cap. xx
De ischuria, id est, urinę suppressione. Cap. xxi
De scabiosa uesica. Cap. xxij
Simplicia remedia ad suppressam acẽgre prodeuntem urinam, si aut eius multitudo, aut crassities in causa sit. Caput xxij
De resoluta per paralysem uesica. Caput xxiiij
Ad eos qui se in somno permungunt. Cap. xxv
De inflammatione uesicę. Cap. xxvi
De sanguinis ex uesica eruptione, & de grumis eiusdem. Cap. xxvij
Quę tubercula in uesica concoctione indigent. Cap. xxviij
De uesicę ulceribus. Cap. xxix
Dieta ex libris Archigenis. Cap. xxx
De uesicę fluxione, & his quę capillorum forma exeunt cum urinã. Caput xxxi
De priapismo & satyriasi: Galeni. Caput xxxij
De seminis profluuiõ: Galeni. Caput xxxiij
De seminis in soninis profluuiõ. Caput xxxiiij
De his qui reuenera uti non possunt. Caput xxxv.

AETII MEDICI GRAECI CONTRA

CTAE EX VETERIBVS MEDICINAE, TETRABIBLI,
siue Quaternionis Tertij sermo tertius, & ex ordine Vndecimus.

De Renum & uesicę affectionibus: Et de priapismo,
ac seminis profluuiõ, rebusq; ueneris.

DE DIABETE, HOC EST PROFLVUIO VRINAE. CAP. I



DIABETES diuturna est affectio circa renes cõsistens, multũ potum inducens unã cum hoc quod quicquid bibitur, simul ut acceptum est per urinam reijcitur. Quidã autem affectionem hanc hydropem, siue hyderum, & siphonem à fusorij instrumẽti similitudine appellant, ali; urinę leuitatem uocant, ali; dipsacon ab inexplibili siti appellauere. Cõcomitatur ægros pertinax sitis, neq; ulla satietas ex alicuius liquoris exhibitione contingit. Aliquando & sitis supra sitim inexplibiliter ægros urget, hoc est, ut assidue potum assumere cogantur, neq; tamen satiantur, propterea quod citissime per lotium expellitur potatum. Caterum proprius renum affectus diabetes existit, qui uide-
delicet

delicet immoderate humorem appetunt, ipsumque propter debilitatem retentivæ in eis facultatis continere non possunt. Quæadmodum enim in appetitionibus caninis, & in quibusdam lienterijs uehementissime quidem appetentiæ oboriuntur, quæ multos cibos, eosque assatim accipere cogunt: uerum nihil fere ex acceptis retinetur: sed in caninis quidem appetitionibus ob grauitatem reuomatutur: in lienterijs uero tum ob grauitatem, tum ob præsentem retentiæ facultatis infirmitatem, inferne cruda excernuntur: Eodem modo etiam in renibus uehementissima serosi humoris appetentiæ contingit, propter debilitatem autem retentiæ in eis potentiæ, eum ipsum humorem acruatum in uesicam excernunt. Aretæus etiam hæc addit, Viscera ipsis uri uidentur, anxij sunt ac animo dubij, & non longe post moriuntur: igne amplius ardere se putant, acceditque sitis & mictio festina: sed quamuis aliquando parumper urinam retineant, intumescent lumbi, testes, & coxæ: quod si adhuc amplius mordens caliditas in uisceribus augeatur, superior uenter corrugatur, & uenæ in ipso eleuantur, uniuersum habitum gracilem habet, & tabes totius corporis grauis accedit. Porro alij sunt qui non mingant, neque ex eis aliàs potatum transpirat. Quare ob potus insatietatem, & humoris inundationem, & uesicæ circumsensionem, acruatum uentre rumpuntur. Cæterum humores uitiosi in ipso renum corpore imbibiti, affectionem ipsam inducunt. Scopus igitur in curationibus nobis sit, ut humorum acredinem deleamus, sanguinemque ac cum eo permixtum serosum humorem ad motum tardiores reddamus, & renum intemperiem reuocemus. Archigenis. Itaque mox ubi occeperit malum, nondum ad perfectionem progressum, optimum est cubiti secare uenam, & moderate sanguinem auferre. Utendum etiam mediocriter urinam cientibus, quæ uitiatum in renes imbibitum humorem re purgare possunt. Quod si uero inueteratum sit malum, neque uenæ sectio assumatur, neque quicquid quod urinam cit exhibeatur. Cōcidunt enim in inueteratis uires, & ex uenæ incisione totum corpus acrius redditur, & urinam cientia in ipsis multiplicat malum. Maximum autem remedium huic affectioni, ut statim potatum reuomatutur. Sit autem perquam frigidus ipse potus, reliqua item diæta cōuenit uti frigidior: quare olera refrigerantia minimeque urinam cientia in cibis profunt, pro sorbitione autem ptisanæ succus frigidus probatur. Materia etiam ipsa ad exudationem diuertenda. Optima uero, inquit Aretæus, est in dolio facta euaporatio, ad exudandum, eo modo ut caput extra dolium promineat: frigidumque aerem at trahat, reliquum uero corpus omne calefiat. De cætero uelut æstuantem febrem, causam Græci appellant, curare oportet, quo celerrime sitis extinguatur. polentæ itaque florem aceto & rosaceo subactum cataplasmatibus modo præcordijs imponito, uitæ item folia tenera trita, aut umbilici ueneris, aut portulacæ, aut serpidis, & quæcunque alia cōsimilia: præbibendum etiam sanguinariæ succum ex uino nigro assidue præbeto. Symphytum item & palmarum cremorem, baccorumque citi & pirorum. Vermes quoque terrenos coctos ex aliquo prædictorum succorum. Cibi exhibeantur boni succi, mordacitate carentes, & qui acredinem obrundere possunt, uelut sunt oua sorbilia, & similago, & halica ad sorbitionis formam apparatus, carnes porcinæ macræ probe coctæ. Vinum sit rufum, crassius, frigida amplius dilutum, ad sanguinosorum humorum prolutionem, qui sitim inducunt. Vinum enim corporis miscellam ad dulcorem permutat: neque uero incommode exhibetur eis caseus recens compactus citra saltem, & lac per silices aut ferrum ignitum scissum, seroso humore adempto. Porro si prædicta auxilia frustra adhibeantur, affectioque ipsa augeat: non absurdum fuerit etiam stuporem inducentibus uti, ita ut soporiferum

ferum antidotum ex papauerum capitibus apparatam exhibeamus, aut alium quem ex doloribus leuantibus pastillis, infuso etiam soporifero utendum, uelut est opium erui magnitudine cum pari modo castorij, aut etiam maiore: hæc in passo cretico dissoluantur: non ut in colicis fieri solet, cum oleo rutaceo: refrigerare enim in his præsumimus. Infunditur etiam utiliter oleum in quo uermes terreni sunt decocti. Forinsecus autem retro ad lumbos & ad pectinem illitiones & cataplasmata refrigerantia adhibenda, qualia sunt quæ ex lactuca, umbilico ueneris, lenticula palustri, perdicio, & similibus apparantur. Cerata etiam his locis ex rosaceo adornata imponenda, aut ex chamamelino quibusdam ex prædictis succis ammixtis. In quibus autem uehementer stupefacere sensum intendimus, etiam mandragoræ succum in cerata ammiscemus, foliorum item papaueris succum, & similia. Per interualla autem quædam, etiam antidoti ad lethalia uenena destinata exhibeantur, & maxime theriace ex uiperis constans Andromachi inuento, recens apparata, & ea quæ Eisdæ inscribitur.

De renum cruentam urinam excernentium debilitate: ex libris Rufi.

Cap. II

Renū porro & alia affectio est, in qua tenuis sanguinis serū mingitur, quod ipsum itidem propter renum debilitatem contingit, quemadmodum in hepate fieri solere diximus, atque propter amplitudinem osculorum ex uena caua urinam ad renes excolantium. Quum enim ampliores meatus sint, quiddam etiam ex sanguine uenæ laxatum emittit, aliaque itidem crassa: adeo ut postquam ea quæ mixta sunt constiterint, subsidentia quædam in uase reperiantur, & superne quedam concreta, marinum maxime pulmonem similitudine referentia. Concocto igitur cibo & in uenas distributo, qualia dicta sunt minguntur: recens autem ingesto & crudo adhuc cibo, pura & aquosa, quæ nihil subsidens habent, per lotium eijciuntur. Nihil uero dolitant, aut omnino parum, & eiectione lotio leuati melius habent. Extenuantur autem & emaciantur temporis progressu omnes, & magis adhuc hi qui plus sanguinis mictu excernunt. A principio itaque conueniunt quies, & cibi adstringentes, & uinum nigrum in potu. Ab his quæ urinam ciant, & a coitu omnino abstinendum. In potu autem hæmoptoica pharmaca exhibenda, maxime uero sanguinarie succus, & radices symphyti decoctum, & tragacanthus in uino nigro macerata. Sistit uero sanguinis ex renibus eruptiones stratiotæ aquis innatantis succus potatus, & radices magnæ crocodilia dis iuxta aquas nascentis, quam Syri orophen appellant, decoctum, pægoniæ siue glycyldes grana fulua xii. ex uino. Cornu ceruini uisti drachma una, uinum, folia salicis trita cum uino, lysimachij succus, lapidis hæmatitæ drachma una, ramentorum loti arboris cremor, radices spinæ albæ decoctum, & similia, quæ in sermone de hæmoptoicis sunt prædicta: Forinsecus autem renibus & lumbis imponuntur ea quæ ad muliebrem fluxum describentur epithemata, item ea quæ ad sanguinis per sputum reiectiones sunt descripta: & quæcunque una cum eo quod adstringunt & resiccant, etiam robur addere possunt: qualia sunt rubi folia, & glandes, & myrti ac quercus folia, itemque myrti bacca, malicorium & balauista, & perdici folia, & similia palmis passis excepta, & imposita. Post hæc habitus cibarius, lacte ac auicularum carnibus, suillis etiam ac macris reficiendus est, quo uniuersum corpus ad pristinas vires reducatur, & renes corroborati proprium obeant munus. Est autem proprium renum munus, serosum humorem a sanguine secernere & excolare.

Ec De his

De his qui per circuitum quendam sanguinem mingunt:

Archigenis.

Cap. III

Quidam per circuitus quosdam sanguinem e renibus excernunt, simili modo ut ex hemorrhoidibus in sede fieri consuevit: & in principio quidem propterea quod citra ullum aliquem dolorem excernitur, nihil in totum mali formidant egri: ubi uero diuturnior fuerit affectio, & aliquando cohibeatur quod pro more excerni consuevit, gravitatem inducit, aliorumque pessimorum morborum causa exiit, sanguine nimirum ad alias particulas dilabente, articulares enim affectiones in aliquibus ex cohibitione accidunt, aut uertigines, aut deliria ex atra bile, & insaniam, aut oculorum caecitates, qualia etiam mala hemorrhoidibus cohibitis contingunt: ut plurimum uero in malum habitum corporis et hydropem delabendi aptitudo inde oboritur. Manifestum autem fit sanguinem e renibus excerni, quod ipsi aegri excreti sanguinis transitum iuxta renum locum saepe sensu percipiunt, & maxime quum urinae ammixtus sanguis reperitur. Contingit affectio haec magis in aetate uigoris, praesertim iuuenibus qui licetius rebus ueneris utuntur. Quidam autem sanguinem ex renibus excernunt, propter uenae rupturam in renibus factam. Quemadmodum contingit his qui graue onus leuarunt, aut ualde saltarunt, aut ex alto ceciderunt, aut aliud quippiam tale uiolentum pertulerunt. Aliquando autem & ob acres exsiccantissimas defluentes humores erosio uenarum contingit. Conandum igitur statim in principio ut sanguinis impetus cohibeatur praesertim in his qui eum secundum circuitum excernunt. Si enim ab exercitatione, ut dictum est, excretio contingit non tuto cohibetur: itaque uenae sectio in cubito commoda fuerit his qui per circuitum sanguinem excernunt, paulo ante circuitum adhibita, eis uero quibus ob ruptam uenam promanat, statim in principio. Ceterum sanguinis detractionem parti melius erit, ut paulatim eius reuulsio ac diuersio fiat. Loca autem circa renes spongijs posca imbutis cooperiantur, aut lanis succidis cum rosaceo & aceto. Post haec & emplastra imponenda cruentis uulneribus glutinandis apta. Commode etiam cucurbita adhibetur, praesertim si suspicio sit inflammationem adesse in his, qui ob uenae rupturam sanguinem mingunt. Conueniunt item potiones hemoptoicis apte. Porro ubi sanguinis excretio cessauerit, diata utendum est unde non multus sanguis gignatur, maxime in his qui per circuitum excreuerunt, & supernae corporis partes assidue exercenda. In his uero qui ob uenam ruptam sanguinem mingunt, si exulceratio in locis relinquatur, ipsam post sanguinis suppressionem, curabimus per ea quae in loco de exulceratione dicuntur. Emplastrum renale. Ceræ sesquialteram, croci staterem unum, uitellorum ouorum numero duo, palmarum numero decem, aceti & rosacei quantum satis est.

De calculosis renibus: Archigenis & Philagrii.

Cap. IIII

Renum calculis homines prouectae aetatis magis quam pueri apprehenduntur: quemadmodum uesicae calculis pueri frequentius quam aetate prouecti. Causae autem generationis horum calculorum assidue existunt cruditates, unde materiae incoctae ac crudae multitudo congregatur, & ardor circa renes & uentricam exoritur, qui humores ad assans eos cogit, & in lapidem indurat, admodum toforum qui in aquis reperiuntur, quae in areis praesertim balnearum uasis coquuntur. Consistunt autem lapides in renibus iuxta uentriculos ipsorum aut parui, aut maiores: & aliquando quidem pauciores, aliquando autem plures: & magnitudine, & forma, & colore, & asperitate, & multitudine inter se differunt.

se differentes: nigri enim & subalbidi & pallidi reperiuntur. Ex eorum numero rotundi & leues facile excernuntur, non item qui alia quacunque forma præditi sunt, maxime tamen oblongi & asperi difficulter excernuntur. Accedit agris loci dolor, tumore nusquam foris apparente, nisi inflammatio per lapillos producat: spina egre flecti potest, & totum corpus ad motum pigrum est: crura torpent, & maxime crus reni affecto propinquum. Urinae circa obturationis principium paucae, aquosae minguntur: postea uero perfecta earum superfluo contingit, aliusque nihil excernit, uerum promptitudines multas ad egerendum facit. Excernitur autem aliquando sanguis propter uiolentiam calculorum, praesertim asperiorum. Caterum ubi lapis ex renibus fuerit emotus, & ad uesicam delatus, urinae multae prodeunt arenosam subsidentiam habentes, & alius similiter large egerit. Sensum autem ager percipit, ueluti calculo à renibus ad uesicam transeunte.

Cura renum calculosorum.

Cap. v

Quum lapis in renibus fuerit obturatus, & uehementissimos intulerit dolores, sanguinis etiam multitudo periculum minantis materias ad tensionem affectam partem aduocat, ob acutos uidelicet dolores. Vena igitur cubiti propinqua manus in corpore ex repletionem affecto secanda est: uerum multo minus euacuandum est quam ipsa repletionis copia ex postulat: neque enim futurum speramus ut omnino cito ex renibus excidat lapis, praesertim si magnus existat: quare seruare oportet sanguinem in eam quae cum tempore futura est in corpore expensam. Itaque qui sanguinis multitudinem congregarunt, eis uenae sectio commoda existit: qui uero uitioso humore abundant, eis purgatio apta est, quae abundanti humori conueniens erit, neque omittenda haec est, nisi aliud quidpiam id fieri prohibeat. Post sanguinem euacuatum aut expurgatum humorem, communis ad omnes calculosos curatio quam infra subieciimus adhibenda. Doloribus igitur repente aut paulatim irruentibus, & per arenularum cum urinis excretionem auctis: deindeque aquosis urinis excretis, & praedictis signis consequentibus egri aluo per clysterem infundere oportet fursurum decoctum caricarumque ac foeni graeci & aristolochiae: & siquidem decenter euacuentur, sinere: si uero non, etiam bis aut tertium infundere, atque id maxime si uenae sectae aut purgationis auxilium sit relictum. Caterum ubi sufficienter excreuerit uenter, quaedam infundere oportet, quae corpusculorum circum lapidem sitorum inflammationes lenire & laxare possunt: id ipsum uero oleum anethinum facere poterit, adipe gallinaceo recenti in eo eliquato, & maxime anserino, & phasiani, aut etiam butyro: quae si non adsint, etiam foenum graecum & althaeae radicem oleo decocta infundemus. Inseffiones item in balneis assumenda, ex decocto foeni graeci, althaeae, anethi, artemisiae, caricarum, & oleo. Maxime uero assumenda sunt inseffiones in balneis & post hoc statim agri in solium tepidius demittendi, atque id assidue facere non ab re est. Fomenta quoque locis admota commodant ex fursuribus, praesertim in praedictis decoctionibus incoctis. Post fomenta conueniunt cataplasmata ex farina tritici, cum semine lini & foeni graeci, melleque & oleo anethino aut gleucino, ita ut in decoquendo etiam althaeae radicem contusam & cribratam cataplasmati inferciamus: in fine autem cocturae terebinthina quoque iniiciatur. Optimum etiam cataplasma fit ex lupinorum farina in passo cocta, peucedani radice quam tenuissime trita, & chamamelo in puluerem redacto ad farinam lupinorum amixtis. Bonum est & panem passo decoctum circa lumbos & uentrem imponere.

Ec 2 nere,

nere, neque tamen absurdum foret eadem cataplasinata uesicæ ac peccini adhibere. Oportet autem coaceruatim alia super alia cataplasinata adferre, priusquam primum frigescat: aut si id non libeat, calefactorio alio extrâ contegere ne refrigerentur: id quod commodè fieri potest per faccellos, aut alia uaporatoria cataplasmati imposita. Multis enim ad lapidis per urinam eiectionem hæc sola suffecerunt: uerum tu etiam ea quæ urinam cient præbibenda dato. Vrinam autem multam ducit, mei athamantici, phu pontici, acori, graminis & nardi decoctum, calami aromatici, ammi, dauci, oreoselini, hyperici, rosmarini, asari, radicis asphodeli, radicis bryoniæ decoctum, coccus item tinctorius. Ex his singula eisq; similia tum per se, tum inuicem permixta data, urinam manifeste mouent. Crassa autem lotia ducit, radicis cardui decoctum, radicis rubiæ farina potata, radicis capparis cortex, & similia. Exuscitat autem facultates ad ecretionem irritando, allium, chamædaphnæ, asparagi uitis albæ, asparagus, tertium scillæ decoctum, primo ac secundo diffusio. Deducunt autem ad renes ea quæ calculos confringunt, peucedani radix, bryoniæ, apium, radiculum, uiti cis semen, oxymyrsmes radix, radicis lauri cortex, paliuri semen, tribuli decoctum, sarx iphagi, betonicæ, radicis graminis, damasonij radicis, cicris iulculum, radix cyperii, lithospermon, recolithon à liquefaciendo lapidem dictum, lappæ quæ philanthropos & xanthium dicitur semen quod in spinosis pilulis reperitur, & lithospermo assimilatur: asparagi palustris radices, uirum combustum tritum, altheæ semen & radix, rumicis domestici radix, pruni arboris gumi, ex spongijs marinis lapilli, uermes terreni cocti: horum singula partim decocta, partim tenuissime trita, præbeto bibenda. Sunt & composita plurima lapidem frangentia, ex quorum numero utiliora in cura calculosæ uesicæ subiungam. Porro ea quæ urinam cient ac lapidem frangunt, tunc exhibere conuenit quum uehementes dolores remittunt. Transmoto enim lapide & ex sede agitato dolores quiescunt. Quod si obfirmati sint lapides, plurimus potus uitandus, itemq; ea quæ urinam ducunt, fomentis autem & cataplasmatibus ac infusibus membra relaxanda, & uenter per infusa ac infusus euacuandus, ne ureteres meatus urinam ex renibus ad uesicam transmittentes comprimantur. Post hæc autem doloribus aliquantulum lenitis, etiam cucurbitæ utiliter ipsis adhibentur & præsertim pressius affixæ, inflammatione uidelicet id non impediens. Adeo enim coaceruatim transmouent sæpe cucurbitæ ipsos lapides, ut repente dolores supprimant, lapide nimirum in uesicæ amplitudinem transuoluto: quapropter in principio superne à rene cucurbitæ sunt affigendæ & ad inguina adtrahendæ oblique secundum meatuum qui ureteres appellatur situm. Cæterum si calidius sit ægri corpus, sitisq; uehementer infestet: sit autem uersum corpus iam per uenæ sectionem, aut purgationem, & efficacissimos elysteres præeuacuatum, ac nulla superfluitate abundet, si quidem consueti fuerint ad frigida potum, & nullum ex uisceribus debile existat, frigidam aquam frequenter & coaceruatim ægro bibendam exhibuimus, & confestim corroboratis renibus, obturatum in ipsis lapidem expulerunt. In repletis autem corporibus & abundantibus superfluitatibus, & in his qui uiscera debilia habent, uitare oportet frigida potum. Sæpe autem delati ex renibus in uesicam lapides, & præ magnitudine circa collum uesicæ detenti, in extremum periculum ægrum deducunt, tum propter dolorum acumen, tum quod urinam excernere non permittunt. Decubitus igitur formam in talibus moliri oportet, ita ut supini sit

tuentur, & longe altiores coxarum uertebras habeant: deinde multiformiter eos commouere, quo omnibus machinamentis adhibitis lapidem ex ipso uesicae meatu excidere faciamus: post uero ægros iubere ut alacriter urinam eijciant, et electo lotio sinere: at uero ubi lapis non fuerit euacuatus, rursus mouere, atque hoc ipsum saepe repetere. Quod si non euacuetur, catheter instrumentum prolectandæ urinæ aptum immittatur, quod pro ægræ ætate congruenter sit moderatum: eoq; humor educatur: post uero per potiones lapidem in amplitudine uesicæ existentem confringere ualentes, lapis ipse atteratur. Si uero ex uesica quidem excidat calculus, iuxta medium autem meatuum ipsius pudendi obfirmetur, & uulnerando exulcerationis periculum inducat, decoctum quoddam ex prædictis urinam ducentibus plurimum exhibendum est, iubendusq; æger ut multam urinam congreget, eamq; postea emingat ac diligentius expellat: ita enim detractus lapis celeriter excidere consueuit. Noui autem, inquit Philagrius, quendam in quo quidem aliàs lapis fuit progressus, non penitus autem quam in summo pudendo fortiter obturatus, & parum absuit quin homo periret, propter urinæ suppressionem, & maximum dolorem. Angusta igitur uolens ipsum lapidem extrahere non potuimus, quare sensim & quiete agitauimus perquam tenui auriculario specillo. quum uero neq; hoc modo eum extrahere possemus, secare statuimus, uulnuscule supernè iuxta glandis magnitudinem incusso. Inferne enim secare non expedit, quandoquidem ferè semper in fistulam proficit, ac postea per ipsam fissuram urina excernitur. Porro ubi per urinam prodierit lapis, lac asininum melle modico mixtum præbeatur, & reliqua etiam diæta commodior, ueluti ad ulcera fieri consueuit, constituatur, ob uexationem uidelicet in locis ex lapide factam. Inde uero præseruare hominem oportet, ne rursus renes lapide infestentur: Smegma Archigenis, ad uesicam & renes affectos ut arenam per lotium excernant, quo in balneis sudans utaris. Piperis, calcis uiuæ, sinapis, fecis uini uisæ, staphidis syluestris, nitri, adarces, pumicis, aluminis scissi, sulphuris uiui, æqualibus partibus utere. Ex oleo præillitis locis.

Diæta præseruans ne lapides renascantur.

Cap. VI

Maximè ad lapidis generationem præcauendam momenti, moderatus cibus & bonæ concoctiones existunt: satietates enim & cruditates non solum exasperant morbum, sed etiam quum non sit generant, quare ægros admonere oportet, ut à coena saepe uomant, & absinthium assidue bibant, et per tempus certum conuenienti temperaturæ ipsorum purgatio pharmaco se per uentrè purgent. Cibus autem deligant è quibus neq; satietates neq; cruditates contingant: urinam etiam cientibus utantur: pastinacam indies edentes ualde percoctam, & fœniculū, sion, carduū, pulegium, calaminthen. Et ex marinis herinacios recētes, strombos, locustas, gāmaros, & cancros fluuiatiles: atq; hæc quidē quotidiana sint, per plures autem dies radicis eryngij decoctum bibant, similiterq; trixaginis, & dictamni, ac radicis tribuli, reliquaq; pharmaca lapidem atterentia partim iam prædicta, partim dicenda. Oportet autē ipsam etiam aquā per omnem uictum purissimam esse & percolatam: uinum item tenue, album, urinam cientis: exercitamentis uero utendum est mediocribus, & fricationibus in balneis ex nitro afflato, et fece uini uisæ, ac pumice: psilothris item assidue utatur, ac reliqua adseruante diæta, quæ in calculosæ uesicæ loco dicetur.

Vnguentum renale: Oribasij.

Cap. VII

Cyprini lib. III, cera lib. II, terebinthinæ lib. I, unguenti amaracini & laurini

Ec 3 cuiusq;

cuiusq; lib. i. centauree, castorij, satyrij, myrrhe, piperis, euphorbij, cuiusq; quadrātem: cyperi, pyretri, pulegij, cuiusq; unciam i. subige, & in fine etiam opobalsami trientem ammiscē. Quidam euphorbij sesquunciam tantum adijciūt.

Aliud malagma: hoc exquisitum est ad eos quibus renes aut uesica lapide laborant, inquit Archigenes: neq; reperias aliud his affectionibus cōuenientius.

Picis liquidæ, italicas heminas duas & dimidiam, ceræ, resine pinus, sulphuris uiui, cuiusque sesquilibram, nitri sesquilibram, pyretri sex uncem, fecis uini ustæ lib. ii. nasturtij, italicum sextarium i. staphidis syluestris sextarium unum, galbani sex uncem. Liquefibilibus liquefactis arida trita infarcito. Emplastrum renale: facit ad colicos & coxendices: est autem Asclepiadæ. Ceræ trientem, styracis sesquunciam, aloës sesquunciam, croci, pyretri, opoponacis, galbani, thuris, cuiusq; unc. i. ammoniaci thymiamatis sextantem, olei ueteris trientem. Apparatum ac pro more subactum confidenter usurpato, et miraberis, inquit Asclepiades. Aliquando uero olei tantum sextantem coniicimus.

Diæta eorum quibus renes è lapide laborant, reliqui uero totius corporis habitus gracilis est: Philagrii. Cap. viii

Maligna corporis constitutio est in qua renes quidem lapidem generant, uniuersi uero corporis natura gracilis existit. Etenim quum lapide laborantes pharmacis & uictu indigeant attenuatorijs, hæc ipsa gracilibus corporibus maxime contraria existunt. Noui enim quendam qui ob renum ex lapide affectionem huiusmodi diæta usus, proprios digitos ægre mobiles, obtusiq; sensus, & ueluti strepentes ac exarescitos sensit: Medici autem ipsi familiares refrigeratos digitos ipsius rati, & resolutionē, quam paralyfin Græci uocāt, meditari, pharmaca ex euphorbio & adarce adhibuerūt: quorū usu affectio multo peior reddita est, & accessiones semper ad superiores partes progressæ sunt, unaq; uehementissimos dolores intulerūt. Post uero ubi æger me accessisset, inquit Philagrius, & quæ contigerant circa ipsum declarasset, auxilium meum implorabat, quare diætam ei inueni per quam citra omnem renum læsionem uniuersam corporis siccitatem sanauit. Pitisanæ igitur succum ex cogitauī, & ex piscibus in petrosis aquis degentes, itemq; maritimos, & quæcunq; alia nihil uiscosum habentia. Simili modo & ex uolucrum genere quæcunq; consimile habent carnem, ueluti sunt perdices montanæ, attagenæ, sturni, turdi, & merulæ, & deinceps columbæ in turribus habitantes, & passeruli itidem in turribus niduos fruantes ac habitantes, deinde etiam gallinæ in altioribus locis connutritæ. A lacte autem reliquorum quidem animalium abstinere iussimus, solo uero asininio uti indulgimus, & ut compendio dicam, mediā inter ea quæ impinguant & attenuant esse oportet, quæ his ciborum loco exhibentur.

De calculosa uesica.

Generantur etiā in uesica lapides, pueris frequētius quā ætate prouectis. uoraces enim pueri sunt, & perpetui motus, & cibis utcunq; oblati & nocturnis utuntur, & neq; horam cibū capiendi seruant ordinatā: quin etiam prius quā prior assumptus cibus cōcoquatur aliū ingerunt: & quū uehementius à cibo moueantur, crudus & incoctus in uenas cibus distribuitur. Mollia aut sunt ipsorum corpora, & quæ facile cedant, eiusq; rei gratia obturationem circa renes non perferunt, quum uero crassissima lotia in uesicæ amplitudinē perferantur, ibidē ueluti uini fex, & limus aquæ subsistunt, ac postea ex loci caliditate desiccata lapidescunt. Cæterum aquæ impuræ, & multo limo refertæ, itemq; duriores & uehementer frigidæ, lapidum generationem adiuuant. Lapidēs igitur in uesica obor-

ca abortos in principio subiectis pharmacis subducere conabimur.

Pharmaca, lapides uesicae atterentia, itemque urinam

ducentia.

Cap. x

Sunt & pharmaca quae lapides in uesica atterunt: porri semē, foeniculi sylue
stiris radix, artemisia, chamamelū, amaracus, altheae radix & semē, carpobalsa-
mū, si non quod circa aquas nascit, graminis radix, adiantū, phileterij radix, smyr-
nij semē, oxymyrsines radix & semen, rumicis radix, pæoniae grana fulua co-
mesta, umbilici ueneris radix, leucāthemum, lapides spongiarū, amomū, tecō-
lithon, lithospermon, scolopendra herba, lapis qui ab aëris per lotiū eiectus est.
tritrus ac potatus, lappae herbae quae xanthiū & philanthropos dicitur, semē: uer-
mes terreni recētes cocti triti cū uino, aut cōdito, aut alio quopīa potu, ex uino
et melle, propomatis nomine Græcis appellato, paliuri semē, amomū, qd ipsum
& aquas lapidē gignētes depurgat, si cū ipso amygdalae amarae gūmī coquatur:
uiuis lachryma, pruni arboris lachryma, hoc est gummi, radiculae radix cū pana-
cis radice & capparis cortice similiter lapidē per urinam eicere facit: thuris gra-
num cū uino mulso, abrotoni semen cum piperis parī modo ex uino. Horum
unumquodq; cum uino albo datur decoctū, aut siccū inspersum, aut cum mel-
le, aut cum quopīa ex uino & melle potu. Danda etiā in potu ea quae urinam
ducunt: eis quidē qui calidiore habitu præditi sunt, cucumeris semen, apij, petro-
selini, hyacinthi bulbi semē, uiolae albę semen, croci radix, & similia quae ad cal-
culosos renes sunt prædicta. eis uero qui temperiem corporis frigidiorē ha-
bent, his calidiora præbeto: quale est meon, phu, acorus, carpobalsamū, iris, &
similia in renū affectionibus prædicta. Oribasij, ad calculosos renes & uesi-
cam. Herbae prosopidis quam scordiā appellāt, & Romana lingua persona-
tam, est aut folio lato, similis symphyto, huius unc. i. piperis drach. i. iridis unc. i.
tritram in uetro reponito. Datur inde cochlearij pleni mensura cū hydromelite:
datur autē quarto quoque die. Aliud Oribasij. Corticis radice uerbasci de-
coctum large per dies quinq; bibendum ex ordine præbe, & interiectis decem
diebus, rursus per quinque præbe.

Communia remedia uesicae & renum calculosorum.

Cap. xi

Acetum multum aqua temperatū omnibus ē calculo siue renum siue uesicae
laborantibus exhibendum est, qualicumque tandem temperie præditi sunt, &
qualemunque sanguinem gignant: acetum item scillinum, Carduus etiam fre-
quenter eis exhibendus est. Oportet autē radices eius recens ē terra extractas,
si tempus ita ferat, aut aridas iuxta aliud anni tempus, in uino albo substantia
tenui decoquere, & largius eam potionem offerre. Crassae enim urinae copio-
sam multitudinem ducit, tum ex omnibus uenis, tum ex calculosis partibus de-
tractam. Carduus igitur secundum totius substantiae suae proprietatem, & pro-
priati temperamenti facultate, uim crassos humores detrahendi habet. Ori-
basij. Commodae sunt etiam calculosis, cicadae aridae tritae potu inspersae tum
per se, tum cum nardi spica, congruenter autem miscetur ad cicadas duas & di-
midiam, nardi drach. i. Dato ex eis per dies nouem: primum, cochlearium unū,
deinde ii. postea iii. deinde rursus ii. & post i. hoc modo progrediendo, do-
nec nouem ex ordine potiones fiant, i. ii. iii. ii. i. ii. iii. ii. i. De passerculo.

Sunt & alia quae aliam naturam habent, & per hanc ipsam prædicta effi-
cacia prædita sunt: quali sanē præstat passer troglodytes appellatus: est autem
passerculus minimus iuxta sepes & murōs uictum quæritans; est que hoc ani-
malculum omnium auicularum minimum, ea excepta quae regulus appella-

Et 4 tur: simi

tur: similis est autem regulo in multis, præterquam quod in fronte auricolares pennas non habet, est etiam troglodytes passer regulo paulo maior & nigrior, caudamque semper subrectā & albo colore retro interpunctam habet: magis item garrulus quam regulus est, & sanè iuxta summum alae lineamentum cinerei amplius coloris, breues item uolatus facit: naturalem autem uim omnino admiratione dignam habet. Itaque sale conditus & crudus in cibo acceptus, morbum perfecte sanat: & noui adeo quosdam ob eius usum nunquam amplius ab affectione uexatos. Conditur autem optime penne euulsis, atque inde largo sale adobrutus, & postquam fuerit arefactus comeditur, & affectionem perfecte sedat. Melius autem est etiam aliter ipsos edere si plures contigerint, coctos nimirum, eius præsertim generis quod per hyemem ubique apparet. Exhibetur autem & alio modo. Passerculus non deplumis in ollulam conijcitur, ac deinde operculo addito uritur, animaduersione assidua habita, ne fallaris quum in cinerem sit redactus, & in aërem exhalans per exustionem totus consumatur: consuevit enim hoc contingere tum ipsi, tum alijs quæ uruntur: quapropter præstat ollæ operculum non oblinire, ut per interualla quædam operculo adempto uustionis modum intueamur. Exhibendus est autem semel omnis unius passer- culi usti cinis per se, aut modico phyllo & pipere ammixto, quo saporis iucunditate ori commendetur. Vtus itaque passerulus peregre proficiscentibus commodus est, licetque melle cocto exceptum in promptu habere. Melior autem mihi uidetur cōdiendi modus, atque adhuc dictis præstantior, si quis præeulsis pen- nis uiuum passerulum sale adobruat, quod & ego facio, inquit Philagrius. Ar- bitror enim & sanguinis naturam quiddam in se complecti, quod minime uul- gariter profit: cui amplius stercoreis efficacia accedit, quam exustione debiliore reddi planè credo. Proderit etiam eis qui abundant assatos edere integros, ita ut nihil ex eis præter pennas abijciant. Atque hæc quidem sunt quæ secundum proprietatem totius substantiæ efficacia existunt. Ceterum non minus genero- se etiam compositæ facultates calculi affectionem in renibus & uelica deterunt: prius autem quam ad eas progrediar, unius simplicis pharmaci mentionem fa- ciam ualde celebris, quod perfectam affectionis destructionem promittit, & quodam modo ad ea quæ ex proprietate totius substantiæ operationem faciunt accedere uidetur. Habet autem hoc modo. Pharmacum simplex ad calculo- sos, cui Marcianus testimonium præbet, medicus Apher. Leporis pellem in ollulam conijce, & in furnum demitte, atque ubi uista fuerit ut probe conteripos- sit, acceptam tere, & ex ipsa cochlearium unum cum uino ieiunis in solij calide aquæ insensu præbe. Si uero uelis experimentum pharmaci ipsius accipere, ex eo in uinum cōijce, & in uinum item lapidem ex flumine acceptum inijce, & contactum per paucas horas sine, & in grumos lapidis dissoluetur. Presby- teri Indi pharmacum ad calculosos, quod itidem externum lapidem in gru- mos resolvere posse quidam aiunt, quemadmodum id quod præcedit. Aco- ri, phu, hyperici, cuiusque drachmas sex, seminis porri drachmas xii, spicæ nar- di drachmas decem, cassiæ, lithospermi, cyperi, cuiusque drachmas xxv, exci- pe melle. Datur magnitudine fabæ. Aliud, quod lapidem celerrime per urinam expellit. Aliorum unguiculos siue nucleos septem, piperis gra- na nouem, contere simul quam tenuissime, & cum uino albo ueteri ad- stringente, pro una uice in balneo bibendum præbe, ubi ad calidum eius locum fuerit ingressus. A dolore quidem hoc ægrum liberat: aliquando au- tem & lapidem post unicam portionem exigit. Oribasij nephriticis. Acori,

Acori, mei, phu, afari, sarxiphagi, piperis nigri, seminis rutæ, betonice, spicæ nardi, piperis albi, singulorum æquales partes accipe: & ex eis siccis cochlearium cum uino adstringente aut aqua præbe. Aliud, Oribasij ad affectionem renum, quod & somnum inducit. Anisi, apiij, petroselinij, spicæ nardi, piperis albi, nigri, & longi, singulorum drachmas decem, cinamomi drachmas octo, myrrhæ drachmas quatuor, opij drachmas quatuor, castorij, sisonis, dauci, cuiusq; drachmas duas, seminis hyoscyami sesquidrachmam, sarxiphagi, rhei, betonice, cassiæ, cumini, seminis cucumeris decorticati, cuiusque drachmam i. excipe melle, & nucis ponticæ magnitudine præbe ex aqua calida. Facit & ad ulcera. Aliud eiusdem celebre. Piperis nigri, albi, longi, sarxiphagi, betonice, petroselinij, afari, nardi celticæ, spicæ nardi, omnium æquales partes misce. Dato drach. i. cum condito calido temperatam.

De hircino sanguine,

Cap. XII

Sanguis hircinus tum ad nephriticos, tum ad calculosos præsens remediū: nam & præexistentes lapides soluit, atq; ita per lotium excerni eos facit, ut etiā alij amplius non gignantur: præterea & dolorem sedat. Colligitur autem hircinus sanguis hoc modo. Quum uua maturefcere cœperit, ollam nouam accipito, & infusa in ipsam aqua, donec terreum deposuerit olla coquito: & accepto egrege hirco ætate matura, plus minus quatuor annorum, eum mactato, eiusq; sanguinem medium olla excipito, ita ut eum qui primum effluxit, itemq; postremum penitus relinquas: medium autem in spissari sinito, et in olla situm per acutam arundinem in multa frustra dissecato: indeq; reticulo denso, aut linteolo raro, aut cribro arctiore contextum sub dio exponito ut insoleatur & roscidus fiat, cauendo ne hymbre commadescat: porro ubi exiccatus fuerit eum diligenter terito & in pyxide adseruato, & remittente malo cochlearium plenum cum passo cretico exhibeto. Cognominatur autem pharmacum hoc Theu chir, hoc est manus Dei. Huius & nos, inquit Philagrius, in breui tempore non aspernārum periculum fecimus. Aliquando autem odoris commendandi gratia parum solij, aut amomi, aut similium ammiscemus. Ego, inquit, hoc pharmacum cum troglodyte passerculo permixtum, cuiusdam penitus nihil lotij eiicienti post magnos dolores exhibui, & permagnum lapidem attritum ab eo expuli. Antidotus Iuliani diaconi, cuius frequens periculum meo tempore fecit: calculos enim & in renibus & in uesica confringit, & paulatim per lotium expellit: facit ad comitiales probe: ducit menses ob densitatem aut frigiditatem restrictos.

Ossium ceruinorum ustorum quadrantem, castorij, piperis albi, agarici, acori, ammiij, cassiæ, amomi, sarxiphagi, corticis capparidis, radicis panacis, calamintæ, coaguli leporini, serpillij, petroselinij, singulorum unc. i. mellis quātum sufficit. Datur nucis ponticæ magnitudine: ad renum affectionem & menstrua purgantia: cum uino mulso: ad comitiales, cum frigida aqua: ad bestias uirus eiectantes, cum uino. Antidotus ex hircino sanguine. Componitur ex hircino sanguine antidotus huiusmodi. Sisonis scrupulos XII, spicæ nardi scrupul. XII, piperis communis scrup. XII, piperis longi scrupulos XII, cumini æthiopici scrupulos VI, petroselinij, dauci, rhei pōtici, croci, caroi, ligustici, myrrhæ, acori, cuiusque scrup. XII, sanguinis hircini exiccati ueluti prædictum est scrupulos XXXVI, mellis despumati quantum satis est. Datur auellanae nucis magnitudine condito calido temperata: datur autem in balneo in calidi soli insecu.

Alia, Archigenis: celebre & clarum est, inquit, ad calculos

fos &

fos & hoc quo utor: hac antidoto inquit, usus est etiam Philotimus & Iustinus, Spicæ nardi drachmas decem, croci drachmas octo, myrrhæ drachmas quinque, castorij drachmas quatuor & obolos totidem, cassiæ, floris iunci odorati, cinamomi, cuiusque drachmas quatuor, alij drachmam unam tantum habent, costi drachmas duas, scordij, polij, cuiusque drachmas tres, asari drachmam unam & obolos quatuor, mei drachmam unam, piperis albi & longi, dauci, petroselini, opobalsami, rosarum siccarum, singulorum drachmam unam, carpopobalsami obolos quatuor, quidam etiam sanguinis anatis foeminae drachmas duas, & succi radicis dulcis drachmas duas addunt. Excipe melle despumato, & fabæ magnitudine præbe cum uini mulsi diluti cyathis duobus, aut aqua calida, hanc etiam Oribasius commendat.

Antidoti uariæ ad calculosos.

Cap. XIII

Archigenis. Spicæ nardi, seminis apij, dauci, cuiusque drachm. quatuor, aluminis scissi drachmam unam, cinamomi, cassiæ, floris iunci odorati, cuiusque drachmam unam, croci obolos tres, myrrhæ tantundem. Trita cum uino cenanthite subige, & cum uino mulso obolum unum præbe. Præclarum inquit, huius pharmaci experimentum feci, neque præstantius aliud reperias, neque ad huiusmodi affectionem destruendam, neque ad lapidis coactionem prohibendam, neque ad iam compacti attritionem, neque ad defecationem, neque ad educationem & repurgationem limosæ in urinis fecis: coadiuuante præsertim diæta, quæ potissima præseruatiuæ facultatis pars est existimanda.

Philagrii pharmacum ex damafonio constans, quod secundi ordinis esse dicit. Damafonij drachmas decem, seminis dauci drach. sex, radicis dauci drachm. sex, radicis herbæ lanariæ, corticis radicis capparis, cinamomi, cuiusque drachmas sex, cassiæ drachmas octo, betonica, piperis, cuiusque drachmas octo, nardi celticæ, iridis, acori, asari, seminis foeniculi, petroselini, cardamomi, spicæ nardi, cyperi, costi, sarxiphagi, seminis apij, myrrhæ, seselis, radicis panacis, zingiberis, piperis albi, cuiusque drachmas quatuor, lapidis syriaci masculi drachmas sedecim, lapidis foeminae drachmas sedecim, seminis myrrinij, lincurij quod succinum itemque electrum appellant, cuiusque drachm. xvi, seminis erucæ drachm. xvi, mellis quantum sufficit, datur nucis ponticæ magnitudine cum radicis asparagi palustris decocto, aut floris iunci odorati, aut radicis dulcis. Datur à balneo. Aliud Philagrii, ex damafonio pharmacum, quod tertij ordinis esse ait in lapide atterendo. Facit & ad renum affectiones.

Damafonij drachm. xxxiiii, seminis dauci, radicis herbæ lanariæ, corticis radicis capparis, cassiæ, nardi celticæ, cuiusque drachm. vi, alij drachmas xvi, habent, iridis, mei, asari, foeniculi, cardamomi, cyperi, petroselini, costi, seminis apij, myrrhæ, croci, cuiusque drachmas ii, seselis drachmas iii, radicis panacis drachm. iiii, quidam & zingiberis drach. iiii, & piperis item drachm. iiii, addunt, mellis atticici quantum satis est, excipe & utere quemadmodum prædictum est. Oribasij, ex libris ad Eustathium, antidotus Xenophili. Facit ad uescicam & renes calculosos & exulceratos. Atterit enim lapillos, & ulcera sanat.

Cassiæ unciam unam, sarxiphagi trientem, betonica, cyperi, petroselini, costi, tribuli, seminis uiticis, lithospermij torrefacti, cuiusque sextantem, seminis apij sesquiunciam, phylli, spicæ nardi, asari, dictamni, baccarum lauri, seminis ocymii, singulorum unciam unam, zingiberis drachm. iiii, nucum pinearum quas strobilos Græci uocant sexuncem, mellis lib. ii, in balneo exhibeto, aut ante balneum ex uino mulso aut passo chrysatice magnitudine fabæ.

labæ. Andromachi antidotus ad calculosos, quæ paulatim confringit & extrudit lapides, donec uesicam perpurget, & pellucidum lotium procedat: & quod maximum est, ita perfanat, ut nec in posterum ginantur. Habet autem hoc modo. Seminis dauci, anisi, seminis cucumeris decorticati, seminis apij, petroselinij, myrrhæ, cuiusq; sesquidrachmam, cassiæ, cinamomi, nardi celticæ, cuiusq; drachm. i. trita aqua subigito, & ad paruorum lupinorum formam redigito: ieiunis autem quotidie per dies triginta cum aquæ cyathis tribus exhibeto. Cæterum ad huius pharmaci apparatus religiosè, inquit, accedendū est: in lignea enim pila, & pistillo item ligneo hæc contundenda sunt: oportetq; amplius eum qui hæc contundat neq; annulum ferreum gestare, neq; calciamenta clauis ferreis transfixa, atq; id ut mysterium habe. Asclepiadæ ad calculosos compositio. Carpobalsami, lapidis qui in spongijs reperitur, pulegij sicci, seminis maluæ syluestris sicci, singulorum æquales partes contusas & cribratas reponito, indeq; cochlearium unum cum uini diluti cyathis tribus præbeto.

Alia compositio celebris. Electri siue succini unc. i. lapidum qui in spongijs reperiuntur unciam unam, sarxiphagi unc. i. Dantur ex ea scrupuli duo quomodo cunq; uelis. Pharmacum ex cardamino ligno ualde celebre.

Spicæ nardi, piperis, hyssopi, tecolithi, cuiusque unc. i. piperis albi scrupulos xviij, cassiæ scrupul. ix. helenij siue inulæ scrupulos v. scobis eboris scrupulos xii. ligni cardamini scrupulos xii, mellis quantum sufficit. dantur ex eo obolites cum condito, aut aqua mulsa. Aliud laudatum. Seminij brassicæ drachmas vi. cyperorum, petroselinij, electri, piperis singulorum unciam unam, mellis quantum satis est, datur nucis ponticæ magnitudine cum condito sebre carentibus, aut cum aqua mulsa. Aliud. Cucurbitam aridam exure, & cineris cochlearium unum, ut uelis bibendum præbe: aut catapotia ex cinere formato ac exhibeto, & celerrime per lotium calculum extrudet. Aliud, quod calidioribus præcipue conducit. Ex portulaca succum exprimito, eūq; resiccatum in catapotia redigito, & drachmam i. exhibeto, ad miraculum usq; lapidem per urinam expellit. Aliud. Cancros iiii. aut v. aut vii. impari solum numero sub testa uiuos exure, & contriti eorum cineris cochlearium i. cum condito præbe: eūq; calculosos renes sanabis. Aliud. Phu aqua feruefactum bibendum præbe, omnesq; lapides educet: quod si Mithridatis compositione abudes, eam quæ scincos admixtos habet, unā cum decocto præbe. Experiments constat: utere. Conditum Oribasij. Vini sextarios duodecim,

mellis sextarios duos, piperis sesquiunciam, sarxiphagi, betonice, mei, phu, spicæ nardi, petroselinij, cassiæ, cuiusq; sextantem. Aliud conditum, ad uesicæ lapides accommodatum. Sarxiphagi, spicæ nardi, cuiusq; drachm. iiii. piperis unciam i. carpesiæ, zingiberis, mei, asari, cassiæ, sisonis, petroselinij, acori, dauci, singulorum drachm. iiii, mellis sextarium unum, uini sextarios iiii, aut v.

Aliud renale. Spicæ nardi, phu, sarxiphagi, betonice, asari, lithosperi, petroselinij, cuiusque unciam unam, colti uncia dimidium. Ex hoc arido cochlearium unum in conditum mitte, idq; æger hora ante prandium bibe. lapides atterit, & per urinam expellit, neque amplius cogi lapidem perdit. Aliud Oribasij conditum renale: facit enim ad inueteratos renum dolores, & ad difficultatem emittendi urinam ex uesica, ad strangulationem item ac urinæ suppressionem, ad eorundem etiam membrorum frigiditatem: callosas durities extrudit, lapides confringit, & ad alias affectiones eodem modo probè facit.

Sarxiphagi drachmas duas, betonice drachmam unam,

unam, petroselini scrupul. vi. spicæ nardi scrupul. iiii. phylli scrupul. iiii. rhei scrupulos iiii. irionis scrupul. vi. piperis scrupulos xii. mellis sextarium unum, uini boni sextar. iiii. Aliud pharmacū renale. Zador, id est, zeduaræ, galangæ, ligustici, fefelis, cardamomi, piperis longi, piperis albi, cinamomi, zingiberis, seminis smyrni, careophylli, phylli, stachyos, myrobalani, phu, costi, cordij, silphij siue laserpitij, rhei barbarici, pæoniæ: alij etiam arboris nucis uiscum & paliuri semen, itemq; sarxiphagum ac cassiam addunt. Ex his singulis statueres duos commisceto. Datur cum condito aut uino uetere ad balneum ituris, et sine balneo, uesperis similiterq; mane. Absinthaton renale, ualde bonum.

Petroselini unc. i. sarxiphagi scrupul. xii. betonicæ scrupulos xii. seminis irionis sesquiunciam, spicæ nardi scrupul. vi. phylli scrupul. vi. rhei pontici scrupulos vi. calami aromatici scrupulos quinq; dictamni scrupulos iiii. mellis sextarium unum, uini sextarios quinq; præbe mediocris poculi mēsurā ieiunis.

Pharmacum lapides in renibus atterens, adeo ut in una die commoditatem suam ostendat. Abrotoni drachm. viii. croci drach. viii. herbæ anthyllidis drachm. xvi. foliorum rutæ uiridum drachmas xxxii. Probe contrita in pastillos digerito, & ex eis drach. i. cum aceto mulso præbeto. Vtere ipso, inquit, assidue: mirum enim quanta utilitate præstet.

Cura eorum in quibus lapis atteri non potest, neq; item per lotium excerni. Cap. xiiii.

Quod si uesicæ lapides per lotium excerni non queant, sed in meatu sint obturati, & urinæ suppressionem inducant: ægrum supinum decumbere, ueluti dictum est oportet, ita ut coxarum partes magis sursum uergant: indeq; huc atq; illuc multiformiter cōmouere, quo ex meatu excidat, post uero ita adhuc supinum & positum sursum uergentem mingere iubere. si uero neq; sic excernere possit, per catheterem instrumentum urinam proleſtare. Quod si ob lapidis asperitatem uesica incidatur, & ex hoc subruenta mingant, aliquādo uero purulenta, et submucida, illis ipsis siue mingant siue non mingant plus quam alijs dolorum adest. cæterum in potu exhibenda sunt his pharmaca quæ lapidem atterere prædicantur, & ulcera ipsa sanant, quibus uero ulcera nondum sunt oborta, lapides autem in uesica detinentur, hi pellucida & tenuia ac aquosa mingunt: quin & arenam subsidentem urinæ habent, & in lotij eiectione dolores augescunt. Quod si neq; per hæc adhibita pharmaca lapis in uesica atteri possit, ad sectionem trāseundum quæ pro more infernæ fiat, atq; ita lapis subtrahatur & fissura quā diligentissime carne repleatur, cicatrixq; inducatur, ne fistula per successum oboriatur.

Diæta post exactos lapides, adseruans ne alij renascantur, & de affligentis humoris cognitione ex lapidis colore. Cap. xv

Post exactum lapidem, & cicatricem ulceri obductam diæta constituenda est, ne eos renasci contingat. Coniectura etiam faciēda tum ex alijs tum ex exacti lapidis colore, cuius humoris materia in corpore abundet, ex qua adeo lapides cogantur, alij namq; subalbidi apparent, atq; hi pituitosiores humorem ostendunt: alij uero pallidi sunt, & bilem abundare demonstrant: alij autem coloris testacei sunt, ob superassatam uidelicet à plurimo calore bilem: alij nigri, qui atq; bilis humorem exuperantem declarant. Omnes igitur quomodo odore, que calculosi à cœna assidue uomant, neq; quicquam feruens in cibo sumant, quod renes & uesicam exalfacere possit. Cauere autem conuenit cibaria substantiæ duræ, & quæ ægre manducatione atteruntur: itemq; ea quæ multam substantiam

substantiam habent, plurimumque similiter nutriunt, & quæ acervatim digeruntur antequam perfecte concoquantur; gravis item qualitatis, & quæ difficulter commutantur, ac supernatant, & ægrè per aluum subeunt, ac inflant: item quæ meatus obstruunt, aut aliàs diutius in corporibus insident; ex huiusmodi enim, cibus venter labore fatigatus, ipsos aut crudos aut semicoctos ad hepar & renes digerit, atque ita quod crudum cumulatim allatum est, ineptè præterque naturam excolatur, & cum tumultu ad renes progressum, statim coactum inspissatur ac resistit. Quare omne lac præter asininum eis incommodum existit: hoc enim inquit Archigenes, & substantia tenuissimum est, & facultatis facillimè dissolventis, igitur mirabiliter articularum tumores & nodos (quos & callosæ duriciei modum ex vitiosi lactis usu pueri sustinere coguntur) leuigat & delet, unde admonendum duxi, ut ipsum calculosis assidue hemina mensura exhibeatur, post matutinas deambulationes, atque id adseruandi à lapidis generatione: gratia præ omnibus alijs fiat. Potus aliàs sit aqua calida, fontana, pura, defecata, levis. Vinum autem tenue, urinam ciens, non ualde uetus. Dulcia enim uina calculosis sunt nociua. Porro ut compendiò dicam: omnis dicta in frigiditate temperatura prædictis, exquisitè attenuatoria sit: in calidioribus uero, inter attenuatoria & impinguantia media, fatietatem uero præ omnibus alijs uitare oportet, dulcium præsertim & ex caseo conflatorum ciborum: unde & crudita tem infestissimam eis censere oportet: in quam si quando incidant, impastos & absque cibo manere decet. Frigora quidem magis quam æstus cauenda. In temperatis uero locis degant in quibus anni tempora & horæ nimio seruore non infestent. Assumantur etiã ociosæ deambulationes, & exercitia moderata, segnities enim & ocium eis nocent. Cæterum uentrem semper probè laxum habere oportet: hic enim si bene subierit, puriora lotia prodibunt. Vnguentis utantur quæ locos defendere queant, ne faciliè grauius oblaedantur: epithemata etiã ceterum rubefacientia, itemque lancinantia, dropacesque & sinapismi adhibeantur. Malagma autem exquisitum hoc est, neque faciliè reperias aliud, inquit Archigenes, ad huiusmodi affectiones magis accommodatū. Picis liquidæ heminas II. & dimidiam, ceræ sesquilibram, resinæ pinus sesquilibram, sulphuris uiui sesquilibram, staphidis agrestis bessem, galbani sex uncem. Liquefabilia eliquantur, & inspersis aridis tritis, simul optimè subacta & unita imponuntur. Variosa asperitas ex hoc inducta mucum plurimum ducit, & pruritus non malum facit, adeo etiã ut uolupte sit si per resolutionem refrigeretur. Quod si aliquando levis molestia inde oboriatur, cerato eam lenire oportet per unam diem, ac deinde rursus eadem imponere. Conuenientissimū etiã renibus est, si super uentris locum idem malagma imponatur. Sinapismi item calculosis apti sunt, & naturalium aquarum usus: lauent autem non sæpe, ungantur autè frequenter. Curiose etiã temporis oportunitas dispicienda est, ut uenam secemus, si quidem sanguis abundare uideatur, aut ut purgationibus conuenientibus utamur in eis quibus uitiosi humores coacervantur. Bibant autem & ea quæ urinam ciunt per interualla quædam tum simplicia, tum composita præscripta: in huiusmodi enim omnibus quicquid modicè relictum est, facile ad debitam commutationem deuenit. Aiunt autem quidam terram ex latere ueteri tritam cum uermibus terrenis, & peccini crassius illitam, preparare ut lapis in uescia aut renibus per lotium ejiciatur.

De renum inflammatione: Ruffi.

Cap. XVI

Ob plurimas causas renes inflammantur, nam & humores corrupti, & plaga, &

Ff ga, &

ga, & attritiones, & pharmacorum potiones inflammationē generant, & praesertim equitationes continuæ & uehementes. Accedit agris dolor pulsatis retro iuxta primum dorsi uerticulum, paululum supra spurias costas, distendit autem dolor sursum usque ad hepar, praesertim dextro rene affecto, deorsum uero usque ad uesicam & pudendum, lumbosque & coxendices, pectinem item ac femora, consequitur etiam stupor propinqui cruris, & neque recta erigi possunt, neque pedibus ingredi, & siue sternutatio, siue aliqua alia concussio irruat, uehementi dolore lancinantur. frigent eorum extrema, & magis surae ac pedes: adest urinae emittendae difficultas, minguntque assidue ac laboriose, in principio quidem tenuia & aquosa, in quibus nihil subsidet, inflammatione uero in peius proficiente, rubicundiora, deinde etiam crassa & mucosa, adfuntque febres uehementes. Quod si adhuc amplius inflammatio augetur, haec omnia itidem fiunt uehementiora. His accedit nausea, & stomachi morsus, & uomitus bilis. Quidam autem ipsorum usque ad animi deliquium anguntur & exudant. Sinitur ipsis uenter adeo ut inflentur, & assidue ructus emittant. Sequitur fastidium uehemens, et quibusdam continuè fiunt exacerbationes: quibusdam uero per interualla, in uniuersum autem uentris egestio, & urinae multa excretio dolores ipsos praecedunt. Noui autem ego quendam, qui post uehementem uexationem animo linquebatur multumque exudabat: ubi autem restitutus sibi animum recepisset, simul ab omnibus molestiis liber euasit. Renes igitur inflammatos hoc modo curare oportet. Aegrum in lecto mollissimo decumbere oportet, ac primo die à cibo abstinere, non tamen in multis dies in ediam extendere. Urinae enim puriores & acriores per in ediam redditae, uehementissimos morsus infligunt: itaque in principio sorbitionibus tenuibus morsus lenientibus connutrire oportet, & aquae calidae potu. Aquam uero mulsam in principio non laudo, priusquam concoctae & consumptae fuerint inflammationes: neque item eorum quae urinam cient usum: oblaedunt enim mordaces humores inflammatis partibus inducendo, neque etiam purgatiuum pharmacum exhibendum, ueluti quidam consueuerunt. Per clysterem autem maluae decoctum, aut seminis lini, & sceni graeci, cum oleo infundendum, ammixto etiam melle, aut prisanæ succus cum oleo & melle. Caeterum copia non multa infundatur, ne repleta intestina comprimant renes: ubi uero stercora prodierint, & intestinum fuerit euacuatum, oleum iniiciatur anethinum aut gleucinum cum butyro, eliquatis in his adipibus quibusdam, anserino uidelicet aut gallinaceo, aut medulla ceruina. Subeunte autem uentre, incumbente lanam ex oleo calido assidue rigare oportet: melius tamen fuerit si anethum, ruta, althea, & artemisia, oleo sint concocta. Porro si adhuc maiori acumine renes affligantur, & uehementior exurgat dolor, uenam cubiti secare conuenit, sanguinis detractione repetita, & si post id auxilij aliquid ex inflammatione relinquatur, ad cataplasmata procedendum, primum quidem ex farina in aqua mulla cocta, aut ex semine lini, postea etiam ex chamæpity, polio, abrotano, trixagine, asaro, iunci odora ti flore ammiscendum, atque tum non amplius in aqua mulla cataplasmata coquenda sunt, sed in passo. Mixturae autem modus sit, ut ad farinæ partes IIII. quorundam ex praedictis pharmacis partes II. commisceantur. Bonum est & hoc cataplasma. Galbani, terebinthinæ, farinæ erui, cuiusque drachmas quinquaginta, iridis drachmas IIII. cerati ex gleucino, aut amaracino, aut irino, aut cyprino, aut aliquo consimili oleo apparati libram unam, farinæ triticeae sextantem, passi cretici quantum satis est. Apparato ac supra ilia ac lumbos imposito. Facit idem ad ue-

ad uescam inflammata si pectini imponatur. Quod si per cataplasmata dolor non leniretur, cucurbita lumbis ac illis est adhibenda, & fissuris impactis plurimus sanguis attrahendus, deinde spongiarum fotu utendum, & in calidam aquam desidendum, in qua calamus aromaticus, chamæmelum, flos iunci odorati, semen lini, anethum, maluae syluestris radices sint incocta. Prius autem & uescica ingens aqua & oleo semiplena ipsis locis imponatur, fomentis etiam pinguioribus admotis, postq̃ etiam ceratis: quin & malagmata amplius imponenda, cerata quidem conueniunt ex cyprino aut irino apparatus: malagmata autem odoratissima sunt, qualia sunt hepatica ex styrace conflata. Caterum dolore affligente bibenda sunt pharmaca quæ dolorem leuant: eiusmodi sanè. Calicis papaueris tosti oboli dimidium, styracis tantundem, thuris obolum unum, seminis cucumeris grana uiginti, seminis apij quantum tribus digitis comprehendi potest, opij ad erui magnitudinem. Hac omnia quam tenuissimè terito, ac cum aqua dulci permixta pro uice una exhibeto. Statim enim quiescet dolor, & obdormiet ager. Conferunt item consimiles pastilli dolorem leuantes. At uero ubi perfectæ cōcoctæ fuerint inflammationes, & quæ uerint dolores, tunc etiam per urinam cientes purgandum: ueluti sunt acorum, mecon, phu, petroselinum, gramen, cassia, chamæpitys, polium. Horum unumquodq̃ ex aqua coquendum est, & cum uino & melle bibendum. Cibi autem post concoctas & consumptas inflammationes exhibendi, sunt panis optimus, maximè clibanites, ex uolucris, montanæ: ex marinis, herinacci recentes: ex oleribus, fœniculum, apium, daucus, et syluestria omnia, & cucumis coctus. Hac enim optimè urinā prolestant: maximè uero id præstant pastinacæ probe percoctæ, & crithma, & scandix, & gingidia. A concoctis inflammationibus urinae his prodeunt multæ & crassæ, & in quibus bonum est quod sublidet, atq̃ hæ ipsæ maximè iudicant ac secernunt morbum: aquosæ autem mictiones & puræ ac pelluentes, agrè morbum secerni indicant.

De duricie renum.

Cap. xvii

Quæcunq̃ duricies circa renes oboriantur, dolores quidem non amplius inferunt: egris autem ex uacuo uentris loco ueluti quippiam pendere uidetur, et stupor adest coxendicum, & impotentia crurium, minguntq̃ pauca, & reliquo corporis habitus aqua inter cutem laborantibus maximè similes existunt. Quiddam etiam temporis progressu manifestè hydropem incurrunt, ueluti etiam ab alijs uisceribus induratis contingit. Hos itaq̃ ceratis & malagmatis, itemq̃ frictionibus ac pinguibus fomētis remollire oportet, & urinam ducentia eis exhibere. Ventrem item ex althææ, fœni græci, & caricarum decocto subluere, melle & nitro ac oleo ipsdem adiectis. Ad noctem item infusa per clysterē conueniunt, oleum anethinum cum butyro & adipè anserino.

De suppuratis renibus: Ruffi.

Cap. xviii

Quibuscunq̃ renum inflammationes ad puris permutationem uertuntur, his omnes in renibus inflammatis prædictæ accessiones extenduntur, & febres cum horrore irruunt, atque id maximè circa uesperam. Iam uero & tumor quodammodo circa ilia apparet, & uehementis calor sensus ipsos circa renes affligit: minguntq̃ ruffa & pura. Vbi uero suppuratio fuerit perfecta, tunc & febrium & dolorum accessiones minores contingunt, & grauitatis sensus magis circa affectum renem infestat: tempore rupturæ magis exacerbantur, ad quam etiam humorum excretio cum ipsis urinis consequitur, inuehuntur & sordes quædam ex substantia renum elotæ, ut plurimum enim ad uescicam ex renibus

erumpens pus defertur, quod sanè conducibile putandū est. Aliquando autem & ad intestina eruptio deuoluitur, & per sedem pus euacuatur. Quibusdā uero neq; in totū suppurata erumpunt, sed circa renes per multū tempus consistunt, donec cauterē adhibito aut alio modo forinsecus apertionē & educationē moliaris. Igitur postquā abscessus signa apparuerint, quā celerrimē adiuuare oportet tum suppurationem, tum puris eruptionem. Quā in re spongiā aqua & oleo, itemq; fursuribus imbuta assidue proderūt fotus gratia admota, eundem usum etiā cataplasmata præbent, ex farina ordeacea cum ficuum & altheæ ex aqua mulsā decocto, aut ex cretico passō. Bonū est & ipsas ficus ammiscere tritas, & ablinthij comam contusam, aut chamelæam, aut irin, & bryoniam: addatur & terebinthina, pix, manna thuris, thus ipsum, columbæ ster cus, polium, & quæ similia his existunt, & simpliciter omnia adhibeantur quæ in hepatis abscessu supra approbauimus. In malignis & putrescentibus humoribus, quos ex febrium acrimonia cognoscēs, etiā rosæ in cataplasmata cōmiscendæ, & myrti bacca, eruiq; ac lentis farinæ. Hæc enim eisq; similia humorū putrefactionē sistunt. Post hæc emplastris utendū quæ pus permutare possunt, quemadmodū in hepaticis est prædictū. Quod si ruptura moretur, acriori infuso aluius est subluenda, ueluti ueratri nigri cremore, raphani item & alliorum ac cucumeris syluestris radicis cremore. Macerare autē hæc in aqua maris aut sal sugine uel muria oportet, parumq; olei ammiscere, quo infusa lubrica reddantur. Hæc sanè per clysterem infundenda, iubendiq; ægri quo plurimo tempore apud se detineant: consueuerunt enim sæpe ipsam suppurationē dirumpere, unā cum hoc quod uentrē emollire solent. Si uero uehementiores sunt dolores, pitisanæ succus infundatur & lac recens multum: infusus quoq; in aquam & oleum apparatur. In potu leniora urinā ducentia exhibeantur, ueluti cucumeris semen decortiatum ex aqua mulsā, palmulis in ipsa incoctis. Danda etiam iris cum melle despumato delingenda, aut ipsum mel in decoquendo in pastillum redactū. Remorantem item rupturam iuuat cuminum cum passō, ruta cum uino mulsō. Si uero ex habitu corporis & doloribus languidioribus coniecturā facias, ob crassiciem pus ipsum non excerni, sceniculi decoctum in potu dato, & chamæpityos, pulegijq; & origani. Post rupturam autem carunculæ paruæ oblongæ cum urina excernuntur: & siquidem maligna fuerint ulcera, humores fetidi, liuidi & mucosi: si uero benigna fuerint, etiam pus ipsum album, & aquale, & leue, absq; odore graui, & paucū reperietur. Lac itaq; cum melle post puris eruptionem eis præbendum: & primum quidem asininum aut equinum, ad ulcera enim repurganda cōducit, quum uero repurgatione amplius opus non habent, & morsus fiunt obtusiores, indigetq; æger nutrimento, tunc etiam bubulum lac eis exhibendū II. & III. heminarū mensura. Amplius autem omne lac recens multum calidum præbendum est, animali in domum ubi æger decumbit deducto: hoc & aliorum internorum ulcerum optimum est pharmacū, & graui puri maximè amicum, & corpus probè nutrit. Porro ad uires refocilandas ac restituendas, ægrum decumbentem molliter fricare singulis diebus mane conuenit, & primum bubulo lacte nutrire: postquā uero concoxerit lac, sorbitionem ex pitisana apparatus præbere, aut amyllum, aut similaginem lotam cum lacte coctam, dandum & lac ouis permixtum, & iusculum gallinæ pingue. Ex oleribus cōueniunt, malua, seris, rumex, portulaca, asparagus palustris, cucumis, lactuca, omnia cocta, neq; quicquam crudum uorent. Hæc sanè morsus obtundunt. Ceterum succedentes repletiones uomitu euacuare oportet.

ter. Ut uero facile uomant, cucumeris semen tritum ex passo eis præbeatur; aut pisanæ succus cum passo. Oleo autem cyprino præsertim illinantur pennæ, quibus item ad uomitum irritentur. Non solum autem ad repletiones uomitus laudo, uerum si quis omni mense audenter uomat, forte & renum ulcus, & quicquid inde mali accedere possit, dissoluat. Reliqua diæta eadem sit cum ea quæ postea ad uesicæ ulcera dicitur. Ex his uero quæ urinam ducunt simplici-
ra iam sæpe dicta itemq; dicenda, ad repurganda renum ulcera bibantur. Quum uero munda fuerint ulcera, quod inde tibi palam fiet, si neque rectorium etiam ulceri obductum cum urinis excretum appareat, neque etiam pus excretum sit feculentum, sed subalbum, & leue, & æquale, & paucum: tunc sanè pro empla-
stris malagmata assumenda sunt: id quod ex seminibus constat: item quod ex baccis lauri; & quod Apollophanium inscribitur: & omnia quæ cutem rubefa-
cere possunt, quale est id quod ad calculi affectionem est præscriptum. Pro his uero quæ urinam cient resiccantia adhibeantur: quare cibus ipse adstringens sit, & pharmaca quæ corpora cogant. Conferunt etiam dropaces, & sinapismi, & naturalium aquarum calidarum & frigidarum usus. Porro ad inueterata renum ulcera, pharmaca sunt assumenda quæ ad exulceratam uesicam describentur. Atqui nosse oportet omnem exulcerationem, & uesicæ, & renum, ægre cura-
bilem esse, præsertim quæ ex erosione sit oborta, adeoq; paucos nouimus qui ab ea perfecte sint liberati: si uero extra suppuratio uertatur, inflammatio magis tumescit, & ad manum & ad oculum magis euidenter expolita est. His merito medici manum admoliuntur ubi maxime tumor attollitur, curamq; adhibent quæ ad communia & caua ulcera requiritur: non ignorandum tamen ea in si-
stulam abire solere, quare diligentiori omnino indigent tractatione.

De disuria, id est, emittendi urinam difficultate; & stran-
guria, hoc est, stillicidio urinæ. C A P I T U L U M XIX

Disuria dicitur, quum meiere æger cupit, & cum ui urinæ excernuntur. Stranguria autem appellatur, quum paulatim & guttatim urinæ destillant, & assiduam ad mingendum irritationem faciunt. Hæc autem contingunt aut ob acrimoniam urinæ, aut ob exulcerationem uesicæ, aut ob uesicæ debilitatem: aliquando autem & affectis renibus aut hepate, quum abscessus rumpitur, & pus per uesicam excernitur, assiduam irritationem ad mictionem propter acre-
dinem suam inducit, ex intemperie etiam quadam ægra uesica in propria ladi-
tur actione. necessarium igitur est scire causas quæ stranguriam & disuriam præcesserunt, atque ad ipsas remedia adornare. Si igitur frigiditas has affectio-
nes præcessit, oleo rutaceo calido pectinem fouere oportet, ægrumq; in samolici
aut rutæ decoctum desidere; ac inum uentrem contegere ac calfacere: aliquan-
do & per sedem oleum rutaceum calidum infundere, & cibus urinam cientibus
uri quæ concalfacere possint: aromatum etiam decoctiones in potu exhibere.
potest etiam præberi in potu theriace cum passo aut uino mulso. Sin uero bilio-
siores sint urinæ, & mordacitas circa uesicam contingat, ac urinæ stillicidium
inducat: tum sanè exuperantem uitiosum humorem quàm celerrime purgare
oportet, & cibus temperamentum inducentibus uti, ita ut ab omnibus acerbis
ac falsis abstineamus: in potu autem plurima aqua calida dulcis exhibenda,
ægerq; assidue ad mictionem cogendus: si enim acre recrementum diutius in
uesica moretur, partes ipsas corrodit & exulcerat. Conueniet igitur continuis
fomentis uti, & amyllum cum lacte decoctum, itemq; cum palmarum decocto
absorbendum præbere. Vinum autem dulcius præbeatur. Optimum est &
Ff 3 ipsum

ipsum lac calidum potatum. Quod si acrimonia adhuc augeatur, etiam per colem lac ipsum cum amylo in uesicam iniiciatur, & pastillus ex physalide constans in potu sumatur. Porro si aliud membrum sit affectū, & id ipsum per uesicam expurgetur, manifestum est illi priorem curam deberi, ita tamen ut neq̃ uesicam negligamus.

De difficultate emittendi urinam in febris.

Cap. xx

Philumeni: Fit & in februm malignarum principio urinæ emittendæ difficultas, ut & inde uesica affligatur, & paulatim cum dolore urinam emittat: neque uero sola molestia hæc est, sed & signum totius nervosæ partis affectæ. Ad id imum uentrem igitur & pectinē, inguinaq̃ & coxendices, lana pura oleo dulci imbuta, in quo ruta, anethum, aut oleum sicyoniū sint decocta, imponatur, lanæq̃ amplius cum inū quā tenuissimè tritum infarciatur, & si alius eis sit adstricta foeni græci & maluæ decoctiones infundantur. Infectiones etiam affumantur usq̃ ad umbilicū & lumbos totos, ex artemisiæ, foeni græci, rutæ, pulegiæ, & maxime samfuci decocto, oleo itidē ammixto. Quod si accessiones urgeant, etiā uenæ sectio adhibenda est, & diæta exquisita, quæ maxima parte ex sorbitionibus constet. Utimur itaq̃ halica lota cū anetho in aqua mulla despumata cocta, aut pane loto, aut sorbilibus ouis. Post hæc & malua cōuenit, friabilis cocta, & porrū capitātū in tribus aquis decoctū, & tenerrimi pisces. Post formenta uero, cataplasmata adhibeantur ex eadē materia apparsa. Vrgentibus autem doloribus, cucurbitæ cum scarificatione ad imum uentrem affigantur. Ceratum uero ad has affectiones conuenientissimū hoc est: Maluæ syluestris radices in oleo sicyonio cum modica aqua coquuntur, donec aridæ fiant, & ipsæ quidem abijciuntur, oleum autem cum rutæ succo permiscetur, ut quarta olei pars de succo rutæ addatur: hisq̃ amplius cera sufficiens & parum castorei adjicitur. Caterum potus ita affectis cōmodus est cucumeris satiuī semē, quod præmaceratum decorticatur, deinde tritum cochlearium II, mensura ex aquæ cyathis III, præbetur. Lotium enim citra molestiam ducit, & dolores circumlocos infestantes euestigiō dissoluit. A reliquis autem quæ urinā cient quamdiu febres persisterint in totum abstinendum est. Moti enim ex febrili calore totius corporis humores, per ea quæ efficacius urinam cient, ad uesicam prius afflictiā deducuntur.

De ischuria, hoc est, urinæ suppressione.

Cap. xxii

Ischuria, hoc est, urinæ suppressæ affectionē, etiam ipsum nomen declarat: ægris enim in totum urina supprimitur ac cohibetur. Atq̃ id aliquando ob imbecillitatem contingit, uesica ea quæ in ipsa cōtinentur arcuē complecti ac exprimere non potente, aliquādo autem & inferiore meatu à crassis humoribus obturato, aut lapide obstructo, quandoq̃ autem ob inflammationem aut talem quempiam tumorem meatum angustum reddentem, & perfectè obturantem. Sanguis etiam in grumos concretus in uesica, suppressæ urinæ causa existit: pus item crassum per ipsam uesicam à renibus, aut hepate, aut alio quopiam inferiore membro excretum, urinæ suppressionē operatur. Accidit & sanis sæpe urinam ipsorum cohiberi, aut ob negotiorum importunitatē, aut in concionibus, aut foro iudiciario, aut somnis, si diutius continuerint mictionem. Afficitur enim in his comprehensua & urinam obuoluens uesicæ uis, ex immodica uidelicet repletionē & tensione: imò quantum amplitudo ipsius uesicæ expleta circumtenditur, tanto angustior seipso fit meatus. Urinā igitur ob inflammationem suppressam uenæ sectione curabimus, fomentis item ac cataplasma

his alijsq̃ remedijs adhibitis, quæ iam sæpe ad inflammata sunt prædicta, & in sequentibus describentur. Si uero sanguinis eruptio præcesserit, coniectare oportet sanguinis grumos suppressæ urinæ causam esse: hi itaque dissoluendi sunt eo modo, qui de eruptione sanguinis ex uelica dicitur, quod si lapis sit qui urinā supprimat, & hunc ex loco excutere ac dimouere oportet, quemadmodum de calculosis est prædictum. Si uero crassi humores in causa sint, fomentis & infussionibus ac cataplasmatibus cura concredenda est: ab his uero quæ urinam cient in totum abstinendum, ueluti in loco de difficultate emittendi urinā in febribus est relatum. Quibus uero citra inflammationē & eruptionem sanguinis, aut aliam quandam ex prædictis causam, urinæ excretio supprimitur, propter ægrum uelicæ sensum contigit id scilicet, quapropter irritando submovere, ac excitare eius actionē oportet, & per infellus auxiliari, nitroq̃ ad meatum admoto, aut nitrī spuma, aut cimicibus cōtritīs. Quod si ita non procedat, ad catheterum usum confugiendum, perq̃ hoc ipsum instrumentū immissum urinā prolectandæ. Vrinam ducentia nequaquā bibant, ne multitudinē eius uelica distendatur. In sanis autem, quum ut dictum est ob negotiorum importunitatem lotium diutius retentum uelicam debilem reddat, auxiliari oportet ipsi, ambabus manibus supra inum uentrem admotis, ac urina lentē expressa. Ad urinam ægrē prodeuntē. Cucurbitæ semen præmundatū aqua mace rato, quum uero emollitum fuerit, sufficienter aqua affusa terito, percolato, ac succum bibendum præbeto. Vtere, experimento constat.

De scabiosa uelica.

Cap. XXXII

Quibus uelica scabit, his pruritus tum imi uentris, tum pectinis succedit, inq̃ urinis asperæ & fursuracæ subsidentia deferuntur: progrediente uero morbo, uelica exulceratur, accessionesq̃ ad ulcera præscripta inducuntur. Nōsse igitur opere prætium est quod non penitus curabile sit malum, conandum tamen ut pro uiribus leniatur. A mordacibus igitur & quæ humores aciores ac falliores reddunt abstinendū. Exhibenda autem uina dulcia & lac & gallinæ aut hœdorum aut agnellorum carniū iuscula, palmarumq̃ cremor, similago item & amyllum, ac sorbitiones ex his apparatus, pisces molles carne & omnes coctos: & ex oleribus quæcunq̃ urinam quidem subducunt, nihil uero mordax in se habent, uelut est pastinaca probè cocta, crithma, fœniculum, apium, hipposelinum, asparagus, cucumis, & quæcunq̃ eius generis existunt: nam & urinam agentibus mitioribus tamen, uelicam subpurgare oportet: periculum enim est ne fortioribus exulceretur, quod omnino peius extat. Vrinam itaque commodē cient cancri, & pinæ conchæ, & herinacei marini recentes, & herinacei terrestres caro exiccata & drachmæ pondere potu accepta. Neq̃ minus cōmodæ cicadæ censendæ, & uermes terreni tres ex passo potati. Non inueniens item fœni græci succum cum melle sorbere: id ipsum enim & infestini morsus obtundit, & si ad uelicam procedat scabiem eius mitigat. idem etiam tragacanthus facit, iucundus est item baccarum myrti cremor cum uino potatus, aut mali cotonei cremor, aut cuiuscunq̃ alterius adstringētis fructus. Hæc autem adstringentia, inquam, pruritus quidem mitigant, affectionem uero nō sanant. Dieta porro optimi succi sit, & per aliquot dies uomant. Sero autem lactis aluus subducatur. Mediocribus etiam exercitijs moderatē utantur. Aliud, quod cōfestim auxiliatur. Serpillū cum cicere satis diu coquito, percolatumq̃ decoctū bibendū præbeto. Oribasij, ad ægrē meientes. Amomi, cardamomi, floris iunci odorati, cuiusq̃ dra. vi, costi, castorij, myrrhæ, cuiusq̃

Ff 4 drach.

drach. iiii. cassiae drach. i. mellis quantum satis est, datur fabae Aegyptiae magnitudine cum uino temperatum. Aliud eiusdem. Petroselinii, baccarum myrti nigrarum, singulorum drach. xvi. seminis apij drachm. xx. xxi. ammiij drach. vii. nardi celtici drach. iiii. myrrhae drach. ii. mellis quantum sufficit, datur drach. i. ex aqua mulsâ, aut uino diluto cyathorum iiii. mensura.

Simplicia remedia ad suppressam ac aegrè prodeuntem urinam, si aut eius multitudo aut crassities in causa sit. Cap. xxxiii

Vrinam difficulter prodeuntem & suppressam, uiscera herinacei terrestres sanant exiccata ac sufflata aëro undiquaq; probè contesto. Oportet autem ipsa sale condire ac exicare. Quin & in potu accepta sicca trita quantum tribus digitis apprehendi potest ex uino multas urinas cient: carnis item herinacei in sole exiccati drach. i. ex uino datur, & urinam multam citra molestiam educit.

Aliud. Aselli qui & millepedae sub aquario stabulantes uase, egregiè difficultatem emittendi urinam soluunt, si duo aut tres in modico garo coquantur, ipsumq; garum cum aqua cyathis duobus bibatur. Aliud. Vermes terrestres tres aut quinque tritos ex uino mulso aut aqua mulsâ præbeto: citò enim urinam ducunt. Forinsecus autem artemisiae folia cum myrrha trita pectini illini, itemq; imo uentri, & lotium prodibit. Aliud. Perdicium herbam terito, & affuso oleo feruifacito, atq; ita uesicæ imponito. Eandē item herbam cum oleo coquito, ipsaq; proiecta lanā oleo imbuito ac imponito. Aut peponis pulcherrimi pelliculam cum modica ipsius carne imo uentri imponito & colligato, & prodibit urina. Si uero arida sit pellicula, ipsam in aqua macerato, & imponito, ac colligato. Infessus etiam eis ex famfuci maxime decocto apparentur, aut si id non adsit, ex decocto rutæ artemisiae & altheae.

De dissoluta per paralyfim uesica.

Cap. xxxiiii

Ex his qui paralyfi exolutam uesicam habent, alij quidem præter uoluntatem urinam emittunt, & quanto plus id eis contingit, eo minus periculo sunt obnoxij: alij autem lotium non excernunt, sed eo suppresso uesica & lumbi eis distenduntur similiterq; pectus: femora autē tumefacta habent, & quum non eiiciant lotium subiecta membra mortificantur, neq; ita longè post moriuntur. Quum igitur lædi contigerit nervos qui ex spinali medulla ad musculum uesicæ collum claudentē deferuntur, exoluto musculo, inuoluntaria urinæ excretio contingit. Si uero proprij uesicæ nerui fuerint affecti: nerui aut musculi qui, ceruicē uesicę cōplectuntur uires suas conseruantes in actione sua ualidi sunt, urina ipsa cohibetur. Cæterum quum cuidam ob casum spina in anteriore partem esset luxata, & inflammatio successisset, tertia die urinæ suppressio ei accessit: curauimus autem ipsum, inquit Galenus, ueluti contra inflammationem renitentes. Alius autem quum cecidisset, uertebri retro inuersis & luxatis, præter uoluntatem urina ab eo prodijt, citra tamen uesicę dolorem, ex quo coniecturam fecimus neruum esse læsum musculi eius qui uesicā claudit, & propterea medelam spinali medullæ adhibuimus, affectis inquam, uertebri. His igitur quibus citra casum urina supprimitur, hoc modo auxiliari oportet. Infessus assidui in fœni graci, seminis lini, altheae, rutæ, ac artemisiae decoctū cum oleo eis apparentur, & loci ex oleo calido rutaceo, aut scyonio, aut gleucino saepe per diem & noctem, & maxime post infessus irrigentur & perfundantur: curbitæ etiam locis affigendæ, & cataplasmata imponenda ex cruda ordeacea farina, ex uinoq; dulci & uino mulso. In aluum autem per clysterem infundatur centaureæ, & radicis cucumeris agrestis decoctum, addito oleo rutaceo & mel-

& melle. Post sublutam uero aluum oleum rutaceum sicyonio ammixto infundendum, adiecto aliquando etiam modico castorio. Vnguenta item & medicamenta illitu lassos nervos reficientia, acopa Græci uocant, & supra resolutio nes sunt descripta, tum spinæ, tum imo uentri adhibenda. Castoriū itemq̃ the riace in potu propinanda. Modicus autem eis conuenit potus & uomitus qui pituitam educunt. Post euacuationes sinapismi, tum pectini, tum lumbis com modi sunt. A quibus cerata quæ partes mitigent, & malagmata odora impo nantur. Porro urinæ suppressionem quæ ob sauciata spinam, aut calum, aut uertebræ luxationem, aut ob lethales accessionum concursus, suborta est, im possibile est curare, quare cautè remedia adhibere oportet. Ceterū eos qui præ ter uoluntatem urinam emittunt curare conuenit roborando per mordacia ca taplasinata, & malagmata, & per rubefacientia ex sinapi apparata, & arenæ a sole feruescente iniectione, aquisq̃ naturalibus, primum quidem calidis, postea etiam frigidis & maxime sulphurentis & bituminosis. Exercendæ etiam ac perfricandæ partes, ueluti in loco de resolutione est prædictum. Vrinā autem ducentia nequaquam exhibeantur. Dieta uero calidior & siccior sit, nisi acro res ac mordaciores appareant urinæ.

Ad eos qui se in somno permungunt.

Cap. xxv

Affectio hæc pueris maxime contingit: ad eam Archigenes hæc descripsit. Pulmo hodi moderatè assatus, & circa panem largè ad triduum in cibo accepius, eos qui lectos commingunt corrigit. Aliud. Leporis cerebellum sic cum potatum ex uino lectos permungentes sanat. Aliud. Testiculum leporis siccum in uinum radito, & bibendum dato. Quidam autem leporis cerebrum in uesicam porcina coniectum & assatum, unā cum uesica eden dum prebent. Etenim ipsa porcina uesica per se usta, & in potu exhibita, iuuat. Simili modo & ouilla uesica facit: cinerē itaq̃ eius ex posca præbeto. Aliud. Adipem anserinum drachmæ pondere, cum coagulo leporino oboli pondere, & cum polenta subigito, & reclinatis in lectū præbeto. Aliud. Linguae anse rinæ coctæ per triduum exhibitæ affectionē sanant. Quidam assatas præbent. Aliud item Archigenis. Myrrhæ, calaminthæ, cuiusque obolum i. terito, & cum uino odoro ante cœnā bibenda præbeto. Aliud eiusdem. Rapha nidem marinam contusam urito, eiusq̃ cinerem totum bibendum præbeto. Aliud. Ruta præsertim syluestris semen torrefactum duarum drachma rum pondere bibendum præbe. Aliud. Castoriū drach. i. in potu præbe. Quod si acrores & mordaciores sint urinæ, lactucæ seminis drachm. i. bibe ndam dato. Aliud. Galli guttur ustum ac tritum cum aqua tepida ieiunis bibendum porrige. Aliud. Gnaphaliū aut anthyllin herbas quibus pro tomento & strato usus est ager, easq̃ perminxit, siccato, urito, & cum potu exhi bero. Cæterum in somno pudendum illinant ex cimolia cum perdicij succo. Circumligent etiam femora infra inguina, quatuor digitorum distantia, atq̃ hoc per uiticis uirgas. Porro ubi sitierint, omnino amplius dormiant: multus enim potus affectioni incōmodus existit. Atqui si diuturnum & inueteratū sit malum, uelut eos qui præter uoluntatem ob resolutionē uesicæ urinam emit tunt curato. Differunt autem hi ab illis, in eo quod his per somnum saltem hæc accessio cōtingit: illi uero quibus ob musculi colli uesicæ resolutionem hoc ac cidit, etiam dum uigilant eodem modo afficiuntur.

De inflammatione uesicæ: Rusi.

Cap. xxvi

Morborum qui circa uesicam oboriuntur grauissimus & maxime mortalis inflam.

inflammatio existit. Consequuntur autem ægros cōmunia inflammationis signa. Febri acuta infestantur, & uigilant, & delirantes aliena loquuntur, & uomunt biliosa pura, & lotium eijcere non possunt: durus fit pecten & pubes cum uehementi dolore, & egerendi appetentiæ uelut in teneſmo fieri solent: quod uero egeritur tenuē est, & subsidentiam non habet. aliquando & inflationes sequuntur, & aluus adstricta est, intestino recto ab inflammatione uesicæ compresso. His itaq; si nihil aliud prohibeat ueniam citra cunctationem in principio morbi secato, & paucō cibo adseruato, & aque potu, locos uero oleo in quo anethum, semen lini, aliquādo etiam ruta & althea incocta sint irrigato. In decoctum item seminis lini & fœni græci insidere facito, odorato aliquo semine, ueluti petroselino, dauco, aniso, simul incocto. Admoneaturq; æger quo in aqua decocti desidens mingat: uesica enim non satis robusta est ad amplectendam & expellendam urinam, igitur ipsum ægrum aut aliquem ex adstantibus scite ac placide pectinem premere oportet, neq; id ultra modum ne dolor inde intendatur. Est autem inuentum hoc Philumeni, qui hominem hoc modo a se tractatum urinam eiecisse testatur. Ceterū primum omnium aluus leni infuso subluatur, & post stercoreum educationem, oleum quo supra ad irrigationem usus es, in intestinum solatij & leniendi doloris gratia iniiciatur. Præstat autem & papaueris calicem simul cum oleo incoquere, & adipem anserinum aut gallinaceum recentem in ipso oleo eliquatum simul infundere. Ego uero, inquit Rufus, uehementioribus existentibus doloribus opium magnitudine erui cum modica myrrha & croco lanæ illitum, in podicem indidi, & statim dolores quieuerunt, confestimq; æger obdormiit. Post clysterem & infusa, infususq; & irrigationes, etiam cataplasmatibus utendum ex cruda ordeacea farina, capitibus papaueris, & hyoscyami folijs, ac modico mandragoræ succo adiectis. Fomenta autem fiant per aquam & oleum in uescicis bubulis semiplenis admota, aut polenta calidam in sacculis aut detritæ uestis panniculis ligato, & pro foru admoueto. Post cataplasmata, etiam cerata imponantur, ex celypo, & cera, & sicyonio aut gleucino oleo cū castorio apparata. Quod si neq; licet tumultus cesset, cucurbitam affigemus locis unā cum scarificatione. Ceterū ubi euidentis declinatio apparuerit, ad emplastra & malagmata transeundū est. Porro catheteris immiſsionem ad inflamatā uescicam in uiro quidem nō probo: etenim quum laboriose immitti quæat, dolores exacuit, & inflammationē auget. uerum mulieri ipsum adhibere nihil absurdum: breuis enim in ipsis uirinæ meatus existit, & recta situs, ut citra dolorem hoc molimen admitant. Si uero urinæ suppressæ periculum urgeat, necessariō ad catheteris usum confugimus, non quod affectionis molestiam tollat, sed ut urgentem urinæ suppressionem corrigit, & a præcipiti periculo liberet. Post urinæ profectionem rursum ad eadem mitigatiua auxilia accedendū, usquequo inflammatio soluat, aut suppuretur. Solet autem sæpe repente inflammatio solui, erysipelate iuxta cutis superficiem oborto, & permanente, neq; rursus intrō recurrente: imō & lotio multo eiecto, sæpe id eadem iudicatione liberum hominem reliquit. nihilo minus tamen etiā si hæc appareant, iisdem remedijs insistere oportet, quandoquidem ut plurimū tensione aliqua facta ac oborta, continuæ exacerbationes fiunt, & mali constitutio diuturna. At uero ubi periculosa accessiones cessarint, & morbi cōstitutio iam fuerit inueterata, ad unguenta quæ humores ex profundo euocant ac transferunt, metasyncritica Græci appellant, & ad mala-

De san-

De sanguinis ex uelica eruptione, & de grumis eiusdem.

Cap. XXVII

Est & alius acutus uelicae morbus: rumpitur autem uena in ipsa, & partim quidem sanguinem foras mittit, partim uero intus condensatur. Sanguine autem condensato, & grumis coactis, æger animo linquitur & pallefcit, pulsusque paruos, obscuros, & densos habet, mœrore angitur, refrigeratur, ac uiribus destituitur. quum uero grumus aliquando in urinarum meatum inciderit, is etiã lotij excretionem supprimit, uerum omnino difficilioris curę censenda est erupcio ex erosione facta. Quare quã celerrimè uelut etiã in alijs sanguinis erupcionibus auxilium ferre oportet, extremas partes constringendo, & peclinë ex spongijs posca imbutis irrigando. Quod si inflammationē suspectã habes, lanas succidas uino & rosaceo madidas imponito. Caterum ob prædictũ periculum, compendiariã curam facere conuenit, & nequaquam rem differre: & siquidem nihil prohibeat, uenã secare partita sanguinis detractiõne, ut eo modo saepe & paulatim sanguis detractus reuellat: ægri uero in decumbendo sursum uersus collocentur, & cox endicibus ipsorum leuandis & simul refrigerandis spongiæ posca imbutæ subdantur, aut pelles substernantur: summè aut pro sunt urgente malo cucurbitulæ illijs ac lumbis affixæ. Post irrigationes autem cataplasmatibus utendũ sanguinaria, rubo, plantagine, perdicio, mali punici floribus, lentisci & myrti folijs: horum unumquodque cum polenta flore pro cataplasmate imponendũ est, & frequenter priusquã tepescat, altero imposito, auferendũ. Optimè etiã faciunt ex palmis, acacia & hypocisthide ac alumine apparata cataplasmata, & quæ his similia existunt, Summè autè cinis linteoli usti auxiliatur, si palmis ammisceatur, aut alicui ex epithematis infarciatur. Spongia item pice liquida imbuta, usta & epithematis ammixta mirificè sanguinis eruptiones sistit. Caterum detrita uestis panniculus ustus, et spongia usta, non solum forinsecus locis apposita, sed & cum plantaginis, aut sanguinariæ, aut herbæ sideritidis succo uelicae infusa, maximopere auxiliantur. Oportet autem infusi fistulam aliã catheteri similem esse, uerũ ex summo utriculũ aut uelicam adaptatam habere. Quandoque & sedi hæc infusa profunt. In seßus autem conueniunt ex consimili materia constructi: nam & posca & lentisci decoctum, itemque rubi & similitum eis conuenit. Danda autem & in potu pharmaca educationi sanguinis apta tum simplicia, tum cõposita, ueluti sunt rheon ponticum tenuissimè tritũ, & loti arboris scobes & ramenta, præsertim corticis eiusdem, & glycyssides aut præonia grana rubra XII, terra samia, & lemnia, sphragis appellata, hippuris, centaureæ magnæ radix, thuris cortex, & similia. Optimum uero & hoc est, quo Archigenes usus est. Ad sanguinem mingentes: Archigenis. Aluminis scissilis drac. I, gummi obolum I, tragacanthæ dra. II, in passo diluito, & in pastillos redigito, & ex eis obol. II, cũ passo præbeto. Ad sanguinis è uelica eruptionē: Asclepiadæ. Balauftij, acaciæ, succi hypocisthidis, cuiusque dra. III, aluminis scissi dra. II, in pastillos cum aqua digerito, & obolos III, cũ uini myrtitæ cyathis III, exhibeto. Porro quibus sanguis in uelica in grumos cogitur, primũ tentandum est ut pharmacis diffundatur, artemisia igitur in potu præbenda est, & elichrysum, & cyrenaicus succus, aut laser purum, aut conyza præsertim parua, absinthiũ, raphani semẽ, rubi succus, betæ succus, leporis coagulũ, aut hœdi, unumquodque cum aceto mulso. Ego aut, inquit Galenus, pharmacum eis præbui bibendum quod lapidẽ confringit ex aceto mulso: imò ipsum per se acutum mulsum exhibui, & quibusdã ipsorum grumi dissoluti

soluti paulatim per lotium prodierunt. Quod si hoc modo nihil proficias, sed urina supprimatur, necessitatem inducet catheteris adhibendi, per quem ubi urinas eduxerimus, rursus prædicta in potu exhibemus præstantia ad grumorum coactorum dissolutionem, si uero neque sic grumi dissoluantur, inter capedinem inter anum & pudendum perinaeon Græcis dictam inferne dissicare oportet, quemadmodum in calculosa uesica est prædictum, & eductis grumis de cætero uelut ad sanguinis eruptionem uesicæ opitulabimur, ubi uero sanguinis eruptio cessarit, uelut alia ulcera curato. At uero sanguinis ex cole eruptiones, epithemata colæ refrigerantia, & quoddam ex prædictis infusum sanant.

Quæ tubercula in uesica maturescere oporteat. Cap. xxviii

Optimum quidem est in principio conari quo tubercula dissoluantur, ut ne in pus permulentur; si uero id citò fieri non possit, auxiliorum usu ea maturare facere oportet, quæ supra renibus cataplasmatibus modo dixi imponenda, atque amplius adhuc nasturtio cum erui farina & melle, & columbino stercore cum caricis imposito. Fomentis autem & alijs remedijs utendum quemadmodum isthic est prædictum. Vt plurimum uero circa uesicæ collum suppurantur, quapropter etiam urinae stillicidium amplius inducunt, suppurantur & in uicinis sedibus, & magis recrementi egestionem impediunt. Suppurantur etiam circa peritænem utrinque; uerum non difficile est ea coniectare, tum loci dolore, tum grauitate, atque ipso adeo tactu: duriora enim & calidiora sunt corpora quæ suppurationem incurrunt. Ex tuberculis etiam quædam foras uertuntur ad sedem, quædam quocumque contigerit defluxus. Periculosa igitur & hæc sunt ac omnino lethalia, periculosiora autem sunt quæ intus rumpuntur.

De uesicæ ulceribus: Ruffi.

Cap. xxxix

Si uesica sit exulcerata, aut propter abscessum, aut ob tuberculum quod præcessit aut ex ruptura, aut ob fluxionis erosionem, aut ob aliam quamcumque causam: ægros dolor acutus uesicæ omni quidem tempore comitatur, maxime uero tempore mictionis & excretionis puris, & si quidem sordida fuerint ulcera, feculenta simul excernuntur, & mucosa, & quæ crassam subsidentia ad modum farinae habent: aliquando autem & pelliculæ tenuis ad modum foliorum & lammarum cum urina excernuntur. Si uero serpendo depascant ulcera, subcrenta excernuntur & saniosa ac foetentia. Ad hæc accedunt urinae emittendæ difficultas, & pudendi arrectio ac petulantia, & dolor non solum quum urinae meatus fuerit affectus, sed & quum tale quippiam in profundo existit. Cognoscetur autem num in profundo, siue iuxta urinae meatum sit affectio, ex eo quod si in amplitudine sua uesica sit affecta, dolor circa pubem consequatur: Si uero iuxta collum uesicæ ulcera consistant, tempore mictionis tantum & maxime ubi mingere inceperint ac cessauerint, dolor sentitur, atque id amplius contingit si urinae sint acriores. Omnes quidem igitur assidue decumbunt, & neque erecti stare possunt, neque reclinati quiescunt, ab indefinente dolore, febribus, uigilijs, & colliuatione perimuntur: alij quidem citius, alij tardius. Dolores enim acuti sunt & ulcera iniucunda, partim quod urina assidue ea contingat, partim quod urina natura acris existat, neque quamuis plurima excernatur, uis uesica euacuari possit: sed semper ex urina quippiam in ipsa relinquitur, quod continuè ulcera contingit: semperque uesica lotio plena existit, etenim quum multitudo eius euacuatur uesica contrahitur, & quod in ea relictum est quantum uis modicum, id ipsum omnes eius partes contingit, & quantum rursus repletur, paulatim simul extenditur. Propter hoc ipsum itaque, & quod neruosa est infana-

infanabilia ut plurimum eius ulcera existunt: periculosiora autem sunt quæ ex
 erosione orta sunt, & modica spes est ea restaurandi. Attamen quum sæpe etiã
 præter expectationem quædam eueniant, cura est aggredienda, per quam si
 nihil aliud, certe accessorij dolores minuentur. Primum igitur persuadendus est
 æger ut decumbat, & in lecto quietem toleret, idq; maximè si febres simul ad-
 sint: deinde remedia febribus intermittentibus adhibenda, maximum uero hic
 fuerit lactis potus, neq; scio an post ullum aliud remedium secundo saltem loco
 id sit habendum: nam & asperitates lenit, & ulcerationes eluit, aliasq; affectio-
 nem extergit: reliqua uero diætæ frugi sit & cõmoda, ut ne urina acris fiens, mor-
 deat ac irritet ulcera. Per pharmaca etiam cõsolari ægrum oportet, quæ super-
 nè pectinem amplectantur, & siquidem cum inflammatione exulceratio con-
 sistat, cataplasmata ex lini semine & fœno græco apta erunt, & reliqua quæ in-
 flammationē soluere possunt: infussiones item & fomenta ex oleo & per spon-
 gias. quin & cerata imponenda ex ælypo, butyro, adipe anserino, & styrace
 apparatus, & ceratum myrteum, quod pro cerusa, samiam terram, aut lemniam,
 sphragidem appellatam, aut minium sinopicum, aut diphryges habet ammi-
 xum. Quod si loci uiolentius coarctentur, nardinum quidem sit ceratum. mal-
 uæ autem radices probè in aqua mulsâ coctæ, deinde tritæ, in ceratum infar-
 ciantur, aut cerata ex meliloto & fœno græco similiter adhibeantur, aut quod
 tetrapharmacum, itemq; quod enneapharmacum inscribitur, laxationem enim
 mali faciunt, uerum his omnibus aliquid satis amplum de styrace addendum.
 Porro si exulceratio pascendo serpat, epithematis subadstringentibus utendum
 est, atq; his quidem calidis, ut ob calorem quidem partes circumdolitantes le-
 niendo iuuent, ob potestatem autem ipsorum nomen uicinos locos appre-
 hendere prohibeant. Sylua horum sæpe iam relata est, utpote in palmis, uuis
 passis, gallis, malicorio, alumine, acacia, hypocisthide, & similibus sita. ex his
 singula aut palmis excipiuntur, aut cataplasmatibus ex loliacea farina. decoctio
 autem fit in posca. Utendum etiam pharmaci per catheterē infusione, ita ut in
 inflammatis & exasperatis lac recens mulctum infundatur, aut rosaceum opti-
 mum recens tepefactum. Si uero nihil horum adsit, aqua dulcissima tepida as-
 siduè infundenda, mordacitatis tempore instante: in intestinum quoq; per se-
 dem prorsus succus infundendus est, & seminis lini succus, & cucumeris semē
 decorticatū tritum cum lacte, rosaceo oleo ad singula instillato. Cæterū ubi
 dysterem adhibere uelis ei qui uesicam habeat affectam, non supinum ipsum
 decumbere oportet: non enim permittunt uesicæ infusum intrā transire, utpo-
 te indurata & graues factæ, & intestino incumbentes, uerum in genua pronū
 reclinare hominem oportet, atq; ita infusum adhibere. In hac enim situs figura
 uesicæ secedunt & intestinum laxant, quo infusum assumere possit. Frequen-
 ter autem & in aquam calidam desideant ægri, & in decoctiones relaxantes:
 nam hæc mitigant dolores. At uero ubi ulcera iam pascendo proserpant, per
 catheterem iniicienda sunt quæ depastionem sistere possunt. Multa autem eius
 generis sunt, sed plurimis itemq; nobis familiare est, ex charta siccum pharma-
 cum, quod cum rosaceo infundere oportet. Facit & Musæ pastillus, cum passo
 cretico tepidus infusus. Quod si uero sordida sint ulcera, pharmaca infunden-
 da sunt, quæ repurgandi uim habent: uelut est Epigoni chlora, siue uiridis com-
 positior: item quæ lsis appellatur, multo rosaceo diluta, aut ea quæ ex herbis con-
 stat, aut huiusmodi quæpiam alia. Si uero acrimonia consequatur & mordaci-
 tas, lac recens mulctum cum optimo amylo infundatur, aut pompholyx pluri-

G g bus

bus aquis elota & exsiccata, atque deinde cum lacte diluta, aut collyrium Afer inscriptum, aut quod Cynariū appellatur: aut pastillus ex physalide, aut pan- chrestus, a comoditate dictus, qui somnum inducit. Quum uero repurgata fue- rint ulcera, adiuuare oportet quo ad cicatricem perducantur, atq; id per infes- sus adstringentes & eiusdem facultatis epithemata. Emplastrum igitur ex ouis commodē superponitur, & ex hordeo uiso, & ex cadmia, tripla eorum parte cum cerato myrteo, aut rosaceo contemperata. Si uero magis fluxione affe- ctio infestetur, post repurgationem ulcerum, emplastro ex salicibus, aut celsi, aut ex lolio utendum est, donec in totum ad cicatricē perducantur. Atqui noli- le operæ precium est quod in quibusdam ob solidam cicatricem inductam, se- minis meatus excacantur, & uis generandi perditur: ita ut appetentiam qui- dem habeant ad coeundum, nihil autem in totum seminis emittant, atque hæc affectio penitus incurabilis existit. Cæterum si ad multum tempus exulceratio duret, quemadmodū in plerisq; fieri consuevit, tunc sanè & exacerbationibus interualla siue remissiones ægros apprehendunt, quare in exacerbationibus quidem cataplasinata, & fomenta & irrigamenta leniendi uim habentia adhi- beantur. remissionis uero tempore ductu ad destruendum malum apto uten- dum est. Pecten igitur iuxta membranæ peritonæi appellatæ, locum per ma- lagnatum ad hanc rem destinatum impositionem rubefiat: sunt autem hu- ius facultatis, id quod ex lauri baccis constat, & epithema uiride appellatum, & similia, maxime uero quæ ad calculosos renes sunt præscripta, quin & sin- pisino utendum, & diæta uiribus reparandis apta est constituenda. Quod si non mansuescant, & diutius durent affectionis dispositiones, crustas circa pe- ritoem & peritonæum membranam infligere oportet, aut per pharmaca, aut per ferrum, sinereq; ut per multum tempus ulcera se per effluxionem repur- gent. Neque uero inepitæ pharmaca dolorem leuantia in potu exhibueris, si uehementes insint dolores. Et sanè quidam iam papaueris succum erui ma- gnitudine cum croco & myrrha lacte dissolutis in podicem indiderunt, aut ce- rato ex adipe anserino apparatus permixtum & lana exceptum eodem modo intruserunt, scimusq; eos non uulgarem commoditatem inde consequutos. Assumantur etiam quæ per os exhibentur, siquidem urgeat urinæ emittendæ difficultas: ueluti est papaueris albi tosti semen, quod drachmæ pondere tritum in tres cyathos decocti floris iunci odorati, aut calami indici, aut radicis dulcis inspergitur & exhibetur: his fortiora sunt meon, phu, acorum, daucus. Pluri- mum autem exulcerationis dolorem mitigat hoc. semē cucumeris granorum triginta, nuces pineas duodecim, amygdalas amaras decorticas quinque, cro- ci quantum ad colorandum satis est, quotidie ieiunus accipiat cum lacte rectis mulcto, aut passo protopo, aut uino, aut sapa, quod si lenius reddere uelis, pro nucibus pineis maluæ semen parī modo recte conieceris. minore item mole- stia ab ægro procedet urina, si tragacanthus prædictis commisceatur. Probi- autem exulcerationē iuuant uerbenacæ rectæ folia cum passo potata, in duo- bus cyathis dissoluta, quo facili potu accipi possint. Ad urinæ difficultatem quidem & ad ipsam exulcerationē pariter conueniunt, papaueris albi semen, amyllum, myrti baccae nigrae, singulorum drachmæ quatuor, croci oui assati dimidium: unito & drach. i. ex passo dato. Quod si multum pus efferatur, seru- læ uisæ drach. i. ex passo diluto exhibita, ipsum repurgat. Deinde autem singu- lis diebus cucumeris semē decortatum, & crocum, obolorum ii. pondere, & nuces pineas pityidas appellatas desquamatas v. & anisi obolos iii. simul tri- ta cum

ta cum uino mulso ex calida aqua temperato, exhibeto. Cyphi item & cyphoides ad hepatis ulcerationes prescripta, in paucis adeo diebus uesicæ ulcera persanare possunt. Ego autem, inquit Archigenes, ad uetera ulcera hoc usus sum, neque opus fuit mihi pharmaco magis uariiegato. Trixaginis, chamapityos, cuiusque drach. xxi. asari drach. vii, piperis albi drach. vii, cinamomi drach. i. quam tenuissimè terito, & unita simul reponito. Ego, inquit, ex eo cochlearia ii, cum passo diluto præbeo. Quum uero morsus contingit ulcerosus, amyli cochlearijs duobus, & seminis cucumeris granis xv. adiectis, quod uolui sum assequutus. Suffecerint quidem igitur uolentibus bona methodo remedijs uti, hæc à Rufo & Archigene prescripta pharmaca. Apponā tamē & alia cōsimilia itidem à ueteribus tradita. Sint autem prescripta eorum quæ describentur quod ad usum pertinet exempla. Andromachi, ad ulcera renum & uesicæ. Seminis lini, seminis papaueris albi, seminis cucumeris repurgati, tragacanthi, singulorū drach. ii, amyli drach. iiii, cum aqua cōterito, & in pastillos nucis ponticæ magnitudine redigito: ex eisq; drach. i. cum passo diluto dato. Asclepiades autem & Eras hoc modo apparant ad assiduos morsus, & sanguinis ex uesica eruptiones. Seminis lini torrefacti, seminis cucumeris repurgati, seminis papaueris albi, tragacanthi, cuiusq; drach. vi, passi quantum satis est, apparato, & ponticæ nucis magnitudine cum passi diluti cyathis ii. præbeo. Ad sanguinis eruptiones, cum aqua dato. Oribasij, ad uesicæ ulcera. Profunt & his quidē quæ ad renes affectos sunt descripta, propriè autem in potu accepta, portulacæ succus cum passo, graminis decoctū, lac, uinum dulce, cupressi coma cum myrrha, erui magnitudine. Ad uesicæ dolores. Seminis lini cochlearium i, ex passo, sesamum, seminis hormini drach. i, oxyschoeni semen, loti arboris bacca, seminis papaueris drach. i, cum aqua mulsa, floris cotoneorum decoctum. Eiusdem, ad renum & uesicæ exulcerationem. Nucum pinearū heminā italicam, physalidas numero x, nuces iuglandes octo, alijs x. habent, croci drachmas viii, seminis rumicis drach. viii, opij drach. iiii, seminis cucumeris decorticati drach. iiii, seminis apij drach. iiii, mellis cocti quantum satis est. Datur obolorum iiii. pondere. Aliud, Andromachi, ad uesicam exulceratam & urinæ emittendæ difficultatem. Nuces pineas xxx, amygdalas præmundatas uistas viii, carnes palmarum xxxv, tragacanthi drachmas quatuor, succi radicis dulcis drach. i, croci obolum i, myrrhæ tantundem. Excipe passo, ac utere ut dictum est. Aliud, ad uesicæ ulcera & inflammationes. Nuces pineas xx, seminis cucumeris grana xx, amyli obolos iiii, spicē nardi drach. i, seminis apij drach. ii. Spica & apiū in sextario aquæ uno coquantur, deinde ad decoctū prædicta miscentur, dantur cyathi ii, ad uehementes morsus calefacti. Aliud. Amyli drac. viii, baccarū myrti nigrarum maturarū carunculæ drac. viii, seminis papaueris drach. xvi, passi protropi quātum satis est, apparato, & nucis ponticæ magnitudine ex passo dato. Pastillus ex physalidibus, ut tradit Eras, ualet ad renum & uesicæ affectiones, etiam si pus aut sanguis, aut corpuscula mucosa, aut fibris similia, aut crassa, per urinam exant. Facit & ad scabiosas affectiones, & stillicidium urinæ, & ulcerationes ægrè cicatricem recipientes; idem & bibitur & in uesicam iniicitur. Granorū herbæ physalidis numero xxv. sunt autem halicacabo similia, paulo tamen maiora; amygdalarum thasiarum decorticatarum, croci, nucum pinearum totarum, seminis rumicis hortensis desquamati, singulorum drach. iiii, seminis cicuta, opij, seminis foeniculi cuiusq; drac. iiii, seminis hyoscyami albi, seminis

Gg 2 apij,

apij, cuiusq; drach. vi. seminis cucumeris satiui desquamati drach. xii. Excipe passō, & dra. i. præbe febre carentibus, cum passi diluti cyathis iii. febricitantibus cum aqua. Cæterum si uehementes fuerint dolores etiam ante somnū præbe. Per catheterem item iniice. Vtere autem ut efficacissimo. Quidā etiam nucis ponticæ tostæ drac. iii. addunt. Aliud, ad omnem renum & uesicæ exulcerationem, omnemq; emittendi urinā difficultatē, & calculi affectionē. Porculacā exuccato, succumq; resiccato, & in pastillos redigito, drachmamq; i. cum aqua calida potandam præbeto. Pastillus ex tragematis siue bellarijs, ad renum & uesicæ exulcerationes. Vuarum passarum albarum mundatarum bessem, nucum pinearum sextantem, seminis cucumeris decorticati, baccarū myrti exacinarū, amygdalarum amararum delibratarū, aut dulcium, amyli, palmarū pinguium, seminis apij, singulorum sextantem, seminis papaueris albi drach. iiii. tragacanthi, croci, radicis dulcis, cuiusq; drach. iiii. myrrhæ dra. ii. Redige in pastillos cum cretico passō. Exhibe drach. i. cum passi cyathis ii.

Aliud, experimento constans, Olympij sophistæ, ad exulceratam uescicam. Rheipontici dra. iiii. seminis cucumeris decorticati drach. iii. seminis hyoscyami drach. ii. seminis maluæ drach. v. nucum pinearum tostiarum drac. vi. seminis apij dra. i. amygdalas amaras delibratas lxx. cum sapa subige, & ponticæ nucis magnitudine præbe, cum passi diluti cyathis tribus. Asclepiadæ pharmacum accommodatum, ex cuius usu multos renum affectione apprehensos in totum liberatos scimus. Oportet autem ad multos dies pharmaco huiusmodi. Sanat etiam uesicæ affectiones: datur & calculosis, remediū est & colicis. Habet autem hoc modo. Nucum ponticarū repurgatarum, amygdalarū amararum mundatarum, seminis cucumeris depurati, seminis caroi, ling. drach. ii. seminis papaueris albi, aut si non adsit, cicutæ drach. vi. croci, seminis maluæ, opij, cuiusq; drach. vi. seminis hyoscyami albi dra. xii. seminis apij dra. xii. excipe melle cocto & informa pastillos, datoq; obolos iii. cum aqua mulle cyathis tribus. Aliud, ad exulcerationes renum & uesicæ. Damafonij drachmas duas, palmarum drach. x. nucum pinearum drach. vii. seminis cucumeris drach. iiii. anisi drach. ii. amygdalarū amararum drachmas ii. croci drachmam unam, dato obolos vii. ieiunis cum passō diluto. Quod si damafonius non adsit, eryngium conieci. Vtere etiam Xenophili antidoto ad calculos capite xiii. præscripta, & similibus quæ ad exulceratam uescicam itemq; renos ualent, unā cum hoc quod arenulæ minguntur.

Diata ex libris Archigenis.

Cap. xxx

Vitet æger omnem delassationē, & longiorē ac effluentem gestationem, maximē uero quæ sit in equo, uigilijsq; & omnem uehementem concitationem, & econuerso perpetuum ocium, & balneorum assiduitatem: amplius autem & cruditates, & supra quā conuenit repletiones, & ne quid crudum in cibo accipiat, & neq; quod ægrē concoquitur, aut faciliē corrumpit, aut inflatio nes parit, sumat: maximē tamen uitet quæ faciliē acescunt, & quæ crassi humoris sunt, quæ urinā cient, quæ ægrē secernuntur, quæ difficulter infernē excernuntur, & quæ amplius uentrem perturbant. item omnia acria & feruentia, & quæ accepta amplius adstringunt, & magis resiccant, & non nutriunt, & quæ stomacho inimica sunt, & quæcunq; bilem aut pituitā præcipuē gignere possunt, quæ re & multus potus, & meracior potus, ac ieiunus potus, omnes incommodi exiunt, & uice uersa longa sitis, & inedia, & eduliorū uarietates, & superflua condimenta, omne item nidorosum & graueolens & putridū & crudū præfertim olus

olus incōmodum. Hęc enim omnia tum renū tum uescicā ulceribus inimica sunt, atqui si quando appetitui gratificari uelimus, lactuce cauliculos, aut serin, cruda & cocta minore offensione sumere possunt. A placentis uero & alijs pin- guibus abstinere oportet, & a plerisque bellarijs. Vua passa enim non incōmoda est, & nuces pineæ recentes duabus aquis maceratae, & amygdalæ uirides qui- deti, maturæ tamen & probè mundatæ, siccæ uero non uetustæ, sed præmace- ratæ & decorticatæ, licet & pistaciū sumere, melius quidem uiride, aut si id non adsit, madafactū, minime uero uetustū. Thebaica autem palma caryotus qui os non habet, siue id a natura, siue arte ei cōtingit, acerbior est, & stomachi & renū & uescicæ debilitati conuenit. Cæterum genera quidem reliquorū tandem de- scribantur: speciatim autem panis sit recens clibanites decenter apparatus. Ex uolucris montanæ & tenerā carnem habentes & non antiquæ. Ex pedestri- bus cōuenientiores sunt hœdorū extremitates. Ex aquatilibus ad renū & ue- sicæ ulcera magis congruunt, apua marina minima assidue comesta, non in- pi sunt etiā a fellis parui, & qui gobij appellantur: extergunt item ulcera gamma- rus, locusta, & aliquantulū etiā squilla, cancer aut fluuialis uelut remediū præ- beatur, & herinacius recens familiariter permittatur: ex conchis uero & pelo- ridibus parum quiddā uarietatis gratia detur. Pro liquamine aut intinctus ac uoluptatis gratia acetū modicum, & quā minimū gari albi & boni conceden- dum. Parce autem utendum est pipere & laseris succo, nasturtioq; & sinapi, ab- eruca uero in totum abstinendū, nam & uenerē excitat: coitus aut omnibus re- nū & uescicæ affectionibus insensibilissimus est, & maxime senibus ac natura im- becillioribus. Omnia porro quæ in cibo sumunt, mediocris multitudinis sint, etiam si utilia esse ferantur. Aqua pluuia non corrupta omnino melior est: ex alijs uero quæ nullam omnino gustanti qualitatem exhibet, exquiratur. A frigi- da potu in totum abstinendū: frigidum enim ulceribus inimicum. Balinei ue- ro rarus sit usus: quo uero aliquando appetentiæ gratificemur, & lassitudinem refoueamus, permittatur. Cæterum naturales aquas experiri non inutile fue- rit: aluminosas uidelicet, sulphurulentas, & consimiles, quales sunt albulæ, & lactei temperamenti atq; teporis. Frigida etiam lauare ac irritare commodissi- mum est: supra naturam enim ulcerationes ægrè sanabiles, tum externas tum internas destruit. De albularum aquarum potu. Conferent itaq; aquæ albulæ si adsint, & consimiles post matutinam deambulationē, trium hemina- rum mensura prima die potatæ, deinde usq; ad quinq; & sex heminas perue- niendum. Ad hoc enim quod intestinum eluunt, aer etiam ipsarum fuligino- sis uescicam ad doloris sensum percipiendum hebetat, & humoribus segrega- tis puriorem ac lucidiorem sanguinis uaporem reddit. quin & ipsæ aquæ ul- cera utiliter repurgant, & cum uoluptate infra subeunt, atq; adeo nihil ægro sa- nando efficacius deprehendere possis: hora autem calidior ad eas accipiendas apta est. Quod si non adsit huiusmodi aquarum qualitas, adsint autem aliæ nul- lam gustui qualitatem exhibentes, sed late se ad gustum diffundentes, hæ ipsæ reliquis meliores sunt censende, & proximo ab eis loco bituminosæ. Nitrosa- rum etiam si adsint & salsarum experimentum sumere prodest: maiorē enim quā credi potest sepe ex his succedentē uidi effectum. Intercapedine autem & distantia a balneo facta, aridarum rerum comestio primum utilis est, nisi si- tis simul adsit: tunc enim aqua calida modica sitis extinguenda est, aut aliquo uino dulciore. Adsit autem & œnanthites & myrtes uinum: nam ea post bal- nea & exercitia utiliter ad ulcera delabuntur.

De uesicæ fluxione, & his quæ capillorum forma exeunt cum uina. Archigenis. Cap. xxxxi

Fit aliquando & fluxio circa uesicam, ut aliquando quidem mucosa, & folijs ac lamis similia, itemq; crassa excernantur, & aut crebro, aut post temporis moram lotia reddantur: aliquando autem aquosa & tenuia. Nouimus autem quosdam etiã pilos per lotium eiecisse, modo inuicem perplexos, modo simplices, & aliquando ualde longos, aliquando breues, atque eos omnes à fluxione productos. Hæc sanè Archigenes. Galenus autem de hoc ita inquit: Capillis similia etiã Hippocrates cum urina prodijisse uidit, & nos sanè uidimus quandoque palmi longitudine, quandoque etiã longiora aut breuiora: ex colore autem & compage persuasus sum, ex crasso & uiscoso humore calefacto & resiccato in uenis eos coactos esse: quare quum primum uidissem, per urinam scientia pharmaca medelam futuram speraui, atque ita ferè omnibus contigit. Cæterum quibus hæc affectio accidit, nulla renalis mali accessione, neq; antea neque postea sunt uexati, postquam uidelicet per urinam ducentia pharmaca sunt curati. Archigenes autè ad hæc, inquit, fluxiones ex locis remouere oportet, uniuersiq; corporis habitũ, maximè uero circa renes & uesicam locos uendicare atque corroborare.

De priapismo & satyriasi: Galeni.

Cap. xxxii

Priapismus, tentigo est membri pudendi, & auctio in longum & spissum citra rei ueneris appetentiã, ex caliditate quadam acquisita cum inflammatione quadam & dolore locorum cõsistens. Appellatione autem accepit priapismus à Priapo uidelicet Satyro: tale enim à natura habentem pudendũ homines fingunt & pingunt. Fit autem affectio aut ob dilatata uenarum ac arteriarum in pudendo ora, aut flatu uaporofo iuxta antrosum neruum, ipsum inquam pudendum, oborto. Mihi autem, inquit Galenus, propter utrumque fieri uidetur, sapius tamen ad dilatata uenarum ora consequi. Aliquando autem propter abstinentiam à rebus ueneris: quidam hac affectione apprehenduntur, atque hoc ipsum eis qui multo semine abundant, simulq; præter consuetudinem se abstinere, euenit, quum non per frequens & multum exercitium sanguinis abundantiam discusserint, maximè uero hoc illis contingit qui rebus quidem ueneris opus habent, in imaginationem autem ipsarum peruenire possunt per uisiones quæ ipsos in rerum ueneriarum recordationem impellere possunt. Cæterum dolores eis contingunt, quales tetanici habent, & hi qui reliquis membris distenduntur: inflatum enim & distentum pudendum conuulsionis modo afficitur, & ex præcipiti hoc modo affecti pereunt, nisi confestim eis auxilium feratur, quum uero moriuntur uentre inflantur, & frigidum exudant, id quod & eis euenit qui alijs conuulsionis modis perimuntur. Propter dolores igitur & inflammationes uenam secare statim à principio conuenit ab affectione prehenso, & in inedia adseruare usque ad dies tres, irrigareq; pettinem & coxendices unã cum pudendo ex lanis succidis uino & oleo imbutis: siti item premere, & aluum obrutam euacuare non acri nimium clysteri, ne inflammationes exacerbentur. Cibum autem exhibere frumentaceũ patiens cum atque omnino nihil inflantẽ, & in aqua potu continere. Quod si diutius duret affectio etiã cucurbita cum scarificatione affigenda sunt: & si amplius sanguinis multitudo adiacere uideatur, hirudines adhibendẽ in ipsum locum: cataplasmata uero imponenda sunt ex cruda ordeacea farina. Optimum etiã fuerit aluum submolliẽ per betæ & maluæ decoctum paucis mercurialis succo admi-

admixto. Concharū item decoctum in potu exhibendū: ab efficacioribus autem purgantibus pharmacis in totum abstinendū. Cauenda etiam quæ urinæ ciendæ facultatem habent. Utendum autem cibus frumentacei generis qui leniter attenuare ualent, citra manifestam calefactionē. Lumbis uero quæ euidenter refrigerant imponenda, uelut est solanum, portulaca, hyoscyamus, & semperuium. Necessariō etiam coles & intercapedo inter anum & pudendū ex aliquo leniter refrigerante illinitur, uelut est argenti spuma, cimolia, & cerusa, si aceto, aut posca, aut aqua sint diluta. Optimè autem facit in ipsis ceratum ex rosaceo optimo apparatus, & frigida aqua sæpe elutum, si tum pudendis, tum lumbis imponatur. Porro in latus decumbere ipsos ex re est, & substernere ea quæ ad seminis profluium dicuntur: in potu amplius præbere quæ ad illos describuntur. A spectaculis uero & narrationibus, ac cōmemoratione eorum quæ ad uenerem excitare queant, penitus sunt arcendi.

De seminis profluuiō: Gale-

ni.

Cap. XXXIII

Profluuium seminis excretio est eius præter uoluntatem, citra pudendi tēiginem. Nomen autem habet ex eo quod inuitis profluit semē. Fit autem affectio ipsa ob retentiūæ in uasis seminarijs facultatis imbecillitatem. Quemadmodum enim in his qui secundum naturam integris uiribus præstant, ea quæ in nutrimentum cedunt retinentur, & excrementa excernuntur: sic in his qui præter naturam habent, recrementa aliquando ob expulsiūæ facultatis infirmitatem retinentur, & ob retentiūæ debilitatem excernuntur, aut etiam ob aliquam aliam affectionē, quæ seminariorum uasorum partes eodem modo quo expulsiua secundum naturā facultas mouet: ueluti in comitialibus, & alijs uolentioribus conuulsionibus contingit, aliquando etiā in his qui ex conuulsionem moriuntur, ut uidelicet semen eis excernatur. Profluuiū igitur seminis uasorum seminariorum affectio est, non pudendi, quæ dolorem quidem non ita ualde inferre solet, molestiam autem nō uulgarem & pollutionem exhibet ob assiduum & inuitis cōtingentem seminis fluxum. Oboritur autem aliquando etiam ex seminariorum uasorum fluxione: quandoq; etiam satyriasi præcedente profluuium seminis succedit, contingit autem affectio maxime pubertatem transgressis citra decimum quartum annum, imō alijs item ætatibus. Est autem semen quod profluit aquosum, tenue, citra appetentiam coeundi, & ut plurimum quidē citra sensum, quandoq; uero cum uoluptate quadam promanans. Corruptitur affectis sensim uniuersum corpus ac gracilescit præsertim circa lumbos. Consequitur & debilitas multa non ob multitudinem seminis profluentis, sed ob locorum proprietatem. Non solum autem uiris, sed & mulierculis hoc accidit, & in foeminis sanè ægrè tollitur. Cæterum cura communis est cum ea quæ in omni fluxione adhibetur. Primum igitur in quiete, & pauco cibo, ac aquæ potu affectos adseruare oportet: deinde etiam lumbos & pubem tegere lanis uino & rosaceo, aut œnanthino, aut melino madefactis, neque uero ineptæ sunt spongiæ posca imbutæ. Sequentibus uero diebus cataplasmatis ex palmis, malis, acaciā, hypocisthide, œnanthē, rhoē rubro, & similibus, infessibus item adstringentibus utendum est, ex lentis, rubi, myrti, & similibus in uino austero siue mero siue diluto decocto. Cibus autem utendum qui ægrè corrumpuntur, & difficulter permutantur, & resiccandi uim habent. Dandum etiā cum potu ac cibus uiticis ac cannabis semen præsertim tostum, turæ item semen ac folia, lactucæ semen, & cauliculi, ac nymphae radix. In

Gg 4 potu

potu uero quotidie pro communi aqua, aqua in qua ferrum saepe extinctum est praebeatur. Quidam uero corticem radicis haliacabi ex aqua eis bibendum praeauerunt, neque ineptum fuerit huius aliquando periculum facere. Antidotus etiam haec magnae celebritatis, tum ad hoc modo semen profundentes, tum ad assidua in somnis profluvia, commodè exhibetur. Seminis falicis drach. vii. calaminthae drach. vi. seminis uiticis albae drach. v. rutae drach. iiii. seminis cicutae drach. ii. cum aqua in pastillos digerito, & ex eis ad ponticæ nucis magnitudinem cum poscæ cyathis tribus praebeo. Omnem uero acrium rerum esum, & multi uini potum, & olerum exhibitionem uitare oportet: diæ tam uero uniuersam resicatoriam & adstringentem constituere. Post prima autem mox tempora ad unctiones & exercitricem diætam transeundum, per quam totum corpus & praesertim affecta ad sanitatem perducantur, & plurimo quidem tempore circa unctiones immorandum: paucies uero lauandis, si aut lassitudini aut cruditati mederi uelimus. Bonum fuerit etiam, si nihil prohibuerit, ad frigidae lauationem defugere, quæ omnem morbum ex fluxione obortum depellere consuevit, maxime si medicamentaria qualitate aqua praedita sit, uelut sunt in albulis aquæ, quæ etiam in potu acceptæ eis summe profunt. sunt autem sapore subfalso, & tactu lactei teporis. Conuenit item per interualla quædam, illitionibus & epithematis & malagmatis uti, quæ rubefacere & emollire possint, atq; ea quæ in profundo hærent ad superficiem transferre. Decubitus porro frequenter in latus fiat, calaminthæ folijs, & rutæ ac uiticis substratis. Epithema autem in eis usu uenit hocce: Capillum ueneris multum, contundito & terito cum aceto, aut apij succo, aut seridis, aut psyllij, coq; cochlearum carnes coctas excipito, et simul in linteolum infarta coxendicibus imponito. Utendum uero & praescripto ad priapismum cerato, & his quæ paulo mox ad seminis in somno profluvia dicentur. Omnem autem de rebus ueneris cogitationem excludere oportet.

De seminis in somnis profluuio, Philagrii.

Cap. xxxiiii

Semen in somnis profundere dicuntur, quicumq; dum dormiunt naturæ genitalis semen emittunt: quod ipsum eis ut plurimum ob uitiatum humoris materiam, aut materiam multitudinē, aut ob partium seminalium robur contingit. Iam uero quidam & ob animi incontinentiam, aut in ediam, per somnos præter consuetudinem semen excreuerunt: atq; id materiam acrimonia irritati, non ob partium seminalium robur pertulerunt. Huiusmodi sanè qui uidelicet animo incontinentes, aut in ediam diutius pertulerunt, in totum ferè nulla imaginatione præcedente, citra sensum etiam, in somnis profluit semen. Reliquis autem non solum cum pudendi intentione, sed etiam cum quadam proposito imaginatione, quæ in somnis occurrit, inordinatè semen profunditur. Cæterum pessimus corporis habitus hic est, quum semen multum & calidum aliqui generant, quod eos ad excretionem urget, atq; postquam per coitum eiecerint, exolutione oris uentris patiuntur, & toto corpore exoluuntur, debilesq; fiunt & sicci, & tenues, & pallidi, oculos etiā cauos habent hoc modo affecti. Quod si à coitu uenero abstinereant propterea quod ita afficiantur, capite discruciantur itemq; stomacho, & æstu fastidioq; anguntur, nihilq; magnopere ex continentia iuuantur: contingit enim eis per somnum semen profundentibus cōsimilia perpeti offendicula qualia coeundo perpessi fuissent. Quidam uero ipsorum mordax, & calidum semen percipiunt in excernendo, ueluti ipsi confitentur. His igitur, inquit Galeenus, consulere oportet, quòd à cibis semen gignentibus abstineant: accipiant autem semen

tem non solum cibos, sed & pharmanas quæ semen extinguunt: ueluti est uiticis semen tostum & perfrictum: folia item & flores uenerem cohibere creduntur, non comesta tantum, sed & in potu sumpta & substrata. Lentium uero decoctum etiam membri tentionem remittere ac sedare aiunt. Portulaca comesta, & lactuce semen potatum, & nymphae radix & semen in cibo accepta, semen refrigerando extinguunt: Ruta uero comesta calore suo semen coagulat & corrumpit. Calaminthem autem assidue edentes generandi potentia priuari dicuntur, id quod similiter & uiolæ albæ semen, & hederæ cacumina nigra tria faciunt. Ceterum aqua fabrorum ferrariorum in qua ferrum sepe extinctum est, assidue potata, citra molestiam imminuit semen. Horum autem omnium sylua uarieta in secundo huius tractationis præscripta est Sermone. Compolitius porro ad ipsos uitor, tum his quæ ad seminis profluium sunt præscripta, tum hoc ipso, Ammij grana vi. fœniculi tantundem, foliorum rutæ parum quiddam cum caricis pinguibus tribus, per mensem semel edito, aut quotiescumque uelis. Atqui assiduum eorum quæ uchementer refrigerant usum, tum in his quæ per os exhibentur, tum in eis quæ forinsecus apponunt, uitare oportet: ueluti sunt ea quæ ex papauere & mandragora apparantur unguenta. Allitiones autem à balneo adhibeantur ex mediocriter refrigerantibus. Sunt autem hæc: oleum ex crudis oliuis expressum quod omphacinum appellatur: rosaceum maximè quod ex omphacino est apparatus, & melinum. Componenda autem sunt aliquando unguenta compage crassiora, ne uidelicet facile defluant. Compositio uero ipsorum est ex cera, & succo aliquo adstringente aut refrigerante commixtis, hoc modo. Cerae partem unam cum quadruplici oleo liquefacito, deinde in mortario cum manibus sufficienter emollito, & paulatim ex succo refrigerante quantum expedit instillato, unito, ac uitito. Succus uero ad hanc rem apti sunt, succus semperuiui, solani, umbilici ueneris, psyllij & sanguinarie, tribuli, perdicij, nymphae & portulacæ: uerum hæc succum non emittit, nisi ad eam contusam in pila, aliquis alius tenuis succus affundatur, uuae præsertim immaturæ, & rosarum, qui sanè in æstate facile parabiles sunt. Alij uero multi etiam alijs temporibus haberi possunt, ueluti lactucæ, seridis, stratiotæ, & lentium quæ in aquis nascuntur: semen lini etiam in aqua coctum, succum moderate refrigerantem reddit: rhamni item foliorum succus, & quæ his similes existunt. Optimum etiam censetur laminam plumbeam lumbis supponere, tum eorum qui in somno, tum qui aliàs semen profundunt: multum enim refrigerare consuevit. In his uero qui plumbi duritiem ferre non possunt, consulere oportet, ut ex prædictis herbis quædam arefactæ substernantur, quibus etiam uiticis folia & modica ruta ac calaminthe commisceantur, maximè uero ipsæ rosæ. Prosumt enim hæc citra renum læsionem. Vchementes namque refrigerationes eorum quæ lumbis subduntur, renes iniuria afficiunt. Ipsum etiam stratum pellicetum sit & non ualde molle. Decubitus porro ut plurimum in latus fiat, uitata forma decubitus supina, ne lumborum arteriæ inde supercalhant. Atque hæc quidem cõmunis est omnium quibus semen in somnis profluit cura. Ceterum eos qui prædictum uitiosum corporis habitum & constitutionem habent, de illis dico, quibus ex coitus usu stomachus iniuria afficitur: illos, inquam, obseruare oportet quando maximè seminis multitudo, quæ excretionem expetat, congregata appareat: & tunc sanè in die quadam moderato ac boni succi cibo usi, à cœna quæ ad somnum uertuntur, coitu utantur: sequenti uero die quæ sufficienter dormierint, & à somno surrexerint, linteolo corpus perfricent, donec

donec cutis quendam attrahat ruborem; deindeq; olei confricatione, & intritu moderatè utantur, & aliquantulo temporis spacio interiecto, panem bene fermentatum, clibanitem, purum, modicum ex uino diluto accipiant, atq; hoc modo ad consueta munia obeunda perueniant. Eo uero tempore quod inter olei intritum & panis exhibitione intercedit, si locus adsit in uicinia aptus, in eo paulisper deambulet; si uero hyemis tempus instet, melius fuerit tamdiu intrus deambulare. Abstineant autem à spectaculis & lectionibus quæ ueneræ rei usum in memoriâ reuocare possunt. Et quotidie sanè hoc modo affectu exerceantur his exercitiorum generibus, quæ per supernas partes fiunt. At uero corroboracione stomachi ex esu panis cõmunem designamus in omni homine, cui bilis effluens, & qui stomachũ exolutum habet. Quare & hi circa horam tertiam diei modicum panem ex uino cum calida aqua diluto madefactũ accipiant, atq; ita ad consueta operas prodeant.

De his qui re uenerea uti non possunt.

Cap. xxxv

Qui re uenerea uti cupiunt, ignaua autem & impotentia membra habent, infernas corporis partes exerceant, inguinãq; & femora his confricent, piper uidelicet, nitro, & euphorbio cum oleo, unguentisq; ex huiusmodi rerũ amixtione apparatis: exempla autem cõponendi paulo post dicemus. Dormiant in mollibus lectis, legantq; quæ ad coitũ cohortantur, lectionibus item ac spectaculis eiusmodi assideant. Cæterum edulia & pharmaca ipsis cõueniunt calefacientia & inflantia, ueluti sunt, cicer, fabæ, halica, porri, bulbi, pastinacæ radix & semen moderatè, nuces pineæ, ari radix cocta, colocasij radix cocta, itemq; dracunculi, urtica semen, rapi semen, erucæ tum folia tum semen, maximè agrestis, costus & piper cum uino mulso, satyrium, sesamum, hominum, amygdalæ moderatè, anisum, polypodes & coricharum genera omnia: perdicis item oua ad coitum excitant, & testiculus galli. Seminis uero multitudinem augent omnia bono succo prædita: testes uulpis licci triti cochlearij mensura potati innocuam & minimè uanam membri tentiginem faciunt: partes etiam renes scinci amplectentes ad tentiginem pudendorum excitandam bibuntur. Orchis, herba est quæ testiculi appellatione habet, eius maior bulbus cum late potatus tentiginem ciat: minor uero cum aqua potatus, tentiginem remittit. Compositum tentiginem ciens, & faciens ad læguorem membrorum, ac resolutionem. Sinapis, radicis panacis, seminis erucæ cuiusq; dra. viii. seminis cardamomi dra. iiii. piperis grana xx. redigito in pastillos cum erucæ succo, & dato drach. i. ieiunis cum uino ueteri adstringente. Aliud. Seminis hederae nigræ, floris chamæmeli, seminis oxychoeni, cuiusq; drachm. iiii. seminis erucæ, piperis albi, sinapis, cuiusq; drach. i. pyretri drachm. iiii. excipe melle, & ad strigmentorum spissitudinem redige, præbe à balneo nucis ponticæ magnitudine. Aliud. Pudendum cerui aridum urito, & drachmam unam cum uino meraciore præbe. Experimento constat. Aliud, quo & ego utor. Seminis hormini, sesami, piperis, seminis erucæ, sinapis, nucum pinearum, caudæ scinci, satyrii, floris iunci odorati, styracis, seminis porri, uuar passæ, singulorum æquales partes, mellis quantum satis est: præbe drachm. i. Aliud, quo etiam ipse utor. Salis communis torrefacti sesquiseptariũ Italicum, hoc est, uncias xxxvi. seminis hormini scrupulos duodecim, spicæ nardi unciam unam, salis scinci unciam i. caudæ scinci drachmas quatuor, ammij scrupulos duodecim, satyrii sextantem, piperis unciam unam, seminis cardamomi unciam unam, seminis fœniculi unciam unam, myrrhæ unciam i. seminis erucæ

erucæ drachmas sex, feminis uerbenacæ supinæ aridi drachmas tres, feminis sanguinaræ sicci drach. II. nucum pinearum unciam unam, physalidum drachmas IIII. feminis hyperici drach. IIII. contundito, cribrato, & ad uesperam cochlearium quomodocumq; uelis exhibeto. Aliud uehementer efficax.

Myrrhæ, piperis, spicæ nardi, tragacanthi, cuiusque drachmam I. thuris sels. quidrachmam, croci drachmam I. styracis, galbani, dauci, feminis hormini, cuiusque drach. II. canchryos, feminis fœniculi, feminis lini, feminis urticæ, sels. cumini Aethiopici, anisi, feminis erucæ, cuiusque drachmas VI. erui albitosti drach. VI. feminis apij drachmas III. selsami non loti drac. X. amygdalas amaras delibratas quindecim, amygdalas dulces triginta, nuces pineas centum, bulbos crudos magnos sex, mellis quantum sufficit, ut ad cerati crassitiem redigatur. præbe drachmam I. ante coenam, cum uino mulso maxime, aut uino austero. Facit ad tentiginem, & superabundantem rei ueneræ usum ciendum, in senibus præsertim & debilitatis. Facit & ad liberorum, procreationē.

Unguentum efficacissimum. Olei uetustissimi libram I. erucas in tithymallis repertas nonaginta sex: erucas in æstate dum in uigore est herba accipe, & in oleum coniectas ad solem per dies septem expone, & postea oleo utere: an & pudendi intercapedine, itemq; lumbis ex eo cōfricatis. Idem etiā pinus erucæ faciunt, & tentiginem uehementer ciens. Oribasij satyrica. Zingiberis, radices saryrij superioris, cuiusq; dra. VII. caudæ scinci, mei, asari, petroselin, cardamomi, selselis, cuiusque drach. IIII. feminis erucæ drac. III. cinamomi drach. III. hormini, piperis, feminis urticæ, cuiusq; drach. II. floris iunci odorati drac. I. spicæ nardi drach. I. sanguinis hircini sicci cochleariū plenum, datur drachma I. cum uino, imbecillioribus uero cum lacte. Oribasij, ad pudendū langorem ac resolutionem, præsertim senum. Seminis erucæ drachm. II. cumini unc. I. portulacæ un. I. excipe melle, & mane ac uesperis cochleariū præbe. Porro ad coitum concitat passer troglodytes appellatus, in cibo acceptus. Verum his, qui frequentius & supra quā conuenit inde coeunt, urinā capræ bibendam præbe. Oribasij, tentiginem ciens. Piperis, petroselin, nucum pinearum, scobis pudendi ceruini aridi, terebinthine, æquales omnium partes melle excipe, & cum uino bibendas præbe. Aliud, Oribasij. Stellionemustum quā tenuissimè conterito, deinde oleum affundito, atq; ex eo magnū dextri pedis digitum inungito, & coito: ubi uero à coitu cessare uelis digitum ipsum abluito. Aliud eiusdem. Leporis coagulū, aut leonis adipem pudendo illinito: deinde tria piperis genera cum tragacanthi succo testiculis intercapedini inter anum & pudendū, ac lumbis oblinito. Ex Rufi libris unguentum efficax tentiginem ciens. Myrrhæ drachmam unam, sulphuris uiui drachmam unam, cnici interioris drachmā unam, pyretri obolos duos, melanthij drach. I. I. piperis grana XXX. grana cnidia depurata uiginti, contundito, & cum drachma una succi scillæ terito, ceræq; uncia unā, cum olei cicini besse colliquato: mellis item quadrantē adijcito. Vtitor. Post coitum uero cum lin-teolo loci diligenter extrergantur. quidam uero hoc unguento sedem illinunt. Porro Rufus etiam hæc addit. Facile est, inquit, & hic remedium reperi-re, his: qui uehere uti non possunt. Adolescens enim quispiam nos accessit, & se uehementer coitum appetere confessus est, uerum ubi commisceretur semen emittēre non posse, sed flatus plurimos sibi per sedem erumpere. In hoc itaq; coniecturam feci, ualorum seminariorum siccitatem adesse: quod ipsum etiam adepta sanitas demonstrauit, nam postquā humida & boni succi dia-

ta est.

ta esset usus, semen emisit. Alius item adolescens domesticus minister, confessus est se, quando cum muliere rem haberet, semen effundere non posse: quum uero dormiret, plurimum ei semen prodire. Visum itaque mihi est, uasa eius seminaria propter multam unam cum frigidityte humiditatem, calferi non posse: propterea quod caliditas in coeundo ad corporis superficiem diffunderetur. In somnis uero amplius calefieret, propterea quod somni interna calefaciunt, & refrigerant exteriora. Quare hunc ipsum infernas partes exercere iussi, atque id maxime per equitationem. Castorium etiam bibendum prae-
bui, & dietam omnem calidam & siccam constitui.

VNDECIMI SERMONIS FINIS.

INDEX CAPITVM DVODECIMI AETII Sermonis.

| | | |
|--|----------|--|
| D E ischiadicis siue coxendicū dolore. | Cap. xx | De olei & salis affricu in podagricis. |
| De herba iberide, quae & cardamine appellatur, eiusque sinapismo. | Caput i | Cap. xxi |
| De ulatione. | Ca. ij | Vniuersalis methodus curationis podagricorum. |
| Cura affectionis exacerbata. | Cap. iij | Cap. xxij |
| Epithemata & malagmata ad ischiadicis. | Cap. iij | Cura eorum qui ex sanguinis copia agrotant. |
| De podagra & arthritide siue articulo rum morbo. | Cap. v | Cap. xxij |
| Causae uniuersales. | Cap. v | Quod eleuatas & incuruas uenas ex membris fluxione infestatis, uelut in uaricibus, auferre oporteat. |
| Quare in quibusdam magnus sit morbus, in alijs uero paruus. | Cap. vi | Cap. xxij |
| Quare multo tempore aut pauco morbus duret. | Cap. vii | De perustione in morbo articulari. |
| Quae sit incuruatorum articulorum causa. | Cap. vii | Cap. xxv |
| Quae causa generationis toforum in artubus. | Cap. vii | Cura in fluxibus sanguineis post sanguinem euacuatum. |
| Quae causa sit cur inflammationes in podagricis non facile suppurent. | Cap. ix | Cap. xxvi |
| Quomodo ex inflammationibus & consequentibus accessionibus, siue symptomatis, adfligens humor cognoscatur. | Cap. ix | Cura eorum qui neque uenae sectione, neque purgatione sustinere possunt. |
| Sanguinei humoris influentis signa. | Cap. x | Cap. xxvii |
| Cap. xiiij | Cap. x | De his qui ob bilis influxum agrotant. |
| Biliofi humoris signa. | Cap. xi | Parabilia remedia ad inflammationes non ualde feruentes. |
| Pituitose fluxionis signa. | Cap. xxi | Cap. xxix |
| Bilis atrae influentis signa. | Ca. xij | De stupefacientibus medicamentis. |
| Serofarum fluxionum signa. | C. xij | Vnguenta recalcatoria quae post fluxum pefactiuorum usum adhibent. |
| De his qui ex humorum complexu fluore infestantur. | C. xij | C. xxxi |
| Dietae & cura podagricos praeseruans. | Cap. xix | Pharmaca & edulia eorum qui flaue bilis influxu infestantur. |
| | | Cap. xxxij |
| | | Cura eorum qui ob pituitae influxum agrotant. |
| | | Cap. xxxij |
| | | Cura eorum qui ex atrae bilis influxu agrotant. |
| | | Cap. xxxiiij |
| | | De his qui ob tenuem & serofum influxum agrotant. |
| | | Cap. xxxv |
| | | De fluxionum inter se complexu. |
| | | C. xxxvi |
| | | Cura affectionum ex sanguinis & bilis complexu. |
| | | Cap. xxxvij |
| | | Cura |

| | |
|--|--|
| Cura bilis ad pituitam permixtę. Cap. xxxviii | Vnguenta & acopa diuerſa ad podagricos, articulorum dolores, iſchia- |
| Cura humorum atrę bilis alijs permixtorum. Cap. xxxix | dicos, membrīs exolutos, et trementes. Cap. xliiij |
| Cura durorum humorum qui poſt inflammationes relinquuntur. Cap. xl | Ad durities in artubus inſtar toſorum. Caput xlv |
| De tumorum crudorum & incoctilium cura. Cap. xli | De medicamentis purgatiuis articuli morbo accommodatis. Cap. xlii |
| Malagmata diuerſa, in quibus etiam Leucij malagma eſt, ad articulorum diſtortiones deſtinatum. Cap. xlii | Antidoti podagricę. Cap. xlii |
| Cerata podagrica Cap. xlii | Qui podagrici lauandi ſint, & quomodo. Cap. xlii |

AETII MEDICI GRAECI CONTRA

CTAE EX VETERIBVS MEDICINAE, TETRABIBLI,
ſiue Quaternionis Tertij ſermo quartus, & ex ordine Duodecimus.

De iſchiadicis ſiue coxendicum dolore, deq; podagra et articulari morbo, quem Gręci arthritidem appellant.

DE ISCHIADIS SIVE COXENDICVM DOLORE. CAP. I



Archigenis. Iſchiadici, hoc eſt ex coxendicum dolore affecti, proprie dicuntur quibus dolor circa iuncturam quandam uertebrarum innititur. Antecedit autem & quaſi auſpicatur hoc malum aliquando quidem uicinarum muſculorum dolor, & maxime lumborum; aliquando uero ab ipſa iunctura initium fit affectionis. Iam uero quādoq; etiam cōtingit ut uertebrę dolore ſerē ſublato, circa poplitem ſolum afflictio hæreat; alijs autem iuxta talum; quibuſdam uero totum crus æqualiter dolore affligitur, multis item circa inguinam dolor ſigitur, & tum ſanē uelica ipſa moleſtiam tranſſumens, urinae difficultatem inducit: & tunc maxime totum crus à coxendicibus uſq; ad calcaneum dolorem perfert, & non ſolum ſi ipſum crus moueatur conuulſiones inſert, uerum ſi etiam aliqua alia corporis pars agitetur. Generant autem hanc affectionem aſſiduę cruditates, et immodicus rei uenereę uſus: aliquando etiam deambulationes concitiores, & hæmorrhoides ſuppreſſę, & uomendi conſuetudo intermiſſa, & purgationes menſtrua, aut etiam alia familiares excretionē impedita, & exercitiarum contemptus. Cōmunis quidem igitur iſchia dicis, podagra, et articulari morbo exiſtit ualida alicuius humoris ubertas, quę affectum articulorum nexum occupat: quo impleto exporrecta neruoſa corporuſcula tenſione affliguntur, atq; ex his oboritur dolor. Cæterum ad affligentis humoris cognitionem conferet diæta quę præceſſit, & anni tempus, & aëris nos ambiētis ſtatus, ætaſq; et habitus, itemq; color corporis: amplius autem & doloris ſpecimen, ſiue feruens & pungens, ſiue ſtupidum. Initium igitur curationis fiat ab affligētis humoris euacuatione, & ſiquidem humoribus ex æquo redundarit corpus, præ omnibus uenę ſectio adſumatur: deinde etiam purgatio: poſtea uero ea quę dicuntur pharmaca oportune et ordinate adhibeantur: ita ut in manibus quidem et pedibus pharmaciſ fluxum repellentibus utamur,

Hh circa

circa coxendicum uero iuncturā id facere uitemus, quum enim hic cōnexus in alto situs sit, sanguis ex uicinis et ambiētibus uenis ac musculis ad ipsum impellitur: quare lenitiuis in principio opus est pharmacis ad coxendicū dolorē, atq; ea neq; omnino refrigerent, neq; fortiter calfaciant. Etenim quæ refrigerant, ad connexum materias impellunt: quæ uero uehementer calefaciūt, aliam amplius materiam ex adiacentibus partibus adtrahunt. A multitudine itaq; sanguinis coxendicum dolorem obortum uenæ sectio curat, si primum cubiti uenam secemus: deinde etiam eam quæ iuxta talos est, aut poplitem. In principio enim omnium inflammationum diuulsoriam uenę sectionem facere oportet, ueluti si pes sit inflammatus, ex uena è directo loci affecti sita sanguinē extrahemus. In affectionibus uero iam inueteratis, maxime quidem ex ipsis locis affectis extrahemus: aut si id fieri non possit, ex uicinis. Post sanguinis uero è cubito detractionem, à talo repetita sectione auferre oportet, secunda est aut interna uena iuxta talos sita: uiriliter enim imbecillis auxiliatur. Et scio, inquit Galenus, coxendicum dolores in una die curatos per hanc ex cruribus euacuationem, maxime si non à frigidityte sint oborti, sed ex uasorum sanguinis circa coxendicem repletionem. In omni equidem coxendicum affectione, præcipue tamen ea quæ humoribus ex equo redundantibus oboritur, si quis prius quam corpus euacuet, acris pharmacis ad affectam particulā utatur, agerrimè sanabilem affectionem reddit, utpote multitudine ibidē insolubiliter cōdensata: supra reliqua enim inspissatur & uiscosa redditur, & ob acrium pharmacorum caliditatē & siccitatem nō dissimile quippiam afflacioni perpetitur. Ab euacuatione igitur totius corporis, ut quæ maxima facultate ad huius affectionis curā præstet, curandi initiū faciemus: & non solum à cruribus, sed & à cubito primum sanguinem extrahemus. Sunt & uomitus ischiadicis cōmodi, atq; adhuc amplius quam per uentrem euacuationes, nimirum retrahentes humores infra repentes. Eos igitur in principio affectionis facere à cibo expedit. Inueterato uero malo etiam à pharmacorū uomitum scientiū acceptione, ita ut à mediocribus incipiamus. Porro quibus iam indissolubilis humorum coactio in ipso articulo à medicis per immodicum acrium pharmacorum usum facta est, his cucurbita quam maxima cum scarificatione locis affixa auxiliatur, & purgatio per infusa efficaciora. Qui igitur iam dicta præ oculis habuerint, etiā præscriptis à ueteribus medicis pharmacis iuxta methodū poterint uti. Itaq; post uenæ in cubito sectionē, & à talo item sanguinis detractionē, aut per purgatiū euacuationem, ubi uidelicet alius leniori clysteri iniecto excreuerit obturata, irrigare locos oportet, primum quidem ex oleo rutaceo, postea uero etiam efficacior irrigatio adhibenda quæ sensim calfacet, & materias ex alto ad superficiem attrahere possit, qualis est quæ ex cyprino, aceto, nitro, & canchry constat: ita ut octo quidem cyathi olei cyprini, quatuor uero acris aceti, duo aut nitri, et unus canchrys conijciantur, & donec ter aut quater efferueant coquātur: post uero expressus & in lanis succidis exceptus succus super affectos locos imponatur, uerum quotidie renouare hanc irrigationem oportet, et tribus uicibus hoc fotu admoto profectus animaduersionem habeto. Multos enim, inquit Archigenes, uidi qui nullo alio præsidio opus habuerunt, ego uero, inquit, post prædicta etiam simpliciore clysterē infundo, & sequenti die acriorem, atq; haud scio an ullus tam degener coxendicum dolor reperiatur, qui huic præsidio nō cedat: aut si aliquando ad primam adhibitionem nō cessit, post alterū eius usum penitus excisus est. Apparatur autem acrior clyster hoc modo, Mellis sesquicyathum

thum, olei tantūdem, aquae cyathos II. nitri drach. VIII. terebinthinæ drac. IIII. hæc unita & calefacta infundito, & podici fomentum apponito, quo diutius infusum contineatur, nam sic magis operatur, ut plurimum uero mucosam humiditatem extrahere consuevit, aliquando autem & sanguinem, quando etiam maior commoditas refultat. Quod si adhuc affectio ipsa persistat, paucis diebus interpositis, non tamen ut prioris præsidij utilitatē demoliamur, rursum clysteri utemur pro simplici aqua, cētaureę decocto ad prædicta affuso, quorobustius pharmacum reddatur. Supra opinionem autē iplis commodat cucumeris syluestris radix in tenues partes concisa, deinde paululum cocta, atq; decocto eius cum solo melle infuso, citra omnem mordacitatem euacuat assilgentem humorē. Optime etiam facit lupinorum amarorū decoctum cum pari oleo infusum. Sæpe enim, inquit Archigenes, hæc prædicta cura ad omnes ischiadicos mihi suffecit. Quod si tamen affectio adhuc remoretur, cucurbita quam maxima cum plurima flamma locis affigatur, uulnuscūlis etiam altioribus per scarificationem impatis. Cæterum & reliquam curam referre operæ pretium existimo, ut nota sit si quando usus eius necessario expetatur. In omni enim tempore plurima curationis principia constituenda, hoc enim modo facilius affectio destruetur, si assidue præsidiorum permutationes fiant. Itaq; ubi rursus mericoeperis, uomitib; uteris siue à cena, siue à raphani acceptance cōcitatis; deinde loci affecti & totū corpus in balneo per nitrū extergatur, post balneum autē loci ex unguento per adarcem & euphorbium compolito illinantur. Deinde rursus aliud medendi initium à purgatione facies. Solitus autem fui, inquit, purgatiuum ad ischiadicos assumere huiusmodi. Colocynthidas quotquot uelis accipito, & derafa ac proiecta medulla ipsas oleo optimo expleto, & totam noctē finito, deinde oleo per se effuso, cum uacuo colocynthidis calice aquam una et dimidia olei mēsurā commensurato, ac in ollam fundito, atque cum ea ipsa communi aqua colocynthidas ipsas donec flaccescant coquito: & expressas ipsas quidem abijcito, liquorē autem excolato, & affuso ad ipsum oleo seruefacito, ac panis siliginei contusi & cribrati quantū satis erit inspergito, manibusq; satis diu emollito, ac pilulas ad nucis ponticæ magnitudinem formato, ex eisq; XXIII. pilulas à balneo exhibeto. Si uero fortius reddere pharmacum uelis, ad hanc dosim ueratri nigri corticis tenuissime triti obolos tres, & scamonię scrupulum unum adijcito. Possum autem idem de hoc præsidio quod supra de clysteri dixi referre, quod uidelicet solum aliquando sufficit etiā eam quæ per multum tempus indurata est coxendicum affectionem extirpare, licet itaq; eo fape uti, multitudine tamen eius imminuta, & sanē moderatam eius multitudinem obseruauimus numerum XVIII. pilularum. Eis uero qui pilulas deuorare non possunt, colocynthidis cremorem exhibeto hoc modo. Colocynthidem quam maximam perforato, & eiecto semine, relicto autem eo quod instar tomenti inest in totum, colocynthidem ex uino dulci ueteri expleto, et per totam noctem finito, & cum defecto ex ea operculo cooperito. Mane uero excolatum per panniculum uinum, & tepefactum bibendum præbeto. Si uero parua fuerit colocynthis, duas pro una uino expleto & exhibeto. Quod si efficaciorē reddere uelis hunc cremorem, ueratri nigri obolos tres adijcito, & scamonię sesquiobolum. Cæterum per interualla quædam prædicto clysteri ex cucumeris uidelicet syluestris radice apparato, etiam ad ipsos utaris.

De herba iberide, quæ & cardamine appellatur, eiusq; sinapismo. Cap. II
Quod si uestigium quoddam affectionis relinquatur, herbæ iberidis quæ
Hh 2 & car-

& cardamine appellatur, radix assumenda est; etenim odorem & saporem ac figuram cardami, hoc est, nasturtij, habet. Multa autem ubique nascitur, maxime tamen circa uetera monumeta murosque & circa uias in incultis locis, folia autem habet nasturtij uere quidem uirentia, & nasturtio multo maiora: longitudo uero caulibus cubiti parui est aut paulo amplior; aestate flores lacteu promit, & tunc sane efficacissima censetur: semen fert quam minimum, atque id ipsum per totum caulem enascitur. Radix uero acerrimum habet odorem, & maxime omnium nasturtio similem. Hanc aestate maxime recentem effodito (arida enim uires amittit) & diligenter tundito: tunditur autem difficulter, & axungia ueteri modica excipito, ac iuncturæ coxæ & uniuerso cruri imposito, adalligato, ac incumbere sinito, mulieribus quidem non infra duas horas, uiris autem per quatuor horarum spacium, si possibile sit id perferre, excitat tumores cum ardore & rubore, ueluti sinapismus facere solet: post uero in balneum inducito, nullo ungento aut smegmate eis illito, ubi uero modicum exudauerint, in solium ob feruorem mordacius desidere iubeto, idque fortiter perferre cogito. morsum enim cum ardore in principio inferre consuevit: deinde de educito. Ferme enim semper, quamuis ab alijs fuerint importati, sua sponte pedibus ingredienti, exhibunt. Verum a balneo ad oleum multum paucum admodum uinum ammisceto, & conquassata illinito, ac humore cum aspero panis deterfo, crus ipsum cum leuissimis lanis cooperito. Et sane consuevit hoc ipsum praesidium nullo alio inde auxilio opus habere. quod si tamen aliquando uelutium affectionis relinquatur, uicenis horis siue diebus interpositis, rursus eodem praesidio utaris. Atque hic quidem sinapismi est modus. Caterum pharmacum ipsum plures quam sperare possis in se complectitur commoditates, & cum minori acrimonia eius usus perficitur. Hoc autem utendi modo etiam ad inueteratos capitis dolores, omnesque alios diuturnos dolores, quacunque tandem corporis parte constiterint: ad affectiones item ægre solubiles, & resolutiones persanandas uti licebit. Ceratum ad ischiadicis: Archigenis. Porro interiectis diebus quibus ab exhibitione remediorum quiescis, ceratum locis imponatur huiusmodi, Opopanacis drachm. viii, in aceti cyathis ii, dissoluito, deinde cera trientem, cum besse olei cyprini liquefacito, refrigeratoque ac leuigato, & ad dissolutum opopanaca conijcito, unito, ac utitor.

De uestione.

Veteres, inquit Archigenes, etiam uestione in ischiadicis usi sunt, tum per cauterios ferreos igni candefactos, tum per struthij & aristolochiæ radices coxæ iunctura in altum perusta, itemque crure per intervalla quædam, circa dolentes maxime locos cautere admoto. Quidam uero alij ad propinquæ cruri affectionis magni locum inter magnum digitum & indicem medium, circa infernum magni digiti siue pollicis articulum, caprinum stercus feruens per forcipem imponunt, stercoraque uariant ac permutant, donec sensus uestionis ad locum affectum transferatur: tunc enim sufficientem uestionem esse dicunt. Dioscorides autem hanc rem ita tradit. Caprinum, inquit, stercus feruefacito, & extenso magno manus digito, cauum locum circa inferni articuli eiusdem digiti finem notato: deinde locum ipsum ex oleo prælinito, & lana conuoluta oleo imbuta ad cauum locum substrata, sigillatim caprinum feruefactum imposito, quousque sensus per brachium ad affectam coxam procedat. Antylus autem: nos, inquit, etiam huiusmodi urendi modo utimur: stercus caprinum siccum feruefacimus, eoque uentrem magni digiti affecti pedis perurimus paulo infra ungulam usque ad os ipsum uestione penetrante. Hæc ipsa uestio extremas coxendicæ affectiones, & quæ nulli

Cap. iiii

alii præsidio cedunt, dissoluit. Cæterū post uersiones porri folia cum sale trita, aut oliuas nigras cum sesamo illoto tritas, aut nucum interiora trita, ad locū crusto sum imposito. Eis uero qui molles carnes habent, lac cum melle adhibeto. Tertia autē die ab uersione, lenticulam coctam cum melle donec cruste penitus exsiccent, cataplasmatibus modo imposito: atque deinde suppuratorio ductu utitor, ulceribus ad plures dies adseruatis, ne cicatrix eis obducatur. Nouimus, inquit Archigenes, plurimos qui ex prædictis uersionibus opem senserunt: uerum nobis, inquit, ad coxarum affectionis demolitionem prædicta remedia suffecerunt, itemque malagmata quæ paulo post dicentur: apposuius autem De uersione, ne uidelicet eius usus ignoraretur.

Cura affectionis exacerbatae.

Cap. IIII

Archigenis. Tempore porro exacerbationis reliquæ partes fascijs circumligandæ sunt, & diligenti fricatione contrectandæ: irrigationes item locos impinguentes, & per uices mutatae, ex oleo sicyonio calido adhibeantur, & cum lana conuoluta contegantur. Cataplasmata autem ex semine lini ac fœnigraci affectis partibus imponantur. Maxime uero quæ ex loliacea farina apparantur, ac quædam calefacientia assument, & altheæ radicem. Mitigant etiam uehementes dolores ex oleo fomenta, & ex milio frictio, itemque sale in sacculis calfacto. Potiones ad ischiadicos. Succus cyrenaicus exacerbationes diffundit, erui magnitudine potatus, aut deuoratus. Summe facit & castorij dra. i. cū opopanacis obolis tribus. Alia potio ad ischiadicos. Farinæ erui, anisi, fœniculi, singulorum parem mensuram conijcto, tundito & cribrato, obolosque nouē in dimidia uini hemina dato. Multa crassa per urinam ducit. Vbi uero purū prodire uideris lotium, ne ampliùs præbeto. Alia. Centauræ minoris ramulos contundito & cribrato, ac ieiunis cochlearium ex aqua calida ad horas tres aut plures dato. Alia. Radicem rubiæ contundito, & cribrato, similiterque præbeto, sanguinem per urinam educit, quotidie aut bibentem lauato. Auxiliatur item irionis semen cum uino, & smyrnij semen eodem modo. Seminis nasturtij dra. i. cum uino: radicis capparis corticis drac. i. cum uino: radicis iridis tritæ dra. i. cum passio: ruta syluestris, & domestica, cum anisi decocto: symphyton in petris nascens, cum uino mulso decoctum: radicis altheæ decoctum, aut centauræ minoris: ammoniaci thymiamatis dra. i. ex aqua multa: seminis hyperici dra. i. quod ipsum & stercora educit itemque pituita: Bacca iuniperi ex uino: Bitumen pro catapotio deuoratum: carpobalsamum ex aqua multa. Cæterum & potiones dolorem lenientes, itemque soporifera, ubi dolores resisterint, commode assumi possunt: maxime tamen omnium antidotus quæ præonia appellatur, in tertio decimo Sermones descripta. Ego autem, inquit Archigenes, etiā in exacerbationibus prædicto clysteri usus sum, eo uidelicet qui ex terebinthina & nitro constat, & euidentem permutationem feci. Poteris autem & cucumeris syluestris decocto in exacerbationibus uti. De reliqua diætâ: Archigenis. Subiungemus autem ex ordine & paucis reliquâ curam. Præ omnibus igitur adhortor ut cōtentiones, & exquisitæ negociorum incommoditates eis exhibeantur, non solum à cibo accepto, sed etiā sumendi cibi tempore, diætâ unctoria & impinguate constituta, quo similiter carnis incremento sit consultum. Nam si hanc ueluti neruorum operculum, acquisierint, tutum simul ad omnem externam causam inuentum habebimus, simulque commodam exercitationem omni unctoria diætâ potiorē apponemus. Vngantur autem ab expertis & gymnasijs exerceantur. Minime enim molesti labores sicut cum perito præexercitatore: et manus sanè exercitij tritæ

Hh 3 com-

commodiores sunt mollibus ad curationem. At uero significandum est etiam quod ischiadici ab assiduis flexibus & deambulationibus, & moderato cursu quam commodissime opem ferre possint. Praecedat itaque gestatio in equo, deinde naturalium aquarum usus, primum quidem calidarum, deinde etiam frigidarum, si enim ad frigidae lauationem adsuecant, sola suffecerit ad incolumitatem acquirendam. Caterum diata tempore quidem exacerbationis forbilis sit & modica, per intervalla uero solidior & reparandis uiribus magis accommodata, haec utrumque acrium eduliorum comestiones quasdam per aliquot dies adiunctas, horum autem sylvam saepe iam apposuius, utpote quae nihil uiscosum, aut crassum succi, aut aegre concoctile, aut quod difficulter digeritur, completur. Bonae uero concoctioni imprimis consulant, non solum damni quod ex cruditatibus provenit ratione habita, sed & incrementi carnis, quae praeter omnibus ischiadici opus habent. Quin & qualitates eorum quae aegre concoquuntur fugiendae sunt, praesertim eorum quae urinam ducunt. Alium autem probe soluta habere expedit: premuntur enim & aggrauantur articuli ubi ipsa sit adstricta. Neque uero assidue profluat uenter. Nam id imbecilles reddit, & quod cum purgationis imperio a toto corpore attractum est, id ipsum uicinas partes replet. Contingit tamen etiam aliquando a periculosa dysenteria oborta omnem coxarum molliciem ac aptitudinem ad affectionem corrigi & emendari. Praestat etiam uomitus per intervalla siue a cibo accepto, siue a raphanis. Neque latet nos quosdam ueratro ad ischiadicos usos esse. Scimus item ueratrum efficaciter auxiliari: Verum non suspicamur eius usu opus esse ad hanc affectionem, utpote quae ab antea tradita cura extirpabitur. Cataplasma ischiadicum. Farinam lupinorum amarorum in aceto mulso aut posca decoctam imposito. Aliud. Calaminthen praesertim uiridem, aut si haberi nequeat, cum posca locis imposito, est enim praesidium praecellens. Aliud, facit ad uehementes dolores. Papaueris calices in aqua mulsa decoquito, ipsisque proiectis farinam ordeaceam aquae mulsa incoquito ac imposito. Aliud. Calices papaueris uirides terito, & adpersa polenta farina, in pastillos redigito, eosque in umbra reliccato. Visu uero expetente in sufficienti aceto dissolutos ac calefactos imposito. Aliud Asclepiade, ischiadicis, podagricis, et articularum morbis euestigio auxiliatur. Fornum graecum in fictile uas coniectum & posca sufficienter affusa per integram noctem macerato: mane uero ad ignem appositum donec solutur coquito: deinde in mortario tritum, & sufficienti melle affuso calefactum, & linteolo exceptum ad affectos locos apponito, & fasciola adalligatum sinito, idque per dies duos aut tres facito. Aliud. Radicis symphyti sex uncem rasam & in tenues partes concisam in pilam testaceam conijcito & enixe terito, atque ubi contrita fuerit, manne quadrantem, & ouorum recentium crudorum candida tria una cum luteis adijcito, rursumque enixe terito, & contritis lib. i. adipis suilli ueteris probe subacti adidito, unito, ac linteolo excepta imposito. Euestigio dolores mitigat, & praesertim cum fluxione articularum obortos. Aliud Asclepiadae. Foenigraci mollis triti, corticis radicis mandragorae, mannae, cuiusque quadrantem, oua cruda recentia x. radicis maluae lib. i. radicis symphyti lib. i. carnis cochlearis terestris sex uncem. Ut praedictum est apparato diligenter, & sublatum reponito. Visus uero tempore pharmaci partem unam, adipis suilli ueteris partes duas accipito.

Cap. v

Epithemata & malagmata ad ischiadicos.

Malagma, inquit Archigenes, quod ualde multo experimento nobis constat.

stat, est subscriptum: uerum cucurbitam prius ad dolentes locos affigere oportet: ipsum autem malagma aliquandiu inhaerere consuevit; quare expectabis eius utilitatem. Colophoniam lib. i. baccarum lauri besslem, seminis raphani trientem, corticis capparis libram unam, picis aridae libram unam, pyretri libram i. cerae libras duas & dimidiam, foenigræci besslem, iridis libram i. sinapis besslem, nitri libras duas. Nitrum cum aceti libris duabus terito: deinde reliqua arida inspergito, simulq; terito, affusisq; liquefactis, emollito, ac utitor. Hoc quidē igitur malagma eiusmodi est, quod malum penitus extirpat, cutem rubefacit, & materias ex alto ad superficiē educit, quo sanē in principio non oportet uti. Verum quod sequitur leuissimum est & multae commoditatis, quoq; citra formidinē conuenit uti. Cerae trientem, styracis sesquunciam, satyrj sesquunciam, aloës primariae sesquunciam, ammoniaci thymiamatis sextantem, croci unciam unam, pyretri unciam i. opopanax unciam unam, galbani unciam, i. thuris unciam unam, olei ueteris libras quatuor, aliquando autem sextantem solum in aestate: Apparato, & utitor. Præter opinionem etiam facit ad ischiadicōs emplastrū pardalis appellatum, quod ad hydropicos inuenies descriptum.

Leæna emplastrum, malum penitus extirpans. Olei ueteris libras duas, plumbaginis, salis communis, terebinthinæ, singulorum libram unam, squame æris quadrantem, æruginis, herbæ lanariæ radicis, chamaeleonis nigri radicis, aristolochiæ, sinapis, singulorum sextantem, aliquando etiam canchrys unciam unam, aut pro eo pyretri tantudem. Auxiliatur etiam capiti ad hemicraniam impositum. Heræ, ad ischiadicōs, hoc, inquit, usus sum ad Frōtinum statim ab exacerbationibus imposito. Cerae drachmas centum, uisci drachmas sedecim, terebinthinæ drachmas uiginti quinque, galbani, myrrhæ, iridis, cuiusque drachmas sex, cedriæ hemina dimidium, olei cyprini hemina dimidium, Ceram, cedriam, cum cyprino oleo liquefacito: deinde resinam & galbanum adijcito, & ablatis ab igne statim uiscum adito, & ubi dissolutum fuerit irim inspergito & unito, & ad myrrham in mortario cum aceto tritam affundito. Quidam etiam nitri drachmas duas adiecerunt. Aesclepiades autem ita inquit. Malagma quod ischiadicis statim post exacerbationum remissionem imponitur, facit ad ossa contrita ac omnem neruorum per consensum affectionem, omnemq; duriciem dissoluit: facit item ad alias inflammationes, comprimit & committit malignas cicatrices. Prodest luxatis & collisis, & ad omnes malignas mamillarum dispositiones. Est enim ualde generosum. Cerae, terebinthinæ, uisci, galbani, myrrhæ, iridis siccæ, singulorum drachmas quadraginta octo, olei cyprini quantum sufficit. Galbanum cum cera in mortario contusum & emollitū cum cyprino liquefacimus, deinde ablatis ab igne uiscū inijcimus, & ubi dissolutum fuerit irim inspergimus, & ad myrrham cum acetō in mortario tritam affundimus. Commodant etiam ipsis emplastra ex sale: quale & hoc est. Salis drachmas centum, picis sex uncem, olei libras quatuor, cerusæ libras duas. Salem per se quā tenuissime terito, similiter & cerusam, deinde oleum ad ipsa in mortariū affundito, & postquā sufficienter trueris, excepta usquequo manus non inquinent coquito ad lentum ualde ignem, deinde picem liquefactam & percolatam inijcito, ac rursus ad cōpagem quæ manibus non adhæreat reducito, & utitor. Malagma ex sulphio, ischiadicis ualde præclarum. Ammij drachmas duodecim, sulphij, seminis rutæ syluestris, baccarum lauri repurgatarum, singulorum unc. i. medullæ colocynthidis drach. i. i. nitri, abrotani, cardamomi, cuiusque drachmas quatuor, cerae, adi-

pis uitulini, ammoniaci thymiamatis, cuiusq; sesquinciā. Arida liquefactis ab igne ablatis insperguntur, simulq; in mortarium ad ammoniacum cum aceto tritum infunduntur. Quidam uero ammoniacum cum cera liquefaciunt, & ad cōpagem manus non inquinantem redigunt. Aliud malagma, quo Theodorus proprium patrem curauit, quū ob dolorem suspicere non posset. Cera, picis liquida, aluminis liquidi, æquales partes accipe: liquefabilia liquefacito, & ad alumen cum aceto tritum affundito, emollito, ac utitor. Aselepiada, ad ischiadicis, facit & ad colicos: secureq; in exacerbationibus exhibetur: scabiē etiam quam pforam Græci appellant, citra exulcerationem sanat. Cera, picis liquida, picis arida, cuiusq; lib. i. sulphuris uiui, aluminis scissilis, nitri rubri, cuiusq; sexūcē. Quæ eliquari possunt, eliquato, aridaq; quā tenuissime trita paulatim adspergito, simulq; in mortario posca madefacto cōmisceto, emollito, ac utitor. Quidā picem aridā & resinam pinus, ac cerā, per singulos dextantes sumunt, oleiq; sextantem addunt, ac reliqua, ueluti prædictū est. Ischiadicum mirabile. Thuris, euphorbij, ammoniaci thymiamatis, pyretri, picis, cere, singulorum quadrantem, resinā pinus aridā sexuncem, olei cyprini sexūcem, selis taurini quadrantem. Thus, euphorbium, ammoniacum, unumquodq; per se quā tenuissimas in partes unā cum felle terito: liquefabilia uero liquefacito, & pyretum inspergito, eaq; ad trita fundito, unitoq; ac utitor confidenter. Experimento constat. Melius autem apparatur si ammoniacum quā tenuissime tritum liquefactis inspergatur, atque eo eliquato thus tritum adijciatur: euphorbium uero cum felle teratur. Vnguenta & acopa, quæ neruorum lassitudinem in ischiadicis reficiunt. Ad coxendicum dolorem prœoniæ radicem in oleo ad triduum contusam accipito, & quarta die paululum coctā illinito. Cæterum præpurgandos eos scito, ex succi tithymalli guttis quinque tantum cum caricis acceptis, aut ex corticis tithymalli cremore. Corticem autem ipsū contusum & cribratum quatuor scrupulorum pondere in uino per integrā noctem macerato: mane uero excolatum uinum præbeto. Aliud. Nyctericidē herbam, quam, unguentum Helenes appellant, oleo decoquito, & per diem unam in oleo manere finito, percolatoq; & illinito. Aliud, multo experimento constans. Herinaceum terrestrem uiuum in oleum coniectum donec flaccescat coquito: deinde eo extracto, farinæ adarces sextantē oleo inijecto, & olei cyprini uncia, i. Utitor autem illito ex eo loco. Cæterum oleum ipsum in quo herinaceus coquitur librarum duarum pondus esto. Aliud ischiadicis, quod isotheon appellatur. Facit & ad resolutiones, & ad omnem neruorum per consensum affectionem. Castorij, opopanacis, euphorbij, cesyphi liquidi, ammoniaci thymiamatis, galbani, terebinthinæ, singulorū sextantem, medullæ ceruinæ trientem, styracis unc. i. olei styracini trientem, olei irini sexuncem, piperis unciam unam, ceræ libram unam, olei sicyonij lib. i. olei ueteris libram unam. Ammoniacum, galbanū, opopanaca cum uino terito: liquefabilia uero eliquato, & ab igne ablata reliquis affundito, ac probe unito: styracem uero in pilatū dīto, ac paulatim ex pharmaco ei addito: ubi uero dissolutus fuerit, cū reliquis unito, ac utitor. Acopon, ad ischiadicis efficacissimum est, quod inter communia acopa post articularia remedia refertur, & Orchestæ inscribitur: eo itaque confidenter utitor. Vtere, & similibus acopis ac unguentis quæ isthic describentur. Inspergimen ad ischiadicis in balneo. Inspergimen ischiadicum efficax. Farinam lupinorum in balneo inspergito, & in exudatoria tabella prostratum sudare facito. Aliud, facit & ad inueteratas affectiones. Colli,

Costi, piperis albi, pyretri, cuiusq; quadrantem, nitri unc. i. fecis vini uisæ lib. i. contusa in balneo inspergito. Aliud. Costi quadrantē, pyretri quadrātem, nitri unciam unam, piperis albi, adarces, euphorbij, cuiusq; unciam unam, fecis vini uisæ libram unam, samfuci sex uncem, contundito, cribrato, ac in balneo utitor. Heræ, ad ischiadicos inspergimen lenitiuum doloris. Picis aridæ partes octo, sulphuris partem unā, terito ac misceto, & præloto ægro dum corpus adhuc calet inspergito, & cum charta cōtegito, atq; donec sua sponte decidat finito: nihil autem uetat ægrum lauare charta adhuc inhaerente. Alia inspersio. Adarces, staphidis agrestis, canchryos, sinapis, cardamomi, piperis, euphorbij, sulphuris uiui, cuiusq; unciam unam, contundito, & cribrato: ægro uero inducto, & in secūda balnei domo reclinato, pallio prius ad tabellam substrato, ad dolentem locum inspergito, & contente adfricato: deinde in calidam desiderare facito, & prolutum educito ac extergito, rursusq; insperginem iniungito & adfricato: postea uero dum adhuc calidum corpus habet, eiusmodi malagma imponito. Cineris caulium brassicæ ustorum quadrantem & uncia dimidium, cineris lignorum ficulnorum agrestium ustorum tantūdem, picis aridæ libram unam, cineris lignorum uitis ustorum quadrātem & uncia dimidium, sulphuris uiui quadrantem, axungia libram unam. Liberabitur enim æger, atque id breui ab omni dolore, ut incantationi similis facultas uideri possit.

De podagra, & arthritide, siue articulorum morbo.

Cap. vi

Podagrica & arthritica affectio eiusdem speciei inter se existunt. Differt autem podagra ab arthritide non toto genere, sed affectis locis. In omnibus enim debilitas est articulorum diuturna cum fluxione. Quæ quidem si in pedibus perficitur, Podagra appellatur, si uero in aliquo coxarum uertebro, Ischias, hoc est coxendicum morbus nominatur. Si uero in multis corporis articulis innititur, Arthritis, siue morbus articularis uocatur. Cōtingit autem aliquando uispenite irruat malum æqualiter per omnes articulos dispersum: quod ipsum euenire consuevit his qui cōsuetæ exercitia coaceruatim relinquunt, & licentiores diata utuntur: ut plurimum uero clanculum & paulatim fluxus irruere solet, alteri enim cuiusdam magni digiti pedis articulum dolor inuasit, alijs uero calcanei extremum, rursusq; alijs cauum pedis, aut ex calciamenti aut ex consimilis rei affricu. Cæterum initio à pedibus sumpto, paulatim ad genua malum proccedit, ad coxendicum item ac fœmorum iuncturas, deinde ad manus, singulis articulis particulatim affectis, quando sanè proprie, ueluti prædictum est, arthritis & articularis affectio appellatur. Qui uero extreme ab hac affectione apprehenduntur, his & spinæ uertræ & costarum iuncturæ & genæ dolent, aliquibus autem & iris siue corona pupillā oculi ambiens; neq; est aliqua ossium connexio, quæ ab hac affectione sit immunis.

Causæ uniuerſales.

Cap. vii

Generant autem affectionē cruditates coaceruatæ, et ebrietates, atq; his adhuc amplius immoderatus rei ueneræ usus: iam uero & deambulationes citatiores quàm pro more, & stationes diutius productæ, & familiares excretiones suppressæ, & consuetorum exercitiorum intermissiones. Vt plurimum uero aptitudines à parētib; in filios ac posteros trāsferūt. In uniuerſum uero amplius omnium crudorum humorum multitudo affectionis causa existit. Quod humorū multitudo affectionē inducit. Quādo quidē igitur humorū multitudo

multitudo in corpus digeritur, hiq; ipsi ad pedes deferuntur, & in ipsis partes omnes distendunt, inflammationesq; & dolores inferunt, manifestissimū sanē id existit. Nam & tumore attolluntur affectae partes, & uenae sanguinis in ipsis apparent repletae, & euacuatis ipsis in naturalem habitum aeger reducitur. Verum multitudo influēs nō in omnibus aequalis existit. Etenim alij ex caliditate aegrotant, alij ex frigiditate, atq; exinde etiā refrigerando, aut calefaciendo, aut resiccando opem sentiunt. Quā ob causam membra fluore infestentur.

Posteaquā igitur humorum multitudo in corpore congesta, hominem molestia afficit, unumquodq; quidem membrū quod primum affectionem percipit, affligentem humorem a se repellit: eum ipsum uero suscipit aliquid ex uicinis membris ac subiectis. Itaq; quum fortiora membra eum depellant, & imbecilliora suscipiant, id adeo citra intermissionem contingit, donec id quod propellitur ad omnium debilissimum membrum perueniat, & in ipso permanseat. Vna quidem igitur fluidarum affectionum generatio haec est, membris uidelicet fortioribus superfluum demittentibus, suscipientibus autem imbecillioribus. Ceterum articuli ipsi ex assiduo motu debiliores redduntur.

Quare in quibusdam magnus sit morbus, in alijs uero paruus.

Cap. viii

Magnitudo morborum ex fluxionibus obortorū ad humorum influentium multitudinem consequitur. Si enim plures humores fuerint, maior etiam affectio contingit: si pauciores, minor. Ceterum multorum recrementorum influxus ob multas causas accedit. Etenim & copiam humorum multam esse oportet, & uias latas per quas feruntur, & partem quā a fluxu infestatur raram, & facultatem in ipsa debilem: & membrorū eum delegantium uires fortes, quomagna affectio fiat. Verum si paruus futurus est morbus, praedictis contraria omnia concurrere oportet.

Quare multo tempore aut paucio morbus duret.

Cap. ix

Porro ut multo tempore aut paucio morbus duret, etiā praedicta sunt causas, tenacitasq; insuper & crassitudo humorum. Etenim sanguis multus & crassus, densa pellicula conclusus, & a uiribus debilibus segniter correctus, tempus auget & producit. Qui uero contrario modo habet, minuit et breuius facit. Ceterum & in alijs corporis affectionibus, siue in superficie sint, uelut erysipelates: siue sub cuticula, ut herpes: siue in carnosissimis partibus, uelut inflammationes, recrementa ut plurimum feruntur. In podagricis autem & arthriticis appellatis, usq; ad iuncturas per altum repletio ex fluxione contingit, una cū hoc quod nerui permadescunt & distenduntur, itemq; ligamenta & pelliculae, omniaq; circum circa sita: atq; ob id saepe usq; ad quadragesimū diem morbus extenditur. Etenim quū etiam cessauerit fluxus, neq; amplius ex supernis feratur, repleta adhuc multo humore existentes iuncturae, eum ad circumsitam membra delegant. At uero si tenuior sit fluxus celerrime aegri sanantur, nisi male omnino curentur. Quod si uero quis ex medicis ueram methodū ignorantibus per resoluentia semper omnes inflammationes curet, non in quadraginta tantum dies, sed & in quadringentos, & in omnem reliquam aegri uitam inflammatio nes extendet. A mala enim curatione podagricis pleraq; mala accidunt, maxime uero calli & artuum duricies, et articularū curuitates ac cōtractiones, propter medicorū ignorantiam fiunt, qui neq; per uenae sectionem, aut purgationem euacuant, neq; reducant in uniuerso corpore humorē, quiq; ad iuncturas defertur, et proinde articularū morbos producit, per ea quae moderate adstringat repellunt.

repellunt. Quidam enim ex ipsis inflammationes immodice resoluunt, tum per aqua & olei mixtionem, tum per cataplasinata ex cruda ordeacea farina appa-
rata, attrahuntque per cataplasinatum caliditatem humorum copiam ex subiectis
locis. Quin & ob hanc ipsam inductam laxitatem, affectas partes debiliores, et
adcrementorum susceptionem aptiores reddunt.

Qua sit incuruatorum articularum causa.

Cap. x

At uero alij medici immodice refrigerant, alij autem uehementer discutiunt.
Ex quo sane neruofas partes inspissari contingit, incuruarique & distorqueri, ob
redundantium uidelicet humoru susceptionem. Contingit item callosas & cal-
culosas coactiones in ipsis emergere, & neruos spontaneo motu se mouentes
congelari, ligamenta item & neruos qui tendines appellantur, qui sane aptis-
simi ad hoc perferendum censentur, propterea quod substantia ipsorum densa
& solida existat.

Qua causa generationis toforum in artubus.

Cap. xi

Generatio quidem igitur toforum siue callorum in artubus induratorum,
materiam quidem habet crassos humores, causam autem efficientem, qualita-
tem calidam & siccam. Quemadmodum uidere est & in tofis: qui in arcibus ua-
lis ex limosae aquae incoctione generantur. At uero pharmaca quae ualde re-
frigerant, si assidue adhibeantur non solum crassos humores congelant, sed & te-
nues. Quemadmodum uehementissimum frigus congelat aquam. Quae
uero aceruatim & immodice discutiunt, id quidem quod tenue in ipso fluxu est,
euanescere faciunt: quod uero reliquum est, inspissant et coagulant: atque id eo am-
plius si ad hoc quod discutiunt, etiam immoderate calefactoria habeant facultatem.

Qua causa sit cur inflammationes in podagricis

non facile suppurentur.

Cap. xii

Causa cur podagrica inflammationes non facile suppurentur, primum qui-
dem est affectarum partium substantia, tum natura, tum pro more & gre permu-
tabilis existens. Ad hoc enim quod natura durae sunt neruofae partes, etiam to-
lerandi cura anguntur ea quae molestiam inferre possunt, praesertim tamen pe-
dum & manuum extrema, quin et carne nudatae magis haec sunt partes minusque
calidae & humectae, & ob id etiam reliquis partibus frigidiores: imo & influen-
tes in podagricis inflammationibus humores corruptioni minus sunt ob-
noxij, & pharmaca similiter adhibita inepta sunt ad putrefactionem ac sup-
purationem. Etenim alia ex eis refrigerant & repellunt, alia uero discutiunt,
alia autem resiccant. Contingit tamen aliquando in quibusdam inflammatio-
nem aut suppurari, aut erodi. Quum enim crassus humor uehementer fue-
rit condensatus, & deinde non ita uehementer, sed moderate calefactus, ne-
cesse est ipsum suppurari. Acri uero & erosiuo humore influente, erosio con-
tingit, quemadmodum & marcor in quibusdam succedit, irruente uidelicet
in membrum humore qui putrefacere potest: quanquam raro haec in podagricis
eis contingant.

Quomodo ex inflammationibus & consequentibus ac-
cessionibus, siue symptomatis, affligens humor cogno-
scatur.

Cap. xiii

Quomodo quidem uniuersi corporis intemperiem cognoscere & curare
oporteat, iam ante in quarto Sermonem est praescriptum, huius uidelicet tracta-
tionis. Quomodo uero quis inflammationes in partibus inflammatis consistere
cognoscere possit, necessarium & hic paucis referre. Apparet autem id ex eis
quae

quæ accidunt & consequuntur: quæ si quidem frigida fuerint, frigefaciunt: calida uero calefaciunt: mixta autem mixtas etiam signorum species inducunt. Quo uero manifestior fiat hic sermo, quæ iam dixi, repetam, singulatimque retratabo.

Sanguinei humoris influentis signa.

Cap. XIII

Humor sanguineus si multus fuerit, & circa summam caliditatem moderatus, repletionem efficit, & tumorem ingentem: non uenarum modo, sed totius membri affecti circa cutem: cumque calidum quidem moderate, uehementer aut rubentem, pulsus autem adest in alto inflammationis mediocris. Qui hoc modo sunt affecti, neque refrigerantia neque calfactoria ualde præsidia adhiberi sustinent, & assidue ac continue exacerbantur, quandoquidem assidue & æqualiter sanguinis allatio contingit, quanquam & per circuitum quiddam irritatione uexentur, quum non continue sanguis defertur, & exacerbationum accessiones omnino quotidie fiunt, uerum non ita durant ueluti hæ quæ ex pituita oboriuntur. Vrina uero eius qui sanguine redundant, fulua sunt, & mediocri crassitudine prædita, aliquando etiam subsidentiam albam, aut nubem, aut tale quiddam in medio pendens quasi suspensum habentes. Quod si magis ad pituitam declinet sanguis, albiore & crassiores: aliquando uero et conturbatæ reperientur urinae, & multum est quod in eis subsidet. Venæ autem in his ampliore sanguine susceptæ replentur, & in tumorem attolluntur. Aetas uero ab adolescentia usque ad ætatem uigoris apta fiet ad multitudinem sanguinis producendam. Edulia item boni succi & quæ maxime alunt: & exercitia moderata. Ex temporibus uero, uer, & regio temperata.

Biliosi fluxus signa.

Cap. XV

Quod si uero biliosus sit fluxus, color cutis inflammati loci, aliquando quidem flauior quam secundum naturam apparebit: aliquando uero rubore cum flauo permixto, quando uidelicet flaua bilis sanguini est permixta. Caliditas autem uehementissima & feruentissima adest, quæ amplius refrigerantibus pharmacis gaudet. Qui enim ita habent, uehementer à refrigerantibus iuuantur medicamentis siue actu siue potentia talia existant. Exacerbationes uero his per tertium quenque diem mouentur, & præcipientes quidem irruunt, citius uero uigorem remittunt, per uentrem enim & per urinam recrementa superflua his euacuantur: per cutem etiam transpirant, utpote quæ tenuium partium existant. Lotia eorum subfulua sunt, & subflaua: quandoque etiam acris, ut in mictione urinarium arrodant meatum. Curæ autem ingentes, & ira, & uigilia, & illuies multæ, & fatigationes, & diæta omnis bilem gignens & attenuatoria, ex acris uidelicet & salis edulijs, huius humoris influxum præcedunt. Aetas uero & temperies corporis calida & sicca ad eum apta est. Hora autem siue anni tempus æstiuum: consimilis item regio.

Pituitosa fluxionis signa.

Cap. XVI

At uero si pituitosa sit fluxio, ad digitorum appressionem cauus fit tumor sublaxus existens et moderatus, & color dolentis membri albus. Dolores uero aliquando quidem fortes, aliquando uero mediocres: & exacerbationes quotidie paulatim irruunt & augentur, & per plures horas durant, & breuem intercapdinem habent: imò neque unquam integre remittunt. Aetas autem hoc modo amplius afficitur senilis, & temperamentum humidum & frigidum, & consimilis ambientis nos aeris status, et tempus hybernium. Aliquando autem & frigoris sensum in alto locorum affectorum ægri perceptant. Vita uero ociosa & socordia ad pituitosi humoris generationem plurimum conferunt. Edulia item

item refrigerantis & humectantis ac inspissantis facultatis, & balnea à cibo unde & urinæ crassissimæ ab eis prodeunt, & sæpe conturbatæ reperiuntur. Atque hæc quidem signa sunt pituitæ naturæ frigida prædominantis. Nam & hæc ipsa propriè pituita appellatur. Salsæ pituitæ signa. Cæterū si salsæ pituitæ fuerit influxus: color membri affecti & tumor eodem modo habent, ueluti de pituita est prædictum. Pruritus autem maximus & mordacitas infestat locos. Urinæ uero tum his tum prædictis, aliquando quidem tenues & aquosæ, aliquando uero crassum in eis est quod subsidet, suntq; conturbatæ.

Bilis atræ influentis signa. Cap. XVII

Quod si ex atra bile sit fluxus, qui sanè potentia frigidus est & siccus, quod raro tamen contingit, frigoris sensus quandoq; affectis adest, et corpora in profundo uelut atterantur aut scalpantur afficiuntur. Colores uero tumorum nigriores sunt, & circuitus exacerbationum per quartum quemq; diem redeunt. Sunt autem exacerbationes tum magnitudine tum impetu mediocres. Aetas uero quæ magis hunc fluxum generat, est uigore inclinato, & uergente: temperies aut frigida & sicca, & natura quidem superfluitates pituitosas generat, non autem atræ bilis. Quæ uero ex degenerante & mutata caliditate fit, flaua bile superaffata & nigram generante oboritur. Præcedit porro hunc fluxum diæta ex edulij atræ bilem gignentibus, & lassitudines immodicæ. Regio autem ei apta est frigida & sicca. Tempus autumnii, & cōsimilis aëris status. Urinæ uero ut plurimum in principio tenues eis sunt & aquosæ propter obturationes: postea uero quàm secundum naturam atriores, & modicè crassæ, et quod subsidet in eis aliquando fuscum est, aliquando uero mixtum subcruentum uidelicet & fuscum reperitur.

Serofarum fluxionum signa. Cap. XVIII

Sin uero serosa recrementa influant, dolores non ita magnos inferunt, quemadmodum etiam neque fluxu infestatas partes in tumorem ualde excitant. Secundum speciem uero consimilia perficiunt, qualia humores solent, qui cum eis eiusdem generis existunt. Pituitoso enim sanguine demanante, serosa in ipsa pituita recrementa, consimiles quidem secundum speciem dolores inferunt, secundum magnitudinem uero multo minores. Vbi uero alij humores defluerint, consimiles etiam illis serosæ ipsorum superfluitates inferunt dolores.

De his qui ex humorum complexu fluore infestantur. Cap. XIX

Nosse porro operæ precium est, quod aliquando fluxus fluxui commiscetur, aut calidus frigidus, aut uicissim frigidus calidus, & secundum utriusque horum qualitatem exacerbationes fiunt, & continget quandoq; agrum bis in die exacerbationum accessionem sentire.

Diæta & cura podagricos præseruans. Cap. XX

Qualis quidem igitur diæta unicuique prædictarum temperierum conueniens sit, iam antè prædictum est in quarto huius tractationis Sermonè: superfluum uero est eadem bis scribere. Cæterum ad ea quæ isthic relata sunt, uomitus in uniuersum ferè omnibus qui podagricam affectionem defugere uolunt, commodi sunt, præterquam eis qui thoracem & caput, quæ facile læduntur habent. Quibuscumq; igitur ex exercitijs, aut alijs quibuscumq; motibus, recrementa in uentrem confluunt, his uomitus ante cibum prodest. Qui uero sanguinis copiam aggregarunt aut humores pituitosos, post acceptum cibum uomant

li manē

mant per aliquot dies. Venus uero omnes podagricos extreme lædit, & præfertim si assidue aut intēpestiue ea utātur. Etenim uoluptas per se neruorum corporum robur & firmitatē dissoluit, multo uero magis si cum uehementi motu perficiatur, & ob id membra affecta longe imbecilliora fiunt, & prompte ac expedite cōfluentia recrementa suscipiunt. Adhibetur tamen eius usus aliquādo, propter consuetudinem uitiosam semine plurimum irritante, quum uidelicet multi & noxij fuerit humoris. Generatur autē tale in naturis proprie multise minis appellatis, & oportet sanē, quo molestiam eius uitemus, prohibere ne eius copia in seminaris uasis generetur. Quomodo uero seminis generationem prohibere oporteat, iam prædictum est in eo qui hunc præcessit Sermone.

De olei & salis affricu in podagricis.

Cap. xxii

Operæpretium porro est nosse, quod omnes qui se, ne in podagricam affectionē incidant, adseruare uolunt, & præsertim eos qui humecta & frigida natura sunt, magnifice iuuant sales cum oleo quā tenuissime triti & affriciti, non quidem tempore inflammationis & doloribus instantibus, sed quū hæc remittunt; nisi uehementer sicca temperie ægri sint præditi. Omnibus enim qui hoc modo fricantur insitus calor augetur, & quod præter naturam est discutitur, recrementa quæ consumuntur, & affecta membra fiunt robustiora, ac aduersus affectionem firmantur, minime quæ ei obnoxia redduntur, maxime si diligenter singulis diebus mane & uespere, ubi dolores, quemadmodum dictum est, remiserint, per omnem uitam hoc præsidio utantur. De quo sanē ausim confidenter pronunciare, inquit Philagrius, quod etiam solum sufficiat his, qui uel maxime circa dietam delinquant, aut immodice refrigerantur, aut ægrotant ex labore, aut re uenerea nimium sunt usi, aut quemcunque alium sortem excessum admiserunt: quare omnino postquam inflammationes quieuerint & dolores, cotendum est.

Vniuersalis methodus curationis podagricorum.

Cap. xxiii

Itaque prius dictis rursus in memoriam reuocatis, pronunciamus & membrorum debilitatem, & humorum copiam, primas causas omnium fluidarum affectionum esse, præcipue tamē podagræ & articularis morbi. Quare duplex etiam sanationis scopus nobis præfigetur. Euacuatio redundantis humoris & corroboratio partium debilitatarum. Euacuatio itaque fiet aut per uenæ sectionem, aut purgationem. Post uniuersalem autē euacuationē, calidi quidem fluxus refrigerationē amant, frigidi uero calefactionē; humidi resiccare, sicci humectari gaudent. Etenim acies quidem ac uiscosos discindētib; et extergentibus curare conuenit, crassos uero tum eisdem, tum quæ amplius attenuatoriā uim habent, acres uero per ea quæ mordacitatem obtundere possunt. Amplius autē ea quæ assidue influunt, per repellentia prohibenda sunt, itemque per ea quæ resiccant. Quæ uero per circuitum irritant, quum quidem influunt impedienda, quum uero non deferuntur, tum sanē ea quæ iam illata sunt euacuationem requirunt, ad quam eisdem debilitatarum partium corroboratio accedat.

Cura eorum qui ex sanguinis copia ægrotant.

Cap. xxiiii

Quū igitur sanguinei humoris fuerit influxus, & dolor mediocris qui neque calore suo neque frigore manifeste infestet, locus inflammatus pharmaco quidē fortiter adstringente, modice autem resiccante illinatur, eiusmodi autem est id quod ex acacia & utroque ueratro apparatur. Abstineat autem æger ab omni cibo & motu, & uini etiam potu. Et si fluxionis impetus non ualde magnus fuerit, & pharmacum adhibitum comoditatem suam ostenderit, rursus, cum passio tenuis

tenuis substantiæ aut posca large dilutum quo strigmentosum reddatur, illinatur. Caterum neq; aqua neq; oleum pedibus adhibeatur, sed & si illitum ablueri oporteat, quo uidelicet aliud illinatur, posca mediocriter tepescita abluatur, aut cum plantæ alicuius austeræ decocto, usq; quo id quod influxit sedetur. Cataplasma ob id etiam imponendum ex malis maxime cotoneis, aut mespilis, sorbis, cornis, hippuri, sanguinaria, aut folijs quercus tenerioribus, singulis pane permixtis & uino ueteri maceratis. Idem uero ipsum & per alia quædā eiusdē materiæ existentia cōfieri potest. De quibus rursus postea sermonē repetemus. Porro si sanguinis motus in uniuerso corpore uehementer inualuerit, utendū nihilominus prædictis pharmacis, ne uidelicet particula repleat, et dolores fortes ac diuturnos inducat. Euacuetur aut id quod ex sanguine redundat, quantum sanè id uires & affectio permittunt, & maxime si qui cōtinetur sanguis bene sit temperatus, et homo ipse ad sanguineas euacuationes sit aduēfactus. Cognosces uero sanguinis impetum, tum ex tumore præter naturam, tum ex doloris magnitudine & uelocitate. proportionabiliter enim tum ad copiam sanguinis, tum ad allationis eius modū, impetus ipse contingit. De sectione uenæ. Eos igitur qui multo sanguine abundāt necessariō secta uena fortiter euacuabis, nō solū semel, sed iterū atq; iterū & pluries detractiōe paulatim repetita. Si em̄ uenæ sectione omīssa, repulsorij pharmacis fueris cōfusus, magni mali auctor eris. Ex ignobilibus enim mēbris ad principalia & uitæ necessaria sanguis repulsus, deinde in aliquod horū irruens, uelut in hepar, aut septū transuersum, aut thoracē, aut pulmonem, aut in ipsum deniq; cor, pro morbo mortē inducit. Quapropter maxime necessaria est sanguinis ac reliquorum humorum in sanguineis influxionibus euacuatio, præsertim in his qui sanguine redundant, itēq; reliquis humorū recrementis, ac lautiore diæta utuntur. In his enim antequā dolores oboriantur, uenam secare oportet, bis in anno sanguinē large detrahendo, & purgare quoq; eosdem, si licet modo per singulos menses. Caterum in omnibus diei horis ueniam secare conuenit his qui uehementibus doloribus sunt apprehensi, adeo ut etiam si quis pransus sit, nihil ueritus tamen uenam secare possit, atq; id maxime si ex uentris locis cibus ad intestina fuerit dilapsus. Vbi uero in uentre adhuc cibus detineatur, euacuatione prius per uomitum facta, ita paulatim sanguinem detrahes. Secunda est autem ē directio cruris in eius sectione infestati uena præsertim in brachio inferna, ita tamen ut obseruemus et in hac obseruemus subiacentem neruum. Quod si uero manus dextra dolore infestetur uenam in dextro crure secamus, iuxta talos aut poplitem, aut plantam pedis: post sectam uero uenam si dolores adhuc perseverent, & fortis tensio sit in affecto membro, sape in ipso inflammato crure uena incisa, & multo sanguine detracto, hominē ab omni dolore liberaui. Memini itaq; inquit Philagrus, cuidam in quo humores æqualiter omnes & multus imprimis sanguis redundabat, bis sanguinem ex secta uena detractum, in quo manifeste cognoui quantam uim habeat uena ē directio membri affecti secta. Quum enim dexter pes ei fluxione infestaretur, uena dextræ manus incisa, confestim à molestijs est liberatus: quumq; tribus interpositis diebus alterum item crus fluxione infestaret, uena sinistræ manus secta, similiter à dolore liber euasit. & quū inde pharmaco ex croco curaretur, perfectā sanitatem recepit. Verū hic quem admodū prædictū est, multo sanguine redundabat, et uniuersum corporis habitum eiusmodi habebat, qui non facile posset exolui. In his uero qui contrariam

huic corporis dispositionem habent, parçẽ sanguinem detrahẽre oportet.

Quod eleuatas & incuruas uenas ex membris
fluxione infestatis, ueluti in uaricibus,

auferre oporteat.

Cap. xxiiii

Operæpretium est, inquit Rufus, etiam alios auxiliorũ modos excogitare: Ego quidem igitur articulis pedum fluxu infestatis, laudo si quis uenas quæ ex supernis in pedes deferuntur excindat, ueluti uaricosa in suris excindi solet. Etenim partes hæ tempore præsertim inflammationũ apparent in tumorem eleuatæ, & uenæ circũ circa rubent, & sanguine repletæ cõspiciuntur, atq; qui ita affecti sunt, magis à dolore uruntur, & frigidis gaudent. Si igitur quis uenas ueluti in uaricibus excindat, multitudo sanguinis non amplius influere & inflammationem facere, quemadmodũ antea consueuit potest, atq; id præsertim in sanguinea podagra conducet. In alijs uero articulis, utpote coxendicibus ac cubitibus & similibus fluxu infestatis uenæ non ualde apparent. Quod si contrã contingat, etiam in his eas quæ altius eleuatæ sunt excidere oportet.

De perustione in morbo articulari.

Cap. xxv

Crustas igitur inurere oportet, aliquas quidem paulo altius loco fluore infestato, aliquas uero propius, atq; id cauterijs facere præstat, aut si id eger ferre culset, cum medicamentis. Longe autem præstantior est cauteriorum usus, nam & citius & siccius perurunt. In uniuersum uero pedibus ex fluxu infestatis, loci circa utrumq; talum forinsecus & intrinsecus inurendi sunt, cauterijs iuxta magnas ibidem sitas uenas admotis, paulo altius supra talorũ locum. Inurendus item locus inter magnum pedis digitum & eum qui ei proximus est, medius, ubi sanè uenæ magis tumefactæ cõspiciuntur, præsertim ex eis maximæ. Quibusdam aut & articulos ipsos perurere expedit, quum submucidi ualde cõspiciuntur, priusquàm durities ad modum toforum in eis generetur. Sciendum tamen, inquit Rufus, quod in articularum submucidorum perustione, ulcera ægre curabilia oboriuntur, uerum ubi cicatrices coaluerint maximum robur ipsis articulis præbent, ut non amplius ad suscipiendum influentia recrementa sint apti. Et de his quidem, hætenus. Oportunum autem & iam reliquam curam post sanguinis euacuationem aptam describere.

Cura in fluxibus sanguineis post sanguinem euacuatum.

Cap. xxvi

Post sanguinem euacuatum affectam partem aceto ueteri tenuium partium cum rosaceo rigare oportet, & præsertim si in alto hædere dolorum causa uideatur. Etenim acetum propria sua tenuitate usq; in altum progressum, expeditam rosaceo uiam exhibet, quod natura sua dolores lenire potest. Ceterum si in superficie dolor consistat, per uini & olei usum magnopere iuueris, æstare quidẽ tepidorũ, hyeme uero calidorũ. Deinde etiam cataplasmatibus utendũ quæ inflammationes lenire possunt, citra hoc quod prouocent & prolestant fluxiones. Talia aut sunt, farinæ sceni græci & hordei, fabarumq; & cicerũ tritæ uino coctæ, potest etiam aqua modica affundi, ubi uinum nimis forte extet. Quin et passo ac modico rosaceo unaquæq; ex prædictis farinis cocta dolorẽ mitigare consueuit. Oportet autem cataplasmata omnino semper calida esse: quod comode fieri potest, si assidue permulentur, & lana forinsecus contegantur. De pharmaco ex croco. Quum itaq; prædictis præsidijs adhibitis uehementibus & præsertim ad cataplasma ex fabis apparatus, ne uidelicet coaceruatim

tum transitus fiat. Deinde etiam amplius quid de pharmaco ammiscendum est. postremum uero pharmacum ipsum cum rosaceo dissolutum & ad bonam compositionem redactum imponemus: diffundit enim celerrime si liquidius fiat. Hoc itaque pharmaco saepe post euacuatum sanguinem, doloribus ualde imminutis statim usus sum, loco prius ex aceto rosaceo perfuso: multam enim utilitatem & breui ostendit: quare ipso assidue ad podagricos utimur, utpote quod laudem dignum experimentum nobis exhibuit, inquit Philagrius, in pluribus enim solum hoc suffecit ad perfectam curationem semper quidem cum rosaceo dissolutum, aliquando uero uino tenui & fuluo ammixto, quantum sane eius conquisitando & excipiendo pharmaco satis fuit. Ceterum hoc ipsum in his facie dum est, quibus adhuc aliquid ex fluxione ad inflammatum locum defertur. Quandoque autem pro uino acetum addimus, maxime ubi tum quod inferitur repellere uolumus, tum discutere iam in loco contentum. Passum etiam aliquando pro uino additum mollibus corporibus profuit. Verum enim uero & ad passillum ex acacijs & ueratri apparatus, adiectum hoc pharmacum saepe quod influit prohibendo, & quod adest euacuando, & membrum confortando, non parum iuuat. Solum item post sedatos dolores durius impositum robur partibus addit, ut adstricta & recrementorum influxui minime obnoxia, ac breui fortia reddantur. Hoc quidem igitur medicamento uarie & multiformiter usi sumus, multosque iuimus, tum instante dolore, tum etiam eo sedato. Habet enim repulsoariam uim paucam quidem illam propter acetum & crocum, habet & concoctariam & discussoariam ac moderate resiccantem, rursus ob crocum & galbani thurisque & ammoniaci thymiamatis ammixtionem. Discussoria autem tum in his ipsis sita est facultas, tum in pice et aceto. Merito itaque podagricis inflammationibus conuenientissimum censetur. Nam & fluxum moderaterepellit, & calfaciendo sensim concoquit, & contentum discutit, & debilitatis membris firmitatem inducit. Compositio autem hoc modo habet.

Galbani drachmas xxxi , thuris drachmas xxxi , croci drachmas sedecim, ammoniaci thymiamatis drachmas quadraginta octo, cerae drachmas nonaginta octo, picis aridae drachmas ccccxxv , olei rosacei drachmas quadraginta octo, aceti albi acerrimi heminam unam. Ceram, picem, rosaceum lento igne liquefacta excolato: galbanum autem & crocum, ammoniacum, thus, cum aceto terito, & ad liquefacta & ab igne ablata in cacabum adijcito: unitaque in mortarium quod modicam aquam frigidam habet, diffundito, & sufficenter emollita extrahito, ac quemadmodum praedictum est utitor. Hoc quidem modo Philagrius apparare pharmacum ipsum praecipit. Quidam uero post eum etiam opij unc. i. ad hanc compositionem adiecerunt, eoque ad uehementes dolores sedandos usi sunt. Alij autem usus tempore instante parum quiddam opij addunt ad maximos cruciatus compescendos. Pastillus ex acacijs & ueratri. Porro ex acacia & ueratri pharmacum hocce est. Pastillus podagricus admirabilis ad podagricos & morbum articulare, inflammationesque & omnia pruriginosa: in principio enim illitus manifestam utilitatem exhibet, ut eadem etiam die lotus ager deambulet. Vbi uero dolor in uigore est incommode adhibetur. Quidam enim in uigore affectionis eo usus, confestim quidem sibi iniuari usus est: paulo uero post concalescente & resiccato loco, a maximis doloribus ager apprehensus nos accersiuat, quare quum accessissemus & didicissemus factum, cognouimus quod membra in superficie posita contusionis modo affecta essent, tum ob inflammationem, tum ob exortam ex pharmaco ad-

strictionem & distensionem. Distensæ autem erant & in profundo sitæ partes ex cuticulæ exterioris ad interna impulsæ. Abluto igitur prius cū aqua calida il lito pastillo, cataplasma ei imponi iussu ex aqua mullā dilutiore apparatū, & ex oleo modico dulcissimo, farinisq; fœnigræci & fabarū, atq; hoc ipsum feci propter eam quæ ex ipso pharmaco ei contigit oppilationemq; & constrictionē: quū uero dolores euestigio essent sedati à resoluentibus discessi: etenim cata- plasmata & irrigationes in fluidis dispositionibus adhibitæ incurabilem red- dunt morbum. Verum pastilli ipsius compositio hoc modo habet. Acaciæ ni græ drachmas triginta duas, acaciæ flauæ tantundem, glutinis fabrilis pelluci- di, aut quod magis expedit, glutinis piscium drachmas triginta duas, ammoniæ ci thymiamatis drachmas sedecim, glaucij drachmas sedecim, aloës drachmas sedecim, thuris masculi drachmas octo, ueratri albi & nigri cuiusque dra. viii. Aceto scillitico trita cogito in pastillos. Vfus uero tempore eisdem in aceto eo dem liquefactos illinito, & exiccare permittito, ægrumq; in balneū demittito, & ubi inde redierit similiter utitor. Totū pastilli pondus drachmarum centum & sexaginta octo est, hoc est unciarum xxi. Hoc pharmacum podagricis in- flammationibus inchoantibus conuenit, & solum sufficit, si non multitudo flu- xus redundet: & multo amplius, si per plumbi succum fuerit dissolutū & lique- factum. Fit autem plumbi succus hoc modo. In mortarium plumbeum suc- cum aliquē refrigerantem simul & adstringentem iniicito, & cum pistillo plu- beo in sole donec crassior reddatur terito, atq; ita iniectum pastillum & contra- tum illinito. Sit aut succus ipse plantaginis, aut oxylapathi, aut sanguinarig, aut uuæ acerbæ immaturæ, aut semperuiui, aut aliquarū cōsimilium herbarū, quæ & ipsæ commodę sunt in principijs inflammationū. Hoc ipsum itaq; pharma- cum ex plumbi succo, non solū in principijs & progressu, sed & in uigore mali aliquando cōmodum existit. Et Philagrius quidem hoc modo de pastilli usu scripsit. Quidā uero pastilli ex croco ad dysenteriam descripti, atq; huius ipsius pares partes aceto aut plumbi succoterūt, et duabus ante balneum horis illinūt, atq; ubi lauerint à balneo rursus similiter illinunt, & egregium testimonium huic usui præbent. Diæta eorū qui ob sanguineum fluxū ægrotāt. Inflammationes ex sanguinis influxu obortas quemadmodū dictum est curare oportet. Care- rum cibos eis exhibere oportet qui minus nutriūt, Quales sunt holera, et spino- sæ plantæ: et ex uolucris, montanæ: ex piscibus uero, qui in petrosis aquis de- gunt. Aluum uero facile subeuntem habere oportet, & si quidem officio suo non sua sponte fungatur, simpliciōri aliquo clysteri seu infuso eluatur.

Cura eorum qui neq; uenæ sectionem, neq; purgatio- nem sustinere possunt.

Quandoquidem uero quidā adeo formidolosi sunt et mollicie fracti, ut neq; nomen uenæ sectionis aut purgationis audire sustineant, non melius tantū sed & fortunatius est nullum talem cōtingere. Et tamē si ad curādos eos cogamur, prædicere oportet diuturnos dolores eis affuturos, & uigilias, articuloꝝq; tor- turas & claudicationes, præsertim si crassus & multus sit sanguinis influxus. Abstinencia quidem igitur ciborum illis constituenda est, & clysteres modera- te fortes iniiciendi, & pharmaca umbilicaria imponenda epomphalia Græcis appellata, quæ sanē umbilico imposita aluū ducunt. Utendum etiā his quæ sedi apponuntur glandulis uidelicet, uelut est cydamini succus, & elateriū, & similia, quorū in tertio Sermonē feci mentionem. Utendū & post aluū exolutam, unguentis discussorijs, & fricationibus eiusdem generis, & omnibus quæ su-
perfluum

Cap. xxvii

perfluū euacuare possunt ex locis fluxu infestatis, Etenim repulsoria, si nō prius uniuerso corpore euacuato, assumentur, periculum inducunt. Cataplasmata igitur eis imponere oportet ex pane, fabacea & fœnigræci, ac cicerum farina, cum aqua mulsā aut adipe suillo non ualde ueteri. Scarificationibus item iuxta affectū locum utendū. Irrigare aut assidue oportet ex aqua & oleo, & aliquando cataplasmata ex lixiuio apparare, quo per erosam cutē, ueluti per riuos malum euehatur. Huiusmodi hominibus cōueniunt item ceratorū formam habētia medicamenta, ex oleo sicyonio, nitroq; & cera apparata, quæ humorē ad locum delatum discutere possunt. Pharmacū ex lixiuio & spuma nitri digerens ac exhauriens inspissatos humores, est autem pharmacum ipsis commodissimum & facile parabile: excitat bullas, & cutem erodit. Spumæ nitri albæ quæ achelesiam appellant drachmas uiginti quinque, terebinthinæ drachmas triginta sex, olei drachm. cccclxxx. lixiuij ficulnei, hoc est, exustis lignis et aqua extinctis, loturæ eorum percolatæ drachmas octoginta quatuor, ceræ drachmas ccl. Oleum, ceram, terebinthinam, & lixiuium, hoc est aquam ipsam, ut prædixi, coquito, & quum pars maxima aquæ fuerit consumpta, spumā nitri prius tenuissime tritam adijcito, unito, ac utitor. Huiusmodi sanē sunt inflammationum podagricarum ex sanguine curationes.

De his qui ob bilis influxum ægrotant.

Cap. xxviii

Quod si uero inflammationes ob biliosum influxum fiant, tum & in his communis scopus euacuationis adligētis humoris existit. Fiant aut euacuationes in principio, tum per uomitū, tum per uentrē. Danda itaq; pharmaca bilē eductentia, ex quorū numero aliqua per utramq; uia bilem exigunt, uelut est thlaspi hoc enim acetabuli mensura potatum & superne & interne purgat, atque tantum sanē de eo semine ad summum datur. Constat autem quod & purgatoria medicamenta ex scammonia apparata flauam exagitant & euacuant bilem: horum uero compositiones iam ante retulimus in tertio Sermonē. Faciemus tamen & in hoc Sermonē quorundam mentionem, sed paucorum et paulo post. Purgare igitur eos oportet confidenter, & secundaria uice si res ita postularit: confestim enim in euacuationibus subsistunt & sedantur. Quod si tamen neque hi purgari uelint, neque sustineant ob quamcunq; tandem causam. Tum sanē & his quemadmodum dictum est, mederi conuenit per umbilicariorū purgatiuorum impositionem, & per ea quæ sedi subduntur. Per infusionem item aluus ipsorum eluatur. Et cataplasmata adhibeantur ex fabacea & hordeacea farina, adipe suillo recenti & insulso, tenuiq; chamæmeli farina ac aqua. At uero hæc ipsa posterius imponenda sunt: in principio autem usque ad uigorem ea quæ ex semper uiuo apparantur, & rosas uiridibus, perdicij herba, anchusa, sanguinaria, helxine, sideritide, portulaca, rumice acuto, atriplicis, solano, plantagine, hyoscyamo, lenticula, & stratiote palustribus, blito, lactuca, seride, malua satiuā, ramentis cucurbitæ, umbilico ueneris, flore uiolarum, mali punici corio. Horum unumquodque cum pane ex farina polentæ impositum dolorem tollit, & maxime psyllij semen aqua feruenti maceratum, et postquam succulentum factum fuerit, pro cataplasmate impositum. Vnguentum item ex plumbi succo ad sanguineas influxiones prescriptum his commodissimum existit. Comoda sunt & mala cum pane trita imposita, & quæ his sunt similia. Et cerata Hippiones & Ambrosiæ nomine insignita, & quæcunq; excera, chamæmelo, & rosaceo apparantur; adijcitur aut succus quispiā ex prædictis

dictis refrigerantibus, & ouorum candidum, & aqua cum modico aceto, quorum compositiones paulo post subnectemus. Optimum autē pharmacum pro eis est ceratum ex rosaceo betæ succo quantū satis est adiecto. Vidi etiam quendam hac affectione occupatum, qui immisiss in frigidam aquam pedibus & aliam quandiu in ea detentis preclaram opem tulit. Alium item uidi qui ostreorum carminibus cum argenti spuma & uiridibus hyoscyami folijs ac oleo ueteri diligenter tritis utebatur, & tum illinendo eas, tum imponendo probe restitutus est. Licebit autem per ostreorum penuriam, carnibus concharum fluuialium uti. Atque hæc quidem conueniunt, si mediocris inflammatio & ardor adsit. Nam si magna fuerit ad erysipelatorum modum curationem instituemus. Cicutæ nimirum folijs & papaueris ac mandragoræ & hyoscyami adhibitis: quibusdāq; medicamentis compositis stuporem inducentibus, quæ ex papaueris succo & similibus constant. In horum tamen medicamentorum usu immodici caloris deletionem pro scopo habere oportet, quæ sæpe in una cōtingit hora: post quā statim stupefactiuo ablato, cataplasma ex fabacea farina, adipeq; & aqua imponatur. Etenim ubi ea quæ uehementer refrigerant diutius adhæserint, stupor & ægrumq; ac languidum sensum corpori inducunt. Quapropter quum in feruentibus doloribus fuerimus ad stupefacientium usum coacti, postea resouebimus partes per ea quæ calefacere possunt.

Parabilia remedia ad inflammationes non ualde feruentes.

Cap. XXIX

Reliqua ex eorum numero quæ facile parantur, quæq; doloribus non ualde magnis profunt. Palmularum glandulæ sunt, & mali medicæ ramuli, citriū autem ipsam appellant & aureum malum. Quin & fructus ipsius medulla sapore acris, pani aut pollini ammixta in cataplasmatibus commodissima est. Quemadmodum etiam si oleo coquatur & cera sufficienti ad oleum adiecta pedibus imponatur. Commodū est & symphytum per se pro cataplasmate impositum, & cum pane aut cerato permixtum. Et malicorium aceto incoctum, aut aridiū tritum cum pane subactum. His ergo utaris. Optimum autem cataplasma tragacanthicum & hoc est. Cupressi uirgulta teneriora & pilulas in ollam coniecta cum aqua marina donec flaccescant coquito. Deinde in mortariū culinarium trāsumpta, ad cerati formam terendo redigito: & linteolo excepta, dolentibus locis imposito. Hoc cataplasmate quotidie ante somnum utitor, etiam si non adsit dolor, per integrum annum. Nam perfecte ægrum sanat. Mirifice etiam facit cupressi decoctum, si ex eo æger sæpe perfundatur. Aliud. Cypri hoc est ligustri folia uiridia trita in pastillos digerito, usus uero tempore aceto dilutos illinito. Barbari autem Indi arida ipsa folia contusa & cribrata reponunt, usū uero expetente aqua feruenti subigunt, modico etiam aceto adperso, aut rhois culinarij decocto, atque hoc modo inflammato loco imponunt, folijs aucini aut carpasi superstratis, aut si hæc haberi nequeant, brassicæ. Reperies autem mane cataplasma aqua plenum. Sensibilis enim discussio & exhaustio contingit, adeo ut æger exuctionem sensu perceptet, et maxime iuxta ungues. Vitiat tamen colorem, eum ad fuscedinem corrumpens, quapropter aliqui celerrato liquido ungues prælinunt. Aliud cataplasma, quod eadem hora dolores sedat. Cerebrum porci cum amylo & rosaceo tritum, & panniculo infartum imposito, & confestim liberabitur æger, ut deambulare possit. Optime faciunt item maluæ aqua coctæ & tritæ impositæ, celerrime enim dolores sedant.

De stupefacien-

De stupefacientibus medicamentis.

Cap. xxx

Composuerunt medici, quemadmodum praedictum est, ob excellentes dolores, aut etiam ob aegrorum molliciem quos curare cogimur & neque minimum dolorem tolerare possunt, medicamenta stupefacientia appellata. Hec enim nequaquam affectiones ipsas in quibus dolores fiunt, curant: uerum stuporem & sensus hebetationem membris inducendo, quietem quandam doloribus obducunt, quapropter si ad huiusmodi pharmacorum usum, aut ob excellentem dolorum magnitudinem, aut ob immodicam caliditatem erysipelatis consimile, cogamur, utemur quidem modice, quo feruor immodicus refrigeretur, aut sensus oblaesio deleatur. Ad hoc etiam animaduersione habita diligenti, ne quid post uehementis caloris et doloris extinctionem, ex stupefacituo pharmaco in membro permaneat. Sunt autem medicamenta stupefacitua huiusmodi. Asclepiadae epithema dolorem leuans, podagricis & articulari morbo commodum: usus eius est in ipsis exacerbationibus et excellentibus feruoribus inflammationum. Opij dra. iiii, croci dra. i, panis siliginis quantum satis est: unumquodque per se lacte bubulo maceratum terito, & unita imposito. Aut haec ipsa cum lacte trita cerato rosaceo excipimus & utimur. Aliud, quod confestim a doloribus liberat: oportet autem ante pharmaci impositionem aegrum lauare, atque ita exteris locis statim adhibere. Succus absinthij trientem, croci trientem, ceram tantundem, opij unc. i, irini sexuncem, Opium & crocum in passo diluito, & affuso cerato unito ac utitor. Asclepiadae pastillus podagricus, dolorum leuans. Vfus eius competit tempore exacerbationum. Aloes lib. i, centaureae sextantem, thuris trientem, myrrhae trientem, lapidis asij, opij, succi mandragorae, styracis, aluminis scissi, cuiusque sextantem: excipe ac subige passo & ad pastillorum formam reducito. Vsu uero expetente lacte dissolutos cum pinnulis illinito, supra illitum locum lineto imposito passo imbuto.

Vnguenta recalcatoria quae post stupefacitiorum usum adhibentur.

Cap. xxxi

Quum itaque stupefacitiuis usque ad feruoris inflammationum deletionem fuerimus usi, post calefacere membra conuenit cataplasmatibus ex castorio & thapsia compositis: si enim hoc non fecerimus, debilia & intemperata reddita membra perpetuo fluori obnoxia reddemus, & quae in actionibus facile offendentur: quapropter unam atque alteram unguentorum recalcatoriorum compositionem apponam. Ex quorum numero & haec est. Succus thapsiae dra. viii, piperis dra. xiiii, adarces, canchryos, euphorbij recentis, cuiusque dra. xxxii. Si uero recens euphorbium desit, duplum eius sume: staphidis syluestris dra. xii, pyretri drachmas xii, terebinthinae drachmas xvi, cerae drachmas xiiii, olei cypri nilibras vi. Altera, eiusdem usus. Pyretri, castorij, helenij, adarces, piperis, euphorbij, zingiberis, nitri, cerae, singulorum drachmas viii, irini quantum sufficit. Pro pauperibus autem satis faciunt, allia, thymus, origanum, saturia, sinapi, & similia.

Pharmaca & edulia eorum, qui flauae bilis influxu infestantur.

Cap. xxxii

Exhibenda est autem & cyclaminus a flauae bilis influxu infestatis. Huius enim radix quam tenuissime trita cum aqua mulsa aut passo pota, biliosum humorem per sudores excludit. Dandae autem ex ea drachmae quatuor corporibus magnis et robustis, reliquis uero pro uiriū tolerantia. Adiuuare uero oportet sudorum exclusionem corpus calefaciendo & fricando, ita tamen ne affectos locos contingamus.

contingamus. Præbenda quoque in potu ea quæ urinam cient, talia enim bilem per lotium euacuare cōsueuerunt: pastillus item ex seminibus soporifer, & qui à triangulari forma Trigonus appellatur, et cōsimiles, doloribus infestantibus commode à flaua bile affectis exhibentur. Nā et somnus alti soporis inde oboritur, & fluxiones ab ipsis resiccantur, atque id maxime si post corporis per purgatiuum euacuationem exhibeantur. Edulia autē eis apta quæ refrigerant, non tamen humectant: humiditas enim auget fluxiones. Dandum item eis lactuce semen ob somnum conciliandum, & papaueris semen tum in cibo tum in potu. Mala etiam & sorba & mespila præbenda, & quæcunque ad hoc quod refrigerant, fluxus cohibent allationem. Cæterum à uino omnino exacerbationis tempore abstinendum est. Interapedine autem pura reddita parum ex eo concedendum. Porro inedia ab amara bile infestatos extreme lædit: nam bilem acriorem reddit.

Cura eorum qui ob pituitæ influxum
ægotant.

Cap. xxxiii

Horum item curationem à pituitæ euacuatione principiū sumere oportet. Euacuatur autem humor pituitosus per uomitus quidem, nihilominus tamen & inferne per uētem. Vtilis est autem in hac affectione per inferna purgatio, siue iuxta manus siue iuxta pedes hæreat morbus, & multo adhuc magis si iuxta omnes corporis articulos fluxus fuerit dispersus, familiarior enim pituitæ uia & minus periculosa per intestina existit. Si enim in superiorem uentrem uio- lenter adtracta non euacuetur, periculum inducit. Quapropter tutius est ut ad infernam excretionem ducatur. Euacuata enim in una die morbi utcumque inueterati robur contundit, quare in podagra innatum ex pituitoso humore fluxū, & mediocriter affligentem, & qui tum potentia tum actu calidis remedijs delectatur, purgare oportet. Ante purgationem uero modice adstringentibus utendum, atque id magis adeo circa initium fluxionū. Atqui si euacuatio per purgationes fieri non possit, quæ sanè uel sola sæpe sufficit ad affectionem fluidarum curationem: tum inedia & fame utendum est ad plures dies, natura enim pituitosi eam bene tolerare possunt. Utendum etiam confricationibus discusso- rijs ampliusque efficacioribus infusis, & pharmacis cientibus urinam. Cæterum quæ ratione nutrimenti præbentur edulia, natura sicciora sint et minus nutriat, ueluti est oryza succus & bromi, qui inter frumentacea refertur. Noces iugla- des paucæ, pistaciaque & nux thalia, & uua passæ, & capparis ex aceto mullo. Quandoque etiā parui pisciculi in petrosis aquis coaliti, & passeruli mōtani ac- sati præbeantur. Vinum autē præbeatur quā minimum interualli tempore, te- nue, fuluū & uetus. Cataplasmata autē quæ frigidis fluxionibus conueniunt ima- ponenda. In principio quidem terebinthi folia uiridia et tenera cum adipe suil- lo recenti, & rosaceo, modica cera adiecta. Aptæ sunt ipsi et cupressi folia & pi- lulæ uino cocta. Et cyperi radices, & rhamni folia. Post principiū uero pituitos- sis cōuenit ex eruo & lolio ac fœno Græco cataplasma. Quemadmodū etiā ea quæ ex ciceribus constant, aristolochiæ radice trita ammixta, centaureaque & gentiana, & pæonia, & bryoniæ radice ac fructu. Ex amaraci itē coma, & arte- misia, abrotonique folijs et adianto, uitice, lauro, pulegio, samfuco, mēta, brassica, sisymbrio, serpyllo, filice, fœniculo, eruca, & reliquis quæ saporis acris, aut salis, aut amari sunt, et maxime si dolores citra ardorē ex refrigeratiōis sensu sint ob- orti. Singula uero ex his cū pane & adipe recentia pro cataplasmate imponito, quāntū nihil uetet unumquodque per se adhibere. Optimum est etiam fomen- tum

tum ex passo mari mixto apparatus. At uero quinquefolij radicem & malicorijæ qualibus partibus decoctis perfudi ac foui, inquit Archigenes, circundolentes partes. Imò & tritis ipsis magis inflammata loca cataplasmatim modo contexi, atque hoc ipsum multis uelut obluens & resistens remedium dolores expulit, aliquibus autem ut pharmacum nulli inferius ipsos mitigauit, rarissime uero citra commoditatem apparuit. Mansuetissimum uero & hoc est.

Altheæ folia cocta trita tum per se, tum cum polline, aut ordeacea farina imponantur. Ceratum item ex radice eius, quæ hibiscum appellatur, cocta in aqua multa trita, constat autem ceratum ex gleucino aut irino. Imponatur uero his qui tum uehementer calida, tum ualide frigida auersantur, mediocribus autem delectantur. Pharmacum porro conueniens noui, inquit Philagrius, podagricis qui unâ cum doloribus frigoris sensu percelluntur, id quod ex laurino componitur. Quum enim & alia eiusdem generis sint cum ipso, tantam tamen commoditatem à nullo exhibitam scio. Compositio autem hoc modo habet. Pharmacum ex oleo laurino. Cere, adipis suilli ueteris, resine pinus sicca, terebinthina liquidæ, cuiusque drach. xvi. cyprini, laurini, cæsyti, butyri, cuiusque drach. xlviii. galbani, medullæ ceruine, cuiusque drach. xvi. Hoc quidem igitur medicamentum confestim à dolore liberat eos qui in dolore frigoris sensum percellunt. Admirandum etiam in his pharmacum est, quod ex croco constat et galbano, supraque ad sanguineum influxum præscriptum est, & in omni tempore adhibetur. Sunt autem & alia pharmaca his apta. Quemadmodum ea quæ Myrica copæ appellantur, & quæ ex ipsis componuntur cerata, fiunt autem hæc commensurata & proportionata cera ad unguenta ipsa ammixta. Pharmacum ex metallicis. Optimum uero & ipsis pharmacum est ex metallicis ad fauciatos neruos à Galeno apparatus, cuius & nos admirabile periculum fecimus, inquit Philagrius. Quum enim partium quam tenuissimarum sit, ad profundum corpusculorum progreditur, & attenuat, & discutit. Commodum igitur existit in prædicta dispositione post sedatos dolores admotum, aut quum mediocres existunt, non solum enim discutit ut dictum est, sed & repellit. Compositio uero hæc est. Chalcitidis drachmas viii. misyos drachmas xvi. Squamæ æris drachmas xxiiii. thuris drachmas xxiiii. galbani drachmas xii. colophoniae drachmas xvi. ceræ drachmas xvi. olei drachmas cxxviii. aceti acerrimi quantum satis est. Metallica cum aceto in sole æstiuo terito ad plures omnino horas: Deinde thus adijcito, rursusque diu terito, & liquescibilibus liquefactis, refrigeratis, & erasis admixtis unito ac utitur. Pharmacum ex uino & oleo, Galeni. Aliud pharmacum ex oleo & uino Galenicum, conueniens in declinationibus inflammationum, & post easdem omnibus podagricis. Spumæ argenti, drachmas xvi. olei ueteris drachmas cxcii. ad podagricos uero sufficit si anniculum sit oleum, uini ueteris fului pellucidi atque leniter dulcis, drachmas cxcii. Coquito simul ad compagem manus non inquietantem. hic enim est optimus eius apparatus. Nam qui triplum olei accipit diutius coquitur & magis resiccans redditur. Porro in his qui post dolores uehemens frigus percipiunt, aliud Galenicum pharmacum ex euphorbio ad fauciatos neruos descriptum conducit. At uero adhuc pharmacum podagricis commodum, tum in inflammationum remissione, tum post easdem existit, quod Aegyptium appellatur, & quod ex lanis succidis uitis apparatus. Habetur autem inter multæ commoditatis emplastra in xv. Sermone huius tractationis.

Cura

Cura eorum qui ex atra bilis influxu
ægotant.

Cap. xxxiiii

Dicatur aut ex ordine & de atra bilis influxionibus quæ & ipsæ omnino
uniuersali euacuatione præcedente opus habent, hoc est uenæ sectione, aut pur
gatione. Quando quidē igitur ad atrā uergunt bilem, euacuatione per ea quæ
ipsam repurgant, quando uero ad sanguinē atrabile infectū declināt per uenę
sectionem. Si uero ambo hæc simul per totum hominē redundarint, non unū
aliquod ex prædictis adhibere suffecerit, sed præfecta uena, deinde depurga
re cogimur, quod ipsum & in alijs affectionibus duplici euacuatione indigen
tibus erit faciendum. Priusquam igitur totum corpus euacuamus, atq; in ipso
etiam euacuationis tempore, dico sanē in principijs, repulsiuoribus et sensim simul
calefacientibus utendum est. Post euacuationem uero his quæ sensim caleface
re, & attenuare, & discutere possunt utemur. Sunt autem Repulsiua quidē
simulq; leniter calefacientia, terebinthi folia & cupressi, cyperi radices, & simi
lia. Calfacientia autem simulq; attenuatoria & discussoria, bryonia radix & cy
clamini, syluestrisq; cucumeris, & raphani, lauri item folia mollia, & pastina
cæ, & caualidis, sinapis, nasturtij, conyzæ, brassicæ, iridisq; & ocymi & alio
rum innumerorum folia. Ammiscenda autem sunt hæc panī aut cuiuspiam ex
prædictis iam sæpe farinis, & adīpi anserino aut gallinaceo, butyroq; & oſy
po, atq; id maxime in humectis & mollibus corporibus quo leniora reddan
tur. Quin & post huiusmodi pharmacorum impositionem, præscripto ex cro
co pharmaco, & eo quod ex metallicis constat uti cōuenit, ampliusq; quod Ma
charioni inscribitur, & quod Iſis appellatur, similibusq; quorum compositio
nes in xv. Sermonē traditas reperiēs. Etenim huiusmodi pharmaca relictum
in membris humorem concoquunt, eundemq; attenuant & discutunt, ampli
usq; membra debilitata corroborant. Commodissimum autem pharmacum
per interualla exacerbationum dolore non infestante, ad atræ bilis fluxiones
est Corax, quemadmodum etiam pastilli Andronius inquā, & Musæ, & qui
ex centaurea, itemq; qui ex lanis succidis apparatus et consimiles in xiiii. Ser
mone descripti, illinuntur aut cum uino dulci. Miscentur etiam ad præscrip
tum ex croco pharmacum, & ad id quod ex metallicis constat, ita tamen ut parum
quid ex pastillis ad multam pharmaci partem commisceamus, ut uidelicet pa
stilli xii. pars ad unam pharmaci partē addatur, hoc est ad pharmaci lib. i. pa
stilli uncia una. Aliquando autem minus. Quum enim euacuare & discutere
uoluerimus, minus de pastillo adiicimus, corroborare autem & firmitatem
addere, plus. Quod si neq; perfecta neq; absq; dolore sint exacerbationū inter
ualla, panem uino maceratum & sufficienter emollitum ad prædicta medica
menta per interualla ammiscere expedit. Præstans autem est & in his discussio
ria fricationum species uniuersi corporis, præter affectas partes, tum per inter
ualla, tum tempore exacerbationum uehementius & diutius facta, & maxi
me si non fuerint præeuacuatæ.

De his qui ob tenuem fluxum ægotant.

Cap. xxxv

Si serosi sint humores qui ad articulos influunt, non paruum signum te
nuitatis ipsorum est, quod neq; tumorem magnum habeant inflammationes,
neq; diutius durent, imò neq; molestiam aliquam in motibus perpetiuntur æ
gri postquam quieuerint inflammationes. Eorum igitur qui ob tenuem in
fluxum ægotant remedium quod eadem die opem eis fert purgatio est per ea
quæ serosos humores euacuare possunt facta. Fluxiones aut quæ non ita uali
dum

dum dolorem inferunt, saepe in solo irrigationum foci subliterunt, ex oleo uilicet rosaceo & uino dulci suppressa, modica cera ammixta, iisdemque lanis succidis exceptis, additur etiam aliquando nitri spuma. Quin & quod ex cote naxia ex ferri affricu deteritur & in ea congregatur illitum iuuat: Et selinusia terra, & cretica, & famius aster, & lemnia, sphragis appellata, uino & posca, & aceto ac passo diluta, illita eodem modo profuerunt. At uero & caseus recens coactus impositus mediocres inflammationes etiam solus iuuat, & cum polenta, aut farina praesertim ordeacea, Habet enim in se non modo quid repulsorium, sed & discussorium, per quod & tenues fluxiones repellit, & humores in articulis euacuat. Lentisci etiam ramuli teneri & fructus, similiterque myrti & rebinthi, & pisorum, ac quercus, oleae, punicae, mespilorum, cerati, pruni, rubi canini, & rubi, cuius etiam fructus & uirgulta idem operantur, & ut simpliciter dicam, quaecumque res in fructibus, & folijs, & succis, & radicibus aliquid amari, aut acris, aut salis, aut nitrosi habent, simulque cum amaritudinis & acoris omniumque praedictorum moderata qualitate non adeo excellenti, adstringunt: haec mediocres dolores ex fluxione obortos iuuant. Sufficit autem una cum his ad perfectam saepe curam fames ipsa: Quemadmodum etiam clyster omnibus ferè podagricis conuenire uidetur, & maxime in quibus uenter assidue cohibetur. Ruta etiam uiridis & pastinaca uiridis utiliter ipsis pro cataplasmate imponuntur, maxime quibus uenter cohibetur, ampliusque quibus pungitui sunt dolores & inflantes. Ammiscere autem omnibus his expedit adipem, quandoque & polentas, & farinas quasdam, quae haberi possunt: mel item ac passum, & rosaceum, quo humecta & liquida conseruemus. At uero si & fermentum inodi cum hoc tempore ammiscas nihil peccaris. Hoc igitur modo etiam plurima ex hortenlibus tibi commoda fuerint, si ipsa iuxta praedictas qualitates iudicaris, amaram nimirum & salam, acidamque & adstringentem atque acrem, quae omnes sint mediocres. Inuenies autem aliquando & dulcem qualitatem una cum his permixtam in eadem etiam planta. Ea quoque quae in mari nascuntur plarumque talia sunt, utpote quae Lactucae appellantur. Sunt autem germina lata & oblonga ac uiridiora, tenuia & subrugosa, ac ueluti conduplicata ad littora maris per fluctus eiecta. praestantiores autem fiunt cum posca decoctae. Viridia item quae in fuco siue alga tinctoria ad radices sita sunt. Et ad haec quae in petris maris reperiuntur similitudine fungorum, reliquaque germina mollia commendant eodem modo. Omnia enim huiusmodi apte commiscuntur adipibus ac farinis. Quin & torpedo tum marina tum fluuiialis, iuxta alium quendam modum, non in paruis solum sed in magnis quoque inflammationibus congruit. Naturali enim facultate quadam stupore inducit & dolores e corporibus tollit. Quapropter ipsam uiuentem assidue admouere inflammatis locis oportet. Cocta item adhuc uiua in oleo, deindeque extracta, ac modica cera cum oleo eliquata, commodissimum pharmacum omnibus dolore afflictis podagricis redditur. Consimili efficacia uermes terreni appellati praestant, si in oleo coquantur, & cera postea in oleo liquecat.

De fluxionum inter se complexu.

Cap. xxxvi

Quum itaque iam simplicium & immixtarum inter se fluxionum curatio sit relata, nulla difficultas amplius est, etiam mixtarum curam inuenire. Satis enim manifestum est quod ad humorum complexum, consequenter etiam curationes oporteat mixtas esse. Cognitiones autem mixtarum fluxionum ex praedictis simplicibus affectionibus sunt sumendae.

Kk Cura

Cura affectionum ex sanguinis & bilis complexu.

Cap. xxxvii

Si igitur sanguinea & biliosa affectiones concurrant, & propterea tumor magnus & ruber, & quodam modo flauus ac feruidus, membrum fluxione infestatum apprehendat, & dolores nunquam remittentes incumbant, & exacerbatio uehementer quidem alternis & tertio quoque die fiat, benignior autem singulis diebus; omnino sane manifestum puto, quod medicationis initium a uenae sectione primum fiet, consequente exinde biliosi humoris purgatione. Satis constat autem quod & euacuationum tempore repulsorij utemur, quae uidelicet frigida & adstringentis sunt facultatis: Et deinde primum mitigatorij & refrigerantibus quidem utendum, non autem amplius adstringentibus. Adstrictio enim tumorem inspissat ac cogit, ut aegre discuti & resolui possit, si diutius ea utamur, postremum uero etiam his quae concoquere & discutere tumorem possint utendum est. In principio igitur iuxta euacuationum, in quibus, tempus, utile pharmacum eiusmodi affectionibus est ex acacia & ueratri pastillus in mortario plumbeo cum semperuiui, aut plantaginis, aut sanguinarie, aut necionis, aut umbilici ueneris, aut rumicis acuti, aut solani, aut uuae acerbae, aut hyoscyami, aut lactucae succo dilutus. Atqui iuxta augmenta & uigores affectionum, etiam ea quae ad sanguineas affectiones dicta sunt, in cataplasmata ammiscere expedit, succosque item iam relatarum herbarum, & ipsas adeo herbas tritas. Postquam uero seruator inflammationis cessarit, concoquentibus cataplasmatibus & medicamentis utemur: parte etiam affecta uulnibus scarificata, praesertim si appareat tumefacta.

Cura bilis ad pituitam permixtae.

Cap. xxxviii

At uero si pituitosi humores biliosis fluxionibus ammiscantur, siquidem unio & permixtio ipsorum eodem tempore hominem infestet miscere etiam remedia oportet, eorumque multitudinem purgare per ea quae bilem simul & pituitam educere possunt: forinsecus autem cataplasmata imponenda pari aut impari modo permixtis his quae pituitosum & biliosum euacuant fluxum. Etpari quidem modo utraque coniiciemus, quum affligentium humorum mixtura aqua lis fuerit. Impari uero si alter humorum redunderit. Neque uero obliuioni tradenda quod aliqua ipsorum in principio recte adhibentur. Aliqua uero iuxta malum progressum & uigorem. Quaedam uero eo remittente & circa declinationem.

Cura humorum atrae bilis alijs permixtorum.

Cap. xxxix

Eadem etiam methode uteris si atrae bilis fluxiones reliquis fuerint ammixtae, tum iuxta exacerbationum circuitus, tum iuxta continuitatem. Neque enim solum ad affectionum complexus est respiciendum, sed & num assidue & citra remissionem, an iuxta circuitum infestet. Primum quidem igitur & in illis euacuationibus conuenientibus utendum est: Deinde ubi quidem assidue infestauerint, cataplasmatibus sedantibus uti expedit: Vbi uero per circuitum moueantur, instantibus quidem doloribus mitigatoria cura, per interualla uero corroboratoria membrorum utemur. Manifestum autem quod quae magis feruent maiori refrigeratione opus habent: quae minus, minori. Omnia tamen seruentia refrigerare oportet. Quaecumque autem fluxiones pruriginosae fuerint, obtundentibus & discussorij curabuntur. Quaecumque uero mordaces, obtundentibus solis. Et quae in alto sitae sunt, per ea quae tenuium partium existunt, quae uero in superficie, per simpliciora. Omnium autem horum sylum in fine secundi huius tractationis Sermonis praescriptam habes.

Cura

Cura durorum tumorum qui post inflammationes relinquuntur.

Cap. XL

Duri et reluctantes aliquando tumores post inflammationes relinquuntur, qui ex crassis humoribus generationem habent, in corporibus praesertim durioribus, & quae aegre per discussoria exoluuntur, & male curatis. Huiusmodi enim non curati statim seipsis peiores fiunt ad uitae actiones obeundas. Ceterum huiusmodi tumores sedant, pharmacum Machaerionis, & Piscatoris, & Aegyptium, & consimilia. de quibus dicitur xv, Sermonem in pharmacorum multae commoditatis relatione. Dicitur autem & hic ubi ex ordine de tumoribus qui aegre concoquuntur tractabimus, Sunt etiam parabilia pharmaca ad hanc affectionem si ruri uiuamus, fatiuae fici, & syluestris quoque grossi cocti, triti & impositi, tum soli, tum cum quadam ex praedictis farina & adipe. Cyclamini item & cucumeris syluestris radix, & althea bis cocta, & carica pingues, adianton, auena, urtica, bryoniae radix, bulbi anethi, abrotoni, buphthalmi, iridis folia, itemque marrubij, ita ut singula praedicta cum uisco, pice, & sulphure uiuo permisceantur.

De tumorum crudorum & inconcoctilium cura.

Cap. XLI

Crudi tumores ex materia albidior ac lentiore congregantur, diuque durant, neque concoquuntur, neque discuti possunt. Quandoque uero primis quidem discussis loci statim fluxione infestantur, & inaequali magnitudine semper permanent tumores, & in quibusdam sane penitus absque dolore fiunt, in alijs uero dolore quodam comitante. Quandoquidem igitur diuturnos uideris tumores citra dolorem, per discussoria curato, diligenti animaduersione habita ne quid relinquatur induratum, quod incurabile aut aegre ualde curabile reddatur, & maxime ubi callosarum duricierum generationem uideris in articulis futuram. Si igitur citra dolorem uideris crudos tumores, emollientibus ad discussoria amixtis curato, ne quid penitus induratum relinquatur. Si uero cum dolore contingant tumores, non modo discussorijs, sed etiam quae una cum hoc quod discutiunt, lenire possunt, expedit uti. Manifestum autem est quod si fluxus tenuis & modicus cum doloribus quibusdam deferatur, inde tumores post inflammationum remissiones oboriatur & infestent, atque id maxime in his evenit qui delicatius uiuunt, aut frequenter lauantur, aut plus quam oporteat inambulāt, uel etiam rebus uenericis utuntur. Oportet igitur in his ad tumefacta imponere pharmacum ex salicibus, ita ut adglutinari possit apparatus: aut quod ex aspidibus constat ad strumosos destinatum, aut aliquod consimile: praesertim quum sensus aegris adest iuxta coxendicem aut femur, tanquam aliquid ad inferiora deferatur: quumque dicunt se affici uelut formicas repentes sentiant, doletque, & iam refrigeratur, iam calescit membrum. Quin & lauantes per simegmata ex adarce, alcyonio, & pipere defricare oportet. Adstringentia igitur sunt simulque discussoria pharmaca, quibus necessario utimur ad crudos & dolentes tumores, uelut symphytum petraeum, terebinthi uirgulta, scolopendrium uiride, cyperos, & similia de quibus saepe dictum est, cum pane multo & rosaceo permixta, praesertim in his qui humido & albo corporis habitu sunt praediti. Ex compositis autem conuenit eis pharmacum ex succis quod cum uino flauo & subadstringente est emollitum, & Galeni phenicinum cum multo rosaceo liquefactum, & locis liquidius impositum. Ceterum in tumoribus citra dolorem conueniunt adiantum uiride, folia urticae, altheae, chamamelum, uua passa pinguis, sertula campana, melissophilon, lauer, citrij exterior cortex, & similia: Ad quae singula cicerum & lupinorum fa-

Kk 2 rinae, &

rinæ, & panis, & olei ueteris ac sicyonij, & adipis suilli ueteris, tantū ammiscen-
dum est, ut mollis ad tactum compositio reddatur, & morsum nullum ad mem-
brum accedere permittat. Ex compositis autem pharmacis conueniunt his, id
quod ex croco & galbano cōstat, & quod ex liquecibilibus apparatur ac mox
referetur: Et Macharionis, & Piscatoris, cum cerato ex oleo Sicyonio aut ali-
quo cōsimili liquefacta. Atq; hæc quidem in mollioribus corporibus adhiben-
tur. In durioribus autē & quibus tumores nō dolitant, conueniunt uiticis folia,
præsertim arida, & amaracū, amarātum, ari & arifarī radix, smyrnium, altheæ
radix, elaphoboscum, ericæ folia, scœniculi folia, filix, sisymbrium, scandix, eru-
cæ folia & sinapis uiridis. Composita autem cōueniunt tum prædicta citra ce-
rati ammixtionem, tum līs, & Aphrodite appellatæ, & alia infinita iisdem ui-
ribus prædita. Huiusmodi autem pharmaca unā cum hoc quod tumores exol-
uunt, etiā fluxiones naturę suę aptitudine repellunt: Quod ipsum etiā pro
be faciunt cupressi pilulæ uirides cum uino coctæ, prædictorum leguminum fa-
rinis & suillo adipe ammixtis, quandoq; uero & lauri ramuli, & rubi folia, & si-
milīa ammiscentur. Efficaciora autem prædictis sunt, & agrestioribus corpori-
bus ac tumoribus qui agerrimē cōcoquuntur conuenientissima, abrotonum,
ammoniacum thymiamia, anemonarum radices & hastulæ regiæ, bryoniæ ra-
dix, pulegium, dracunculi radix, bdellium, buphrthalmum, gentianæ radix, &
myrobalanus. His autem adhuc fortiora sunt capparī folia, glastum, betonica,
cyclamini radix, brassicæ ustæ cinis, ruta, panaces uiride, peucedani radix, scil-
la, sici syluestris fructus, trifolium asphaltites, trixago, sulphur, pix. Addatur au-
tem singulis prædictis panis & adeps, aut prædictorum leguminū farinę, quā-
doq; etiā caricæ. In quibus omnibus scopum tibi prepositum habeas, ut citra
partis affectæ combustionem & afflictionem curam facias: quapropter etiā
necessaria est prædictarum farinarum, itemq; adipum admixtio. Tantum au-
tem commiscere ex eis oportet, quantum uehementem uniuscuiusq; uim obui-
dere uolumus. Ammiscendus autem est non solum adeps suillus, sed & capri-
nus, & uitulinus, & taurinus, ceruinus & anserinus: Medullæ item omnes am-
miscendæ habito naturæ curandi corporis respectu. Et cochleæ unā cum testis
tritæ, & sine alterius rei admixtione, aut caprino stercore cum aceto trito am-
mixto impositæ, tumores laxos & molles destruunt & adstringunt, qui sanē ex
lentis & crassis humoribus oboriuntur. Porro operæ precium duxi admonere,
diligenti animaduersione opus esse, ne clām te indurata aliqua tumoris pars re-
linquatur, quod sanē ubi uideris factum, his quæ fortiter emollire possunt ute-
ris, respectu simul ad habitum corporis habito. Ex malagmatibus autem ue-
tissimum est Leucio inscriptum ad articulos distortos.

Malagmata diuersa, in quibus etiā Lucij malagma est, ad articulorū
distortiones destinatum. Cap. XLII

Malagma Lucij ad articulos distortos inscriptum, facit ad thoracis affectio-
nes & abscessus in profundo, ad neruos contractos, & articulos stupore occu-
patos. Latini distortionēs & Græce ancyas appellamus. facit opisthotonicis,
& ad omnem neruorum per consensum affectionem: Ad neruorum item lassi-
tudinem acopon egregium est irino aut cyprino dissolutum. Bdellij, adipis ui-
tulini, ammoniaci thymiamatis, iridis, cuiusq; sextantem, opopanax, galbanū,
canchryos, thuris, styracis, cuiusq; drach. viii, pipēris grana clxx, ceræ sexun-
cem, terebinthinæ sex uncem, fecis unguenti irini aut cyprini sextantem & un-
ciæ dimidium, uini quantum sufficit. Ammoniacum, opopanax, thus, cerito
cum

cum aceto, liquefabilia uero liquefacito, & ab igne ablatis sicca inspergito: deinde etiam trita ipsis adijcito, & unita in mortarium diffundito, ac fortiter emollito, extractisq; utitor. Optimum est etiam eis ex pice brutia Galenicum pharmacum ad rabidi canis morsum descriptum. Habet autem hoc modo, Picis brutiae libram I, opopanax quadrantem, aceti acerrimi drach. I. apparato quemadmodum de rabidi canis morfu praedictum est Sermone sexto. Aliud pharmacum ex liquefiscibilibus, Galenicum. Quod concoquit simul & attenuat tumores. Quo sane in mollibus corporibus uel solo utendum, In durioribus uero ammiscendum est ei id quod ex metallicis constat ad sauciatos nervos destinatum, ita ut mixtura ubilibet iuxta corporum & affectionum naturam fiat. Habet autem hoc modo, Opopanax, unc. I, terebinthinae chia, unc. I, propolis tenerae, quadrantem. Si uero propolis tenera non sit, admiscebis terebinthinae trientem: quod si neq; in totum propolis haberi possit, conijcito picis brutiae sex uncem, Opopanax in aceto albo contere. Hoc pharmacum praedictos tumores concoquit, & humores in alto sitos adtrahit, diffecat, & repurgat. Ceterum quod ex metallicis constat item Galenicum ad sauciatos nervos destinatum hoc modo habet, Chalcitidis, misyos, aeruginis usta, cuiusq; drachm. VIIII, colophoniae beffem, squamae aeris drach. XXIIII, cerae drach. XCVI, olei drach. CXXVIII, resinae drach. XVI, galbani drach. XII, aceti quantum sufficit. Chalcitin, misy, aeruginem, eris squamam cum aceto in sole estiuo cotere ad plures horas, & liquefiscibilibus liquefactis & affusis, uni, emolli, ac utere. Aliud Galenicum. Ad eos qui tenerum corpus habent & nervis sauci sunt descriptum. Chalcitidis usta, misyos usta, cuiusq; drach. VIIII, Squamae aeris drach. CXXII, thuris drachm. CXXII, cerae drach. XCVI, olei drach. CXXVIII, resinae drach. XVI, galbani drach. XII, aceti quod satis est: Apparato ut dictum est. His itaq; pharmacis utemur per se ubi dolores ex profundo dissolvere uelimus, Miscebimus autem pharmacum ex liquefiscibilibus constans ubi tumores fuerint obdurati. Malagma ad podagricos & articulorum morbos ualde generosum. Liberat a tota affectione, usus eius est per exacerbationum interualla. Cerae lib. I, terebinthinae lib. I, spumae nitri sex uncem, floris lapidis asij sex uncem. Thuris sex uncem, olei cyprini lib. I, lixiui coactiliariorum, siue pileariorum, quantum sufficit. Arida contundito, cribrato, & cum lixiui ad liquidi cerati crassitudinem terito, & liquefabilia liquefacta tritis affundito, unito ac utitor. Aliud. Calcis uiuae, thuris, cuiusq; drach. IIII, terebinthinae drach. IIII, ammoniaci thymiamatis drach. IIII, spumae nitri drach. IIII, adipis taurini drach. VIII, floris lapidis asij drach. II, cerae trientem, olei trientem, liquefabilia liquefacito & cum siccis unito ac utitor. Valde praclarum est. Resorbet collectiones circa articulos congregatas, & a doloribus uindicat. Aliud, quod in totum ab omni affectione liberat. Seminis cicutae, comae centaureae, iridis illyricae, agarici, cardamomi, foenigraci, corticis radice mandragorae, singulorum sextantem, terebinthinae lib. I, olei ueteris, sex uncem, ungeti syriaci, aut falca appellati, sex uncem, Terebinthinam cum oleo ueteri modice coquito, deinde unguentum addito, & ablatis ab igne arida trita inspergito & unito, emollitaq; in uas creum aut stanneum reponito, uase tamen prius ex ungento malabathrino siue foliato illito. Hoc pharmacum crassos & mucosos humores trahit per obscuros meatus. Aliud ad eos qui a nativitate articulare morbum contraxerunt. Vtpote quibus genua, humeri, cubiti, & reliqui articuli dolitant. Cerae, colophoniae, resinae pinus, cuiusq; sex uncem, terebinthinae unc. I, foeni graeci sicci cotusi & cribrati trientem, Cyprini trientem aut

Kk 3 tem aut

tem aut quantum satis est. Eliquatis liquefcibilibus foetum græcū inſpergē,
& utere. Aliud Ceratum ad articulare morbum pulchrum. Cere adips
porcini, colophonix, refinæ pinus, cuiusq; lib. ii, butyri lib. i, terebinthinæ lib. i,
galbani trientem, adipis taurini, lib. ii, œſypi lib. i. Liquefac, percola & adſerua.
Uſus uero tempore ungento nardino diſſolue aut etiā gleucino, & linteolo
exceptum impone. Aliud ad articulorum morbum & podagricos. Vt præ
admiratione conſterneris. Cere, drach. c, roſacei drach. c, foliorum ſideritidis
tenerorum drach. c, ſtyracis drach. xx, thuris drach. viii, nitri drach. viii, mā
næ drach. x. Liquefacta cum reliquis tritis unito, ac utitor. Sunt autem & alia
quā plurima pharmaca quæ tumores tollere poſſunt poſt inflammatioē ad
hibita: Maxime uero omnium quod ex aſpidibus cōſtat ad ſtrumas deſcriptū
facit ad eos quibus laxi tumoris magnitudinem detrahere uolumus: Subueſcit
enim quā plurimum tumores laxos, itemq; duſos eoſq; ſimul diſſundit. Con
ſtringit autem & condenſat articulos præclare omnino ſi quod ex ſalicibus cō
ſtat ei ammiſceatur. Ego autem, inquit Philagrius, penuria pharmacōū ex me
tallicis præſcriptorum, id quod ex ſalicibus apparatur ammiſcui & maxime
re profeci articulis inde conſtrictis, denſatisq; ac corroboratis, obfirmato uide
licet fluxionum humore prius euacuato. Licebit autem ſi quis ruri uiuat & præ
dictis pharmacis careat, ex adipe qui ad manum ſit, & arida pice cum refinā pi
nus, aut etiā alia refinā quæ haberi poſſit, pharmacum in cerati formā appa
rare, ipſiq; chalcanti quantum uililbet recte habere uidebitur ammiſcere: Sa
lem item ac myſi, auripigmentum, & ſimilia: Quin & uiſcum & irin, ariſto
chias, præoniā, peucedanum, gentianā, centaureā, artemiſiā, thymum,
origanum, nitrum, nitri ſpumam, thus, myrrham, ſtyracē, propolin, maſtiſchen,
ac alia innumera his conſimilia licebit reperire, indeq; pharmaca tumores con
ſtringentia componere, quemadmodum nos fecimus non paucies cōmunibus
ad podagricos & articulorum morbos pharmacis inde apparatis. Philagri
pharmacum ex nitro et oleo. Nitrum accipito friabile et nihil calculoſum in
ſe habens, idq; ipſum quā tenuiſſime terito, olei tantum ad ipſum in mortariū
affundens quo trita ſimul ad mellis craſſitudinem redigantur: atq; ubi ſatis diu
contriueris cacabo excepta, ad lentum ignem non ſumantem coquito, aſſidue
agitādo donec ad bonā compagem reducantur, animaduerſione habita ne
liquidius pharmacum relinquatur, quod ubi contigerit, pharmacum penitus
liquidum euadit, & neque in poſterum inſpiſſatur, niſi multā aliam ſuſtineat
coctionem, quæ uim eius ſicciorē, & ob id affectis dolore membris inutilem
reddit. Probare autem eius compagem tempore coctionis oportet, ad teſtam
aridā ipſum deſtillando, teſta non prius humectata, quemadmodum in alijs
pharmacis facere ſolemus. Reſoluitur enim nitrum per aquæ contactum. Sit
aut oleum quod nitro affunditur dulciſſimū, tenuium partium aut roſaceū, aut
chamæmelinum, aut anethinum, aut uetus, aut cicinum, aut ſicyonium. Quan
doq; etiā chamæmeli humidæ ſiue aridæ, aut iridis tenuiſſime tritæ, aut ariſto
lochix, aut alicuius cōſimilis partem ammiſcere prodeſt. Si quidem aut repelle
re ſimul ac diſcutere uelimus, aut etiā calidos dolores curare, cū roſaceo ipſum
pharmacū coquemus, aceto quādoq; in coctiōe aut modico paſſo aſſuſo. Si ue
ro ampliſ diſcutere uelimus cum aliquo alio oleo coquemus, ammixtis etiā
quibuſdā præſcriptorum aridorū, iuxta habitū uidelicet curadi corporis & cō
pagem ipſius tumoris. Hoc ſanē pharmacū dolores in alto obortos quā celer
rime ſanat, atq; id eo magis ſi nō bilioſum ſit, neq; multū calidum quod inſiſtit,
Neque

Necq; uero solum podagricos dolores ex professo iuuat, uerum etiā eos qui tales non sunt, sed ex fluxionibus cōgregati & discussione alias resistentes. Vtimur itaq; ipso si post sedatas inflammationes dolores in alto permaneāt. Pharmacū ex urina Bordonis, hoc est, muli apparatus. Attrahit quidem hoc priore prestantius. Conuenit autem magis crassis & crudis fluxionibus, praesertim si cum chamamelo uiridi uel sola, uel cum adipe porcino recēti, fuerint prius cataplasmatīs modo contectae: cum arida uero itidem eodē adipe ammixto, ampliusq; farina fabacea, aqua & oleo ac modico passo adiectis. Quin & ipsa anthemis, quae & chamamelon dicitur, ualde calidos dolores & inflammationes maxime pere ex natura sua iuuat, statim post uigorem adhibita. Etenim cutem rarefacit & attenuat moderate, & biliosos humores transpirare facit, adeo ut huiusmodi inflammationes etiam sola, nihil ex attenuatorijs & incisorijs, ueluti est artemisia, & aristolochia, & calaminthe, & alia infinita, admixtum habens, curet. Hoc itaq; pharmacū ex argenti spuma & urina apparatus, de quo sanē sermonem institui, scio quosdam circa totius affectionis uigorem, non modo iuxta particulares exacerbationes, aliquando uero & augmenti tempore, ad dolentes locos pro cataplasmate imposuisse, humoresq; forinsecus extraxisse, & tumores quidem maiores reddidisse, dolores tamen omnino sedasse ac extirpasse. Ceterum odor ipsius intolerabilis est eis qui tenero olfactus sensu praediti sunt. Compositio uero talis est. Urinē muli masculi nō castrati, sextarios Italicos IIII. spumae argenti, lib. II. Spumam argenti tenuissime tritam in mortario habeto, eiq; urinam affundito, ad solem uidelicet aestiuum exposita paulatim urinam instillato, & postquam ad mellis spissitudinem peruenerit, urina scilicet consumpta, olei unc. XXIII. addito, adipis porcini ueteris unc. XVI. & usq; quo nō amplius inquinari manus coquito. Vfus uero tempore linteolo exceptum imposito. Oribasius autem axungiae lib. I. coniecit, & medullae ceruinæ nō salsae, bessem, & mellis, lib. III. reliqua uero eodē modo. Scribunt porro quidā proprii muli urinā accipiendam esse. Resistit enim & obluatur morbo ex natura sua hoc animal. Efficacius autem aiunt, reddetur si quis dum coquitur ipsa semel incacabur, & quatuor, & semel in terram. Atq; haec cum quibusdam barbaris nominibus intueri licet adscripta, quae sanē curiosam penitus habent scripturā, atq; ob id superfluum & indecorum mihi uisum est, inquit Philagrius, ea adscribere. Etenim citra eorum nominum incentionem ac nomenclaturā, ipsum pharmacum apparatus, eodem modo efficax est, sicut id quod cum nominibus praeparatur. Hippione Philagrii. Hippione uero hoc modo apparatus. Anethi uiridis, unc. XVI. scillae recentis sex uncem, olei omphacini septuncem ac uncie dimidium, aquae sextarios III. Anethum & scillam in aqua & oleo ad triduum macerato, deinde donec aqua consumatur coquito, & percolato oleo ceræ nouae lib. II. adijcito medullae ceruinæ libram I. aut si haec non adsit, adipis ceruini libram unam. adparato & utitor.

Cerata podagrica.

Cap. XLIII

Ceratum ex succo senecionis ualde pulchrum. Ceræ, libram unam, olei chamamelini, dodrantem, adipis porcini recentis, sex uncem, croci, drachmas quatuor. Crocum cum succo senecionis terito, liquefabilia autem liquefacto, percolato, & succi quantum expedit paulatim instillato, fortiterque agitato, atque ubi refrigerint, ad crocum tritum adijcito, & subacta unito, ac utitor. Ceratum dolorem leuans, ad inflammationes in uigore constitutas. Appellatur autem Manus Asclepiadae. Facit ad excellenter inflammata;

Kk 4 eadem

eadem hora liberans citra dilationē. Succī hastulæ regiæ, cyathos IIII, succi so-
 lani, cyath. IIII, succi bupthalmi, cyath. IIII, succi perdicij cyat. IIII, cere, butyri
 recentis, axungia, medullę uitulins, calcis uiuæ, cuiusq; quadrantē, terræ cimo-
 liæ, drach. XII, terræ samia, drac. XII, sandarachæ, drach. XII, nitri bernicarij,
 spumę nitri, cuiusq; drac. XII, fecis uini uste, drac. XII, glutinis chartarū, hoc est
 pollinis cocti, drach. XII, olei boni lib. III. appa & utere. Aliud ad præ-
 scripta itē efficax. Cera, colophonix, adipis anserini, cerusæ, cuiusque
 drach. XVI, picis drach. IIII, succi brassicæ, cyathi dimidium, succi foeni græci,
 cyathi dimidium, succi seminis lini, cyathi dimidium, succi stratiotæ, cyathi di-
 midiu, succi sertulæ campanæ, cyathi dimidium, lactis bubuli, cyathi dimidiū,
 oua gallinarum numero IIII, olei, libras II. Ex his cerata duo facito, eaq; unā
 cum eis quæ Aegyptia inscribuntur in promptu habeto, quæ pauci adeo homi-
 nes habent, apparato confidenter, nulliq; reuelato & plus quā hominis no-
 men assequeris. Podagricum aliud ceratum approbatissimum. Facit
 ad inflammationes & dolores, etiam in principijs impositum celerrime sanat,
 & nervos arefactos emollit, adeo ut quidam ei hanc facultatem inesse non cre-
 dant, dissoluit & pedum nodosos tumores condylomata græcis appellata. Olei
 cicini, lib. II, succi mandragoræ, drach. XXXII, succi artemisiæ, drach. XXXII,
 succi rumicis, drachm. XXXIIII, resinæ pinus, drachmas XLVIII, terebinthinæ,
 drach. XLVIII, adipis anserini, drach. XLVIII, succi rubi, drach. XVI, butyri re-
 centis drach. XLVIII, lycij indicis drach. XXXIIII, sanguinis hircini sicci drach.
 XVI, lachrymæ hederæ drachmas XXXII, galbani drachmas XLVIII, opopa-
 naxis drachmas XXXII. Lycium & sanguinem hircinum & panacis succum
 cum modico uino terito, & affusis succis, siquidem liquidi affuerint, aut siccis,
 si illi haberi nequeant, unito, liquefabilia autem liquefacito eisq; trita adjicito,
 & ad lentum ignem coquito spatula assidue agitando donec cogantur. Cera
 terum ligna quæ ad coctionem eorum suburuntur arida uitis *fermenta esse o-*
porter. Ceratum podagricum ex bryonia. Egrege facit ad omnes inflam-
 mationes & dolores articularum. Hac usus & in uigore & in remissione succi
 sum & gloriam reperi. Reperies enim inflammatas partes corrumpi & citra
 dolorem. Frequenti experimento nobis cognitum est: nam multos eos seruau-
 mus. Radicis cucumeris syluestris drachmas CCCCXLXVI, scillæ mundæ
 drachmas CCCCXXX, radicis hastulæ regiæ drachmas CXLIII, olei rapha-
 nini drachmas CCCCXCXVII, ceræ drachmas CXLIII, galbani drachmas
 XLVIII. Herbas omnes in aqua sufficiente per triduum madesacito, singulis
 diebus bis ipsas sensim agitando. Deinde affuso oleo, coquito donec oleum so-
 lum relinquatur ad lentum omnino ignem, percolato deinde, & ceram ac gal-
 banum in mortario diligenter trita & emollita addito. Quibus omnibus po-
 stemū liquefactis, & ab igne ablatis utitor ad omnes doloris affectiones. Hoc
 etiam ad uiscerum diurnas inflammationes sum usus. Ceratum in mul-
 tis approbatum, ad inflammationes pedum, discutiens citra dolorem. Vtere eo
 in uigoribus, & magis in declinationibus. Olei anethini quincuncē, chamæ-
 melini quincuncē, butyri quincuncē, adipis anserini quadrantē, farinæ lupino-
 rum sextantē & dimidiū uncia. Liquefacito & agitando refrigerato, in morta-
 riūq; infundito, terito, & ouorū quinq; crocea singulatim inijcito. Deinde & lu-
 pinorum farinā inspergito, unito, utitor. Ceratū Iacobi Psychriste, ad seruen-
 tes pedū inflammationes Cera albæ sexuncē, rosacei recētis unc. X, ouorum
 quinq; candida, aquæ septuncem & uncia dimidiū, Ceratum ad prunas lique-
 facito

facito, & diligenter agitando refrigerato, deinde in mortarium fundito, & adiectis singulatim ouorū candidis terito, postremum instillata sensim aqua omnia rite unito, & noua olla sufficienter praelora excipito, & infusa aqua pura finito, quotidie aquam permutando.

Vnguenta, & acopa diuersa ad podagricos, articulorū dolores, ischia-

dicos, membrīs exolutos, & trementes. Cap. XLIIII

Vnguentum Asclepiadæ. Facit podagricis, articulorum doloribus, & ad omnem neruorum per consensum affectionem. Vini ueteris sextarios duos, lanarum succidarum ex locis sub alis libram unam, spumæ niri libram unam. Lanæ succidas in uino per triduum madefacito, deinde expresso liquore, spumā niri tenuissime tritam inijcito, dissoluitoque, ac olei libras duas addito, & conuassata in uitreum uas reponito, & utitor, quotidie agitans & ex eo illiniens locos affectos a somno, & ante balneum, & post balneum, & a cœna.

Aliud unguentum ex sale: podagricos a tota affectione liberat. Salis sordidi, hoc est ipsius terræ libram unam, aluminis scissi libram unam, fecis uini ueteris sextarium unum, floris lapidis asij trientem. Arida sigillatim unumquodque per se diligenter terito, deinde etiam fecem adijcito, simulq; terito, & ad trita demum olei ueteris sextarios duos affundito, conuassato, reponito, ac utitor. Quidam etiam mellis libram unam addunt. Aliud itidem, Ascle-

piadæ. Thuris quadrantem, ammoniaci thymiamatis, zingiberis, piperis, salis sordidi, floris lapidis asij, aluminis scissi, cuiusque unciam unam, galbani unciam unam, opopanacis sesquunciam, terebinthinæ quadrantem, olei cypri ni, laurini, samfucini, & ceræ, singulorum sex uncem, aceti quantum satis est ad ea quæ dissoluere oportet. Vtere in frigidioribus. Aliud optimum. Spumam niri albam cum oleo ueteri terito, eoq; locos affricato, & miraberis.

Aliud, Asclepiadæ. Vini ueteris sextarios tres, olei ueteris sextarios duos, uirgultorum lauri libram unam, foliorum tenerorum aut pilularum cupressi teneriorum libram unam, ceræ libram unam, galbani unciam unam, sanguinis testudinis terrestres satis largam copiam. Herbas in aceto macerato, deinde conuassato, & ad decoctum liquefacta reliqua addito ac unito, & sanguinem testudinis recenti affuso conuassato, & utitor. Olei gleucini præparatio.

Oleum gleucinum dolores & lassitudines neruorum quàm maxime sedans. Habet enim uim calefactoriam relaxantem: facit ad affectiones uulvæ, & ad omnem neruorum per consensum affectionem. Facit ad rigores per circuitum repetentes, quotidianæ præsertim & quartanæ febris. Omni enim acopo præstantius est. Maxime autem facit ad eos qui tum retro tum ante distendantur, opisthotonicos & emprosthotonicos Græcis appellatos, si calidum purislanis exceptum locis imponatur. Compositio eius hoc modo habet.

Olei omphacini primarij libras CCL. vini falerni ueteris odorati sextarios quinquaginta italicos: musti ex uua aminæa, hoc est adstringente alba sextarios italicos centum quinquaginta, olei libras duodecim, aspalathi libras quinque, spathæ unguentariæ quam palmam elateri appellant libras quinque, hedydari hoc est seminis pelecini sesquilibram, artemisiæ libras duas & semissem, cypri libras duas & semissem, piperis sesquilibram, musci qui splanchnon & hypnon & bryon Græcis appellatur libras duas & semissem, xylobalsami libras duas & semissem, asari libras duas & semissem, cassiæ nigre libras duas & semissem, carpobalsami, scenigræci, cuiusq; lib. II. & semissem, foliorū myrti aridorū detentanrem, rosamarinis sicce lib. V. calami aromatici libras quinque, iunci odorati floris

floris libras quinque, thuris libras quinque, crocomagmatis primarij libras quinque, nardi celtici libras quinque, zingiberis libras tres, quidam uero libram unam & quadrantem, aristolochiae longae libram unam & quadrantem, styracis pinquis libram unam & quadrantem, cassiae fuluae libram unam & quadrantem, ladanij, seminis cardamomi, amomi, radicis panacis, meliloti, samfuci, cuiusque libram unam & quadrantem, bdellij sesquilibram, croci libram i. & bessum, costam libram unam & bessum, rosarum siccarum libram unam & quadrantem, opobalsami uascula parua quinque, hoc est bessum, hoc est heminae tertias partes duas, unguenti malabathrini libram unam. Arida contundito, & rariore cribro excutito, omniaque uino ueteri macerata. Bdellium autem & ladanum praemacerata in pila terito, & ad arida prius macerata adijcito. Sit autem uas unguentarium stanneum, quod diligenter opertum ad dies & noctes duas finito. Deinde unam flaccidam, ita ut nihil roris ei adhaereat accipito, ac pure exprimito, & ex acinis excolato, inque aliud uas stanno illustratum ipsum mustum infundito. Sit autem magnum uas & capax: quo etiam ad ebullitionem multum locus amplius supersit. Deinde omnia in ueteri uino macerata, itemque oleum ipsum in mustum inijcito, & spatha unguentaria bis per diem agitato. uerum spatham diligenter detergere oportet, ne quod adheret ei acidum factum pharmacum corrumpt. Ceterum uas ipsum operculo & pallijs pluribus superne contegatur, & diligenter obligetur, supponaturque uasi circulus ex quacunque materia qui ipsum sustentet. Quum uero dies quindecim praeterierint, amomum contusum inijciatur, rursumque ut dictum est agitetur. Trigesima autem die in diplomate coquito, atque ubi ter uel quater efferbuerint ab igne ablatis statim opobalsamum indito, agitataque & probe contecta tepescieri finito. Deinde totum oleum testa excipito: fecem autem, hoc est calida per sportulas primum manibus, postea etiam praelo exprimito, & abiectis rebus instar feni exiccatis, unguentum per se curato: malabathrinum uidelicet unguentum in diplomate in aqua calida praetepes factum ei adijcito, cum spatha agitato, & probe unito, & per biduum consistere finito, ac mundis testulis excipito: indeque in uasa uitrea transferens reponito. Quidam etiam ammoniaci thymiamatis lib. i. & quadrantem adijciunt. Acopon ex abiete apparatus. Abietis semen maxime maturum circa Septembrem est mensis. Verum quocumque anni tempore inijcias, ipsum semen oleo inijcere oportet: praestat tamen si prius contusum inijcias, & per dies quadraginta sinas. Nos autem, inquit Galenus, etiam ad tres & quatuor menses permisimus macerari: deinde liquore seminis expresso, ipsum oleum semen abiecimus, oleum uero per linteolum excolauimus. Sit autem oleum dulcissimum, & ad libras olei uiginti quinque, seminis modius italicus unus inijciatur. Itaque ubi oleum ut dictum est, excolaueris, ac semen segregaueris, cereae libras iiii. terebinthinae chiae bessum ei adijcito, & modice quo uniantur calefacito, excipito ac utitor. Hoc pharmacum conuenientissimum est ad omnes spontaneas lassitudines, itemque non spontaneas, & ad neruorum per consensum affectiones. Eo uti conuenit ad eos qui iuxta carnem atque omnem corporis molem crudos humores congregarunt, siue concoctione, siue discussione opus habeant. Acopon ex populo nigra. Bonum est etiam acopum, quod ex populi nigrae floribus componitur. Estque huiusmodi. Ad florum populi nigrae iam iam prodeuntium modium unum, olei dulcissimi libras uiginti inijciuntur. Melius tamen fuerit, si flos moderate contusus oleo inijciatur. Exponatur autem ad solem, & singulis diebus agitetur, & in domum calidam

calidam deponatur. Post menses autem tres florem exprimito, ipsumque abijci-
to. Oleum uero ut acrimoniam arcens, & lenissimum, & discolorium adserua-
to: ueluti id quod ex abietis semine est apparatū. At uero & terebinthinae sex-
uncem iniicere licet, aut minus, aliquando item parum ceræ, quidam enim ma-
xime liquidorum medicaminum usu gaudent, quidam uero crassiorum. Hæc
autem pharmaca crudos iuxta carnem & cutem humores discutere possunt,
præsertim non ualde crassos, neque uiscosos. Quod si quis confestim & necessita-
te moram omnem excludente apparare cogatur, semen ipsum in oleum conij-
cere oportet, & in diplomate coquere. Infundere autem ad oleum in decoque-
do tantum aquæ aut uini quantum consumi potest, ut tamen quadruplum aut
quintuplum oleum extet. Oleum samfucinum. Samfucinum etiam
oleum eodem modo apparatur. Conuenit autem tempore hyberno, & in re-
gione frigida, & cōstitutione aeris frigida. Potest & ad hoc ceræ & resinæ quip-
piam addi, si corporibus ex eo illitis, diutius ipsum adhærere uelis. Acopon
unguentum Marciaton. Vnguentum Marciaton præclarum ad articularū
morbos & corporis languores ac resolutiones. Styracis primarij flauj trien-
tem, medullæ ceruinæ sextantem, ceræ albiſſimæ quadrantem, mastiches purg-
quadrantem, terebinthinae chîæ unc. i. œſſypî unciam i. opobalsami unc. i. olei
omphacini, unguenti nardini cuiusque sexuncem. Styracem in pila contun-
de, opobalsamo paulatim instillato, deinde liqueſcibilia liquefacito & percola-
to, eisque styracem iniicito: quo liquefacto in mortariū omnia transferto, & pi-
ſtillo donec quàm albiſſimum fiat terito, ac utitor. Vnguentum Orchestæ, si
ue Saltatoris, dolores remittens ac relaxans, ischiadicis ac arthriticis commo-
dum, multo experimento cognitum. Hoc Saltator quum gymnasiarum con-
suetudinem reliquisset, & in articulare morbum incidisset, usus sanatus est.
Cuius item periculum in multis alijs factum est. Habet autem hoc modo.
Altheæ, seminis lini, ſœnigræci, rutæ, fabæ, singulorum libr. ii. Hæc in aqua
maſſeſacta, & tertio die poſt cocta, ut quàm crassiſſimus eorum liquor fiat, per-
colato: & ſucci quidem excolati lib. iiii. cōſſicito, olei uero ueteris, medullæ cer-
uinæ, opobalsami, adipis anſerini, unguenti nardini, singulorum libras duas,
ceræ colophonîæ, & resinæ pinus, singulorum libras iii. euphorbij, opopana-
cis, terebinthinae, singulorum libr. i. caſtorei sexuncem, addito, ac utitor confi-
denter. Pentamœron, hoc est quinquimembre unguentum. Styracis un-
ciam unam, mastiches sextantem, ceræ albæ quadrantem, opobalsami trientē,
unguenti nardini quincuncem. Ceram cum nardino super prunas liquefacito,
ſtyracem uero cum opobalsamo terito, & ad ceratum unā cum maſſiſche iniici-
to. Liqueſacta que percolato ac in mortario diligenter terito donec quàm albiſſi-
ma ſiant. Utitor. Decamœron, hoc est decumanum, Oriſaliſij. Spicæ nar-
di, ſoliſij, euphorbij, piperis, coſti, adarces, singulorum unciam unam, maſſiſches
ſeſquunciam, opobalsami quadrantem, ceræ sexuncem, unguenti nardini li-
bram unam. Alia uaria unguenta. Vnguentum ad morbum articula-
rem, & omnem neruorum per conſenſum affectionem, approbatum.

Styracis pinguis unciam unam, ladani pinguis unciam unam, maſſiſches
unciam unam, ceræ sextantem, olei ſicyoniſij quadrantem, adipis anſerini li-
bram unam, utitor. Aliud mirabile. Aſphodeli radicem in super-
to, & ad oleum modicum ſtyracis conſicito, quo eliquato ſycomori ſuccū ad-
dito, & unitis utitor. pedes autem ſi inde illueris confestim dolorem ſedabis.
Aliud

Aliud, per multam experientiam constans, celerrime dolores mitigans. Ad pis hircini recentis lib. ii, heliotropij tria grana habentis foliorum uiridium libram i, ouorum assatorum lutea quinque, rosacei optimi trientem. Vtere.

Aliud. Olei dulcis sextarios quinque, foenigraci sextarios iiii, radicis altheae, maxime uiridium, uerbenacae foliorum, lingulorum fasciculum manipulare, galbani drach. iiii, foenum graecum mundatum & lotum cum uerbenaca & althea ad biduum in aqua madefacito. tertia uero die infusum oleum ad lentum ignem coquito, assidueq; agitato, ne foenum graecum adharescat cabcabo, postquam uero herbae omnem liquorem emiserint, eas extrahito ac oleum percolato, seorsim uero cum modica olei parte galbanum praemollitum liquefacito, percolato, & ad reliquum oleum adijcito. Vtitor sensim & quam plurimum inungendo, facit ad omnem neruorum per consensum affectionem, & dolores a frigore obortos. Aliud ad idem. Medullae e medio scillae quadrantem, seminis cucumeris syluestris quadrantem, foenigraci repurgati sextarium italicum i, anethi uiridis sexuncem, samfuci sextarium italicum i, baccarum lauri sextarium i, fertulae campanae lib. i, cerae lib. i, bulborum cibariorum quadrantem, adipis porcini recentis lib. x, uini ueteris odorati sextarios vi. Omnia in uino ad triduum praemacerato, & deinde adipe liquefacto ad macerata infuso, omnia ad uini consumptionem coquito, exprimito, ac percolato: & reliquis abiectionis, ceram ad adipem liquefacito ac ammisceto: atq; hoc ipso, ut praeter opinionem praestanti utitor. Smegma podagricum. Cerae sexuncem, colophonae sexuncem, succi seminis lini trientem, adipis anserini sextantem, terebinthinae quadrantem & unciae dimidium, olei omphacini dextantem, ammoniaci thymiamatis unciam unam, thuris quadrantem, lactis bubuli quadrantem & unciae dimidium, candida ouorum nouem, Ammoniacum, & thus, cum lacte & succo seminis lini terito, deinde candida ouorum adijcito: liquefabilia autem liquefacito & refrigerato, atq; ad trita ammisceto, & pyxide lignea excipito. Vtitor autem tum pro emplastro, tum pro unguento. Vnguentum Casti ni, ad podagricos & arthriticos, eo sanauit quendam uniuerso corpore languefactatum & exolutum, unice tamen articulorum morbo prodest. Adipis leonini unc. i. adipis ursini lib. i. adipis equini lib. i. adipis uulpis lib. i. castorij sextantem, medullae taurinae sexuncem, medullae ceruiniae quadrantem, adipis struthionis camelii quadrantem, adipis phasianii saginati quadrantem, euphorbij sexuncem, opopanax trientem, mastiches lib. i, styracis trientem, myrrhae trientem, thuris sexuncem, ammoniaci thymiamatis sexuncem, heliotropij tria grana habentis un. i. praenoniae sextantem, artemisiae unc. i, phylli sextantem, nardi celticij sextantem, radicis altheae cotusae & cribratae unc. i, ruta uiridis drac. iiii, radicis cucumeris syluestris unciam unam, hippuris herbe unciam unam, aristolochiae drachm. iiii, aloes lib. i, sanguinis dracunculi libram unam, cerae sexuncem, colophonae sexuncem, unguenti nardini libras octo, olei suffumigabilis libram unam, opobalsami septuncem. Arida quam tenuissime trita in mortarium ad styracem cum opobalsamo & ruta tritum indito, unito, ac utitor sedulo. Vnguentum ex hedera, ad arthriticos, ac omnem musculorum aut neruorum per consensum affectionem. Mirabiliter etiam ischiadicis prodest. Foeni graeci lib. i, baccarum lauri numero centum, pilularum cupressi numero xx, sabiniae lib. i, rosmarinii lib. i, olei dulcis aut ueteris lib. i, cerae lib. i, resinae pinus lib. i, terebinthinae sexuncem, succi hederiae trientem, aquae sextar. iiii. Herbas in crassiores partes contritas ad triduum in aqua macerato, deinde adiecto oleo sufficienter coquito, & percolato,

lato, liquefcibiliaq; liquefacta adfundito. Hederæ autem succum cum aceto diluito. Refrigeratis deinde liquefactis omnia in mortarium diffundito, & quam plurimum diligenter terito, reponito, ac utitor. Acopon ad molestias ex laboribus & fatigationibus obortas, facit & ad neruorū per consensum affectiones, uehementer commodum est. Hoc utor, inquit Asclepiades ad fatigatos. Samfucini sextariū I, rosmarini cōtusi sextariū I, fenigræci sextariū I, cardamomi sextarij dimidium, fabinæ sextarij dimidiū, uini dulcis sextarios VI, olei optimi sextarios III, ceræ lib. II. Arida in uinum coniecta per triduum macerato, deinde affuso oleo ad prunas assidue agitando coquito, & quum saepe ebullierint percolato, ceramq; in eis eliquato, refrigerato, reponito ac utitor, quādoq; quidem immixto, aliquando uero cum quodā unguento diluto & liquefacto. Aliud arthriticum, Asclepiadæ: pharmacū prosperi succellus, Ballo inscribitur: quo usus quum antea multo tempore paralyticus fuisset, ab illa affectione liberatus conualuit. Olei melini, olei cyprini, olei myrtei, cuiusq; trientē, olei ueteris sesquilibram, ceræ libram I, terebinthinæ sexuncem, galbani quadrantem, mannæ trientem, opopanaxis sextantem, castorij sextantem, radice bryoniae trientem, æruginis sextantem, spumę nitrī albæ trientem, piperis sextantē, pyretri sextantem, euphorbij sextantem, adipis hœdini sexuncem, aceti quantum satis est, Bryoniam & pyretum cum aceto coquito & percolato, eoq; decocto arida terito, & reliqua liquefacta eis infundito ac unito. Utitor aliquando immixto, aliquando liquefacto cum quopiam unguento. Anthi uiride acopon, ad podagricos & arthriticos multo experimento cognitū, utere & ad ischiadicos cōfidenter. Phu sesquiunciā, mannæ sesquunciā, œsypi sesquunciam, ammoniaci thymiamatis sextantem, aluminis scissi drachm. V, æruginis drach. V, terebinthinæ quincuncem, spumę nitrī albæ trientē, opopanaxis drach. V, galbani drach. II, medullæ ceruinæ drach. V, olei cyprini trientem, olei melini trientem, cerę quincuncem, mellis quincuncem, olei ueteris lib. I, Aeruginem, ammoniacū, alumen, mannam, opopanaxa, cum modico aceto tere, eisq; liquefacta affunde, ac utere ad omnes cum oleo melino eliquato: in inueteratis uero affectionibus etiam adarces & euphorbij, cuiusq; unc. I, adde. Aliud eiusdem. Opopanaxis quadrantem & drach. IIII, terebinthinæ drach. IIII, ammoniaci thymiamatis scrupulos X V, œsypi scrupul. X VII, æruginis scrup. X VI, propolis scrup. X V, aluminis scissi, ladani, aristolochiæ rotundæ, lachrymæ hederæ, singulorum scrup. V I, spumę argenti scrup. III, salis ammoniaci scrup. II, camphoræ unc. I, colophoniæ quadrantē, ceræ quadrantem, olei quadrantem, utere cum unguento quopiam dissoluto. Aliud acopon unguentum ad paralyticos in principio. Olei gleucini, cyprini, irini, laurini, singulorū libram unam, ceræ trientem, terebinthinę sextantem, œsypi sextantem, castorij unc. I, euphorbij drachm. IIII, ex hoc tum affectæ partes, tum ea quæ facile affectioni obnoxia fiunt illinuntur. Aliud acopon ad coxendicum morbum inueteratum, distortionem et resolutionem paralyticas. Est autem, inquit Asclepiades, ualde efficax. Olei ueteris libras II, irini sexuncem, styracini sexuncem, baccarum lauri sexuncem, terebinthinæ, euphorbij, ammoniaci thymiamatis, castorij, piperis, opopanaxis, galbani, cuiusq; sextantē, medullæ ceruinę trientem, & drach. IIII. Liquefcibilia liquefacito, & ad arida affundito, unito, ac utitor. Aliquando quidē immixto, quandoq; uero cum rosaceo aut alio quopiam unguento liquefacto. Arida uero uino teruntur. Unguentū ad opisthotonicos, & quibus canino more os distorquetur, ex melle apparatus. Olei irini, rosacei, L I gleucini,

gleucini, cyprini, cuiusque sex uncem, ceræ quadrantem, mellis unciam unam.

Aliud, ad eadem. Ceræ drachmas quinquaginta, terebinthinæ drachmas xxv, œsypii, medullæ ceruinæ, galbani, ammoniaci thymiamatis, spumæ nitræ albae, baccarum lauri aridarum, singulorum drachmas vi, olei ueteris sextarios sex, uini heminam unam. Utitur. Unguentum ad resolutiones, ualde pulchrum. Sphæritidis, hoc est, cupressi pilulas ferentis sextantem, marrubij sextantem, herbe caucalidis quæ bulborum figuram habet sextantem, stercoreum cameli unciam unam, ampeloprasii unciam unam, eryngij unciam unam, cyclaminii unciam unam, bituminis unciam unam, peucedani drachmas quatuor, terræ ampelitis unciam unam, seminis apij, cyperi, lapidis gagatæ, distamni, cuiusque unciam unam, sulphuris drach. iiii, lactis alinini sextantem, unguenti fusini quadrantem, medullæ cameli quadrantem, adipis alinini unciam unam, pilorum ex cauda simie drach. iiii, olei ueteris sextantem, acetodrantem. Apparatum reponito: usus uero tempore cum unguento aliquo diluto utitur. Acopon Eræ Cappadocis, ad resolutos, & in uniuersum ad omnem dolorem musculorum & neruorum. Rutæ uiridis, pulgij, cyperi, fenigræci, mercurialis, marrubij, rosmarini, aristolochie, amygdalarum amararum, repurgatarum, singulorum libram unam, nitræ sextantem, iridis, terebinthinæ, baccarum lauri, radicis cucumeris syluestris, ammoniaci thymiamatis, sabinæ cuiusque libras duas, myrti uiridis libras tres, foliorum lauri aridorum libras tres, ueratris albi sex uncem, ceræ libras duas, bdellij libras quatuor, uini cōgios quatuor, olei congios tres. Quæ contusione opus habent crassas in partes contundito, ac modicam aquam, qua contusa tantum humectentur, affundito, deinde uinum & oleum adijcito, & per diem unum finito. Sequenti uero frequenter agitando coquito ac percolato. Postremum ceram & terebinthinam addito, itemque bdellium in modico uino prius tritum. Acopon ex rubetis quod omnem affectionem tollit. Radicis cucumeris agrestis uiridis libras sex, oleidulcis libras sex, medullæ ceruinæ, terebinthinæ, ceræ, cuiusque sex uncem, ranas rubetas appellatas uiuas numero sex, rubetas traiecto per pedis plantam filo in oleum demissas donec flaccescant coquimus: deinde extractis per plantas filo traiectis ranis, syluestris cucumeris radicem uiridem concisam inijcimus, atque donec uires suas in oleum transmittat coquimus & excolamus: postremum liquefacta, itidem percolata, ad oleum addimus, & in uitro reponimus. Vitæ mane & uespere ad podagricos, arthriticos, ischiadicos & resolutos. Per huius usum nouimus homines a podagra & chiragra toto corpore distortos post latrurum in tantum conualuisse, ut citra omnem offensionem obambulant. Quandoque apparauimus, inquit Asclepiades, hoc pharmacum additis ad hanc descriptionem samfuci libra una, unguenti crocini libra una, opobalsami quadrante, sanguine testudinum numero decem. Aliud, ad podagræ & articulare morbum mirabile. Facit & ad diuturnum capitis dolorem, materiam ad superficiem ducens, & ad frontem ac sinciput. Canicula paruum probè saginatam uiuam, & mustelam uiuam in olei sextarios nouem, ac butyri libras tres, conijcito, atque donec uieta fiant animalia coquito: deinde in percolato oleum calidum pedes aut manus per totam diem imposito. Galenus autem ait. Quidam uulpeculas & hyænas oleo incoquant, eoque articularum morbos curant, atque alij quidem ipsas uiuas in maximum lebetem inijciunt: alij uero mortuas, ac deinde unâ cum oleo quàm diutissime coquunt. Solia deinde ac uenas ex oleo calido explent, atque deinde arthriticos inscindere, ac multo tempore

pore in eo morari iubent. Porro oleum hoc maxime discussorium redditur, adeo ut etiam ad superficiem extrahat ea quae in profundo corporum continentur, quae ex re magna commoditas consequitur. Quin & herinacci terrestres uiui oleo incocti ipsum discussorium reddunt. Etenim oleum hoc dolores sedat, tum affectis articulis in ipsum demissis, tum etiam iisdem ex eo illitis. Alia unguenta podagrica. Terram nigram, quae praesertim in lenticula reperitur, aut etiam aliam nigram cum aceto terito, ac illinito. Sedat dolores & inflammationes etiam in his qui multa prius experti nihil profecerunt. Aliud. Cypri folia uiridia trita in pastillos redigito, eosque usu expetente cum aceto terito ac illinito. Aliud. Croci unciam unam, salis usti unciam unam, spumas nitri numero decem, oui luteum unius in spinæ decocto ad tertias redacto, terito. Aliud. Vitrum in aceto probe tritum confidenter illinito.

Aliud. Alumen aceto tritum illinito. Aliud, quod ad genuum fluxio nem solum profuit, multis antea frustra admotis. Marmor, hoc est, crustulam non usitam, contusam, & cum rosaceo tritam illinito. Ego autem scobem &amenta marmoris lota & resiccata in promptu habui. Vsu uero expetente cum rosaceo trita adhibui. Aliud, ualde bonum. Tecolithi, glaucij, myrrhe, cuiusque unciam i, aloës drach. IIII. Terito, ac siccum adseruato. Vsu uero exigente luteum oui & uinum austerum ammisceto ac illinito, & si circumtendat cum solo uino adhibeto. Aliud. Aëtiten lapidem cum ouo ac modico rosaceo illinito. Aliud. Vrticæ semen & hirundinis nidum cum sapa terito ac illinito. Aliud mirabile, pro diuitibus. Mameram aqua macerato, deinde tritam illinito, & miraberis. Aliud, multa experientia cognitum, in ueterata etiam affectioni accommodatum. Stercoris ciconiæ quadrantem, cum pari axungia tritam illinito. Vtere, inquit, neque cuiquam patefacito. Multos enim seruauit. Aliud. Caninum stercus album cum aqua calida tritum, atque ita tepescitum quam crassissime illinito, & folia oleris alicuius supra illitionem imposito.

Ad durities in artubus instar toforum.

Cap. XLV

Est & hoc optimum pharmacum ad durities artuum in tofos coactas. Sunt praeterea & alia quaedam, maxime uero Galenicum, quod ex caseo componitur. Ac nostrum itidem ex huiusmodi rebus apparatus, inquit Philagrius. Radicis peucedani drachmas II, ammoniaci thymiamatis drachmas II, myrrhæ drach. XXXIII, aristolochiæ drachmas VI, pumicis drachmas VI, castorei drachmas IIII, lanarum succidarum ustarum drachmas VIII, floris lapidis asij drachmas sex, si uero non adsit, salis ammoniaci usti drachmas sex, propolis ternæ drachmas sedecim, stercoris canini sicci drachmas sex, uisci drachmas sedecim, æruginis drachmas sedecim, squamæ æris drachmas XVI, atramenti scutorij drachmas sex, misyos drachmas sex, ceræ drachmas centum, resinæ pinus drachmas CL, picis drachmas CL, olei ueteris quantum sufficit, aceti quod satis est. Hoc quidem igitur nostrum pharmacum spissitudine auctum, & imminutum ac liquefactum prout probe habere uidebitur, iuxta curandorum corporum differentias, extrahit ac eicit tofos in artubus coactos. Aliud Galenicum, quod omnibus ferè corporibus adhibuit congruit. Est autem tale:

Caseus bubulus uetustissimus, adeo ut ob acrimoniam edi non possit, cum porcinae carnis inueterata ac falsæ decocto teritur, & probe emollitus ad durities artuum imponitur. Est & aliud ab eodem compositum. Pinguedinis pernae porcinae ueteris libram unam, casei caprini uetustissimi libram i, adipis taurini libram unam, apochymatis, hoc est, resinæ cum cera ex nauigijs dera-

Ll 2 lique-

corticis ueratri nigri drachmas viii. contundito, cribrato, ac cochlearis unius mensura dato ex aqua calida, animaduersione habita ne pharmacum ultra modum purget: est enim inexuperabile. Apud alios etiam laudatum reperi, si gentiana & chamæpityos, ac aristolochiæ longæ, cuiusq; drachmæ viii. addantur, chamædryos item drachmæ xxi. Omnia, inquit, hæc melle excipio, indeq; ad summum cochlearium unum exhibeo.

Antidoti podagricæ.

Cap. XLVII

Pharmaca quæ podagricis & morbo articulari correptis per os exhibentur, plurima quidem sunt & uaria ac diuersa. Cognita itaq; à me ipsorum multitudine, tum eo quod tetrapharmacū, à quatuor rebus ipsum constituentibus appellatur, tum quod ex hyperico constat, itemq; quod ex gentiana paratur, & similibus, quibus pro consuetudine Medici ad simpliciter podagricos utuntur: ipse sanè propriū pharmacū composui, inquit Philagrius, quale iudicauī sufficienter ex calfacere posse, non tamen expers facultatis moderatè humectandi, & attenuandi crassos ac uiscosos humores, & quod præclare omnino potest excretionum vias dilatare, unā cum hoc quod uim subducendæ alui & mouendæ urinæ complectitur. Quin & naturales actiones excitat, & transpirationē insensilem ac obscurā procurat. Compositio autem hæc est. Radicis præoniæ recentis drach. i. croci cilicij drach. iiii. rhei pontici drachmas iiii. calaminthæ montanæ, comæ saluæ, cacuminum stœchadis, seminis thlaspeos, epithymī, centaureæ maioris radicis, cuiusq; drac. iiii. centaureæ minoris succi dra. iiii. succum accipito quum in summo uigore herba est ac floribus prægnans. iridis illyricæ, seminis rutæ syluestris, piperis longi, seminis anethi, cuiusq; drac. iiii. ligustici, seminis apij, petroselinī macedonici, seselis massiliensis incorrupti, origani, cacuminum thymī, seminis trifolij bitumen olentis, seminis cardamomi medulla priuatī, seminis dauci, piperis albi, cuiusq; drach. iiii. mei athamantici drach. ii. asari drach. ii. spicæ nardi, adianti, casia polypodij, thuris albi, galbani puri, terebinthinæ chiæ, bdellij scythici nigri, pinguis, ac resinosi, ammoniaci thymiamatis, cuiusq; drach. vi. radicis symphyti recentis siccæ, sabinæ, radicis rubiæ, helenij, agarici, herbæ scordij, seminis paliuri, sarxiphagi, betonice, radicis cyclamini siccæ, seminis uiticis tosti, cuiusq; drach. viii. mastiches chiæ, radicis bryoniæ recentis siccæ, terræ lemnice quæ sphragis appellatur, opobalsami, cuiusq; drach. xvi. succi peucedani, drac. xvi. qui si non adsit, conijcienda sagapeni drach. viii. & radicis peucedani recentis siccæ drach. xvi. pastilli theriaci drach. xvi. habeant autem pastilli carniū partes duas, panis partem unam: compositio autem ipsorum in Sermonē de theriaca dicta est: styracis siquidem adsit calamitæ, si uero non, flauī & pinguis drach. xxi. niger enim ut uitiosus reprobandus est: aristolochiæ rotundæ non rugosæ & plenæ drach. l. ossium ceruinorū aut bubulorum ex furis recentium, & ut probè conteri queant, ustorū dra. l. mellis attici despumati quantum satis est, quo ad bonam elegmatis compagem pharmacum reducatur. Arida omnia contundito & cribrato: mastichem autem & thus unumquodq; per se sensim, ne in laticas crustulas abeant, terito & cribrato, deinde prædictum pondus ex eis expedito, & reliquis aridis tritis ammisceto. Bdellium autem & ammoniacum ac galbanum & peucedani succum aut sagapeni, in mortarium coniecta tundito, deinde ad ignem emollito, & postea cum modico melle liquefacito, & in pilula optimè terito. Similiter autem & terebinthinam per se cum modico melle dissolutam ad reliqua in pilam conijcito, Stryacem uero in mortario constan-

ter tundito, opobalsamo paulatim ad eum infuso ac melle calido, deinde similiter in pila terito. Expedi etiam cum modico melle styracem liquefacere ac deinde terere. Ceterum ubi hæc sufficienter fuerint unita & dissoluta, paulatim arida trita addito: melle itidem sensim affuso. Ad finem uero centauree succum per se cum opobalsamo terito ac reliquis unito. His uero omnibus probè cōmixtis, mellis despumati tantum addatur quantum suffecerit ad pharmacum delingibile futurum, & quo per dulcorem ægro cōmendetur. Quare si gustu pharmacum iudicaueris, nihil peccaris etiam si piperis augeas modum. Notum namq; ego ipse quendam qui eo usus plus sibi de pipere ammiscere iussit, itaq; ammiscui saepe tantum ex ipso post reliquorum omnium mixturam, quantum quisq; pro gustu sui modo expetiuit. Satis uero manifestum est quod quando quidem præseruare aliquem à podagrîco malo uelimus, tunc sanè plurimum piperis injicere non ab re est, & præsertim in hyeme, & si humores frigidi fuerint ac diuturni. Porro centaureæ succus tempore ueris quum in uigore herba est ac florem fert, ex ea uiridi ac contusa exprimitur, deinde percolatus, usque ad mellis solidioris spissitudinem in sole resiccatur. Ceterum in compositione pharmaci, si is qui eo usus est amaris delectetur, amplius quàm drachmas quatuor ex succo centaureæ ammiscere expedit, atque id maxime si distillationes dissoluere uelimus, si uero ager amara auersetur, quatuor omnino succi drachmas injicere oportet. Ex hac uero antidoto ad elegmatis cōpaginem redacta ad summum cochlearium i. exhibetur. Dupliciter insuper pharmacum hoc apparatus. Vno quidem modo pastillis theriacis ut dictum est amixtis, itemq; ossibus uitis. Alio autem modo citra pastillorum & ossium admixtionem præparatur. Licet etiam si quis uelit post sufficientem mellis mixturam, mel ipsum in duas ex æquo partes diuidere, deinde ad unam partem, dimidium præscripti ponderis, tum pastillorum theriacorum, tum ossium uistorum infarcire: est autem dimidia pars pastillorum theriacorum drachmarum viii. Ossium uero uistorum dimidia pars est drach. xxv. Quandoquidè uero pastillos theriacos impossibile est per se contundi, si non cum alijs aridis tundantur, oportet eos quantum possibile est in mortario tundere, ac modico uino ueteri dulci madefacere, deinde in pila terere ac cum largo melle dissoluere atque demum ad reliquam mixturam diligenter coaptare. Ceterum quum humectare oportet & mollire, attenuareq; & crassa dissicare, repurgare item ac euacuare infartos humores, itemq; uias dilatare, nihil ex pastillis theriacis, neq; ex ossium cinere ammiscere oportet. Viperarum enim caro quàm cellerrimè ad cutem ac superficiem digeri ac distribui solet. Quapropter ubi recte mentorum copia adfuerit, & uia fuerint obturate, minime tuto uiperarum caro exhibetur: sed postea quum coniectauerimus humores attenuatos esse, & dilatatas uias. Ossium uero substantia facultatem habet consumendi ac resiccandi, adeo ut etiam sola assidue & oportunè exhibita inueteratum articulum curare possit. Ut uero ne quid ex humoribus resiccetur ac lapidescat, incurabileq; aut ægrè medicabile reddatur, tempore præseruationis eam minime miscemus, sed postea si ita uidebitur. Consumit enim & resiccet humores in ipsis articulis iuncturis relictos. Forinsecus etiā quando discutere animus est, pharmacum hoc oleo ueteri aut sicyonio dilutū maximè profuit, maxime si citra ossium additionem est apparatus. Tunc enim non modo discussoria, sed etiam coactoria facultatem acquirit. Quare eis qui non discussione solum, sed & exterarum corporis partium corroboracione opus habent, commodissime hoc

hoc modo adhibetur. Hoc pharmaco si & arthriticis & podagricis medebē-
 ris, minime poenitueris. Hepaticos item ex obturatione affectos, itemque spleni-
 cos curabis, & à uipera morfos & qui uenenum hauserunt, & comitiali morbo
 apprehensos, si eo oportune utaris: quin & aliorum morborum per ipsum cura-
 tionem fieri reperias sufficientē, de quibus sermonē producere minime operæ
 precium existimo. Theriaca item ex uiperis, quæ Andromacho inscripta est,
 de qua plurima tradidit Galenus, utiliter exhibetur frigidioribus & magis hu-
 meis corporibus, forinsecus etiam commodē illinitur cum oleo ueteri aut scyo-
 nio dissoluta, ut dictū est. Sales quoque Theriaci, & ex gentiana pastillus, & qui
 ex hyperico constat, & similia, his qui ex multo & crasso fluxu ægrotant utilia
 existunt. Verum his qui ex biliosa fluxione afficiuntur, & ut simpliciter dicam
 omnibus calidiori temperamento præditis hæc ipsa nocentissima sunt, & quod
 supra relatū est nostrum pharmacū. Ex horum enim pharmacorum potu non so-
 lum nihil opis ferunt hi qui calidiori temperatura præditi sunt, sed & resolutio-
 nibus immedicabilibus apprehenduntur, sæpe nimium resiccati, & in uitiosos hu-
 mores dilabuntur qui eos erodunt, & in quibus aliquando pessime intereunt.
 Porro in huiusmodi pharmacorum usu etiam raritatem & densitatē curandi cor-
 poris respicere oportet: ampliusque & ætatē, & anni tempus, & regionē. Ad hæc
 itaque respectu habito minus aut plus de eo dabis, neque uero minus & ad magni-
 tudinem aut paruitatem corporis respiciendum. De uiperarum esu. Vi-
 perarum esus omnibus podagricis & arthriticis plurimum commoditatis affert,
 quemadmodum etiam anhelosis, & elephantiasi correptis: exigit enim per cu-
 tem omnia redundantia recrementa, siue calida siue frigida fuerint, quæ mor-
 bi ipsius sunt causa. Oportet autem crassa & uiscosa ex ipsis prius attenuare ac
 euacuare: quod ubi factum est, reliqua facili per uiperarum esum euacuantur,
 nimirum ad cutem delata atque exclusa. Quapropter etiam in sole ipsarum feras
 rum comestione facere iubet, utpote quod inde iuuentur, atque uel caloris hu-
 morum delatio foras feratur: curandum tamen ne caput probe contegere ab-
 actu negligamus. Oportet autem recens captas esse uiperas, & iustæ magnitu-
 dinis, & non ex maritimis: tales enim siticulosæ existunt. Caterum ex uipera
 ipsarum caput tum caudam amputare oportet, itemque interanea omnia abij-
 cere, ac ex tribus aquis lauare, deinde cum aqua & anetho maxime uiridi, &
 modi congruentis oleo coquere, & post sufficientem coctionem congruenti
 sale condire, ac uiperam ueluti anguillam comedendam exhibere. Porro
 quidam ex harum comestione plurimum exudant, & pediculorum copiam
 generant. Omnes tamen qui eas comederunt maxime se alleuatos sentiunt.
 Quapropter his qui corpus recrementis exundans habent etiam bis ac ter in
 anno exhibere conducit: bis quidem ueris tempore, semel autem in autum-
 no. Quod si uero sint quibus corpus per insensibilem & obscuram transpira-
 tionem, aut etiam per sudores naturales euacuetur, his omnino uiperarum esu
 interdicemus. Periculosa enim fit huiusmodi ipsarum comestio propter im-
 modicam per cutem exhalationem. Dicemus autem ex ordine & de alijs an-
 tidotis. Antidotus ex quatuor rebus constans. Tetrapharmacum igitur
 ex quatuor rebus apparatus & à quibusdam Mysterium appellatum,
 ex gentiana componitur & aristolochia, baccis lauri, & myrrha, æquali pon-
 dere coniectis. Datur autem singulis diebus ex ea cochliarij dimidium ex
 aqua calida ad præseruationem. Prodest pituitosis: biliosos autem lædit.
 Antidotus ex hyperico. Antidotus ex hyperico à quibusdam hoc modo

descripta est. Antidotus sanans podagras, coxendicum morbum, & ut in uniuersum dicam, omnes iuncturarum & articularum morbis implicatos per annum potata. Firmat stomachum, & uisum acutiorē reddit, reliquosq; item sensus clariore & illustriore facit: euacuans leniter per urinam; unde etiam neq; aliud ullum membrum offensionem sensit. Neq; enim materiā ex affectis locis ad aliam corporis regionem depellit, quemadmodum epithemata forinsecus contrahentia & cohibentia facere solent: sed causas morborum tum per uelice tum per alui locos expellit, atq; uniuersum corpus sanius reddit. Quare etiam comitali correptis morbo auxiliatur in potu. Alios item à diuturnis & uehementer grauib; capitis doloribus liberauit, qui etiam de sanitate sua iam desperauerant. Splenem uero & hepar in scirrhum indurata moderatur ac demulcet. Articularem aut morbum adeo efficaciter sanat, ut etiam duricies instar toforum in articulis quibusdā per uim morbi coactas dissoluat. Compositio autem hoc modo habet: Trixaginis, dodrantē, centaureæ bellem, aristolochiæ rotundæ septuncem, radicis gentianæ sexuncem, comæ hyperici quincuncē, petroselinī trientem, mei athamantici quadrantem, phu pontici sextantē, agnirici sextantem, Mellis despumati lib. i. ii. Hoc autē modo parato. Vnumquodque per se cōtundito & cribrato: deinde ponderata simul misceto, ac rursus cribrato quo accurata permixtio fiat. Deinde mellis despumato ammisceto, ac pastillos formato pondere drachmæ i. atq; ex eis unū pro uice exhibeto. Vius eius est circa tertiam horam diei ubi uenter onus suum pro consuetudine deposuit: pharmacum uero ipsum cum aqua calidā sesquicyatho liquefacito. Oportet autē eum qui bibit: si nihil prohibeat, deambulare, quo ex motu euntis pharmacum inferna contingat. Porro pharmacū hoc aliās quidem præclare efficacē est, utpote ex fortibus simplicibus compositum: amplius autem efficacius redditur per aristolochiā quæ natura sua articularibus morbis auxiliari solet, & duris corporibus imprimis prodest. Ex cancris autem pharmacum etiam mollioribus corporibus conducit. Habet autem Antidoti ex cancris compositio hoc modo. Cancrorū magnorum uiuorum ustorum in æreo uase, trientem, gentianæ incorruptę quincuncem. Thuris integri & non secti albi unc. i. Datur inde cochlearium unum. Ad cancrorum uero exustionē ligna uitis aduruntur. Pharmacū ex fluuialibus cancris uctis. Describam porro & aliud pharmacū corporibus recrementis abundantibus & mollibus conducens: est autem id quod à rabido cane morsus datur, cuius compositionem in Sermone de rabido canis morfu tradidimus, huius inquam operis sexto. Adieci autem ego, inquit Philagrius, ad huius pharmaci apparatus, etiam petroselinī drac. vii. ut plurimum uero x. quo urinæ ciendæ uim acquirat, & multos sanē arthriticos iuuat, præsertim quibus tenerum & album corpus fuit, mediocris mystri mensura ex eo data aliquando ex aqua sola, aliquando ex aqua mulsa. Quin & melle despumato sæpe ipsum excepi, quo ualidum & citra transpirationem adseruerem, deinde uero ueluti prædictum est bibendum exhibui. Antidotus ex centaureis. Antidotus podagrica ex duobus centaureæ generibus, uehementer laudatis & præter opinionē auxiliantibus, quod ipsum experientia testatur. Nam multos eius usu seruatos noui. Est enim adeo salutaris podagricis ut quosdam per x. annos podagra correptos, eius usus ad iter pedibus faciendum præparauerit. Est autem stomacho grata, aluo conferens, & urinam ciens. Habet autem hoc modo. Centaureæ minoris comæ, centaureæ maioris radicis, trixaginis, gentianæ, aristolochiæ rotundæ, singulorum æquale pondus,

dus, puta lib. i. contundito & cribrato, & drach. i. præbeto per dies XL. ex aqua calida. In sequentibus autem ex ordine anni diebus CCCXXV. drachmę dimidium eodem modo præbe. Alia antidotus podagrica usu cognita. Anisi, cumini Aethiopici, piperis communis, piperis longi, seminis cnici interioris, cuiusque dra. ii. euphorbij drac. iiii. mastiches dra. vi. myrrhę, drach. iiii. moschi, siliquam unam, caudę scinci unius extremum. Mellis quantum satis est. Datur nucis auellanae magnitudine ex aqua mulsa. Hac amicus quispian usus, bis in hebdomade ex ipsa bibendū præbuit, & affectos locos ex uiridi unguento Antho inscripto cum rosaceo aut melino singulis diebus illeuit, multosque seruauit. Antidotus podagrica experimento constans, accipit per annū, Analsij. Agarici unc. i. rhei un. i. petroselinī sextantē, phu sesquunciam, gentianę quadrantē, hyperici sextantem & uncia dimidium, centaureę unc. i. Aristolochiæ longę sesquunciam, & rotundę quadrantē & uncie dimidiū, chamaedryos trientē & uncia dimidiū, cinamomi un. i. folij unc. i. aloës primarię unc. i. mei sextantē, aut spicę nardi duplum. Alia antidotus podagrica experimento cognita, datur per annum. Doari Episcopi. Agarici unc. i. rhei Barbarici unc. i. petroselinī sextantem, phu sesquunciam, gentianę quadrantem, hyperici sextantem & uncia dimidium, centaureę trientem, mei sextantem, aut spicę nardi trientem.

Qui podagrici lauandi sint & quomodo.

Cap. XLVIII

Manifestum quidem existimo quod post inflammationū remissionem omnibus podagricis balneum commodissimum existit, quandoque autem & in uigo reutiliter adhibetur, si æger pruriginē aut uigilijs uexetur, aut aliās labore sit fatigatus. Lauare autem oportet tempore remissionis, ita ut spongię aceto & sale permixtis madefactas locis affectis circūponamus, ut a fluxione immunes permaneant. Amplius autem lintheis siccis & plurimo nitro totum corpus perspicare, & ut aëri diutius immorentur iubere, & moderatē non solum calidam sed frigidam adhibere, & in ipsarum solijs desidere. Vtile autem est balneum natura siccioribus, & gracilibus, & colore nigrioribus, & qui a tumore intotum sunt liberati. In huiusmodi enim affecta particula nō intumescit adeo magno tumore excitato, uerum distrahi, uelut a cane apprehensas, in profundo litas corporis partes aiunt, & inopinabili tensione distendi. Et inhorrescunt sæpe, pellicula quę os ambit a fluxione falsa aut acri & tenui ualde ac erodente uellicata. Hi a balneis operiri ferunt, quapropter non semel tantum, sed iterum atque iterum eos lauare oportet, & in aëre per omnia moderato, citra aliquā pinguedinem adhibitam immorari, hoc enim modo magis euacuabuntur. Deinde oleo dulci cum aqua conuassato illitos in aquam calidā demittere, & in eo aliquandiu morari præcipere. In frigidam uero minimē demittantur, nisi immodici caloris sensus infestet. Ut plurimū uero tepida aut lactei temperamenti aqua perfundatur in prima balnei domo. Si uero cum tumore quodam non ualde magno post euacuationes suborto aliqui dolore uexentur, conueniet in aëre balnei reliquum corpus per sicca linthea usque ad rubefactionem perspicare. Tendum autē & exterforijs sinigmati ex adarce, nitro, pipere, euphorbio, staphide agresti, æquali pondere cōiectis, apparatis. Atque his quidem reliquū corpus contentē defricitū excitetur: pedes uero eorū muria moderatē perfundendi sunt, & in calida aqua non morandū, frigida uero ne contingenda quidem. Quod si balneum non adsit, eos qui ab acrioribus fluxionibus uellicantur, aqua dulcissima calida perfusos fouere oportet, & totum corpus ex oleo chamamelino in ieiunio illinire; alios uero temperamento non calidos, & qui ta-

men

men tumorē habeant post euacuationes relictum, si balneū non adsit, cucurbitulis admotis curabimus, initio à lumbis facto, sursum usq; ad scapulas progrediendo, fricabimus etiam per sicca linteola & per exterforia sinegmata iam dicta. A talibus enim hi tum in balneo, tum citra balneū opem sentiunt, quale & hoc est ex profundo humores euocans ac transferens, quod metasyncriticon Græci uocant. Eo itaq; in balneo utantur, aut si balneū non admittat, post exertia ex eo deficiente, deinde spongijs extergatur id quod ex hac arida insperione corporib; adhæret. Cōpositio eius hæc est. Nitri rubri li. i. sinapis sicci lib. ii. fabinae lib. ii. ueratri albi lib. i. sulphuris uiui lib. i. Aliud Andree comitis. Nitri, ueratri nigri, piperis æqualibus partibus utere. Præter opinionē autem eis conducit Siccum Magnū ipsi affectis locis in balneo inspersum. Estq; hoc. Recrementi siue scoræ ferri, spumæ nitri albe, cuiusque æquales partes misce, & odoris gratia parum folij & costi adde. Siccum quod psilothro podagrico rum inspergitur. Mastiches, thuris, lapidis asij, pumicis assati, alcyonij, staphidis agrestis, cimoliz, ueratri albi, samfuci, spumæ argenti, amyli, carcophylli, spicæ nardi, cyperi, floris iunci odorati, buglossi, singul. lib. i. auripigmenti un. x. sandarachæ unc. x. saponis quantum satis est. Prædicta omnia, excepto auripigmento, sandaracha & sapone, contundito, cribrato, & sicca in promptu habeto. Vfus uero tempore calcis uiuæ unc. x. in oryzæ aut ptisanæ succo dissoluito, & auripigmenti unc. i. sandarachæ unc. i. saponis drach. iiii. & prædicti sicci cochlearia ii. magna, omnia quàm tenuissimè trita inspergito, ac unito, eoq; pedes aut etiam alios locos fluxione infestatos illinito. Caterum qui hoc sicco inspergimine utuntur hoc modo diætam suam instituant. Thoth, hoc est, septembri, lac & edant & bibant. Phaophi, hoc est, Octobri, allia edant. Athyr, hoc est, nouembri, in totum nō lauent. Choia, hoc est, decembri, brassicam ne edant. Tybi, i. ianuario, mane meracum bibant. Mechir, id est, februario, betæ ne edant. Phamenoth, hoc est, martio, dulcia tum in cibo, tum in potu sumant. Pharmuthi, id est, aprili, raphanum ne gustent. Pachon, id est, maio, polypum ne edant. Pauni, hoc est, iunio, mane frigidā aquam sumant. Epiphi, hoc est, iulio, à ueneris abstineant. Mefori, id est, Augusto, maluā ne edant. Siccū Maloriani. Aluminis scissi sextantem, pumicis unc. i. terito & in uitro reponito. Vfu uero expetente, uino adstringente locos prælauato, & quodammodo extergito, ac siccum ipsum inspergito, tenerisq; manibus affricato, & sicari siniste, & uidebis tumores quàm celerrimè discussos & resolutos. Ego utriusq; & aluminis & pumicis æquale pondus conieci, & magis sanè successit.

DVODECIMI SERMONIS FINIS.

INDEX CAPITVM DECIMI TERTII
Aëtij Sermonis.

| | | |
|--|--|-----------|
| D E his qui ab homine morfi sunt. | De his qui à fele morfi sunt. | Cap. v |
| Caput i | De morfi à crocodilo. | Cap. vi |
| De his quos canis momordit. | De bestijs uirus eiuculantibus & primum quibus artibus adhibitis ea tollantur. | Cap. vii |
| Ad leonum pantherarum ac urforum morsus. | | Cap. viij |
| De suum morsu. | Illitiones præseruatiuæ. | Cap. iij |
| | | Quæ |

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------|
| Quæ appositæ uenenatæ animalia occi- | De buprestis. | Cap. I |
| cidant. | De eruca pini. | Cap. li |
| Comunia remedia ad omnes uenenū | De salamandra. | Cap. liij |
| iaculantū ferarum plagas. | De lepore marino. | Cap. liij |
| De uespis & apibus. | De rana rubeta. | Ca. liiij |
| Ad stellionis morsum. | De rana palustri. | Cap. lv |
| Ad salamandræ morsum & lacertæ | De hîrudinibus. | Cap. lvi |
| chalcidæ. | De ephemero. | Cap. lyij |
| De mure araneo. | De dorycnio aut solano furioso. | Cap. lyij |
| Ad scolopendræ plagam. | De aconito. | Cap. ltx |
| Ad araneæ ictum. | De melle quod in Heraclea ponti na- | |
| De terragnathis. | scitur. | Cap. lx |
| De percussis à phalangio. | De coriandro. | Cap. lxi |
| De his quos scorpio percussit. | De psyllio. | Cap. lxij |
| De moris ab aspide. | De cicuta. | Cap. lxij |
| De uiperæ maris & fœminæ morfu. | De simlace. | Cap. lxiiij |
| De dipside. | De succo carpasi. | Cap. lxv |
| De hæmorrhoidis & hæmorrhoidis. | De herba fardonis. | Cap. lxvi |
| Præparatio sanguinis testudi- | De hyoscyamo. | Cap. lxviij |
| nis marinæ & usus. | De mandragora. | Cap. lxviij |
| De ammodyte aut cenchria. | De succo papaueris. | Cap. lxix |
| De sepe. | De toxico. | Cap. lxx |
| De cenchrite siue Acontio. | De his qui ixian hauserunt. | Cap. lxxi |
| De cerafte. | De chamæleone. | Cap. lxxij |
| De dryino. | De fungis. | Cap. lxxij |
| De amphibiaena & scytala. | De sanguine tauri. | Cap. lxxiiij |
| De pareia & spathiuro. | De lacte in grumos coacto. | Cap. lxxv |
| De pelidae & elape. | De gypso. | Cap. lxxvi |
| De basilisco. | De cerusa. | Cap. lxxviij |
| De draconibus. | De argenti spuma. | Cap. lxxviij |
| De chersydro. | De argento uiuo. | Cap. lxxix |
| De rana rubeta. | De calce, sandaracha, & auripigmen- | |
| De turture seu pastinaca marina. | to. | Cap. lxxx |
| De murena. | De thapsia, ueratro, elaterio, & agari- | |
| De dracone marino. | co. | Cap. lxxxi |
| De scorpio marino. | De rutæ syluestris & melanthij nocu- | |
| De culicibus. | mentis. | Cap. lxxxij |
| De muscis. | De acervato frigida aqua potu. | Cap. lxxxiiij |
| Ad pulices. | De strangulatis. | Cap. lxxxiiij |
| Ad cimices. | De his qui ex alto ceciderunt. | Cap. lxxxv |
| De uenenis. | De præseruantibus & prælagis anima- | |
| Methodus præseruatiua ne quis à ue- | libus. | Cap. lxxxvi |
| nenoso pharmaco lædatur. | De theriaca ex uiperis Andromachi. | |
| Quomodo cognoscantur qui uenenū | | Cap. lxxxviij |
| sumpserunt. | Pastillorū scilliticorū præparatio. | Cap. lxxxix |
| Comunia remedia & cura omnis ue- | Hedychroi confectio. | Cap. lxxxix |
| neni. | Pastillorum theriacorum præparatio. | |
| Ad eos qui cantharidas hauserunt. | | Cap. xc |

Dere-

- Dereliquis quæ in antidotum conij-
ciuntur. Cap. xci
Modus conficiendi. Cap. xcij
Post quantũ tempus ea sit utendum.
Cap. xcij
Quanto tempore efficax sit. Ca. xciiij
Modus probandi theriacen. Cap. xcv
De exhibitionis mensura, & utendi
modo & quibus conueniat morbis.
Cap. xcvi
Sales Theriaci ex libris Martiani, cum
quibus consentit Galenus. C. xcviij
Antidotus Mithridatica. Cap. xcviij
Confectio Cypheas. Cap. xcix
De Antidoti Mithridaticæ usu. Ca-
put c.
Antidotus Eisdæ aut Prophetæ docto-
ris. Cap. ci
Antidotus pæonia. Cap. cij
Antidotus aromatica optima, Galli.
Cap. cij
Antidotus ex duobus piperis generi-
bus. Cap. ciiij
Antidotus Athanasia. Cap. cv
Oribasij theriaca qua Marcus Impera-
tor usus est. Cap. yi
Oribasij theriaca ex Bryonia. Ca. cvij
Antidotus Hadriani. Cap. cvij
Antidotus Acharistus. Cap. cix
Philagrii antidotus ex sulphure utuo.
Cap. cx.
Theriaca Democratis. Cap. cxi
Antidotus Theodoretus ex anacar-
dijs. Cap. cxij
Theodoretus aliter apparatus. C. cxij
Theodoretus per acetum mulsum ap-
parata. Cap. cxij
Picro siue amara per acetum mulsum
apparata, Oribasij. Cap. cxvi
Cyphi ex rebus. xxxvi. Cap. cxvij
Cyphi ex rebus. xxxviii. Cap. cxvij
Musiaphij confectio. Cap. cxvij
Thymiamia siue suffimentum Bereni-
ces. Cap. cxix
De Elephantiasi, ex libris Archigenis
Cap. cxx
Cura Elephantiasi affectorũ. Ca. cxxi
De his qui castrantur. Cap. cxxij
De uiperarũ esu, & de pruritibus, Ar-
chigenis. Cap. cxxij
Illitiones ad iumentes corporis emi-
nentias. Cap. cxxij
Dieta Elephantiasi correptorum. Ca-
put cxxv
De pruritu, Archigenis. Cap. cxxvi
Ad pruriginosas papularum eruptio-
nes. Cap. cxxvij
Ad pustulas psyrdras Græcis appel-
latas, & ad papulas ex seruore aut
sudore obortas. Cap. cxxvij
Oribasij ad nigras cicatrices inalban-
das. Cap. cxxix
Ad ulcerosas papularum eruptiones,
tum in tibijs, tum in toto crure obor-
tas. Cap. cxxx
Ad cicatrices nigras ex ulceribus reli-
ctas. Cap. cxxxi
De Vitilagine seu alphi. Cap. cxxxij
De leuce vitilagine altius insidente,
Galenĩ. Cap. cxxxij
Delepra, Archigenis. Cap. cxxxij.

AE TII MEDICI GRAECI CONTRA

CTAE EX VETERIBVS MEDICINAE, TETRABIBLI,

siue Quaternionis Quarti Sermo primus, & ex ordine Decimus

tertius. Per IANVM CORNARIVM Medicum Phy-
sicum latinè conscriptus.

De noxiorum animalium morfu, & de bestijs uirus ei aculantibus.

Et de Elephantiasi, pruritu, scabie, alpe, lepra, leuce.

Et de antidotis multae utilitatis.

DE HIS QVI AB HOMINE MORSI SVNT. Caput 1



Enoxiorum animalium moribus scribere auspicientes, initium ab his qui ab homine morfi sunt faciemus, ut Archigenes inquit. in his igitur quos homo momordit, loco ex oleo praesito, feniculi radicem tritam cum melle cataplas-
matis modo ulceri imposito usque quo repurgetur, deinde his quae ex-
plere possunt utitor. Cuius generis & hocce est, Mellis, terebinthinae, butyri, adipis anserini, medullae
cerui, aut si non adit, uituli, aequalibus partibus liquefactis utitor. Si uero si-
nus statim in principio fiat, eum aqua mulsa diligenter eluito, & spon-
giam nouam Aphricanam melle cocto imbutam imposito, & ligamento quod ad si-
nus referetur obligato, ac tertio die soluito. Aut myrrham terebinthina ex-
ceptam ut malagma imposito. Aut aes tritum in melle cocto exceptum ueluti
collyrium indito, & postquam repurgaris conglutinato: uel ossa uitulina ad al-
bedinem usta, & pice liquida siue cocto melle, aut utrisque ex aequo simul ex-
cepta, in sinum indito, uel mannam, aut ipsum adeo thus cum myrrha terito, et
cum uino ac oleo imposito. Emplastra autem cruentis uulneribus destinata
& adglutinatoria eis conueniunt, in expassis quidem & planis ulceribus, uiri-
de ex atra styliide. In sinibus uero cruentis emplastrum Piscatoris, ex aceto ap-
paratum, & Athena, & Nigrum appellatum.

De his quos canis momordit.

Cap. II

In his uero quos canis momordit statim acetum irrorato, & ex passa palma
morsum percutito. Deinde nitrum cum aceto tritum ex alto supra morsum de-
stillato, & spongiam nouam posca aut aceto imbutam imposito, & ad tres dies
obligato, ligamentoque supernè ex posca aut aceto prout uisum fuerit madefaci-
to. Egregie enim auxiliatur. Post haec uero ut commune ulcus curato. Aut per
dicium herbam cum sale tritam imposito, quotidie eam alterando donec ex-
cidat crusta. Deinde ubi ad cicatricem perducere uolueris ipsam per se tritam
imposito. Quod si magnus sit morfus quemadmodum a magnis canibus in-
fligit solent, praescripta in sexto Sermonemethodo curato, ueluti eos qui a rabi-
do cane sunt sauciati. Si uero cauius & angustus appareat morfus, in principio
cum aceto, ut dictum est, irrorato. Deinde nitrum itidem cum aceto tritum ex alto
superstillato, & anetho sicco usto morsum expleto, & lintecolum conuolutum
ex aceto madefactum indito, & obligato. Post triduum uero soluito & reperi-
es morsum repurgatum. Idem facit & cuminum tritum morfi inditum. Post-
quam uero ulcera fuerint repurgata, praedicto pharmaco utere liquefacto ad

Mm homi-

hominis morsum relato, Si uero inflammatio succedat, lenticulam cum malitorio coctam & tritam imposito, aut rubi folia contrita. Aut panis medullam in betæ succo madefactam cum modico rosaceo pro cataplasmate adhibero. Ad uulnera uero iam suppurata erui farinam cum melle subigito & morsum expleto. Summè enim auxiliatur. Aut irin cum melle & linamentis indito, ac supernè lenticulam coctam tritam cum modico melle & rosaceo pauco imposito. Repurgatis uero iam ipsis cum prædicto liquido pharmaco expleto, ac deinde his quæ cicatricem inducere possunt, utitor. Emplastra autem ad demorsos à cane uel urso aut similibus animalibus statim à principio commodè adhibentur ex sale & cerusa apparata. Etenim uenenosum humorem in morfibz ex dentibus relictum expurgant, & callosam ex impactis dentibus concretionem explanant.

Ad leonum, pantherarum, ac urforum mor-

Cap. III

sus. Horum animalium consimiles sunt morsus: nam robusta sunt hæc & unciunguia, implicantque quicquid contigerunt unguibus penetrantia, & corpora ipsa dilaniant. Perseuerando autem in manducatione non solum carnes dilaniant, sed & ossa aliquando ad polentæ similitudinem confringunt, indeque & uicini stimulis afficiuntur nervi. Satis uero manifestum est, quod corpora quæ in eiusmodi ac tantas calamitates inciderunt, non effugiunt periculum abalienationis: nam etsi maneant, putrefactionem suscipiunt, & ulcera serpentina inducunt. Huiusmodi igitur uulnera cum aceto elota & circumrasa, solutis item corporibus ac ossibus extractis, emplastris integere oportet, & post suppurationem partium dilaniatarum, repurgantibus linamentis curare & cicatricem inducere, quemadmodum in communibus ulceribus solemus. Emplastra autem his conuenientia sunt, id quod ex salibus constat, & similia, cuiusmodi etiam hoc est.

A sclepiadæ pharmaci, ad cruenta uulnera accommodatum, & ad intercisos nervos & ad urforum ac leonum morsus. Aeruginis rasæ dra. vii. aluminis rotundi drach. vii. squamæ æris drach. xii. mannae, galbani, cuiusque drach. xii. ceræ unc. xvi. resinæ pinus aridæ unc. xxxii. olei lib. i. Arida & galbanum aceto terito & liquefabilia liquefacta adfundito. Aliud, emplastrum Venarum appellatum, admirabile. Radicis symphyti, comæ dictamni, iridis Ilyriæ, atramenti indici, aluminis scissi, misyos, ammoniaci thymiamatis, myrrhæ, cuiusque sextantem, salis cappadocici quincuncem, æris usti trientem, aristolochiæ rotundæ, iridis astragalitidis, gallarum, rosarum siccarum, squamæ æris singulorum unciam unam, æruginis quadrantem, picis sesquilibram, resinæ pinus siccæ libras quatuor, olei trientem & dimidium uncie unius. Metallica in aceto terito. Habeat autem & ceræ sesquilibram. Quod si marcedo subsequatur & ulcus serpendo depascens, optimè facit subscriptum uiride emplastrum, carnem arrodens, exest usque ad os, & squamas eiicit, ac ulcus serpens compescit, & in uniuersum utile est ad omnia inueterata eiusmodi actionis, & maxime in quibus ueneni corruptio est, & corpora sunt abalienata: quibus etiam immixtum pharmacum adhibere oportet. In alijs uero dissolutum. Habet autem hoc modo. Spumæ argenti unc. i. squamæ æris unc. i. nitri, atramenti sutorij, salis ammoniaci, æruginis, singulorum sextantem, cyperi quadrantem, olei sexuncem, aceti scillitici quantum sufficit. Arida aceto terito ut strigmentum spissitudinè acquirant, & liquefacta adfundito, & in uitro reposito, aceto aceto affuso, ut pharmaco ipsi innatet. Ad confectionem autem & præparationem si ace-

si acetum scilliticum haberi non possit, scillam cum aceto coquito ac utitor.

De suum morfu.

Cap. IIII

Quandoquidē uero & in uenationibus à syluestribus suis læduntur quidam, operapretium est & de his facere mentionem. Vulnere itaq; ab ipsis incussa grauiasunt, propterea quod non solum profunda, sed & magna existant: adglutinatorio autem medicationis ductu ea curare impossibile est. Nam unā cum cōtusione labia uulnerrum discindunt, imō & adurunt. Mutuō enim dentium inter se attritu, ac ueluti ad cotem affrictu utuntur, ad uindictam eorum qui eis obueniunt currentes. Adusta itaque corpora crustam quandam iuxta uulnerrum labia inducunt. Quare suppuratorium & non adglutinatorium curationis modum in eis adhibere oportet.

De his qui à fele morsu sunt.

Cap. v

Omnia ferē quæ ad canis morsum dicta sunt, etiam à fele morsu conducunt. propriē autem eis conuenit: mel, terebinthina, oleum rosaceum, simul eliquato ac utitor. Aut centauream tritam cum melle imposito. Aut galli sterlus liquidum cum adipe gallinaceo subigito & imposito.

De morsu à crocodilo.

Cap. vi

Primum quidem eos quos crocodilus momordit quā tutissimē custodire oportet, in domo conclusos fenestras non habente: etenim ob contrariā quandam affectionem ferē in totum syluestres maximē feles ad demorsos accedere cōsueuerunt. Remedia autem his eadem quæ ad morsos à cane ac ad reliquos relata sunt conueniunt. Propriē autem humanum sterlus & misy simul trita & imposita ad eos faciunt. Aut piscium garum, aut carniū salfarum iusculum morfu infunde, aut salem & myrrhā æquali pondere in acerrimo aceto quā tenuissimē contere, & cerato excepta impone. Aliud. Stercoris hyænæ, drach. i. l. æruginis drach. i. x. adipis anserini drachmas sex, galbani drachmā unam, cere drach. viii. olei drachmas xii. Aeruginem & sterlus aceto terito, & liquefacta affundito. Quod si hyænæ sterlus non adsit, porcino utitor. Apollonius autem inquit, demorsos locos acri muria aut piscium garo perfusos ac fotos, adipe crocodili eliquato illinito, & linamentis inditis obligato. aut carniū salfarum pinguiore partes tulas indito, aut melanthium cum aceti fecetritum imposito. Hæc enim & ulcus serpens compescunt, & morsus euestigio ab inflammatione uindictant. Post hæc autem lenticulam coctam cum mel letritā cataplasmatīs modo adhibeto. Erui uero farina cum melle subacta, aut iride cum melle morsum expleto. De cætero uero ulcera renutrito, & per communia auxilia ad cicatricem perducito.

De bestiis uirus eiaculantibus, & primum quibus artibus adhibitis uenenata animalia tollantur.

Cap. vii

De uenenatis animalibus scripturi, primū præsidia quædam indicabimus, quibus ea tollantur & perimantur. Perimuntur itaq; ex syluarū ac materierum exustione, in quibus uitam degunt. Verum in his quæ intra domos reperiuntur, feruentē aquam in eorum lustra ac latebras infundere expedit, & acidam muria feruentem per instrumentū fusorium, siphona Græci uocant, immittere. Vespis uero oleum infundatur, & assiduus fumus ipsarum tentorijs achabitaculis obfundatur. Quæ substrata ab omni uenenata bestia præseruant. Iuxta uias quidē igitur & in domibus ab omni uenenato animali præseruant substrata: abrotonū, conyza, dictamnū, uitex, echion, calaminthe, solanum, hastula regia, saluia, peucedanū, hypericū, polium, samfucus, gentiana, origanus, ru-

Mm 2 ta syl

ta syluestris, serpillum, laurus, pulegium, cupressi, aut cedri coma, aut ramenta, cardamomū, lysimachion, melanthium, bitumen, his addatur & gagates lapis.

Suffitiones præsuerantes, quæ incensæ uapore suo uenenatas bestias abigunt. Viticis folia, bitumen, castorium, melanthiū, cornu ceruinum aut caprinū, nasturtium, cardamomū, galbanum, propolis, peucedanum, panax, opopanax, conyza, cupressi, aut cedri ramenta oleo imbuta, gagates lapis, sagapenum, polium, canchryos radix, filix, baccae lauri, & similia graueolentia. Quum enim uenenata animalia omnia angustos habeant meatus, quàm celerrimè replentur, & ab huiusmodi odoribus obturantur ac suffocantur. Refertur etiam de stercore crocodili, quod per infundibulum suffitum, feras ipsas uenenosas ex latibulis suis exigit. Archigenes autem, ungulæ caprarum & pili, inquit, suffitu fugant bestias uenenosas: procul enim per ipsorum odorè relegantur. Stratonis suffumigium. Galbani, radicis canchryos, cornu cerui, melanthij, cuiusque unciam unam. Omnia terito, & in pastillos cum aceto redigito, atque ubi uti uelis, oleo madefacito, ac incensæ per mediam domum suffito, aut in ipsum ferarum latibulum per infundibulum uaporem immittito. Aliud suffimentum. Scorpions deturbans, & omne reptile ex ædibus exigens: galbani, sandarachæ, butyri, adipis caprini, æquales omnium partes in pilulas redigito, & ut dictum est suffito. Probè facit & pyretrum cum sulphure suffitum. Mirificè item Beronices suffimentum facit, quod in hoc ipso Sermone descriptum est, ubi ipsum cyphi etiam reperitur.

Illitiones præsueratiuæ.

Cap. VIII

Illita autem ferarum accessum prohibent, easque fugant, althææ semen & acetum cum oleo, baccae lauri & galbanum oleo trita. Panacis semen & flos & succus cum oleo: uehementer efficax est oleum, in quo cedrina ligna uiridia incoquantur, baccae iuniperi cum oleo, conyza, peucedanum, silphium, saluia, hastula regia, abrotonum, galbanum. Horum unumquodque excellenter facit aceto & oleo dilatum, aut etiam quædam ex his, aut omnia mixta & illita. Aut castorium cum medulla ceruina & unguento narcissino illitum uehementer efficax est. Apollonius autem inquit: Qui ex syluestris rutæ succo oblinuntur, omnibus uenenatis bestiis manus admouet, & non mordentur. Scunculi item succo manibus illitis qui uiperam tenuerit non mordebatur. Semen autem dracunculi aqua tritum & latibulis ferarum iniectum, ipsas in terram fugat. Probè facit & solani succus illitus. In uniuersum autem omnem feram cuiusque earum adeps illitus fugat.

Quæ apposita uenenata animalia occidant, & de his quæ in edulia & potiones incidunt.

Cap. IX

Venenatas bestias occidit galbanum cum spondylis & oleo appositum. Cancri appositus scorpioni, ipsum occidunt. Lychnis syluestris scorpions fugat: quod item facit pastinacæ semen. Cæterum & aquarum quas in potu accipimus animaduersionem habere oportet. Non pauci enim perierunt ex quibusdam bestiis in edulia & aquas dum coquantur collapsis, atque id maxime in peregrinationibus euenire solet. Quapropter tunc culinæ procul ab arboribus extruendæ sunt, propter feras in eis latibula habentes, quin & salamandræ quandoque & erucæ calefactæ obsonijs incidunt. Præcipuè itaque pinus & picea arborisugienda: in his enim letales sunt erucæ. In obsonia quidem igitur dum coquantur, illabi consueuerunt serpens & salamandra, & erucæ, in uinum uero uipere.

Com.

Communia remedia ad omnes uenenum eiuculantium ferarum plagas.

Cap. x

Per prædicta quidem igitur præcauere oportet, ne in malignas bestias incidamus. Si uero contingat ab animante quopiam uenenum iaciente percuti, huiusmodi remedijs cōmuniter utemur. Si quidem leuior sit plaga aut morsus, postea calida eum proluemus, deinde uero locum ipsum exugemus. Verū qui exucturus est, prius os oleo colluat, ne inde lædatur, atque ita ore ad morsum admoto exugat, & expuat uenenum. Cauere etiam oportet, ne exulceratam aliquam internā oris partem habeat exucturus. Post hæc uero cinis aceto subactus pro cataplasmate imponatur. Maximè autem ad hanc rem conducit, ex ficulis lignis exustus, aut laurinis, aut lignis uitis, qui si non adsint, eo qui haberi potest utendum est, diligentia ad hoc potissimum adhibita, ut inflammatio in loco excitetur, & materiæ ad morsum prouocentur. Quod si minus nobile sit membrum, & uehementior morsus, cucurbitam cum plurima flamma ad morsum adhibe, & uicinos locos circumcirca impactis uulnusculis scarificato: attrahetur enim una cum sanguinis & flatus attractione ipsius bestiae uenenum. Deinde à tepidæ largæ haustu uomere iube: & sic deinceps pharmaca exhibe. Vigilans etiam æger adseruandus est, ac desidens per totum curationis tempus, donec euidentem remissionem acceperint molestiæ concomitantes. Venter item adstrictus citra dilationē per infusum eluatur, & uesicæ quoque cura habeatur, quo citra impedimentum lotium excernat. Optimè autem auxiliantur, si statim in principio post cucurbitas plagæ imponantur animalia parua discerpta, & adhuc intus calentia, uelut sunt gallinæ, hœdi, agni, porcelli. Uenenum enim exugunt, & dolores leniunt. Aptæ sunt etiam his cataplasmata dilaniantia, uelut sunt allia cum melle, cepæ cum sale, ruta cum melle, silphium tritum inspersum, laser, piscis salus maximè uetustus, alliū ustum, plantago cum sale, melissophylon, uirgulta fici cum melle, suillum recrementū acetum, calaminthē, stercur caprinum cum aceto. Summè autem facit ad omnem bestiae uenenatæ plagam, præterquam aspidis, calx uiua cum oleo & melle crassitudine cerati imposita. At uero & inurere morsus ipsos expedit usque ad crustæ productionem. Aut sinapi largum cum rumice acuto imponere, aut salem tritum liquida pice exceptum. Præter opinionem autem facit ex uiperis theriace Andromachi emplastrī modo imposita. Emplastra uero ad omnem uenenosi animalis ictum conueniunt, ex dictamno apparatus, omniaque quæ attrahendi uim habent, qualia sunt & quæ ex sale, & quæ ex chamæleonis radice constant, & aphroditæ appellata. Egregiè autem hoc auxiliatur. Spumę argenti libram unam, cerusę librām I, resinę pinus libram I, olei ueteris libras tres, cerę sex uncem, ammoniaci thymiamatis trientem, galbani trientem. Cerusam, argenti spumam, & oleum coquito, donec non inquinent manus: deinde liquefacta adijcito, unito, & utitor reposito ad omnē morsum, & ad abscessum, & tubercula mamillarum, panos, sinus, fistulas, parotidas: ad miraculum enim usque discutit ipsas. Utitor & ad carbunculos. Arcet uehementer inflammationem, & raro citra magnam cōmoditatem & efficaciam adhibetur. Potiores cōmunes. In potu autem citra dilationē in omni uirulenti animalis morsu, theriace Andromachi præbeatur, aut Mithridatica, & consimiles cōpositiōnes. Ex simplicibus uero, uiticis semen cum uino tritum bibendum præbeto, rutę syluestris semen cum uino similiter tritum dato, platani pilulas, poliū, polemonij quod & philetarium appellatur drach. I, leporis coagulum aut ceruicę

Mm 3 allium;

allium, trixaginem, dictamnium, saluiam, castorium, ex unoquoque dra. i. bryoniae radicem drachmae pondere: seminis trifolij bitumen olentis dra. i. Prodest & conyza & chamapitys & scordium, cuiusque drach. i. ex uino. Auxiliatur autem omnino cancri fluuiales cocti aut affati comesti. Ranae item elixae & comestae. Verum si qui earum esum auersentur, ranas donec uictae reddantur coquito, & iusculum ipsum ignaris absorbendum praebeto.

De uespis & apibus.

Cap. xi

Quod si quis ab apibus & uespis illaesus permanere uelit, cum maluae folia cum oleo illita, & eruca siue bruchus cum oleo illitus adseruabunt. Quandoquidem uero quidam ab his clanculum percussi, ob dolorem perturbantur, putantque se a maligno aliquo animante petitos esse, necessarium existimo prius ostendere quae signa ad horum plagas comitentur. Hos itaque qui ab apibus punguntur, dolor ictus consequitur, & rubor loci, cum tumore partium in ambitu litarum: stimulus autem omnino in percusso loco reperietur. Eadem etiam hos quos uespa pupugit concomitantur, sed intensiora; uerum stimulus uespa in percusso loco non relinquit. Auxilium autem utriusque ferunt, luto aut stercore bubulo eis illito cum posca, aut maluae folijs impositis cum posca, aut cimolia cum malua & posca, aut sesamo cum posca. Naturaliter autem opitulatur ueneranda & uirifica crucis imago in sigillo ferreo exculpta, & plagae appressa. Non enim perimit amplius inflammationem generari. In potu praeterea ipsis foliorum lauari tenerorum drach. ii. cum uino austero praebeto.

Ad stellionis morsum.

Cap. xii

Qui a stellione morfi sunt, assidue & contente dolitant, morsusque locum liuidum habent. Iuuantur autem euestigio si caepe & allia cataplasmatibus modo eis imponantur. Auxiliantur amplius eadem comesta, uino meraco post eorum acceptionem absorpto. Vtiliter etiam sesamum eis imponitur, aut melanthium aqua multa affatim affusa.

Ad salamandrae morsum, & lacertae chalcidis.

Cap. xiii

Quos salamandra percussit, eos dolor uehemens & crustae productio consequitur. Adhibeatur autem eis communis cura iam praedicta. Qui uero a lacerta chalcide appellata percussi sunt, eos tumor pellucidus consequitur, uelut in ingrore in ambitu plagae relucente. Consequitur autem & putrefactio. Curatio uero eadem illis accommodanda est, quae ad muris aranei morsum referetur.

De mure araneo.

Cap. xiiii

Mus araneus colore quidem mustelae similis est, magnitudine autem mure, unde & mygales apud Graecos obtinuit nomen. Os autem sublongum habet, & exiguum caudam. Dentes uero tenues, atque eos duplici ordine sitos in utraque maxilla, quo fit ut quatuor dentium ordines habeat. Qui igitur ab eo morfi sunt, his uulnera manifesta fiunt: quadrifido enim ordine uulnera conspiciuntur. Et sanguis quidem primus purus promanat, paulo post uero saniosus. Animal enim ipsum putrefactione occidit. Consueuerunt etiam bullae insurgere, quas si quis dirumpat, carnem subiacentem seculentam uidebit, & fissuris disparatam. Inflatio autem sequitur demorsos. Caeterum hoc animal frequentius ad testes insilire solet, eosque uerbere impetere non hominis solum, sed cuiusque etiam bruti animantis. Auxilium autem ferunt quum ob putrefactionem periclitantur, post praedicta communia remedia adhibita, ab huiusmodi rebus. Lauri foliorum tenerorum drach. i. aut ii. cum uino tritas bibendas praebeto. Conueniunt etiam ipsis

ipsis omnia prædicta cōmunia remedia in potu accepta ex uino dulci. In peco-
ribus uero & iumentis illa ipsa cum aqua trita naribus infunde. Est enim ipsis
præfens remediū: unde etiam hominibus similiter in potu præbeto. Morsum
porro cum cumino integito & allio, putamine extrinseco non abiecto, eadem
etiā cum oleo trita assidue & diligenter locis circumfritis illinito. Si uero ruptæ
fuerint bullæ, & ulcera oborta, acida muria proluc, & ordeum ustum tritum im-
pone; uerū non rumpentur, nisi pregnans fuerit mus araneus, qui morsum in-
flixit. Quod si exulcerentur, mali punici dulcis coriū coctum tritum impone,
ulceraq; ex eodem decocto, aut magis myrti decocto, perfusa foue. Strato uero
inquit: in muris aranei morsu locum scarificato, ac ipsum murē araneū ustum
cum aceto cataplasmat is uice imposito, aut sinapi tritū itidem ex aceto. In po-
tu uero panaca exhibeto, erucam, capparis corticē, gentianæ radicem, & uer-
benacam rectam tum cum uino bibendā præbe, tum pro cataplasmate im-
pone; malux item folia impone, & antidotos magnas bibendas exhibe.

Ad scolopendræ plagam.

Cap. xv

His qui à scolopendra icti sunt, eadem remedia conueniunt quæ ad mu-
ris aranei morsum sunt prædicta, & sales cum liquida pice impositi: & cedria
cum melle: & allium cum folijs fici, & cumino, eruoq; ac uino. In potu uero
etiam ea commodant, quæ à mure araneo morsis. Amplius autem & absin-
thium & menta cum uino.

Ad araneæ ictum.

Cap. xvi

Est & araneæ genus, quod ictu continentes dolores inducit: rubor uero cir-
capracordia, & urinæ emittendæ difficultas ægros concomitatur: aliquando
uero & suffocationes. Ab eo percussis rutam syluestrem, & uiticis albæ semen,
aut folia bibenda præbe. Allium etiam largè edendum, ac uinum insuper me-
racum absorbendum exhibeto.

De tetragnathis.

Cap. xvii

Tetragnathus, species est phalangij subalbida, pedes scabros habens, & iu-
xta caput eminentias duras, unam rectam, alteram latam, ut existimes eum ora-
quidem habere duo, maxillas autem quatuor, & lineam per os æqualem. His
qui ab eo percussi sunt, communiter quidem eadem accedunt quæ à scorpio
percussis. Proprie autem in ipsis plaga contentè dolet, & percussus locus sub-
albicans est: tumor uero faciem & caput occupat, & percussæ partes usque
ad articulos gracilescunt: cibum item ac alimentum non sentiunt membra, &
post adeptam sanitatem uigiliæ intensæ succedunt. Opem autem ferunt ex
calaminthæ potu, aut trifolij, rutæ, panacis, polij, & his quæ ad percussos, a pha-
langio referentur.

De percussis à phalangio.

Cap. xviii

Phalangiorum genera quidem plura sunt: quæ uero apud eos qui de noxijs
bestijs scripserunt referuntur, ut plurimū sex numero existunt: unum quidē ex
eis rhagium, alterum lupus, tertium formicariū, quartum cranocolaptes, quin-
tum sclerocephalon, sextum scolecium appellatū. Ac primum quidem rhagiū,
id est, acineum, figura rotundū est, colore uero nigrum, acini uuæ nigræ simili-
tudine, unde etiam appellationē accepit. Et os quidem iuxta mediū uentrem
habet, pedes uero ex utraq; parte quā breuissimos. Alterum uero lupus ap-
pellatum muscas perdit, eisq; pascitur: ac corpus quidem habet latum ac uolu-
tile, partes uero circa collum ipsius incisæ sunt, amplius aut & os eius eminē-
tias tres habet. Tertium autem myrmeciū, hoc est, formicariū dictum, formi-

Mm 4 ca ma

ca maximæ assimilatur: color est fuliginosus, corpus uero eius uelut astris quibusdam insignitum est, maximè circa dorsum, Quartum deinde cranocolaptes, sublongum est, & uiride, stimulumq; iuxta collum habet, atq; si in quem irruat, locos circa caput petit. Quintum sclerocephalum dictum, caput habet faxeum & obduratum: lineamenta uero per omne corpus similia animalibus illis, quæ circumuolitant noctu lucernas, Sextum autem scolecium, siue uermicarium appellatum, sublongum est et submaculosum, maximè circa caput. Atque hæc quidem species phalangiorum enumerantur, quas sanè obseruare oportet. Quæ uero percussos ab eis concomitantur, cõmunia sunt iuxta magnitudinem & paruitatem discreta. Morsus porro tenuis est ut uix conspici possit, tumor autem liuidus, quibusdam etiam rubicundus: frigiditas adest circa genua & lumbos ac scapulas, quandoque uero totum corpus aggrauatur. amplius & dolor alliduus adest, tremor, pallor, uigilia: quibusdam uero pudendi tentigo, & circa caput pruritus, aliquando etiã circa suras, oculi humecti & lachrymantur ac caui, & uenter inæqualiter eleuatur. Intumescit autē uniuersum corpus, faciesq; & maximè circa linguam partes ut impediū habeant sermonem, quibusdam uero & urinæ emittendæ difficultas adest cū pudendi tentigine & dolore. Si uero minxerint, aquosæ ipsorum sunt urinæ, quædam aranearum textis similia in se habentes: & uomitus quoq; consimilis est: aliquando uero per lotiū, & per uentrem talia excernuntur. Cæterum in calidam aquam demissi à dolore leuati sibi uidentur, post uero contentè dolent pudendū. Senioribus uero pudendum plurimū laxatur, ac minimè intenditur. Atq; hæc quidem cõmuniter ad omnium ictus sequuntur. Si uero cranocolaptes aliquem percusserit, caput magis dolet, & uertigines consequuntur, frigus continens, delirium, corporis iactatio, & stomachi punctura. Omnes autē à phalangijs percussi assiduis balneis iuuantur: plaga etiam ipsa ex trifolij bituminosi decocto cum oleo proluitur, totum uero corpus ex cerato liquidissimo pinguescat. Iuuantur etiam fomentis spongiarum in calido aceto tinctorum, & sæpe ad plagam adhibentur. Cataplasmata autem eis conueniunt, bulbi, sanguinaria, porrum, fursures acetico cocti, ordeacea farina folijs lauri cum ea in uino aut melle incoctis, ruta, grossi ficus, caprinū stercus cum uino, samfucus cum aceto, syluestris ruta cum aceto, itemq; cyperus. Asclepiades autem hoc inquit, utere ualde laudato. Seminibus rutæ syluestris, seminis erucæ, staphidis syluestris, canchrys, seminis uiticis pilularum aut foliorum cupressi, æquales omnium partes aceto terito, & melle exceptas imponito. Idem & in potu acceptū auxiliatur. Aliud laudatum, quod similiter & potatum & impositū iuuat. Sulphuris uiui drach. iiii. galbanum drach. iiii. succi cyrenaici dra. ii. aut si non adsit, laseris drach. iiii. amygdalarum amararum repurgatarum drach. ii. in uino diluito, & melle excepta imponito. Bibendū etiam, ut dictum est, præbeto. Amplius uero & cupressi folia aut pilulas tritas cum uini & olei hemina una à phalangio percussis dato. Aut anisum, aut daucum, aut cuminum, aut melanthiū, aut piper, aut agaricum, singula drachmæ pondere præbeto. Aut ammij drach. ii. aut iridis drach. i. aut hyperici drach. i. aut trifolij bituminosi quantum tribus digitis apprehendi potest. Conueniunt etiam lauri bacca, scorpiuron, serpillum, silphium, calamintha, chamæpitys per se & cum ruta accipere, singula uero ex uino. Aut mentha & samsciculum posca meraciore coquito, & decocti cyathos ii. præbeto. Idem & samfuci, & radices spinæ albæ decocti, ac trixaginis & pulegij præstat. Lixiuum item & radices hederæ succus cum aceto. Vtere etiã ad eos remedijs à scorpio percussis.

perculsorū, & ex uiperis theriaca, & consimilibus. Asclepiadae, ad percussos à phalangio: hac Chariton utebatur, & per hominum conuentus oberans à phalangis percussis auxilia promittebat. Seminis spondylii sicci, calaminthæ, æquale pondus simul terito, & ex uini cyathis II, præbeto atq; id fac pe per diem facito. Aliud eiusdem. Succu cyrenaici, seminis dauci, mentæ siccæ, spicæ nardi, singulorū æquale pondus coagmentato cum aceto, & dra. I, cum poscæ meracioris cyathis IIII, præbeto, & à potu ægrum in calidam aquā demittito. Quod si succus cyrenaicus non adsit, pro eo laser purum conijcito. Aliud ualde præclarum. Cancchryos, seminis rutæ, piperis, myrrhe, staphidis agrestis, singulorum drachmā unam, radicis cyperi drachmam I, coagmentato, & drac. I, cum uini odorati cyathis IIII, ac mellis cyathio I, exhibeto. Auxiliatur item eis allij esus, balneum, & uinum.

De his quos scorpio percussit.

Cap. XIX

A scorpio percussos uehementissimus plagæ dolor consequitur, frigiditas, ac tensio, & stupor, circūq; plagam & totum corpus frigidus sudor, & his qui iuxta infernas partes percussi sunt, inguina excitantur, ac intumescunt, qui uero circa supernas, locus sub alis, & hæc quidem leuiter percussis adsunt. Validius autem ictis, ardor circa plagam adest, quemadmodum in ambustis, & uerrucarum instar formicarum eruptio, circa labra & totum corpus, ut grandine se impeti putent: facies distorquetur: sordes circa oculos adsunt glutinosæ, & lachrymæ uiscosæ: durities articulorum, anusq; præcidit cum egerendi cupiditate, spuma circa os est, & uomitus largus, singultus, conuulsiones opisthotonicis similes. His igitur serpillum, althææ radicem, & elaphoboscum bibendum præbeto. Præter opinionem autem facit elaphoboscus tum uiridis coacta, tum sicca potata. Pastinacæ item syluestris semen & nuces ponticæ: hæc enim in zona gestatæ non permittunt aliquem à scorpio lædi. Aliud. Cochleam hortulanam maximè accipito, eamq; unā cum testa tritam plagæ impo- nito, & confestim sedabis dolorem. Idem etiam uermes terreni facere dicuntur. Aliud. Cancrum fluuialem cum uino & lasere terito, ac bibendum dato. Aliud. Verbenacam rectam aut uiridem pro cataplasmate impone, aut siccam tritam bibendam præbe. Aliud. Cumini, melanthij, seminis uitis, singulorū par pondus tere, ac dra. I, inde ex uino exhibe. Poteris etiam omnibus cōmunibus auxilijs prædictis uti. Aliud, hoc & ad phalangij & scorpij ictum facit. Styracis drach. VI, sulphuris uiui drachmas sex, pyretri drachmas IIII, seminis rutæ syluestris drachmas III, castorij drachmas duas, seminis erucæ drachmas duas, cum sanguine marinæ maximè testudinis subige, aut si nō adsit, terrestris, & nucis ponticæ magnitudine præbe cum poscæ aut ex aceto. Alia antidotus, excellenter ad scorpij ictum conducens: quæ etiam ad meipsum ægrè affectum usus sum, & seruatus. Habet autem hoc modo. Castorij, succi cyrenaici, piperis, cuiusque drach. IIII, costi, spicæ nardi, croci, succi centaureæ, cuiusq; drach. II, mellis despumati quantum sufficit. Datur nucis ponticæ magnitudine. Datur autem à scorpio ictis cum uino diluto, ab aspidemorsis cum aceto diluto. Detrahendi uim habet, adeo ut digestos etiam in membra ueneni succos eruat: & ob id etiam ad uulnæ strangulationem utiliter cum hydromelite exhibetur. Aliud. Aristolochiæ longæ, melanthij, radicis panacis, seminis rutæ syluestris, æquales omnium partes committe. Dantur inde dra. II, cum uini meraci hemina una. Optimè autem ad eos facit, similiterq; ad phalangij morsum antidotus ex quatuor rebus ad podagricos

gricos descripta, ex aristolochia uidelicet, gentiana, myrrha, & baccis lauri. Da-
to etiam si abundes ex theriaca. Ad plagam autem scorpionē ipsum qui percus-
sit, si inueniri queat, imposito. Aut stellionem dissectum plagæ adhibeto. Cala-
minthe etiam quæ iuxta aquas nascitur imposita, confestim dolores remittit &
tollit. Allium quoque aut per se aut cum sale tritum imponatur, aut syluestris ru-
ta, aut scorpiurus herba. Ego uero syluestris rutę drachmam unam in aceto te-
ro, & ceræ unciam unam, resinæ pinus quadrantem liquefacio, & parum olei
affundo, unio, ac impono. Et est mirabile pharmacum. Quin & ouillum ster-
cus uino coctum & impositum, confestim dolore liberat. Vtere item præscri-
ptis communibus emplastris, & eo quod ex dictamno apparatur, & quæ ex sa-
libus quæque ex chamæleone constant.

De morsis ab aspidē.

Cap. xx

Aspidum apud ferarum scriptores tres species reperiuntur. Quædam enim
ex eis terrestres appellantur. Quædam uero Chelidonix & circa fluuiorum ri-
pas, præsertim Nilī, latibula habent. Aliæ uero Ptyades nominantur. Terre-
stres quidem igitur maiores sunt, & quandoque usque ad quinque cubitorum lon-
gitudinem reperiuntur. Maximè uero Ptyades bicubitales sunt. Chelidonix
autem, cubito maiores reperiuntur, & colorē hirundini similem habent. Ptya-
des uero cinereo sunt colore uiridiq; & ad auri colorem declinante. Terrestres
uero ut plurimum & ipsę cinerei sunt coloris, quanquā & subuirides reperiuntur.
Cæterum accessiones & signa communia sunt in his quos aspidēs momorde-
runt. Vulnere enim in demorso loco ueluti ab acu puncta inueniuntur. Bina
quidem ex masculi morfu, ex foemellæ uero quatuor, citra magnum dolorem
a quibus nihil effluit, nisi uiolentum animal sit quod morsum infixit. Conse-
quitur autem stupor, pallor frontis, refrigeratio, assidui hiatus, palpebrarum
nictationes, colli inclinatio, capitis grauitas, segnities, & collapsio in somnum
profundū. Ad finem uero & conuulsio. Mors autem in tribus ad summū horis
ex terrestris morfu sequitur. In chelidonix uero ictu præsentissima adest. facit
rō his qui a ptyade cōspuuntur, caligo oculorū succedit, & cordis dolor, facit
tumor, ac auditus corruptio. Tardius autem mors cōsequitur. Auxilium autē
ab aspidē morfi ferunt, & præsertim quos ptyas momordit, ex acerrimi aceti po-
tu: dandum autē est quousque aceti qualitatē circa dextram præcordiorū partem
perceptent: hepar enim in morsis ab aspidē primum aiunt sensu priuari. Cate-
rum ad prænotionē an uicturus sit percussus, centauream cum uino nitam bi-
bendam præbeto: siquidem enim euomer pharmacum, morietur, si non, ui-
uet. Quo uero malignitas ueneni distributi & in corpus digesti probe euo-
matur, allia trita cum zytho exhibeto, donec nausea abundus reddatur. Aut opo-
panaca cum uino diluto dato, & confestim uomitionem operabitur. Nummus
autem inquit: Origanum uiridem aut aridam pro ægri uiribus cum uino da-
to. Post uomitum antidotis theriacis utendum & communibus remedijs præ-
dictis. Vuliter autem ad plagam imponuntur, post cucurbitarum adhibiti-
onem & scarificationem, centaurea cum myrrha & modico opio. Rumex au-
tem si cataplasmatīs modo imponatur, nihil lædetur. Præter opinionem uero
auxiliatur theriace tum plagæ imposita, tum potata. Pro sunt autem & assidue
excitationes cum euulsionibus & plagis, & uniuersi corporis motus, & aqua
marina calida pro fomento aspersa.

De uiperæ maris & foeminæ morfu.

Cap. xx

Vipera foemina colore quidem est subflauo, multis instar rotarum notis ex-
orna-

ornata, magnitudine cubitali, longissima uero palmos tres aequat. Cauda autem habet acruatim in tenuitatem delinentem, non paulatim imminuta, et omnino carne nuda cauda & aspera. Oculi uero subrubri, & caput latius, & angustius collum. Ventrem autem sinuosiore habet, & in gressu ad summum caudae nititur, sensim uero inambulat, & quatuor habet caninos dentes. Vipera uero mas eiusdem est coloris: uerum caput angustius, & collum crassius habet, & uniuersum corpus tenuius, & quodammodo prolixius: gressum autem supernè circa uentrè firmat, & alacrius mouetur: dentes autem caninos solum duos habet, paulatim uero cauda ei imminuta est, quemadmodum & reliquod serpentium generi, non acruatim uelut in uipera foemina dixi, & per hoc sanè a foemina differt. Reperiuntur igitur in eis quos uipera mas momordit uulnera in plaga bina: in his uero qui a foemina demorsi sunt uulnera quatuor. Primum autem ex eis excernitur sanguis, deinde sanies sanguinolenta & oleosa: adeo tumor biliosus, feruidus, bullosus, subruber, deinde liuidus & denigratus & proferpens. Os adeo exsiccatur, ardor, exolutio, & frigidi horroris insultus, aliquando & bilis uomitus, tormina, capitis grauitas, uertigo, pallor, lingul tus, febris, spiritus & anhelitus celer, color plumbeus, sudor frigidus. Mors in horis septem, aut ut longissime absit tertia die, in his qui non seruantur, & maxime his qui a uipera foemina sunt icti. Conuenit igitur priusquam cruenta prodant lotia, allij plurimū edere, & uinum meracū multum bibere, ac uomere. Efficacissimū enim in eis remedium est allij esus, ac meracior uini potio, inquit Archigenes: adeo ut si quis multum eius sustineat usum, itemq; meri potum, nullo alio auxilio habeat opus. Dato autem citra dilationem theriacen ex uiperis bibendam, eandemq; plagae superposito. Quin & ipsam uiperam excoctam & coctā, capite ac cauda & interaneis uisceribus omnibus reiectis, uel sanguillam edendam praebeo. Caput autem amputatum diligenter per uellam teneto, & morsui imponito ea parte adhuc calente quae contigit collum: id enim extrahet uenenum. Aut quempiam qui ore plagam exugat adhibeto, qui, ut supra dictum est in communibus remedijs, os prius habeat ex oleo colatum. Aut gallinam dissecato, & internè adhuc calentē morsui imponito, atq; hoc remedium frequenter ac assidue repetito. Scarificare autem per ambitum oportet demorsum locū & cucurbitas ad mouere. Postea uero fraxini folia tundo & exuccato, & succum quidem in potu exhibeto, quod uero ab expresso succo reliquum est ad morsum imponito. Est autem fraxinus arbor ex qua fraxinea appellata ligna caduntur: est enim ualde efficax ad uiperarū morsus hęc. Melissophylli item folia & succus cum uino potatus & uulneri impositus euident auxilium confert, etiam si iam moriatur ager. Aiunt autem si quis melanthij drachmas IIII, edat, non moriturum. Similiter etiam melaphrodis herba efficax est, & cancri fluuiales cum lacte triti & potati & plagae adhibiti. Magnifice etiam profunt ranæ coctæ comestæ, & iusculum earum bibitum. Praestat & nasturtium plurimū edere, ac tritum quoq; cum uino bibendum exhibere. Facit autem mirabiliter testudinis sanguis exsiccatus cum syluestri culmino potatus. Utendum etiam omnibus cōmunibus remedijs supra relatis: sustentum autem fuerit eadem saepe scribendo repetere. Maxime uero utendum est Anchusæ radice, & heliotropio cum uino. Dandus & hæmatites otatis uero a uomitu theriace Andromachi exhibeatur. Post scarificationē et gallinarum impositionem plaga ex trifolij bituminosi decocto calido per multum

tum tempus proluatur ac foueatur. Nam si pauco id tempore facias, peius afficiuntur. Deinde porrum & panem cum sale imposito, aut allium cum aceto, aut cinerem ipsius exustum, aut fraxini cinerem, aut alium quemuis cum aceto, aut hastulæ regiae folia, aut sycomori folia cum pane, aut lauri folijs teneris coctis & cum oleo tritis locos integre prius quam claudantur, aut caprinum stercus imposito cum uino. Asclepiadæ epithema, ad uiperæ morsum. Sagapeni, piperis, laseris maxime cyrenaici, opopanacis, cuiusque unciam unam, galbani sextantem, sulphuris uiui sextantem. Succos aceto dissoluito, & arida trita inspergito, & ad emplastri formam redacta plagæ imposito. Forinsecus autem folijs fici aut urticæ contegito. Aliud. Centaureæ, aristolochiæ, radicis peucedani, æquales partes contundito, cribrato, & aceto subigito, adiectoq; galbano in emplastri formam reducito. Aliud. Canchryos, staphidis syluestris, aristolochiæ, radicis bryoniæ, singulorum partem unam, opopanacis partes duas, aceto subige, & utere ut dictum est. Utendum & prædictis communibus cataplasmatibus & epithematibus, maxime uero Andromachæ theriaca. Aliud ualde bonum. Cancrorum fluuiialium carnes terito, & adiecta iride & calaminthe rursus sufficienter terito, idemq; rursus modico sale addito facito, & pastillos informato, quibus in umbra exiccatis utitor, in potu quidem ex aqua mulsa, aut uino: in cataplasmata uero cum lacte dissoluito.

De diphsæ.

Cap. xxii

Diphsæ à quibusdam causus appellatur, estq; uiperæ species quæ in maritimis magis locis reperitur, magnitudine cubitali, ex crassa in tenuem desinens. Notas autem habet per omne corpus fuluas & nigras: caput uero angustius. Sequitur autem ab ea morsos, præter ea quæ de uipera dicta sunt, & sitis intolerabilis planè, adeo ut etiam si multus eis potus exhibeatur, sitis non sedetur. Et tamen neque per urinas, neque per uomitum, neque per sudores quicquam excernitur. Duobus igitur pereunt modis, aut ob multam sitim exulsi, si potum non sumant: aut ob multam expletionem distentus rumpitur uenter, uel infernè circa inguina uel circa inum uentrem, quemadmodum in hydropticis fieri consuevit. Cæterum & his ueluti à uipera morsis auxiliamur: propriè autem in his portiones magis urinam cientes exhibeantur. Alius item per infusum eluatur, & oleo cum decoctionibus exhibito ad uomitum cogantur. Ad plagæ uero locum post exuctionem, & scarificationem, & cucurbitularum affixionem, & dissectas gallinas, calcem uiuam cum oleo imposito, & emplastra adtractoria, & theriacen.

De hæmorrho & hæmorrhoide.

Cap. xxiii

Animalia hæc colore quidem sunt arenoso, magnitudine autem tres palmos æquant, & in tenuem ac angustam figuram paulatim desinunt. Sunt autem igneo oculorum fulgore, rectaq; & tardè proreptant. Per corpus uero multis notis albis & nigris uariiegata sunt, & asperioribus squamis oblita, quæ propter dum serpunt sonus auditur. Et femina quidem uentri incumens per terram reptat, & gressum infernè circa caudam firmat: mas uero circa uentrem in gressu nititur, & collum in serpendo extendit. Consequitur horum morsum color icti loci cruentus, mali coloris & nigricans: ex quo nihil in principio effluit, præterquam paucum quippiam aquosum. Stomachi adest dolor, & spirandi difficultas. Deinde sanguis ex naribus profluit, & ex foraminibus ipsius morsus. Et quicquid est in toto corpore cicatricum, id rumpitur & sanguinem profundit: atque hæc quidem in maris hæmorrihi morsu contingunt. A femina uero

na uero hæmorrhoidis morfu ad hæc & anguli oculorum sanguine manant, & gingiuarum dentium, & unguium radices: & ut simpliciter dicam, per omne corpus sanguinem efferrî contingit. Dentes præterea excidunt, & gingiuarum putrefiunt. Horum porro curam facere oportet, primum quidem sanguinis eruptioni obluendo ac resistendo per ea quæ apte sanguinem sistere possunt, deinde cataplasinata plagæ imponendo ex folijs uitis coctis tritis cum melle, & portulacæ folijs cum polenta. Antea uero quam cruenta prodeat urina, allium multum edant, & uinum multum dilutum bibant, & ad uomitum cogantur: deinde confestim theriace exhibeatur, & postea pisces multos, alijs tritis cum oleo tinctos, edant. Sumant item in cibo panem & uiam passam dulcem, & deinde uino diluto largè hausto uomant. Plaga uero aqua frigida proluatur. Vesica autem spongijs calidis foueatur.

Præparatio sanguinis testudinis marinæ, & usus.

Cap. XXIII

Testudinem super ligneum aut fictile uas supinam reclinato, eiusque caput statim amputato, & leuata ipsa sanguinem supposito uase excipito, & congelatum deinde per harundinem in multas partes secato, atque operculi uice cribrum uasi superponito, & ad solem locato, siccatum uero reponito, ac utitor ad uiperæ morfum drachmis duabus exhibitis, ex poscæ cyathis uno: sequenti deinde die siccæ sanguinis drach. IIII, cum acetæ cyathis duobus dato: & tertia deinceps, sanguinis drach. VIII, ex acetæ cyathis tribus.

De ammodite, aut cenchria.

Cap. XXV

Ammodites magnitudine quidem cubitalis est: maior enim non pingitur, neque scribitur, colore uero arenosus, per corpus autem maculis nigris insignitur. Caudam autem habet præduram supernè discissam. A quibusdā uero cenchrias, hoc est, miliaris, ob caudæ instar milij duritiem appellatus est. Latiores autem maxillas quam uipera habet, quumque in multis alias ei similis sit, colore magis discerni potest, uipera enim subflaua est. Cæterum ab Ammodite percussos festina ut plurimum mors sequitur. Qui uero breui non pereunt, his sanguis ex uulnere promanat, & uulnus intumescit, paulo post autem sanies effertur, sequiturque capitis grauitas, & animi deliquium. Qui uero optime dispositi sunt, in triduo intereunt, quanquam aliqui usque ad septimum diem durarint. Celerius uero mors adest his qui a foemina sauciantur. Auxilium porro & hi ferunt, primum quidem a communibus remedijs, utpote a cucurbitularum appositione cum scarificatione per ambitum uulneris locorum, & superiorum partium constrictione, & ad ipsam plagam scalpelli admotione. Propriè autem eis auxiliatur menta cum aqua mullâ potata, castorium, cassia, & artemisia succus cum aqua. Danda etiam in potu theriace, eadem quoque plagæ imponenda. Utendum & emplastris attractorijs: postea uero cataplasmata, quæ ad nomas siue ulcera serpentia conducunt, imponenda.

De sepe.

Cap. XXVI

Serpens qui seps appellatur, longitudine quidem duorum cubitorum reperitur, ex crasso autem in tenuem abit, recta uero ac tardè proserpit: caput habet latum, os acutum: uniuersum autem corpus multis albis notis respersum. Cæterum his qui ab eo percussî sunt, ex uulnerib, manifestus sanguis excernitur, paulo post uero sanies graueolens, tumor & dolor languidus est: at affectæ partes putrefactæ dealbantur, ac totum corpus uiriligini (quæ alphas appellatur) simili colore inficitur: defluunt capilli toto corpore, atque intra tres aut quatuor

Nn dies

dies pereunt. Porro opem & hi sentiunt ex eisdem rebus quæ in uiperæ & cerastæ & ammodiæ morfu relatæ sunt. Exhibenda est præterea portulaca multa in cibo, & uinum bibendū myrtites meracius. Conueniet item spongiam calido aceto imbutā morfui imponere, & ex butyro cum melle locum illinire, aut milium cum melle, aut paleas unā cum terra eis adhærente exustas illinito.

De cenchrite siue acontia.

Cap. xxvii

Cenchrites serpens est magnitudine duorum cubitorum, figura autem crassa in tenuem abeunte, colore uiridi maxime iuxta aluum, ut milium colorem ferat: unde & cenchrias, hoc est, miliaris appellatur. Aiunt etiam hunc seipso fortiolem fieri, quum milium floret. Cæterum ubi se ad lædendum parat, extendit seipsum, ac ueluti iaculum uibratum corporibus inuolat, atque hoc modo uerberat. Ab huius morfu omnia quæ de uipera dicta sunt sequuntur, atque etiam grauiora, adeo ut etiam putrefactiones & carniū defluxus consequantur, ac grauior item mors succedat. Cæterū remediā similiter eadem quæ ad uiperæ morfum his conducunt.

De ceraste.

Cap. xxviii

Cerastes magnitudine cubitalis est, longissimus cubitorum est duorum, corpore uero arenosus est, & iuxta caudam desquamatus: eminentias habet in capite duas, cornuum similitudine. Partes uero circa uentrem ex ordine squamis oblitæ sunt, quapropter in serpendo sonum sibilo similem edit, per obliquū autem non rectā prorepat. Cæterum percussis ab eo eleuatio actumor plagæ capitis clauī similitudine insurgit, & sanies profluit uini colore aut nigricans, & maxime per ambitū, uelut in cruentatis ac fugillatis aliās fieri consuevit. Reliqua item quæ in uiperæ morfu dicta sunt, etiam his succedunt, cum intensione uehementiori. Vt plurimum uero usque ad nonum diem superfunt. Remedia autem eadem quæ morfis à uipera conferunt.

De dryine.

Cap. xxx

Serpentes dryini appellati abundant magis iuxta Hellepontum, latibula autem habent in quercuum radicibus. Est autem dryinus foetidus, unde & si quis eum non uideat, foetore loci cognoscatur. Est autem cubitorum duorum longitudine, & obesus, ac asperrimis squamis circa uniuersum corpus munitus. In his ipsis squamis muscæ pennis æreis latibula sua habere dicuntur, quæ tandem ipsos serpentes occidunt. Adeo autem malignæ ac nocentis naturæ est, ut si quis eum calcet modo, illius pedes excoriet, & tumorem ingentem circa cruci inducat. Et quod magis mirum uideri potest, aiunt etiam Medici curantis ægrum manus excoriari. Si quis autem, inquiunt, animal ipsum occidat, omnia quæ odoratur ab eius foetore corrupta putat. Porro qui ab eo percutiuntur, his tumor insurgit nigricans, dolor uehemens, nome, delirium, corporis siccitas, singultus, uomitus biliosus aut omnino uomitus simplex, urine suppressio, tremor, interceptio uocis, stupor, scissura & mortificatio percussorum locorum. Plurimi etiam intereunt. Porro & hi ipsi quoque ex his quæ in uiperæ morfu dicta sunt, opem sentiunt, itemque ex communibus remedijs iuxta consequentium accessionum proportionem adhibitis.

De amphibæna & scytala.

Cap. xxxi

Animalia hæc inter se similia sunt: non enim ex crassiss in caudam tenuem abeunt, sed æqualis crassitudinis per totum existunt, ut neque cognoscantur uident ea, iuxta utram partem caput aut cauda sint sita. Differt autem amphibæna à scytala, in eo quod ex utraque parte progrediatur: unde & amphibæna

Græcia

Græcis est appellata. Galenus autem amphibænam animal biceps esse dicit. De hac bestia ferunt, quod si fœmina uterum ferens ipsam transgrediatur, conceptum malè pariat ac abortiat. Ceterum ab utroque animante demorsis, contingit morsum obscurum esse, ac uix apparere, ueluti sunt muscarum puncturæ: quapropter etiam si mordeant, nō enecant tamen, uerum inflammationes inducunt, ueluti contingunt etiam ab apum ac uesparū stimulis. Quare transferantur ad hos quoq; quæ de illis sunt relata, uerū facultate intensiore. Aiunt autem scytalam chalcidicam eiusmodi accessiones sequi, quales à uipera morsos. Vnde & iisdem remedijs ad eius morsum utendum, & ut compendiò dicam, ad omnem uenenatæ feræ morsum: cuius speciei hic non reperis nomenclaturam, auxilia eadem quæ ad uiperæ morsum conducunt.

De parca & spathiuro.

Cap. xxxi

Pareas serpens in Syriæ locis reperitur, colore autem alij quidē æs referunt, alij uero nigricant. Morsum autē etiam si inflixerint non enecant: uerum quem admodum amphibæna & scytala, ita & hic plaga sua tantum inflammationē inducit. Quare ex iisdem etiam curentur, & ex his quæ de cherhydro referuntur. Ceterum spathiurus in locis iuxta chalcidem magis inuenitur. Est autem animal ex crasso in caudam abiens tenuem: latum habens caput, ac mures comedens. Neq; uero hic morfu enecat, sed inflammationes tantū inducit. Quapropter ab eis percussi iisdem consimilibus remedijs curentur.

De peliade & elapē.

Cap. xxxii

Signa quidem horum animalium apud ueteres non sunt descripta, utpote quæ omnibus sunt manifesta. Contingit à peliade morsis dolor circa locum, & putrefactio, non periculosa tamen, & uexatio ac obfuscatio oculorum, ex ueneni nimirum ad ipsos distributione. Curantur autē succo ptisanæ cum oleo in potu exhibito, & oxylapathi decocto, & simplicioribus remedijs ad ictericos descriptis. Oculi uero lotio pueri uenrem nondum experti proluantur tum per se, tum muria ammixta. Caput item similiter ex eisdem perfundatur. Post purgationem deinde corporis opobalsamum cum melle illine, aut collyrium aliquid uisum acuens quod meatus rarefacere potest. Simul enim cum lachryma rum profusione & uenenum excernetur. Si uero dolor consequatur oculorū, eum lenibus collyrijs mitigare oportet, quæ tamē nō stupefacent. Elapis porro morsum tormen uoluulosum consequitur. Alias cōmunibus auxilijs curantur. Maxime uero his quæ tormina leniunt, & urinam cient.

De basilisco.

Cap. xxxiii

Hocce animal magnitudine est palmorum trium, subflauum & capite acuto. In capite autem eminentias tres habet. Vim uero super alia omnia reptilia maximam acquisiuit, ut nulla ex eis queant uel sibilum saltem ipsius sustinere. Quin & si quod ex reliquis animalibus uenenum iaculantibus ad cibum aut potum capiendum properet, & basilisci iuxta locum præsentiam persensit, retro cedit, necessarij etiam ad uitam nutrimenti negligens. Ceterum percussos ab eo totius corporis ardor comitatur, itemq; liuor: defluunt capilli e corpore confestim, & in instanti omnino tempore mors sequitur. Neque uero corpus ipsius mortui ullū aliquod animal carniuorū attingit: si uero fame coactum ipsum contingat, tum & ipsi ilico eodem loci mors instat. Aiunt autem quod conspectus modo, & sibilans auditus, eos qui ipsum audierunt, tollat, si militèrque ab ipso conspectos. Quare uanum & superfluum duximus auxilia contra eum referre.

Nn 2 Dedra

De draconibus.

Cap. xxxiii

Animal quidem hoc uenenum nō iacit, attractione autem & ui sua enecat. Abundant quidem igitur dracones in Aethiopia & Lycia: colore autem differunt: alij enim nigri sunt, alij rufi, alij cinerei coloris: & rursus alij quidem cubitorum v. sunt, alij uero x. sunt & qui ad xxx. cubitos se extendant: quidam etiam maiores narrantur. Squamis autem oblitī sunt per totum corpus asperimis: magnos oculos habent, & supra oculos præminentias quasdam similitudine pellium flexibilium superciliorū. In mento autem ex crescentia quandam habent, quam barbam appellant: maximè hiante sunt oris rictu, lingua exerta, & dentibus magnis similitudine syluestriū suum, cum quibus etiam fracturas & collisiones corporum inferunt. Quare curationes ueluti ad mordentia animalia fiunt, non ut in his quæ uenenum iaciunt.

De chersydra.

Cap. xxxv

Serpens hic chersydri appellationem inde habet, quod in principio quidem in aquosis degit locis, & hydrus appellatur ab ipsis aquis, hoc est, Natix: postea uero siccos incolit locos, & ex compositione locorum, chersydri, id est, natricis terrestris nomen inuenit. In terra itaq; degens, chersydrus appellatur, & tum sanè seipso seuior redditur. Equidem in humectis locis ex humido uictu exsatiatus, non purum uenenum habet: quum uero terrestris fit, maximè parum & nocentius id acquirit. Ceterum similitudine est aspidis terrestris parum, præterquam quod ceruicē non ita latam habet. Hoc enim insigne solum aspidēs præ his habent. Qui igitur ab his morfi sunt eis communiter eadem accedunt quæ in aliorum serpentium morsu: ueluti est tumor, continuus dolor, aspius, liuidus locus & seculentus, uertigo oculorum, exolutio, uomitus biliosi foetidi. Propriè autem motus totius corporis inordinatus, ut & per uentrē quædam inordinatè ferantur. Mors autem intra tres dies. Porro ex cōmunibus remedijs etiam hi opem ferunt, & ex theriacis antidotis. Priuatim uero cupressi pilularum drach. i. & myrti baccarum itidem i. drac. terito, & cum melle rosaceo aut uino mulso in potu exhibeto. Iuxta affectum autem locum calcem uiuam & similia cum oleo imposito.

De rana rubeta.

Cap. xxxvi

Rubeta, ranæ species est, quæ palustris uitæ conditionem in terrestri mutauit, unde & rubeta appellatur: hac autē mutatione, similiter ut chersydrus, ægrè curabilē afflictionē eis qui in eam inciderunt, inducit: est enim animal magnitudine nihilo minus testudine parua: exasperat autem & uibrat terga dum spiritu expletur, atq; ob id ipsum audentius euadit. Ad lædendū itaq; & manifestè insurgit, & saltibus interpositum spatium contrahit: rarò quidē morsum infligens, uerum anhelitum cōsueuit uehementer uirulentū inducere, adeo ut etiā si anhelitu contingat tantū, eos qui propè sunt lædat. Plura autē de hoc animalis te historijs relata relinquimus, his tantum quæ cognitu utiliora iudicauimus, appositis. Cæterū qui ab eis læsi sunt, his omne corpus intumescit, & diffinditur, ac citò omnino pereunt. Porro quæ opem auxiliarem his ferre possunt, ex uniuersalibus & cōmunibus antidotis ac epithematis huc transferantur, itemq; & reliquis quæ ad curationem pertinere uidebuntur.

De turture seu pastinaca marina.

Cap. xxxvii

Qui à marina pastinaca percussi sunt, his uulneris locus manifestè apparet: sequitur autem dolor pertinax, & totius corporis stupor: acutum enim & firmissimum habet aculeum, quo uehementissima ui in altum impulsio nerui sauciatur.

ciantur. Quapropter in aliquibus mors derepente totum cōuellens corpus comitatur. Narrant quidam, si quis caudam pastinacæ quæ ictum intulit, auferat, & in arborem, maxime quercum, suspendat ac figat, ipsam quidem arborem arescere, ægrum autem sanari, atq; id iuxta contrariæ affectionis & remedij rationem contingere. Cæterum auxilium ferunt percussi ab ea, ubi stupor & refrigeratio totius corporis consequatur, ex calidis illitionibus & consimilibus cataplasmatibus. Proprie autem fursures aceto cocti & pro cataplasmate impositi eis auxiliantur, & ipsum adeo acetum affusum pro fotu ualde prodest. Magis autem conueniunt eis attractoria, & quæ tenuium partium sunt, ac calida: quo nimirum per attractoriam facultatem uenenum ex profundo attrahitur, & per calorem frigiditas mitigetur: & quæ tenuium sunt partium in altum prorepent. Ad hanc igitur rem in promptu habebis apta. Sulphur uiuum urinæ ueteri rigatum, marrubium, lauri folia, echium, radicem panacis, saluam & similia. at uero si his careas, fermentum acidum cum liquida pice emollitum imponito: mirabiliter enim auxiliatur. Cum his concordat emplastrum Piscatoris, & ex bryonia pastillus tum impositus, tum ex uino calido diluto potatus, euestigio autem utilitatem suam demonstrat: describetur autem in fine huius sermonis. Dato item & lauri decoctum, aut succum cyrenaicum erui quantitate cum myrrha magnitudine fabæ, ac modico pipere terito, ac dato cum uino: aut silphium, aut laser ex uino: aut succi fici guttas quinque cum tribus serpilli granis bibendas præbe.

De murena.

Cap. xxxviii

Morsis à murena eadem accidunt quæ morsis à uipera: quapropter etiam similia remedia eis adhibenda. Dato autem & fici succum cum serpillio, ut prædictum est.

De dracone marino.

Cap. xxxix

Ad marini draconis plagam, locum percussus cum plumbo fricato, ipsumq; draconem dissectum plagæ imponito. Serpillum item tritum aut lentisculam coctam pro cataplasmate imponito. In potu uero absinthium cum uino diluto præbeto, aut saluam cum passo. Mirè etiam his conducit ex bryonia & eruo pastillus cum uino potatus.

De scorpione marino.

Cap. xli

Scorpii marini plagam sanat nullus dissectus & impositus, sulphur uiuum cum aceto illitum, Lauri baccae tres tritæ in potu acceptæ.

De culicibus.

Cap. xlii

Quandoquidem & hi hominum corpora lædunt, etiam de ipsis pauca dicemus. Culices fugantur cedrinorum lignorum scobe cum atramento sutorio suffito. Idem faciunt cupressi pilulæ, aut coma, aut ramenta: & uini fex sicca, & conyza, & bubulum stercus postquam contraxerit nigrorem. Aut melanthium uel absinthium oleo coctum illine, et culices non appropinquabunt. Aut melanthium cum absinthio, aut cerusam cum atramento sutorio in bubulo stercore suffito.

De muscis.

Cap. xlii

Muscas necat, ueratrum album tritum, lacti, aut aquæ mulsæ inspersum. Aliud. Semen hyoscyami, & ueratrum nigrum, & argenti spuma simul trita, & cum polenta irrigata & subacta, butyroq; aut adipe nidorosa facta, & in massas coacta, & muscis exposita, ipsas occidunt.

Nn 3 Adp

Ad pulices.

Cap. XLII

Pulices necat rhododaphnes, aut cumini decoctum respersum. Idem & aqua marina facit.

Ad cimices.

Cap. XLIII

Vt ne cimices gignantur, chamaeleonis nigri decoctum facit, si ex eo lectus proluatur. Deinde sutorium atramentū cum felle tauri terito, ex eoq; lectum illinito. Aut etiam oleum per se, aut cum atramento sutorio inungito.

De uenenis.

Cap. XLV

Ex animalibus exitiosa & letaliter corruptentia, sunt cantharis, buprestis, salamandra, eruca pinorum, rana rubeta, lepus marinus, rana palustris muta, hīrudines. Ex seminibus autem, hyoscyamum, coriandrum, cicuta, psyllū.

Ex succis, papaueris succus, opocarpasum, succus thapsiae, elaterium, succus mandragorae. Ex radicibus, thapsia, aconitum, ixias, ueratrum nigrum, agaricum, ephemerum. Ex oleribus autem, taxus, solanum furiosum, herba sardonis, papauer cornutum, ruta sylvestris. In his etiam fungorum genera connumerantur. Ex animalibus uero, sanguis tauri, mel, Heraclea Pontica urbe natum, lac coagulatum. Ex metallicis, gypsum, cerusa, calx, auripigmentum, sandaracha, spuma argenti, argentum uiuum. Ex his uero quae nobis familiaria sunt, uinum multum acruatim à balneo potum: similiter & aqua frigida acruatim à balneo aut cursu ingesta.

Methodus praeseruatiua, ne quis à ueneno phar-
maceo

Cap. XLVI

laedatur.

Quod si quis uenenum habeat suspectum praecauere omnino oportet, prima cura ad hoc adhibita, ut corpus ita appareat, quo lesioni ac ueneni impressio ni minimè obnoxium reddatur: quam ad rem bona concoctio uel impressio conducit. Cibi autem ea gratia sumendi sunt boni succi & magis carnosissimi: aduersione habita, ne quod obsonium consuetum non referat colorem, aut odorem, aut gustum, aut qualitatem. multa enim uenena à prouidis & probe considerantibus facile cognoscuntur. Qui igitur in potu aut cibo ueneni suspicatum habet, is signis certis quale sit id deprehendat. Ex odore namq; & amaritudine potus & cibi, opium cognoscatur. Ex colore autem cerusa, gypsum, calx. Ex his uero quae in cibo & potu innatant, lac coagulatum, & recens marini tauri sanguis. Ex foetore autem & qualitate ac odore, rana rubeta, et lepus marinus. Quin & reliqua ex alijs quibusdam signis noscuntur, de quibus sigillatim amplius dicitur. Caterum praeseruatiua sunt, quae si quis ieiunus praesumat, & post sumere uenenum contingat, minimè ab ipso laedatur: suntq; huiusmodi. Calaminthe quotidie accepta ex natura sua omni letali pharmaceo resistit: & si in ueneni suspitione exhibeatur, destruit iam acceptam exitiosam facultatem. Theodorus autem ita inquit: Antidotus quae in corrupta manens omnia uenena uincit, haec est, Nucum iuglandum unc. i. caricarum pinguium sextantem, sesami unc. i. unumquodq; per se tundito, deinde etiam simul pistilato ex oleo optimo madefacto, & pastillos nucis Ponticae magnitudine formato, ex eisq; unum aut tres dato, & non contingeret ipsum in uniuersum ullum aliud quod letale pharmacum. Quidam etiam rutae trientem ammiscent. Strato autem commune est, inquit, hoc praesidium ab omni exitioso pharmaceo praeseruans. Rutae folia xx. nuces iuglandes ii. caricae ii. salis grumum i. Haec ieiuno praesumenda dato, & à nullo letali pharmaceo laedatur. Alia antidotus Asclepiadis, ad exitialia uenena, quae ante data adseruat: si uero ab accepto ueneno de-

tur, ipsum cognobile facit. Baccarū iuniperi dra. ii, terræ lemniae quæ sphragis dicitur drac. ii, contere, & melle aut oleo excipe. Vñ uero expetente ad nuncis ponticæ magnitudinē ex aquæ mullæ cyathis ii. à balneo bibendum præbe. Hoc quidem igitur pharmacū si nulla letalis adsit uis sumptum manet, neq; per uomitum rejicitur. Si uero quippiam letale haustum sit, nauseam mouet, et uomere cogit, ut acceptum uenenum unā cum antidoto excernatur. Quidam dimidiam tantum partem lemniae terræ, ex iuniperi baccis coniungunt, & cum oleo omphacino subactis, similiter utuntur.

Quomodo cognoscantur qui uenenum sumpserunt.

Cap. XLVII

Cognoscere autem & discernere oportet eos qui tale quippiam sumpserunt ex signis quæ coincidunt & consequuntur. Vbi enim in aliquem placida & bene composita prius mentis, & bonæ itidem habitudinis, accedente etiam iusta ciborum cōcoctione, statim & derepente uariæ accessiones irruant, præsertim ab accepto statim cibo aut potu, ueluti si accedat tussis, aut foetida sanguinis per os reiectio, aut molesta & agra lotij excretio, aut dolor in alto natus, aut ardor iuuenilis & uehemens, aut sensus erosionis, aut stuporis perculsio, punctura item, tremor, singultus, contractio, eruptio bullarum, liuor, tumor, coarctatio, quarundam partium putrefactio, uomitus foetidus & plenus, manifesta alicuius uenenosæ qualitatē apparitio & demonstratio. Ex his omnibus si quid repente ab accepto cibo sano homini acciderit, ueneno infectum esse hunc ipsum existimandum est.

Communia remedia & cura omnis ueneni.

Cap. XLVIII

In his igitur qui ignari uenenum sumpserunt, aut quibus circumtectū exhibitum est, cōmunibus remedijs est utendum. Itaq; ubi adhuc datum uenenum in uentre est, & ob id morsum & nausæa infert, aut etiā alias accessiones, euestigio ad uomitum infectus cogendus est, aut mox inde à ueneno uidelicet accepto, sua sponte, aut aqua & oleo tepidis in potu datis, aut butyro, si oleum non adsit, cum aqua calida dato. Licebit & maluæ decoctū exhibere cum oleo, aut foeni græci, aut seminis lini, aut fursurum, aut ptisanæ succum, aut seminis urticae decoctū: unumquodq; ex his oleo ammixto. A uomitu autē raphanos multos edendos dato, aut cū aqua tepida tritos absorbendos: aut si hæc non adsint, nitrum cum aqua præbeto, rursumq; uomere iubeto. Post sufficientē uero uomitum communia remedia paulò mox dicenda in potu exhibeto. Dato etiam id quod ex iuniperi baccis & terra lemnia est præscriptum. Quod si uenenum antea ad intestina descenderit: & tormina circa umbilicum induxerit, clysteri efficacissimo aluum euacuare oportet, ex maluæ uidelicet, althææ, foeni græci, fursurum, centaureæ, aristolochiæ, & similitum decocto, melleq; & nitro largo, itemq; oleo ammixto. In cibo uero exhibeatur raphanus, & salsamentū, alliaq; & cepæ. At in potu, uinum recens mari mixtum. Si uero in uesicā imperum fecerit uenenum, in aquam & oleum utere defessu, ita ut in aqua ipsa foenū græcum, ac lini semen, malua syluestris & fatiua, ammiq; semen sint decocta. In potu etiā idem ammi semen præbendū, aut apium, aut foeniculum, aut spicam nardī, & similia odorata & simpliciora urinam cientia. Si uero uesicā ropasso diluto præbeto. Similiter autem & si uentrem uehementer exurat, idem semen dato, ab omni calidiorum rerum adhibitione abstinendo: & his quæ ad cantharidem & buprestim referentur utendo. Caterum ad cutem iam delato

Nu 4 ueneno,

ueneno, irrigationem adhibeto, & illitionem ex oleo modico calido, in oleum item aut aquam & oleum in folio defessum. Cibos autem facile digestibiles & sorbitiones cum melle exhibeto: piscibus item recentibus teneris, & uolucibus facile concoctilibus utitor. In potu deinde uinum album & rufum, uetus & quam odoratissimum præbeto. Quod si ad caput decurrat uenenum, ut grauitas & sopor consequatur, primum quidem aluus per infusum ex fœni græci, seminis lini, altheæ & cucumeris syluestris maxime radice decocto subducatur. Deinde sternutatorium ex struthio & pipere adhibeatur, & cyclamini succus, aut elaterij naribus infundatur; odora menta item admoveantur castorium, & similia cum aceto diluta. Preterea & præseruantibus præsidij uendum est, eo quod ex nucibus & caricis constat, & quod ex iuniperi baccis ac lemnia sphragide apparatur, & theriaca Andromachi ex uiperis, & Mithridatis antidoto, & consimilibus. At uero si composita non adsint, parabilibus utaris, & communiter ad omnia ferme uenena destinatis. Communiter autem ad omnia letalia uenena facit irionis semen cum uino & oleo. Lemnia sphragis cum uino: egregie enim & quam celerrime uomitum procurat. Aut nuces iuglandis cum caricis et ruta edat, aut hæc ipsa decoquito, & decocto accepto uomat, aut seminis lini, aut maluæ, aut fœni græci decoctum cum oleo sumat. Porro ad accensiones quæ cum frigore incidunt, abrotonum in aceto mulso cum sale dato: item irionis semen, eryngij radicem, spicæ celticæ radicem, serpillum, bryoniae radicem, castorium, porri succum, laser, sagapenum, opopanax, succum cyrenaicum, rutæ syluestris semen. Polij etiam ac scordij & betonicae, cuiusque drachmam unam cum uino aut aceto mulso.

Ad eos qui cantharidas hauserunt.

Cap. XLIX

Qui cantharidas acceperunt in corpus, his statim uirus eorum in nares distribuitur odore picis. Picis item aut cedriæ qualitas linguae inferri uidetur. Sequitur autem & stomachi morsus, uentrisque ac renum, & maxime uesicæ. Quandoque & sanguinis excretio per urinam & aluum fortes morsus comitatur. Unde sanè locus circa os uentris uehementer dolet, adeo ut ipsum pectoris os, quod chondrium xiphoidea à capitis gladii figura Græci appellant, dolore affici putetur. Inflammatur autem & dextrum ilium: deinde urine eijciende difficultas, inordinatio & suppressio consequitur. Amplius autem & uis uisua oculorum consumitur, delirantque, & à loco in locum factantur. Caterum auxilium sentiunt, si quam celerrime uinum dulce eis præbeatur, nucleis pineis recentibus aqua calida præmaceratis ac probe tritis ei ammixtis, aut cucumeris semine decorticato similiter ammixto. Lac etiam assidue cum melle modico primum exhibendum, postea & per se recens mulctum. Aliquando & adipem anserinum aut gallinaceum liquefactum potui adfundito, aut terræ samiacæ drachm. i. aut rosmarini drachm. i. ex aqua mulsa dato. Danda etiam iura pinguium porcina, aut ouilla aut anserina: carnes etiam agninae, gallinarum, porcellorum recens natorum pingues ac probe coctæ, & cerebella porcina. amplius autem de iure absorbendum præbeatur, donec affectus ad uomitum concitetur. Bibat insuper uinum dulce tepidum plurimum dilutum, ubi biberit autem unumquodque uomitu reijciat, rursumque bibens uomat, idemque saepe repetitis uicibus faciat. Post uomitum uero lac recens mulctum, aut ptisanæ succus, uel halicæ, aut oryzae, aut maluæ, aut seminis lini succus cum adipe anserino uel gallinaceo per clysterem infundatur. Quod si exolutiones & morsus oboriantur, lac bubulum recens mulctum cum assidue bibendum & cito reuomendum exhibeto. Aut uitis germina cotusa cum passo

passo diluto dato. At uero contrariæ affectionis ratione quantum nihil aliud his auxiliatur cantharidū alæ & pedes cum passo potata, & scorpij radix trita ex passo potata, quæ itidem optinē ad buprestim facit. Dandum & ex uisperum theriaca parum quid, aut ex Mithridatis antidoto. Porro ubi accessiones fuerint sedatæ, farina hordeacea cum aqua mulsa ilio imponatur, & uniuerso corpore ex oleo gleucino aut cyprino illito, æger in balneum deducatur, & in solio diutius moretur. Cibis autem facili concocilibus, & acrimoniam lenientibus multo tempore utatur. Vinis item dulcibus & lactis potu.

De bupresti.

Cap. L

Buprestis species quidem est cantharidis, uerum uirosi tum gustus, tum odoris. Ab eius autem haustu uehemens stomachi & alui dolor consequitur. Intumescit item os uentris, uenterq; ipse ac totum corpus attollitur, quemadmodum in hydropicis fieri consuevit, & lotium cohibetur. Cæterum eadem remedia quæ ad cantharidas dicta sunt, etiā ad buprestis sumptionē exhibentur. Propriè aut post uomitum à iusculis pinguibus & passo concitatur, & post euacuationes per clysterē, ficus aridæ pingues in cibo cōueniunt, & decoctū ipsarum in potu cum uino. Cōmodissimum autē tum his, tum qui cantharidas acceperunt, est muliebris lac ex ipsis mamillis assidue exuctum.

De eruca pini.

Cap. LI

Eruca pinus potata, statim dolor circa os & palatum oboritur, & linguæ inflammatio fortis, & stomachi aluiq; ac intestinorū adstrictio uehementis, cum pruriginoso circa interna sensu. Ardor item per totū corpus, & stomachi fastidiū. Cæterū eadem his auxiliatur quæ ad cantharidas sunt relata. Propriè autem oleum melinum pro simplici oleo exhibitum, & uomitu reiectum.

De salamandra.

Cap. LII

Salamandra animal simile est stellioni, asperius & scabrum magis quam lacerta uenenata. Penetrat autem hoc animal per ignem ardentem, nihil quæ læditur dissecta & discedente ab ipso flamma. Si uero per tempus aliquod in igne immoretur, consumpto frigido in eo humore, exurit. Comitatur autem salamandræ acceptionem, inflammatio linguæ: mens impedita & turbata: tremor quæ cum stupore quodam & exolutione. Quædam etiam corporis partes per ambitum liuescunt, adeo ut etiam decidant sæpius putrefactæ: primum equidem maculæ albæ per corpus apparent, deinde rubræ, postea nigræ cum putrefactione & defluuio capillorum. Danda uero & his quæ in cantharide sunt relata, ut inde uomant. Propriè autem resinam pinus cum melle tritam delingendam præbe: aut etiam galbanum cum melle, aut nucis pineas tritas cum chamæpityos decocto: aut urticæ folia lilij incocta cum oleo. Præter opinionem autem eis auxiliatur ranarum iusculum, si eryngij radices in eo coquantur.

De lepore marino.

Cap. LIII

Lepus marinus reperitur ferme in totum inter loligines, animal paruum. utrosque odorem habens. Concomitatur autem eos qui eum in corpus ingesserunt, sapor in ore similis piscibus uirosus: paulo uero post aluum dolitant, & color corporis ad arquati similitudinem permutatur, deinde plumbeus redditur, cum faciei tumore. Incenduntur autem pedis plantæ, & pudendum tumescit lotium emingunt, quandoq; etiam sanguinolentum. Deinde nauseabundifacit biliosa uomunt sanguine permixta, & piscium loturam olentia. E

dant item graueolentia, & omne piscis genus auersantur ac odio habet præter cancrum. His igitur lac asininum recens multum cum passo assidue præbeatur, aut si hoc non adsit, bubulum, aut maluæ decoctum. Indeque confectum uomant, deinde radices cyclamini tritæ drac. iiii. cum uino diluto dentur. Aut ueratri nigri drachmam uniam, aut scammonia scrupuli duo cum bubulo lacte aut aqua mulsa. Aut mali punici acini, uel cedrides, hoc est, cedri fructus triti ex uino. Aut picem liquidam, aut cedriam modicam cum passo delingendam dato. Anseris item sanguinem adhuc calentem cum passo bibendum præbet. Edat & cancos assidue: piscem enim nullum admittit. Signum porro salutis iudicabis, si piscem edere possit.

De rana rubeta.

Cap. LIII

Ranæ rubetæ duæ sunt species: Altera quidem surda est: altera uero non. Surda autem exitiosa censetur. Pascitur autem in arundinibus roris lectu uiuens, ex ea sanè uenenum apparatur. Quod qui acceperint febris comitatur, extremæ partes incenduntur, frequentique anhelatione ac difficili spiratione anguntur. Tumor autem sequitur corporis cum pallore buxo intenso, fœtorque oris & singultus. Quandoque etiam seminis inuoluntarium profluium contingit. Cæterum facile opem reperiunt, si post aquæ & olei uomitum, uinum meracum multum sumant, aut picem cum uino. Radicem etiam harundinum in quibus ranæ rubetæ pascuntur contusam ex uino bibendam dato, aut cyperum ibidem enatam pondere drachmarum duarum ex uino. Aut marinæ testudinis sanguinem cum leporis coagulo & cumino ex uino præbet. Porro dolium insuper aut furnum igne seruefacito, igneque extracto laterem imposito, & agrum immitti, multumque ac diu exudare iubeto. Cogatur autem et ad continentem inambulationem, cursumque ac exercitationem, propter contentum in ipsis stuporem. Vehementer enim efficax exercitatio in ipsis existit. Quotidie etiam lauetur.

De rana palustri.

Cap. LV

Qui ranam palustrem acceperunt appetitione priuantur, sequiturque oris humectatio, nausea, uomitus, & oris stomachi leuior morsus. Curantur autem uel multi potu cum omnibus quæ calfactoria uim habent: uelut est cyrenaicus succus, laser, sulphur, cuminum, piper & similia.

De hîrudinibus.

Cap. LVI

Hîrudines cum aqua deuorata faucibus adhærent, aut iuxta quempiam stomachi locum, aut ipsi ori uentris, & primum quidem sensim exugunt sanguinem, expletæ autem his quæ deglutimus uiam obstruunt. Superexpletæ uero etiam sanguinem quem exuxerunt foras profundunt, ut imaginationem inducant tanquam sanguis ex internis locis reieceretur. Ceterum qui affectis contingit exuctionis sensus, is signum sit tibi hîrudinem deglutitam esse. Excudit autem ipsas muria continuè & paulatim absorpta, atque id eo magis si acida muria sit, & laser ei ammisceatur. Idem facit & nix aceto dissoluta & assidue absorpta. Gargarisset insuper nitrum cum aqua, aut aquam marinam, aut atramentum sutorium cum aceto, aut sinapi, aut hyssopum, aut origanum. Si uero inferne circa os uentris hîrudo adhæreat, prædicta itidem omnia bibenda dato, præter sutorium atramentum, utendum etiam his quæ aluum soluere possunt. Nos autem medicamento purgatiuo. Cum excrementis enim exire consueuerunt. Quæ temper alij multi esum has efficiunt, nullo ex prædictis opus habemus. Quæ postremum gutturi affixæ sunt hoc modo excutere oportet. Aegrum in solium calida

calida expletum usque ad collum immittito, & frigidissimam aquam ore tenendam exhibeto, eamque frequenter permutato. Egredietur enim inde hirudo frigida appetentia prolecta.

De ephemero.

Cap. LVII

Qui ephemerum quod aliqui colchicum aut bulbum sylvestrem adpellant; in corpus adsumpserunt, hos pruritus totius corporis concomitatur, non dissimilis ei qui urticae aut scillae irritamentis lacessitus excitatur. Circa stomachum insuper acrimoniam sentiunt & uruntur cum multa gravitate. Inualecente autem malo, per aluum cruentum quiddam ramentosi admixtionem habens effertur. His veluti Salamandra accepta auxiliari oportet, per uomitus videlicet assiduos & infusorum immisionem. Ceterum antequam inualescat venenum, querci foliorum, aut glandium, aut malicorij decoctum cum uino prebeto, aut origanum cum lixiuio, aut uuas passas pingues tritas cum lacte exhibeto. Mirabiliter autem auxiliatur lac bubulum recens multum assidue potatum, & in ore detentum, ut alio auxilio non sit opus.

De dorycnio aut solano furioso.

Cap. LVIII

Dorycnio siue solano, ut alij appellauerunt, furioso potato, in gustu ueluti lactis quaedam qualitas sentitur, singultus adest continuus, humectatio linguae, & sanguis acruatim reijcitur, atque per aluum ramentosa quaedam feruntur, quemadmodum in dysentericis fieri consuevit. Ante quam uero quid tale consequatur, post uomitum & clysterem, aqua mulsa, aut lac asininum recens multum assidue potatum auxiliatur, passum item tepidum cum aniso potatum & amygdalis amaris tribus: pectuscula etiam gallinarum probe cocta, & omne conchyliorum genus trudum & assatum in cibo acceptum, & locustae & gamari, & iusculum ipsorum in potu.

De aconito.

Cap. LIX

Aconitum uero quod quidam itim sylvestrem adpellant, statim dum potatur linguam edulcorat cum quadam adstrictione, deinde paulo post in lingua amarescit, & constrictio mandibularum concomitatur, & oris stomachi morfus, et laterum dolor, pectorisque grauitas ac precordiorum: materia enim quam circa umbilicum innititur, & cum multis flatibus consequentibus corruptione contingit, grauatur item caput & tempora contremiscunt, oculi uero turbiores fiunt & subruenti ac lachrymas profundunt. Quod si diutius perseveret malum, etiam tremor ac concussio ac tumor totius corporis sequitur. Ceterum his post uomitus & infusa, origani potu succurrendum est, & ruta, marrubij, absinthij, erucæ, abrotoni, chamelææ ac trixaginis cum uino. Aut coaguli ceruini, aut hoedi, aut leporis potu ex aceto. Aut ferri crementum, aut ipsum ferrum, aut aurum siue argentum, aut lapidem molaræ omnia igne candefacta in uino extinguito, ipsumque uinum calidum bibendum prebeto; aut lixiuuium cum uino dato. Aut pullum gallinaceum tenerum & pinguiissimum coquito & decoquendo eliquato, donec ossa sola relinquantur, et iusculum per se uel cum uino bibendum exhibeto. facit & uitulinum pingue ius potatum & uomitu reiectum. Maxime uero proprie facit trixago potata & castorium, & iris ac ruta. Quanquam aliqui à nullo horum se auxilium sensisse asserant.

De melle quod in Heraclea ponti nascitur.

Cap. LX

Hoc mel siue in potu siue in cibo acceptum easdem adstrictiones infert quas aconitum; in Heraclea enim ponti urbe aconitum gignitur, ex quo colligitur ibidem.

dem istud mellis genus. Conueniunt igitur eadem auxilia in aconito iam relata, & magis utiq; ruta folia ex uino mulso potata.

De coriandro.

Cap. LXI

Coriandrum potum ualidam & asperam uocem facit, & delirium furiosum, non dissimile illi quod ab ebrietate proficiscitur inducit, hoc accedente etiam quod turpia dictu infecti loquantur, & per omne corpus odor coriandri transpiret. Auxiliatur autem eis uomitus ex oleo irino, & uinum meracum cum per se, tum cum absinthio potatum. Oua item in unū uasculum euacuata conuassata & tepesacta ex muriaq; absorpta, ius itidem pingue salsum tum anserinum, tum gallinaceum, passum etiam, & anisum in uino acido siue uappa sumptum.

De psyllio.

Cap. LXII

Psyllion potatum totius corporis frigiditatē inducit, & stuporē cum exolutione & mœrore. Auxiliantur autem his eadem quæ coriandro hausto.

De cicuta.

Cap. LXIII

Cicuta potata uertiginem & caliginem oculorum inducit, adeo ut neq; minimum cernere possint, singultum insuper ac mentis percussione & frigiditatem; sequitur deinde suffocatio, & segnicies ac liuor, postremum conuulsio spiritus in respiratione suppressio strangulantur. In principio igitur per uomitum ex aqua & oleo cicutam excutere oportet, quod uero ad intestinum delapsum est, per euacuationem expurgetur. Deinde tanquam ad maximum remedium ad passi meraci potum perueniendum, ita ut in interuallis meraci potus bubulum lac aut asininum recens mulctum, aut absinthium cum pipere in potu exhibeamus. Rutam item & castoreū ac mentam cum uino. Aut amomi drachm. i. aut styracis drachm. i. cum semine urticae ex uino. Aut lauri folia, aut silphii, aut laser, aut succum cyrenaicum, aut apij semen, aut iridis radicem, aut sceli malisiliense, omnia ex uino dulci, aut nitrum cum aqua larga. Totum præterea corpus calefacere conducit & præsertim præcordia. Ad uehementiorem item motum, ac cursum æger cogatur.

De similace seu taxo.

Cap. LXIII

Smilax quæ & Thymion, atq; apud Rhomanos taxus appellatur, potata frigus totius corporis & suffocationē inducit, & celerem omnino mortem. Ceterum remedia eadem quæ ad cicuta haustum relata sunt, eis auxiliantur.

De succo carpasi.

Cap. LXV

Carpasi succus potatus soporē grauiorem inducit & sensus hebetat absq; dolore, exudationem etiam facit & repentinam suffocationem cum exitiosa faciei reiectione. Opem uero sentiunt ex his quibus curantur qui cicuta hauserunt, & toxicum, atq; item ephemerum.

De herba Sardonis.

Cap. LXVI

Herba quæ Sardonis appellatur, & ranunculi species est, potata furorem & conuulsiones inducit, malasq; contrahit, ut risus imaginem de se præbeat qui eam hausit, à qua dispositione etiam sardonius risus non admodum boni nominis adagio uulgò circumfertur. Est enim accessio grauis omnino quæ falsi risus prætextu præsentem & insperatam mortem inducit. Ceterum qui eam hauserunt, post uomitum, aquæ mulsæ ac lactis potu iuuantur, fortiq; ac irrigatione & pinguefactione totius corporis, per calefactoria unguenta. Immitendi etiam sunt in aqua & oleum calidum inungendiq; ac fricandi plurima post egressum ex folio perfricatione, in uniuersum enim uelut ad conuulsionem curam

ram moliri oportet: castorio item cum passo & per se in potu dato, & si qua ei consimilia existunt.

De Hyoscyamō.

Cap. LXVII

Hyoscyamus acceptus delirium quali ebrii obnoxij fiunt, inducit, & iactationem corporis cum distortionem, his succedit exolutio animi deliquio similis, & oculorum rubor, pruritus, deinde tremor, suntq; omnino deliri & putant se flagris corpore cædi. Cæterum facile curantur aquæ mulsæ largo & lactis potu si haberi possit, asinini. Id uero si non adsit caprinum aut bubulum exhibendū. Facit autem & ad eos uinum salsum, & urticæ semen, similiter & folia cocta ex uino salso. Sinapi præterea, & raphanus, nasturtium, cepe, & allia eis conueniunt unumquodq; ex uino salso. At uero quiescere eos cōuenit ut uinum eo melius concoquatur. Auxiliatur etiam eis muliebris lactis exuctio.

De Mandragora.

Cap. LXVIII

Mandragoræ radicem nemo latenter exhibere potest, etenim trita quidē liquida grauem quendam & nauseabundum odorem exhibet, & gustui etiam amarulenta est & iniucunda. Certa itidem copia & mensura ad lædendum exhibetur: de cætero uero molestias quidem facit, interitum autem serius inducit. Cæterum ex his qui radicem hanc hauserunt: alij quidem sēgnes et languidi tristesq; ac exoluti fiunt, & refrigerati in grauem ueternosum soporem delabuntur, & si quis eos excitei uix audiunt, & excitati cito rursus recidunt. Alij uero calidi quidē minime fiunt, uerum mente perturbati tarde in obliuiosum soporem incidunt. Cura itaq; adhuc perturbatis adhibenda est post uomitum, cocti semine aut pulgēio tenuissime trito in potu cum aqua calida dato, aut his quæ uentrem inferne exoluere possunt. Eis uero qui graui sopore pressi sunt, post uomitum, origanum ex aqua frigida exhibendum est: ualde enim inde iuuantur. Dandum etiam ablinthium in passo diluto. Caput uero ex aceto rosaceo irrigandum est agrō assidue excitato. Odoramenta etiam naribus admodum, castorium, ruta, pulegium cum aceto. Porro mandragoræ mala perfectē matura a quibusdam comeduntur citra noxam, semine tamen reiecto: & si plura quam oporteat edantur, plus somni quam iuxta naturā conuenit inducunt. Imatura uero & crudiora & præsertim cum semine comesta, maximum periculum inferunt. Sequitur ab eorum acceptione ardor circa superficiem corporis. Lingua uero & os exsiccantur usq; eo, ut neq; salua hæ partes humectentur. Hiant semper, ore citra intermissionem aërem attrahentes. Et si non statim auxilium feratur, conuulsi pereunt. At uero si remedia afferantur, facile curabiles existunt. aquam namque cum theriaca ex uiperis Andromachi potantes ab omnibus molestijs liberantur. Vehementer autem iuuantur in aqua frigida natatione, maxime si aliquandiu in ipsa immorentur.

De succo papaueris.

Cap. LXIX

Quemadmodum de mandragoræ radice prædictum est, ita neq; papaueris succum quispiam latenter sano homini exhibere possit, propter saporis proprietatem & amaritudinem ac graueolentiam odoris, & quod certa copia ad interitum inferendum exhibeatur. Quando igitur aliqui uoluntarie hoc pharmacum biberint, siue id manifestare noluerint, siue uolentes dicere non possint, per huiusmodi accessiones cognoscuntur. Sequitur enim eos qui eum acciperunt in somnum grauem collapsio, cum frigidityte & pruritu intenso, ut aliquando ob ipsum excitentur, odorq; opij per totum corpus effertur & exhalat. Inferior maxilla laxatur, tumescunt labra, irruit singultus, distortetur nasus,

o o adest

adest pallor, liuor unguium, præcordiorū diuulsio, respiratio parua & frigida, & per interualla fissuræ ad finem etiam conuulsio. Auxiliatur autem his post uomitionem ex oleo, & acrioris clysteris infusionem, acetum mulsum potum, & acetum calidum per se, & uinum uetus, rufum, meracum, largum cum absinthio & casia, & nitrum cum aqua. Et origanus cum lixiuio, rutæ syluestris semen, piper & castorium ex aceto mulso, saturciæ & origani decoctum cum uino. Oportet autem & hos odorem excicare, & in calidum solium immittere et fouere ob pruritum. post balneum autem pinguius iuscula, et medulla ceruina exhibenda. Manifestum autem quod & his & omnibus qui etiam aliud uenenum sumpserunt dari debeat theriace tum ante tum post uomitum.

De toxico.

Cap. LXX

Toxicum inde appellatum uidetur, quod Barbari sagittas, quas tox cumata græci uocant, ex eo illinirent. Concomitur autem eos qui toxicum biberunt labiorum & linguæ inflammatio, furor adeo uehemens ut ægri uarijs imaginationibus obuersantibus coerceri non possint, atque ob id adeo etiam ægre curentur, & raro aliquem seruari contingat. Vinculis igitur eos constringere oportet, & cogere ad passi cum rosaceo potum, & uomitum per immisionem pingularum. Deinde iusculum pulli gallinacei pinguis absorbendum dato. Auxiliatur autem eis rapî semine potatum, magis proprie autem quinquæfolij radix, et sanguis hirci uel capræ, & cortex quercinus cum lacte tritus, & mala coronea comesta, aut decoctum ipsorum potatum, & pulegium potatum, amomumque et carpobalsamum ex uino. Quod si quis periculum effugiat, multo tamen tempore in lecto decumbet: Stupidus autem & dubiæ ac uacillantis rationis per reliquum uitæ tempus manebit.

De his qui ixiā hauserunt.

Cap. LXXI

Ixiā quæ & ulophonon appellatur potata saporem & odorem ocymo similem habet, linguæ autem inflammationem fortem infert & furorem: recrementorum uias omnes obstruit, murmuratque ac rugitus intestinorum cum animi deliquio inducit, quum tamē interim nihil excernatur. Auxiliatur autem eis post largam uomitionem & uentris per clysterem subductionem, absinthij cremor cum uino multo aut aceto, aut aceto mulso potatus, aut syluestris rutæ semine, aut silphij radix, aut tragorigani decoctum cum aliquo ex prædictis, uel cum lacte. Aut resinæ terebinthinæ & nardi & silphij cuiusque obolus, ex uino. Aut castorij & rutæ & terebinthinæ singulorum drachma.

De Chamæleone.

Cap. LXXII

A chamæleonis potu, morsus uentris & linguæ tumor cum rugitibus intestinorum sequitur, facies distorquetur, & uomitus spumofus, & tremores, & conuulsiones, & totius corporis conuulsiones, ac uocis interceptio concomitantur, qui uero album chamæleonem hauserunt etiam strangulantur. Cæterum curantur ex his quæ ad fungos sunt relata. Datur eis & thlaspius & betæ succus, et triticeæ ptisanæ succus ex passio, absinthij cremor, & nitrum cum aceto mulso, ubi uero uomuerint, lac recens multum sepe exhibeto, & aluum cum lubricis infusis eluito, uelut est foeni græci & altheæ decoctum. Præcordijs etiam fomenta ac calfactoria adhibeto.

De fungis.

Cap. LXXIII

Fungorum aliqui genere, aliqui copia noxi sunt. inferunt autem suffocationes strangulationibus non absimiles, quibus confestim prius quam penitus uiuantur auxiliari oportet, per raphani aut rutæ foliorum largam comestione

nem, Dandum & nîtrum bibendum ex posca tepida aut aceto mulso, ita ut his liquoribus hyssopum, origanum, thymumq; sint incocta, atq; inde ad uomitû cogantur. mirabiliter autem iuuantur lixiuîj ex sarmentorum cinere excolati potu, atq; eo amplius si ex pirastri ligno lixiuium sit factum, aceto ac nîtro ad cinerem eius adiecto. syluestria uero pira, aut arboris ipsorum pirastri uidelicet, folia cum fungis cocta strangulandi uim ex eis tollunt, insuperq; ab eorum acceptione, comesta, auxiliantur. Bibitur & commodè aristolochiæ drach. i. aut absinthij ex uîno, melissophilon cum nîtro, radix panacis cum uîno. Nasturtium item uiride edat aut semen bibat. Cæterum Philagrius gallinaceum ster- cus album inquit, tritum exhibemus ex posca aut aceto mulso, huius enim manifestum habemus experimentum quod ad fungorum strangulationes auxilietur. Oportet autem & acri infuso aluum euacuare. Quando uero quidam fungi à feris uenenum iaculantibus arrosi aut infecti, aut etiam in locis ubi eiusmodi bestiae latibula sua habent, enati, non modo suffocationem inducunt, sed & intestina exulcerant, absinthij & ficuum decoctum large in potu exhibendum est, & origanum cum melle, indeq; uomendum, deinde uero theriacen bibat, & in calidam aquam demittatur.

De sanguine tauri.

Cap. LXXIII

Sanguis tauri recens mactati potatus in aluo in grumos cogitur, agram que spirationem inducit ac suffocationem: comprimit etiam os uentris & cõtinuas conuulsiones infert. Inuenitur autem horum lingua rubra & gingiuarum corrosæ, & sanguinis grumi inter dentes, in his itaq; uomitum uitamus, etenim grumi in ore uentris coadunati uomitum impediunt. Damus autem eis quæcunq; grumos dissoluere possunt. grossos igitur ex fico maxime syluestri succi plenos cû posca & nîtro dato, aut fici succum eodem modo, aut lixiuium ex cinere ligno rum fici, aut ramulos fici tritos cum nîtro & posca præbeto, at uero syluestris fici fructus etiam siccus comestus euestigio grumos dissoluit. Datur & silphij radix utiliter ex aceto, & amarantum, & brassicæ semen, & conyzæ folia cum pipere & lixiuio. Aluus autem pinguius & lubricis infusis eluatur.

De lacte in grumos coacto.

Cap. LXXV

Lac coagulatum aut multum & acruatim haustum, suffocationem aliquando infert in grumos coactum. Auxiliatur autem his coagulum omne, maxime uero leporinû ex aceto potatum. Etenim coagulû recenti lacti iniectum ipsum cogit & inspissat, id uero quod iam coactum est, ex natura sua dissoluit. Datur eis & calaminthæ uiridis succus, aut folia arida trita, & iuniperi bacca, item ea quæ ad sanguinem in grumos densatum sunt prædicta. Vomitus uero etiam in his recusamus, neq; quicquam omnino falsum exhibemus.

De Gypso.

Cap. LXXVI

Gypsum potatum in lapidem induratur ac strangulationem inducit: quapropter eadem auxilia quæ ad fungos relata sunt huc transferre oportet, ita tamen ut in his pro oleo, maluæ, aut sceni graci, aut ficuû decoctum exhibeamus, aut oleum cum aqua mulsa. His item eadem decocta per clysteres infundenda.

De Cerusa.

Cap. LXXVII

Cerusa ob colorem suum latere nō potest, accepta enim palatum in albat, linguamq; ac gingiuas, in quibus etiam pars aliqua cerusæ reperietur. Infert autē singultus & tussis, linguæq; ac faucium ariditatem: frigescunt corporis extrema cum delirio & mentis percussione, & difficili motu siue torpore. His porrò aqua mulsa exhibenda est, aut ficuum & maluæ decoctum, aut lac calidum, aut

Oo 2 selamum

seſamum tritum ex paſſo, aut lixiuſum ex cinere ſarmentitio, aut oleum irini. Omnibus enim oleum large ammiſcere oportet, ab uno quoque uero uomant. ſcit & ſcammonia cum aqua mulſa potata.

De argenti ſpuma.

Cap. LXXVIII

Argenti ſpuma potata grauitatem ſtomachi inducit, aluique ac inteſtinorum, cum torminibus uoluuloſis intenſis, quæ citra umbilicum maxime innituntur. Lotium ſupprimitur, corpus intumelſcit, liueſcit ac plumbi colorem induit, & articulari incenduntur, ac ardent. Ad ſinem uero et ſuffocatio ſequitur. Conſertigitur poſt uomitum à decoctionibus lubricis factum, hormini ſemen, & myrrha oboli tres ex uino, aut abſinthium, aut apij ſemē, aut hyſſopum, aut piper. Et columbinum ſtercus cum uino & oleo, aut cum uino mulſo & oleo. Si ueronimium proſua ſit alius, lauacra calida, & carnes ſuillæ pingues aſſatæ conueniunt, & aquæ potus, & oleum ſimiliter in potu.

De Argento uiuo.

Cap. LXXIX

Argentum uiuū hydrargyros græcis appellatum potatum eadem inferitque argenti ſpuma. Conſimilem etiam curam expoſtulat: Auxiliatur autem impietis lac alinum recens mulſum potatum ac uomitu reiectum.

De calce, ſandaracha & auripigmento.

Cap. LXXX

Calx, ſandaracha & auripigmentum potata dolore uentris & inteſtinorum cum uehementi morſu inducunt. luuantur autem ſucci malæ potu, aut ſeminis lini, aut oryza, aut halicæ pinguibus iuſculis potatis, aquaque mulſa, & lacte calido, ſi ea aſſiduo uomitu reieſcent.

De thapſia, ueratro, elaterio & agarico.

Cap. LXXXI

Ex his quæ homini ob commoditatem in uſum ueniunt, aliquando uero pericula inducunt, eſt thapſia, ueratrum album & nigrum, elaterium, agaricum. Quandoque enim hæc ſuffocationem inferunt & purgationem ultra quam oportet: Agaricum uero in quibuſdam per aluum non ſubductum, tremorem & reſolutionem produxit. Suffocationibus igitur, ueluti in ſungis dictum eſt, nos opponemus, aut uelut de albo ueratro relatum eſt in tertio Sermone. Purgationes autem ultra modum factas per ea quæ cohibere poſſunt ſedabimus, & per ea itidem quæ firmitatem corpori addunt, de quibus ſimiliter in tertio Sermone eſt prædictum.

De rutæ ſylueſtris & melanthij nocuentis.

Cap. LXXXII

Lubricorum & acrimoniam hebetantium decoctorum potu cum largo oleo opus habent, qui ea hauſerunt.

De acruato frigida aquæ potu.

Cap. LXXXIII

Frigida aqua acruatim pota, aut etiam uinum meracum, aut paſſum, à balneo maxime, aut curſu, aut concitatoribus exercitamentis morſus & dolores inducunt. Verum in his ſtatim uenâ ſecare oportet, & per clyſterem euacuar.

De Strangulatis.

Cap. LXXXIII

Strangulatis, adhuc tamen inſpirantibus & aërem attrahentibus ſternutatorium naribus admotum auxiliatur, & uenæ in cubito ſectio. Piper autem ex aceto ſiue poſca bibendum dato, & ad uomitum cogito. coartatis deinde colli locis, quam & oleum calidum adhibeto, aut anethinum calidum, aut adipem anſerinum, lanis inſuper molliſus collum amplectendum eſt ac fouendum.

De his qui ex alto ceciderunt.

Cap. LXXXIV

Ex alto præcipitatis eueltigio auxiliantur uitis ſarmenta aquæ in coctæ, ſi aqua in potu ſumatur. Quod ſi æger potam aquam nō ferat ſed uomitu reſiciat, morietur.

morietur. Si uero is qui cecidit, sanguinem exspuit, & uenarum ruptura sit inspecta, sarmenta ipsa urito & aqua restinguito, ipsamque aquam percolatam bibenda dato, quo inde sanguinis grumi dissoluantur, at uero sarmentis non praesentibus cinerem quemcumque pelluito, & lixiuio inde utitor.

De praeseruantibus & praesagis animalibus.

Cap. LXXXVI

Quando uero & praeseruatua quaedam ac praesaga animalia descripta sunt ueteribus, quae iuxta contrariae affectionis rationem uenena produnt, ex his etiam magis probata eligemus atque hic apponemus, quo uniuersus sermo huius tractationis perfectior fiat. Piso itaque in libro de animalibus ait perdicem qui domi nostrae connutritur uociferari ac clamare circumplicareque, ac lacerare cortem in qua perdices connutriuntur, ubi cognouerit medicamentum quodpiam intra aedes parari aut aliud uenenum, Menelbus autem, aquila inquit, intra aedes connutrita insilit & arcet eos qui talia moliuntur. Simonides uero pauonem tradit, cognito apparato medicamento, ad locum prodire & clamare, seque expandere & medicamentum ex uasis dispergere, aut etiam effodere siquidem sit sub terram defossum. Aristodemus porro ichneumonem domi nutritum medicamenta sub terram defossa praesagire scribit. Pherecydes autem narrat pluitacum marem obseruare & arguere ac nominatim deferre eos qui talia faciunt, aut in domum important. Ceterum post praescripta uenena, etiam antidotos multi usus & commoditatis, experimentoque cognitae ex ordine subnectemus.

De theriaca ex uiperis Andromachi.

Cap. LXXXVII

Ordinemur autem a theriaca Andromachi ex uiperis: Cuius admiratione dum Galenus haec de ea scribit, Quum multa discordia sit circa theriaces descriptiones, nos Andromachi descriptione ut longe optima utimur, quae etiam in regum usus apparatus eius hoc modo. primum quidem scilicet pastillos apparare oportet, propterea quod resiccatione per multos dies opus habent. Apparantur autem hoc modo.

Pastillorum scilliticorum praeparatio.

Cap. LXXXVIII

Scillam accipere oportet recentem, probe coactam, rufam & non ualde magnam, eamque non, ut quidam faciunt luto, sed fermento mundo integere, & in cacabos in quibus panes assantur inditam in furnum ut assetur immittere. Deinde extractam per ambitum purgare, & acceptis internis partibus tenerioribus eas ipsas probe terere, & farinae cruinae ex eruo rufo recenti factae, duas tertias scillae partes inspergere, ita ut erui quidem librae sint duae, scillae uero tres. Quanquam aliquando ex aequo ambo commisceantur. Haec ipsa inquam, unire ac committere oportet, indeque paruos orbiculos formare, rosaceo oleo in his conformandis adhibito, deinde in umbra resiccare, atque bis per singulos dies uersare.

Hedychroi confectio.

Cap. LXXXIX

Ari, asari, amaraci, aspalathi, opobalsami, floris iunci odorati, calami aromatici, phu pontici, singulorum drach. x. xylobalsami, cinamomi, costi, cuiusque drac. xii. myrrhae troglodyticae, folij, spicae nardi, croci, caliae, cuiusque drac. xxx. amomi drach. vii. mastiches drach. v. uini ueteris odorati dulcis quantum satis est. Arida contundito & cribrato, crocum uero cum uino in pila diligenter terito, deinde myrrha & mastiche adiectis ac probe tritis, opobalsamum adijcito, ac arida inspergito, simulque commissis omnibus pastillos tenuiores formato, uino in his conformandis adhibito: ipsos deinde pastillos in umbra refrigerato, singulisque diebus uersato.

Oo 3 Pastillorum

Pastillorum theriacorum præparatio.

Cæterū pastillos theriacos hoc modo appurato. Viperas fœminas accipito, non quocunq; tempore captas, sed desinente uere, nondum uero inchoata estate, si uero uer diutius hybernū sit, iuxta æstatis principium, non ita diu post uergiliarum ortum, quæcunq; enim uiperæ prægnantes fiunt, eas uitare oportet, neq; ad confectionem pastillorum adhibere. magis enim exasperatæ seipis redduntur prægnantes. Ipsas igitur accipito quum in latibulis suis delitescere cessant, & de cætero in locos sub diuo egrediuntur, & non adeo malignum habent uenenum, intus enim delitescencia animalia, & calentis aëris ui minime per cutis meatus resoluta, nocentiorē & magis exitiosam ueneni uim in se coaceruant. Sunt autem animalia ipsa subflaua, ingentia, & agilia: oculos subrubros habent, collum angustum, & latius caput, & caudam acervatim in tenuitatem abeuntem ac carne penitus nudam, uentrem autem sinuosiorē habent, & gressum circa caudæ summum firman, caudam ipsam non circumuolutā, sed magis contorquentia, et lentius inambulantiā. His enim signis fœmina à mare dinoscitur, in superiōrē quod quatuor habet caninos dentes, quibus tantum duos habeat, & angustius caput, ac crassius collum, & totum corpus tenuius, caudamq; paulatim in tenuem desinentem, non acervatim ut fœmina, neq; omnino carne nudatam. Cauere enim oportet ne mares uiperas in antidoti confectionem assumamus. Neq; uero minus etiā reliqua serpentium genera uiperæ similia uitanda sunt. Similis est autem uiperæ maxime quidē amodytes, imò & hæmorrhus, & cenchrias, & seps. Quos omnes ex prædictis in eorum tractatu signis dinoscere oportet, & præcipue ex colore. flauo enim & subfuluo colore uipera est, alia uero genera arenosi sunt coloris, aut fusca, aut nigricantiā. Verum non oportet etiā prædicta de unoquoque signa alia negligere. Has sanē uiperas prædicto tempore eadem die aut præcedente omnino captas accipito, ac primum quidem ipsarum capita ac caudas amputato, in tantum sanē quantum uideris in eis carne nudatum. At uero non amputationis tantum respectum habere oportet, sed & num statim ex anguia & immobilitate ac omnino mortua animalia appareant: talia enim ut inutilia ad antidoti compositionem censenda. Si uero prædictis partibus amputatis, motum quandam uideris in reliquo corpore superstitem, & animalia ipsa cruorem aliquandiu in se conferuent, hæc ipsa ut optima in antidoti confectionem sunt ammittenda. Post hoc uero ipsorum pellem totam diligenter ex coriato, adipēque ac omnibus pectori insitis ut inutilibus reiectis, carnes ipsas ex duabus aut tribus aquis lauato, posteaque in ollam puram inijecto, & congruentem aquæ uitæ coram affundito, ac anethi uiridis fasciculum addito, subiectis que lignis uitis coquito. Quod si efferveat olla, solet enim assidue in decoquendo aqua irrore & ex olla effundi, quotiescunque hoc ipsum contigerit frigidam aquam irroret, Modum autem decoctionis sufficientem iudicabis, ubi carnes à spinis dissecuisse uidebis, penitus que separatas, ut ne quid ex ipsis spinis inherens carnibus te fallat. Ad manum deinde peluim appositam habere oportet mundam, & ex iusculo cocturæ aliquid continentem, atque in eam ipsam depuratas carnes iniicere, facile enim resiccantur, & proinde difficulter conteri possunt. At uero ubi carnes ipsas puras feceris ac manibus diligenter expresseris, eas ponderato, & in pilam culinariam asperiore conijcito, ac fortiter suerint trice, rito, paulatimq; iusculum instillato. Vbi autem quā tenuissime fuerint trice, panis purissimi recentis aridi non ex ueteri farina apparati contusi & cribrati, quartam

quartā carnū partem addito, aliquādo autem quintā solum: & rursus paulatini iusculi quod satis est affundito, ac in cōterendo quā diligentissime unito: atq; ita pastillos mediocres tenues formato, modico opobalsamo in his formandis adhibito, eosq; deinde in umbra siccato in domus superiore cœnaculo, ad meri diem, aut omnino ad septentrionem sito. Versare autem ipsos assidue oportet quo equaliter resiccentur, & ne aliqua pars diutius humecta permanens, putre factioni obnoxia fiat & periclitetur. Postquam uero sicciores fuerint facti, eos opobalsamo optimo oblinito, & in uitreo uase adseruato: ac quicquid pulueru lenti & albi ex eis per situm productum est post dies aliquot linteo extergito. perforantur enim si id ipsum eis diutius adhærescat.

De reliquis quæ in antidotum coniunguntur.

Cap. xci

Cæterum simplicia pharmaca quæ cum tribus antea præparatis pastillis in antidoti confectionem coniunguntur hæc sunt. Pastillorum scilliticorum drach. XLVIII. pastillorum theriacorum, drachm. XXIII. massæ hedychoi, drach. XXIII. piperis nigri drachm. XXIII. opij Thebaici recentis, drach. XXIII. rosarum siccarum repurgatarum, drach. XII. scordij cretici, seminis buniadis agrestis, cuiusq; drach. XII. iridis illyricæ non corrosæ, drach. XII. agarici pontici albi, drach. XII. cinamomi, drach. XII. aut casia duplum: succi glycyrrhizæ sicci drach. XII. opobalsami optimi, drach. XII. myrrhæ troglodyticæ drach. VI. croci cilicij drach. VI. zingiberis non perforati, drach. VI. rhei pontici recentis, drach. VI. radicis quinquefolij, drach. VI. calaminthæ montanæ, drach. VI. comæ marrubij in uigore consistentis, drach. VI. cacuminum & foliorum stœchadis, drach. VI. petroselinæ macedonici, drach. VI. costi recentis, drach. VI. piperis albi, drach. VI. aut nigri loco eius drach. IX. piperis longi non corrosi, drach. VI. di stamni cretici, drach. VI. thuris masculi integri & in partes non cōminuti, drach. VI. floris iunci odorati, drach. VI. terebinthinæ chiæ, drachm. VI. casia fistula, drach. VI. spicæ nardi, drach. VI. radicis gentianæ, drach. IIII. comæ polij, drach. IIII. styracis calamitæ, drach. IIII. fœlis massiliensis incorrupti, drach. IIII. seminis thlaspios, drach. IIII. seminis ammi, drach. IIII. comæ chamædryos drach. IIII. chamæpityos, drach. IIII. succi hypocythidis sicci, drach. IIII. foliorum malabathri, drach. IIII. spicæ celticæ, drach. IIII. anisi helladici, drachm. IIII. mei chamantici, drach. IIII. seminis fœniculi, drach. IIII. lemnia terre quæ sphragis appellatur, drach. IIII. chalcitidis semiasatæ, drach. IIII. amomi racemi, drach. IIII. radicis acori, drach. IIII. phu pontici, drach. IIII. carpobalsami, drach. IIII. hyperici in uigore consistentis, drach. IIII. acaciæ liquidæ, drachm. IIII. gummi uermiculati, drachm. IIII. cardamomi drach. IIII. dauci cretici, drach. II. galbani puri, drach. II. opopanax, drach. II. sagapeni persici, drach. II. bituminis iudaici, drach. II. comæ centaureæ minoris, drach. II. castorij, drachm. II. aristolochiæ tenuis, drach. II. uini ueteris dulcis quantum sufficit, mellis atticî despumati libras X. aut quod satis est.

Modus conficiendi.

Cap. xcii

Apparatur autem antidotus hoc modo. Sex drachmas casia, & alias etiam XXIII. quæ cinamomi loco sunt coniectæ, per se tundito ac cribrato. deinde crocum primū in pilam coniectum cum uino probe terito. atq; ubi quā tenuissimus factus fuerit ei cribratam casiam addito, ac rursus infuso uino terito. ubi uero casia sufficenter fuerit trita lemniam terram cum uino modico in alia parua pila per se terito, & asphaltum siue bitumen similiter dissolutum ad crocum & casiam inijecto, ac rursus aliquandiu terito. Reliqua uero omnia

Oo 4 herbacei

herbacei generis cum tribus pastillis & cum castoreo tundito & per tenuissimū
cribrum excutito, succulenta autem omnia, acaciam inquam, myrrham, opiū,
thus, hypocistidis succū, & glycyrrhizam, opopanaca, sagapenum, galbanū
& gummi contusa, in competenti uini mensura una die antē macerato. Syra-
cem uero in pilam magnam ac amplam coniectum cum opobalsamo terito, &
priuatim unito, deinde & pramacerata succulenta in pilam inijcito ac probe te-
rito, atq; si opus fuerit uinum paulatim affundito, postquam autem & hæc suffi-
cienter fuerint trita, styracem antea tritum, & casiam, & crocum & quæ cū eis
sunt adijcito & diligenter unito, Chalcitidis deinde bonæ sex uncæ aut amplius
in ollulam paruum nouam ampli oris inijcito, et supra carbones ardentes impo-
nito, ac chalcitidem assidue cum pura rudicula agitato. Quum uero liquefieri
coeperit & lutosam subsidentiam acquisierit, statim ab igne auferto, positaque
in terram ollula quo uniatur diligenter agitato, coagmentatamq; paulisper li-
nito. Deinde ablato & abiecto eo quod in superficie siccior & rufum apparet,
ex medio quod uiridius est & molle apparet accipito, ac quatuor drachmas po-
derato, easq; in mediā pilam inijcito, in qua reliqua prius trita habes, cum mo-
dicoq; uino in uno aliquo pilæ loco dissolutas, cum reliquis committito, ac mo-
dico addito melle despumato unito. Postquam uero chalcitis ad reliqua trita fu-
erit admixta, omniaq; nigrum acceperint colorem, tunc addito etiam terebin-
thinam cum modico melle prius dissolutam. Qua deinde ammixta, arida etiā
cōtusa & cribrata adijcito, & reliquum item mellis paulatim ammisceto, postea
cum magno pistillo omnibus quā diligentissime unitis, antidotum ipsam in
mortarium transfundito, & pistillis ligneis ex grauissimo ligno & politissimo
fabrefactis, eam ad solem expositam in mortario tundito, deinde probe conte-
ctam finito, & rursus post triduum aut quadriduum ad horas tres tundito, atq;
id donec quadraginta transierint dies facito: deinde uasis uitreis modico melle
despumato prius imbutis excipito, neq; uero uasa ualde expleto, sed locū quen-
dam quo transpirare pharmacum possit relinquito, probeq; contectum ac con-
ligatum adseruato. Hæc quidem igitur omnia ad pharmaci uirtutem ac conser-
uationem sunt descripta. Vt autem nigrum fiat, non scio quomodo in consue-
tudinem uenerit, & sanè quisquis hunc colorem in eius apparatu non adsequi-
tur, is irridetur. Modus uero adsequendi omnibus in promptu est. Nolle tamē
opere precium est ex colore pharmaci, uim ipsius minime permutari. Quod ue-
ro circa colorem pharmaci offendamus & delinquamus, ob chalcitidē est plus
iusto uisam. si enim paruum superuratur rubicundiorē antidoti colorem red-
dit. Si uero amplius, non rubicundiorē, sed à naturali parum immutatum fa-
munda agitare, ne id quod in superficie est & quod uasi contiguū adhæret ex-
arescat. Ceterum tempore ad concoctionem non modico opus habet, quo ma-
tura usui antidotus fiat, & iuste concoquatur. Vt plurimum uero per duode-
cim mensium tempus coadunatur, & concoquitur.

Post quantum tempus ea sit utendum.

Cap. XCIII

Qui uero ipsa magis uigente & ualidiore uti uolunt, etiam post unum men-
sem ea utuntur, præsertim ad eos qui à uenenatis bestiis demorſi sunt, & à uene-
nolis pharmacis infecti, hi enim quum grauiore malo urgeantur, potentiore e-
tiam ab antidoto auxilio opus habent.

Quanto tempore efficax sit.

Cap. XCIII

Est autem pharmacum ualidum inquit Galenus, usq; ad xxx. annū in his
affectionibus

affectionibus in quibus non tanta est nocentis causa. Quod si uero per tempus siccior fiat antidotus, eam in mortarium coniectam & pistillo tritam, optimo melle despumato affuso, rursus unire ac excipere oportet, atq; id quotiescunq; aridior facta fuerit faciendum est.

Modus probandi theriacen.

Cap. xcv

Multi igitur ipsius potentiae probandae ac cognoscendae gratia, aliquod purgantium pharmacum prius exhibent, deinde ab eius acceptione antidotum bibendam praebent, atq; hoc modo eius iudicationem per comparisonem quamdam faciunt. Si enim ualida & uigore efficax fuerit, purgationem fieri minime permittit, sua ui exuperans pharmaci purgatiui facultatem. Si uero aequae purgetur homo ueluti si antidotum non accepisset, manifestum sit eam inualidam & exilem esse, ut quae retinere non potuit purgatiui medicamenti fluxum. Quidam uero papaueris succum duorum scrupulorum pondere aqua dissoluunt, eumq; cani aut gallinae uel columbae bibendum praebent. Deinde etiam confestim antidotum dissolunt, ex eaq; nucis ponticae magnitudinem ori animalis infundunt, neq; quicquam mali inde comitatur.

De exhibitionis mensura, & utendi modo, & in quibus conueniat morbis.

Cap. xcvi

Ceterum facultatis eius mensura non eadem in omnibus hominibus existit. Sicut neque liquor idem est, in quo dissolutam ipsam exhibemus. In uenenatis namque pharmacis, aut uenenum iaculantis animalis plaga, nucis ponticae magnitudine in uini cyathis tribus dissolutam bibendam praebemus. In alijs autem affectionibus tum mensura, tum liquore diuersimode utimur: Secundum affectionum enim diuersitatem, etiam pharmacorum quantitatem competenter metimur, & conuenientem similiter liquorem eligimus. Non enim solum ad bestiarum morsus & uenena a natura sua auxiliatur, sed & ad alias magnas affectiones auxiliare pharmacum per usus experientiam a nobis inuentum est. Capitis igitur dolores diurnos & uertigines sanat. Auditum grauem & uisum obtusum potu sedat, quandoque & gustus organum debilitatum emendat, & comitiali morbo auxiliari consueuit. Auxiliatur & spiritalis & qui orthopnoici dicuntur ex aqua mulsa potata, diffecans & attenuans ac facile educiles reddens coactos & uiscosos humores. commodat ueteri ac recenti tussi, & quibus pectoris aut laterum partes dolent, magnitudine fabae, febre cerentibus ex uino mulso, febricitantibus ex aqua mulsa. Conuenit & sanguinem per sputum reiicientibus siue ex pectore, siue e pulmone educio fiat, siquidem recens sit elatio cum posca, inueterato autem malo ex aquae cyathis tribus, praestiterit autem aquam ipsam radices symphyti decoctum esse. Datur autem fabae aegyptiae magnitudo ad noctem & mane. Sape uero & stomachi uitia curauit, & fastidium eius, ciborumq; inappetentiam in eorum decoctionem & appetentiam suauiter commutauit. Quin & uentriculi difficilem concoctionem & imbecillitatem corrigit, similiterq; & stomacho inflatos, & intestinis tortos, aut colum dolentes placat. Aliquando autem & cholericae affectioni praecclare auxiliatur, corporis miscellam corroborans & pleraque corroborans fluxiones. Maxima uero eius efficacia in his qui ex oris stomachi morisimo linquuntur, cardiacos graeci appellant, apparet. pra multis enim & aspidius sudoribus corpore diffuente, & uiribus exoluto, quum ex uini potu saepe nihil opis sentiant: Antidotus ipsa potu sudores sistit, & uires concidentem uelut erigit ac fortiores reddit. Lumbricorum etiam omne genus mirabiliter exint

ex intestinis exigit. Et hepaticas omnesque inueteratas affectiones saepe curat. At quatum item morbum ex aliqua hepatis affectione obortum strenue sanat. Quandoque & induratos lienes liquefacit, sordibus eorum & superflua substantia paulatim consumptis, atque hoc cum aceto multo data prestabilius facit. Deterit & lapides renum, omneque terrenum & sordidum ex illis repurgat cum decocto petroselinii, difficilem item mictionem uesicae compescit, & in ipsa ulcerationes quandoque persanat. Laudatur & ob id quod omnem insultum diuturni rigoris & algorem tollat, bilisque uomitum accessionis ex acerbationum tempore aliquando concomitante sedet: Maxime uero quartanis conducit si quis ea ingeniose utatur. Ego igitur, inquit Galenus, multos quartanarios hoc ductu usus facillime liberaui. primum quidem eos per uomitum a cena euacuaui: Deinde sequenti die mane absinthij cremorem exhibui, atque ita duabus horis ante accessionem antidotum ipsam dedi: & mirabiliter adeo saepe successisse noui, ut con festim nulla accessione qui acceperat impeteretur. Verum utendi tempus non in principio morbi est, sed quum perfecta concoctio in urinis appareat. Etenim si in principio morborum siue ipsa, siue aliud pharmacum prebeat, conuenat morbum. Datur & hydropicis cum sisari decocto & similibus, & eam preterit quae aqua inter cutem & Graecis leucophlegmatias appellatur, generose iuuare conlueuit, per totum corpus digesta & distributa, atque undiqueque car nibus exprimens humorem. Quapropter etiam his qui malo corporis habitu praediti sunt optimum pharmacum exiit, & elephantiasim saepe curare solet, corrupti onem corporis fieri prohibens: Et rigore neruorum conuulsis plurimum auxiliatur. Et membrorum resolutiones in potu accepta saepe persanauit. Credita est & foeminis menstruas purgationes ciere, & immortuos foetus eicere, quos natura propter debilitatem expellere non potest. Danda itaque eis ex passo aut aqua nulla magnitudine fabae, ruta tamen aut dictamnino in praedictis liquoribus decoctis. Podagra etiam affectis & articularum omnium fluxione infestis optulatur, maxime quum augmenti tempus praeterierit, & status acuminis insit. rit, doloribus enim sedatis per ea quae eos mitigare possunt, antidotum in potu praebere oportet. Illatos enim fluores consumit, & alios inferri impedit. Maxime autem profuerit si sani adhuc ipsam accipiant. Superfluos enim humores expendit & totam corporis miscellam permutat. Multi igitur in principio podagrae per assiduum eius potum perfecte ab affectione sunt liberati. Admirari porro subit antidotum, quum ipsam non modo corpori medentem uideamus, sed & ipsum animum saepe ab affectibus male dispositum iuuare potentem. Ex atra bile enim obortus animi affectus ipsa sedat. Etenim assidue exhibitum pharmacum ex uenis & uicinis partibus atram bilem uelut exhaurit & consumit, quemadmodum etiam ex ferarum ictu illatum uenenum: Quin & aquae formidine pessimum morbum quo a cane mors laborant, saepe tollere consueuit, atque ita mirifice tantorum malorum concursum impugnat. Cognita est praeterea nobis antidotum ut quae in pestilentibus constitutionibus peste apprehensis unice auxiliari potest: Eos uero qui eam praebierint pestilenti affectione apprehendi prohibet: Ipsa enim uelut temperamentum quoddam & sanam constitutionem corporibus inducit, redundantes humores consumendo, & refregatas partes concalasciendo, insuper & innatam facultatem corroborans, ad naturales actiones probe obeundas. Caterum in peregrinando maxime consulo ut ea utaris quum frigido existente aere per hyemem iter facis. Est enim ueluti bonum uiscerum indumentum, quod plurimam caliditatem ipsis exhibere potest.

test. De Mithridate sanè magno illo belli duce referunt, quod theriacem quidem non biberit, neq; enim adhuc in usu erat; uerum ex alterius antidoti, quae postea Mithridatica ab illo appellata est, usu, ita corpus apparauerit, ut nulla ueneni uisædi posset, & quum etiam letale pharmacum accepisset, mori non posset. Quum enim ab hostibus uinceretur seipsum interficere urgebatur, quando plurimo ueneni haustu mortem sibi consciscere nequiuisset. Quapropter uocato quopiam ex amicis ei iugulum præbuit. Quare uides multæ mixturæ pharmacæ multam etiam uim habere, quo corpora ex eorum usu corroborata, nullis ueneni affectionibus uel raro & difficulter admodum obnoxia reddantur, atque hac facultate uel imprimis theriacem præditam esse constat. Porro tempus exhibitionis commodum est quum probe concoxerit, ipsam accepturus, neque ciborum copia sit oneratus. Bibat autem ieiunus, quo sufficiens temporis interuallum superfit ad ipsius pharmaci concoctionem. Anni præterea tempus simulq; regionem inspicito, in quibus ipsum es exhibiturus. Aestate enim neque in totum dabis. Quapropter etiam eis qui in ætate uigoris sunt, & plurimum habent naturalem calorem, neque multum, neq; sepe pharmacum ipsum exhibere moneo: Quemadmodum contra eis qui iam uergente & adfecta ætate sunt, tum plurimum, tum sæpe cum aqua, quanquam potius cõsulam ut cum uino accipiatur. In pueris uero pharmaci exhibitionem omnino uitare oportet: Maior est enim pharmaci facultas quàm uires eorum tolerare possunt, & corpus sanè facile dissoluit, & insitum spiritum cito extinguit: Quemadmodum & lucernæ flammam oleum ipsum, si ignem superet, facile extinguit. Atque ego uere id narrare possum, inquit Galenus, puerum quendam ab intempetuo antidoti usu exolutum esse. Omnem namq; ipsius habitum pharmacum ipsum dissoluit, & uetrem fluore cõmouit, atq; ita noctu puer expirauit. Quod si aliquando calidiorem regionem inhabites, uitare oportet antidoti usum, sufficiente tibi illius loci aëris calore. Vnde neq; hominibus qui sub primo solis ortu habitantes calidissimi sunt, & multum habent illius regionis calorem, antidotum theriacem conuenire puto.

Sales theriaci ex libris Marciani, cum quibus consentit

Galenus.

Cap. XC VII

Sales ex uiperis hoc modo apparantur. faciunt autem & ipsi ad omnia prædicta moderate, per assiduum usum commoditatem exhibentes: quanquam sint qui eorum auxiliarem potentiam penitus negent, per exustionem dissipant affirmantes ferarum facultatem. Ego uero dicere ausim, eandem quidem potentiam cum theriaca sales non habere, non tamen eorum uim per ignem petire, quum multa sint quæ per ignis familiaritatem meliora reddita conspiciantur, uelut est aurum, & calx, & similia. Viperæ enim integræ ustæ intensiorem & malignam uim per exustionem deponunt: Temperamentum autem auxiliare & symmetriam ab igne sumunt. Proprie autem in affectionibus cutis curandis sales commendantur, cuius generis sunt leuce, lepra, impetigo agrestis, elephantiasis, alphas, scabies agrestis, & raritas ac defluuium capillorum. huiusmodi enim cutis uitia confestim delent, & acria recrementa subter cutem reita per exudationē corrupta substantia euacuatur, adeo ut quidam in principio pediculos excluderint intra XIII. ad summū dies: post hos enim nullus in corpore pedunculus apparet. Quidam uero pro pediculis sputa pituitosa reieciāt a salum reiectione initium faciētes, deinde paulo post etiam sputa repurgata si stantur;

stuntur. Licet autem tum in prandio tum in coena eis uti, cum quibuscunque
 edulijs eos accipere uelis, neque ultra ad eorum acceptionem prouocare oportet.
 Tanta enim ipsis insita suauitas est, ut magis uoluptatis gratia eos confectos
 quis dicere possit, licet igitur usque ad III. cochlearia per diem ex eis sumere,
 maxime si cibus prius in uentre sit probe concoctus. Qui enim eos accipiunt
 concoquunt melius & cibi appetentiores fiunt, floridius etiam corpus habent,
 & sensus omnes uegetiores. Suffusiones igitur incipientes & nondum conge-
 latas egregie dissoluunt, neque plane quis suffusionem incurrat qui eos quotidie
 accipiat, purgationes item lunares propter obturationem aliquam aut sangui-
 nis coactionem suppressas ciēt. Iidem etiam largum & impetuofum mentium
 defluxum sistunt. Quisquis autem eos praesumpserit omnes uenenorum, & ui-
 rus iaculantium bestiarum insidias euincet, neque etiam quum infectus fuerit, &
 postea statim sales acceperit, periculum incurret, maxime si corporis sui tempe-
 ramentum per horum salium usum multo tempore appararit ac ueluti condie-
 rit, quemadmodum Mithridatem fecisse dixi. Praestat & pestilenti constitutio-
 ne instante ad auxiliare hoc & mali depulsorium pharmacum confugere, pra-
 fertim si ei myricae herbam ammisseris. Morborum praeterea omnium medi-
 ci sales existunt, maxime tamen eorum qui in renibus consistunt: lapides enim
 in eis atterunt, & plane marcidos renes restituunt, uertigini uero & dolori ca-
 pitis inueterato, morboque comitiali nulla alia cōsimilis medela exhiberi queat,
 si quis eos per integrum annum ex ordine large sumat. Noui & arquatos diu-
 turnos, & splenicos, ac colicos qui frequenter hanc affectionem inciderunt per
 eos sanatos, hydropem etiam maxime subter cutem per eorum usum resiccati
 et ingentem famem, bulimon greci dicunt, dissolui. Ut quis etiam per frigidum
 aerem iter faciens minus frigore laedatur, comesti faciunt. Rigores autem per
 circuitum repetentes diuturnos cohibent, & tussis humectas resiccant. Tabidos
 uero iam mirabiliter ad bonam corporis habitudinem reduxerunt paulatim edu-
 lijs adpersi. Exolutos autem a languore perfecte reuiuiscere faciunt. Scio namque
 plurimos membris penitus resolutos per ipsos sanatos. Ad podagram denique
 maxime incipientem, & omnino ad omnes articuli morbo affectos unicum
 hoc edulium constructum esse uidetur. Adhortor igitur eos qui a podagra libe-
 rati sunt ut eis continue utantur. Quidam uero uiperas totas extendunt & sic-
 cant, posteaque terunt ac eas in potu contra morbum articulorum exhibent. Ca-
 terum uix satis dignis uerbis assequi queas, quantum diuturnas quartanas & de-
 liria ex atra bile oborta dilatent & remouentur, si ante accessiones & in interval-
 lis quoque sumantur. Enecant item omne lumbricorum genus, optimum est etiam
 per ipsos maxime crassiores, dentes confricare. Non enim albiore tantum eos
 reddunt, sed neque dens postea laxior factus mouebitur, neque erodetur, neque su-
 porem incurret. Extrahunt etiam per caput recrementorū copiam, ac caput pur-
 gant, & oculos leuiore reddunt. Apparantur autem hoc modo. Viperas accipere
 oportet magnas, eiusmodi qualem praediximus specie eodemque tempore capras,
 numero quatuor, non ultra biduum postquam captae sunt adseruatas: sed si fieri
 potest eadem qua captae sunt die, easdem in ollam figulinā puram magnā conijce-
 re oportet, statimque supra ipsas pro sale ammoniaco, salem cōmunem lotum &
 exiccātū inijcere, praestiterit quidem ammoniacū salem esse, si uero haberi non pos-
 sis, cōmunis & albi italici modij dimidiū, hoc est lib. x x, inijcito, atque id non in
 meridie facito sed mane. Tunc enim rigētes adhuc bestiae ad motū tardiores fiunt.
 Quod si phagi etiam arboris ramulo uiperas cadas, ad motum ipsas tardiores
 reddes,

reddes, & mirabilem eis soporem induces. Est autem phagus species quercus. Quam igitur uelut dictum est, uiperas salibus grauatis & oppresseris, pastillos insuper ad sales adijce hoc modo apparatus. Radicis gentianæ, sesquilibra, aristolochiæ rotundæ, sesquilibram, comæ centaureæ minoris lib. ii. seminis cardamomi lib. ii. marrubij, scordij, apij, chamædryos, seminis rutæ hortensis, singulorum lib. i. Hæc omnia in crassas partes cōtundito, & cum attico melle subacta in v. aut vii. pastillos latiores, quo probe exuri queant, reducito. Hos equidem pastillos eo quo dixi modo præparatos habens ad sales uiperis uiuis iniectos imposito. Deinde scillas electas, magnitudine sua manum explētes, recētes v. in tenues partes dissectas pastillis superindito, aliumq; dimidium modicum Italicum hoc est x. libras alias salis supra scillam & pastillos inijcito, & de inde ollam operculo tria foramina habente obturato, eamq; forinsecus totam luto figulino, ut si rumpatur nihil pereat, oblinito. Inde q; sensim igni adhibeto paulatimq; circumlitum lutum torreto, deinde aucta flamma per ficulneorū aut uitis lignorum ollæ subiectorum exustionē, uaporem inde per foramina elatum obiectrato, primū enim fumus multus caliginosus & turbatus ualde exgens apparebit, significationem perhibens quod ignis iam feras ipsas continet. Quo tempore diligenter cauere iubeo, ne quid ex illo fumo per respirationem haurias, aere nimirū per ferarum exhalationem infecto, deinde ubi cessauerit uapor, & flammam quandam exilem per foramina conspexeris egredientem, tunc sanè quàm optime affatas putato, atq; ita olla ab igne ablata, perq; diē ac noctem refrigerata, uita per apertam ollam eximito, & cum subscriptis tundito. Sunt autem hæc. Seminis rutæ syluestris, dodrantem, hysopi dodrantem, nardi celticæ sex uncem, stachyos sex uncem. Est autem marrubio similis non tamen spinosa planta seu frutex, seminis fœniculi montani sex uncem, petroselinum macedonicum trientem, comæ origani dodrantem, seminis hormini tosti dodrantem, racemi amomi quadrantem, cacuminum thymi dodrantem. Foliorum malabathri trientem, carniū iuniperorum baccarum lib. ii. seminis coriandri sex uncem, piperis longi lib. ii. radicis silphij uncias xv. zingiberis non corrosi lib. ii. seminis satyrii quadrantem. Quidam uero radicis satyrii cōijciunt sex uncem, pulegij montani sex uncem, seminis mentæ sex uncem. Aut si haberi non possit, herbæ siccæ sex uncem, tordylii et casia cuiusq; quadrantē, fœlis massiliensis sex uncem, cinamomi unc. i. Maximopere autem conandū est ut crassiora ueluti sunt lignosa omnia contundendo attenuentur, neq; quicquid ex eis reiiciatur. Tusa aut per angustissimū cribrū excutito, bis & ter per eadem cribella excutiēdo, quo quàm optime uniātur, atq; ita omnia in uitreis uasculis reponito, neq; statim utitor sed post quadragesimū tandē diem. Inueteratum enim pharmacū maiorem cōmoditatem de se præbet, maxime si extra omnem humiditatē ipsum siccum adseruatis. Cæterū colore non ualde nigrescit. Ego uero inquit Galenus, bestias ipsas non exuro, sed pastillos ex eis, quorum confectionē in theriaca docui, reliquis quæ cum bestiis uruntur ammisceo & simul exuro, quo eam quā in se habent amaritudinē per exustionē abijciant, tātā aut pastillorum mensurā adijcio, quantā coniectura assequi possum quatuor numero uiperas habere, et sanè sales uere optimi euaserūt, utpote qui neq; exustione cinereū retulerint saporē, neq; nigrū colorem, sed et ob qualitatem usui gratissimi sint facti, & qui uim qua eos proprie præstare prædicaui efficaciorē habent. Efficiunt autem quatuor uiperæ magnæ, pastillorum sicciorum sextantem & uncia dimidium. Atq; hic quidem est totius confectionis sa-

Pp

lium

liū theriacorū modus. Oportet autē medicū uarie ipsis uti; utpote si sanguinē spu-
entibus sales hos exhibiturus sit, radicis symphyti cōtusa & cribrata sextā par-
tē ad salis modū addet, ueluti si quinq; cochlearijs pharmaci unā symphyti ad-
dat. In phthisicis autē siue tabefactis & pectore suppuratis, iridis tenuissime trite-
aut dictāni sextā partē salis pōderi adijciēt. Hepaticis uero chamæpityn, splene-
ticis cyclamini radicē, aut capparis corticē, aut piperis addet sextā partē. Quod
si ad podagricos apparare uelis, dimidium præscripti pōderis satyrj auferto, ut
tando ne rabiofas & membra exoluentes in ipsis excites uoluptates. Cæterum
in renibus lapides quā maxime atterunt sales, si carpobalsamum aut lithosper-
ma appellatum habuerint ammixtum. Si uero uim contra uenena intensiorem
facere uelis, in salium confectione scordium & marrubiū duplicabis, in superq;
anatum sanguinem siccum adijcies. Eis uero qui a rabido cane mori sunt
plius conferent, si pæoniæ radicem addas aut caneros exustos. Opisthotonicis
autem qui retro neruis conuelluntur, maxime profuerunt, si castorj & opopa-
naxis parum habeant admixtum, in eis sanē qui id tolerare possunt. Visum por-
rō exacuit malabathri folium duplato pondere in confectione additum. Con-
coctionem uero ciborum iuuant si casia & costi eis sufficiens modus addatur.
Ad inflationes autem cum inū adijcito. Vrinam amplius ciet dauci semen addi-
tum, Quartanas uero amplius soluunt si uerbenacam rectam, & eupatorium
& succum cyrenaicum, aut ipsū laser adsumant. Verum ut summam dicam,
Omne quod commodum & habile noueris affecto membro, id ipsum ad sales,
siue in ipsorum confectione, siue exhibitionis modo ammisceto. Quin & ama-
riores scio sales apparatus. Ex his enim quæ cum uiperis uruntur aristolochi-
am, & scordium, & cardamomum, & dimidium centaureæ detraho, eademq;
postea cum reliquis quæ tunduntur misceo, imō & stoechadis parem scordij mē-
suram addo, atq; ita gustu amariore sales euaserunt, & in usu sanē ad multam
hi commodiores sunt experti. Porro cauendum est ne eos prægnantibus & ab-
ubere lactantibus exhibeamus. Et ne pueris, ac temperamento calidioribus, &
præsertim tempore æstiuo, & regione calida, & qui acuta & sicca febre labo-
rant, eos quoquo modo præbeamus.

Antidotus Mithridatica.

Cap. xcviii

Hæc ut Antipater & Cleopater tradunt, ista capit, Myrrhæ drachmas vii,
obolos iiii, spicæ nardi tantundem, croci drachm. vii, obolos iiii, opij drachm.
iiii, obolos ii, & dimidium, styracis drachm. v, castorj drachm. vi, obol. i, cina-
momi drachm. xvi, polij drach. v, scordij drach. xvi, zingiberis tantundem,
costi drachm. xvi, piperis albi drach. v, obol. i, piperis longi drach. xvi, sele-
lis incorrupti drachmas v, obol. ii, petroselinī drachmas xiiii, seminis dauci
drachm. xvi, casia drachm. xv, thuris drach. xvi, succi hypocisthidis drach. vi,
& sesquibolum, nardi celtici dra. iiii, seminis fœniculi drach. iiii, folij malaba-
thri drach. iiii, acori incorrupti, phu, sagapeni, carpobalsami, hyperici, iridis il-
lyricæ, acaciæ, gummi, seminis cardamomi citra medullā, seminis pelecini, sin-
gulorum drachm. ii, lemnis sphragidis, confectionis cypheos, partium scin-
ci iuxta renes sitarum, singulorum drach. ii, seminis thlaspios drach. xvi, gen-
tiana dra. iiii, anisi drach. iiii, rosarum siccarum mundarum drachm. iiii, mel-
drach. iiii, florum iunci odorati dra. vi, opopanacis drach. vi, galbani drach. vi,
obol. iiii, opobalsami drachmas vi, obol. iiii, aristolochias drachmam i, hyssopi
drach. iiii, marrubij drachm. i, chamæpitios drachm. iiii, rosmarini drach. v, re-
rebinthinæ chiæ drach. vi, obol. iiii, mellis atticī despumati quantum sufficit.
Vinum

Vinum ne addas, sed prædissolutis melle calido succis, indeq̃ tritis ac adiecta terebinthina, inspergito sicca contusa & angustissimo cribro excussa. Vnitoq̃ et reposito omnia. Datur drachmæ pondere; aut ad summum siliquæ xxiij. ex ea exhibentur.

Confectio Cypheos.

Cap. xcix

Cæterum Cypheos quæ in antidotum coniicitur descriptio hæc est. Vuæ passæ tenuis ac pinguißimæ detracta pellicula & uinaceis hoc est, ipsius carnis drachmas xxiij. terebinthinæ ustæ drachm. xxiij. myrrhæ drachm. xii. cinamomi drachm. iij. floris iunci odorati drachm. xiiij. croci drac. i. bdellij drachm. vi. onychos, hoc est, unguis aromatici drachm. i. aspalathi drach. ii. & dimidiâ. spicæ nardi drachm. iij. casia drac. iij. cypèri drach. iij. & dimidiâ. baccarum iuniperi magnarum dra. iij. & dimidiâ. calami aromatici dra. i x. Mellis quantû satis est, uini odorati parû. Myrrham, bdellium, et terebinthinâ usam contere cum uino ut mellis crassitudinē induant; deinde uinâ passam per se probe tritam adijce, simulq̃ tritis mellis sufficîentem modû infunde, ac reliqua insperge, pastillisq̃ inde formati utere. Vritur autem terebinthina hoc modo. Terebinthinam coniice in ollam, & triplû aut etiâ amplius aquæ infunde, et ad ignē adhibe, nihilq̃ omnino mouendo coque, ubi uero consumpta fuerit aqua et terebinthina attenuata ac inualida reddita; ut digitis confringi possit, eam tolle atq̃ in antidoti confectiōnem assume. Si uero insumpta aqua adhuc mollior appareat terebinthina, aliam aquâ superfunde rursusq̃ ad ignē adhibe, donec friabilis reddatur. Datur aut cyphi ipsum & per se commodè his qui hepar aut pulmonem, aut rhēnes, aut aliquod aliud uiscus exulceratû uel obturatû habet.

Cap. c

De antidoti Mithridaticæ usû.

Datur itaq̃ ad summum ex præscripta antidoto Mithridatica nucis ponticæ magnitudo. Eis uero qui ad integram ætatem pèruenerunt græcæ fabæ. Auge tur aut & minuitur hæc magnitudo in medijs ætatibus. Atq̃ his quidē qui febre carent ex uino danda est; aut uino mulso, aut condito; siquidē hepar habent obturatum, febricitantibus uero ex aqua, aut aqua mulsa. Facit enim ad antiquas stomachi fluxiones itemq̃ thoracis, & ad omnes inueteratas in profundo corporis exulcerationes aut abscessus; facit ad tabidos, & ad uentris inflationes. Et Coeliacis medetur. Emendat & reducit obtusum appetitum, & bonum colorem corpori addit. Frangit lapides, sanat urinæ difficultatem & atram bilē congregari uetat; fœtus immortuos expellit, & ad alias itē affectiones conueniens est. Acuit uisum eorum qui eam accipiūt, plurimam autem præsertim præsumpta uini habet, quod non permittat quempiam à letali ueneno legi, qua grata etiâ à Mithridate composita est & appellata.

Antidotus Esdræ aut prophetæ Doctoris.

Cap. ci

Amomi scrup. xii. floris iunci odorati drachmas i x. pyrethri drach. vi. croci scrupulos x x vi. cinamomi scrupulos vi. aut casia duplû, myrrhæ troglodyticæ scrup. xii. styracis calamitæ scrup. x viij. petroselinî scrup. iij. seminis dauci scrup. iij. tragacanthi scrup. vi. succi hypocisthidis scrup. i x. iridis illyricæ incorrosæ scrupulos x v. seminis fœniculi scrupulos vi. bdellij scrup. i x. thuris drachm. i. sulphuris uiui scrup. vi. seminis hyoscyami albi scrup. x x viij. casia scrup. i x. seminis papaueris scrup. x x x. spicæ nardi scrup. xii. seminis rutæ scrup. iij. seminis ocymi scrup. iij. rhois culinarij scrupulos l v. seminis anethi scrupulos vi. asari drach. i. seminis cardamomi reiecta medulla scrup. vi. opij scrupulos x x viij. euphorbij scrup. vi. piperis scrup. x x x. rosarum siccarum scrupulos x x viij. piperis scrup. vi. piperis scrup. x x x. rosarum siccarum scrupulos x x viij.

scrupulos IX, folij, scrupulos XII, opobalsami scrupulos XXIIII, uentris mergi scrupulos VI, laccae scrup. XII, lycij indicij scrup. XII, cariophylli scrup. XII, steracis reperti in aluo mergi scrup. VI, rhei pontici scrup. XII, mei athamantici scrup. VI, floris nerij scrup. IIII, & dimidium, terrae cimoliae scrup. XII, succi artemisiae scrup. uiginti, foliorum seridis scrup. IX, spicae celticae scrup. XII, rosarum rhododaphnes scrup. VI. Alij etiam castorij scrup. XII, uerum tu castorij scrup. III, cojicito, costij scrup. duodecim, gentianae scrup. XII, cofectionis hedychoi scrup. IX, anisi scrup. VI, lisonis scrup. XVIII, ammoniaci thymiamatis scrup. XII, Quandoque & foliorum citri scrup. duodecim, uini ueteris odorati quantum satis est: Mellis despumati primarij libras V, uel VI. Apparatur autem hoc modo. Arida omnia cum croco & castorio ac hedychroo tundito & per angustissimum cribrum excutito. Opium uero, myrrham, hypocisthidem, bdellium, lycium, ammoniacum in uino macerato, Tragacanthum autem per se macerato. Sequenti deinde die rosas rhododaphnes & serin terito ac unito, & tragacantho similiter probe trite reliqua trita adijcito, & cum succo artemisiae unito, mel quoque despumatum & tepefactum saepe instillato ne tragacanthus exarescat: Deinde & arida tusa inspergito, sufficienterque unita probe contegito: in sequentibus uero diebus septem aut nouem in sole terito, & uasis uitreis excipito. Neque tamen uasa expleto, sed locum respirationi reliquum facito. Vfus eius est ad uenenum iaculantium animalium plagas, datur autem fabae magnitudine ex uini cyathis duobus mane & ante somnum eodem modo. Illinitur & plagae eamque a periculo uindicat. Eis uero qui letale uenenum hauserunt post uomitus & ante, nucis ponticae magnitudine datur, mane & ad somnum cum uino. Praesumpta etiam ueneno uini laedendi adimit. Ad capitis porro dolorem eam in sapa dilutam fronti illinito. Dato & ad somnum phasioli magnitudine modica aqua & sapa dissolutam. Furiosis uero ante somnum datur fabae magnitudine ex sapa diluta: dissoluitur etiam cum sapa, & toti fronti & inter supercilia illinitur, per omnem item foris nasum ante somnum, maxime enim somnum inducit. Caeterum ad oculorum inueteratas fluxiones sapa liquefactam ad frontem usque ad supercilia illinito. Ad molares dentes erosos, itemque ad dentium dolores cum sapa liquefactam & calefactam ore detinendam praebere, & confestim quiescet dolor. Ad tussim uero diuturnam & spirandi difficultatem ac orthopnoeam datur nucis ponticae magnitudine ne non febricitantibus cum aqua frigida, febricitantibus cum aqua multa. Datur autem ex ordine per dies septem ante somnum. Ad tabidos uero subuenienta expuentes & eos qui abscessum internum habent, fabae magnitudine dato cum sapa modica frigida aqua diluta. Dato autem ad plures dies mane & ante somnum, & sanabitur affectio quantumuis sit diuturna, utere igitur neque eam contemnito. Porro ad diuturnos stomachi dolores ex frigiditate obortos cum sapae cyathis tribus, magnitudinem fabae dato ante somnum: si uero febricitent, cum aqua multa. Ad singultum uero ob repletionem aut frigiditatem datur fabae magnitudine ex aqua multa ante somnum. Ad hepatis obturationes fabae magnitudine cum condito. Ad duricies uero cum aqua multa. Ad splenicos ex aceto aut aceto mulso. Arquato infectis ex uino mulso, hydropicis ex aceto mulso aut uino mulso, illinito etiam cum antidoto tumefactas partes & tumorem ressecabit. Et lapide laborantibus datur cum sapa: ad urinae difficultatem cum apij decocto, aut petroselinij aut aliquo consimili. Ad profluuium uentris & coeliacis & dysenteriae maxime incipienti, nucis ponticae magnitudine dato, mane & ad somnum ex uino, in febricitantibus ex posca diluta confidenter utitor. Ad podagram fabae magnitudine

gnitudine præbeto cum aqua mulsa. Eliquatam etiã cū sapa affectis locis illinito. Et si quidẽ principiu fuerit affectionis, liberabitur ac euadet. Si uero diuturnũ fuerit malum magnopere iuuabitur. Ad coxendices affectos & reliquos articulos corporis fluxione infestatos, eam cum unguento aliquo, gleucino puta, aut irino, aut sicyonio eliquato, ac articulis illinito. Ad Elephantiasim in principio præsertim, imò & his qui iam malo oppressi sunt, nucis ponticæ magnitudine ex aqua mulsa bis per diem dato, eliquatam etiã cum uino toto corpori per nouem ex ordine dies in sole illinito, discedit enim paulatim à corpore cutis & ueluti squamulæ decidunt, & tota concretio & corporis miscella renouatur. Ad ægre parientes mulierculas ipsam per se ad inum uentrem illinito, & facile partus prodibit. Ad ulcera postremum maligna & diuturna in cutis superficie oborta, uestis detrita panniculo exceptam imposito.

Cap. CII

Antidotus pæonia.

Antidotus Pæonia uere pæonium pharmacum multo usu iudicatum & apud probatum. Amomi, scrup. xviij, croci scrupulos x l. radicis pæoniæ scrup. xii, seminis pæoniæ scrup. xii, pipëris albi scrup. ix, pipëris cõmunis scrup. xii, phylli scrup. ix, euphorbiæ scrup. ix, spicæ nardi unc. i, rhei pontici scrup. xii, costi scrup. xii, petroselinæ scrupulos x l. opij scrup. xv, seminis hyoscyami albi scrup. xii, alij scrupulos, xvij, habent, styracis primarij scrup. ix, myrrhæ troglodyticæ scrup. xii, casicæ unc. i, pyretri scrup. xii, thuris scrup. xvij, castorei scrup. vi, calaminthæ scrup. ix, mellis despumati quod satis est, itemq; uini. Opium, myrrham, thus, cum uino terito; styracem uero cū modico melle liquefactũ similiter probe terito, atq; eis unito; adiectisq; aridis tritis melle excipito ac utitor. Dantur ex ea siliquæ lxx. cum aqua calida ieiunis, frequenter etiã ante somnum prout res urget. Facit autem ad destillationes è capite, & tussis, purisq; reiectiones, tabidos, peripneumonicos, pleuriticos, præter opinionem enim thoracem extra periculum sistit, tum quod à destillationibus, tum quod ab ulcerationibus imminet, etiam si sanguinem reiecerint. Ad anginam uero uino mulso diluta utere assidue gargarissando, pinnulaq; etiã cū melle illini. Ad colicos aut & ex renum lapide affectos excellenter efficax existit. In exacerbationibus enim colicorum febre carētium exhibita euestigio dolores sedat. Si uero febri- ant remissiones febriles obseruato, atq; ita exhibeto, Frangit enim calculos, & ab urinæ difficultate liberat ea præsertim quæ ex crassis humoribus & propter obturationem est oborta. Infunditur etiã et maxime in ipsis colicis uehemētissimis urgentibus doloribus cum oleo rutaceo, & statim à periculo liberat. Longas aut febres maxime quotidianã & quartanã facile soluit duabus ante accessionem horis data. Quin & ægros ad reficienda corpora optime paratos fecit. Datur aut non in principio morborum, sed quũ perfecta concoctio apparuerit in urinis. Cæterum ad pestilentes & populariter grassantes morbos ex uitiatõ aëre obortos in corporibus summe auxiliatur, & in principio sanè data pestilentem prohibuit sæpe dispositionem. Præseruat etiã à dysenterijs & torminibus intestinorum. Inducit & somnos dolori minime obnoxios, neq; soporem ac stuporem infert, ueluti reliqua ad leuandos dolores apparsata, uerũ somnum tam diu detinet, quousq; pharmacum penetrarit, & causas dolorum dissoluerit. Et sanè multi ex ægris à somno surrexerunt adeo concoquendi facultate præstantes ut obliui sint an unquam aliquid à principio doluerint. Plura autem his & ultra promissa ei confidere potes. At uero si uisceris alicuius inflammatio adsit, cauere oportet ne exhibeamus eam priusquam inflammatio laxetur.

Pp 3

tur. Quod si tamen periculum maximum instet, id ipsum præfatus ac prætestatus dato, quo successuræ curationi per ipsam æger adseruetur, eaq̃ tandem uictoriam obtineat morbi.

Antidotus aromatica optima, Galli.

Cap. ciii

Facit ad omnes maxime tamen inueteratas circa os uentris, atq̃ ipsum adco uentrem affectiones, & ad hepaticos. Est stomacho uehementer grata & efflicax. Cinamomi drachmam unam, aut casia duplum, amomi dextantem, spice nardi trientem, folij trientem, myrrhæ troglodyticæ drachmam unam, casia belessem, croci unc. i. floris iunci odorati unc. i. costi unc. i. piperis sexuncem, mellis attici despumati quantum satis est. Ego autem inquit cinamomi modum conoduplico, meliorq̃ antidotus redditur. Datur nucis ponticæ magnitudine cum uino, aut uino mulso, aut etiam cum aqua mulsa si adsit febris.

Antidotus ex duobus piperis generibus.

Cap. ciiii

Antidotus ex duobus piperis generibus quemadmodum eam describit Archigenes, leuans dolorem, finiens febrem, reliccans & concoquens. Facit adcolicos. Hanc etiam Crito apparauit hoc modo. Croci drachmas sex, casia drachmas tres, cinamomi drachmas duas, costi drach. iiii, styracis drach. viii, piperis longi drach. iiii, piperis albi drachmas quatuor, galbani drach. iiii, myrrhæ drach. quatuor, quidam uero decem sumunt, opij drachmas, tres castorij drachmas v. Succulenta cum uino uetere terito, reliqua uero contundito & cribrato ac tritis adspergito, & mellis despumati quantum sufficit adijcito, unitoq̃ ac adseruato. Datur quibusdam magnitudine fabæ, alijs magnitudine erui. Colicis uero à cibobopræbeto cum uini austeri cyatho uno. In affectionibus autem circa hepar & uesicam ex passo dato. Tabidis & pectore suppuratis fluxioneq̃ infestatis ex aqua mulsa. Vtitor & ad quartanas & ad alios diuturnos & per circuitum repetentes rigores, duabus ante accessionem horis.

Antidotus Athanasia

Cap. cv

Athanasia ut nunc apparatur, est autem Aegyptiorum inuentum. Croci, spice nardi, folij malabathri, costi, foeni græci, glycyrrhizæ, radices eupatorii, petroselinii, styracis, casia, opij, singulorum æquales partes, mellis quod satis est. Datur ad summum nucis auellanae magnitudine, hepaticis quidem si non febriant cum uino mulso, febrientibus uero cum aqua mulsa, datur ad dies ex ordine septem. In angina cum melle delingendam dato, in affectionibus pulmonis & pleuritiscis cum aqua mulsa. Stomachicis, & qui non concoquunt cibum cum posca. In fluxionibus uero stomachi ac alui in catapotia informatam dato, quibus deglutititit aquam frigidam præbe bibendam. Ad exulceratam uesicam & uulua cum tepida aqua. In morbo arquato, hydrope, & rhenum morbo cū uino mulso exhibeto. Ad febres diuturnas per circuitum redeuntis summe auxiliatur ante accessionē accepta, his qui diuturna oculorū fluxione laborant ad noctē dato, & frontem ex ea illinito. Hemoptoicis & dysentericis ex posca ante somnum exhibeto.

Oribasij theriaca, qua Marcus Imperator usus est, quæ ante

& post infectionem sumitur.

Cap. cvi

Trifolij bitumen olentis seminis, rutæ syluestris, farinae erui rufi, aristolochia rotunda, æquales omnium partes in pastillos redige, & ex eis drachmam unam cum uino & oleo præbe. Alia confectio ualde bona. Farinae erui rufi, drach. xlviii, anisi, seminis foeniculi, ammi, seminis apij, singulorum drachm. viii, mei drachmas quatuor, seminis trifolij, opopanax, serpilli, cuiusque drachmas quatuor, cum uino redige in pastillos, & cum uino ter præbe bibendos. Oribasij

Oribasij theriaca ex Bryonia.

Cap. CVII

Theriaca ex bryonia ad uenenatorum animalium morsus et ueneni haustu, ad morsos à uipera & à scorpio percussos. Radicis bryoniae, opopanax, iridis, rosmarini, opij, myrrhae, singulorum drach. IIII, aristolochiae dra. V, thuris dra. VI, seminis rutae syluestris drach. VI, cumini drach. XVI. Alij tres tantum drach. habent, farinae erui drach. XVI: Alij IIII, habent, cum uino pastillos informatos, atque ter cum uino praebeto. Philonis antidotus ad colicos praescripta est. Isthos antidotus ad tussim relata est.

Antidotus Hadriani.

Cap. CVIII

Piperis drachm. XX, seminis hyoscyami albi drach. XX, opij drach. X, croci drach. V, spicae nardi, euphorbij, amomi, pyretri, cyperi, cardamomi, folij, rutae siccae, casiae, castorij, seminis dauci, myrrhae, petroselinij, cuiusq; drach. I, rosarum siccarum sesquidrach. I, seminis apij sesquidrachmam, zingiberis drach. II, opobalsami drach. II, mellis quantum satis est. Datur ad summum nucis ponticae magnitudine, minimum uero fabae Aegyptiae modo. Facit ad colicos ante somnū data ex aqua calida: Stomachicis & qui reuomunt cibū ex posca, in urinae stilli- cidio ex aqua calida, haemoptoicis ex posca, dysentericis eam in catapotia re- digito, & ab eorum deglutitione modicā poscam absorbendam praebeto. Tabi- dis ad noctem cum hydromelite dato, aride uero tussientibus cum melle delin- genda exhibeto. Morsis à phalangijs & uiperis cum uino mulso. Educt et men- ses cum uino mulso accepta in quo pulegium, aut calaminthe, aut ruta sint inco- cta. Colicis cum aqua mulsa datur.

Antidotus Acharistos, cui digna gratia referri non potest.

Cap. CIX

Casiae, myrrhae, piperis albi, piperis nigri, castorij, galbani, styracis, croci, co- sti, opij, spicae nardi, singulorū par pondus. Mellis quantū satis est. Datur magni- tudine fabae, facit ad omnia diuturni temporis purulenta in thorace, & ad hepa- ticos cum aqua mulsa, & ad colicos eodem modo, ad splenicos cum aceto mul- so. Reperias autem ipsam & ad alias plurimas affectiones approbatam.

Philagrij antidotus ex sulphure uiuo.

Cap. CX

Febrem finit, hac inquit Philagrijus, omnino utor ad diuturnos per circuitū repentes rigores. Sulphuris uiui, seminis hyoscyami albi, seminis cardamomi citra medullam, styracis, opij, myrrhae, cuiusq; dra. VIII, costi drach. X, rutae dra. X, croci drach. IIII, casiae dra. XI, piperis drach. XII. excipe melle attico despu- mato. Dato hora una ante impetum exacerbationis ex posca dilutiore calida, & post modicū interstitium dormire iubeto. Somnū enim inducit, atq; omnes diuturnos febriū insultus soluit. Verū non conuenit eam prius exhibere quā bona concoctio manifestissime ex urinis deprehendatur. Bene prospicere eti- am oportet, quo is qui accepturus est redundantibus excrementis non sit onu- stus, et maxime si febres quotidianae existant. Datur ad summum, quum adhuc in uigore est pharmacum. nucis ponticae magnitudine.

Cap. CXI

Theriaca Democratis.

Medetur haec morsibus animantium uirus iaculātium, uiperarum, cerastae, aspidum, naticum terrestrium plagis, & paruarum bestiarum puncturis itemq; uesparum. Et marinae turturis siue pastinacae ac draconis ictibus, phalangiorū itē & scorpionū. Apparāt hoc modo. Iridis illyricae, zingiberis, opopanax, o- pij, herberosmarini, myrrhae troglodyticae, seminis trifolij bitumē olētis, cuiusq; dra. VIII, aristolochiae dra. XI, seminis rutae syluestris dra. XII, radicis bryoniae aridae

arida albiſſimæ drac. xvi. ſerpilli, caſtorij, radicis eryngij, ſeminis apij, cumini æthiopici recentis, cuiuſq; dra. vi. Alij dra. xii. habent, farinæ erui ruſi, drach. xxiiii. Omnia hæc contundito & cribrato, opopanaca uero cū uino diſſoluito, eiſq; arida inſpergito & in paſtillos reducto, & ex eis dra. i. cum uino ueteri meraco bibendam præbeto. Statim enim ut potatur commoditatem ſuam oſtendit, facit ad colicæ aut uentris inflationes ex aqua ter potatum, facit & ad eos qui intrinſecus aliqua parte dolent, citra manifeſtam cauſam.

Antidotus theodoretos ex anacardijs.

Cap. cxii

Antidotus theodoretos, hoc eſt, diuinū munus, ad totum hominē utilis eſt, ſcit ad uertiginē & omnes capitæ affectiones, omniaq; peſtoris uitia emendat, maxime uero ſuſpirioſis, orthopnoicis, tabidis, pleuriticis, hepaticis, ſplenicis, et quib; exacerſcit in uentre cibis, & omnib; diuturnis circa ſtomachū & uentrem affectionibus prodeſt. His item qui ex longis morbis ſe ægre reficere poſſunt, & qui decolores ſunt, et quib; corpus in arquati colorē mutatur, et quibus aqua ſubter cutem effundi incipit, renum etiā affectionibus, & eis qui aſſiduo colicæ dolore affliguntur, auxiliatur: omnemq; habitū corporis corroborat. Quin & febribus inordinate ueteraſcentibus, atq; etiam per certū circuitū redeuntibus ante acceſſionem data prodeſt. Mirabiliter utilis eſt mulierculis, quæ purgationis menſtrug ſtillicidio ac ſtrāgulatu uexātur, & quæ ab utero ſuffocātur. Soluit etiam uentrem citra moleſtiam. Educt enim ea quæ iam longo tempore inteſtinis in hæſerunt, & ut ſemel dicam eſt diuinum donum. Huius enim uſu in omnibus ſenties ſucceſſum. Quod ſi quis uere & autumnō præſertim, ſemel aut bis ea utatur, neq; circa diætā magnopere delinquat, nullis morbis obnoxius fiet, non ſolum enim præſentes affectiones ſedat, ſed quas etiam futuras timeamus impedit. Habet autem hoc modo. Croci, caſiæ, phylli, ſpicæ nardi, mei, agarici, rhei pontici, ſloris iunci odorati, acori, epithymi, piperis, ſarxi phagi, iris illyricæ, cariophylli, carpobalfami, myrobalani interni, cuiuſque ſcrupulos ixx. anacardiorum, ſcrupulos x. aloës ſcrupulos xxxvi. mellis deſpumati lib. iiii. Datur ad ſummum drachmarum iiii. pondere ex aqua mulſa, aut uino, aut uino mulſo, ſecundum quod cuiq; affectioni commodum fore putas. Ceterum ſi ſcammonia ſcrupuloſi x. adſumpſerit, præter opinionem flauam bilem purgat. Si uero epithymi ſcrupuloſi x. acceperit & ſcammonia ſcrupulum dimidium, atram bilem expurgat. Id quod multo adhuc efficacius præſtat, ſi pro epithymo ueratri nigri corticis drachmam unam aſſumat. In pituitoliſis porro utiliter ad eius exhibitionem colocynthidis medulla tuſa & tenuiſſime cibrata ammiſcetur.

Theodoretos aliter appaſata.

Cap. cxiii

Aloës drachmas lx. & ſiliquas lx. agarici drachmas xxxiiii. croci drachmas vi. rhei pontici, drachmas vi. aſari drachmas iiii. coſti drachmas viii. acori drachmas vi. cinamomi drachmas vi. xylobalfami drachmas iiii. ſpicæ nardi drachmas iiii. caſiæ drachmas vi. mei drachm. ii. chamaedryos drachmas iiii. maſtiches drachmas vi. piperis albi drachmas iiii. mellis deſpumati quātum ſufficit. Dantur ex ea ad ſummum drachm. iiii. ad emolliendum uentrem. Quod ſi quotidie ea ut antidoto uti uelis in aliqua ex prædictis affectionibus, nucis ponticæ aut ampliori magnitudine præbebis. Quidam uero & piperis nigri, & albi, & longi, ſingulorum drachmas ii. addunt, item amomi, ſloris iunci odorati, zingiberis, cuiuſque drachmas duas, gentianæ in ſuper drachmas duas aliqui adijciunt.

Theo

Theodoretos per acetum mulsum appa-
parata.

Cap. CXIII

Facit hæc magis ad omnes capitæ affectiones, & deliria ex atra bile oborta, itemq; insaniã, facit stomachicis & colicis, hepaticis, atq; amplius adhuc splenicis & hydropicis. Habet compositio hoc modo: Spicæ nardi, folij, croci, mei, cassiæ, epithymi, floris iunci odorati, thei pontici, myrobalani, cariophylli, cuiusque drach. IIII, aloës sextantem, carpobalsami scrupulos xvi, zingiberis scrupulos xvi, mastiches scrupulos IIII, iridis trientem, anacardiorum, scrupulos IIII, agarici scrupulos VII, corticis radices fœniculi lib. i, acetum acerrimi sesquiseptarium, mellis sesquiseptarium. Corticem prælotum in aceto per triduum macerato, deinde ut dimidium relinquatur coquito, percolato, & ad acetum mel adijcito, rursusq; ad mellis spissitudinem coquito, atq; ubi tepuerit ad arida tenuissime trita in mortarium addito & diligenter unito, reponito ac utitor utitur in prioribus dictum est.

Picra siue amara per acetum mulsum appa-
rata, Oribasij.

Cap. CXV

Facit ad stomachicos, colicos, uulvæ strangulatus, hydropicos. Corticis radices fœniculi lib. III, acetum acerrimi lib. vi. Radices in aceto ad tertias coquito, & percolato aceto mellis libras IIII, adijcito, & ad mellis spissitudinem coquendo redigito, refrigerato, & paulatim ad subscripta tenuissime trita in mortarium addito. Sunt aut hæc, Aloës bessæ, iridis sextantem, mastiches unc. i, zingiberis, cassiæ, nardi celticæ, helenij, singulorum unc. i, piperis drach. IIII, mei unc. i, aut si nō adsit, nihil impedit. Datur cochlearij mensura cum aque mulse cyamidis IIII. (Est id poculi genus & Ægyptio uocabulo ciborium appellatur) Ab accensione etiam aquæ calidæ cyamosi i, absorbeant.

Cyphi ex rebus xxxvi.

Cap. CXVI

Thuris sexuncæ, styracis pinguis lib. i, myrrhæ trientem, folij quadrantem, costi trientem, amomi quadrantem, spicæ nardi quadrantem, cassiæ quadrantem, sabinæ, cardamomi, ammoniaci thymiamatis, iridis, carpobalsami, singulorum sextantem, nardi celticæ, helenij, hypni, floris iunci odorati, aspalathi, cuiusque unciam unam, mastiches, quadrantem, ladanum, quadrantem, baccarum iuniperi magnarum et parvarum, bdellij, singulorum sextantem, fœnelis unc. i, cyperi unc. i, croci trientem, seminis cupressi unc. i. Alij drach. i, habent, calami aromatici drach. IIII, rosas uirides numero quingentas, terebinthinæ depuratæ sesquunciam, caricarum pinguium sexuncem, palmarum pinguium quadrantem, carunculae uuarum passerum quadrantem, nucum pinearum quadrantem, succi hastulæ regiae unc. i, mellis sesquilibram, uini odorati quantum satis est. Arida contusa & cribrata cum liquida excipito, palmis, caricis, uvis passis prius in mortario tuis, deinde mastichen tritam eis addito, & bdellium ac pineas nuces rosasq; & thus unumquodq; per se tritum, postea etiam styracem adijcito, & ladanum per se mortario contusa, deinde terebinthinam & mel adfundito, & arida infarcito. Ego uero thus, bdellium, myrrham, & ladanum cum uino tero, atq; ita ad tusa in mortarium conijcio, & pastillis inde formatis utor. Facit ad capitæ dolorem fronti illitum cum aceto, similiter & ad oculorum lippitudinem cum uino. Ad hepatis et renium exulcerationes cum passo, ad obturationes eorundem cum uino mulso. Tussientibus, tabidis, orthopnoicis cum aqua mulsa. stomachicis, splenicis, ischiadicis cum aceto mulso. Ad tormina, lunaticos & morbum comitalem cum aqua calida. Datur drachmæ pondera.

Cyphi

Cyphi ex rebus xxviii.

Cap. cxvii

Aspalathi, bdellij, helenij, ladani, styracis, myrrhæ, cuiusque drachmas vii, baccarum iuniperi magnarum l. paruarum itidem l. succi hastulæ regiae, trientem, Sabinae, trientem, croci, sextantem, costi sextantem, cardamomi, quincuncem, cyperorum, quincuncem, seminis cupressi, quadrantem, nardi celtici, sextantem. Alij etiam casigabent sextantem, sphagni siue hypni quincuncem, aromi sextantem, spicae nardi sextantem, rosarum siccarum quadrantem, floris iunci odorati, sextantem, nucum pinearum, quadrantem, foliorum malabathri, quadrantem, caricarum lib. ii, uuarum passerum pinguium sextantem, terebinthinæ chiae lib. i. palmularum pinguium carunculae lib. i. mellis lib. v. vini, sextarios ii. Apparato & utitur ut dictum est. Etenim quæ ex huiusmodi rebus adparantur ad prædicta optime faciunt.

Masuaphij confectio.

Cap. cxviii

Croci quadrantem, styracis unc. xxx. ladani unc. xxxiii. galbani quadrantem, cariophylli sexuncem, rosarum siccarum unc. xii. fertulæ campanæ unc. xviii. hypni, canalicula id parua est ex arbore quæ damascenea dicitur, item quæ ea quæ Rhodacinea appellatur ex orta, bessæ, malabathri sexuncem, arnabæ unc. xii. costi, unguium aromaticorum, casia, zacathij, singulorum sexuncem, asari quadrantem, carpobalsami unc. xxxiii. pilularum cupressi, quadrantem, foliorum lauri quadrantem, chachula quod canchryon est unc. i. amomi unc. xii. spicae nardi, gummi, cuiusque sexuncem. Vini lib. vi. contere & ad formam quancunque uelis redigè.

Thymiamia siue suffimentum Berenices.

Cap. cxix

Seminis uitis, melanthij, cornu cerui, samfuci, baccarum lauri, ablinthij, salphuris uiui, bituminis Iudaici, saluiae, radices cyclamini, artemisiae, origani, ruta syluestris, cumini, castorei, lapidis gagatae, anisi, conyzae, rosmarini, buccinorum ulstorum, resinae, singulorum unciam unam, cedri sextantem, picis zacynthiae pinguis lib. i. Quidam etiam radices pæoniæ unc. i. sed nos eam non admittimus. Omnia contusa & cribrata, cedria, resina, ac pice excipito, in passillosque redigito ac utitor. Facit ad anginam potatium & suffitum, ita ut hiantem ore eger uaporem hauriat. Ad omnem uero uigiliarum speciem uino liquefactum fronti illinito atque ipsi forinsecus naso: quin & intrinsecus nares sublinito, & super prunas proiectum suffito, & somnium ægro conciliabit. Facit & ad ozenas fordidum & foetidum narium ulcus, ipsis naribus ex eo illitis cum aceto. Fugat animalia uenenata muscasque & culices suffitum. Et ut quidam tradunt etiam immundus spiritus arcer. Porro de pharmacis dolorem leuantibus scriptum est in præcedentibus quaternionibus, Sermonis noni Cap. xxxii. & octauo Cap. l. v.

De Elephantiasi, Ex lib. Archigenis.

Cap. cxx

Elephantiasis à quibusdam leontiasis, ab alijs satyriasis appellatur. Elephantiasis quidem à magnitudine & diuturnitate affectionis nomen accepit, imò et propter cutis asperitatem quæ in quibusdam succedere consuevit. Leontiasis autem appellatur quia frons egrorum cum quodam tumore laxior redditur, ad similitudinem pellis flexilis superciliorum leonis. Satyriasis uero dicitur propterea quod mala faciei ipsæ cum rubore attolluntur, et musculis maxillaribus ueluti conuulsionem patientibus, mentum ipsum dilatatur, quemadmodum etiam in alacritas uehemens ad coitum ipsis adest, quemadmodum & de satyris ferunt. Est autem grauis morbus & prope ex eorum numero qui incurabiles existunt, & grauis

& grauis quidem est ipsi agro, intolerabilis autem conspicientibus, utpote qui ipsum omnino auersantur, adeo ut & plerique ex necessarijs & domesticis agri ipsius conuersationem deuient. Etenim suspicionem de se præbet malum tantum sit contagiosum. Atque ego sanè malum esse affirmo cum ipsis conuersari: inquinatur enim aer quem inspirando adtrahimus ex ulcerum foetore, & ex uiciata spiritus exhalatione. Caterum affectio ipsa non solum ob id grauis est, quod indissolubilem ferè habeat structuram & apparatus, sed quod principia generationis eius ferè sint ignota, quum enim circa superficiem iam uestigia eius apparent, tunc non gignitur, sed perficitur, intus à uisceribus initio factio, & progressu usque ad cutem dilatato: quare non absimile est, tumentes eminentias etiam in internis oboriri. Apprehenduntur autem hac affectione uiri magis quam fœminæ, atque inter illos magis qui crassum et uiscosum ac atra bile redundantē sanguinem habent, & qui pituitam multam fœsam aut acidam gignunt. Amplius uero & qui uictu crasso & agre concoctili utuntur, & qui in otio degunt. Non minus uero his & qui multis exercitijs inordinate utuntur, & per hoc sanguinē inspissant. Itaque hi qui cibos assidue in uentre corrumpunt, quod uero ad ætatem attinet, pueri & iuuenes, maxime quo tempore pubescere incipiunt. Regio uero huius mali inductrix est tum quæ ualde calida est, tum quæ uehementer frigida est. Et altera quidem ob id quod sanguinem adhaeret: Altera quod frigore suo eundem congelet, & perspirationes prohibeat, ac insitum calorem suffocet. Consequitur eos qui obnoxij futuri sunt malo, fœgnities, spiratio tarda, spirandi difficultas, motus difficilis, assidua constrictio alui, urinarum ueluti sunt iumentorum lotia excretio, respiratio grauis & fœtida, ructus continui, qui etiam ipsis agris aliquid molestiæ addunt, appetitus non obtuli quidem neque inflammati, impetus in uenerem intensus. Jam uero ubi ad cutem progressum fuerit malum, malæ primum crassiores fiunt & mentum, deinde rubescunt, non florido sed liuido rubore. Et sub lingua uenulæ uaricosæ fiunt ac nigrescunt: quod signum est etiam uiscera ipsa in simili constitutione esse, eiusmodi plane qualis in porcis quibusdam circa interna uidetur, quæ Gran dinis nomine insignitur. Quandoque uero & per omne corpus eminentiæ apparent, & præsertim iuxta summam frontem ac mentum. Corpus præterea ipsum magnum esse uidetur, & cuiusdā intolerabilis grauitatis sensus eis adest, unde neque potu neque cibo admodum suauiter delectantur. Pusillanimes fiunt ad omnia, neque præ uitæ amore uitam relinquere & contemnere possunt, neque affectionem ipsam generoso animo perferre. Verū ueluti seipsos condemnantes se occultant, & notos homines uitant. Quidam porro ex eis, ad modum eorum qui suffocantur aut strangulantur, maxime circa somnos afficiuntur. Quæ admodum igitur perfecte à malo eiusque diuturnitate uictis frustra manum ad mouemus. Ita et abstinere ab his qui iam affectione corripiti et tentari uidentur, planè desperantium hominum est & malignorum. Humanum enim & plenū beneuolentiæ signum est, in extremis etiam malis usque ad experimentum, procedere ad difficultatem affectionis compescendam.

Cap. cxxi

Cura Elephantiasi affectorum.

Quum igitur quædam ex prædictis signa affectionis apparuerint, citra dilationem sanguis auferatur particulatim ex utroque cubito. Reuiuiscit enim inde aliquo modo insitus calor, ut sensibilibus corpus ipsum alleuetur. Habendus tamen est modus in euacuando. In multo enim inutili & uiciato sanguine parū quiddam genuini sanguinis inest. Post sanguinis autem detractionem paucis diebus

Uiri magis quam fœminæ

regio uero huius mali inductrix est tum quæ ualde calida est, tum quæ uehementer frigida est

Ne sanguis deiectione uiciatus sit

*pulvis colocynthidis
quar. libras. 9. dr.
Pondus. 9. dr.
libras. 9. dr.*

*non videtur
lectus*

*deum. 9. dr.
Nostis. 9. dr.*

diebus interpositis alius inferne subducatur. & primum quidem colocynthidis pulve utendum est, ex qua catapotia XVIII. nucum ponticarum magnitudine exhibeantur. Eius autem apparatus praedictus est in coxendicum morbi tractatu. Sequenti deinde die XII. catapotia praebantur. Si vero ea accipere reculant, per hieram nostram purgato. Mirabiliter autem eis conducit per mensem semel data. Post dies autem aliquot sero lactis scissi utendum, ex eoq; non minus tribus heminis, neq; ultra quinq; accipiendum. Sit autem lac asininum si haberi potest, ex quo serum ipsum sumitur. Ammiscendum est etiam ipsi ueratrū nigri trium obolorum pondere, & scamoniae scrupulus i. ita ut haec ipsa cum modico sero ieiunis praebamus, atq; deinde ipsum serum paulatim per se exhibeamus. Hac enim purgatione frequenter utendum esse cenfeo. Omnino namq; conandum est ut omnem corporis miscellam ab affectu occupatam liquefaciamus, aliamq; quandam ueluti ex integro regeneremus. Id ipsum uero fiet si per interualla oportune purgationes adhibeantur, & cibi apponantur qui facile concoquantur, & per corpus distribui possint. Post quorum acceptionem uomitus a cibo fiant, deinde etiam a raphanis a ieiunis, postea ad ueratrū perueniendum: ac primum quidem decoctum ueratri exhibendum est, deinde & bulbos ipsius contusos, & ad finem uirgas optimas ex eo praebemus. Id uero quomodo fieri debeat, iam antea diligentissime traditum est in tertio huius tractationis sermone. Post haec autem uirum refocillatrice dieta utendum est. Ad os uentris utrinq; ad uiscera cucurbita inanis affigatur. Et primo quidē circuitu auxilium hoc modo perfectum, rursus ad principium reflectendum est. Et uenae quidē sectio utitur: ab hiera uero principium purgandi sumatur, & reliqua consequenter facienda uelut praedictum est, ter & quater in anno eodē ductu repetito. Maligna enim & difficulter cedens affectio est, quapropter plurima cura opus est ne in peius euadat.

De his qui castrantur.

Cap. CXVII

Nouimus quosdam audaciores qui sibi ipsos testes ferro ressecarunt: castratis enim non in peius malum ipsum procedet. Neq; enim temere reperias, inquit Archigenes, ullum aliquem castratum elephantiasī laborantem, neq; item facile mulierem: Quare etiam quidam ex confidentioribus Medicis manum admovent, & quotquot sanē ex eis ex sectione periculum euaserunt, per consequens curationis usum perfecte ab hac maligna affectione liberati sunt. Noui etiam quendam qui ualde correptus esse existimabatur, a tali quopiam pharmaco curatum. Aceti optimi & cedriae, singulorum cyamum i. succi brassicae cyamum i. commisceto & ieiunis mane praebeto, deinde ad uesperam ordeaceum panem modicum exhibeto cum quopiam uolucrum leuiorum, & per solum hoc maximum curationis sperato successum. Vtere autem ipso per annum, semel in hebdomade ex eo praebens, quandoq; tamen bis, quanquam ad usum eius aduersus factis etiam rigidius procedendum sit, nimirum ad duplam pharmaci mensuram. Quum uero & ad comitalem morbum praclare faciat, eo sanē & ad ipsum uirum & pra omnibus alijs eius profectum laudo. Facit & brassicae decoctum quotidie potatum quum ex cedria pharmacum non datur. Multi etiam sideritim herbam laudant: datur autem foliorum eius aridorum drach. i. ex uino austero. Nout & trifolium herbam bitumen olentē probe huc facientem. Datur autē & ipsa drachmaz pondere trita ex uini cyatho uno, acetī uno, mellis una, Eboris etiā & cornu ceruini ramēta cochlearij mensura saepe ad praedictā mensuram ammiscuntur. nā et per se ipsum unumquodq; eorum potatū utilissimum existit. In regione Indorum elephantiasis affectos assidue per sedem eluere per urinā asininae infusionem be-

minæ mensura calefactæ consueuerunt. Crocodilum item terrestrem accipiūt eiusq; extremas partes amputant, ac interiora proieciunt. deinde fermento obvolutum assant. deinde ablato fermento, & scabricie eius derafa, carnis ipsius drach. i. quotidie bibendum præbent, & magnum sanè testimonium de hoc reamedio præbent. Præclare aut succus cyrenaicus facit, erui magnitudine deuoratus, simul enim ut acceptus est per omne corpus diffusus uehitur. Aselli item sub aquario uase stabulantes, qui & millepedæ appellantur quinque aut sex numero cum hydromelitis cyamis iiii, triti potati præter opinionē tum his, tum spiriosis, et omnibus suffocatione apprehensis auxiliantur. Multæ comoditatis est & scillæ semen trium obolorum pondere in cyatho mellis semicocti delinctum. Asperam enim arteriam à pituita repurgat, et coarctationem uiarum uocis probe dilatat. Similiter autem & pastillorum scilliticorum, qui in theriaces confectionem coniunguntur drachma una, exhibetur cum uino austero mera co trita. Ex calida autem datur. Theriaca porro ex uiperis Andromachi compendium totius medicationis existit, si post purgationes per modica intervalla præbeatur.

De uiperarum esu, & de pruritibus. Archigenis Cap. cxxiii

Mirabile elephantiasis remedium uiperarum esus existit, eas uero hoc modo apparatus edere oportet, primum quidem amputato capite & cauda, & detracta pelle, exemptisq; interioribus uisceribus omnibus caro aqua pura bis acetrola, in olla instar anguillarum coquitur, aqua quidem sufficiente affusa, et oleo modico cum anetho & porro. post sufficientem deinde cocturam, iusculum moderato sale condidatur, atq; ita agro in sole desidenti exhibeatur, capite tamen probe uelato. Neq; uero semel tantum aut bis uiperas edere satis est, sed sæpe id fiat, quum extra periculum sit, & insuper commoditatem afferat. Sint autem uiperæ recens captae, & ex humectioribus locis accipiantur. Nam quæ iuxta mare degunt, uehementer siticulosæ existunt. Utimur & ad ipsos salibus theriacis eos quotidie pro liquamentis ad intinctus exhibentes una cum obsoijs. Suntq; tum sapore, tum odore gratissimi. Quin & ex betonica antidotus ad podagricos præscripta utiliter purgans, etiā his commodè exhibetur. Et ut in uniuersum dicam propter incidentes ipsis suffocationes, etiam ea quæ orthopnoicis præbentur, his utilia sunt, utpote quæ crassos humores non modo in thorace, sed & in toto corpore contentos secant & diducunt. At uero ob id quod ferinus est humor, ea quæ lumbricos enecant & expellunt etiam his dan da sunt. Forinsecus porro cuti psilothrum assidue per modica interualla in balneo adhibendum est, oculis probe cōmunitis ne quid ex psilothro in ipsos dilapsum eos laedat. Commode item facies ipsa ex eo illinitur, utpote quæ maxime ab affectione sit correpta, multo etiam tempore in eius usu perseverandum est, donec cutis ipsa rubefiat, nō tamen exulceretur. Quapropter ex psisanæ succo psilothrum apparetur. Ursinus autem maxime aut uulpinus adeps, uel si hi haberi non possint, taurinus cum sarmentitio cinere emollitus, & cum lixiui coctus probe attenuat eminentes tumores, hoc enim modo etiam sapo præparatur, quem in usum conuertere oportet si ursinus aut uulpinus adeps non adsit. Bona est & portulaca cum aceto trita, et semperuium minus quod Rhomani illecebram uocant, & Mercurialis decoctum tum per se, tum cum aridis quibusdam mixtum, & fici syluestris folia arida contusa & cribrata cum aceto illita, & in balneo affricata. Optime facit & decoctum ipsorum, & betæ & ocymo cum aceto tritis aut coctis dignam laudem tribues, si per eorum attritum fueris deterfus.

Qq

deterfus. Myrobalanus item cum aceto praestat: probe auxiliatur & alumen cum sale, & sandaracha æquis partibus in uino & oleo maxime lentiscino, aut si non adsit, rosaceo tritis. Aridum quoque inspergimen ad alphos siue vitiliginem à nobis compositum liberaliter extergit & repurgat. Est autem hoc. Alcyonium, nitrum, sulphur uiuum, myrti folia, & fici agrestis folia sicca, singula pari mensura contundito & cribrato, deinde cum aceto trita oblinito, & in balneo affricato. Conuenit & alcyonium assatum cum aceto tritum & affricatum: testæ item ostreorum omnium usta & cum pari melle ac modico aceto trita. Et acetum si sece arida usta, cum sulphure trita in exudatorio loco commode uteris. Amygdalino autem oleo inungito, atque hoc modo corpus forinsecus illinito.

Oribasij sinegma ad elephantiasin. Pumicis, testæ sepiae, nitri assati, galilae, cimoliae, cuiusque sextantem, gummi unciam unam, arida affrica. Aliud optimum sinegma. Nitri assati, pumicis usti, testæ sepiae usta, gallæ, cimoliae, cuiusque sextantem, gummi unciam unam, arido utere in balneo aut lauacro & aqua marina ablue. Aliud efficax. Spumæ nitri albæ drachmas xx, cimoliae drachmas xii, melanthij drachmas ii, radices bryoniae drachmas ii, alcyonij drachmas vi, sulphuris uiui drachmas iiii, radices chamaeleonis albi siccae drachmas iiii, trita in balneo inspergito & affricato. Aliud sinegma.

Ad omnem corporis pruritus et humoris atræ bilis fluxionem celebre. Verratri albi unc. i, uerratri nigri unciam unam, baccarum lauri sextantem, cerusæ, pumicis usti, testarum sepiae ustarum, pompholygis, rutæ uiridis, singulorum trientem, sulphuris uiui besslem, spumæ nitri albæ besslem, mellis besslem, aloës quæ in uentriculis afferri solet, besslem, aceti quantum satis est. Vtere in balneo.

Remedium ad psoras. Archigenis. Magni nominis est & ad elephantiasin laborantes, id quod ad psoram feram à nobis priuatim est apparatus. Id ipsum hoc modo habet: Rumicis satiui, & rumicum acutorum radicum, fasciculatos manipulares duos in aceto coquito, deinde in mortario tulsis, singulorum am in pila tritis, acetum paulatim instillato id ipsum in quo decoctæ sunt radices aut etiam aliud, atque deinde hæc ipsis infarcito. Nitri drachmas xlviii, sulphuris uiui drachmas xxv, thuris drachmas xv. Omnia ad strigimentum crassiciem reducta unito, ac æstate quidem ad solem sæpe illinito, hyeme uero in balneo donec exudarint. Apparatur autem à nobis pharmacum ad elephantiasin summe congruum, huiusmodi. Rumicis satiui & rumicis acuti radices fasciculos manipulares duos in aceto coquito, tundito, ac terito, ut prædictum est. Deinde hæc quam tenuissime trita eis infarcito. Alcyonij, lib. i, sulphuris uiui lib. i, spumæ nitri, besslem, testarum cochlearum ustarum trientem, radices chamaeleonis nigri sextantem, Omnia simul conteruntur, donec ad strigimentum spissitudinem redigantur: & illinuntur æstate quidem ad solem sæpe, hyeme uero in balneo, donec exudent.

Illitiones ad tumentes corporis eminentias.

Illinantur autem tumores in cute efferati & inflammati ex glaucij succo, aut polij, aut lycij, aut hypocisthidis, aut aloës, & similibus succis. Aut halicæ uel erui farina cum plantaginis, aut polygoni, aut perdicij, aut portulacæ, aut brassicæ succo diluta. Quod si cataplasmatibus opus habeant loci inflammati, cum halica cruda polygoni, aut plantaginis, aut marrubij succo ammixto, contegantur. Postquam uero inflammationes mitigatæ & laxatæ remiserint, herba serapiadis tritesticularis uiridis folia tenera aut semina probe terito, et agnâ ad

ad solem calidum locatum ad horas II. defricato, atq; ubi prodierit sudor uinū meracum uetus odoratum bibendum præbeto, rursusq; herbā ipsam affricato. Deinde ipsum in aqua marina abluo, & hoc quotidie per dies aliquot facito, & reperiēs ad sanitatem cōsequendā successum. Optima est & hæc illitio Cri-
tonis. Ad tumentes eminentias, & ad faciei pruritus, ac principium elephan-
tias, Gummi albi, spumæ nitri, thuris, sulphuris uiui, singulorum par pondus
in aceto dissoluito, et ex probe penitus contritis pastillos formato, eosq; in um-
bra resiccato. Vfus uero tempore postulante aceto dilutos illinito. Vbi autem
exaruerint subscripta confectione defricato. Est autem hæc. Saponis libram
unam, ammoniaci thymiamatis libram unam, thuris, quadrantem, spumæ
nitri albæ quadrantem, mastiches quadrantem. Ammoniacum cum aqua
prius tritum, & sapone ei adiecto, in figulino uase coquito, duobus sexta-
rijs aquæ affusis, atq; ubi dissolutus fuerit, thus, mastichen, spumam ni-
tri, unumquodq; per se tenuissime tritum & unitum adijcito. Deinde in mor-
tarium translata & diligenter tusa in uitreum uas reponito ac utitor. Optime fa-
ciunt & hæc ad tumores non inflammatos illita. Ammoniacum thymiana ex
aceto, aut marrubij succus & thus eodē modo, & uerbenaca recta, & fel capre
aut hirci, & flos æris cum melle, & caninum stercus cum aqua, & aloë cum thu-
re ex aceto mulso potata & illita. Vtiliter illinitur & dictamni succus melle co-
cto & cedria permixtus, & sulphur uiuum cum liquida pice, aut sesamum, aut
amygdalæ amaræ, aut chamaeleonis nigri radix similiter cum liquida pice, &
alecyonium cum cedria. Efficacissima uero est cedria cum phocæ adipe aut eti-
am ursino illita, ita ut simul eliquatis sulphur uiuum infarciatur. Valde efficax
& hoc est. Si alumen liquidum linteolo illigatum, & ustum, deinde cum aceto
acerrimo & brassicæ, aut ocymi succo tritum, illiniri præceperis. Aliud.

Thuris, aluminis scissi, cuiusq; sextantem, sulphuris uiui, ramentorum plum-
bi, cuiusq; quantum satis est, unito & leuiter illinito, eminentijs ex pumice præ-
fricatis. Aliud. Ammoniacum thymiana, & sulphur uiuum, & columbæ
stercus, & uitrum tenuissime tritum, in aqua, aut uino, aut aceto terito, & prout
commodum aestimaueris illinito. Aliud ualde efficax. Cedriæ, sesquili-
bram, acetil lib. II. foliorum cupressi lib. I. folia tusa ad biduum in aceto macera-
to, deinde excolato aceto, cyparissum probe terito, eiq; cedriam adijcito ac
unito, & cum uulturis pennis agro in sole locato illinito. Aliud. Efficacissima est & hæc illitio. Auripigmenti drachmas VI. thuris drachmas VIII, co-
lli drachmas. II. calcis drachmas IIII, baccarum lauri sextantem, cedriæ drach-
mas IIII. Omnia teruntur, & cum foliorum populi albæ arboris decocto in co-
quendo inspissato illinuntur. Aliud ad faciei eminentes tumores præcipue
conducens. Mastiches unc. I. myrt hæ drach. IIII. sulphuris uiui dra. IIII. olei
omphacini quantum sufficit, utere. Mirabiliter autem prodest ad faciei tumen-
tes eminentias, ex Milesia herba remedium. Tunduntur autem folia herbæ ui-
ridia cum axungia ueteri et imponuntur. Et rubescunt sanè inde plurimum par-
tes quibus imposita sunt: contrahuntur autem facile pane imposito, aut cerato
ex oleo amygdalino, rursusq; in naturalem suum colorem restituuntur. Post-
quam uero ex æquata fuerint eminentiæ illitionem talem parato. Thuris unc.
I. gummi albi unc. I. cimolix trientem. Vino ueteri aut aceto trita illini. Em-
plastrum quod & ipsum ad maiores & liuentes eminentias facit, inquit Archi-
genes. Terebinthinæ drach. X. radices aristolochiæ drach. IIII. radices cappa-
ris, ueratri albi, sulphuris uiui, lapidis pyritæ, cuiusq; drach. II. thuris dra. I. tere-
binthi-

binthinam liquefacito, & ab igne ablata reliqua tenuissime trita infarcito. Op-
time facit et Andronis pastillus et Musę pastillus similiter illitus uterq; Maiores
porro tumores etiam emplastro aliquo discussorio cōtegatur: efficaciter eis au-
xilias emplastrū ex asellis ad meliceridas ulcera mellei humoris et strumas de-
scriptum. Magis proprie autem hoc conuenit. Olei cicini lib. i. spumę argenti
drach. c. picis crudę heminam i. ad lentū ignem assidue agitando coquito: atq;
ubi coacta fuerint, ab igne ablatis chamæleonis nigri radicem tenuissime tri-
tam drach. x. pondere inspergito, & ex tithymalli succo parum. Aliud. Ce-
ram & uiscum cum modico myrteo oleo liquefacito, & diphrygis triti quod fa-
tis est inspergito, ac utitor. Aliud. Radicis panacis drach. iiii. nitrī drach.
v. calcis drach. i. cerę dra. ii. adipis ursini sextantem. Liquefacta aridis assundi-
to, & misceto. Ceterū nigras eminentias, aut ualde liuidas, cum scalpello le-
uibus uulnusculis impactis incidito, deinde splenio cruentis uulneribus desti-
nato, & quod inflammationem arcere potest, integito, eius generis est empla-
strum Barbarum appellatū, aut salem tenuissime tritum oleo subactum, et lanis
succidis exceptum imposito, & postea radicem maluę teneram cataplasmatas
uice adhibeto, aut cerato ex diphryge cicatricem inducente utitor. Auiden-
dum autem in fortioribus corporibus, præsertim ubi prius corpori robur addi-
deris, etiam ex coriatorium ad impetiginem feram descriptum illinere, citra ta-
men cantharidum ammixtionem apparatus, quod ubi factum fuerit, & bulle
eruperint, eas uiridi Epigoni emplastro, quod Iliis à quibusdam appellatur, inte-
gito, & per balneas curato: & tunc lac potandum præbeto. Vlceraiones autē
obortas, cerato ex diphryge cicatricē obducente, aut melino cerato ex uino ap-
parato, sanabis. Facit idem & ex pompholige ceratū, & quod ex cadmia appa-
ratur appellatur. Quod si curationem difficulter accipiant, uelut chironia ulce-
ra tractato. Si uero pascendo proserpant ulcera, corace pastillo ex aceto multo
apparato utitor, aut pastillo Andronis. Aliud, ad utiliginem quę leuce dici-
tur, & ad psoras. Calx in uino aut rosaceo fermentata cum aqua illinitur, &
post hoc ceratum rosaceum adhibetur. Aliud celebre ad elephātiāsim. Ara-
mēti futorij partes iiii. aluminis scissi madefacti partes vi. luto fusco subigito, et
ægro nudato ac præfotato, corpus eius illinito, deinde lauato, ac rursus eodē mo-
do foueto, illinito, ac abluito, qđ ubi ter feceris cutē rosaceo intūgito, ægrūq; per
totā noctē cōtegito, et reperiēs sanū. Aliud, ad elephātiāsi affectos, carcinoma-
ta, podagrā, articulārē morbū, strumas, condylomata, & cōuulsiones neruorū.
Vulturis cerebrū unā cū capitis ossiculis & reliquis carnib. capitis accipito,
et in uino dulci coquito, atq; excolata quidē illa profigito: cum iusculo uero ip-
so, euphorbij, croci, attramenti indici, piperis albi, castorij, myrrhæ, cuiusq; sex-
tantem coquito, & foliorum rubi, seminis satyrj, cuiusq; quadrantē, picis qua-
drantem, succi mandragorę, cedrię, cuiusq; unc. i. fel tauri, aut capre integrum,
uermes ex lignis putrescentibus & marcidis numero tres, addito. Hęc sanē o-
mnia in uini dulcis sextarijs nouem simul coquito. Hoc iuramento adstrictus
accepi, ne cuiuspiam reuelarem. Hic apparatus ad illitionem in nouem dies suffi-
cit, & eminentias ipsas exterit. Ceterum cum penna vulturis etiam illinatur.
Aliud, ad elephātiāsim, abscessus, condylomata, strumas, eminentias cor-
poris, tubercula, pingue quiddam in se collectum habentia Græcis inde
steatomata appellata, unguium abscessus paronychias uocatos, & gutturis tu-
mores qui bronchocelę appellantur: ad omnes item malignas eminentias qua-
cunque corporis parte, multo experimento cognitum. Vultur em uinum acci-
pito,

capito, eumq; in uini dulcis aut sapæ sextarijs nouem aut sex suffocato: aut uul-
turinum gallum eodem modo tractato, & à uespere usq; ad matutinum tēpus
ad uitis ligna coquito. Cæterum ægrum tenui uictu connutrito, sæpe etiam ine-
diam perferre iubeto, & per subscriptum purgatiuum medicamentum purga-
to, perq; dies septem ex marina aqua lauato. Postquàm uero uultur coctus fue-
rit ac excolatus, ossa ipsius contrita cum ægri sudore, præsertim qui à sole pro-
lectus est, cani edenda proijcito: massas uero septem inde formatas cani dato.
Vulturem autem ipsam per triduum à uespere usq; ad matutinum tempus, ne
ab aurora conspiciatur, coquito, atq; id similiter tertia die facito, probeq; conte-
ctum omni die mane in domo tenebricosa reponito. Atq; ubi tandem ita per-
coctum ac excolatum habueris, ad iusculum in nocte, minime uero in die; se-
quentia addito. Salis fossilis alge siue fuci marini, in petris condensati trientem,
alij unc. i. habent, galbani, opopanacis, cuiusq; sextantem, colophonie, picis, cu-
iusq; quadrantem, euphorbij, castorij, sanguinis capræ, cuiusq; trientem, am-
moniaci thymiamatis, myrrhe, glutinis aceto dissoluti, picis liquidæ, singulorū
sex uncem, rutæ syluestris ramulos septem, catanancæ herbæ scrupulos tres, ami-
anti scrupulum unum, polypathij herbæ quæ per contrariam affectionem luna
desinente auxiliatur, lapidis gagatæ, cedriæ, singulorum quadrantem, bitumi-
nis iudaici sextarium unū, artemisiæ herbæ, chamæleonis herbæ, cuiusq; sex tã-
tem. Hæc omnia cum iusculo ut dictum est apparato, probe trita committito et
unito. Cæterum uulturem primum unā cum pennis usq; ad pedes excoriato,
atq; ita in sapam coniectum suffocato. Pellem autem ipsam cum pennis myr-
tha conditam, & in fumum suspensam exsiccari finito. Pedes uero in oleo co-
quito, & cum oleo podagricos, per uulturis etiam pennam, illinito. Nervos ue-
ro ad pedes podagrici pro amuleto appendito, et ab affectione eū liberabis. Por-
ro purgatiuum cuius mentionem feci hocce est. Aloës uncia dimidium, gari,
aceri, parem mensuram unito, & octauam sextarij partem bibendam præbeto.
Ad condylomata in facie elephantiali affectorum. Thus cum uino auste-
ro tritum pinnullis illinito. Illitio alia optima ad elephantiali laborantes: facit
& ad pruritū. Gummi, gallarum, singulorum drach. decem, pumicis drach-
mas uiginti: contundito & cribrato, ac utitor ut optimo. Aliud, etiam ad le-
pram. Veratri nigri, gummi, cuiusq; quadrantem, spumæ prisanæ quantum
sufficit: conijce in ollam, & coque donec succulenta fiant, ac tritis utere.

Diæta elephantiali correptorum.

Cap. cxxv

Diæta elephantiorum talis sit. A somno membra eorum plurimum & le-
niter manibus contrectentur, deinde alius consueta recrementa deponat, &
post hæc ipse æger sub diuo aut in porticu deambulet, mollibus calciamentis
subligatis, conficiatq; deambulando usq; ad stadia triginta. Deinde cataplasma
ei imponatur primum ex pane, aut faba cocta, aut ptisana, aut aliquo consimi-
li illinatur, uerum ad unumquodq; prædictorū citrij acidi succus ammisceatur
si haberi possit, aut si desit, peponum aqua, & post modicum interstitium aqua
pura large abluatur. Postea cerato rosaceo liquidiore facies superne leuiter illi-
natur. Deinde ubi gestationis genere aliquo fuerit uectus, rursus deambulet
concitator gressu. Postea uero potione aliqua ex prædictis accepta, quotidia-
no alicui & consueto muneri uacet. Circa quartam autem horam concitatio-
re gymnasio exerceatur, & deterfo sudore, ursino aut uulpino adipe illinatur,
qui si non adsint, caprinus aut taurinus, aut equinus, aut aliquis ex uolucrum
genere, aut butyrum recens sumatur. Deinde cum foenigraci aut ptisanæ suc-

Qq 3 60,

co, qui parū ammoniaci cum aceto liquefacti ammixtum habent, perfundatur, atque ita lauacro quodam præscripto utatur. Nocuum est enim affectioni si quis non lauet. Per intervalla autem psilothro, ut dictū est, defricetur, & quodam ex prædictis smegmate quotidie expurgetur. Commoda sunt etiam in maris fomenta, & post sufficientem ex dictorum usu exudationem, natationes in mari, aut in sulphurentis & aluminosis aquis, non extreme frigidis, quales sunt aquæ Albulæ in Italia vocatæ. Quod si tales non adsint, frigida lauacro assidue utatur, raroq; balneum petat, nisi psilothri gratia, aut altera aliqua urgente necessitate cogatur. Si uero quis ad frigida lauacrum cunctantior sit, eum in balnei aëre plurima aqua frigida perfundi commodius erit. Præstat item solum ex decocto aliquo eorū quæ adstringunt apparare, plantaginis præsertim, aut rumicis, aut perdicij, quanquā efficacius omnino cēscatur betæ decoctū, cui sanè & ex aceto parum est affundendum. Extergatur etiam ueluti prædictum est, in balneis cum quopiam prædictorum smegmatum, & cum myrobalaano assidue ex aceto. Quibus deinde ablutis, ad acrimoniæ & mordacitatis curationem ex oleo lentiscino cum aceto & uino austero conquassato, aut ex oleo myrteo & pari uino conquassatis illinatur. Licet etiam aliquando parum ammoniaci, aut alumen rotundum in uino cōterere. Optimum est & butyrum recens illitum. Post lotionem & extersionem per tenera linteola, ad horæ dimidium quiescat deinde aqua tepida hausta sponte uomat, aut si id facere nequeat, per immisionem digitorum. Postea modico intervallo temporis interposito, uinum absinthites aut origanites bibat, non infra hemine mensuram, & paulo post cibis ei apponatur. A uino in posterum omnino abstineat, passioq; & uino mulso, ab omniq; cibo difficulter concoctili, & maxime a frigida potu. Cæterum cibi tempore purgationum qui facile secerni queant, sumantur. Panis hordeaceus aut triticeus recens calidus. Ex oleribus betæ, & porrum capitatum duabus aquis edulcatum: lactucaq; & capparibus ex aceto mulso. Ex mari uero herbarum recentibus, ostrea, pelorides, pectunculi, tellinæ cum betæ coctæ, & uisamentum uetus ex aceto mulso. Vbi uero post purgationes refocillare, & uires restaurare uelimus, acris auferenda sunt, præter condimenta, quorum ut urinam cientium usus commodus est. Exhibendus est autem panis optime præparatus, oua forbilis, halica lora, & lac cum melle. Omnia tamen cum pane. Ex oleribus, malua, rumex, sisarum, lactuca, seris, fœniculum, ficus coctæ, a quorum acceptione parum aquæ calidæ bibat, in qua decocta sint, quæ urinā moderate cient. De cætero uero abstineat, ut ne potet usq; ad cœnam. Bis enim cibum capere præstat, quā semel se explere: nam, ut dixi, etiam prandium ipsum simplicissime paretur: cœnam magis uariam concedo. In cœnam etiam duæ tertiæ panis partes referuentur. Præbeatur item in ea piscis molli carnis, ne non graueolens, coctus, simplici iusculo apparatus & ex auiculis montanis, extremæ partes & uentres, ex pedestribus, hoedorum carnes, & leporinæ & dorcadum. Pro condimento & embammate ad intinctus, acetum scilliticum, & sales scillitici commodi sunt. Ex leguminibus, ptisana utilissima censetur. Danda tamen & per intervalla oryza, porro in cocturam eius addito. Ex fructibus cōueniunt, ficus electæ, uua arefacta, pirum coctum in aqua mulsa, similiter et cotonea: unumquodq; certo pro coniectura modo. A reliquis fructibus omnino abstineant. Ex dulciarijs mellitis, placentam dato ex amygdalis modice tostis, & paucis pineis nucleis, & cnicī semine contuso & cribrato, ac modice copipere apparatus, Ex bellarijs, parum ex caricis aridis concedito, & uinas passas

passas pingues, amygdala tosta, pistacia, & terebinthos tostos, & cicer tostum, enico cum eis torrefacto et muria adstillata. In potu aqua calida eis omnino cōuenientior est: sed uiribus restaurandis, uinum album et tenue, ac non ualde uentus in cœna post cibos detur: quàm minimum tamen potent, in sitis tantum expletionem. Reliquæ potiones ex uino & melle confectæ, propomata Græce peculiariter appellatæ, uitandæ. Acetum autem mulsum non incommode exhibetur tum ieiunis, tum inter cibos, si stomachus tolerare possit. Somnus porro diurnus nociuus elephantiscis est: nocturnus autem aptissimus. Post longum à cœna interstitium, deambulatio lenta ac sensim facta commoda est, quo cibi eo melius descendāt. Matutinarum uero excitationum sint studiosi. Coitus affectioni infestissimus est. Etenim non reperias ullum aliquem temere qui exectus ab elephantia si apprehendatur, neque etiam facile mulierem. Fortè ob id quod ab utili ac bono humore seminis emissio prodeat, aut quod largior generatio ipsius in seminarijs locis ob materiæ spissitudinem contingat. Multo itaq; semine elephantia si correpti abundant. Non tamen absurdum fuerit pororum gignendorum gratia per rariora interualla coire: neq; enim in totum cōtagiosæ successiones ipsius affectionis in omnibus fiunt, præsertim si quis optime dispositus, ad uenerem incitetur. Quod si succedat curatio, etiam ad quotidiana uitæ munia obeunda demittantur, & longis peregrinationibus sanitati uberius consulant. Si uero nō succedat, procul à mari & urbibus segregentur: Cap. cxxvi

De pruritu: Archigenis.

In omnibus pruritibus uenæ sectione utendum est: si iuuenes sint, & multo sanguine redundant qui ex eo laborant, & nihil aliud impediāt eam admittere: particulatim autem & paulatim eum detrahare oportet, & quandoque sequenti die sectione repetita rursus auferre: deinde restauratis uiribus, per purgatiuum pharmacum alius subducatur. Lauandi sunt omnino quidem ieiuni, quandoque tamen ubi parum quiddam cibi acceperint, à concoctione autem secundo lauentur, ægre enim humectari potest malum. Radenda etiam pilis obrita, & cum maluæ syluestris aut satiuæ, aut betæ, aut scœni græci, aut sesami, aut fursurum decocto repurganda. Totum uero corpus ex farina fabacea, aut lupinorum, aut myrobalani conspergatur. Quod si diutius durer affectio, fomenta quidem & lotiones ex saluiæ, myricæ, mercurialis, origani, pulegij, baccarum lauri, radicum cucumeris agrestis decocto adhibeantur: ex lixiuio item & muria acida. Corpus uero nitro tenuissime trito conspergatur, uini fece usta & arida adiecta. Aut cum hac mistura: Spumæ nitri albæ, sulphuris uiui, alcyonij usti, singulorum æquales partes committe & insperge. Si uero intensiorem uim eius facere uelis, etiam ueratrū album adde. Ea q; simul citra pinguiū ammixtionem corpori insperge. Aliud, bonū & mitius. Spumæ nitri libram unam, thuris lib. i. cimoliæ sex uncem. Aliud. Atramenti sutorij, thuris, sulphuris uiui, nitri, æquales singulorum partes in uino terito, & in prima balnei domo illinito: deinde lauato, & cum uino et oleo inungito. Aliud, ad pruritum totius corporis. Plumbaginis, spumæ argenti, nitri, cimoliæ, iridis, chamaeleonis nigri radicis, pumicis, aluminis, sulphuris uiui, samfuci, lapidis specularis usti, omnium æquales partes committito ac utitor in balneo. Aliud smegma ad pruritum. Nitri libram unam, pumicis usti libram unam, spumæ nitri sex uncem, postreorum ustorum quadrantem, baccarum lauri, costi, nardi celticæ, singulorum sextantem, cyperi unc. i. folij mala bathri quantū uoles odoris cōciliadi gratia: cōtulis et cribratis utere in balneo. Aliud,

Aliud, faciens & ad pforas. Sulphuris, nitri, spumæ argenti, pumicis usti, cum mini, omnium parem modum sume & utere. Inungendi sunt & aceto ac oleo in quibus staphis sylvestris sit contrita, pulegij item ac thuris æquis partibus cum oleo & uino tritis. Frequentius uero cum cimolia in uino madefacta eos expurga, aut cochleas terrestres uistas & tritas cum melle adfrica. Optimū autē est & hoc in balneo. Mellis partes duas, aluminis liquidi partem unam. Coquito ad permutationem aliquantulā, ac utitor primum in sole, deinde in prima balnei domo: atq; ubi parum humectati fuerint, thus cum sulphure uiuo, & nitro, & gummi, æquali pōdere trita arida corporibus eorum inspergito. Critonis, ad pruritus uehementiores. Foliorū lauri uiridium, fasciculum, salis pinguis cyamum unū, acetī sextarium unū, olei lib. iiii. Omnia simul coquito, atq; ubi bis aut ter efferbuerint, ab igne auferto, & frige fieri finito, deinde oleum segregatum inungito. Aliud, ad ægre tolerabiles pruritus. Fecis uini usta, nitri assati, cimolia, cuiusq; lib. i. staphidis sylvestris quincuncem, iridis trientem, acetī sextarios quatuor, olei lentiscini sextarios duos. Arida contusa & cribrata humidis excipito. Vfus eius est in sole, aut in balneo. Aliud, Critonis, Radicis rumicis, fœnigreci, gummi, singulorum drach. duodecim, sulphuris uiui, aluminis liquidi, cuiusq; drac. iiii. myrobalani, cimolia, fecis uini usta, cuiusq; dra. sedecim, acetī sextarios duos, olei sextariū unum. Cōmittito ac utere ut dictum est. Efficax est & id quod ex rumicis radicibus ad elephantalim est præscriptum. Probe facit etiā ad omnē pruritum, inquit, oleū in quo rhododaphne incocta sit illitū. Aliud, ad intolerabilem pruritum, & qui domari nō potest. Cæterū quum neq; uenæ sectio, neq; defricatio aliqua quicquam profuisset, quidā ex huius remedij usu malū exuperarunt. Testudo terrestris uiua in oleo coquitur, & ex oleo corpus inungitur. Sedāt & pruritus ualde egregie, morisolia arida trita affricata, & portulaca trita per se, & perdicū, & apiū cum sulphure uiuo & sale. Quū uero caliditas multa affuerit cū pruritu, ptisanæ succus cōmodissimus est, tum per se, tum modico aceto ammixto. Quod si uehementer urgeat afflictio, quedā ex prædictis sinegmatīs ad ptisanæ succū ammisceto. Vitanæ aut sunt insolationes, præsertim in æstiuo sole. Aqua autem marina maxime frigida convenientissima est pruritu. Quare tentandū est ut æger bis & ter in die probe perfrictus in ea nateat: bis quidem ante prandium, semel uero circa uesperam. Diætā boni succi et uentri commoda eligatur. Etsi alius adfrica sit, cataporia ex aloë sex numero in erui magnitudinem formata post cenam præbe. Abstineat æger ab omni acrium ciborum esu, & ab omni falso edulio, & a cunctis oleribus crudis. Ad scabiosos pruritus. Cæterum ad pruritus scabie perplexos, lac scissum assidue adhibebitum commodum est, & sinegmata omnia prædicta utiliter adhibentur. Priuatim aut hæc. Myrrham cum aceto & oleo tritam illinendā præbe donec exudent. Sinapi item et myrobalanum cum aceto & oleo eodem modo. Aliud. Spumæ nitri, alcyonij usti, sulphuris, singulorum equales partes tritas & linteolo exceptas in oleo madefacito, et deinde ex arido accipito, locosq; donec erodantur defricato, atq; ita aqua abluito. Aliud Ammoniā salis, nitri assati, sulphuris uiui, singulorum unciam unam, myrti aridæ sextantē. Vtere sicco. Aliud celebre. Farina cicercum cū caprini stercoreis pari modo utitor. Aliud ad pforas, pruritus, uiriliginēs, & impetigines. Bituminis, sulphuris uiui, thuris, buccinorū ustorum, equales partes cum aceto & melle tritas adhibe. Optime facit & pulegium cum mannæ puluisculo ex oleo & uino illitum. Vnguentum ad pforas. Hedera folia tenerima

rima & modicum salem cum uino & oleo trita illinito. Aliud. Oleum amygdalinum uinumque ac butyrum conuassata illinito. Aliud. Aloës, cerula, spumæ argenti, lyrici, plumbaginis, glaucij, recrementi argenti, saponis constantini, singulorum æquales partes, aceti & rosacei, quantum satis est. Vtere in balneo. Aliud, ualde celebre. Noces rancidas quindecim, sulphuris uiui quadrantem, gari pontici quantum usui opus fuerit: tritis utere in balneo. Aliud. Perdicium herbam cum sale & sulphure affricato. Aliud, experimento constans. Noces rancidas quinquaginta, salis manus plenæ mensurâ, sulphuris uiui unc. i. tritis utere in balneo ad defricationem, oleo non adhibito: atque ubi exudarit, ægrum in solum calida expletum demittito, indeque egressum rursus defricato, & statim rursus in solum demittito. Aliud præsens remedium. Panis aridi, nucum iuglandium rancidarum, æquales partes, sulphuris uiui, paulo plus quam pro panis mensura, optime terito uino austero affuso, donec ad strigmentorum spissitudinem redigantur, & absque oleo in balneo affricanda præbetur. Aliud. Saponis gallici, nitri, pumicis, sulphuris uiui, perdicij herbarum, cuiusque unc. i. adipis porcini recentis unc. x. viii. carpobalsami dra. i. iiii. Vtere in balneo. Unguentum optimum ad psoras. Picis sex uncæ, ceræ quadrantem & unciam dimidiam, spumæ nitri sextantem, sulphuris uiui sextantem, olei myrteii quod satis est, ut ad strigmentum solidioris crassitudinem redigatur, Vtere in balneo. Aliud Pyretri dra. i. iiii. herbarum lanariæ dra. i. iiii. fenigræci dra. viii. contusa & cribrata reponito. Vsu uero expetente quantum tribus digitis apprehendi potest accipito, & cum aceto acerrimo conuassato: deinde rosaceo sufficienti addito unâ cum smegmatis illinito. Aliud. Aluminis scissilis, spumæ nitri, sulphuris uiui, cuiusque sextantem, staphidis syluestris sex uncæ. Aceto & rosaceo diluta illinito. Aliud ad inueteratas psoras. Atramentum sutorium cum lacte & rosaceo tritum illini, quidam uero cum adipe suillo utuntur. Aliud. Chalcitidis, misyos, æquale pondus, tritis cum uino & rosaceo utitor. Aliud. Nitrum assatum, sulphur uiuum, alumen ustum, æquis partibus cum oleo circumlinito. Facit et centaurea arida trita adstricta, similiter & chamaepitys. Aliud. Raphani succum cum ouo in balneo diligenter illinito, & in paucis diebus curabit ægrum, idem & rapii succus cum ouo probe facit. Aliud, ad psoras. Spumæ argenti trientem, oua integra quinque, aceti lib. v. & dimidiam, olei myrteii sextarium unum: trita illini. Aliud, ad psoras sanie fluentes & foetidas. Mali punice ramulos teneriores aut folia tusa terito, aqua aut poscaprout melius iudicaueris affusa: illine assidue, & miraberis. Aliud, ad psoras ægre curabiles, & principium elephantiasis. Serapiadis tritesticularis manus plenæ mensurâ, radicis altheæ tantundem, hyoscyami uiridis tantundem, myrti uiridis tantundem, scillam unam mediocrius magnitudinis aut paruas duas, olei sextarios tres, aceti sextarios tres, spumæ argenti dodrantem, cerulæ trientem, croci sesquiunciam, candidum ouorum decem. Spumæ argenti, cerulam, & crocum cum aceto terito, herbas uero cum oleo & reliquo aceto coquito, percolato, ac tritis affundito & candida ouorum addito, unito, utitor. Ego uero & perdicium herbam adieci, & in magnis affectionibus etiam chamaeleonem, & rosmarinum herbam. Aliud ad psoras, quo usus sum in elephantiasis principio. Nitri, aluminis, sulphuris uiui, ceræ, cuiusque sextantem, picis trientem, olei in quo rhododaphnæ coctæ sint lib. i. Ceterum ego sulphuris uiui sex uncæ conieci, et pro arida pice liquidam indidi: & corpore ex his illito usque ad miraculum profecti. Verum ubi iam ad cicatricem perducta essent ulcera, sulphuris sextantem, & picem aridam inieci. Ceratum ad psoras, ualde celebre. Colophoniam unc. i. ceram

unc. i. emplastri ex succis sesquunciam, myrti quadrantem. Vsu expetente, si quidem pforæ fuerint asperiores ipsum ut habet adhibe. In exulceratis uero rostro faceo liquefacito, ac utitor. Aliud, quo in exulceratis pforis per omnia utimur,

Ceræ sextantem, picis aridæ sextantem, emplastri ex succis quadrantem, auxilii faciei trientem: liquefacito, ac utitor ueluti eo quod præter opinionem auxiliatur. Cæterum si diuturna sit affectio, subscriptis uteris: Epithema præclarum: facit & ad ulcera cicatricem difficulter recipientia. Aeruginis unciam unam, atramenti sutorij unciam unam, ceræ unciam unam, adipis porcini recentis sextantem: liquefacta aridis committito & imposito, ac post triduum soluito. Facta uero exulceratione, uelut igne ambusta curato. Aliud epithema. Sandarachæ unciam unam, ammoniaci unciam unam: terito, et terebinthina excipito, ut emplastri accipiant formam, & præfricto loco, pellicula excepta imposito, ac post dies quinque soluito. Vbi uero tectorium ulcri fuerit inductum, eodem pharmaco donec tectorium excidat, utitor. Ad exulceratam autem cutem his quæ ambustis conueniunt utendum est: & maxime emplastro ex hordeo apparato. Porro ubi in callum induruerit affectio, magisque fuerit exacerbata, sequentibus utendum erit. Epithema ad pforas in callum obduratas, & ad leprosas dispositiones, pharmacum prospere accommodatum, nam & callos coercet, & ex profundo extirpat, et ulcerationes ad cicatricem perducit: solū enim ea quæ præter naturam accreuerunt corpora contingit. Faring lupinorum tenuissime tritorum, syluestrium quidem malum si adsint, aut fatiuorum, si illi haberi non possint, uncias quatuordecim, farinae loliae septuncæ, nitri rubri sexuncem, picis liquidæ italicum sextarium unum, aceti acerrimi italicum sextarium unum, terebinthinæ bessellem, picem cum aceto coquito, & ubi unita fuerint terebinthinam adijcito, & ab igne ablata aliquo modo frigesieri finito, & inspersis acinfartis farinis, assidue agitato, deinde ad ignem lentissimum admotum coquito indefinenterque agitato donec pharmacum à testa in qua coquitur incipit separari. Quo facto ipsum in mortarium translatum & probe tritum reponito. Vsu uero exigente præfricto ex nitro loco, linteolo exceptum nouo & denso imposito, ac post tertium diem soluito, et alia noua splenia concinnata imposito, uelut id usque ad perfectam sanationem facito. Oportet autem non modo hoc epithema, uelut etiam alia quæ ex aceto & pice cruda apparantur in loco sub diuo apparare. Facile enim dehiscunt & disparantur. Heraclides in aëreo uase coquendum esse admonet, & terebinthinam postremam coniiciendam. Oribasij, ad ulceratas & feruidas in furis eruptiones. In balneis quidē myrobalanum & sulphur cum liquido cerato leuiter illinito: postquam uero frigida aqua solū inscendetur, ex oleo myrteo cum uino inungito, aut ex rosaceo aut lentiscino eodem modo. Potes & lentiscino citra uinum uti. Ad pforam, Magistrianum, ualde necessarium. Rhododaphnes ramulos in oleo cogito, deinde nuces rancidas & sulphur uiuum in mortario terito, infusoque ad ea oleo simulque trito, locos in sole illinito, & post horam lauato, & sanabis. Aliud, præter opinionem ad pforas faciens: Cerusæ, spumæ argenti, sulphuris uiui, ceræ, singulorum sextantem, oua numero duo. Oua recentia in aceto per tres dies ac noctes macerato, deinde una cum putaminibus trita, reliquis probe tritis aridis ammisceto, et ceram cum rosaceo probris duabus et dimidia liquefactam cum eis committito, ac utitor in balneo prounguento. Aliud ex ochra, ad pforas commodum. Spumæ argenti trientem, cerusæ unc. i. ochræ sextantem, cadmiæ unc. i. ceræ trientem, olei myrtei lib. ii.

Ad

Ad pruriginosas papularum eruptiones.

Cap. CXXVII

Diphryges cum aceto illinito, & mori radicem ex aceto, plumbaginem, rubiginem ferri, misy, cyclamini radicem, omnia ex aceto: alumen omne melle coctum, rutam cum sale & oleo, cerusam & argenti spumam ex aceto, rutam cum cerato myrteo quadrupla parte. Aliud, ad psoras, humentes lichenes, pinguesq; & tumentes ac multo humore manantes, mirabile. Cadmiam uino & oleo tritam illinito. Ad omnem psoram ulceratam cum pruritu aut dolore, & ad ulcera capitis manantia, erysipelata, & herpetas. Plumbi usti, cadmiae, plumbaginis, cuiusq; unciam unam, scoriam argenti quae & helcysina sesquunciam, spumae argenti sesquunciam, uini & olei omphacini aut rosacei quantum sufficit. Vtere ad omne ulcus aut papulam in toto corpore. Præter opinionem enim facit, præsertim in infantibus. Aliud, ad psoram asperiorē & tubercula, optimum. Cadmiae, cerusae, sulphuris uiui, mastiches, cuiusque unciam I, ceræ quincuncem, rosacei dextantem. Vtere, locos ex eo integendo. In balneo autem ex pharmaco unciam I, & saponis sesquunciam misceto, ac illinenda dato.

Ad pustulas psydacas Græcis appellatas, & ad papulas

ex feruore aut sudore obortas.

Cap. CXXVIII

Fiunt in toto corpore pustulae, dolorem inducentes citra saniei collectionē; eas eczemata, ab ebulliente feruore Græci uulgo appellant. In his plumbago conuenit cum uino aut lentiscino oleo trita, aut cerusa cum uino & oleo myrteo: aut minium sinopicum cum adipe suillo recenti, aut misy assatum cum uino & rosaceo. Ad exulceratas pustulas. Vbi uero exulceratae fuerint pustulae, subscriptis utendum erit. Scoriam plumbi, & spumam argenti, pari pondere uino & oleo myrteo excepta illine. Aliud. Malicorij, spumae argenti, atramenti sutorij, singulorum æquas partes, cum uino & rosaceo illine.

Aliud. Baccarum myrti nigrarum, malicorij, atramenti sutorij, spumae argenti lotæ, singulorum æquale pondus, cum uino & oleo myrteo illinito.

Smegma, ad pustularum eruptiones. Farinæ fabarum, ptisanæ mola trita, radices polygoni contusæ & cribratæ, terræ cimoliæ tostæ, singulorū dra. II, spumae nitri albæ drach. I, thuris tenuissime triti tantundem. Vfus eius in balneo est. Ex eo autem quantum sufficere putaueris accipito, ac cum ouī cādido subigito: deinde corpus ex eo circumlitum exsudare sinito. A balneo aut ex rosaceo aut myrteo corpus illinito. Aliud smegma. Cimoliæ drach. II, farinæ erui drach. II, quod ex myrobalano contusa et expressa reliquum est tantundē, iridis tusæ drach. II, nitri drach. II, myrti siccae tusæ drachmæ dimidiū: tritis utere ut dictum est. Aliud. Radicis hyoscyami contusæ drach. I, farinæ lupinorum drach. I, cimoliæ drachmæ dimidiū, iridis drach. II, & dimidiū: tritis utere ut dictum est.

Oribasij, ad nigras cicatrices in albandas.

Cap. CXXIX

Spumae argenti, mentæ, thuris, æquales omnium partes, cum melle utitor.

Aliud. Stercoris crocodili drachmas decem, thuris drachmam unam, cerusæ drachmas duas: aut ex aqua, aut cum cerato cyprino mixta illinuntur.

Aliud. columbinum stercus ex aqua illinito, ipsumq; cito abluito, ne exulcerationem inducat. Aliud. Cimoliæ, stercoris columbini, saponis, thuris, singulorum pares partes cum aceto illinito. Aliud. Hirundinis stercus ex aqua illinito. Aliud. Saponis, stercoris canini albi, ceræ, olei in albandis, æquales omnium partes committe ac utere. Aliud. Nitri, ammoniaci thymia-

thymiamatis, myrrhae, sulphuris uiui, singulorum equas portiones in aceto albo terito, aut uino & aqua trita modice illinito, ne exulceratio succedat. De impetigine, praescriptum est Sermonem octauo. De herpete, & similibus, in Sermonem quarto decimo. De uerrucis, tum quae myrmeciae, à formicis, tum quae thymi, à similitudine cacuminum thymi appellantur, item in decimo quarto Sermonem scribetur. Ad papulas autem infantium, in quarto Sermonem tractata sunt remedia.

Ad ulcerosas papularum eruptiones, tum in tibijs, tum in toto crure obortas.

Cap. cxxx

In balneo ex myrobalano & sulphure cerato liquido exceptis leuiter illinatur, & in aquam leniter calidam demittantur: postquam uero frigidae aquae solium inscenderint, loci ex myrteo oleo cum uino, aut rosaceo, aut lentiscino cum uino inungantur. Lentiscino etiam per se utendum. Probe faciunt ad eas & mali punici putamina uino cocta & trita, ac cerato modico liquidiore ex myrteo aut rosaceo oleo apparato excepta, et illita. Facit & myrsinatum dictum pharmacum, & emplastrum ex hordeo cum largo rosaceo aut myrteo diluto & illitum. Aliud. Valde commodum & hoc est, quod in adolescentulam quopiam sumus experti, qui psoram multam inueteratam iam ac asperissimam circum crura habebat, quaeque à genibus usque ad pedum digitos procedebat.

Semen lini cum aqua contusum quam crassissime illinito, & assidue tantamquam uehementer approbato utitor. Aliud, ualde efficax. In quodam qui asperissimam psoram circum crura habebat cognitum, in quo adeo affectio ipsa inualuerat, ut elephantorum corporibus non absimilis esset: qui sane in paucis diebus sanatus est. Sulphur uiuum quam tenuissime tritum, amurca & oleo exceptum, in balneo ad defricationem exhibeto, & post balneum ex eodem illinatur.

Ad cicatrices nigras ex ulceribus relictas.

Cap. cxxxii

Quandoquidem uero in profundorum ulcerum curationibus, cicatrices nigrae conflantur, etiam de his dicere opera pretium fuerit. Differunt autem cicatrices à uirilagine nigra, quae alphas appellatur, in hoc quod leue corpus habent. Vitiligo enim tum ad speciem, tum tactui aspera subiaceret. Ad nigras itaque cicatrices subscriptis utendum est. Plumbi uisti, spumae argenti, aquae les partes cum uino tritas, & in cerati crassitiem redactas, reponito. Vbi uero usus expetit, uino & rosaceo liquefactas, & ad pinguis emplastri spissitudinem deductas, illinito. Aliud. Sulphuris uiui, & myrobalani, aequas partes cum aqua illine, aut terebinthina exceptas, & uestis detrita panniculo infartas imponere. Aliud. Myrobalani unciam unam, stercoris columbini unciam unam, melanthij sextantem, tritis utere pro smegmate, poteris & cum aceto illinere. Aliud. Myrobalanum, sulphur uiuum, alcyonium, cum aqua ad strigmentorum spissitudinem redacta illinito. Aliud. Buccinorum uisum sextantem, thuris unciam unam: illine cum aceto. Oribasij, ad cicatrices nigras. Radicis cucumeris syluestris uiridis drachmas duodecim, sulphuris suilli recentis drachmas quindecim, aluminis scissi drachmas duas, sulphuris uiui, nitri, cuiusque drachmas duas. Aliud. Spumae argenti, ceruse, aquae les partes lotas terito, & cum oui candido illinito. Smegma, cicatrices inalbans. Cimolix, stercoris columbini, saponis, thuris, aequales omnium partes cum aceto adfricato, & rursus ex eodem illinito. Aliud. Veratri albi drachmas duas, thuris drachmas duas, spumae nitri drachmam unam, cimolix drachmam

drachmam i. Vtere cum aceto. Aliud. Bryoniae radicem concisam, in oleo donec succulenta reddatur coquito, & oleum ipsum assidue illinito. Aliud. Erucae semen cum felle bubulo, aut alio quod haberi possit, illinito. Aliud. Spumae argenti sextantem, sulphuris uiui unciam unam, erucae succo trita illini, ubi uero exaruerint, laua. A balneo uero ex sola argenti spuma cum erucae succo illine. Aliud. Talum ouillum ustum cum uino terito, ac illinito. Pastillus ad cicatrices nigras in quacunque corporis parte. Cornu ceruini usti, buccinorum ustorum, spumae argenti, cerusae, thuris, alcyonij usti, singulorum unciam i. piperis sesquunciam, sulphuris uiui sesquunciam, gummi unciam i. cum uino pastillos, quemadmodum nosti, formato. Alius pastillus, per experientiam concolores cicatrices faciens. Lapidis pyritae, comae absinthij, lupinorum amarorum, pompholygis, cimoliae, stercoris columbini, myrobalani, melanthij, aequales singulorum partes in pastillos cum aceto cogito, similiterque utitor. Ad cubitorum & coxendicum nigredines ex cinctura obortas. Alcyonium ustum, siquidem tenera cute praeditus sit cum aqua: si uero duriorẽ cutem habeat, cum aceto statim a balneo illinito. Smeagma idemque illitio, ad nigras in toto corpore cicatrices. Farinae fabarum Italicam choenice unam, baccarum lauri drach. viii, ueratri albi drac. viii, myrobalani drach. iiii, spumae nitri drach. iiii, contusa reponito. Vfu uero exigente, cum aqua illinito. Vtere & pro sinegmate in balneo. Aliud. Farinae erui, spumae nitri albæ, radices bryoniae, alcyonij asperi, myrobalani, singulorum aequales partes committito, ac utitor, ut dictum est.

De uutiligine, seu alphi.

Cap. cxxxii

Vitiliginum, quæ alphi Græcis dicuntur, generatio eiusdem speciei est cum leuce & lepra, non tamen omnino in profundo caro in eis affecta est, sed summa tantum cutis, & uelut squamulae quaedam uutiligines ipsæ affixæ inhaerent, albæ quidem ex pituita, nigræ uero ex atræ bilis humore obortæ. Dictus est autem Græcis alphi, ex eo quod colorem cutis immutat: immutare enim apud ueteres, alphænein dicebatur. Ad albas igitur uutiligines & nigras communiter faciunt, folia ficij, sulphur uiuum, alumen, aequalibus partibus cum aceto illita: quare eis ut præstantissimis utaris. Aliud, ad utraq. Calcem aqua multoties lotam in æstiuo sole desiccato: usus uero tempore cum aqua liquefactam dilutiorem illinito. Ad nigras uutiligines. Ad nigras uero uutiligines priuatim subscriptis utendum est. Veratri nigri, terræ cimoliae, aequales partes aceto aut aqua dilutas, & ad strigementitiam spissitudinem redactas in sole illinito, præfixo antea loco. Aliud. Radicis narcissi, seminis urticæ, cuiusque sextantem, nitri rubri unc. i. cum aceto illine. Aliud. Veratri nigri, nitri, æquis partibus ex aceto utere. Aliud. Cochleas terrestres uistas & cum melle tritas, post modicum temporis interuallum affricato. Ad inueteratas nigras uutiligines, & superficie iam in callum indurata, subscriptis utendum est. Radicis chamaeleonis nigri dodrantem, sulphuris uiui sextantem, spumae nitri unciam i. Vtere in aceto dissolutis illinendo ad solem. Aliud. Alcyonij sextantem, nitri sextantem, staphidis syluestris unc. i. sulphuris uiui unciam i. hæc arida adseruato, primumque psilothro utitor, & sudorem ab eo excludet. Aliud. Alcyonij usti, spumae nitri, sulphuris uiui, ueratri nigri, singulorum æquas partes cum aceto illinito, & cum eodem etiam in balneo defricando repurgato. Aliud odoratum efficacissimum. Veratri nigri dra-

Rr chmas

chmas VIII, iridis, spumæ nitri, costi, cuiusque drach. IIII, cum aceto illinito, & in balneo citra pinguitudinis ammixturem affricato, Optimè facit & ad hæc id quod ad albas uutiligines apparatur adiaptoton, ex eo quod citra opem non dilabatur, inscriptum. Smegma ad nigras uutiligines. Radicem cucumeris syluestris contusam & cribratam affricandam exhibeto. Aliud. Foliorum fici in umbra desiccatorum drach. VI, similaginis drach. IIII, nitri drachmas VIII, alcyonij drach. VIII, contusa, cribrata, reponito. Ante usum autem ad solem exudare affectum oportet, deinde inspergere, & finire exiccari, deinde citra olei ammixturem defricare. Hoc in quinque diebus uutiligines curat. Aliud. Melanthij, ueratri albi, costi, singulorum drach. IIII, nitri drachmas XII. Vtere in balneo citra pinguium admixturem. Manifestum est autem, etiam si nullus dicam, quod prius ex hiera Galeni corpora purgare oporteat, aut ex colocynthide & aloë catapotijs. Deinde uero subscriptis uti. Bulbos cum aceto tritos illinito. Poteris item purgatiuis ex ueratro nigro & epithymo uti. Ad uutiligines albas. Hos itidem prius cum Galeni hiera purgare oportet, aut per catapotia ex colocynthide & aloë formata, deinde sequentibus uti. Dracunculi radicē, aut ari radicem, cum farina ordeacea ex aceto illinito. Aliud. Bulbos tritos cum aceto illinito. Aliud. Altheę semen cum aceto tritū illinito. Aliud. Bryonię radicem concisam cum oleo decoquito, donec oleum inde succulentū reddatur, & assidue illinito. Aliud. Baccarū lauri, cimolię, nitri, æqualibus partibus utere cum aceto. Illine autem ad solem, & post paruum interstitium aqua ablue. Aliud. Fœni græci trientem, spumæ nitri sextantē, alcyonij usti unc. I, cum aceto illinito. Eodem etiam pro leuigmate in balneo utitor. Aliud ualde efficax. Alcyonij usti, sulphuris uiui, ueratri albi, spumæ nitri, æqualibus partibus in balneo ad defricandum utere: cum aceto item in sole illine. Aliud adiaptoton, quod citra opem non dilabatur, appellatum. Radicis chamæleonis albi drach. VIII, alcyonij usti, sulphuris uiui, atramenti sutorij, spumæ nitri, cardamomi, pyretri, foliorum fici syluestris, aluminis liquidi, pulueris calcis uiuę, qui parietibus adhæret domus, in qua calx reposta est, singul. drach. IIII, tere, & in sole cum aceto illine, ægro prius in balneo ex eo defricato. Facit & ad uutiligines nigras. Aliud ad nigras ac albas uutiligines celeberrimum. Myrrhæ, sulphuris uiui, spumæ nitri, ueratri albi, cuiusque sextantem, alcyonij usti sex uncem. Vtere confidenter pro smegmate in balneo: & in sole item cum aceto illinito.

De leuce uutiligine altius insidente, Galeni.

Cap. cxxxiii

Pituitosus & lentus ac uiscosus sanguis, & affectorum locorum debilitas, causæ sunt ob quas leuce generatur. Quum enim ex pituitoso simulq; uiscoso sanguine caro per multum tempus connutritur, facillimè leuce omnis per profundum ipsius pituitosa oboritur, neque potest amplius delatum ad locum nutrimentum ad propriam naturam in rubedinem transmutare. Accedit his quod & ipse qui ad locum influit sanguis pituitosus, ueluti prædictū est, existit. Qualem igitur locusta, aut cancer fluuiialis, et ferè omnia exanguia ostrea ex natura sua carnem habent: talem habent & ex transmutatione ac in aliam speciem de generatione, hi qui leucis corripuntur. Etenim hanc carnis affectionem ita appellant ab albo colore nomine accepto. Quum enim in pilo obstitis locis leuce oboritur, pilo locos ipsos non denudat, sed canos omnino facit. Si uero loci pilosi glabri & pilis nudi reddantur, incurabilis leuce censetur. Ad leucas igitur subscriptis remedijs utendum est. Fici syluestris nigræ uirgultorum libr. I.

rutæ sex uncem, misyos unc. i. calcis uiuæ uncia i. aceti acerrimi quantum satis est. Contere obnixæ & pastillos informa, eosq; in umbra resicca. Vsu uero exigente illine in sole, loco prius confrieto: & si bullæ oboriantur, eas acicula penetrato, & ceratum imposito. Aliud. Fici nigræ uirgulta in aceto macerato, & quam tenuissimè terito, eisq; spumæ nitri, sulphuris uiui, fructus myricæ, singulorum æquales partes ammisceto, & locum cum nitro prius defricato, indeq; in sole illinito, diligenter obseruans ne ulceratio ex eis consequatur.

Aliud. Fici nigræ folia uiridia in aceto macerato: sit autem aceti tantum urea superet & penitus contegat, deinde contusa & trita cum sufficiente calce uiuæ misceto, & locis prius exteris in sole illinito, usquequo lentigini similem imaginem ipsa leuce induat, atque deinde fici succum recentem supra istam illitionem inducito, ipsamq; leucem solam aliquandiu confricato, & ne uicinas partes exulceres obseruato. Egregiè enim auxiliatur. Aliud, ad leucen diuinum donum: facit & ad lepram. Sandaracham terito, eiq; nucum iuglandium uiridem testam adijcito, ac adfuso aceto, rursus simul probè terito, & loco prius deterfo, in sole illinito. Quod si acre ægro appareat, paucum panem ammisceto, & assiduè lauato. Aliud, ex cuius usu sapiculè laudem adeptus sum, citra exulcerationē medetur. Vsus sum eo in muliercula quadam quæ in fronte leucen habebat, & ualde egregiè uires suas declarauit. Seminis cardamomi sesqui uncia, atramenti futuri sextantē, sulphuris uiui dra. iiii, aluminis rotundi & scissi, cuiusq; drach. iiii, cum aceto diligenter terito, locoq; ex nitro & aceto præfrito, in sole illinito. In quibusdam sanè bullam quotiescunque illinitur producit, qua sublata lepram ipsam item tollit. Aliud, ad leucas & lepras. Nucum iuglandium immaturarum & adhuc acerbarum exteriorem corticem uiridem detrahito, & fici nigræ syluestris ramulos amputato, & ad hæc spumam argenti conijcito, ac cum aceto coquito, terito, & ad unguenti formam reducito, idq; ipsum in sole illinito. In decoquendo etiam hordei grana septem addito. Hinc enim sufficientis decoctionis signum habebis, ubi uidelicet hordei grana cocta uideris. Aliud, Archelai. Veratri nigri, radicis bryoniæ, radicis chamæleonis nigri, sulphuris uiui, atramenti futuri, misyos, alcyonij, foliorum fici nigræ syluestris, singulorum æquales partes contusas per angustissimum cribrum excutito, deinde in mortarium conijcito, & aceto affuso diligenter terito, atque ubi ad liquidissimi cerati spissitudinem fuerint redacta, in pyxidem plumbeam recondito. Vsu autem expetente, loco prius cum nitro perfrieto, ad solem liquidius pharmacum illinito. Summè etiam ad lepras conducit. Ad leucas quantumuis crassæ existant. Adarces, canchryos, sulphuris uiui, æquales partes: unumquodque per se priuatim conundito & cribrato, deinde simul cum aceto ad multos dies sufficienter in sole terito, & loco prius confrieto non acruatim illinito, sed dilutius, obseruans etiam in principio ne cutis exulceretur. In progressu uero temporis parum quid ex uerato, tantundemq; ex gallis, ad tria prædicta ammisceto. Aliud. Olus est in Syria folia habens seridis angusto folio præditæ. Vocatur autem lepidium, & cum lacte conditum, seruatur: cum radice uero eius lanæ tinguntur, & nigrum induunt colorem. Hoc ipsum olus tritum & impositum, cutem liuidam reddit & attollit, ut exoriatæ similis uideatur. Est autem radix eius alba, crassitudine digitali: ex qua in sole siccata corticem detrahare oportet, & per diem unum in acerrimo aceto macerare, deinde mane probè & constanter terere, affusioque aceto sufficienti ad strigmentitiam crassitudinem redigere,

Rr 2 atque

atque ita repositum adseruare. Vbi uero usus exegerit, locum nitro defricatum paulisper transpirare finito, atq; ita pharmacum ipsum ad calentissimū solem illinito, & quodammodo adfricato, deinde acetum paulatim ad illitum insillato. Quum uero ager uellicationem ac morsum perceperit, eum ad toerantiam inhortato. Bullæ namque succedent, quas acicula penetratas excoriare oportet. Vbi itaque excoriatæ fuerint, siquidem adfectus locus excoriatus color appareat, ipsum ut secundum naturam habentem & restitutum sinito, si uero non, rursus ad duos & tres dies idem pharmacū illinito, donec omnino perfecte uideris locum ipsum sanatum. Aliquibus uero ex hac curatione bullæ non erumpunt, uerum locus ipse excoriatur, hos itaque uelut igne ambusta curare oportet. Aliud. Floris mali punici drachmas viii, spumæ nitri drach. v, alcyonij drach. iiii, sulphuris uiui drach. ii. Vtere cum aceto. Est item Siccum optimū ad leucas, & inspergitur postquam exciderint crustæ ex acibus pharmacis obortæ. Cæterum ad cicatricem obducendam, & cicatrices reliquo corpori concolores reddendas, aceto excipe, & loco probe præfricatio iline. Vbi uero bullæ emerferint, pharmacum ipsum cum melle cataplasmatico modo impone. Efficacius autem fit si pro sulphure, uertrum nigrum coniiciatur. Smegmatis porro ad leucen itemq; lepram plurimis ex præscriptis illitibus uti oportet. Præclarissimè autem ad ipsos Siccum magnum facit, quod Indum inscriptum est, quo etiam ad elephantiasim, & omnem cutis scabiciem: ad articulare item morbum, & membrorum resolutiones, & ad hydropicos uti conuenit. Salis ammoniaci, salis communis, salis cappadocici, salis amari, nitri assati, farinæ fabaceæ, pumicis usti, spumæ nitri, singulorum trientem, ueratri albi, ueratri nigri, radices struthij, radices bryoniae, cyperorum, aluminis liquidi, aluminis scissi, floris iunci odorati, gummi, iridis, lapidis specularis usti, testarum sepiæ, seminis lini, costi, baccarū lauri, farinæ lupinorū, pulegij, thuris, seminis uiticis, singulorum sextantem, ostreorum ustorum, radices dracunculi, fecis uini usta, pyretri, radices chamæleonis nigri, sulphuris uiui, staphidis syluestris, sinapis, radices pæoniae, samfuci, spicæ nardi, comæ marrubij, foeni græci, granij cniidij, phylli, singulorum unc. i, radices cucumeris syluestris, cimolix, gallarum, singulorum scrupulos xvi.

De lepra Archigenis.

Cap. cxxxviii

Ex crasso ac uiscoso, & magis atræ bilis humore lepra generatur. Differt autem lepra, à leuce & alphi utiliginis speciebus, in eo quod lepra aspera est ad contactum, & pruritus locorum inducit. Cutis enim sola est quæ affecta est, unde & excoriata cute, caro subiecta sana reperitur. In leuce uero, uelut dictū est, subiecta cuti caro tota per profundum transmutata est ad albidiorē colorem, & superficies affecti loci leuissima est, & confrieta citius rubescit, præsertim in his qui facile curantur. At uero alphos in superficie hæret, & uelut squamæ cuti affixus est. Cæterum à scabie differt lepra, quod in scabie quidam furfuracea quædam cuti inhaerentia apparent. In lepra uero quædam uelut magnorum piscium squamæ. Differt autem lepra ab impetigine syluestri, eo quod impetigo orbiculatius semper ad uicinos locos proserpit. Lepra uero non ita eodem modo. Ad lepram igitur faciunt plurima ex his quæ præscripta sunt ad leucen, peculiariter autem talia. Glutinis, saluix, lachrymæ oleæ syluestris, singulorum drachmas viii, corticis radices capparis, gummi, singulorum drachmas xvi. Vtere cum aceto illinens præfrictus in sole. Aliud. Cardamomi, atramenti sutorij, aluminis rotundi, radices chamæleonis nigri, nitri

nitri affati, farinæ lolij, singulorum æquales partes, loco ex nitro præparato, medicamentum hoc in sole impone. Aliud. Atramenti futorij drachmas duas, sulphuris uiui drach. II. cardamomi drachmas II. farinæ lolij, drachmas VII. foliorum fici drach. VIII. carnis caricarum pinguium drach. VIII. Aceto trita impone, & alternis solue, ac rursus lotis impone. Aliud. Verratri nigri, sulphuris uiui, radices bryoniæ, nitri, bituminis, foliorum fici, mysos, alcyonij usti, radices chamæleonis nigri, atramenti futorij, singulorum æquales partes, Vtere cum aceto ad præfrictos in sole. Aliud ad lepram experimento cognitum, tollit eam per dies quinque. Aeruginis drach. III. resine pinus liquidæ drach. III. thuris recentis dra. II. Arida cum aceto terito, & adiecta resina liquata, præfrictis imponito, & alternis soluito, & reperies lepram splenio adherentē. Deinde uero loco per poscam deterfo ac cōfrictio, ut cruentus fiat, rursus impone. At si exulceratio facta fuerit, per muriam & lenticulam cum melle depurga. Et postea per ceratum ad ambusta paratum curationē perfice. Aliud, ad lepras, ipsas excorians. Radicis chamæleonis nigri partem unam, succi thapitiæ partem unam, uentriū cantharidum, sulphuris, æquales singulorum partes pice liquida excipe, & loco illine, ubi prius ipsum probē confricueris. Postquā uero bullæ ac pustulæ excitatæ fuerint, lenticulam cum melle impone. Archigenis ad lepram, Magistriani. Arietis nigri adipe accipito, & locum ex eo assidue inungito, & in paucis omnino diebus citra exulcerationem, eam tollit. Aliud. Seminis raphani drachmas quatuor, sandarachæ drachmas X. lupinorum aridorum decorticatorum, sulphuris uiui, singulorum drachmas X. gallarum omphacinarum, uerratri nigri, gummi, singulorum drachmas octo. Aceto excipe, & præfricto ex fici nigre folijs loco, illine in sole. Cum eodem item in balneo citra olei ammixtionē sicco, per dies nouem defricato. Critonis, ad lepram, ueluti Oribasius tradit. Farinæ lolij choenice Italicam unam, cardamomi drachmas III. spumæ nitri drachmas III. atramenti futorij drachmas octo, radices hastulæ regie medias quatuor, terito omnia & misceto. Vfu uero expetente quantū satis uidetur accipito, acetoq; acerrimo coquito, & ubi ad cerati spissitudinem redegeris, crassius illinito, loco tamen prius ex nitro confrictio: superne uero linteolum obligato, idq; tertio quoque die soluito, frigidaq; abluito, ac rursus illinito. Aliud, ut Oribasius tradit, citra exulcerationem perfanat. Radicis rumicis syluestris drachmas XX. gummi drachmas XII. sulphuris uiui drachmas sex, myrrhæ drachmas III. gallarum drachmas III. Rumicis radices in aceto ad tertias decoquito, eisq; tritis reliqua ammisceto, ac simul terito, ad finem uero etiam gummi addito. Vfus autem tempore loco prius ex nitro confrictio, illinito: sequenti uero die lauato ac similiter curato. Vtere eo & ad impetigines ac pforas asperas ac scabras. Oribasij, ad leprosos. Succis radices hastulæ regie sexuncem, sulphuris uiui drachmas quatuor, mannæ drachmas decem, nitri drachmas octo, illine cum aceto.

TERTIODECIMI SERMONIS

finis.

Rr 3 INDEX

- D**E affectionibus sedis. Caput i
 De inflammationibus sedis, Ca-
 put ij
 De fistulis sedis, & de tuberculis. Ca-
 put iij
 De thymis in sede ac reliquo corpore
 nascentibus, sycosisque ac uerrucis
 formicarijs appellatis, item de cla-
 uis. Cap. iij
 De hæmorrhoidibus sedis. Cap. v
 De hæmorrhoidum chirurgia. Ca. vi
 Ad anum aut sedem procidentem.
 Cap. vij
 De prolabentis sedis perustione. Ca-
 put viij
 De abscessibus sedis. Cap. ix
 De ulceribus sedis proserpentibus, ac
 depascentibus. Cap. x
 De fistulis ani. Cap. xi
 Ad intertrigines inter fœmora ex iti-
 nere obortas. Cap. xij
 De thymis in pudendis. Cap. xij
 De rimis in pudendis. Cap. xiiij
 Medicamenta ad rimas ac reliqua pu-
 dendorum ulcera. Cap. xv
 Ad inflammationes pudendorum.
 Cap. xvi
 Ad nomas in pudendis. Cap. xvij
 Ad carbunculos pudendorum. Ca-
 put xvij
 Ad interna in meatu urinæ ulcera.
 Cap. xix
 Ad scabiosum ac pruriginosum scro-
 tum. Cap. xx
 De testium ac scroti inflammatione,
 Cap. xxi
 De hernia aquosa. Cap. xxij
 De hernia intestinorum. Cap. xxij
 De hernia inguinis. Cap. xxiiij
 De emplastrorum preparatione ac co-
 ctura, & quæ in ea cōiunguntur. Ca-
 put xxv
 De cruentorum uulnerū curatione.
 Cap. xxvi
 De sauciatis neruis. Cap. xxvij
- Curatio nervorū denudatorū ac ul-
 neratorum in ulceribus. Cap. xxvij
 De nervorum contusione. Cap. xxix
 De glandularum inguinis inflamma-
 tione. Cap. xxx
 De quacunque inflammatione. Cap. xxxi
 De abscessibus. Cap. xxxij
 De causis ulceribus non malignis, &
 ratio curandorū ulcerum. C. xxxij
 Medicamenta quæ per linamenta in-
 duntur, & ad suppurandum, reput-
 gandum ac incarnandū. C. xxxij
 De liccis repurgantibus ac incarnan-
 tibus, cephalicis appellatis. C. xxxij
 De ulceribus in quibus caro super ha-
 crescit, & quæ depreffione opus ha-
 bent, & de medicamentis siccanti-
 bus. Cap. xxxvi
 De ulceribus non malignis cicatrice
 indigentibus. Cap. xxxvij
 Sicca ulceribus non malignis cicatri-
 cem inducentia. Cap. xxxvij
 Emplastra quæ non maligna ulcera ci-
 catrice includunt. Cap. xxxix
 De malignis & ægrè recipientibus ci-
 catricem ulceribus. Cap. xl
 Simplicia medicamēta quæ citra mor-
 dacitatem resiccāt ulcera maligna.
 Cap. xli
 De usu relatorum medicamentorum.
 Cap. xlij
 De ligamenti & curationis ratione.
 Cap. xliij
 De emplastrorum cōpositione ad ma-
 ligna ulcera. Cap. xliij
 De ulceribus quæ post obductā cica-
 tricem rursus rumpuntur. Cap. xlv
 Ad extremitatum ulcera. Cap. xlv
 Ad callos extremarum partium. Ca-
 put xlvij
 Ad uermes in ulceribus. Cap. xlvij
 Ad nomas & putredines ulcerum, Ca-
 put xlix
 Sicca crustam inducentia, inter quæ
 Cap. l
 De
 etiā pastilli multi ulus.

| | | | |
|--|-------------|---|------------------|
| De sanguinis eruptione, & quæ cru- stam inurunt. | Cap. li | Deruptione. | Cap. lxxix |
| Exedentia & urentia medicamenta. | Cap. liij | De uulsiõne. | Cap. lxxx |
| Definibus. | Cap. liij | Ad luxatos articulos. | Cap. lxxxi |
| Definibus attritã cutem habentibus. | Cap. liij | Ad laxos articulos. | Cap. lxxxiij |
| Cap. liij | | Ad perniones. | Cap. lxxxiij |
| Defistulis. | Cap. lvi | Ad digitorũ pterygia, siue reduuias. | Cap. lxxxiij |
| De gangræna & sphacelo. | Cap. lvi | Ad paronychias, id est, unguium ab- scellus. | Cap. lxxxv |
| De canceratis tumoribus. | Cap. lvij | Ad contusos ungues. | Cap. lxxxvi |
| De carbunculis. | Cap. lvij | Ad subcruentos ungues. | Cap. lxxxviij |
| De erysipellate, hoc est, igne sacro, Ca- put lix | | Ad motos ungues. | Cap. lxxxviij |
| De herpete. | Cap. lx | Ad scabros ac leprosos ungues. | Ca- put lxxix |
| Ad epinyctidas, hoc est, pustulas no- ctu erumpentes. | Cap. lxi | Ad reparandos ungues. | Cap. lxxx |
| De termintho. | Cap. lxij | De anulís digitis impactis. | Ca. lxxxij |
| De papulis siue pustulis. | Cap. lxij | Ad clauos. | Cap. lxxxxiij |
| Ad ambusta ab igne. | Cap. lxiiij | Ad plantarum rimas. | Cap. lxxxxiij |
| Ad flagellatos. | Cap. lxv | De crurum ac reliquarum partiũ ua- ricibus. | Cap. lxxxxiij |
| Ad delquamata. | Cap. lxvi | De brachiorum ac crurum dracuncu- lis. | Cap. lxxxxy. |
| Ad intertrigines. | Cap. lxviij | | |
| Ad contusa & sugillata. | Cap. lxviij | | |

AETII MEDICI GRAECI CONTRA

CTAE EX VETERIBVS MEDICINAE, TETRABL-
BLI, SIVE QVATERNIONIS QVARTI,

Sermo secundus, & ex ordine Deci-
musquartus.

De sedis, pudendorum ac scroti affectionibus, & de simplicibus medica-
mentis quæ in emplastra coniunguntur. Et de cruentis uulneri-
bus & inflammationibus, abscessibusq̃, ac ul-
ceribus ueteribus.

DE AFFECTIONIBVS SEDIS. EX
Galeno.

Caput i



FFECTIONES circa sedem ob multas causas difficulter cu-
rantur. Nam & ualde tenero sensu prædita pars est: sæpe ue-
ro dictum est tales partes facile ab acrioribus ac austeriori-
bus medicamentis irritari. Et ipse superfluitatum alimentũ
transitus, tum per se mordax est, tum ob id maxime quod si-
mul cum ipsis pertransit bilis, & aliquando quidam serosi hu-
mores. Et ad hæc accedit, quod neque præfinitum est Medicis certum tempus
ad medicamenta imponenda: sed aliquando etiam tempore non conuenien-
ti, agri

Rr 4

ti, ægri ad recrementorum excretionem progrediuntur. Quin & humiditas ac caliditas locorum, siccantibus simul que frigefacientibus opus habens, non parum efficit ut ulcera ægrè curabilia fiant. Mordent enim adstringentia, locus autem ferre non potest morsum, quum subtili sensu præditus exultat. Quapropter conueniunt ipsis medicamenta, quæ adstringunt citra asperitatem, qualia maxime sunt ex metallicis, ea quæ neque acria, neque acerba ualde sunt. Hæc enim lota, citra mordacitatem faciunt id quo opus est. Horum igitur in summa memores, materiam experimento cognitam consequenter scriptam habere.

De inflammationibus sedis.

Cap. II

Ad inflammationes ani, siue ex fissuris, siue ex tuberculis, siue ex ulcere fuerint. Palmarum passarum sextantem, panis siliginis unciam unam, croci drachm. II. Palmas & micas panis sapa præmaceras terito ac illinito. Quum autem inflammatio cessauerit, imminuto pane, palmulas & crocum auges, donec curetur. Curata uero inflammatione, utere sicco hoc ad ulcus. Cerusæ & syriaci pares portiones siccas tritas insperge. Facit hoc etiam ad tubercula condylomata appellata. Medicamentum optimum ad sedem, curat fissuras, & tubercula consumit, & dolorem confestim eximit. Sanat etiam ulcera depressa, ac maligna, & ægrè cicatricem accipientia. Deprimit præminentia, & replet caua. Facit etiam ad tibiæ ulcera, & ea quæ dulcia appellantur sanat. Mastiches, cerusæ, spumæ argenti, succi hyoscyami, singulorum unciam I. olei myrtæ aut lentiscini, quo strigimentolum pharmacum fiat. Quod si etiam amplius quid de hyoscyami succo conieceris, prodest. Reponitur in plumbea pyxide. Medicamentum ad sedem, Orisafij. Olei myrtæ unam, cerusæ trientem, thuris sextantem. Cerusam cum oleo myrtæ ad mellis compagem coctam, ad thus in mortario tritum affunde, & unius utere. Phicotiche Orisafij emplastrum probatum. Thuris drachmas decem, myrrhæ drachmas VII. opij drach. IIII. butyri drach. IIII. aluminis scissi drach. I. cadmiæ ustæ ac lotæ, pompholygis, utriusque drach. VI. ceræ Tyrrhenicæ drachmas IIII. uitellorum ouorum assatorum, numero quatuor, adipis anserini drach. XVI. rosacei drachmas XVI. medullæ ceruinæ drach. XIIII. cerusæ drachmas XIIII. plumbi usti & loti drachmas octo, lapidis hæmatitæ drachmam unam, cæsypii drachm. IIII. & dimidiam. Arida teruntur cum uino.

Ambrosia emplastrum Orisafij. Ceræ, mellis, rosacei, spumæ argenti, cerusæ, adipis caprini, butyri recentis, singulorum quadrantem, thuris unciam unam. Aliud emplastrum sedis dolorem mitigans ac adimens. Spumæ argenti, cerusæ, ceræ, singulorum unciam I. rosacei sex uncem, croci drach. IIII. medullæ ceruinæ drach. IIII. amyli drach. IIII. meliloti un. I. terebinthine drachmas duas. Aliquando & ouorum assatorum uitellos duos aut tres. Spuma argenti & cerussa lotæ ac siccata miscentur, deinde teruntur passo cum meliloto, croco & amylo. Emplastrum sedis ex cerebellis, Andreæ. Adipis anserini curati, ceræ, thuris, medullæ cerui, floris rosarum, pompholygis lotæ, cadmiæ tenebræ lotæ, plumbi usti loti, singulorum drach. IIII. cerusæ drach. VIIII. cerebellorum gruum drach. II. opij sesquidrachmā, cæsypii drach. V. succi intybi cochlearium I. rosacei sex uncem, præpara & utere uelut dictum est. Ad inflammationē ignis sacri in sede. Emplastri ex succis lib. I. panis siliginis lib. I. croci un. I. opij drach. IIII. rosacei lib. II. Crocus & opium passo macerantur, panis uero in aqua, & ad ipsa trita

trita affunduntur liquida, facit etiā ad podagras, in calida intemperie ac fluxione biliosa. Ad eminentias protuberantes. De rumicis agrestis radice humida adhuc corticem detrahe, & ipsam radicem parum contusam ut ex proprio succo madescat, statim eminentiæ ipsi affrica post factam alui exonerationem, nimirum ubi aqua ablueris, & linteo deterferis humiditatem. Hoc decrescen-
teluna fiat. Aliud optimum ad omnem sedis inflammationem. Malicorij seliquiunciam, meliloti unc. i. fœni græci cyathos ii. Vini dulcis veteris heminas quinque. Coquito ad tertias, & abiectionis herbis, terito in uino cerusæ lotæ sextantem, pompholygis lotæ unc. i. thuris trientem, plumbi usti unciam i. Et liquefacto ceræ Tyrrenicæ sextantem, olei myrtei quadrantem, rosacei quadrantem, butyri recentis insulsi sextantem, cœlypi unciam i, medullæ ceruinæ unciam unam, adipis anserini trientem: hæc liquefacta, frigefacta ac erasa, ad trita adijcito, & intybi succum paulatim adstillato, & probe unitis utitor.

Aliud Andromachii, quo utor inquit. Rosarum uiridium, drachmas vii. capitum papaueris drachmas iiii. oua cruda integra duo, butyri recentis, cœlypi, malicorij leuissimè triti, singul. drachm. xvi. mellis dodrantem, rosacei aut myrtei sex uncem, ceræ besslem. Aliud, quo utor ait. Cerusæ drach. v. spumæ argenti lotæ drach. v. thuris drach. vi. aluminis drach. iiii. croci obolos tres, uini & rosacei quantum satis est.

Cap. iiii

De fissuris sedis & de tuberculis.

Tuberculum quod condyloma appellatur in sede fit, ruga a iqua corporum in ano reduplicatorum insurgente, ac præter naturam intumescen-
te. Quum enim sinuosus sit anus, rugas coagmentatas habet. Vbi uero amplius intumuerit ruga, tunc sanè fit condyloma. Et aliquando quidem citra inflammationem fit, & molle est. Quandoque uero cum inflammatione, & durum est ac dolorosum. At uero fissuræ ac rimæ in sede fiunt, quandoque in adstrictiori parte, siue musculo adstringente, quandoque uero in ano. Et aliquando ex influentium acrimonia consistunt. Aliquando autem propter condylomatum inflammationem ac distentionem, partes circumlitæ rupturam sustinent. Curationes autem primum quidem fiunt per medicamenta. Dilata uero curatione, dum & indurantur & callosæ fiunt affectiones, chirurgiam adhibere oportet, ita ut in condylomatis quidem æger commodè locetur, & ipsum condyloma uollet. In fissuris autem, ut callosa rimæ labia deradantur: quo supina ac recens ulceratio fiat ad facilem curationem. Post chirurgiam consequens curatio primum est suppuratoria, deinde repurgatoria, postea ad cicatricem perducens. Quæ uero in principio adhibentur ipsis auxiliis, talia sunt. Ad condylomata pharmacum, quod contrahit ac consumit ipsa. Misy assatum terebinthina liquida excipe, ut emplastrum compagem habeat, & adhibito prius per aquam fomento impone. Vtere ue ut admirando. Aliud. Testas ouorum uistas ac tritas lauato, & siccatas inspergito. Aliud Lucij. Ad inflammationes sedis, & rimas, ac condylomata. Facit etiā ad rimas pudendorum inflammatas. Cerusæ quincuncem, spumæ argenti lotæ sextantem & uncie dimidium, recrementi plumbi loti, aluminis scissi, thuris, singulorum sextantem. Hæc cum uino albo ueteri trita, ad ceratum myrteum ac rosaceum ammisceto ac utitor. Facit ad sordida ulcera sedis, maxime uero circa coronam glandis & præputium consistentia, quæ neq; linamentis repurgantur, & a medicamentis ad depascentia ulcera destinatis exacerbantur. In summa uero perfusiones in condyloma

dyplomatis adstringentes esse oportet, & medicamenta ipsorum adstrictione quadam participare debent. Aliud ad rimas in sede inflammatas, & ad condylomata. Cadmia tenera ter usta ac lota, cerussa lota, spuma argenti lota, singulorum sextantem, ceræ quadrantem, ouorum duorum assatorum uitellos, sapa cyathū i. rosacei cyathū i. Vtere. Est ualde commodum etiā ad antiquata. Ad rimas inflammatas, morsusq; ac feruores, quo ego semper usus, nullo alio opus habui. Collyria asteris aut thuris, aut aliquod consimile, succo hyoscyami & sapa diluito, & rosaceo sufficienti addito, quo strigmentosum pharmacū fiat, ex hoc anum assidue illinere iubeto. Et primum quidem dolores sedat. Celerrime uero etiā ulcera sanat. Potes & species collyrij accipere, & cum hyoscyami succo terere, ac pastillos efformare. Et usus tempore cum sapa ac rosaceo diluere. Aliud Andromachi, quo utor, inquit, ad rimas sedis, & condylomata inflammata. Lapidis hæmatitæ, ammoniaci thymiamatis, thuris, aluminis rotundi, singulorum drach. xii. In alio exemplari, sextantem, gallarum, croci, singulorum drach. i. terebinthinæ drach. iiii. ceræ tyrrhenicæ drach. xii. rosacei drach. x. Vtere ad sedem quidem cum rosaceo, ad uterum uero cum ungento Salca appellato. Aliud ad condylomata & rimas, quo melius non est. Aluminis scissi drach. iiii. croci drach. iiii. cerussæ drach. ii. opobalsami drachm. i. thuris drach. iiii. aloës drach. i. cæsypidi drach. viii. ceræ drac. viii. liquabilia liquefacito, & ad arida trita affundito, ac unitis utitor. Ad rimas in ano ac pudendis. Resinam pinus siccam cum rosaceo terito, donec strigmentosa fiat, & oui assati uitellum ammisceto ac illinito. Ad rimas sedis, inflammationesq; ac condylomata, puluis siccus mitigans ac eximens dolorem. Rhoidarj, Syrici, cerussæ, spumæ argenti, æquales portiones siccas insperge. Aliud. Foliorum hederæ siccorum cinerem cum uino & rosaceo in pila plumbea retere, ac utere. Aliud. Cineris rasuræ linteorū usta, & amyli, æquales partes retere, & foliorum oleæ uiridum succum misce, ac illine. Aliud Maia siue obstetricis ad fissuras & condylomata. Gallæ drac. viii. plumbaginis drac. viii. myrrhæ drach. iiii. cerussæ drach. iiii. tritis utere. Prodest ad omnia. Pastillus Arete Andromachi, pharmacum accommodatum ad rimas & condylomata, in maximis doloribus, citò liberat. Stibij, acaciæ, plumbi usti & loti, singulorum drachmas xvi. cineris siue spodij pompholygis lotæ, drachm. viii. Fructus ericæ, aluminis scissilis, thuris, atramenti sutorij, myrrhæ, opij, singulorum drachmas viii. Vno terito uelut collyrium, & excipe ac forma in pastillos, quos usus tempore passo diluito. Pastillus ad sedem & omnia ani ulcera, rimas ac condylomata. Pompholygis lotæ, terræ samiar, amyli, terræ lemnæ, aloës uste & lotæ, thuris, sandicis, plumbi usti & loti, radices symphyti, centaureæ, singulorum sextantem, croci, squamæ, æris, opij, tragacanthæ, singulorum sesquiunciam. Excipe uino, & utere ut uoles. Pastillus ex solano halicacabo, uelut Heras prodit, qui ad rimas parari solet in sede ac pudendo, & ad ulcera, condylomata, ad uerrucas thymos ac fornicarias appellatas, & ad omnem eminentiam. Facit & ad pustulas nocturnas, papulas, reduuias circa ungues & ignem sacrum. Et ad aures purulentas, & labiorum ac plantarum fissuras. Spumæ argenti drachmas xiiii. cerussæ drachmas duodecim, corticis radices halicacabi sicci drachmas viii, atramenti sutorij drachmas quatuor. Terito uelut collyrium cum aqua, & forma pastillos ac utere, ad ualde inflammata cum lacte muliebri, ad ea quæ cicatrice opus habent cum uino. Andromachus autem hunc pastillum sic præparat. Cerussæ libram unam, spumæ

spumæ argenti, corticis halicacabi, atramenti sutorij, rubricæ sinopidis, singulorum sextantem; in alio exemplari sex uncem; terito cum aceto ac formato pa-
stillos. Medicamentum cicatricem inducens ulceribus in sede. Cadmiæ
ustæ & uino extinctæ, sextantem, cerusæ lotæ unc. i. plumbi usti ac loti unc. i.
ceræ unc. i. olei myrtei lib. i. Sicca cum uino terito ad dies sufficientes, & cera-
tum liquefactum ac refrigeratum adijcito ac utitor unitis. Aliud siccum, ad
rimas præputij ac sedis, inducit cicatricem. Cadmiæ, cerusæ, thuris, æquales
partes. Facit & ad alia ulcera mirabiliter. Aliud cicatricem inducens. Cad-
miæ ter ustæ ac lotæ, plumbi usti ac loti, diphrygis, singulorū unc. i. Vino trita
excipe cerato habente ceræ quincuncem, terebinthinæ drach. xiiii. olei myr-
tei quincuncem. Et unita ac in massam coacta seruato. Vfus uero tempore, de
pharmaco sextantem, ceræ trientem, olei myrtei quantum satis est accipe.
Aliud siccum rimas ac ulcera ad cicatricem perducens. Seminis spinæ Egy-
ptiæ sextantem, mastiches unc. i. Singula seorsim trita miscentur, & post seda-
tas inflammationes inperla cicatricem inducunt. Aliud. Lapidis phrygi-
ter usti ac uino extincti, cadmiæ ustæ lotæ, cerusæ lotæ, aloës, thuris, singulo-
rum drach. iiii. squamæ æris lotæ drach. ii. diphrygis drachm. ii. diligenter te-
reacutere. Aliud. Fructus ericæ, gallarum, thuris ac acaciæ, pares portio-
nes siccas insperge.

De thymis in sede ac reliquo corpore nascentibus, sycosisq; ac uerru-
cis fornicarijs, itemq; clauis. Cap. iiii

Thymi appellationis originatione transumpta est à cacuminibus eiusdem
nominis herbæ in montibus nascentis. Thymi enim in corpore tuberculosa
sunt eminentia, asperæ, subrubræ, oblongæ, præter naturam auctæ, sanguinem
effundentes dum auferunt amplius quàm pro apparente magnitudine. Abun-
dat autem hæc affectio circa sedem & pudenda ac media sœmora. Quandoq;
etiam in facie consistit. Et quidam sanè parui sunt & uocantur thymi: aliqui
uero magnitudine excedunt, & appellantur ficus: & aliqui mansueti sunt, ali-
qui uero maligni. Mansueti igitur thymi, carunculae sunt parua quidem, ue-
rum inæquales, obscuris eminentijs exasperatae, albicantis coloris, aut subru-
bræ, & doloris expertes. Maligni uero thymi, duriores sunt & asperiores ac
maiores, feculentæ, ac liuidi coloris, dolorosiq; ac puncturum dolorem indu-
centes, & exacerbantur maximè ad manuum contactū & medicamentorū ad-
hibitionem. Sunt autem omnes mansueti facillè curabiles, maligni uero incur-
rabiles. Curantur autem aliquando hi, non locali exectione, sed cum ablatione
totius partis in quo sunt. Ad thymos. Saluiam herbam siccam tusam cum
pinguibus caricis præbe edendam, & disparebunt. Verum in pecoribus or-
deum rori exponito, & eandem herbam inspergito, & edere finito, ac mirabe-
ris. Ad eminentias. Soleas ueteramentarias humiditas urito ac terito, & ui-
no præimbutas imponito. Aliud. Serpentis exuium tritum carne carica-
tum reiectis granis excipito, & emplastri modo imponito. Si uero intra sedem
suerint, glandulam inde facito, subdito ac miraberis. Aliud. Caninū ster-
cus album ustum ac tritum & uino madefactum imponito. Caterum uer-
ruca acrochordon Græcis dicta, tuberculosa est eminentia. Nomen uero inde
habet, quod similis est uertice suo resectæ chordæ iuxta extremitatē. At uerru-
ca formicaria, tuberculosa ac callosa est eminentia, nigricantis coloris funda-
mentum latum habens, & ad cutem residens, ad contactum dolorem exhibens
cuiusmodi, qualis à morfu formicæ animalis contingit. Vnde etiam nomen ha-
bet,

bet. Verum in ablotione sanguinem fundit, non pro apparentis magnitudinis ratione. Clauus autem callosa est eminentia, capiti clauis assimilis, frequens autem est circa manuum extremitates, & circa calcaneum. Appellant porro etiam in facie orientes magnas eminentias, ficus: à magnitudine imposita appellatione. Proinde conandum est ut per pharmaca, tum mansuetos, tum malignos thymos curemus, ita ut mansuetis quidem, ea quæ consumere ac contrahere possunt adhibeamus. Malignis autem, ea quæ ad cancerata ulcera & curantur, præsertim in mammis ac utero. At ubi uicta fuerint pharmaca & curatio protrahatur. Thymos quidem qui sunt in musculo ani adstrictior, uelut sella attractos radicitus excindere oportet, & siccum medicamentum sanguinem sistens inspergere, quale est quod flauum appellatur. Et post chirurgiam, pharmaca reliscantia adhibere donec perfecte curentur. Nam unguis uel ratio affectionem refricat. Si uero in partibus magis expositis fuerint thymi, post excisionem quum magni fuerint ac multi uisionem adhibere expediat ad sanguinem sistendum, & regenerationem in posterum prohibendam. Adhibita igitur uisione, curatio decernatur communis ad perusta, primum uidelicet ea quæ crustas amouere potest, deinde repurgatoria, postea resiccatoria. Crustas autem remouere possunt in talibus, lac & mel per linamenta adhibita. Quod si scalpello solum excisi fuerint thymi, post excisionem siccum sanguinem sistens adhibeatur, & reliquus curationis ductus resiccans, uelut dictum est.

Pharmaca consummentia ac resiccantia thymos, & uerrucas formicarias atque acrochordonas. Medicamenta quæ consumunt ac resiccant thymos, sunt ea quæ communiter curant etiam reliquas uerrucas: Quale est hoc quod facit ad thymos in sede ac pudendo, aut in alio corporis loco obortos. Aluminis scissi, atramenti futurijs uisi, glutinis, singulorum unc. i. squamæ gris sextantem. Trita glutine excipito cum aceto prædissoluto, illinito. Ad thymos in sede, & durara ac non inflammata condylomata, & ficus. Squamæ aris drachm. i. sandarachæ drach. i. auripigmenti drach. i. aluminis scissi drach. i. i. Terito per se singula & cum rosaceo, & ad strigmentitiam crassitudinem redacta large illinito, & rasuram linteoli imponito, atque bis singulis diebus curato. At uero in alijs corporis partibus aceto diluta illinito. Mirabiliter autem contrahit ac deprimit thymos in sede ac condylomata, & inflammata lenit, pastillus superiore capite descriptus, Arete appellatus. Heraclidæ Tarentini ad uerrucas formicarias inueteratas. Sulphuris uiui, sandarachæ, atramenti futurijs, singulorum æquales partes, terito cum aceto, & pastillos formato. Et usus tempore aceto dilutos illine. Nos autem apposuius his etiam elaterium pari portione, & ad formicarias atque acutas uerrucas mirabiliter profuit. Verum in formicarijs primum scalpello circumscalpere oportet, atque sic pharmacum illinere. Oribasij ad formicarias uerrucas & acrochordones. Chalcitidis drach. vi. sandarachæ drach. iiii. cadmiæ dra. x. cum aceto assidue illine donec exciderint. Aliud calcis uiuæ partes duas, auripigmenti partem unam. Auripigmentum aqua prius terito, & calcem adijcito, & in uase aqua repleto siccari finito. Hoc ubi tertio feceris, in uas fictile procul ab omni humiditate deponito. Facit ad uerrucas formicarias & instar chordæ apicis acutas, pterygia, callos, nomas, & epulidas. Aliud. Auripigmenti drachmas viii. sandarachæ drachmas sex, elaterij drachm. viii. sulphuris uiui drachmas vi. radices chamaeleonis nigri drachmas iiii. Aceto diluta cogito in pastillos, & utere cum aceto. Verum in formi-

formicaria uerruca basim prius circumscalpe, uelut dictum est. Aliud pharmacum accommodatum. Hoc usus sanauit thymos malignos. Blaterij drachm. vii. auripigmenti tantundem, sulphuris uiui drach. vi. glutinis piscium drac. iiii. trita excipe glutino aceto prædissoluto. Et utere in alijs quidem locis cum aceto dissolutis. Ad sedem uero cum rosaceo. Quomodo uero gluten piscium dissoluere oporteat, dictum est in capite De sanguinem spuentibus, in pastillo qui gluten piscium recipit Sermonem octauo. Ad Thymos ualde malignos, post excisionem & unctionem exorientes, uerrucas item formicarias, & instar apicis chordæ acutas. Pastillus passionis. Squamæ æris drachmas xii. æris uisti drachmas viii. salis ammoniaci drachmas viii. aluminis rotundi drach. viii. thuris drach. xvi. Omnia terito excepto thure, ad multos dies aceto affuso infuse. Deinde thus adijce, ac rursus probe tere, & pastillos efforma, eosq; assidue cum aceto illine, donec penitus exciderint. Ad eos uero qui in sede sunt cum passio diluio. Cæterum ficus ablatis, et thymos ac condylomata curat, et rursus generari non sinat, et iam extantes præclare tollit, cinis lignorum uitis cum aceto illitus, & cinis ex uinaceis uitis, cum aceto.

De Hæmorrhoidibus sedis.

Cap. v

Hæmorrhoids appellationis originationem habet à sanguinis fluxu. Est autem uelut dilatatio localis in sede facta, ualis quibusdam isthic apertis, & progressu temporis callosioribus factis: Hæmorrhoidum uero aliæ sunt cæcæ, aliæ apertæ. Cæcæ sunt quæ omni tempore inflatæ sunt, et nihil excernunt. Apertæ uero sunt quæ per tempora sanguinem effundunt. Hæc affectio malorum plurimorum causa hominibus existit. Nam & deformitatem, & miseram uitam hæmorrhoides inducunt. Multos uero etiam uita priuant, Et deformitatem quidem, propter coloris totius corporis uitiationem, ex euacuatione succedente. Miseram uero uitam, propter corporis debilitatem. Quandoq; autem et de uita periclitantur sic affecti, quum ob excedentem euacuationem perfrigeratum hepatis, aqua inter cutem operatur. Conuenit igitur recta diæta ac uenæ sectione præmissa, hæmorrhoidum extirpationem moliri, et nullam penitus relinquere, quemadmodum quibusdam uisum fuit, possibile est enim incolumes euadere, optimumq; curationis finem assequi, post hæmorrhoidum extirpationem, eos qui oportuno tempore uenæ sectione & conuenienti diæta semper utantur, quemadmodum Hippocrati placet. Inquit enim, Hæmorrhoidas sanant inueteratas si non adseruetur, periculum est hydropem aut tabem succedere. Non enim uelut quidam opinantur, dixit, si non una fuerit seruata hæmorrhoids ad sanguinis excretionem: Sed dixit, si non adseruetur, hoc est, si non conuenienti diæta utatur. Quod autem sic uelit Hippocrates, ipsa aphorismi distinctio ostendit. Ait enim hic uir: Hæmorrhoidas inueteratas sanant. Est autem Sanatio perfecta liberatio, & legitima curatio. Quare iuxta Hippocratem non oportet aliquam hæmorrhoidem relinquere, sed omnes excindere, et post perfectam ipsarum curationem, per conuenientem uelut dictum est diætam, ad naturalem statum corpus curatum reducere, incidereq; cubiti uenam tempore opportuno, quo uidelicet coaceruatus in corpore sanguis euacuetur.

De Hæmorrhoidum chirurgia.

Cap. vi

Aegrum itaq; præparare oportet per modici cibi usum, et aquæ potum, & ut plurimum etiam per clysteris infusum, tum prolectandi stercoris gratia, tum ut sedes irritata promptior ad euerisionem fiat. Deinde adhibeatur Chirurgia quæ admodum in tractatu De chirurgia ostensum est, ita ut singulæ hæmorrhoides

Ss uncino

uncino distendantur, & basis prius circumscalpatur, & per uncinum obtorqueantur. Deinde paruo interstitio facto obligentur, & rescentur. ipsa enim ob tortio adstrictioni correspondens, uasa contrahit ut confidant, quo post excisionem sedes minus sanguinis effundat. Quapropter oportet ut amquamq hæmorrhoidem hamulo distendere, deinde fundamentum circumscalpere, postea per hamulum obtorquere, & porrigere hamum tenendum ministro. Postea uero etiam in alijs idem faciendum est. Postquam uero omnes hamulis distendimus, circumscalptas funiculis obligabimus, & ministro tenendas dabimus. Et tunc primum distentam primam excidimus, & reliquas consequenter ex ordine tollimus. Post excisionem uero, siccum sanguinem sistens apponimus, & spongiam lino obligatam adhibemus, & fili principium foris relinquimus. Postea decernimus consequentem curationem, per linamentorum immersionem, spongiarum appositionem, obligationem sedi conuenientem. Curationis uero postea communis est. Securior itaq; & compendiaris curationis hæmorrhoidum est ipsa chirurgia. Quandoquidem uero quidam melius esse putant assidue purgari per hæmorrhoidas, uelut mulieres. Quidam uero ob timiditatem, per medicamenta potius aliquas ex his aut omnes tolli cupiunt: consequenter subiungemus auxilia ad has conuenientia. **Extractionis hæmorrhoidum.** Quandoquidem pleraque hæmorrhoides opus habent extractione, ad faciliorem medicamentorum impositionem, necessarium est et talia pharmaca describere. Cyclamini succus illitus, & hæmorrhoidas irritat, & non sinit ipsas contrahi in chirurgia, et sedem extrahit ac euerit. Magni pharmaci accommodatū, ad hæmorrhoidas extrahendas. Piperis ac niri utriusq; partes terito, & sedi adhibeto. Aliud. Succum cyclamini cum pari mellis mēsurā ad compagem mellis coquito. Probe facit. Aliud. Hoc uix prolapsas hæmorrhoidas extrahit. Succus centaury drach. ii. aluminis liquidæ drach. i. rnisys drach. i. staphidis agrestis drach. i. Excipe melle et illine sedem. Aut istam pharmaco imbutam in sedem inde. Quum autem promptitudine induxerit, & sedes prolapsa fuerit, & hæmorrhoides apparuerint, imposito ea quæ ad hæmorrhoidum curationem describentur. Quæ aperiunt hæmorrhoidas. **Aperiunt autem has, in his quibus sanguinem per ipsas ex cerni uolumus, amaracinum unguentum illitum, perdicij herbæ folia uiridia assidue affricta, mercurialis trita & uelut glans immissa, fel bubulum per sanæ tomentum inditum.** **Sistentia sanguinis hæmorrhoidum fluxum.** Sanguinem qui ex hæmorrhoidibus nimium euacuatur, sistunt aloë imposita, squama ferri, plumbum ustum cum posca. Aliud, sanguinem sistens confestim. Acciciæ fuluæ drach. iiii. plumbaginis drach. iiii. tragacanthi drachm. ii. Singula seorsim terito, & misceto, & aqua subacta crassius imposito. Si uero penitus res fuerint, in massam coacta indito. Aliud delens hæmorrhoidas & omnem sanguinis eruptionem. Mororum crudissimorum siccorum sesquiquintiam, chalcitidis sesquiunciam, lapidis molaris trientem, pennarum corui serupulos xxi. Extremitates pennarum torreto ac terito, deinde omnia uino subacta ad strigmentitiam spissitudinem redigito. Et in hæmorrhoidibus quidem indito. In extrinsecis uero sanguinis eruptionibus illinito, ac obligato. **Asclepiades prolatio hæmorrhoidum.** Spinæ Aegyptiæ quincuncem, foliorum salicis, artemisij, sideritidis herbæ, singulorum trientem, in quatuor aquæ sextarijs coquito ad dimidias, & herbas quidem abijcito, ad aquam uero decocti siccum hoc ammisceto. Melantherie à clauis drac. x. aluminis rotundi drach. viii. spumæ

spumæ argenti dra. iiii. gallarum dra. iiii. misyos dra. ii. foreos dra. ii. Siccum in decocto diluito, & cum eo septies in die perfundito, atq; hoc per triduum facto. Si uero reliquæ quædam hæmorrhoidum restiterint, eas quarta die acu cōpungito. Et si quidem senserint, aut cruentatæ fuerint, decoctum illud similiter prodest, de sicco uero dimidiā partē misce. Pro lutione uero facta, ipsum siccum pharmacū adhibe, ut exacte urantur, propter inflātionē aut forinsecus panem impone. Hoc cito urit. Ex cataplasmate uero intra septimū diem excidunt crustæ. Mirabiliter quoq; hæmorrhoidas hoc tollit. Cicutæ sicce dra. ii. succi hyoscyami dra. iiii. aluminis dra. ii. æris usti dra. ii. rubricæ dra. i. cerato rosaceo excipe & impone, faciunt & mali punici acidi cortices sicci cum aceto impositi. Si uero penitiores fuerint, uelut glandem supposititiam indito. Aliud ualde præclarum. Sandarachæ dra. viii. auripigmenti dra. viii. cum lixiuio diluta impone. agro antea probe collocato. Mortificatur enim hæmorrhoidis, et decidit in semihora resiccata, & à fundamento deuoluta. Verum circū hæmorrhoidas ceratum illinitur, et fit hoc in sole, aut apud ignem. Debet enim homo in eodem situ permanere, donec pharmacū abluatur. Aliud, ad hæmorrhoidas quod sedat etiā inflammationes ani. Et illæ mortificatæ resiccantur uelut uix passæ, & decidunt in septem diebus citra exulcerationem. Cæterum ad condylomata ac fistulas confert ea q; curat hoc. fecis uini sicce ustæ quadrantem, misyos sextantem, aut pro misy, foreos sextantem. Vtere uelut optimo, fex aut occultitur in prunas, & uritur donec albescat. Aliud. Stercus asini siccum accipito, & ex eo ollulam paruam impleto, & mannæ thuris dra. viii. & tithymali sicci manipulum unum addito, & accenso stercore bubulo, ad carbonem speciem exurito, ea q; trita imposito, donec excident. septima enim die citra inflammationem mortificatæ decidunt. Aliud mirabiliter excindens hæmorrhoidas. Chalcitidis ustæ, misyos usti, atramenti sutorij usti, diphyrgis, foreos, singulorum drachmas iiii. squamæ æris ustæ drachmas duas. Vtere ipso sicco, & instar testæ induratæ excident. Est hoc præclarum, & omnem carnis eminentiam contrahit. Aliud Hippocratis ad hæmorrhoidas admirandum. Gallarum sextantem, myrrhæ sextantem, aluminis scissi quadrantem, melanteriæ quadrantem. Contundito, cribrato, terito, ac utere sicco. Ego uero in penuria melanteriæ, fori adieci, et fecit mirabiliter. Nam intra paucos dies citra mordacitatem ac ulcerationem, hæmorrhoidas dissipat. Verum uino præelucere oportet, atq; sic inspergere.

Ad anum aut sedem procidentem.

Cap. vii.

Nos per muriam, aut marinam aquam, prius anum fouere solemus prolapsum, & sæpe nullo alio auxilio opus habuimus. Aliquando uero salē tritum inspergimus, agro commode ad hoc collocato, & sufficiens tempus expectamus, donec destillantes humiditates extrā processerint. Deinde abluta prolapsa recti intestini parte, illitionibus adstringentibus utimur, nimirum acacia, aut hypocythide cum uino. Deinde anum retrudimus, & sequenti die in sessionē paramus, aut infusum adstrictoriam uim habens, quale est uinum nigrū austerum, in quo decocta est myrtus, aut oleæ folia, aut malicorium. Cæterum in pueris adstringentium usum remittere oportet, & mitiora adhibere. Si uero res urgeat, etiā lumbis adstringentia imponemus cataplasmata ex palmulis ac malis cotoneis & similibus. Item sedi similia adhibebimus. Victus autem sit boni succi, & lactis potus decernatur. Et pulles ex lacte parentur, qualis est oryza cum lacte cocta, & similia. Vinum detur aquosius. pharmaca uero huic affectioni

Etioni commoda sunt eiusmodi, Gallam coquito, & cum leuigata anum in-
gito, & siquidem fortiore auxilio opus habes in uino cocturam facto, sin lenio
re, in aqua. Aliud, Corticis pinus drach. viii, pilularum cupressi, drach. ii,
plumbaginis drach. ii, praelauato cum uino adstringente et acerbo, & sicca tri-
ta inspergito. Aliud, Recrementi plumbi drach. viii, thuris drach. ii, prae-
lue, & trita insperge. Aliud, Balauftiorum drachm. i, malicorij drach. ii, le-
minis hyoscyami drachm. viii, cerusae drachm. viii, myrrhae drachm. ii, plum-
bi loti drach. ii, praelue & insperge. Aliud nostrum ad procidentem anum,
Fructus ericae, gallarum, acaciae, cerussae, succi hypocisthidis, corticis pini, myr-
rhæ, thuris, æquales partes siccas insperge, ubi uino austero sedem prius laueris.
Aliud, Lentis uisæ, panis uisti, farinae erui, æquales partes imposito cum
aceto & sapa. Aliud, Sedem uino praelauato, & picem aridam tritam insper-
gito, aut ollulas uistas tritas. Aliud, Cupressi decocto perfundito, & stercus
caninum siccum inspergito, picem uero siccam, bitumen, & cyperum suffito.
Aliud, Coriandri semen, & laser, trita cum uino illinito. Et torpedinem uiuam
assidue apponito, & contrahet. Aliud, Bitumen et gallam æquis portionibus
tritius siccis sedi inspergito. Valde præclarum hoc est.

De prolabentis sedis perustione. Leonida.

Cap. viii

Quum fluxus ægre curabilis apparuerit, & diata nihil profecerit, neque medi-
camenta contulerint, structura mali iam inueterata, ad uisionem peruenire
oportet. Quum enim alia intestina inter partes principales connumerentur,
externa extremitas intestini recti principalis non est: Sed et dum uritur et seca-
tur, nullum periculum inducit, uelut ipsa experientia testatur. Inurere autem
conuenit per cauteria nucleoformia externam sedis partem extremam, ex mo-
deratis interuallis. Sufficiens est enim uisio ad fluxionem superandam. Cicat-
rix autem solida succedens, anum in ambitu constringit, post uisionem ue-
ro, lac cum melle unito, & linamenta ex eo imbuta indito, ac obligato. Post-
quam uero elapsæ fuerint crustæ, lentem cum melle imposito. Repurgatis au-
tem ulceribus, utere emplastro ex ordeo, aut alijs cicatricem inducentibus, su-
pra ad sedis affectiones præscriptis.

De abscessibus sedis. Leonida.

Cap. ix

Inflammatione prægressa aliquando circa anum abscessus oritur. Quod
ubi contingit, plura corpuscula putrescunt, propter locorum humiditatem ac
largam caliditatem. Vnde necessarium est in chirurgia ablatione uti, & pro-
pterea facile in fistulam transire. Proinde in simplicioribus quidem abscessi-
bus facilis est curatio. Verum in magnis affectionibus, ano orbiculatim am-
putato, plerumque dum cicatrix inducitur, podicis meatus constringitur, &
obturatio contingit. Quapropter conducit inter curandum, primis curationis
temporibus linamentum parare, idem in tetrapharmaco, aut alio quodam ad curatio-
nem commodo, dissoluto intinctum indere in sedem. Tempore uero in-
ducendæ cicatricis, canalem stanneum rotundum sedis meatui conuenientem
immittere. Qui foris quidem sit amplus, uerum apposita parte in profun-
do sita rotundus ac leuis, habeatque in medio foramen, per quod flatus red-
di possunt. Illinatur autem canalis ex medicamento cicatricem inducen-
te, aut samia terra cum uino, aut cerusa, forinsecus autem splenium aut lana
incumbat.

incumbat, et commoda obligatio fiat. At uero canalis ipse usq; ad perfectam curationem inditus sinatur.

De ulceribus sedis proserpentibus ac depascentibus.

Cap. x

Fiunt aliquando in sede ulcera proserpentia et depascentia. Siquidem igitur nome depascens in adstrictorio musculo fiat, conari oportet ut per sedulam medicationem ad nomas pertinentem affectio curetur. Nam interiores ani partes, ipse inquam adstrictorius musculus, ne uosus quum sit, neq; uestionem neq; sectionem sustinet, exciso enim musculo illo, conuulsio sequitur, & nimirum etiam carunculae imminutio ac decrementum: Id quod inde nobis cognoscere datur, quod saepe etiam non adhibita chirurgia, ab ipso depascente ulcere musculus ille consumitur, & carunculae decrementum, Rœada graeci uocant, cōsequitur. Utendū igitur est auxilijs ad nomas descriptis, ita ut myrtorum ac malicorij & rubi decocto, ac similibus, assidue irrigemus, & primum quidem corporibus à natura alienis crustam inuramus, per faustinum appellatum pastillum aut consimiles. Deinde utamur eo qui ex usta charta constat, postea lisdem emplastrum cum multo rosaceo dissolutum per linamenta indamus, & sic reliqua deinceps consequentia faciamus. Cæterum phagedanico ulcere proserpendo exedente in ano existēte, audere aliquid oportet, et aliena à sanis excindere. Deinde uestionem adhibere. Quū enim carnosus sit podex, tales chirurgias facile sustinet, post chirurgiam autem, consequenter curatio, uelut aliorum ulcerum faciēda. Si uero uestio adhibita fuerit, curare conuenit uelut in prolabente sede prædictum est.

De fistulis ani. Leonidæ.

Cap. xi

Quandoquidem ex mala ulcerum curatione, & præcipue circa sedem, saepe fistula succedit, consequenter etiam de his dicendum est. Proinde agro insella, aut alio quodam plano loco collocato, artifex à dextris magis ipsius agri desidens chirurgiam perficiat. Conuenit aut specillum accipere, & caput eius in medium fistulae immittere, ipsumque propellere, quousque per inanem meatum progredietur. Deinde medium sinistrae manus digitum in sedem immittere, per ipsum specilli caput arripit, postea reflectens specillum, & ambas fistulae extremitates inter se adaequatas sinistra manu distendat, atque sic omnia corpuscula callosa per ambitum excindat, unico cōtactu, si id fieri potest. Si uero post sectionem apparuerit callus adhuc insidens circumscalpatur. Manifestus autem est callus, quum sit subalbidus ac renitens. Si uero etiam rugae propinquae apparuerint, uolsella extenta refecentur ad ulcerū explanationem, et facilem deinceps curationem, post chirurgiam manna thuris sectionem imple binus, & linamentis inditis conuenienter deligabimus. Et consequenter communi aliorum ulcerum curatione utemur. Cæterum in his qui ob molliciem aut timiditatem rogant nos ut per medicamenta curentur, primum conari oportet ut per pharmaca resiccantia ac fistulas claudentia curemus. Quae si nihil effecerint, ad ea quae callosa corpuscula erodere ac consumere possunt, transeundum est, quae fistularia collyria appellantur: quorum præparationes in uniuersali de fistulis tractatu paulo post in hoc Sermone dicemus. At uero medicamenta quae fistularum resiccationem promittunt, sunt emplastrum ex spuma argenti & aceto ac oleo paratum, & emplastrum sine cera, et fuluum Galeni, & harmonia, & ex salicibus, & ex lolio constans, & consimilia: facit

Ss 3 & hoc

& hoc ad fistulas incipientes in sede, rimasq; ac condylomata, pæoniae radicis uisæ quadrantem, bituminis Iudaici sextantem, sulphuris uiui unc. i. ceræ sextantem, olei myrtei quantum satis est. Aliud, Mala cotonea ad cinerem exurto, ac trita superne ad osculum fistule imposito, & linamento indito, emplastrum ex uino & oleo, aut simile quoddam adhibeto ac deligato, & alternis diebus soluito. Pastillus ad fistulas sedis, Chalcitidis uisæ drach. viii. gris usti drachm. iiii. cadmiæ drach. iiii. cretæ terræ drach. iiii. pompholygis drach. iiii. Lycij drach. iiii. aloës drach. ii. croci drach. gummi dra. xvi. terito cum succo fenecionis, aut serapidis tres testiculos habentis, & formato pastillos, et utitor siccis, & cum aceto & cum cerato. Vtere etiam ad uniuersales fistulas describendis.

Ad intertrigines inter fœmora ex itinere obortas. Cap. xii

Chalcitis cū aqua trita ac illita prodest. Et plūbago cum aceto aut uino. Erispuma argenti per se, & cum myrto sicca trita. Aut alumen in testa ustum tritum insperge. Aut fici folia usta ac trita cum oleo illine. Aut rosarum capita una cū flore trita insperge. Aliud quo utor ualde efficax, plūbaginis drac. viii. gal-larum dra. iiii. aluminis dra. i. myrrhæ dra. ii. siccum hoc insperge. Aliquando uero cū oleo myrteo illine. Ego uero uino semper prius lauo, & siccū inspergo. Aliud, facit et ad papulas feruidas in fœmoribus ac sub alis, ex sudoribus obortas, præsertim in corpulentis hominibus. Syrici unc. i. fuci tinctorij unc. i. resæ ex clibano antiquo sextantem, prælauato et inspergito, probe quidem facit, uerum lintea inficit, facit & ad ambusta cum cerato.

De Thymis in pudendis. Leonidæ. Cap. xiii

Huius affectionis proprietatem in loco de thymis in sede diximus, sunt autem & hic thymi, aut in sola glande, aut in cole, aut in præputio. Aliquādo uero in omnibus relatis locis. Antea uero dictum est, quod mansueti facile curatur. Maligni difficulter, et per affectæ partis ablationem sanantur. Quomodo autem cognoscere oporteat & mansuetos, & malignos, etiam relatum est. Siquidem igitur mansueti fuerint thymi ac parui, per uolsellam disticti ex cindantur, et aliquo sanguinem sistente ac crustâ inducente illinantur, quale est siccū flauum appellatū, quo per crustam, simile quiddam ustioni efficiamus. Quū uero multi fuerint et maligni, tunc post excisionem ustio adhibeatur, ad sanguinē sistendū, et affectos locos ad aliū statū transmutandos, & thymorū regenerationē prohibendā. Quū autem totum præputiū thymis fuerit refertū, tum iuxta internā, tum circa externā partē, difficile erit ipsum cōseruare. Itaq; necessariū erit quantū eius fieri potest, ad cutis præputij sectionē progredi. Quū igitur ustio post excisionē adhibet, curatio decernatur ad perusta, relata in tractatu de prolabere sede. Excisus autem thymis, & post excisionē sicco crustâ inurente adhibito, post crustæ discessum reliqua curatio resicatoria fiat. Vinctuosa enim pharmaca affectionem resificant.

Cæterum in his qui chirurgiam reiiciunt, utendum est talibus medicamentis. Medicamentum resiccans thymos xeraphium appellatum. Chalcitidis crudæ sesquiunciam, misyos crudi sesquiunciam, squamæ æris sextantē, aluminis scissi unc. i. Locū cū uino prius lauato, et siccū inspergito. Aliud. Gallam et alumen trita inspergito, & exarescent. Vtere etiā si in alio corporis loco thymi sunt. Aliud, egregie tollēs thymos et carnē excrecentē in pudendis. Origanū et rutæ radicē, parib. partib. urito terito ac inspergito, Vtere hoc uelut optimo.

De rimis in pudendis. Leonidæ.

Rimæ ac fissuræ in præputij summitate fiunt, quādo angusta ea existens uio

lenter educitur. Ruptis aut corporibus, inflammationes succedunt et dolores in-
centi. In principiis igitur, omnis rima dum recens est cruentatur, antiqua uero
callosa fit, et rursus quum uiolenter disparatur, rupta rursus cruetatur, proinde
ad curam festinare oportet. Vbi uero antiquatae fuerint, & callosae factae cura-
tionem distulerint, nihil proficientibus medicamentis, confert cutem abducere,
& callosa rimarum labia, supino scalpro quantum eius fieri potest, superficialia
sectione diducere. Resupinatae enim & recentes factae rimae ac fissurae, celerri-
me sanantur.

Medicamenta ad rimas & reliqua pudendorum ulcera. Cap. xv

Rimas medicamentis curare conandum est antea, citra chirurgiam, & uten-
dum est plerisque ad rimas sedis praescriptis, & praesertim eo quod Lucio inscri-
bitur, facit enim & ad rimas in praeputio, & ad ulcera fordida, & praecipue quae
detrahi ac reduci non potest. Inijcitur autem cum oleo & uino per clysteriolum.
Mirabiliter autem facit ad rimas in praeputio & recentes, & inueteratas, urina
quae inter mingendum intra praeputium ac glandem obiter suscipitur, & celer-
rime sanat, ut ne opus quidem sit alio auxilio. Aliud ad rimas praeputij. Re-
sinam frictam cum rosaceo terito donec strigmentitiam compagem accipiat,
& ammixto oui assati uitello utere. Aliud, ad rimas & reliqua ulcera. Colo-
cynthidem siccam urito ac terito, & cum rosarum flore utere. Idem facit & ane-
thum ustum. Aliud. Ad praeputij rimas, & glandis ulcera, repurgat & cica-
tricem inducit. Lapidis phrygij ter usti et extincti, primum butyro aut rosaceo,
deinde melle, postea uino, sextantem, florum rosarum unc. i. malicorij unc. i.
utere. Aliud. Ad rimas praeputij & ani, & pudendi muliebris. Cerusae, plum-
baginis, gallarum, myrrhae, aequalibus partibus utere sicco, aut cum uino & o-
leo. Aliud. Rimas & ulcera ad cicatricem perducens, & acrimonias obtun-
dens. Cadmia tenera ter usta sextantem, rosarum recentium detractis ungui-
bus sexuncem, Cadmiam tundito ac cribrato, & cum rosis terito donec exare-
scat, & sicca inspergito, ubi praelaueris cum uino. Aliud ad pudenda et sedem.
Lapidis phrygij ter usti ac extincti uelut dictum est, cerusae lotae, cadmiae thur-
ris, aloes, singulorum unc. i. squamae aëris drach. ii. diphyrgis drach. iiii. utere
sicco. Aliud siccum, ad pudendorum rimas & ulcera spontanea. Aloes unc.
i. florum rosarum sextantem, utere confidenter. Aliud ad eadem. Aloem so-
lam tritam inspergito. Si uero adstrinxerit, cadmiam ter usta ammisceto. Mira-
biliter efficax est. Aliud. Pastillum ex halicacabo lacte dilutum exhibeto. Ha-
betur eius praeparatio capite tertio, ubi De fissuris et tuberculis sedis tracto. Ve-
rum in his qui praeputium reducere non possunt, lacte eundem diluito & tepi-
dum per clysteriolum injcito. Aliud. Ad spontaneas pustulas in pudendis,
& maxime in his qui praeputium reducere non possunt. Glaucium cum uino
terito, & ubi praelaueris, per fistulam, pus attrahentem, tepidum injcito.

Aliud lene incarnans & cicatricem inducens. Amylum per se tritum
inspergito. Aliud, colophoniam tritam solam inspergito. Aliud. Aloes
lophoniam, thus, amyllum, paribus portionibus inspergito. Aliud. Aloes
primariae, cerusae, rosarum siccarum, aequalibus partibus tritis utere. Aliud.
Collyrium ex thure tritum siccu insperge, aut cum uino dilutum per linamenta
indito, aut cum lacte injcito, facit et quod Aster appellatur, et quod Cleoni in-
scribitur, & similia. Oribasij ad praeputij ac ani rimas. Inducit cicatricem. Cad-
miae lotae, cerusae, thuris, aequalibus portionibus, utere, facit & ad alia ulcera
mirabiliter.

ss 4. Ad

Ad inflammationes pudendorum.

Cap. xvi

Inflammata pudenda rosarū et meliloti decocto perfundito: Aut betæ folia siue semen tritum, in aqua feruefacito, & calido perfundito, facit ad eos qui præputium retrahere non possunt. Cataplasma uero adhibe ex pane cum palmulis sapa præmaceratis, cum modico rosaceo. Aut malicorium in uino coctum ac tritum cum pane ac modico rosaceo pro cataplasmate impone.

Ad Nomas in pudendis.

Cap. xvii

Si ulcus depascens, nomen græci uocant, aut erosio fiat, laxa forinsecus apparet pars erodenda. Et si circumprematur, humorem tenuem subruentem excernit, deinde feculentum. Cōuenit itaq; perfusionibus adstringentibus in his uti, ex decocto myrti, ruborum, oleæ syluestris, rosarum, malicorij, plantaginis, polygoni, pharmaca uero ad nomas cōmoda sunt, pastillus corax, id est coruus inscriptus. Habet autem sic. Gallarum sextantem, squamæ æris sesquiunciam, chalcitidis crudæ unc. i. thuris unc. i. terito in aceto ad sufficientes dies, et ad finem mellis quincuncem addito. Et ex olei myrti lib. i. ac semisse, ad ipis tauri ni recentis belse, ceræ triente, terebinthinæ unc. i. ceratum effice, et in linamentis utere, & per fistulam puris attractoriam iniice, per rosaceum dissolutum. Et superne spongiā ex uino expressā impone, aut ceratum habens malicorium aut gallas. Aliud ex charta usta. Chartæ ustæ sesquiunciam, squamæ æris sesquiunciam, auripigmenti dra. vi. sulphuris uiui dra. vi. plumbi usti dra. iiii. Insperge siccum, aut melle & rosaceo dilutum per linamenta inde. Si uero præputium reducere non potest, plurimo rosaceo dilutum, & modico melle addito, iniice. Aliud siccum, quod sanauit quosdam iam secandos. Chartæ ustæ sextantem, gallarum sextantem. Vtere sicco.

Ad carbunculos pudendorum.

Cap. xviii

Spumæ argenti dra. iiii. cerusæ dra. ii. thuris drach. i. Trita insperge, & rasuras linteorum impone. Aliud. Adipem caprinum cum uuis pallis tritum impone uelut cataplasma. Hoc suppurat, & dolorem eximit, postea eundem adipem cum pice liquida unitum imposito. Aliud, pilulas stercoris caprini uistas cum melle imposito.

Ad interna in meatu urinæ ulcera.

Cap. xix

Lycij dra. ii. myrrhæ dra. ii. atramenti futorij dra. i. chalcitidis dra. i. omnia simul trita cum passi hemina una, & uini ueteris odorati cyatho uno, coquito donec uniantur, et reponito in plumbo. Vfus uero tempore rosaceo diluta iniice: facit et ad ulcera inter anum et testes. Ego autem cygnaria collyria cum late diluta per clysteriolum iniicio, & bonum testimonium ipsis præbeo.

Ad scabiosum scrotum & pruriginosum.

Cap. xx

Contingit etiam circa scrotum assidue scabies & pruritus, ex influxu humorum acrium ulcerantium cutem. Et ubi quidem plures fuerint et acriores allati humores, cutem ipsam exulcerant. Si uero pauciores ac crassiores squamas generant, & pruritus inducunt. Curatio horum fit per congruam uictus rationem, & per medicamenta. Aliquando uero & raro, per chirurgiam. Itaque ab acrium esu abstinendum est, & præsertim ab oleribus malis succi. Quæ uero exhibentur bono succo prædita sint. Qualis est lactis potus assiduus, prisana, halica, gallinarum oua, porcellorum extremitates & uentriculi. Vinum tenue dilutius & album. Ex localibus auxilijs, præsertim ubi squamæ ulceri adhærent, & dolor adest, conuenit cataplasma ex fabæ lomento. nā & dolorē mitigat, & ulcera repurgat. Sit aut ex faba Aegyptia lomentum.

Idem

Idem facit sesamū crudū, et erui farina melle subacta et imposita. Repurgatioe uero ulcerū facta, pruritusq; lenito, ad cicatricē inducendā pergemus, probe autē facit in his partibus, misy cum sulphure uiuo tritū, & cerato myrteo exceptum. Conducit & plumbi recementū, & spuma argenti cum myrteo cerato. Et Emplastrum ex cadmia, & emplastrū ex hordeo. Præclare auxiliatur etiā seroto in superficie tumefacto, terra cimolia cum aqua diluta ac illita, quam illitā exarscere sines, & aqua tepida loco abluto, myrtum siccam tritam modica myrtha addita insperges. Inducta uero cicatrice, nullaq; molestia nec pruritu uexante, curatio transacta est. At si scabie sanata, pruritus restat, aut augetur, aut serotum humore destillat, Nitrum cum staphide agresti & alumine liquido, rosaceo & aceto dilutum, in balneo illinere iubemus. Et à balneo oui candidum cum melle imponere. Si uero uehemens & intolerabilis est seroti pruritus, fex aceti sicca cum uino madefacta adhibetur, eodem modo uelut præcedens medicamentum, illito etiā postea oui albumine. Quod si adhuc amplius uim eius augere uoles, ustam fecem accipies. Idem præstat alumen cum melle probe coctum, & reliqua quæ ad pruritus retulimus.

De Testium ac seroti inflammatione, Leonidæ.

Cap. XXI

Quādoq; testes soli per se inflāmantur, quādoq; testibus nihil affectis, serotū inflammatum est. Aliquando uero testes unā cum seroto inflāmantur. Sic autem in alijs corporis partibus, ita etiā in his, uel ex humorum influxu, uel ictu, uel collisione inflammatio contingit. Proinde solo testiculo inflammatō, serotum colorē naturalem habet, ipse uero testis tumidior, duriorq; ac amplior tactui occurrit. Adest dolor pulsatiuus usque ad renes pertingens. At si serotum inflammatum est, tumor rubicundus in superficie est, renitens ad tactum ac dolens. Vtriusq; uero inflammatis, testibus uidelicet & seroto, ex signorum augmento magnitudinem inflammationis iudicabimus. Proinde cibi parsimonia, et aquæ potu per totū curationis tēpus utendum est. Et si inflāmatio uehemens fuerit, præsertim in iuvene sanguinē multū habēte, uena cubiti secāda est, si id fieri potest, sin minus, tali. Nā et hanc secare prodest, ubi sanguis non fuerit multus. At pro localibus auxilijs, si testes sunt inflāmati, et maxime ubi nerui à quibus pendent simul affecti fuerint: lanā oleo cōmuni aut anethino imbutā adhibebimus ac deligamus. probe facit et uerbenaca recta in oleo cocta modico uino addito, & seroto imposita, atq; lana supilligata. Cataplasmatibus uero ad inflāmationes soluēdas idoneis utemur. E quorū numero admirandū est, ad testium præsertim inflāmationē, Cataplasma ex faba Aegyptia. Decorticatur autē faba cocta, et cū modico melle trita illinitur, præstat etiā ad testium ac seroti inflāmationes, cataplasma ex puro pane, quo ego assidue utor, quādoq; cū oleo et aqua, quādoq; cū mullā. Egregie facit etiā id quod ex uuis passis cum cumino torrefacto ac trito, modico melle addito paratur, prodest et asphodili radix cū polenta in uino cocta. Et lini semen in aqua mulla coctū. Et senecio cum polenta. Et cupressi folia per se, uel cum panis mica. Ceratum ad testium inflammationes efficax. Cera, resina pinus, olei anethini et narcissini, singulorum dextantem, cumini sex uncem, fimi asinini pilastres, fimum arefactum terito et cribrato, & cumino ammisceto, deinde cum cerato liquefacto cōmittito ac imposito. Et lanam narcissino aut rosaceo oleo imbutam superilligato. Confert etiā emplastrum ex succis rosaceo dilutum, durante uero inflammatione, aqua marina calida affundenda est, & cerata adhibēda inflammationes discutientia,

tientia: Qualia sunt ad mamillas inflāmatas descripta. Quod si non solvatur inflammatio, sed transmutetur, suppurationem cum cataplasmatibus adiuuare oportet, perfectioq; iam abscessu chirurgiā adhibenda est, et communi curatione utendum. Si uero nome depascens accesserit, eadem curatione etiam hic utendum erit quā superius ad sedis nomas tradidimus. Oribasij ad testium tumores laxos ac inflammationes. Olei lib. i. alij habent dextantem, plūbaginis, cumini, passularum sine uinaceis, farinā fabarum, singulorū trientē, cerā sextantem, plūbaginem cū oleo ad cōpagem coquito, deinde cerā cū colophonie dra. vi. adjicio et ad perfrigerata passulas ac farinā ammisceto, ac utitor. Aliquando tamē farinam ad liquefacta inijcio inquit, postquā seruior ipsorū quieuit. Aliud eiusdem. Vuarū passarum sine uinaceis dra. xxv. cumini acetabulū. i. resinae pinus quadrātē, mellis quod satis est. Sanguinis porro euacuatio efficacissimū auxilium est ad testes inflāmatos, inquit Oribasius. Ceterum ad testium duricias, cucumeris syluestris radicem terito ac cribrato, et in aqua mulsā coctam cum lolīacea farinā imponito. Aut lilij radicem uino coctam, & modico melle subactam imponito.

De Hernia aquosa, Leonidæ.

Cap. xxii.

Hernia aquosa quandoq; ex occulta, quandoq; ex manifesta causa contingit: Ex occulta quidem, quum aquosus humor circa partes corpusculorum, quę microtum contexunt ac implicant, sanguini ammixtus collectus fuerit. Ex manifesta uero, quum ex plaga collisis, aut fractis uasis, sanguis affluens ad aquosam substantiam transmutatur. Vbi igitur sponte constiterit aquosus humor collectus, subflauus aut subpallidus is inuenitur. Vbi uero ex plaga, cruentam ac feculentam materiam reperies. Humor autem uel intra rubicundam testiculī pelliculam consistit, uel extra ipsam, inter eam & pelliculas adiacentes. Vel in propria pellicula uelut uesica quadam continetur, atq; hoc genus herniam in tunica superagnata uocamus. Aliquando uero duplex hernia oboritur, quum collectio & in rubicunda tunica, & in superagnata consistit. Siquidem igitur in pellicula rubicunda humor collectus fuerit, tumor unius coloris apparet sine dolore, in principio dum adhuc parua est collectio, ad contactum cedens. Postea uero aucta collectione, testiculus humore undique circumdatus sustentatur. At tumor in ambitu extensus ac renitens ad tactum, herniæ carnosæ suspicionem imperitis exhibet. possunt tamen tactu discerni, nam hernia carnosæ omnino renititur, sed aquosa digitis cedit. Si uero in superagnata tunica humor colligatur, tumor ipse siue magnus siue paruus fuerit, omnino circumscribetur. At si simul quoq; in rubicunda tunica collectus fuerit, duo tumores deprehenduntur, alter in superagnata, alter in rubicunda pellicula. Quod si extra rubicundam pelliculam collectio fiat, testiculus tactui occurrit. Ceterum ab hernia aquosa differt hernia intestinorū. Quoniam in aquosa tumor eiusdem penitus magnitudinis semper, & in quolibet corporis situ persistit. Neque enim humores, uelut intestina transferuntur. Inguen præterea in hernia aquosa secundum naturam se habet, qua nota uel maxime aquosa, ab omenti hernia distinguitur. Nam in hernia omenti, semper in scroto contingit. Verum in omenti hernia inguen rarefactum deprehenditur. Tutissima itaq; curatio herniarum chirurgia & ustione perficitur, si peritus artifex contingat. Potest tamen etiam medicamento scrotum inuri, & consumpto humore ac cicatrice

cicatrice inducitur firmari. Ad hunc usum efficax hoc est. Radicis brassicæ usæ
 cinerem, cum ad ipsam sullo inueterato liquefacto ad emplastrum formam adigito,
 et impositum alligato, ægrumque quiescere linito, & postridie soluto medicamen-
 to fomentum adhibeto, et rursus apponito, idque tamdiu repetito, donec uestigio
 perfecta fuerit. Emplastrum autem angustum & oblongum esse oportet, neque
 plus quam conuenit locus inuratur. Ita ut in magnis tumoribus quatuor digito-
 rum longitudinem & pollicis latitudinem habeat. In paruis duorum digitorum
 longitudinem, & auricularis digiti latitudinem exæquet. At uero ubi tunica per
 uestionem detecta est, scalpello eam diduces, excludensque humore fistulare colly-
 rium fissuræ indes, quo uicina partes erodantur. Deinde suppurante medica-
 mento uteris, postea dislapsa crusta, repurgatoria ulcerum per linamenta im-
 mittes, postrema ad adstringentia progredieris, quale est emplastrum barbarum
 appellatum. Poteris etiam pro brassicæ radice, medicamenta erodentia, septica
 Græcis appellata adhibere. De quibus sequenti Sermone agetur. Post humoris
 exclusionem, ne rursus collectio fiat, huiusmodi malagmatis uteris. Cereæ sesqui-
 libram, picis dodrantem, ammoniaci thymiamatis lib. i. et dodrantem, aluminis li-
 quidi sesquiuncia aut sextantem. Aliud Asclepiadæ, ad herniam aquosam ac-
 commodatum, quod perfecta erosione, & humoris exclusione adhibetur, persæ-
 natæ omnem duriciam resoluit, picis aridæ lib. iiii. cereæ terebinthinæ, ammo-
 niaci thymiamatis, galbani, thuris, singulorum lib. i. aceti sextarios iiii. olei cy-
 prini quantum satis est. Picem tritam cum aceti sesquiseptario coquito. Deinde am-
 moniacum cum modico aceto tritum adijcito, & parum feruere linito, postea ceram
 inijecto, eamque liquefacta, galbanum ac thus aceto trita ammisceto, omniaque unita
 & ab igne ablata ad residuum aceti in mortarium mittito, & cyprino adstillato
 probe subigito, ac utitor. Præclare facit etiam emplastrum ex lilijs, quod Ser-
 mone decimo quinto inter Nigra habetur. Sunt etiam medicamenta quæ ci-
 tra uestionem ac erosionem, humoris discussionem promittunt. Quale est hoc
 quod habet. Spumæ argenti drach. vi. salis fossicij, atramenti futorij, singu-
 lorum drachm. x. cerusæ drachm. xiiii. terebinthinæ drachm. xi. olei libram
 unam. Spumam argenti, cerusam, sal cum oleo donec non inquinent coquito.
 Deinde atramentum futorium cum aceto tritum addito, cauendo ne efferve-
 scat, atque ubi parum ebullierit terebinthinam addito, & ab igne ablata in mor-
 tario subigito, & repositis utitor. Aliud, ad quæcunque sine scalpro curare
 uolueris. Cereæ, spumæ nitri, rubricæ sinopidis, nitri, singulorum sextantem,
 terebinthinæ, mannæ thuris, mastiches, singulorum drachmas xviii. olei he-
 minam i. aquæ marinæ siue muriæ sexuncem. Arida cum muria diluito, & li-
 quefacta ammisceto, ac unitis utitor. Aliud Nasturtij. drachmas xxx. ni-
 tri drachmas. x. fimi columbini drachmas. vi. galbani, terebinthinæ singulo-
 rum drachmas xx. liquefacta cum aridis committito, ac utitor confidenter.
 Confert & phittacium inscriptum, quod Sermone decimo quinto inter em-
 plastra mollientia ac discutientia habetur. Hoc ego ad hernias aquosas usus-
 sum, & primum tumorem emolliuit & ualde compescuit, ac post paucos dies
 exudantibus testiculis plurimam aquam extraxit. Aliud ad herniam aquo-
 sam, ualde efficax. Carnium uuarum passarum, ammij, terebinthinæ, singulorum
 drach. vii. nitri rubri drach. x. mellis optimi sextantem. Arida seorsim teri-
 to ac cribrato. Inde uuas passas probe contusas ammisceto ac unito, deinde mel-
 lē cum terebinthina modice coctum addito, et ad emplastrum formam adigito, et linteo ex-
 cepta adhibeto, ac lata fasciola deligato, ægrumque quiescere iubeto, & a balneo ac
 uehementi

uehementi motu abstinere. Solues autē hoc alternis diebus, et spongia locisfo-
uebis, ac rursus impones. Vtere etiam emplastris discussorij ac resiccantibus
ad hydropicos suprà descriptis, et præcipue eo quod Veste nomine inscribitur.

De Hernia intestinorum, Ex eodem.

Cap. xxiii

Hernia intestinorum est intestini aliquando ad inguen, aliquando ad scro-
tum delapsus, qui multarum molestiarum autor est. Nam et deformitatem, &
miserā uitā, & mortis periculū inducit, quando intestina duris recrementis di-
stenta, ad scrotū delata cōdensantur. Inde enim tormina uoluulosa, ac saepe in-
flamationes succedunt, ex quibus perniciēs consequitur. Generatur hoc malū
aut peritonæo membrana aluum ac intestina amplectente nimium extēta, aut
eadem rupta. Si ab extensione fiat, primum quidem laxitas ad inguen procum-
bit, & summa uentri incumbens pars conuellitur, simulq; pili pubis reuulsi
conspiciuntur. Verum postea tumore aucto scrotum uiolatur ac intumescit. Si
uero rupta fuerit peritonæi membrana, quæ ad inguen pertingit, intestinum
per rupturam delatum rubicundæ tunicæ innititur, & hæc tandem temporis
mora oppressa, etiam ipsa inferius prolabitur. Quod si plaga adeo uiolenta con-
tigerit, ut simul et peritonæi membrana, & rubicunda tunica rumpantur,
tunc intestina repente nudo testiculo occurrentia ad scrotum præcipitantur.
Caterum nosse expedit, intestinorum herniam qualiscunque fuerit, semper a-
quosa esse deteriorem. Quæ uero propter extensionem peritonæi membranae
fit intestinorum hernia, difficilior sanatur quàm quæ propter eiusdem ruptu-
ram. Et sanè intestinorum hernia extreme mala, sola chirurgia curari potest,
cæq; graui ac periculosa.

De Hernia inguinis.

Cap. xxiiii

Inguinis hernia propter peritonæi membranae extensionem facta, in princi-
pio adstringentibus appositis, aliquando curari potest. Tutior tamen est ultio,
si peritus artifex contingat. Nunc autem quo pacto hoc malum medicamentis
adhibitis ac ligamentis sistamus, ut ne in peius procedat ostendimus, & simul
quomodo succedentibus accidentibus sit occurrendum. Proinde delapso ad
scrotum intestino, & uoluulosis torminibus diuexantibus, statim conabimur,
dediui locato ægro, diductis cruribus intestina sensim ad inguen reducere, ac
reducta commodis ligamentis retinere. At si partes scroto uicinæ uehementib.
doloribus unā cum inflammatione uexentur, tormina item ac flatu adstant, tam-
diu differenda est reductio donec quieuerint. Et interim partes uicinas alternis
diebus, primum lana succida oleo ac uino imbuta, deinde etiam illitionibus tri-
gabimus. Et dolentes partes circumscarcificabimus. Neglectæ enim sæpe mor-
tificantur. Declinante malo emplastra adhibebimus, quale est Mnaescæ in-
scriptum, et alia huiusmodi. Et ut ne recidat æger, asseruandi gratia perpetuis li-
gamentis utatur. Presbyteri Emplastrum ad herniam inguinis. Thuris, myr-
rhæ, glaucij, opopanacis, sarcocollæ, tragacanthæ, gummi, glutinis taurini, gladi-
nis piscium, cinnabaris quo fabri ferrarij utuntur, carnis cochlearum terrestrium,
singulorum sexuncem, fecis uini adstringentis ueteris quantum satis est glu-
ten utrumq; et quæ macerari possunt in uini fece macerato, atq; aridis tritis
ammisceto, & ad emplastri formam reducito, imposito, alligato, et quiescere iu-
beto, ac septima die soluito. Ad intestina prolapsa. Symphyti libram unam,
mannæ thuris quadrantem, candidi ouorum recentium unā cum uitello, nu-
mero sex. Symphytum tritum ac cribratum in fictile uas cōiicimus, eiq; thuris
mannā siue pollinem unā cum ouis subactum addimus. Deinde fusillo adipe
ueteri

ueteri adiecto ad emplastri formam redigimus, atq; hoc intestino prius reducto adhibemus, & ligamento alligamus. Aliud, Folia et teneras cupressi pilulas impone et alliga, Et si sicca fuerint, in uino prius coque. Hoc auxilium inquit Galenus, omnibus corporibus nimio humore flaccidis confert. reficit enim & corroborat. Decimo autem die id exoluere ac renouare oportet, ita ut ter repetatur, & puer interim per triginta hos dies in lecto decumbat, & cupressi decoctum bibat. Aliud celebre. Aloës, malicori in uino nigro cocti, succi hypocisthidis, thuris, glutinis fabrilis, singulorum æquales portiones. Gluten in passo donec dissoluatur coquito, ac probe terito, & reliqua minutissime trita ammisceto, ac utitor uelut iam sæpe dictum est. Aliud, Balaustrorum sex uncem, thuris, aloës, rhois coriarij, glutinis fabrilis, corallorū, singulorum quadrantem, malicori, gallarum, singulorum lib. i. Gallas & malicoriū in uino nigro ē uinaceis expresso coquito, & postea in mortario terito, et ad tria reliqua cum polygoni succo dissoluta addito, et omnia melle cocto excipito, ac utitor uelut dictū est. Emplastrum datum cuidam adolescenti ob herniæ intestinalis turpitudinē summe anxio, ex quo sanatus est. Resinæ siccae, ammoniaci thymiamatis, bituminis, sulphuris uiui, æquales portiones. Liquabilia liquato, eisq; ab igne ablatis sulphur adijcito, et in mortario ad emplastri formam redigito, adhibeto ac alligato. Oportet autē splenium in quo adhibetur calfactū apponere, neq; frequenter amouere, sed sinere donec sponte decadat. Quidam pro ammoniaco picem, quidam alcyonium iniiciunt. Aliud. Terebinthinæ sesquunciam, cere, thuris, myrrhe, glutinis piscium, carnis cochlearum, singulorum unc. i. Glutē per triduum aceto maceratur: Deinde in mortario teritur, et ad prunas eliquatur, rursusq; teritur, et ad ipsum reliqua trita ammiscetur. Vter præterea Iside inscripto emplastro, quod Sermonē x v. inter emplastra multiusus habetur. Aliud Theodori, admirandum ad herniam intestinorū, quod nos experti sumus, & cum multorum admiratione sanauimus. Curat magnas et diuturnas affectiones. Chartam in aqua frigida ad tridū madefacito, et ubi humorem uelut spongia imbibit, ex ea pilam facito, quam reducto prius intestino, inguini adhibeto ac alligato, neq; ante tertium diem exoluito. Tertio em die miraberis de efficacia ipsius. At uero ægro minime indicabis quid sit id medicaminis, sed chartam uel panniculo inuolues, uel atro colore tinges. Neq; uero tu uilitatem rei despicias. Aliud, intestinorum hernias agglutinans. Chrysocollæ, glutinis piscium, lapidis gagatæ, rhois coriarij, acaciæ, symphyti, carnis cochlearum, singulorum sesquunciam, ammoniaci thymiamatis, lapidis pyritæ, lapidis magnetis, aluminis scissilis, thuris, sulphuris uiui, alcyonij, picis brutæ, nitri, singulorum unc. i. Gluten piscium in uino nigro austero macerato, postea in pila terito, et ad prunas cum eodem uino eliquato, et rursus terito, & ad ipsum reliqua trita ammisceto, quo solidum emplastrum fiat, quod inguini adhibebis ac deligabis, ægroq; quiescere iussu septima die solues. Verum ante adhibitionē locū alicuius ualde adstringētis decocto rigato. Sunt qui prædicta myrteo cerato excipiūt. Ego uero acaciā, thus, ammoniacum, seorsim in uino macero ac tero, atq; ad gluten piscium recte præparatum ammisco. Deinde cochlearum carnibus tritis adiectis, itemq; reliquis tritis, ad emplastri compositionem redigo, quod crassissime inguini impono, & charta imposita deligo.

Aliud Oribasij, picis liquidæ, terebinthinæ siccae, singulorum lib. i. uisci sexuncem, propolis trientem. Quidam etiam colophonix sextantē, galbani sextantem, picis & colophonix liquatis, terebinthinā, deinde galbanum et propo-

T t lim

lim in mortario prius trita ammisceto, statimq; ubi ab igne sustuleris, uiscis adijcito, & rudicula agitato donec frigescat, facit ad strumas, meliceridas ulcera, et inflammatos sub alis tumores, & ad abscessus colli. Repurgat et agglutinat. Aiunt porro Aëtien lapidē gestatum ut inguen contingat, prohibere, ne intestinū assidue delabat. Idē etiā tritus recte medicamentis quę imponūt ammiscet.

De Emplastrorum præparatione ac coctura, &

quę in ipsa consiciuntur. Galeni.

Cap. xxv.

Emplastrorum cōpositionis multæ ac uariæ particulares differētiæ sunt. Quędam enim ipsorum ad cruenta uulnera commoda sunt, itemq; uulnera agglutinant, atq; fracturis conueniunt, aliqua maturant, aliqua discutiūt, aliqua attrahunt, aliqua sinus explent, alia resiccant, alia cicatricem inducunt, alia leniunt, alia pinguia sunt. Quorum omnium uarietates uaria simplicium medicamentorum natura distinguit. Quapropter prius simplicium uires cognoscere oportet. Ita enim etiam compositorum facultates et causas, propter quas inter se differunt, dinoscemus, ut non solum singulorum naturas intelligamus, sed componendi quoq; artē ediscamus: quo si forte liber in quo pharmacorum cōpositiones quibus utimur scriptas habemus, interciderat, ipsi consimilia mihi notis componere possimus. Graue enim fuit id quod duobus medicis mihi notis contigit: Quorum alter ob huiusmodi scriptorum ammissionem mœrore contabuit, alter uero medicandī artem desiuuit. Adest autem exercitatus, ad hoc quod pharmaca componere possunt, etiam iudicandī facultas de his quę priores medici descriperunt, ut et his quę ab illis scripta sunt commode uti possis, & his quę ipse iuxta rectā methodum composuisti, præstat tamen his quę longo experimento probata sunt uti, quānt noua usurpare. Sed uelut dixi necessitas aliquando nos cogit in peregrinationibus, ut noua quedam & experimentis non cognita usurpemus. At uero si omnibus præter naturam affectionibus simplici medicīna mederi possemus, cōpositis non opus haberemus. frequenter enim ad certum quendam modum corpus calfacere uolentes, nullum simplex quod id facere possit reperimus. Nam medicamentū curandæ affectioni correspondere oportet. Quin & aliqua simplicia citra alterius mixturam in usum deduci non possunt. Velut quando medicamentum meatus obducens adhibere uolumus, nullum simplex ad hanc rem idoneum habemus. Neq; enim bitumē, neq; cera, neq; resina, neq; pix, neq; propolis, nec ladanum, nec ærugo, nec cerussa, nec argenti spuma, nec alia metallica, talia sunt. Ideoq; qui primo medicinalia emplastica & meatus obducentia excogitauerunt, cum oleo miscuerunt, coxerunt, & liquabilia eliquarunt. Deinde herbas siccas tritas ammiscuerunt. Contrā in aliquibus affectionibus, unico quidem simplici medicamento opus habemus, sed alia quædam illi miscemus, uel ad uirium ipsius uehementiam obtundendam, uel ad saporis asperitatem mitigandam, uelut quum ad purgantia medicamēta, quicquā ammiscemus ex his quę stomacho grata sunt. Et ad dolorem sedantia, quædam uim ipsorum lenientia, uelut castoreum & cetera huiusmodi, ad opium & mandragoram. Tunc autē maxima componendī pharmaca necessitas est, quum morbus contrarias facultates inter se requirit, uelut repellentes simul et extergentes, aut inspissantes & simul attenuantes, quale est quod ex papaueris capitibus ac melle paratur. papauer enim tenues destillationes à capite inspissat. Mel autem humores ad pectus iam delapsos, reiectu faciles facit. Necessariō præterea componuntur medicamenta, ut idem medicamentum habere possimus ad plures morbos congruum, uelut ad uirus eiaculandi.

lantium bestiarum ictus, & ad uenenosas potiones. De Antidotis ergo & epithematis satis supra tractatum est. Cæterum eorum quæ in emplastra inijciuntur, quædam terrea sunt, ueluti metallica, & lapidum ac terræ species, fecesq; ac cineres & testæ, quædam oleosa, quædam lachrymæ, quædam liquores, quædam succi, quædam liquabilia, quædam semina, quædam herbæ, quædam radices. Et rursus quædam qualitatibus expertia, quædam acria, quædam adstringentia, quædam calfacientia, quædam extensoria, quædam maturantia, aliqua diffundentia, aliqua mollientia, aliqua discussoria, & innumeræ aliæ differentię reperiuntur.

Spuma igitur argenti exsiccat, extergit, calefacit ac refrigerat moderate, ad omnia æqualiter efficax. Hæc aliquando in oleo solo, aliquando aqua aut uino, aut aceto ammixto coquitur. Primo autem seorsim exactissime terenda est, deinde rursus cum oleo ad strigentiam compagem redigenda, atque ita assidue agitata ad lentum ignem coquenda. Intumescit primum ac bullas emittit, quum autem sufficienti cocturæ propinqua fuerit, colorem fecis induit. Mensuram uero cocturæ iustam recipit, quum tumor contractus fuerit, neq; amplius inquinat. Similes spumæ argenti uires plumbago habet, ad frigiditatem tantum magis progressa, nec pariter extergens. Eodem etiam modo coquitur, nisi quod in eius coctura non solum queritur ut ne inquinet, sed ut colorem quoque ex igneo rubore, ad fuluum ac ualde floridum transmutet. Aesustum adstrictionis & acrimoniæ particeps est, contrahit, cicatricem inducit, & ab inflammatione tutatur. Quum autem coquitur non statim in principio immittitur, sed emplastro iam semicocto, Mensuram cocturæ, nisi ualde modicum inijciatur, color indicat, ut uidelicet exuberet, & fuluum emplastrum faciat. Squama æris carnem erodit, adstringit, & ualidius glutinat quam æs, sed minus discutit. Coquitur sicut æs, & eodem tempore inijcitur, eandemq; cocturæ rationem habet. Nisi enim color eius exuberauerit & fuluum emplastrum effecerit, nondum ad iustam cocturam peruenit. Squama uero ferri, præsertim stomomatis, ampliori adstrictione participat, quapropter ad malefica ulcera illi præfertur. Eodem autem tempore inijcitur, & rutilum colorem inducit. Diphryges mixtas uires habet, adstrictoriam cum acrimonia. Quare ad putrida ac maligna ulcera utilis est. Et hoc medio cocturæ tempore inijcitur, bullitq; donec color eius exuberet, neque amplius inquinet. Chalcitis adstrictione simul ac acrimonia participat, contrahit, attenuat, discutit, aperit, & amplius superioribus adstringit, ac minus mollit. Vsta uero tenuior euadit, & adstrictionem perdit.

Coquitur sicut æs, citius tamen liquefit. Mensura cocturæ est, ut rubicundius, ac puniceis coloris emplastrum faciat. Misy similes chalcitidi uires habet, tenuiorum tamen partium est, & ideo magis attenuat, discutit & aperit. Sed minus mollit ac adstringit. Ad finem uero cocturæ inijcitur, neque ullam mensuram exhibet. Sori quoque similes chalcitidi uires habet, nisi quod magis terrem ac crassum est, atque ideo magis adstringit. Inijcitur & ipsum medio cocturæ tempore, & tardius liquefit, & nisi quid prohibuerit, atrum colorem reddit.

Flos æris tenuior est ære usto & squama æris, participat non nihil absterforia ui, ideoq; attenuat & agglutinat. Coquitur uelut de ære diximus. Atramentum futorium ex mixtis facultatibus constat. Valde enim adstringit, neque ingenerose calefacit. Præ omnibus itaque humiditas carnes siccare, omnemq; humiditatem consumere cogereq; ac adstringere potest. Inijcitur medio cocturæ tempore, & liuidiorem emplastri colorem facit. Imò nisi alia obstiterint, atrum eius colorem faciet. Auripigmentum & sandaracha ambo

Ti 2 urendi

urendi facultatem habent, Magis igitur prædictis discutiunt, & usta tenuioris essentiae sunt. Inijciuntur autem ad cocturæ finem. Plumbumustum ex his quæ citra erosionem siccant, efficacissimum est ad maligna, chironiaq; ac cancerosa ulcera, habetq; per se, & cum alijs mixtum, facultatem inducendi cicatricem. Inijcitur medio cocturæ tempore. Cerussa meatus obducit, & moderatè frigida est. Cocta uero siccior seipsa euadit. Hæc in emplastra alba, ad finem cocturæ inijcitur. Sic enim colorem conseruat, et magis inalbat. In nigra uero, aut melina statim in principio inditur. Aerugo æris acrimoniae particeps est, discutiendi incidendiq; ac consumendi omnem carnem uim habet, plurimo autem cerato ammixta extergit ac cicatricem inducit. Hæc in emplastra uiridia post cocturam inijcitur. In quibusdam uero ne inijcitur quidem in ollam, sed cum aceto in mortario teritur, & reliqua ad ipsam affunduntur. In melina uero emplastra medio cocturæ tempore inditur. At in ea quæ geminam faciem ac colorem præ se ferunt, statim à principio inijcitur. Dum enim coquitur ærugo primum melina, deinde bicolor, postremum fulua efficitur. Alumen omne uehementissimam habet adstringendi facultatem resicatoriam & agglutinatoriam. Omnium autem tenuissimum est scissile. Inijcitur plerumque post cocturam, neque peculiarem cocturæ mensuram habet, color eius plerumque ad uiriditatem mutatur. Rubrica adstringit, resiccant, agglutinat, inijcitur in fine cocturæ. Cadmia exterioriam uim habet, caliditate & adstrictione temperata. Usta lota sine erosionem extergit ac resiccant, pompholyx quoq; lenissimū pharmacum est, & malignis ac ulcerosis ulceribus congruum. Inijciuntur ambo in cocturæ principio. Sal mixtam facultatem habet extergendi ac adstringendi, magis tamen adstringit, & ualde resiccant. Nitrum autem extergendi incidendiq; ac exsiccandi uim habet. In attractorijs emplastris sal ipsi misceri solet. Et ambo medio cocturæ tempore induntur. Sulphur omne attractoriam uim habet, calidæque ac tenuis essentiae est. Inijcitur in fine cocturæ. Nigrefacit enim emplastra. Atque hæc quidem metallica sunt quæ in emplastra inijciuntur. Terræ uero in ipsa induntur, samia, erethria, cimolia, ampelitis & lemnia. Ex lapidibus autem phrygius, alius, pyrites, hæmatites, magnes, achates, iaspis, gagates, cos. Horum uires superius exposuimus. Inijcitur et pumex, extergendi attenuandiq; ac discutiendi uim habens. Testæ præterea conchiliorum usta ac crudæ, tanquam attenuantes, extergentes, ac discutientes, et resiccantes, ad sinus glutinandos ammiscentur. Idem præstant & fictilium testæ, exterioriæ etiam ipsæ ac resiccantis facultatis. Inijcitur item calx tanquam præclare resiccans, & ad cicatricem perducens. Cinis uero præsertim sarmentorum sinus agglutinat, callósque extergit ac resiccant. Hæc omnia terrea in fine cocturæ inijciuntur. At uero in pinguiâ emplastra oleum recipientia, oleum statim à principio cum metallicis inijcere oportet. Si uero cum resina quadam, aut pice liquida emplastrum paretur, & oleum statim ab initio inieceris, incohærens faciet medicamentum. Quapropter ut compages fiat, resinas liquidas prius indere oportet, deinde in fine oleum superaddere, atque ita rursus ad bonam compagem coquere. Reliquæ pinguedines, & præsertim adipēs recentiores tenerrimi, medio cocturæ tempore inijciuntur. Ex unguentis ininum quidem cocturam sustinet, cyprinum uero & rosaceum, minus ferunt, cetera omnino non tolerant. Quapropter hæc in fine cocturæ inijcies. Nunquam porro calefacit & moderatè mollit, minusq; glutinat uulnera cruenta. Nunquam

quam coquitur per se, ita enim uratur: Neque cum resina aut piceliquida, ita enim incompacta maneret: Sed iniicitur ad oleum purum, uel aliud cum metallicis coctum, aut ad resinam uel picem præcoctam. Resina omnis multo magis quam cera calefacit, discutit, mollit, extrahit & aperit, ac cruenta uulnera glutinat. Et arida quidem resina post ceram iniicitur, liquida uero seorsim præ cæteris omnibus coquitur, nisi admodum fuerit modica. Pix uires omnes resinæ habet, sed ualidiores. Iniicitur præ alijs omnibus. Mensura cocturæ liquidæ est, ut cogatur. Siccæ uero, præsertim si cum aceto coquitur, ut non amplius bullas emittat, neque intumescat. Bitumen cruenta uulnera glutinat, & præclare calefacit ac resiccat, & sinus implet. Coquitur statim ab initio iniectum. Verum non minute tritum id iniicere oportet, habet enim asperitates ficuum granis similes. Quare crassius contundendum est, & in aceto coquendum citra agitationem, donec non amplius bullas emittit. Agitatum enim in grumos coquitur. At si absque aceto coquendum est, oleo simul additum facile liquefcit. Propolis calefacit, discutit, maturat, extergit & attrahit. Hæc præmolliore oportet, atque ita coquere ab igne ablatis iniectam. Nullam enim ampliorem cocturam tolerat. Ammoniacum mollit, discutit, calefacit, putredinem educit, attrahit. Iniicitur medio cocturæ tempore. Et si quidem conteri ac cribrari potest, leuissimum insperges. Sin minus, cum liquore quopiam leuigatum immittes. Cum aceto quidem aut uino, si ad cruenta uulnera emplastrum paratur. Si uero ad fistulas aut strumas, penitus cum aceto. Si uero molle fuerit emplastrum, qualia sunt quæ ad sedem parantur, cum aqua, ita ut ad reliqua refrigerata infundas, ut ne efferuescant, ac rursus coquas. Opopanax magis calefacit quam ammoniacum, discutit & resiccat. Iniicitur peracta coctura, qua penitus modica opus habet. Et hunc aceto aut uino prius terere oportet. Galbanum ualde calefacit, concoquit ac discutit. Cocturam autem penitus non tolerat. Itaque ablato ab igne medicamento probe mollitam iniicere oportet. Aut cum aceto uel uino ad strigmentitiam compagem dilutam reliquis ammiscere. Sagapenum uires habet galbano similes. Magis tamen discutit & attenuat. Iniicitur in fine aceto aut uino prius tritum, ita ut cum ablato ab igne emplastro emolliatur. Bdellium calefacit, discutit, attrahit, mollit. Iniicitur tritum post peractam cocturam. Si uero pingue fuerit, ac teri non possit, in mortario tusum cum emplastro emolliatur. Thus parum calefacit, præclare maturat, modice attrahit, & sinus glutinat pollin eius, similes uires habet, magis tamen adstringit. Quare medicamentis ad cruenta uulnera commode miscetur. Iniicitur utrumque in fine cocturæ. Myrrha calefacit, concoquit, attenuat, discutit, & exsiccat, facit ad uulnera cruenta. Iniicitur in fine cocturæ cum aliquo liquore qui emplastris miscetur contrita. Aloë ex uarijs facultatibus constat. Adstringit enim, calefacit, attenuat, discutit, sinus glutinat ac resiccat. Additur post omnem cocturam. Succus papaueris strenue perfrigerat, dolores ac inflammationes mitigat, & cruenta uulnera glutinat. Hic pridie in aqua modica maceratur, & in mortario teritur, atque sic emplastrum ad ipsum diffunditur. Thapsia calefacit et rubificat cutem. Iniicitur postrema liquore quodam trita. At uero nulla herba, aut radix, aut semen, cocturam tolerat, celerrime enim torrefiunt. Teruntur igitur ac manent in mortario, & liquefacta reliqua ad ipsa diffunduntur. Aliquando tamen herbas aut radices præmaceratas, in oleo coquimus, & expressas abijcimus, & oleum ad medicamenta assumimus.

Parua & superficialia uulnera, natura sua sponte nullius medicamenti indiga sanare solet, labia solum à nobis contrahantur, & ligamento circundentur, ne pilus, aut arena, aut tale quid illabatur, et ulcus penitus coalescat. At si amplius fuerit uulnus, ut labia contrahi non possint, & sanies congregetur, aut urgeat dolor, tale uulnus sola labiorum contractione agglutinari non potest, sed per medicamenta resiccantia collectam saniem consumere, & affluentem prohibere oportet, talia uero sunt agglutinatoria pharmaca inflammationem arcantia. Si uero uulnus profundius fuerit & in superficie angustius, scalpello incidatur, ut æqualis amplitudo fiat, & inlinuati humores non putrescant, neque uicinas partes corrumpant, proinde qui cruenta uulnera glutinare uoluerit, hæc consideret, & præ omnibus grumos diligenter ex uulnere educat. Quantulacunque enim eorum pars in cauitate relicta in pus conuertitur, & carnes subinde putrescit. Educemus autem grumos spongiarum mollium assiduo frotu, atque he non in omnibus ex aceto exprimantur. Sed si uulnera sine eruptione sanguinis fuerint, aqua solum foueantur, ita enim carnem nihil offendemus, quam adstringens acetum impedit ne cito coalescat. At uero profundiora uulnera penitiores & difficulter extirpabiles grumos in se habentia, aceto rigabimus, quod ex spongia usque ad fundum ipsorum exprimemus. Acetum enim ad dissoluendos grumos efficax est, per adstrictoriam facultatem aperta uasa occludens, allationemque sanguinis cohibens, quibus omnibus à principio intentum esse conuenit, etiam si alias acetum obturando corpora, tardiores faciat uulneris unionem. Cæterum si in capite uulnus fuerit, supra relata membrana caluariam ambiens considerata est, an illæsa aut simul pertusa sit. Si enim illæsa permanserit, labia futuris protinus contrahes, & agglutinatorijs uteris. Si uero perforata aut contusam repperis, ad tutiorem curationem membranam dissecabis, & os diligenter derades, linamentaque conuulsa indes, & forinsecus splenium inflammationem arcens impones, & supra id lanam succidam seu spongiam molliissimam, uino aut aceto imbutam ac expressam, sine oleo adhibebis, præcipue si sanguinis eruptio præcessit, postea fasciolam lineam aceto rigatam ac expressam obligabis, uinculi capite in uulneris loco statuto, quemadmodum in artuum fracturis fieri solet. Studio uero habendum est ut ligatura sursum uergat. Verum constrictionem eius moderatam esse conuenit. Nam uehementior dolorum excitat, laxior inutilis est, post tertiam diem uulnus fractura carens spongijs foueatur, deinde linamenta medicamento suppuratorio illita indantur, & reliqua suppuratoria curatio adhibeatur, postea ad repurgandum ac incarnandum progressus fiat, quemadmodum paulo post de ulceribus indicabitur. porro quoniam rupta caluariæ membrana, ubi uulnus negligitur, inflammatio conuenit, si in principio inflammationis uoceris, protinus liccare uulnus conare, & membranam diducere atque os caluæ deradere. uulnere enim diducto, inflammatio antequam excandescat suppressitur: facta dissectione linamenta indes, & ad ea retinenda linteum uino et oleo imbutum, aut splenium inflammationem arcens, forinsecus impones, & supra hoc lanam uino & oleo imbutam adhibebis. Et deinde ad suppuratorium ductu te conuerteris. Si uero inflammationem uehementem natu fueris, derasis capillis locum aqua moderate calida rigabis, & medicamenta adhibebis inflammationem sedantia. Inflammatione uero sedata, membrana caluam ambiens suppuratur, & uicina partes abscessum patiuntur. Quapropter expedit ut dissecetur uelut dictum est, & pus excernatur, ac

tur, ac calvaria os deradatur, & postea communis ulcerum curatio fiat. Si uero fractura in capite aut alio loco una cum uulnere fuerit, emplastrum ad fracturas accommodatum imponatur. De eo uero partem quadrangularem refecare oportet, quo loco uulnus existit, aliudque paruum splenium uulnere imponere, quale diximus. Atque hoc paruum splenium quotidie tollendum est, & ulcus curandum, ac deligandum. Caterum agglutinatoria medicamenta Sermonem x v. scripta habentur.

De fauciatis nervis. Galeni.

Cap. xxvii

Nervus uulneratus aut punctus, dolorem & inflammationem uehementissimam habet, propter sensus subtilitatem. Quapropter cutis uulnus inagglutinatum seruare oportet, quo per ipsum saniosi humores effluant. Vbi uero uulneris os latius fuerit, conari ut reliccantibus medicamentis labia ipsius committantur ac uniantur. At si per acum aut paxillum, aut tale quiddam, uulnus inflictum fuerit, & in altum progressum, id saltem studio habendum est, ne inflammatione sequatur. Effetque longe tutius ut cutis circa uulneris osculum disceretur, quo commodius in altum procederent uires medicamentorum. At uero si uires ualide fuerint, & nihil impederit, uniuersum corpus per uenam sectionem euacuetur. Seruandaque est in euacuando locorum affinitas, ut dextra manu fauciata, dexter malleolus siue talus, sinistra sinister incidatur. Et uice uersa dextro crure uulnerato subalaris uena dextrae manus, sinistro sinistrae, rectitudine seruata secetur. Si uero subalaris non apparuerit, mediam secabimus. Quod si corpus uitiosis humoribus repletum fuerit, purgatione per idoneum pharmacum utemur. Caterum aqua calida quae reliquis inflammationibus commodissima est, his infestissima existit. Ab humectantibus enim & calfacientibus putrefactio inducitur, praestat igitur nervos fauciatis oleo moderate calido tenuique ac nihil adstringente rigare, tale autem est dulcissimum, quod melius longe fuerit, si annos duos aut tres habuerit. Nervus enim fauciatus curatio medicamentis opus habet, quae tepidam caliditatem habent, ualde uero siccant, atque hoc citra molestiam, & quae substantia tenuissima praedita sunt. Huiusmodi enim sola sine partium distensione ac mordacitate, saniem ex alto euocare possunt. Quapropter oleo in quo anethum & ruta decocta sunt calido perfundimus. Saepae etiam ceratum ex Euphorbio, aut emplastrum Anicetum, aut quoddam ex his quae ad uulneratos nervos describuntur, modico oleo liquatum adhibemus. Deinde emplastro aliquo ex praedictis imposito, lanam oleo calido imbutam extrinsecus illigamus, & per singulos dies bis aut ter soluimus. Et si longiores fuerint noctes, nocturno quoque, praesertim ubi mordacitas uulnus irriteret. Quod si neque mordacitas, neque dolor percipiatur, bis tantum in die, & circa uesperam semel soluimus. Et praeterea alas ac collum oleo calido large rigabimus. Si uero nervus in crure fauciatus fuerit, inguina ac rotam spinam & collum, oleo item calido ubertim perfundimus. At uero si nervorum uulnera a principio male fuerint curata, maxima inflammatio ac putrefactio sequi solet. Itaque farinam ordeaceam, aut fabarum, aut erui in lixuium cum aceto mulso coctam imponere oportet. Est enim hoc cataplasma efficax ad ea quae iam putrescunt. Si uero uehemens inflammatio cum maximo dolore infestauerit, farinam erui aut fabarum cum optima sapa, modico aceto addito coctam imposito, calido oleo prius affuso. Ceratum uero ex euphorbio ad nervos uulneratos, cuius paulo ante mentionem fecimus, hoc modo praeparatur. Ceræ, terebinthinæ, olei, singulorum trientem, sextantem,

Tt 4

sextantem,

sextantem, aut biennalis quadrantem, aut prorsus antiqui trientem. Et si terebinthina defuerit, colophoniam pro ea accipito. Longe uero præstantius erit det medicamentum, si propolim pinguem ac recentem acceperit, ut sit terebinthinæ quadrans, propolis triens, ceræ unc. i. olei triens, euphorbij sextans. Deficiente uero euphorbio, sulphur, aut castorium, aut conlimile quiddam calidum ac tenuium partiū ammiscabis. Quod si omnino ab exacta & media phar macorum ad fauciatos nervos compage aberrandū sit, præstat ad molliorem cō pagem declinare, etiam si ita paratum inquinet, optimum præterea ad eundem usum pharmacum est ex brutia pice & opopanace, quod etiam ad morsus canis rabidi facit, præcipue si corpora contingerint rabustiora. Nam in tenerioribus per ceratum ex oleo aliquo discussorio uires eius mitigare potes, quale est irinum, aut amaracinū, aut opobalsamū, aut oleum uetus. Egregie facit & Ancerum, quod Sermone x v. inter emollientia medicamenta habetur. Quin & ex metallicis constans pharmacū, efficax est ad neruorū punctiones. Habet id hoc modo, Chalcitidis crudæ dra. viii. misyos crudi drach. x vi. squamæ aris dra. x xiiii. ceræ dra. x c vi. olei dulcis aut ueteris, æstate quidē dra. c viii. hyeme uero centū. x x. thuris dra. x xiiii. terebinthinæ dra. x vi. galbani dra. x ii. aceti acerrimi & antiqui quantum satis est. Metallica ad solem æthiūm pluribus diebus terito, indeq; addito thure rursus conterito, & quæ liquari possunt liquata affundito ac subigito. Hoc medicamētum uulnere appositū inflammatio nem arcet, uelut sæpe experti sumus. Admirandū præterea ad fauciatos nervos medicamētū est quod ē seneciōe paratur, et habet Seneciōis succi unc. x xiiii. olei antiqui, olei cyprini, olei dulcis, apochymatis siue picis ē nauibus erasæ, singul. trientē, galbani, æruginis, singul. drach. iiii. terebinthinæ dra. vi. adipis ueteris dra. x i. ceræ dra. viii. resinæ pinus sicca dra. vi. Succum cū oleis coquito donec propemodum consumatur. Aeruginē uero cum modico succo terito, & quæ liquari possunt liquato ac excolato, iniecta q; terebinthina cum decoctis unito, postremumq; omnia ad æruginem tritam diffundito ac subigito: facit ad maximas musculorum in uulneribus inflammationes. Et duricias ac recentes puerorum strumas dissoluit. Porro qui fauciatos nervos habent, urgente necessitate post septimam, uel ubi dolor penitus quieuit, lauari possunt. Verū lauandis medicamēta uulnere indimus, & forinsecus multiplicia lintea oleo imbuta imponimus, & fasciam ex linteo obligamus: deinde ægro in solium descē sūro, ligamenta multo oleo rigamus. Et post balneū remotis omnibus quæ applicata fuerant, præscriptam curationem adhibemus. At si uulnus in manu fuerit, admoneatur æger, ne id calidæ siue frigidæ lauacro humectet. Oribasi ad priuatos fauciatorum neruorum abscessus, priuatos autem uocat, quando in proximis puncturæ locis abscessus parui & multi per certa interualla oriuntur. Ceræ, colophoniæ, butyri, singulorum libram unam, picis sicca, mellis singulorum sex uncem, æruginis quadrantem, aceti quantum satis est ad æruginem conterendam ac dissoluendam.

Curatio neruorū denudatorū ac uulneratorū in ulceribus. Cap. xxviii.
Quod si neruus nō fuerit pūctus, sed manifesta dissectione incisus, ita ut etiā cutis præposita sit dissecta, et appareat nudus neruus, secūdū reſtitudinē et nō tranſuerſim dissectus: relata ex euphorbio aut metallicis medicamēta, minime adhibenda sunt. Abſtinendū etiā ab emplastro Aniceto et cæteris tāta acrimonia præditis. Nudus enim neruus uehementē ipſorum uim non feret, proinde calcem assumes lotam plurimo roſaceo dilutam. Sit autem calx in diebus canicularibus

cularibus ad solem aqua dulcissima saepe elota ac resiccata. Bonū est et ex pompholyge medicamentum plurimo ac optimo rosaceo dilutum, pompholygem autē itidem lauare uelut calcē oportet. Sed et cera in huiusmodi pharmaca recipienda lauanda est. Per oēm enim denudati nerui curationē, reliccare citra mordacitatē intendimus, quare nihil acre uulnēri admouendū est, subtilissimo enim sensu peditus est neruus, et tēperamēto frigidus, ac principalissimo principio coherēs ac cōiunctus. Sed nec oleo talē ulcus rigandū est, sordidū enim inde euadit. Verum lana molli specillo obuoluta sanies detergenda, & ne arida lana uulnus cōtingat, sapa imbuī potest, et ea expressa uulnus detergi, præterea medicamēta quæ adhibētur tepida esse oportet. Quæ enim frigida apponūtur cōuulsio nem inducunt. Ad neruos quoque denudatos emplastrum Aegyptium efficacissimum est, quod ē fuccida lana paratur, & fuluum piscatoris, ambo rosaceo diluta & linamentis indita. Omnium autem præstantissimum est & nulli comparandum emplastrum Isis appellatum, optimo rosaceo dissolutum, & cum linamento tepidum ulceri inditum. Sedat enim dolores & sordida ulcera cito re purgat, incarnat, & ad cicatricem perducit. At ubi linamenta ulceri immiseris, forinsecus emplastrum ē senecione si haberi potest, sin minus, anicetum adhibebis. Cæterum si uulnus nerui transversum fuerit, maximum conuulsionis periculum imminet, inflammatione à dissectis fibris ad integras transeunte. Quod si integre fibræ conuulsæ fuerint, eadem curatio & his, & ulceri adhibetur, parcius tamen hinc agro sanguis auferendus est, et diætā tenuis constituen da, & quies imperanda, & stratum mollissimum parandum, plurimum item oleum calidum inguinibus, spinæ, axillæ, collo, ac capiti affundendum est. Atq; hæc curatio communis ad omnia neruorum uulnera est.

De neruorum contusione.

Cap. xxxix.

Contuso neruo si cutis simul contusa fuerit, & ulceratio fiat, farinam fabaceam cum aceto mulso, aut erui farinam cum sapa et modico aceto impones. Am bæ enim sunt efficaces. Quod si cum contusione dolor adsit picem liquidam ad fabaceæ farinæ cataplasma addes, et simul cocta calida adhibebis. Si uero maiore resiccatione opus habueris, parem mensurā farinæ erui ammiscebis, itemq; iridem illyricam, si adhuc fortius resiccare uolueris. Vniuersi uero corporis curatio eadem est cum ea quā paulò antea præscripsimus. At si neruus fuerit contusus citra manifestā cutis contusionem, oleo calido discussorio, anethino aut rutaceo locus assidue perfundatur, et lana oleo imbuta adhibeatur. Reliqua uero curatio prædictis similis fiat. Porro si totus neruus fuerit dissectus, nullum quidem periculum imminet. Verum pars mutila sit, præsertim si dissectus neruus magnus fuerit. Curatio uero eadem uelut ad alia ulcera adhibetur.

De glandularum inguinis inflammatione.

Cap. xxx.

Galen.

Quum glandulæ inguinis uniuerso corpore pleno, citra aliam manifestam causam, inflammatae intumuerint, humores circa glandulas constipantur. Proinde nisi quid prohibeat, cubiti uenam secabimus, tantūque sanguinis auferemus, quantum plenitudo ostenderit. Loco uero inflammato & ante sectionē uenæ, & in ipso sectionis tēpore, adstringentia ac repellētia medicamenta apponemus. Verum postea euacuato corpore, discutientibus ea quæ affluerūt utemur. At si ulcus in crure fuerit, & per cōsensum glandulas inguinis affligerit, quæadmodū in digitorū pedis offensa fieri solet, glandulā inflāmarī incipientem

incipientē statim à principio lana oleo calido imbuta mitigabimus, nō adiecto sale, uelut aliqui faciunt. Sal enim tenuiores humores confertim discutens, reliquū callosum, ægre curabile, & sæpe immedicabile relinquit, postquam aut inflammationis feruor quieuit, mitigatoria relinquemus, & discussorijs utemur, quæ ad cerati compagem redacta glandulis imponi debent. Nam quæ duriora fuerint, eas partes distendunt, et rursus inflammationes irritant. Atq; hoc quidē modo glandulæ tractentur, ipsum uero crus statim à principio calcificiendū ac humectandū est, ita ut ulceri inflammationis causæ cataplasma mitigatoriū, aut ceratum aliquod ad sedis affectiones paratū imponas, totumq; membrum lana oleo calido imbuta foueas, & ægro quietem imperes. Sedato autem ulcere perumq; etiā glandulæ doloris exortes fiūt. Egregie uero glandulis cōfert psyllium aqua calida madefactū, et pāniculo aut brassicæ folio exceptū et impositū. Item ceratū ex butyro paratū, & quod ostrea uista recipit. Confert & discussoriū emplastrū Dionysia appellatur, et quod ē buccinis preparatur, quorū omniū præparationes Sermone x v. habentur. Vbi etiam ceratum ē psyllio est, aut emplastrum si ita appellare malueris.

De quacūq; inflammatione, Eiusdem.

Cap. xxxi

Omnis inflammatio ob sanguinis affluxū, uel à manifesta, uel ab occulta causa generatur. A manifesta, quādo ab offensus pede glandulæ inflammatur. Ab occulta, quando aliqua parte delegante, aut toto corpore trāsmitte, & affecta parte ob debilitatē recipiēte, humorū copīa affluxerit, uelut supra de podagra ostensum est. Sæpe uero etiā pars quæ inflammatur ob morbosam aliquā et præternaturā caliditatē, materiā ad se trahit. Erit itaq; inflammatiois principiū, quum prius pars sanguinea materia repleat. Augmentū uero quādo affluxus aliūde cessat, & qui in parte cōtinetur putrescere incipit. Atq; eo tēpore calor is præternaturā incrementū, & humorū diffusio, et partis dissentio longe maior est quā antea fuit. Vbi uero iam pus cōflatur, maximiq; dolores adiunt, inflammatio in uigore est. Declinationem autem dicimus, quū allapsus humor discutitur, & tumor ac dissentio minuitur, & dolores mitigantur. Inchoante itaque inflammatione, uictus ratio moderanda est, cibuscq; contrahendus, & aquæ potus imperandus. Et si inflammationis magnitudo sanguinis detractionē postulat, et ætas ac corporis habitus, & anni tempus non obstat, præsertim in hominibus sanguine abundantibus, post præstitutam uictus rationem, uenam secabimus, tantūq; euacuabimus, quantū plenitudo & inflammationis magnitudo, & ægri uires indicauerint. Verū in principio, & ante uenæ sectionem, et ipso sectionis tempore, inflammata parti cataplasmata repellentia adhibebimus. In augmento uero ex discussorijs aliqua ad repellentia ammiscemus. At in uigore dum uehementissimi sunt dolores mitigatoria applicabimus, uelut in declinatione ea solum quæ discussoriā uim habent. Inchoantes itaq; inflammationes repellat glaucium, perdicū, stratiotes in aquis nascens, plātago, polygonū et similia. Mitigant autem & dolori in uigore inflammationis commoda sunt, malua per se, & cum modico pane ac rosaceo imposita, præstat et melilotum passo coctum & cum pane impositū. Idē præstant, palmulæ in passo coctæ, & cū pane ac rosaceo subactæ impositæ. In declinatione uero agrestis malua pollet, et uugæ passæ uinaceis exceptis, cū pane ac modico melle. Itē ordeī farina cū melle aut oleo adhibita. Quod si locus affectus nimia materia turgat, nō mox ad chirurgiā propere oportet, uelut quidā faciūt, sed conari ut materia collecta pharmaca discussoria digeratur. Quale est quod ē buccinis uistis cōstat Ariobarzaniū appellatū, aut

aut Orisbasij fuluum, aut quod Dionysias appellatur ē misy paratum, & reliqua eius generis, quæ Sermone x v. habentur. At si residuū ex inflammatione callosum factum fuerit, uehementioribus medicamentis utendū erit, ita ut singulis diebus bis quantum ea proficiant inspectemus.

De abscessibus.

Cap. xxxii

Si inflāmationes producantur, & ad suppurationē conuertantur, adiuuare oportet ut q̄ celerrime trāsmutētur, proinde partē affectā altheæ ac ficuū decoctiorigabimus, & farinā ordeī aut panē cum aqua et oleo imponemus. Quod si aggre suppuretur inflāmatio, hordeū aut panē in pinguiū caricarū et altheæ decocto coctū imponemus. At si adhuc diutius perstiterit, simū colūbinū, et nitrū, et terebinthinā adiciemus, peracta uero transmutatione in pus, locus aperiatur qua parte maxime eminet, ibi enim tenuissima est cutis. Et si pars aliqua suppurati loci, putrida uidebitur, ea necessario rescindenda est. Resectio autē ad myrtosoli formā fiat, longa uidelicet et angusta, quod sanē in axillis ac inguinum abscessibus faciendum est. In capite uero & huiusmodi locis simplici sectione utemur, qua facta thuris pollinem tenuissimum ulceris cavitati inspergemus, et linamenta conuulsa indemus. At uero ubi duæ aut tres sectiones factę fuerint, limniscos immittere oportet, & postea linamentis conuulsis ulcus replere. Ad tutandum uero locum simplex linteolum uino et oleo imbutum obligabimus. Tertia deinde die ad suppuratorium curationis ductum cōuertemur, per tetrapharmacum & similia rosaceo diluta. Si uero post indita linamenta circumlitę partes adhuc fuerint inflāmatę, cataplasmata adhibebimus, & si nihil amplius urgeat, splenium sedandis inflāmationibus aptum imponemus. Cæterum suppuratione facta repurgantibus utendum est, ex quorum numero præstat emplastrum Aegyptium, quod recipit terebinthinę liquidę et mellis ac rosacei portiones æquales simulliquatas. Sed in robustioribus corporibus, ac impurius ulceribus, terebinthinę ac mellis par mensura absq̄ oleo liquatur, & mirificę repurgat. Verum ad ulcera quæ difficulter repurgantur confert Aegyptium quod coctum appellatur, colore fuluum, cum ærugine rafa ac melle coctum, donec fuluum colorem susceperit. Sunt & alia huic similia, quæ ad fistulas paulò post referentur. Repurgatis ulceribus ad incarnantiā transeundum est, quæ paulò inferius ad caua ulcera describemus. facta uero incarnatione, rhodio emplastro aut psaro committantur, & ubi explanata fuerint ad cicatricem perducantur, per sicca medicamenta quæ referentur ad ea quæ cicatrice opus habent. Suppuratoriū abscessuū, experimento constās. Maluæ agrestis tritæ ac coctæ, farinę tritici, stercoris suilli, æquales partes in sapa coquito, ac imponito, & celerrime suppuratio cōtinget. Philosophi. Ad oēs inflāmationes discutiēdas, facit priuatim ad mamillas & glandulas inflāmatas. Adipis suilli sexuncem, albumina ouorum duorum, mel ad ouorū mensuram, nitrī sextantē, farinæ polentæ quantum satis est. Adipi liquefacto oua ammisceto & mel, deinde nitrū, postremum etiā polentæ farinam quantum ad emplastrī compagem satis erit. Sunt qui ita præparent. Accipiunt oua unā cum uitellis undecim numero, farinæ polentæ libram unā, adipis suilli libram unā, mellis quantum sufficere putant. Nam discutere uolentes, uberius sedare intendentes, parcius ammiscent. Quidam etiā nitrū addunt. Sed quod nitrū habet, magis discutit, quod non habet, magis sedat. Vtere præterea eo quod ex psyllij succo paratur. Ruptoriū abscessuum. Quidam pro ammoniacō

ammoniacum thus adiungunt. Abscessus autem etiam permutatos discutit, Ario-
barzanium ex buccinis constans, et quod dionysias appellatur, ambo in sequen-
ti Sermone descripta. At quod Oribasium refertur sic habet, lapidis pyritæ drach.
xii. ammoniaci thymiamatis tantundem, farinæ fabarum drach. vi. terito ac
cribrato et resina excipito. Sitque resina, si haberi potest terebinthina, sin minus,
liquida, quo emplastri forma fiat. Hoc uel discutiet, uel dirumpet, euacuabit, ad
cicatricem perducet, et sanabit. Nec uero diutius antea præparandum est hoc phar-
macum, cito enim exarescit. In decimo quinto Sermone etiam aliud discuti-
sorium, & aliqua ruptoria reperies. Oribasii Aegyptium repurgans. Mellis
despumati libram unam, aceti libras duas, squamæ æris unc. i. æruginis drach.
iiii. Acetum et mel ad mellis compagem coquito, deinde reliqua ammisceto.
Aliud. Eiusdem, ulcera sordida probe repurgans. Amurcæ coctæ, mellis des-
pumati, aluminis Phorimi appellati, æquales portiones. Aliud ad abscessus,
discutiens aut rumpens, & sine dolore euacuans. Spumæ argenti, cerusæ, am-
moniaci, singulorum libram unam, olei quantum fatis est, resinæ pinus, propo-
lis, opopanacis, singulorum sex uncem, castorei trientem, galbani, myrrhe, thu-
ris, singulorum sextantem. Aceti quantum sufficit. Spumæ argenti et cerusam
cum aceto coquito, & terenda cum aceto terito, & quæ liquari possunt liquefa-
cito, & ad coctam ammisceto, & tritis adjcito, refrigerato, ac subigito.

De causis ulceribus non malignis. Et ratio curan-
dorum ulcerum. Galeni.

Cap. xxxiii

Cavum ulcus humidum ac sordidum est, et ideo pharmacis moderate siccanti-
bus ac extergentibus opus habet. Saepè uero à nobis dictum est, non omni
naturæ eadem medicamenta conuenire, sed debiliori mollioribus, ualidi-
ori ualidiora esse adhibenda. Neque enim tolerat debilis natura potentiora,
proinde quanto humidius fuerit corpus in quo est ulcus, tantum minus resiccantia
medicinas postulat. Quare duobus ulceribus æquali humiditate præditis, al-
terum quod in sicciori temperatura est, maiorem resiccationem postulat. Alterum
quod in humidioris est, minore resiccatione opus habet, quāto hæc natura alia
humidior existit. Carnem enim quæ ad ulceris nutritionem distribuitur reliquo
corpori simile esse oportet. Vbi igitur pristina caro siccior est, ibi noua quoque
perueniens siccior fieri debet. Merito ergo resiccanda est, et quanto prior sic-
cior fuerit, tanto ampliorem siccandi facultatem medicamentum habere debet.
Et uice uersa, tanto minus resiccantia medicamenta conueniunt, quanto mi-
nus sicca prior fuerit caro. Thuris itaque qualitas ad humani corporis naturam paulo
parata, cum temperatis & medijs naturis consentit, humidiores autem paulo
amplius resiccant, quemadmodum sanè etiam extreme siccis, aliquanto humidi-
us existit. Si igitur diligenter obseruaueris, comperies thus in humidioribus qui-
dem naturis carnem producere. In siccioribus autem minime, sed potius suppu-
rare. Thus ergo sicut moderate calidum est, ita ex omnibus incarnantibus appel-
latis minime siccant. At hordeacea & fabacea farina magis siccant quam thus, &
nulla caliditate participat. Aristolochia uero et panax omnibus amplius in suo
genere resiccant, & calidioris sunt naturæ. Medium uero inter hæc obtinent,
farina erui et iris. Et huiusmodi omnia in primo ordine resiccantium ac ex-
tergentium locantur, & minoris ac maioris discrimine tantum inter se disse-
runt, & quod alia uires quibus excellunt simplices habent, alia compositas.
In libro uero De simplicibus medicamentis ostendimus pompholygem usam
& lotam, et cætera huiusmodi, uelut cadmiam & osteorum testas, ex eorum esse

esse ordine quæ sine mordacitate siccant & incarnant. Præterea ad ulcera caua incarnanda emplastrū uiride conducit, quale est quod Iſis appellatur, multo roſaceo dilutum. Qui ergo recta uia medicandi procedet, ubi egri naturam conſiderauit, ſtatim diſciſcit quo medicamento ulcus indiget. Quum autem medicamentum incarnans adhibuerit, & nihil profecerit, ſic quodammodo ad aliud tranſire oportet. Nam ſi ampliores ſordes fuerint, & humidius ulcus, noſſe debet quod medicamentū minus quàm oportuit reſiccauit, quapropter mellis amixtione uires eius intendet. Si uero purum & humiditatis exors ulcus cōperit, plus quàm debuit reſiccauit. quare oleū ammiſcebit, & ceratū liquidū adhibebit. Atq; in his ſumma diligentia utendū eſt: contingit enim aliquando ut à fortiore medicamēto ulceris caro colliquetur, & ſordidū ac humidū appareat ulcus, uelut ea quæ minus quàm oportuit ſunt reſiccata. Verū hoc à peritis facile diſciſci: ulcus enim eliquatū cauus ſeipſo efficit, et labia protuberantia habet, rubet item & inflammationē habet, & eger ſæpe manifeſte mordacitatē percipit. Alterum aut ulcus quod minus reſiccatum eſt, tale nihil conſequens habet.

Medicamenta quæ per linamenta induntur, ad ſuppurandum, re-
purgandum ac incarnandum.

Cap. XXXIII

Sunt & alia multa ad repurgandū idonea, uelut lens, iris, marrubium, ſingula cum melle cocta, herinacei marini teſta uſta, narciffi radix cum roſaceo & melle. Baſilicum uero tetrapharmacum, & quod ad Azaniten refertur, & Macedonicum, ſingula liquefacta ſuppurandi uim habent, & omnia Sermone x v. deſcribentur. Sed & hoc mirifice ſuppurat, omnem quoq; duritiā citra dolorem emollit, & incarnat, & cauſis ulceribus eximie prodeſt. Cera, terebinthinæ, medullæ ceruinæ, adipis uitulini, anſerini, bubuli, butyri recentis, mellis atticī, olei roſacei, myrrhæ, ſing. dra. viii. Myrrha cum melle trita ad prunas coquitur, & reliqua liquata affunduntur ac uniuntur. Aliud Aegyptiū, ad ulcera repurganda mirandū. Mel cum pari terebinthinæ menſura, aut roſaceo, aut ſi neruoſæ fuerint partes affectæ butyro ad prunas colliquamus. Verū in robuſtioribus corporibus, & ſordidioribus ulceribus, terebinthinā cum melle adhibemus. Vtere etiā eo quod ex melle, aceto, & liliorū ſucco conſtat, quod Galenus ualde approbauit, cuius præparationē & utendi modum, in ſimplicium Sermone, capite De lilijs habes. His omnibus efficacius eſt quod aliqui Aegyptium uocant, ſic habens. Aeruginis drach. iiii. ſquamę æris unc. i. aceti trientem, mellis dodrantē. Arida cum aceto terito, & adiecto melle ad prunas ad fuluū colorē coquito. Aliud aureū uocatū, antiqua & recentia uulnera repurgans & incarnans. Salis cōmunis, ceruſæ, atramenti ſutorij, ſpumę nitrī albę, ſingulorū quadrantē, ariſtolochiæ longæ & rotundæ, aluminis ſciſſi, ſing. unc. i. Arida cū aceto trita, cerę ſextante & olei dodrante excipito: deinde uſu expectente cum plurimo roſaceo ad olei ſpiſſitudinē diluito, & admiraberis. Idem capit is quoq; oſſibus denudatis per linamenta inditur. Aliud caua ulcera replens. Adipis uitulini recentis, ceræ, terebinthinæ, ſing. dra. iiii. roſacei dra. xvi. para & utere. Aliud Archigenis Nutrix appellatū, ad cavitates explendas. Roſacei, terebinthinæ, mellis, ſingul. ſextantē, ceruſæ, butyri, ſing. unc. i. para & utere. Quidam & thuris unc. i. addunt. Aliud ad caua & pura ulcera explenda, experimento conſtans. Roſacei trientem, ceræ ſextantem, terebinthinæ, butyri, mellis, ſingu. unc. i. Omnibus ad calidum cinerem colliquatis ac ſimul unitis ad linamenta tingenda utere. Si uero ſordida fuerint ulcera, repurgatis antea uel ut dictum eſt, adhibeto. Aliud, Ceruſæ, ſpumę argenti, pa-

V u res

res portiones uino odorato & oleo excipe, & per linamenta usque ad cicatricem inductam inde. Aliud, ad fordida, cicatricē non fecipientia maligna & ac callosa ulcera. Marrubij succum optimo melle exceptum inde. Aliud siccum maligna & profundissima ulcera explens. Farinae erui dra. xxx. iridis drach. x. x. spumae argenti drac. x. v. aristolochiae longe tantundem, manne thuris, terrae samiae, singul. drach. x. squamae aeris, cadmia, singul. drac. x. v. Hoc in fordidis largē, in puris parcissime linamentis illinito. Exaequatis uero ulceribus & iam cicatrice indigentibus aridum specilli nucleo inspersum ulceri indito, & postea linamentum uino imbuto immittito.

De siccis repurgantibus ac incarnantibus, cephalicis appellatis, Galeni.

Cap. xxxv

Sicca medicamenta quae cephalica, hoc est, capitalia appellantur, omnibus quidem totius corporis, maxime tamen capitis ulceribus incarnandis conueniunt, praesertim ubi ossa in quacunque parte fuerint denudata. Nam ad ossa denudata pinguium & eorum quae ad tingenda linamenta parantur, usum uitamus, & siccis tantum utimur. Quin & citra ossium denudationē, pinguia non ita frequenter in ulcerum curatione adhibemus. Sunt autem sicca cephalica huiusce modi. Asclepiadis siccum cephalicum ad Xenocratem relatum, quo fistulas sanabat. Erui farinae, trientem, iridis illyricae sextantem, aristolochiae tenuis, squamae aeris, mannae thuris, singul. unc. i. Misce ac utere. Quidam etiam radices panaceae unc. i. adijciunt. Et ex melle cocto oblongum quali collyrium faciunt, quod in fistulam immittunt, & postea siccum inspergunt. Aliud siccum. Erui drach. x. x. aristolochiae tenuis drach. x. squamae aeris, radices utris albae, singul. drach. v. Utere ad repurgandum cum melle, ad replendum sicco insperso. Aliud siccum optimum, tuniculas ulcerum relictas consumens, callos rescindens, fordida ulcera purgans, caua replens. Squamae aeris, resinae pinus, singul. dra. x. ii. pumicis usti & uino extincti, iridis, aristolochiae tenuis, silphij, singul. drach. v. iiii. thuris dra. iiii. Misce ac utere sicco, uel cum melle. Aliud siccum omne profundum ulcus incarnans. Farinae erui drac. x. x. thuris drach. x. v. iiii. fuci tinctorij, amyli, singul. drach. v. iiii. misce & utere. Aliud ad capitalis ulcera replenda. Amyli, alicae, thuris, lapidis specularis translucidi usti, singulorum unc. i. Aliud. Colophonia seorsim trita ulcus repleto, & cito sanabitur. Aliud. Colophoniae, amyli, thuris, cerusae, aequales portiones para & utere siccis. Aliud admirandum. Seueri ad ossa praecipue capitis denudata, derasa ossi inspersum: celerrime enim incarnat. pollinis tritici, colophonig tenuissime tritae, pares portiones prepara ac utere, & linamento indito, eius retinendi gratia emplastrum quoddam molle cicatricē inducens impone. Aliud ad ulcera contrahenda. Misys dra. iiii. gallarum, chalcitidis, atramenti sutorij, aluminis scissi, squamae aeris, singul. unc. i. para & utere.

De ulceribus in quibus caro superexcreuit, & quae depreffione opus habent, & de medicamentis siccantibus, Galeni.

Cap. xxxvi

Carnem in ulceribus superexcreuentē consumunt medicamenta fortiter siccantia. Qualis est flos asiae petre, & testacea omnia usta, & uterque herinaceus cum toto corpore exustus, & diphryges inspersum, & aeris flos. Verum aerugo omnia robore suo uincit. Siccum Herculis. Squamae aeris, misys, chalcitidis usta, atramenti sutorij, aluminis scissi. aequas portiones prepara & utere. Aliud Rhodium appellatum, refertur ad Heram. Siftit item sanguinem. Gallarum drach. x. squamae

squamę aris drac. v. atramenti futorij drac. iiii. aluminis scissi dra. ii. Gallas ex dimidio uistas uino austero extinguito, & reliquis tritis ammisceto. Quidā atramenti futorij dra. v. squamę dra. iiii. coniiciunt, & gallas omnes cōburunt. Rhodium inquit Heras, ad sanguinē sistendū efficax est. Facit & ad sacros ignes, & ulcera prosperendo depalcentia, ac nimio humore marcescentia contrahit ac cicatrice includit. Quidā hoc modo Rhodiū cōficiunt, & ualde laudant. Chalcitidis crude, misyos crudi, sing. dra. x. squamę ferri dra. xvi. gallarū dra. viii.

Siccū Plarum appellatū. Hoc largē inspersum cōtrahit ac deprimat parte adhibitum, ad cicatricem ducit. Chalcitidis crudę lib. i. misyos crudi sex uncem, atramenti futorij lib. i. aris usti sex uncem, squamę aris sex uncem, præpara & utere. Aliud utilissimū deprimendi uim habens. Squamę aris drach. iiii. æruginis drach. i. Aliud. Squamę aris, calcis uiuę, mannę thuris, æquales partes præpara & utere. Facit ad ulcera maligna, & carnes fungis similes cum melle repurgat, & cum cerato replet. Aliud. Misyos drac. iiii. chalcitidis drac. ii. gallarum dra. iiii. atramenti futorij, aluminis scissi, squamę aris, singulorum drach. ii. terito, & aperto ulcere cum specillo inspergito. Utere etiam ad maximas carnis superexcrecentias, his quę ad sedis thymos descripta sunt. Aliud. Lanę succidę ustę ac tritę insperfę carnes marcidas ac flaccidas consumunt. Idem faciunt balaustia ubertim insperfa.

De ulcerib. non malignis cicatrice indigentibus. Galeni. Ca. xxxvii
In ulceribus quę cicatrice opus habent, caro quidē innato operimento munitur, sed cutis enasci non potest. Quapropter in summa carnis superficie simile quiddam cuti efficiendū est. Quoniā uero cutis carne siccior est ac densior, si carnē siccabimus & adstringemus, cuti per similem faciemus. Neq; uero satis est hoc docere, quod resiccantia & adstringentia adhibere oportet: nam & quę cruenta uulnera agglutināt, siccantia sunt & adstringentia. Verū in glutinandis uulneribus id tantū quod insluit resiccare conamur, quo pars affecta superfluitatibus careat: in cicatricibus uero inducendis, nō solum influentē, uerum etiam contentū in carnibus humorem consumere oportet. Itaq; medicamentū quod cicatricē inducit longē siccius esse oportet, eo quod glutinat, quo non solum superfluū consumat, sed naturalē quoq; humore attingat. Hanc itaq; rem præstant, galla omphacitis, malicoriū, spinę Aegyptię fructus, & quę citra mordacitatē uehemēter adstringūt, qualis est myrtus. Testa etiā & cadmia, & plumbum, singula usta & lota, citra mordacitatē siccāt, & ad cicatricē perducūt. Sed his ualentiora sunt, chalcitis, misy, alumē scissum. Et his adhuc potentius est æs ustū. Omnīū autē potentissima est squama eris, quę usta lene medicamentū efficitur ad antiqua ulcera cicatrice includenda. Illitio Tetanica, ab extendendo ac explanando appellata, cōsumens ac deprimēs. Adipis suilli, cerę, sing. un. i. terebinthinę semunciam, nitri unc. i. fellis taurini semunciam, resinę un. i. Omnia simul decocta ac excolata ubi tepuerint manibus subige ac utere. Quidā adijciunt atramenti futorij drach. v. Et medicamento ab igne remoto acetī & saponis singulorum unciam i. adijciunt, ita ut hæc prius in alio uase simul sint contrita ac dissoluta. Obseruandum est ne pharmacum hoc in bulliendo effere uelcat, & assiduē agitandum donec ad compagem perueniat.

Sicca ulceribus nō malignis cicatricē inducentia. Cap. xxxviii
Siccū quod cicatricē inducit. Ostreorū ustorū dra. xii. mannę thuris dra. vi. cadmię dra. iiii. præpara & utere. Aliud. Spumę argenti, cerussę sing. dra. viii. recrementi plumbi, myrti siccę, gallarū omphacitidū, sing. dra. iiii. para & utere;
V u 2

utere. Aliud siccū cicatricē inducens. Cadmię, cerusę, manę thuris, amyli, æquales partes unito ac utitor. Aliud admirandū. Cerusę sextantē, amyli unc. i. spumę argenti, thuris, rosacei, singul. sextantē, unito ac utitor. Incarnat enim & ad cicatricē ducit. Aliud. Hoc etiā diuturna ad cicatricē perducit. Corticis pinus dra. vi. cornu cerui usti dra. iiii. cerusę dra. iiii. æruginis dra. ii. cadmię dra. viii. mannę thuris dra. vi. præpara & utere. Aliud. Aristolochię dra. vi. corticis pinus, pumicis usti & uino extincti, colophonię, sing. drach. iiii. iridis dra. ii. unito ac utere ad incarnandū & cicatricē inducendā. Aliud. Pumicis usti & uino extincti dra. viii. mannę thuris, squamę æris, sing. dra. iiii. præpara & utere. Aliud mirabile. Aluminis scissi dra. iiii. in sole dissoluito, & in eo diluto linteolū tenue, uetus ac detritū, purū tingito, & in sole siccato, atq; hoc usus tēpore concisum ulceri indito. Verū ad sedis ulcera & diuturna alia, alumen in uino dissolues, et similiter facies: ad aurū uero affectus, laenam pro linteo accipies. Aliud plantaginē cum radicibus siccā terito & cribrato, ac utere cōfidenter. Aliud. Cerusę dra. viii. gallarū, myrti, recremen ti plumbi, sing. dra. iiii. para & utere. Aliud. Ostrea usta, cerusam, cadmiā, mannā thuris, paribus portionib. unito ac utitor. Aliud siccū, ad caua & maligna ulcera replēda, expertus loquor. Farinę crui dra. x. iridis dra. x. spumę argenti dra. xv. mannę thuris dra. x. v. terrę famię dra. x. squamę æris, aristolochię tenuis, cadmię, sing. dra. v. præpara & ad sordida ulcera largē, ad pura parce adhibe, et hapsū lanę ē uino expressum super impone. Hoc & chironia ulcera appellata ad cicatricē ducit. Aliud, quod etiā callos exterit. Chalcitidis crudę, spumę argenti, ladani, singul. dra. x. bituminis dra. viii. cerę dra. i. olei myrtei lib. i. uini heminā i. Vsu expetente spleniū ex eo imposito, & limenta eo tincta indito. Aliud Andromachi. Spumę argenti dra. x. x. x. atramētī futuri dra. viii. aluminis scissi dra. xii. cerę dra. c. squamę æris dra. viii. bituminis, ladani, sing. dra. x. x. x. olei myrtei lib. i. & quadrantē. Vini ueteris adstringentis quantū satis est: utere uelut prædicto. Aliud. Bituminis, ladani, singul. dra. viii. squamę æris, myrti, spumę argenti, singul. drach. iiii. cerę dra. x. x. x. olei myrtei drach. xxx. Et si hyems fuerit dra. x. x. x. Vini quod satis est, præpara & utere uelut dictum est.

Emplastra quę nō maligna ulcera cicatrice includūt. Cap. xxxix. Emplastrū ē Cadmię preparatū, rosaceo dilutū repurgat ulcera, in carnatq; & cicatrices cōcolores cuti efficit: perniciōibus item ac fissuris, & ani affectiōib. medetur: habet autē hoc modo: Chalcitidis ustę lib. ii. cadmię ustę & uino extinctę lib. i. cerę trientē, terebinthinę lib. ii. olei myrtei lib. iiii. chalcitidem & cadmiā cum uino sufficienti diluito ac conterito, & reliqua liquata ammiscero ac utitor. Aliud. Cadmię, chalcitidis ustę, sing. dra. x. x. v. cerę dra. x. l. v. terebinthinę dra. x. x. iiii. olei myrtei lib. i. uini quod satis est, præpara & utere. Aliud ad cicatrices inducendas efficacissimū. Facit & ad igne ambusta aut cē. Cerusę, spumę argenti, ordeī usti, sing. unc. i. cerę quadrantem, rosacę aut myrtei olei bessēm, cerusam & argenti spumā cum uino terito, cerā uero cum oleo liquefacito, & ad medicamentū ab igne ablatum, hordeū ustum tritum ac cribratū inijcito atq; unito: & omnia frigefacta in mortariū coniecta subigito ac utitor. Aliud ē ladano, ulcera antiqua ad cicatricē perducens. Spumę argenti dra. c. picis dra. l. ladani dra. x. x. v. æruginis dra. viii. æris usti dra. viii. squamę æris drach. ii. olei myrtei lib. vi. Argenti spumā cum oleo coquito, & medio cocturę tempore, æruginē, squamā, & æs adijcito, & coquito donec nō amplius

amplius inquinēt. Et postea picē liquefactā ac ex colatā coctis ammisceto. His uero unitis & amplius nō inquinantibus, ac ab igne ammotis, deposito iam feruore, ladanū cum uino tritū addito, & perfrigerata in mortariū coniecta probe subigito, & ad maligna ulcera ac fistulas utitor. Aliud. Cadmię, chalcitidis, singul. trientē, cerę, colophonię, olei myrtei, sing. unc. i. uini quantum satis est. Aliud. Aeris usti & crudi, singul. sextantem, cadmię sex uncē, chalcitidis uste sesquiblibrā, cerę lib. i. olei myrtei lib. ii. uini quod satis est. Aliud emplastrum candidum, ad cicatricē perducens experimento cōstans, faciens ad tenera corpora, uelut sunt mulierum, eunuchorū ac puerorum. Cōuenit etiam ulceribus spontaneis. Spumę argenti lib. i. & trientē, cerusę lib. i. cerę lib. i. & trientem, thuris & mannę eius, singul. quincuncem, terebinthinę unc. i. aquę lib. i. olei myrtei lib. ii. cerusam & argenti spumā in aqua coquito, & consumpta aqua, ac medicamento non amplius inquinante, cerā primum, deinde resinā addito, & ablato ab igne pharmaco thus ac mannam siue pollinem eius ammisceto.

De malignis & ægrē recipientibus cicatricē ulceribus. Cap. XL
Quemadmodū antea diximus, duplex scopus propositus est in curatione partium quibus nullus deprauatus habitus inest: alter repellendi quod influit: alter discutiendi quod in affecta parte impactū est, atq; hæc à contrarijs qualitibus fiunt: nam quęcunq; adstringunt, repellere possunt quod influit: quę uero attrahunt, discutiūt id quod in affecto loco continet. Adstringentia itaq; exasperant, & ob id dolorē inducūt, attrahentia uero & discutientia quum acra sint, loca ulcerata mordent. Quare cōtingit ut ex his quę exasperāt, & mordent, superflua humiditas ad affectas partes illabatur, quam inflāmatio & erosio ulceris consequunt. Ceterū eius meminisse oportet, quod sæpe à nobis dictum est; quod corpora plena sanguine, aut uitiosis humoribus referta, & mollia ac subtili sensu prædita, ex mordacitate facili inflāmantur. Mulieres autē & pueri & eunuchi, itēq; uiri calore albi & mulierosam uitā degentes, inter molles naturas numerant: proinde quantū eius fieri potest, medicamentorū materia peruestiganda est, quę citra mordacitatē ac dolorē ulcus resiccat, quam sanē nunq; inueniet medicus, nisi quid singula medicamenta adhibita peregerint, recte expenderit. Itaq; cōsiderabit quantū humiditatis primū pharmacū ab ulcere desiccauit, aut si sordidū est, quantum sordidū deterfit, idq; tertium ac quartum expenditur, donec purū ac siccum ulcus apparuerit: quod ubi deprehenderit ad aliud medicamentū, eiusdem quidem generis cum priore, sed debilius, se conuertet: fortiora enim repurgatis iam ulceribus morsum ac dolorē inferūt, & influxiones ac inflāmationes pariūt: talia igitur corpora exacte euacuare, & à superfluitatibus asseruare oportet. Alijs itaq; sanguis si redundet, detrahendus est, alijs purgatio uitiosi humoris & simul uenę sectio cōuenit. Quibusdā uaricē excidere ex ulcere oportet; aliquibus iecur aut splenem curandā assumimus. Neq; uero malignis crurū aut surarū ulceribus, ea curatio debet. Sed manū quoq; ac reliquarū corporis partiū: nam cuidā adolescenti diuturnū ulcus ad radicem manus habenti, uenā ad ulcus supernē allatā excidi, atq; intra paucos dies hominem sanauit, qui per quinquennū ea affectione laborauerat. Sunt quibus loca ulceri uicina scarificare oportet. Quibusdā uero labia ulceris callosa circūcidere. Si uero nihil ex his fecerimus, humiditatis ac sordidū quantitātē cōsiderabimus, & inde ad cōgruum medicamentū transibimus, ita ut diligenter expendamus, quę siccādi quidē uim habent, non autē extergendi: & quę cōtrā extergent, non autē fortiter siccant: suntq; in hoc etiā qualitatis singulorū gradus expenden-

pendendi. Medicamentū cicatricē inducens. Plumbi usti sexuncē, cadmiæ trientē, aeris sextantē, colophonīæ, olei myrtei, singul. lib. ii. Vini ueteris odorati quantū satīs est. Aliud. Cadmiæ, cerusæ, singul. trientē, ceræ, olei myrtei singulorū sexuncē. Aliud. Cadmiæ, spumę argenti, cerusæ, sing. un. i. cerę trientem, rosacei sexuncē. Aliud ē Ladano. Squamę aris un. i. bituminis, terebinthinæ singul. dra. iiii. ceræ, ladani, singulorum quadrantem, olei myrtei quadrantem, at si hyems fuerit, amplius de oleo accipies. Ceram cum oleo & bitumine liquefacito, & terebinthinam adijcito, deinde omnia ad squamam acclaudum prius trita ammisceto.

Simplicia medicamenta quę citra mordacitatem resiccant
ulcera maligna.

Cap. xli

Simplicia porro medicamenta sine mordacitate & manifesta exasperatione resiccantia ulcera, hæc sunt. Lemniā terra sigillum appellata moderatē resiccant. Cadmiā item sub caniculæ aestu cum uino trita ac siccata: ubi uero ulcera ualde sunt maligna, ex aceto terenda est. Vtranq; superat chalcitis usta, & uelut cadmiā trita ac resiccata: nam cruda adeo efficax est, ut etiā crustas inurat. Huic similis est ærugo usta: non usta enim sicut & chalcitis nimis efficax est, nisi quod chalcitis simul adstringit. Atramentū sutoriū inter omnia metalla summe resiccant. Chalcitidi similia sunt misy & fori, maioris tantū ac minoris ratione differētia. Stibiū magis quā fori liccat & adstringit. Diphryges cōmodē siccant, sed aliquantulū mordax est. Omnia aluminis genera exactē siccandi uim habent, uehementerq; adstringunt: quapropter alumen solum per se ad huiusmodi usus adhibetur. Chrysocola naturalis & artificialis eandē uim habet. Plumbum ustum fori ac stibio præstat, plumbi recementū, & squamma ferri præsertim stomomatis, plurimū siccant. Aeris squama præter resiccandi uim etiā ex terget: quare ulcera præ omnibus repurgat, omnia tamen metalla prius mordacitate oportet, deinde ulceribus admouere: ita enim mirificē siccare citra mordacitatem possunt. Siccant etiā buccinorum, purpurarū, ostreorumq; testæ ustæ aclo te. Item translucidus lapis specularis mollia corpora citra mordacitatem siccant. Idem facit nitrum ustum, & quod in æneis lebetibus balnearū adhærescens ex aqua coctura reperitur: æque enim siccant & adstringit. Præterea gallæ & malicorium usta ac arida trita adhibita, malignis & agrē recipientibus cicatricē ulceribus commodissima sunt. Quin & capparīs cortex tritus & siccus inspersus maligno ac putrido ulceri cōmodus est. Polium item tenue siccādi uim habet, & caries lignorum unā cum exterforia facultate. Item peucedani & pastinacæ præsertim agrestis radix & folia, scordium quoq; ac centaurea, & alia huiusce modi, uel priuatim per se, uel simul composita.

De usu relatorum medicamentorum.

Cap. xlii

Necessariō uero talia ulcera uitioso humore referta, sordidissima existunt. Quare ubi aliquod ex relatis simplex aut cōpositum siccum adhibitur sumus, linteolo prius molli puro ac sicco ulcus extergemus, deinde medicamento cauitatem explemus, & extrinsecus splenium ad ulcerum labia attenuanda imponimus. Et linteolo supra splenium imposito ac ligato, spongiā ex frigida aut uino expressā adhibemus, conamurq; ut per totum tempus spongia frigida permaneat, quod facili contingeret, si assidue illi frigida instilletur, citra uinculi linteoli siue fasciæ obligatæ solutionem.

Deligamenti & curationis ratione.

Cap. xliii

Ligamentū ulceri cōuenit quod ad fracturas usurpamus. Quod si uisum

tum fuerit ligamentū, principio ipsius ad superiorē ulceris partē locato obligā-
bimus, siue iura, siue genu, siue talus, siue cubitus fuerit, pars ipsa affecta. At si
duobus ligamentis uti malueris, uelut in fracturis fieri solet, primū ab ulcere ad
superiorem regionē ducatur. Secundū uero initium sumat ab ulcere, & prius
infra obliget, & postea sursum desinat, & ad eundem terminū cum primo duca-
tur: nam ad alia cōmoda etiam hoc accedet, quod ulcera ob rotunditatē coale-
scere nequeuntia oblonga reddent. Solutio autē non quotidie, sed alternis fiat,
& a solutione aqua ulceri ne aspergatur, sed cum molli puro ac sicco linteolo sa-
nies detergatur. Quod si partes ulceri uicinā inflāmata appareāt, splenio latio-
re facto liquidum medicamentū illines, quale est phoenicinū emplastrū aut alia
quod simile, ita ut hoc dissoluas uino adstringente, sitq; oleum quod adijcitur
melinū aut myrteū. At si duricies circa uicinas ulceri partes apparuerit empla-
strum phoenicinū oleo antiquo aut cicino dissolues. Tutiusq; fuerit superiori
regioni aliquod repellēdi uī præditū adhibere, præsertim in crurū ulceribus, &
his quæ eminentē uaricem habent: uena uero quæ amplior fuerit, & atræ bilis
sanguinē habuerit excidenda est uelut diximus. Aliquando tamen eiusmodi
uena excisa, ulcus quidē protinus coalescit ac sanū euadit. Sed qua parte uena
recisa est, nouum malignū succedit, quod cicatricē respuit. Præstat igitur in tali
bus uires ægri perpendere, et a uenæ sectione auspicari, deinde pharmaco atræ
bilis ac pituitæ humorē educente purgare: nam & pituita aliquādo ad huiusmo-
di uarices confluit, atq; tunc uaricosam uenā resicare, multaq; sanguinis copia
hinceducta, uaricis sectionē prius curare, quæ ubi exactē coaluit, tunc demum
maligni ulceris curationē aggredi, eo quem retulimus modo. Alius porrō la-
tis sero in quo cnicus coctus est, aceti nulli modica mensura addita assidue
emollienda est. Dabis autē ex eo, ab hemina una usq; ad quinq; mensurā augēs,
sic tamen ut æger per multos antea dies aquam biberit. Optimum item est &
lacre recens multum per se, uel cum aqua calida aut modico passo, ante cibum
sumptum. Nam & humores contemperat, & uentrem eluit. Confert etiā aloës
drac. i. per interualla deuorata. Balnea uero minimē dulcia, sed sulphurea po-
tius & bituminosa adhibenda sunt. Quod si æger illotus manere non possit ci-
tra totius corporis lationem, lauandus est ulcere nequaquā denudato. Postre-
mum ab omnibus eduljjs ac potibus acerbis & ægrē concoctilibus, ac uitiosos
humores generantibus penitus abstinere oportet.

De emplastrorum cōpositione ad maligna ulcera. Cap. XLIII
Quandoquidē in malignis ulcerib. quæ difficulter cicatricē recipiūt, is scopus
nobis propositus est, ut medicamento nō mordaci rescicemus, & oleū ac aqua
maximē omnium humectant, ab utrisq; penitus cauere oportet, ipsaq; neq; per se
adhibere, neq; cum relatis siccis permiscere: cera igitur recēs pinguis & in sole
subacta ac emollita, idonea est ad sicca medicamenta excipienda. Quod si calo-
ris ex sole copia nō detur, cerā prope ignē molliemus, uel in feruentē aquā inij-
ciemus: neq; enim illi omnino ammiscet aqua: at uero proportio miscendi hu-
iusmodi est, ut si moderatū pharmacū esse uolueris, metallicorū quartā partem
ceræ misceas: si ualidius, tertiā. Neq; uero parua uarietas est pro corporū ratio-
ne, an ne molliores aut duriores habeāt carnes: quare fieri nō potest, ut omnib.
idem medicamentū cōueniat: itaq; his cōsideratis, ubi simplicium facultates co-
gnoueris, facile iudicare poteris uniuscuiusq; cōpositi medicamenti facultatē,
prout ab antiquis sunt descripta. Emplastrū admirandū, è fori cicatricē indu-
cens, deploratis ulceribus opitulans, quæ a multis frustra fuerunt tentata, cui fi-
dendum

dendum est uelut multo experimēto cognito. Soreos dra, XXIIII. gallarū dra, XXII. aluminis scissi, calcis uiuæ, malicorij, sin, dra, XVI. thuris dra, XXII. ceræ dra, CXX. adipis uitulini dra, CLX. olei antiqui lib, I. & si uitulinus adeps non affuerit, porcīnus antiquus sine sale ammiscetur; nam taurinus calidior est, arida terito & cribrato: deinde liquata ab igne remota ammisceto: & omnibus probè unitis, alumen, thus, fori, calcem, cum uīno adstringente trita adijcito, ac utitor. Ego, inquit Galenus, dum hoc medicamentū prępararem, oleum & adipem quadraginta annorū adieci, & semper mihi pręter spem successit ad maligna ac diuturna ulcera. Sunt aut talia ulcera, a quibus pars affecta in deprauatum habitū perducta adeo est, ut etiā si probè coctus sit sanguis, qui ad ipsam alimentī gratiā affertur, ipsum transmutet ac corrumpat, et si uitiolus sit humor qui affluit, ab ipso solo erodatur, etiamsi pars ipsa minimè esset affecta. Aliud splenium optimū. Plumbi usti & loti trientē, cadmiæ sesquiunciam, aeris usti un, I. thuris sesquiunciam, aluminis scissi un, I. æruginis sextantē, cerę sex uncem, olei myrtei lib, I. Aliud Galeni ad maligna & chironia. Cerę, picis, bituminis sing, lib, I. mannæ thuris, cerussæ, æruginis, singulorū sex uncem, malicorij, gallarū, spinę Aegyptiæ fructus, iridis, aristolochiæ rotundę, atramenti sutorij, singul, unc, I. aristolochiæ longę, aeris usti, singulorū sextantē. Olei antiqui aut cicini lib, I. arida in aceto pluribus diebus terito, & liquabilia liquata affundito ac utitor. Aliud Oribasij, ad efferata ulcera deprimenda ac contrahenda. Ochra attica usta, trita, sicca, utiliter adhibetur. Ego uero inquit, etiam cypria usus sum. Idem facit & chamaeleonis nigri radix, & malicorium ustum. Et si perne hapsus lanæ uīno imbutus illigatur. Aliud Galeni fuluum. Spumę argenti lib, III. olei cicini aut antiqui lib, III. aceti acerrimi lib, II. squamę æris, chalcitidis, æruginis, singulorū sextantem. Spumam argenti cum oleo coquito, medioq; cocturę tempore metallica ad æstiuum solem multis diebus cum aceto trita adijcito, tamdiuq; ad ignem finito, donec nō inquinarent. quum autem metallica adijcis, lebes ab igne tollatur, ne efferuescant et superfundantur. Sed et spumā argenti cum aceto & oleo decoquere licet, & medio cocturę tempore metallica addere, & simul sinere ut ebulliāt donec nō amplius inquinent. Hoc pharmacū fistulas glutinat, & labia ulcerū callosa resiccans unit ac cōmittit, ita ut nō amplius disparent si quis recta diætā utatur. Diuturna insuper puris ra & cicatricē respuentia, chironia appellata per se adhibēt, nullo antea puris uestigio apparente, maturat, et suppurat: at nō quotidie, sed alternis hoc pharmacum est, quod si stomomatis ferri squamā addideris, longē pręstantius pharmacum euadet. Ego dum hoc pręparabā, aliquando etiā diphrygis unc, I. adieci, aliquando chrysocollę sextantē. Sape etiā utrunq; ammiscui. Atq; ita pręparatum magna uulnera glutinat. Hactenus Galenus. Nunc uero hoc modo cōficietur. Spumę argenti lib, III. olei antiqui libr, VI. aceti lib, II. æruginis, squamę æris, chalcitidis, ling, quadrantē, coquito sicut dictū est. Quidā diphrygis chironia addūt, afferuntq; efficacissimè strumas discutere. Aliud Galeni, ad chironia ulcera in mollibus corporib. Cerę lib, I. cerussæ bessem, rosacci lib, I. salis ammo niaci trientē, squamę æris sextantē, thuris, aluminis, æruginis, malicorij, calcis uiuæ, sin, un, I. quę liquari possunt liquata ac frigefacta ad sicca cū uīno trita misceto. Aliud ad maligna & serpendo depascētia ulcera, pręsertim tibiārū. Spumę argenti, mastiches, adipis caprini, rosacci, singul, sex uncē, ouorū uitellos V. Argenti spumā cum rosaceo & adipe coquito, deinde mastichen adijcito, & ad frigefacta ouorū uitellos ammisceto. Aliud ad maligna tibiārū ulcera experi-

mento cognitū, Lupinos aridos uustos tritos largē inspergito, et hapsū lang ex uino expressum superligato, Hoc repurgat, incarnat, & ad cicatricē perducit.

De ulceribus quæ post obductam cicatricem rursus rum
puntur.

Cap. XLV

Quædā ulcera post receptā cicatricē non multo tempore interpolito inflam mantur ac refringuntur. Nam quum substratū os malē sit affectum, uicina quidē caro cicatricem recipit, & exactē sana apparet. Verum postea sanie paula tim ex corrupto in alto osse affluente putrescit, & oborta inflammatione cicatrix rumpitur. Quæ igitur horū curatio instituenda est? nimirū ut hæcenus exicce mus, quatenus squama affecti ossis excidat: facile uero excident ossiū squamæ, si papaueris syluestris et fici folia cum uino & polenta imposueris. Aut hyoscyami & atramenti sutorij pares portiones adhibueris: sed & peucedani radix trita citissimē ossium squamas disparat. Vtere etiā siccis capitalibus suprā descriptis: præsertim eo quod silphiū recipit. Aliud siccum, ad chironia & cicatricē respuentia ulcera mirificū. Squamæ æris, thuris, singulorū sextantē, aluminis, salis ammoniaci, singul. trientem, malicorij, cerusæ, ling. un. i. utere sicco, uel si malueris cum cerato. Aliud. Pumicis multifori sex uncem, sulphuris uiui un. i. terito & cribrato ac utitor. Facit & pumex per se aridus tritus inspersus. Aliud, ad cicatricem inducendā diuturnis tibiariū ac totius corporis ulceribus. Calcis uiuæ ac lotæ in aqua & siccata un. i. cimoliæ tantundē, cere, terebinthina liquidæ, singulorū sextantem, olei myrtei aut rosacei quadrantē: poteris & ostreorum ustorū tritorum unc. i. addere. Ad sicca in mortario cum uino trita quæ liquari possunt liquata ammisceto ac unito. Hoc, itemq; reliqua omnia relata, & præcipuē quod ē fori fit, chironijs ac malignis ulcerib. medentur. Eisdē quoq; priuatim comodant capparis radix trita inspersa, centaurea minor, scor dium, caries lignorū ueterum, pastinacæ radix, peucedani radix, malicorium, oleum in quo scillæ bulbis coctus est absq; linamentis cum penna illitum. Ma licorium in uino coctū & rosaceo cerato exceptū: omnium uero efficacissima est theriaca Andromachi ē uiperis rosaceo modico diluta, & emplastri modo apposita. Aliud. Sandaracham tenuissimē tritam ursino adipe exceptā im ponito: aut ammoniacū salem eodem modo præparatum, uel per se adhibeto.

Ad extremitatum ulcera.

Cap. XLVI

Myrti baccas cū uino coctas impone: uel peucedani radicē tritā: uel lignorū ueterū cariē insperge: aut brassicæ uel sabinae folia cū scenigræci farina & aceto subacta impone: aut sideritidē melle exceptā adhibe: aut oleū in quo scilla co cta est absq; linamentis cū penna illine: ita enim ne musca quidē ulceri appropinquabit.

Ad callos extremarū partium.

Cap. XLVII

Brassicæ folia cū melle terito, & cerato ex sinopica rubrica præparato, excipi to, & adhibeto. Aliud. Clibanī antiqui testā cum uino austero terito, & cū ce rato ex ouis facto, aut cum medicamento ex pompholyge ad sedis affectiones parato, adhibeto.

Ad uermes in ulceribus.

Cap. XLVIII

Vermes in ulceribus generatos enecant, plantago sicca, ligni ficulni cinis, calaminthæ succus assidue instillatus. Cerussæ, inquit Theodorus, & polij pares portiones cum pice liquida adhibe. Quidam pro cerusa absinthium scribunt. Aliud. Linamentum ex saliuā hominis ieiuni illitum adhibeto. Hoc etiā aurium uermes necat, & cicatrices concolores facit.

Ad nomas & putredines ulcerum.

Cap. XLIX

Nomæ, hoc est, proserpēdo depascētia ac putrida ulcera appellant, quæ uici-

naa

nas partes erodunt & putrefaciunt. Et sanè uehementissimis medicamentis opus habent. Et lapillimè uestiones requirunt. Siccum optimū, faciens ad nomas, putredines, polypos, uerrucas, thymos & formicarias appellatas, hæmorrhoidas, citra omnem mordacitatem. Misys crudī, chalcitidis crudæ, singul. dra. viii. ochræ dra. iiii. sandarachæ dra. iiii. calcis uiuæ drac. ii. squamæ aris, aluminis, singul. drach. ii. diphrygis drach. iiii. Vnito ac utitor.

Sicca crustam inducuntia, inter quæ etiam pastilli multi
usus.

Cap. L

Melinū, crustas inducens & callos exterens, inspersum, siue cum specilli nucleo adhibitum, & leuiter saltem ulceris superficiem inducitur, ut inde coloratur modo, ulcera cōmittit ac sanat quæ agrè curantur. Chalcitidis crudæ drachmas viii. cadmiæ drac. iiii. ieiuni hominis salua excipito ac subigito, & in mortario operta mali cydonij colorem assumere sinito, & cum pistillo leuiter trita in umbra assiccato. Alij tamen aliter præparant, & à colore quem acquirit, fuscum appellant. Sumunt enim chalcitidis drach. xii. cadmiæ drac. vii. & ad caniculæ æstum cum aceto terunt, atq; ita in umbra siccant. Aliud sic cum, quod item ad solis feruorē paratur, & melinū colorem habet. Calcis uiuæ sextantē, auripigmenti un. i. Auripigmentū cum aqua terito, & calcē addito, ac simul probè conterito, deinde in mortariū aqua plenum conijcito ut subsideat, & ubi subsederint priore aqua diffusa, nouā affundito ac diu uersato, & rursus subsidere sinito, quo facto rursus priore aqua diffusa, nouā affundito, atq; idem tertio repetito. Postremū uase aqua repleto sinito, ac singulis diebus uersato donec arefiat, & consumpta aqua aliam affundito. Atq; hoc per dies x. sub caniculæ æstu facito, & tandem pharmacū siccatum in fictili uase in superiore parte domus non humida seruato. Hoc citra mordacitatē crustas inducit, & ualde deprimat. Facit & ad gingiuas putridas, & epulidum eminentias deprimat, dentes inalbat. Potest quoque in mortario subactum in fictile transferri, atq; insolarari. Vtere Faustini quoq; pastillo ac reliquis eiusmodi ad dysenteriam delari. Vtere Faustini quoq; pastillo ac reliquis eiusmodi ad dysenteriam delari. Aliud. Ad totius corporis putredines & nomas. Calcis uiuæ, chalcitidis, singulorū drach. ii. auripigmenti drach. i. Hoc ad reduuias digitorum, & ad putredines adhibetur, partibus putridis ex eo inspersis. Facit & ad carbunculos splenio resinato exceptum. Confert fistulis melle exceptum cocto, & uelut collyrium inditum. Oribasij, ad pudendorum nomas, præsertim meliceridis dictas. Gallarum, floris mali punici, satiui, itemq; syluestris, aristolochiæ rotundæ, squamæ aris, chalcitidis crudæ, singul. drach. viii. aramentī sutorij drach. vii. aluminis scissi drach. iiii. malicorij drach. i. Adhibetur pudendo cum melle, quemadmodū id quod ex charta præparatur. Facit ad nomas ualde profundas, sicut etiam pastillus Andronis. Cæterum medicamentum ex charta hoc est: Squamæ aris, chartæ uisæ, singulorum drachmas xxiiii. auripigmenti, sulphuris uiui, singul. drac. xii. uel ut alij habent, xiiii. plumbi usti drach. iiii. alij drach. vi. Charta primum teritur, deinde metallica leuissimè trita ammiscet. Facit ad oris ac totius corporis putredines, ad humidiore quidem siccū inspersum, ad sicciores rosaceo imbutū. Additur aliquando & mellis modicū. Ego uero plumbi dra. vi. adijcio. Siccum ad antiquas nomas, & ad gingiuas cruentas. Deprimat etiam carnem ex crescentē. Chalcitidis uisæ drach. x. misys drach. xxx. aris usti drach. x. atramenti sutorij drach. mas viii. sandarachæ drac. v. auripigmenti drach. ii. unito ac utitor. Aliud experimento constans. Rhois culinarij drac. x. squamæ aris, aloës, foliorum olea

oleastri siccorum, sing. drach. viii. chalcitidis dra. v. auripigmenti, sandarachæ, aluminis scissi, salis toiti, singul. drach. iiii. malicorij sicci drach. vi. chryfocollæ factitæ drach. iiii. rusci sicci drach. viii. Trita, unito ac utitor. Aliud ad nomas & putredines, Oribasij. Salis fossilis drach. ii. aluminis in fictili usti un. i. squamæ æris, pumicis usti, sing. unc. i. Aliud eiusdem. Auripigmenti, squamæ æris, misyos, chalcitidis, portiones æquas præpara & utere. Aliud Pali-philum uocatū. Atramenti sutorij, sandarachæ, misyos, chalcitidis, pares por-tiones cōmittito. Siccum aureum appellatū. Aufert ossa, reprimat influxio-nes, fistularum callos exterit, & contrahit sinus. In fistularum aut & sinuū con-cauitates per specillum lana obuolutū inditur. Melantheriæ ac uerustis clauis derafæ dra. v. malicorij dra. x x v. aluminis scissi dra. iiii. atramenti sutorij, mi-syos, chalcitidis, æris usti, sing. dra. viii. squamæ æris dra. x vi. gallarū dra. x v. Acci quantum satis est. Oportet aut aceto in uas æneum cōiecto clauos quo-tidie agitare, & deinde acetū excolare: longè uero præstat quod in fundo resi-det. Aliud siccum. Ad nomas, defluxus, gingiuas, columnellas & puden-da Ochra sesquilibra, croci lib. i. putaminū ouorum ustorū sexuncem, gallarū sexuncem, tritis utere. Gallæ aut sint omphacitides. Pastillus ad nomas com-modus. Sabinæ, myrrhæ, sing. dra. iiii. foreos, misyos, cyprij, atramenti sutorij, thuris, aloës, sing. dra. ii. terito cum uino & formato pastillos. Pastillus ad no-mas & putredines, quo utor, inquit Oribasius, appellatur Asclepius siue Aescu-lap.us, & Cyriacus, hoc est, dominicus, Gallarū dra. viii. florū mali punici, ari-solochiæ rotundæ, chalcitidis crudæ, cadmiæ, sing. dra. v. i. iridis, squamæ æris, sing. dra. iiii. misyos crudi, atramenti sutorij, aluminis scissi, thuris nitri, singul. dra. ii. Terito cum aceto ad dies sufficientes, & pastillos x x. formato. Eosq; uisus tempore aceto mulso dissolutos cerato excipito, hoc modo utens. Accipe pastillorum trientem, ceræ quadrantem, olei myrtei sexuncem, galbani trien-tem. Et pastillis aceto dissolutis ac tritis, liquata ammisceto. Atq; hoc quidē mo-do præparantur ad ignem sacrū, panos & condylomata. Ad ozænas uero, car-bunculos, & carnis excrescētias, pastilli sicci insperguntur, uel aceto mulso triti ac dissoluti. Pastillus Corax, id est, Coruus appellatus. Ad putridorū ulcerū præsertim pudendorū nomas. Gallarū sextantē, squamæ æris sesquiunciā, chal-citidis crudæ, thuris, singulorū quadrantē, ceræ trientē, terebinthinæ unc. i. ad-pis taurini bessem, olei myrtei dextantē. Arida cum aceto in sole ad sufficien-tes dies terito, & mellis sexuncē adijcito. Deinde cerato exceptis utitor. Hic pa-stillus citra ammixtionē per se adhibitus, omnibus nomis præsertim siccioribus cōfert, & ubi nerui sunt denudati. Cū æquali uero cerati portione, sordida ulce-ra exterget, cum uberiore cerato cicatricē inducit. Ego, inquit Asclepiades, sic præparauit. Squamæ lib. i. gallarū, adipis taurini, sing. dodrantē, chalcitidis, thi-s, singulorū sexuncē, cum aceto uelut collyria tero, & pastillos formo. Postea uero ex pastillis drach. x x ii. aceto tero, & mellis dra. x. addo, & cerato quod ha-bet olei myrtei, adipis taurini, singulorum dodrantē, ceræ sextantē, terebinthi-næ trientē excipio. Pastillus ē croco. Myrrhæ, malicorij, æruginis, aluminis scissi, singulorum sextantē, croci unc. i. aloës, squamæ æris, thuris, sing. unc. i. sulphuris uiui drach. iiii. mellis lib. i. cum uino adstringente terito. Facit ad no-mas, putredines oris, & cuiuscunq; loci, dentes motos firmat, ulcera marcida & flaccida repurgat & adstringit, purulentas aures, sinus, fistulas, & carbuncu-los curat, squamas ossium resoluit, & incarnat. Est enim ualde cōmodus ad os-sa curat, ueluti uestienda, Confert etiam dysentericis, & adhibetur uel aridus, uel hoc modo

modo coctus. Mellis lib. iiii. aceti lib. i. pastilli sextans, simul ebulliant ad mellis compagem. Si uero partibus molli sensu praeditis adhibendus est, uino tantum diluitur. Pastillus ex plantis inscriptus. Malicorij, foliorum myrti siccorum, testarum nucum iuglandium siccarum, fructus spinæ, singul. drach. viii. gallarum drach. iiii. salis fossilis dra. viii. omnia tunduntur, & cribrata aceto subiguntur, & in uas fictile mittuntur, ac assantur. Deinde cū aceto teruntur, et adijciuntur myrrhæ dra. iiii. thuris drac. ii. & formantur pastilli. Vfus horū est cum aceto. Pastillus ex lanis succidis quem Leonidas ualde laudat. Læne succidæ ustæ, ramentorū plumbi, squamæ æris, bituminis, singul. drach. x. aluminis scissi & rotundi, gallarum, malicorij, misyos, thuris, chalcitidis, singulorum drach. v. myrrhæ dra. ii. amurcæ sesquiheminā. Terito cum aceto, & formato pastillos ac utitor. Pastillus Bithynus. Ad nomas, fistulas, reduuias digitorum, carnem excrecentem citra mordacitatē deprimit. Cum cerato autem facit ad ignem sacrum & alia huiusmodi. Malicorij, gallarū, aristolochiæ, chalcitidis, cadmiæ, sing. drac. vi. iridis, squamæ æris, sing. drac. iiii. misyos, atramenti futorij, aluminis scissi, singul. drach. iiii. nitri, thuris, sing. dra. ii. Sub canis æstu cum aceto terito, & pastillos formato. Pastillus Pasionis. Squamæ æris drach. x. aluminis scissi, salis ammoniaci, aluminis, æruginis, thuris, sing. dra. viii. Aeruginem cum ære, squama & alumine sub sole terito, & ad probe trita thus addito, simulq; terito ac pastillos formato. Vfus est ex aceto. Polyidæ spirægis siue sigillum, ut habet Asclepiades. Aluminis scissi dra. iiii. thuris drach. iiii. myrrhæ, aloës, fellis taurini singul. drac. viii. floris mali punici satiui drac. x. atramenti futorij drac. iiii. Excipe uino dulci & utere. Sigillum Coracini. Facit ad tonsillarū inflammationes, luxatā columnellam, & gingiuas humore flaccidas. Facit & ad nomas, & affectiones sedis. Aristolochiæ rotundæ, florum mali punici satiui, chalcitidis tostæ, thuris, myrrhæ, atramenti futorij, crocomagmatis, aloës, fellis taurini, æquales portiones passo excipe uelut dictum est. Pastillus Andronius. Ad ulcera fluida, inflammatas columnellas, tonsillarū fluxiones, extrinsecus sub mentum illitus. Facit & ad pterygia oculorum, & glandularum circa inguina inflammationes incipientes, & ad ruptos intestinorum abscessus, callosq; fistularum exterit. Florum mali punici satiui, singul. drach. x. gallarum, aristolochiæ, singul. dra. viii. aluminis scissi, atramenti futorij, singul. dra. i. singula seorsim primum, deinde simul terito, & in pastillos redigito. Infunditur per clysterem prout uires tolerarint ad ruptos intestinorum abscessus, si febris adsit cum aquæ cyathis viii. si non, cum uino. Pastillus Antonij Musæ. Aluminis scissi, aloës, myrrhæ, florum mali punici satiui, singul. drach. vi. atramenti futorij drach. iiii. croci, crocomagmatis singulorū drach. iiii. Terito è uino mulso ex passo confecto, & pastillos formato, quos in umbra exsiccabis. Heras quidem & nos ita præparamus. Asclepiades autem hunc ad Arillarum Tarlensem refert. Et cætera quidem simili modo componit. Verum aramenti futorij drach. vi. accipit, & cum uino falerno pastillos formare iubet. Facit ad ulcera recentia ac uetera, putrida, marcida, efferata, phagedanica, ac fistulosa & quæ priuatim ceria appellantur. Ad ozanas diluitur cum uino. Ad suppuratas aures cum sapa & modico aceto. Ad condylomata item cum sapa. Ad ulcera genarum carbunculosa ac maligna cum sapa. Ad carnis excrecentias in naribus, ore, extremitatibus omnibus, uulua, pudendis, omnem emittentiam compefcit, & digitorum reduuias tollit, ulcera caua replet, sinus & fistulas

stulas melle dilutus ac cum lixiuio instillatus glutinat. Idem ad oris uitia gargarissatur. Quod si semel in mense fiat, neque dentes dolebunt, neque aliquid incommodi ori accidet. Facit & ad testium sacrum ignem, & articulorum inflammationes illitus. Et ad hæc omnia utitur eo Asclepiades. Quod si mollire discereque uolueris, quadruplum ammoniaci miscebis, & cum aceto ad mellis spissitudinem conteres, illinesque & alligabis. Si uero emplastri formam malueris, quadruplum terebinthinæ ammiscebis, adiecto etiam oleo si durius pharmacum apparebit. mollit enim & cicatricem inducit, ac glutinat. Idem pastillus splenicis, hepaticis, ac dysentericis confert, & uiscerum ulcera sanat, & incipienti tabi auxiliatur. Dantur ex eo oboli tres cum familiari in singulis affectionibus portione. Per aliquot autem dies ducit urinas loturæ carnis limiles. Itaque ab eius usu desistendum non est ante sanitatem restitutam. Vino quoque mulso & mali punici dulcis succus dilutus, & cum penna illitus anginis medetur. Verum interim dum illinitur nauseam excitat, & uomitum prouocat. Cæterum crocomagma quod in pastillum recipitur, & quo ad capitis dolores utimur, ita preparatur: Croci drach. c. myrrhæ troglodyticæ, rosarum recentium relictis unguibus, amyli recentis, singulorum drach. cl. Cum uino ad collyrii formam terito, & pastillos formato. Porro pastillus ex solano halicacabo, superius ad fissuras ac tubercula sedis descriptus est.

De sanguinis eruptione, & quæ crustam inurant, Rufi. Cap. LI

Quandoquidem plerumque ex his quæ ad sanguinis eruptionem adhibemus, ad nomas quoque usurpari solent, annectemus etiam de sanguinis eruptione tractationem. Ex ea enim præsens aliquando periculum incurrimus, exhibetque ea res imperitis negotium turbationemque ac formidinem, ut ne medico quiddam parua sollicitudo impedeat. Primum itaque nosse oportet, arterias ad sanguinis eruptionem magis quam uenas paratas esse. Perpetuo enim pulsant, amplioresque meatus ac solidiores tunicas habent, ut non facile cedant. Sanguis quoque in ipsis contentus tenuior est & plurimo spiritu abundat. Quin & aliquando obducta cicatrice cutis, & arteriæ fissura non obturata, sanguis sub cutem exilit, et efficitur tumor, quem aneurysma, hoc est, arteriæ dilatationem græci appellat.

Ab arteria igitur aut à uena sanguis manat, uel osculis ipsarum apertis, uel tunica diuisa, uel per transudationem, ut ita dicam. Porro tunica diuiditur, uel ex uulnere, uel ex contusione, uel ruptione, uel erosione. Oscula uero apeririuntur, aut ob multitudinem confertim ad osculum uasis prorumpentem, aut propter acrem qualitatem extrinsecus allabentem, aut propter uasis imbecillitatē. Transudatio uero aut persultatio fit, tunica quidem rarefacta, sanguine uero attenuato. Potest tamen aliquando etiā fieri paruarum uenularum osculis apertis. Si ergo ex uulnere, aut contusione, aut casu, aut clamore, ruptio cōtingit, causa iam præterijt. Si uero ex multitudine, fieri potest ut adhuc nunc etiā uas amplius rumpatur, quum efficiens causa adhuc maneat. In huiusmodi itaque affectione, multitudo quam citissime euacuanda est. Deinde sanguis sistendus, potestremo ulcus curandū. In quibus uero iam cessauit causa efficiens, protinus sanguis sistendus est, & deinceps ulcus curandum. At quo modo sanguinem sistemus: Nimirum ut ruptum adstringamus ac obturemus, & sanguinem aliò diuertamus. Obturabuntur autem labia uel digitis nostris, si in superficie ulcus fuerit, uel per deligationem, & per refrigerantium ac adstringentium pharmacorum adhibitionem. Nonnunquam & grumis concreti sanguinis uasis oscula occluduntur. Cæterum ex his quæ imponuntur, aliqua adstringunt, aliqua mea-

X x tus

tus obducunt, aliqua crustas inurunt. Quæ itaq; meatus obstruunt, ad sanguinis eruptionem adhibita, cito occludunt. Quæ uero crustâ inurunt, crusta ex cidente ulcus caui faciunt, & sæpissime excidētibus crustis sanguinis eruptio curata difficilima sequitur. Quapropter eiusmodi medicamētis nō nisi cogente necessitate utemur, ueluti si à putrida erosione sanguis erūpat. Tunc enim omni putrido exciso, tutius est uel cauterijs mali radicem exurere, uel crustâ inurentia adhibere, præsertim in pudendorū ac sedis affectionibus. Nam tales partes ob redundantem humiditatem, & acriū recrementorū transitum facillime putrescunt. Proinde in eligendis medicamentis quæ crustam inducunt, non tantū caliditatē, sed etiā adstrictiōnem considerabimus. Talia uero sunt, Misy, chalcitis, atramentū sutorium. Quæ enim ex calce uiua & auripigmento fiunt, uehementiora quidē his sunt, sed crustæ inde inductæ cito excidunt, eo quod nulla adest ipsis adstrictoria facultas. Quæ uero ab adstringētibus inducuntur crustæ, diutius in corporibus persistunt: quæ res nō modicam cōmoditatem affert. Priusquam enim excidat, præuenit incarnatio, ut caro medijs partibus innata, tanquā operculum quoddā uasis fiat. Et hac de causa nō festinandū est, uelut multi faciūt, ad crustarū ablationē, ubi eruptionis sanguinis periculū imminet. Sed in histan tum affectionibus in quibus obputredinē cauteriū adhibere coacti fuimus. Vocatur autē huiusmodi affectio Nome, quoniā ab affectis partibus proserpēs, partes secundū naturā se habētes depascitur, & semper aliquā ipsarū ulceris inuadit. Medicus itaq; his cōsilijs instructus ad sanguinis eruptiones curandas accedet, pro locorū natura, & uenarū magnitudine remedia adhibendo. Erit tū quidē digitis osculum ulceris uasis apprehendat, leniter innitens ac citra dolorem comprimens. Simul enim & sanguinē sistet, & grumum uulnē infingeret. Quod si uas unde sanguis manat in profundo etiā situm fuerit, ex actius cognoscet. Postea uero immisso uncino extēdat ac moderatē ipsum obtorquet. Si uero neq; sic sanguis sistatur, siquidē uena fuerit, conandū est ut citra uinculum sanguinē supprimat, per aliquod sanguinē sistens medicamentū. Optima autē ex his sunt quæ meatus obstruunt, cōposita ex resina fricta, & farina tritici polline, ac gypso, & alijs huius generis. Si uero arteria fuerit, ex duobus sanguinē faciens, aut uinculum circundans, aut totū uas præcidens ac difficans, sanguinē sistes. Cogimur tamē aliquando etiā magnis uenis uinculū obligare, atq; etiam aliquādo totas ipsas diffecare, transuersas uidelicet: quæ necessitas incūbet in his quæ recta ex alto sursum ferūtur, & præsertim per angustia aliquā aut principales partes. Sic enim utraq; pars utrinq; retrahitur, & ab incūbentibus corporibus uulnus tegitur et occultatur. His autē peractis incarnandū uulnus est priusquam uinculū uasis excidat. Nisi enim producta caro circumsitū diffecet, quæ teriē locū præmuniuerit, sed uacuus locus inuentus fuerit affectio sequetur quæ Aneurisma appellat. Quapropter in his potius suadeo ut sanguinē sistentibus, quæ meatus obstruūt utaris, quā his quæ crustâ inurunt. Citius enim ac tutius post illa uulnus incarnatur. Optimū itaq; omnium quæ ego noui medicamentorum est, quo etiā ad sanguinis e cerebri mēbranis eruptionē tutius utemur, hoc est: Thuris partes II. aloēs partē I. cum oui candido ad mellis cōpagem subige, & mollissimis leporis pilis excepta, uasi ac toti ulceri ubertim impone, & forinsecus fasciā ex linteo deliga, ita ut primas quatuor aut quinque eius obuolutōes super ipsum uas quod sanguinē fundit facias, & hinc ad radicē eius procedas, deinde alternis diebus soluas, & si quidē adhuc tutō adheferit ulceri medicamentum

tum rursus aliud ipsi circumfundas, & linamentum prius ex pilis constans uelut madefacias, ac rursus uelut antea deliges. Si uero prius linamentum sua lpon te exciderit, sensim per digitum uasis radicem comprimas, & hoc quidem leni ter adimas, aliud autē apponas. Atq; eo curationis ductu uteris donec uas car ne impletum fuerit, ægro in multa quiete seruato. At uero hoc medicamento varie utimur, aliquādo duplū thuris ad aloē addentes, aliquando ambo æqua li pondere miscentes. Sed & mannam quandoq; pro thure ammiscui, ut quæ ue hementius adstringat. Illud porro constat, in durioribus corporibus ea quæ ma gis adstringūt, & plus aloēs habent adhibēda esse. In mollibus, ea quæ plus thu ris habent. Sed & ad sanguinis ē cerebri membranīs eruptionem, & ad uulne ra in collo, usq; ad ipsas iugulares uenas, medicamento utimur quod plurimum thuris recipit. In his enim sanguinē citra uinculum sistit. Et quamuis multa sint quæ meatus obstruunt medicamēta, nullū tamen æque incarnat. Optime etiam obstruunt meatus pharmaca ex pice torrefacta, & colophonia, & puluere mo lendini parietibus adherente, & gūmi, & tragacantha ac similibus. Quandoq; etiam ex gypso præparata. Et symphyti quoq; radix ad hanc præstantissima est. Maxime cōuenit, ut Medicus pharmaca sanguini sistendo idonea apud se præ parata habeat, quo singulis oportune opem ferat. Tale est siccū Philagrij ad san guinē sistendum ex aloē & thure paratū. Primum autē digitis dissectæ partes cō mittantur ac cōprimantur donec cohæreant. tunc enim impactū medicamen tum sanguinis impetū cohibet, qui amplius adhuc supprimeretur, si leporis pilos molles sub uentre repertos ad impactū medicamentū apponemus, & ex eodē sicco superinspergemus. Atq; hoc ita sinendū est, donec caro excreuerit uelut operculum sectioni obducta. Confert ad idē rhodium supra inter deprimentia ac contrahentia relatū. Cæterum quædā ex sanguinem sistentibus, uelut dixi mus, crustam iuducunt. Quædam cū siccitate adstringūt, quædā ex plent & glū tinant: quorū aliqua magis parabilia referemus, quo ad singulas causas peculia re medicamentū in promptu habeatur. Ex his igitur quæ crustā inurunt, citra mordacitatē & efficaciter sanguinē sistit, hoc. Sandarachæ, auripigmētū, chal citidis, calcis, singul. drach. iiii. Hoc Ammonius chirurgus utebatur. Eo uero adhuc efficacius est quod habet chalcitidis drach. viii. atramenti futorij drach. x. calcis uiuæ drach. vi. aris usti drach. vi. misyos, diphrygis singul. drachm. v. Aliud celebre. Aluminis scissi, atramenti futorij, gallarū, singul. drach. vi. mi syos drach. viii. forcos drach. iiii. Hoc optime facit & ad nomas. Aliud ex erethria terra. Terræ erethriæ aut cimoliæ, drach. viii. squamæ aris, aluminis scis si, resinæ aridæ, thuris, myrrhæ, singul. drach. viii. Aceti quantum satis est. Te rito in sole ad cōpagem, & pastillos formato. Aliud, Spongiam nouam liqui da pice imbutā bitumine trito insperso, in olla exurito. Deinde eius sextantem accipito, chalcitidis, misyos, singul. unc. i. At si mitius facere uolueris: Accipe spongiæ ita ustæ sextantē, plumbi usti & loti unc. i. stibij unc. i. Hoc crustam nō inducit. Aliud cōfestim sistens sanguinis eruptionē. Chalcitidis drach. viii. Thuris siue mannæ eius drach. x. vi. resinæ aridæ, gypsi recentis, singul. drach. viii. Cætera trita ac cribrata in pyxide ærea seruato. Gypsum uero quo tempo re medicamento miscendū est, recens terito, & ammisceto. Aliud sanguinē sistens, citra crustæ inuisionē. Misyos, succi polygoni sicci, singul. drach. x. lii. aluminis scissi drach. x. x. i. Aridum aceto rigatū spongia excipe, & ulceri appo sitū deliga. Aliud Oribasij, facit ad pudendorū & totius corporis nomas. Cal los etiā extertit, & strumas sanat. Minij cū oleo rosaceo subacti, sulphuris uiui, au

Xx 2 ripigmenti;

ripigmenti, sandarachæ, calcis uiuæ, æquas portiones unito ac utitor. Aliud. Optimum ad sanguinis eruptiones, Galeni. Gypsum & tritici pollinem oui dido excipe, & cum leporis pilis impone. Aliud. Resinam pinus probe trita uel per se, uel cum thuris polline adhibe. Qui ergo plura medicamenta expetit, multa in simplicium medicamentorum libris, & in tractatione de singularum partium morbis inueniet. Sed & quæ nunc recensui sufficere possunt. Omnia enim alia ex iisdem preparantur, & non longe uiribus inter se differunt. quædam fortiora, quædam debiliora sunt, ut cuiq; congruū eligi possit. Etenim quum Erynchus quidam in summitate manus ulcus haberet, idq; malignum euaderet, & circū circa eroderet, & sanguis ex ipso manaret, medicamentum ex thure & aloë apposui albumine oui exceptum, et hoc magis auxit sanguinis eruptionē. Detracta itaq; aloë, thus ipsum per se cum ouo imposui, & neq; sic sanguis sisti potuit. Cognoui autē quod ex multa sensus subtilitate hoc pateretur. Quapropter linamenta posca dilutissima imbuta indidi, iussiq; tandem assidue super linamenta instillare, atq; ita statim sanguinis eruptionē suppressi, neq; ab eodem medicamento usq; ad exactā incarnationē destiti. Aliud ad arteriā dissectā. Sal cōmune & equi aut asini simum siccū, pari portione cum lixiuio quercini cineris subactū impone. Aliud. Porrum cum aceto tusum impone. Aliud. Cochleas cum domibus suis, tum paruas tum magnas, uistas tritas impone.

Exedentia & urentia medicamenta.

Cap. LII

Erodentia et ustoria medicamenta ad columnellas adhibemus assidue destilantes ac laxatas, & ad callosas carnis excrescentias, ulceraq; cancerata & strumas, quas erodere uolumus. Item ad coxendicum et articulare morbum, affectiones splenis, pro cauterio. Præterea ad formicarias uerrucas, clauos, ficosos tumores, & alia huiusmodi. Præcipua uero ipsorū uis est ad carbunculosa & maligna ulcera. Adhibita enim nomas compescunt, & crustas exterunt. Erosi-uum citra mordacitatem, Squamæ aeris drach. iiii. sandarachæ drach. ii. ueratri nigri, auripigmenti, singul. drach. i. præstantius hoc euadet, si pro auripigmento aluminis scissi par pondus adieceris. Aliud. Squamæ aeris, sandarachæ, auripigmenti, ueratri nigri, seminis urticæ tosti, æquales portiones cum rosaceo terito ac utitor. Aliud, citra omnem mordacitatem crustas in altum inducēs. Squamæ aeris, sandarachæ, singul. drach. iiii. ueratri nigri drach. i. Ad humida ulcera utere sicco, ad reliqua cum rosaceo. Orisassij erosiuum efficacissimum quo utor: Seminis urticæ, squamæ aeris rubræ, sandarachæ, par pondus cum rosaceo terito ac utitor. Aliud. Sandarachæ, aluminis scissi, singul. drach. iiii. squamæ aeris drach. i. auripigmenti drach. i. Et si quidem nomen est, quæ adstrin- gi debet, siccum adhibeto. Si uero struma, aut canceratus tumor curandus est, rosaceo excipe, & quotidie bis impone. Ceratum ustorium, quo ad lippitum- dines utimur, temporibus adhibito donec rubefiant, facit & ad coxendices, statim enim sedat dolorē. Cantharidū, atramenti sutorij, succi thapsiæ, allij, singul. unc. i. ceræ trientē, olei quincuncē. Aridis ex aceto tritis liquabilia liquata am- misceto. Et ubi locus rubicundus factus fuerit, illinito ea quæ ad ambusta ab igne præparantur. Aliud cauteriū ē uisco. Calcis uiuæ, fecis uini uistæ, sing. drach. iiii. uisci drach. ii. nitri drach. i. Mitius hoc fiet, si calcis drach. iiii. solum accepe- ris, & saponis quantum satis est. At si desit sapo, lixiuij lib. i. ad tertias coquito, atq; hoc modo præparato. Arida leuissime trita, uisco ad ignē liquato excipies, & rudicula agitabis. Deinde ad frigefacta lixiuiū paulatim instillabis, & emol- lies ut medicamentum strigmentitia spissitudine liquidius euadat. Quod in pila beapxyā

bea pyxide solidiore seruabis, & si reficceretur, lixiuium subinde instillabis. Hoc ad menti imperigines ad semihoræ spatium illinito, & postea loco per spongi- am foto, albumen oui, aut emplastrum ex plumbagine, aut hordeo, paratum imposito. Hoc aliqui etiam ad coxendices, & splenis affectiones, ac articula- rem morbum utuntur, hoc modo applicantes. Linteolo cuidam detricto me- dicamentum aliquod glutinosum illinunt, & hoc rotundis foraminibus per- tufum adhibent, foramina uertentes eo ubi inuersionem facere uolunt: Atque isthic medicamentum ustorum ubertim imponunt, quo uidelicet pars requisi- ta tantum inuratur. Tum brassicæ aut betæ folia superimponunt, & decem aut pluribus horis sinunt. Et ablato postea medicamento ad mitigatoria transeunt quæ ad ambusta parantur. Erosium incomparabile. Veratri nigri drach. III, squamæ aris rubræ drachm. XII, sandarachæ, auripigmenti, singulorum drachm. II, atramenti sutorij drachm. IIII, uentrium cantharidum drach. XII. Omnia lixiuii excipito. Cauterium ad columellas, Demosthenis. Calcis uiuæ drachm. IIII, fecis uini ustæ drach. II, Sit autem fex non uetusta, sed duo- rum mensium, nitrî tosti drach. II, minij drach. I. Cum lixiuii ad mellis liquidi- oris spissitudinē terito, & bis aut ter ebullire finito, donec cogatur. Deinde in plumbeam pyxidem recondito ne exarescat, & ea gratia subinde lixiuium in- stillato. Facit ad uerrucas cum alias, tum formicarias appellatas, reduuias digi- torum, clauos pedum ac manuum, callos, cicatrices eminentes, & carbuncu- los. At uero post columellæ uersionem, oleum gargarissandum & in ore tenen- dum exhibeto. Tertia die transacta, ex aqua mulsa, aut lacte cum melle os elua- tur, donec excidat crusta. Eodem modo etiam anthero, siue florido, aut phry- gio medicamento uteris. In alijs uero corporis partibus ad locum inustum re- purgandum, aluminis liquidi, amurcæ, mellis cocti, æquales portiones misce et adhibe. Et post repurgata ulcera mitigatorijs medicamentis uterè.

De sinibus. Galeni.

Cap. LIII

Omnia sinuosa ulcera modo aqua mulsa, modo uino, modo uino mulso, mo- do aceto mulso eluimus. Ad extergendam enim saniem aqua mulsa præstat. Ad repurgandum uero & roborandum uinum mulsum confert. Ad glutina- tionem, uinum. Ad cruetum ac graueolentem humorem, acetum mulsum. At in diuturnis affectionibus incarnatione opus habentibus, medicamenta mea- tus obstruentia plurimo rosaceo diluta, per fistulam in directum perforatâ, cui uesica alligata est, infundemus. In quem usum probe facit Machæionis empla- strum, & quod Isis, & quod Harmonia appellatur, & pleraq; nigra. Sed & hoc quod subiiciemus probe facit. Primum enim sinus repurgat, deinde incarnat, postea glutinat. Corticem caprifici à teneris ramulis detractum in oleo coqui- to, & oleo excolato ceræ quantum satis est ammisceto, ut liquidum & infusile fiat medicamentum. De quo quantum satis esse uidebitur tepidum in sinu in- fundes, & parato ex eodem solidiore cerato, id ipsum impones ac deligabis. Potes & forinfecus imponere emplastrum barbarum, & quæ ex pice ac bitumi ne preparantur, & quod ex falicibus conficitur, & quod è uino mulso, & quod ex spuma argenti, & Harmonia, & emplastrum Piscatoris, & melinum Passio- nis. Ad eos tamen qui uicinas partes teneriores habent, magis conueniunt emplastra ex sale parata. Super emplastra uero spongia aceto mulso, aut posca, aut uino imbuta imponatur. Deligatio uero à fundo sinus incipiat, & ad oscu- lum ulceris desinat. Et linteorū obuolutiones citra dolorem quidem fundum sinus adstringant, sed inde paulatim remittantur, ac laxius ad osculum ulceris

Xx 3 connectan-

connectatur. Ita ut emplastrū qđ forinsecus sinui adhibitū est, iuxta osculū forpi
ce præcidatur, quo sanies excerni possit, et aliud parū rectiloco imponatur ex
eodē medicamēto, sit autē laxius propter eandē saniei excretionē, & alternis die
bus auferat, relicto illo totū sinū ambiente, Deinde ubi sinū agglutinātū cogno
uerimus, ad cicatricē inducētia pergemus. An autē probe glutinatus sit sinus in
p̄fundo, ex pure effluēte cognoscemus, si modicū efflux erit & cōcoctū: Et si in
ipso sinu neq; dolor, neq; tumor percipiat, sed cōtractus fuerit locus siccusq; ac
doloris exps. Illitio ad sinus antiquos. Gallas omphacitidas ad duas horas oleo
macerato, & in fictile siue æneū lebetē cōiectas cū oleo coquito ad prunas, do
nec nigrescāt et uelut torrehāt. Deinde ex oleo eximito, ac frigefactarū un. i. ac
cipito, et aluminis scissi, aloēs, sing. un. i. addito, & radicū altheæ siccārū, artēmi
siæ unicaulis sicce, sampſuchi, singu. sextantē adijcō, & singula seorsim terito,
ac cribrato, & postea mista simul seruat, & usu expetente, oui luteo excepta il
linito. At uero in ipso ulceris osculo parū emplastrū impones ex pastillo quādam
ludāū refertur. Idē medicamentū facit ad fistulas, herniā aquosam, et podagrā.

De sinibus attritam cutem habentibus. Eiusdem. Cap. LVIII

Inflammationibus ad abscessum mutatis si serius incisio fiat, cōtingit aliquā
do ut cutis sinui incumbens tenuis, uelut detritum uestimentum reddatur, &
propterea huiusmodi ulcera detrita appellantur, quæ difficulter coalescunt ac
glutinantur, & præsertim si quis compage siccum medicamentum imponat.
Ab his enim magis adhuc cutis deteretur, & exarescet uelut pelles attritæ. Ad
ea igitur glutinanda utendum est medicamento, cōpage quidem liquido, facul
tate uero sicco. Quale est phœnicinum emplastrum Galeni, quod nos ad huius
modi affectiones præstare cognouimus, si ita paratum fuerit ut neq; ualde du
rum sit, neq; adhuc inquinare desuerit. Ita enim præparatum & cruenta uulne
ra glutinat, & omnibus ulceribus cicatricem inducit. Ad sinus autē detritos ef
ficacissimū est, quod tenerū est et cōpagem mollem habet, & cum oleo ueteri ac
uino moderate antiquo resolutum est. Nam sicut duriciā ad hos usus improba
mus: Ita molliciem minus fluidā reiicimus. Liquidum enim calido corpori in
cumbens diffluit, & linteolum siccum relinquit, quod non solum nihil prodest,
sed etiam glutinandæ cuti obest. Sed & mel moderate coctum ad hanc sinuum
affectionem mirifice conducit: Cui myrrhā, uel aloē, uel thus probe trita, seor
sim singula, uel simul omnia inspergere prodest, præferam si linteolo illitū mel
liquidius appareat. Expertus sum & centaurium tenue mirādum pharmacū ad
hos usus: Deinde symphytū, & plantaginīs folia cū radicibus siccata. Conuenit
& rumicis radix, oleastri folia: Verbenaca supina cū radicibus, uitis alba, iris,
dictamnū, saluā, poliū, sabina, cupressi folia, salicis succus. Et in teneris carnib.
erui farina. Quæ omnia prius tūdenda ac cribrāda sunt. Et ex eis tunc melli am
miscendū est quum coctū ab igne aufertur, ita ut probe cū eis agitatum mel do
nec tepidū fiat, imponatur linteo inductū. De fistulis. Cap. LV

Quandoquidem sinus male curati in fistulas mutari solēt, de his quoq; ex or
dine dicendū est. Appellantur autē fistulæ per translationē à fistulis harundinū,
aut ex alia materia cōfectis. Nam in ipsis cavitās quædam est harundinum ca
uitatibus similis, & sinus callosus inest, qui citra chirurgiam aut fortius pharma
cum rescindi nō potest. Fistulis itaq; obliquis sub cutem extensis specilli nucleū
immittimus, & eleuata cute totā longitudinem una sectiōe incidimus: sin in
callos uelut fistularum causas, si in superficie fuerint, specillo deradimus: sin in
profundum penetrauerint, scalpello rescindimus, Nisi enim rescindantur, neq;
caro

caro produci, neq; ulcus coalescere poterit. At si fistula non fuerit obliqua, sed decliuſ & ad profundū uergens, fistulae ambitū reſecamus, tantū de carne circūſiſta auferentes, quo calli cōmode reſecari poſſint. Si uero fistula in os deſinat, ab oſſe denudato, ſquamā deradimus. Caterū fistulae in os deſinētes ampliores quidē nucleo ſpecilli immiſſo ex renitentia deprehenduntur. In anguſtioribus uero apice ſpecilli pertentamus, & durū ac oſſeū corpus occurrens cōtingimus ac ſonum quendā percipimus, uelut aſſis aere percuſſi, qua arte nō ſolum fiſtulā oſſi contiguā eſſe, ſed etiā an corruptū aut illaſum ſit diuoſcimus. Inducto enim undiquaq; ſpecillo, ſi tanquā à leui corpore ipſum ſemper lapſare percipimus, os incorruptū eſt. Si uero ſpecillū aliquibus partibus inhaſerit, inaequalitates ac aſperitates ſub eſſe indiſcū eſt, & ex eo os corruptū eſſe cōiectamus. At in fiſtulis quae ampliffima habent oſcula, ſaepe uiſu os deprehendimus, ut cōiectura nō ſit opus. Si uero obliquae fuerint, flexūq; aliquem uel plures habuerint, ut ſpecilli apex progredi non poſſit, uirgulā plumbeā aut ſtanneā parabimus, qua iter pertentemus. Quū enim flexilis ualde ſit, ad fiſtulā figurā facile ſe accōmodabit. Si uero propter nimiam obliquitatē, fiſtula nihil tale admiſerit, ex humoris allati natura fiſtulae terminū cognoscemus. Quod ſi fiſtula neruū attigerit, ex dolore indicabitur, punſtionis enim ſenſum exhibebit, aut ſtuporis. Deinde motus qui ab illo neruo perfici ſolet, deterior apparebit. Sed & in ſpecilli contactu moleſtus ſenſus perceptus, indicationē faciet. Humor autē inde allatus tenuior eſt, ſimilis ei qui ab oſſibus deſluit, non quidē oleoſus aut pinguis, ſed ſanioſus & glutinoſus. Eadem uero accidentia cōcomitantur fiſtulas ad muſculos penetrantes. In his autē quae carnes tantū penetrant, craſſiorē ac humectiorem ſaniem reperies. Quae uero uenas occupāt, eadē accidentia habent quae ad neruos ſunt relata, ſed imbecilliora, dolores item ac punſturas. Verum nullus motus impedietur. Idem uero etiā de his dicendū eſt quae ad arteriā pertingunt. At uero ſi fiſtula locū erodēte uena ſuberit, plurimus ac craſſus ſanguis effunditur: Si uero arteriā, tenuis & flauus cū multo ſpiritu ac ſtridore exilit. Atq; haecenus de fiſtularū ſignis ac differentijs, deinceps autē de medicamētis ad eaſdē conferentibus tractandū eſt. Poſt calloſarū igitur partiū reſectionē, carnoſis quidem partibus ſuppurandi ductū adhibebimus, & deſquamata oſſa ſiccare conabimur. Baſilicū itaq; emplaſtrū & reliqua huiuſmodi inter ſuppuratiā medicamēta habētur, ſicut etiā quae capitalia appellantur deſiccādi uim habēt. Linamēta quoq; melle illita commode indūtur. Ad fiſtulas uero inchoātes, nec adeo profundas, quarū chirurgiā aegri penitus reſuſant, medicamēta callos exterētia adhibebimus. Deinde remoto callo, curatiōe reliquis ulceribus cōmuni utemur. Collyriū fiſtulare, ab antiquis fiſtulis callos exterēs. Atramētū futuri, miſyos, chalcitidis crudā, aeruginis, aluminis ſciſſilis, rubricā ſinopicā, gūmi aequales portiones aceto excipito. Quod ſi pro gūmi, thus adieceris, & duodecuplū mellis ammiſcueris, calloſos ſinus repurgat. At ſi uni eiūſdē parti, octuplū mellis adieceris, incarnat & ad cicatricē perducit. Aliud, faciēs ad fiſtulas antiquas. Miſyos, atramenti futuri, aluminis ſciſſi, ammoniaci thymiamatis, aequales portiones excipe aceto. Aliud ſiccum, callos fiſtularum exterens. Cadmiā, chalcitidis crudā, ſandarachā, gummi, ſingulorum quadrantem, aeris uſti, miſyos crudi, ſingulorum ſeſquinciam. Aliud xyraphium, hoc eſt, callos deradens: Ad capitis ac menti ficofas papulas faciēs. Miſyos, chalcitidis crudā, ſingulorum drachm. ii. aluminis ſciſſi drachm. i. praepara, & eloto prius loco, medicamentum ubertim inſperge, & poſtridie ruruſ eloto loco & calli ramento

Xx 4 ſpongia

spongia deterfo, nouum medicamentū adhibeto, tamdiu hoc repetēs donec totus callus fuerit deraſus. Et cauendum interim eſt ne olei contactu pars curanda inquinetur. Quod ſi ita uſum fuerit, poteris ammoniaci thymiamatis drach. i. aceto reſolutam ad ſeptem huius medicamenti drachmas ammiſcere, & collyria efformare. Aliud Collyrium fiſtulare. Chalcitidis crudæ, myſios crudi, æruginis, ſorceos, atramenti ſutorij, ammoniaci thymiamatis, æquales portiones aceto excipito. Aliud philoſophi: Braſſicæ radicem, cucurbitā ſiccā, os canini capitis, cerui cornu, ſimul exurito, & ad cincrem iſorum origanum, & ſtercus gallinaceum, utrūq; ſiccum ac tritum ammiſceto, & arida ſeruato. Viſu uero expetente fiſtulæ oſculū uiuo humectato, & ſiccū large inſpergito, & lin-teolo impoſito deligato. Hoc abſceſſus rumpit, & ſanat fiſtulas chirurgia non-dum attactas. Aliud eiufdē. Conchas cum teſtis exuſtas & tritas adhibe. Vel carnes cochlearū cum myrrha, thure et aloē, in fiſtulā inde, externiſq; impone.

Aliud fiſtulas mirifice reſiccans. Facit & ad ſeminis fluxum, capitis deſilla-tionem, aures contuſas, ac dyſenterias. Conſumit omnem humiditatem. Idem publi & lumbis impoſitum, muliebrem fluxum & hæmorrhoidas ſiſtit. Cochle-arum carnes cum domibus ſuis, bulbū paruum, bitumen, aloē, thus, cum ace-to terito ac utitor. Aliud ad fiſtulas optimum. Polygoni folia à ieiuno com-manſa apponito, & uuas paſſas unā cum uinaceis tritas ſuperligato. Et ne conſe-pſeris medicamenti uilitatem. Aliud ſiccum Magiſtriani, fiſtulas incarnans. Chamæleonis nigri radicem, corticem pinus, thus maſculum, ariſtolo-chiam ſo-gā, ſingula paribus portionibus terito, & fiſtulæ aqua muſſa elotæ ſicca inſper-gito. Aliud. Aloēs ſextantem, radicis anchuſæ unciam, i. Replet & incarnat.

Aliud. Scillam in olla uſtam ac tritam indito. Aliud præſentaneum, quod Hercules appellatur. Idem etiam ægilopas radicitus tollit. Pridie uero papyrus in fiſtulam indatur, deinde collyrium ad fiſtulæ ſiue papyri menſuram immitta-tur, & per triduum ſinatur, & in quarta fiſtulam prorfus ſanatam comperies. Cadmiæ oſtracitidis drach. v. i. æris uſti drach. v. miſyos toſti drach. i. x. chalciti-dis crudæ drach. viii. cantharidas numero ſeptem, libanotidis ſiccæ drach. i. her-modactyli radicem integram, gummi drach. x. excipe aceto & collyria forma-to. Sunt qui atramenti ſutorij & æruginis ſingul. drach. v. i. adiiciunt. Aliud ad fiſtulas uſq; ad os pertingentes. Squamę æris, æruginis, ammoniaci thymia-matis, ſingulorum æquas partes aceto ſubige & paſtillos efforma. Viſu expeten-te quantum ſatis eſt accipito, & ad ignem emollito, & collyria formato fiſtulæ æqualia, eaq; indito. Aliud Oribaſij, Ad fiſtulas & uibices, à Dionyſio acce-ptum. Foliorum lepidij herbæ in umbra ſiccatorum, floris cnicī, mellis deſpu-mati, terebinthinæ, æquales portiones. Arida cum aceto terito, & adiectione mo-dico roſaceo omnia, ſimul ad emplaſtri formam ſubigito. Poſtea fiſtulæ ex ace-ro præſcriptæ, lepidij folia ſicca trita inſpergito, & ſplenium ex medicamento il-litum ſuperimponito. Aliud experimento conſtans. Radicum liſiorum uſtorum cinere fiſtulam expleto, & callus exteretur, quo ſublato ſimilacem her-bam arundinibus ſe implicantem, flore candido, folijs hortenſi phaſelo ſimili-bus accipito, eamq; ſiccā uſtam tritam fiſtulæ indito, & incarnabitur.

Aliud. Oleaſtri radicem uſtam terito, & ſiccā fiſtulæ uiuo calido auſtero elotæ inſpergito, & callus excidet. Aliud fiſtulas incarnans. Lapidem tranſ-lucidum ſpecularem appellatum urito, ac tritum fiſtulæ inſpergito. Cæterum poſt uſum eorū quæ callos exterunt, collyrijs repurgātibus utendū eſt ex ærugi-ne & melle cocto. Medicamētum ſinus repurgās & incarnās. Myrrhę, croci ariſtolo-

aristolochiæ, rubricæ sinopiciæ, singul. unc. i. Fel taurinum integrum, mellis quadrantem. Fel cum melle coquito. deinde reliqua tenuissime trita ammisceto, & rursus coquito, & collyria formato. Aliud. Muscij herbæ quam & dorcadia dem uocant, misyos torrefacti, singul. drach. vii. salis communis, aluminis scis si, æruginis, singul. drach. ii. chalcitidis drach. x. nitri, terebinthinæ, sing. drac. iiii. mellis lib. iiii. aceti libr. i. Quæ teri possunt terito, & omnia melle excepta coquito, & collyria formato, quæ in sinus ac cavitates indes. Emplastrum Oris balij ad sinus & fistulas, è cedria præparatum. discutit enim strumas, & ad elephantiasis tumores prodest. Cera, picis sicca, singul. lib. i. colophoniciæ belsem, cedriæ sex uncem, propolis trientem, uel ut alij habent sex uncem. Reliqua omnia donec non inquinent coquito, deinde propolim adijcito, unito ac utitor.

Aliud. Picis, cera, singul. lib. i. colophoniciæ, cedriæ, singulorum sex uncem, coquito simul donec non amplius inquinent, & propolis sex uncem adijcito, et sublati ab igne thuris, aloës, & aliquando myrrhæ, singul. unc. i. ammisceto. Emplastrum magus uel Hephæstias nuncupatum. Glutinat sinus & fistulas, & alia huiusmodi. Spumæ argenti lib. i. scorici argenti quæ helcysima græcis appellatur, lib. i. testæ clibani antiqui, cera, singul. lib. iiii. olei lib. v. succi coriandri sextar. i. Simul coquito donec non amplius inquinent, deinde ceram adijcito, unito ac utitor. Idem hydropicis confert. Quidam cera nihil, quidam quadrantem saltem inijciunt. Alij uero ita præparant. Testæ fictilium lib. ii. plumbaginis lib. ii. olei sextar. i. Sed hoc modo compagem non acquirit. Commodum est fistulis etiâ nigri è lolio præparatû, & reliqua eius generis. Tutò etiâ adhibetur quod ex argenti spuma paratur, & quod ex aceto & oleo. Vtrûq; in proximo sermone habetur. cõmodat quoq; fuluû Galeni quod ad maligna ulcera paulò ante descriptum est.

De Gangræna & sphacelo. Galeni. Cap. LVI

Gangrænâ appellât quâdo ob inflammationis magnitudinẽ, mortificatio partis imminet, et nisi celerrime succurratur, pars ita affecta facile mortificatur, & malû ad contiguas partes proserpēs singulis perniciem impertit. At ubi iam pars mortificata penitus sensum amisit, nõ amplius Gangræna, sed sphacelus, id est, Caries, malum appellatur. Accidit autem hæc affectio etiâ ossibus, quum circumscita caro uitiosos humores generans, per hos illa perrigauerit ac putrescere. Proinde partem mortificatam celerrime refecare oportet, quatenus contingit uicinam. sanam, ita ut nihil prorsus putridi ac carioli relinquatur: Deinde locum inurere, & postea sesamum cum melle, uel siccum capitale item cum melle adhibere, deinde panem exterius, uel farinã ordeaceã aqua & oleo subactam imponere: Sed & iris & panacis radix, & aristolochia ac eruum crustas tollunt, singula cum melle. Item Machæronis emplastrum, et Isis, cum rosaceo & melle diluta. Vbi uero crustæ exciderint, curationem reliquis ulceribus communem adhibeto. Cæterum priusquàm pars mortificatur, & affectio adhuc gangræna appellatur, sanguinem in loco affecto impactum, quantum eius fieri potest plurimum euacuabimus: propter quem sanè mortificatio contingit, quum arteriæ ob locorum angustiam distendi non possint: atque sic reliquo perspirationem exhibebimus. Aut igitur si uena magna fuerit in loco affecto, hæc dissecta corruptum sanguinem euacuare oportet, & sæpe uelut uaricem uolsella correptum excindere: Aut totam cutem affectæ partis profundis sectionibus diuidere, aut uulnusculis altioribus incussis scarificare, & sanguinem effluere sinere, & postea imponere pharmacum ad putrescentiam commodum. Talia uero sunt, farina erui aut lolij cum aceto mulso, uel si hæc

si hæc nō sunt, fabacea. Quarum uires si intēdere uolumus salem adijcimus, aut aliquē pastillum leuissime tritū ad nomas suprà descriptū, qualis est Andronis, Palionis, & Musæ, & noster Asclepius appellatus, quibus omnibus pro ægrod corporis habitu uteris. Rusticana enim & duriora natura, fortioribus medicamentis opus habent, molliora debilioribus. Profunt etiam gangrenis nuces ueteres, farina lolij cum raphano & sale, & aliquando aceto. Vux passæ demptis uinaceis cum raphani cortice, urticæ folia, raphani semē cum aceto, quæ etiam crustas tollunt. Item lupinorum amarorum decoctū affusum. Aliud ad Gangrenas. Sordes matulæ adhærentes illinito, & postea urina abluito. Nonnulli cedriam sordibus ammiscēt. Aliud. Plurimas lactucas exemptis fibris colliacea farina imponito. Aliqui iridis farinā accipiūt. Aliud, hoc & uiliginēs & alia huiusmodi sanat, & inflammationes mitigat. Herbam catanancem urito, eiusq; drach. v. iiii, cum gūmi drac. x. v. i, cū aceto terito & imponito. Aliud, Aeruginē, rubricā, alumē scillile, paribus portionibus ex aceto trita adhibeto.

De canceratis tumoribus. Eiusdem.

Cap. LVII

Cancerati tumores ex atra bile crassiore efferuente generantur, quæ si etiam acrior fuerit, ulceratos tumores efficit. Quapropter huiusmodi tumores inflammationibus acriores sunt, citra tantā caliditatem, habentq; uenas plenas & circum circa extensas, ad similitudinē pedum cancri animatis. Quandoquidē uero ē profundo inutilis sanguinis multitudo attrahitur, ideo uaricosæ redduntur uenæ, & insanabilis morbus efficitur, quum ob nimiam crassitudinem, humor neque repellī, neque discuti, neq; per totius corporis purgationem leuari possit. & leniora quidem medicamenta adhibita contemnit, ab acrioribus autē irritatur. Fieri tamen potest ut incipiētes cancos, prius quā in affecta parte confirmentur, augeri prohibeamus, atræ bilis humore euacuato. Primum itaq; mioribus ad hoc utemur, quale est Epithymū cum sero lactis, deinde Hiera Rufi, quæ ueratrum pro uirium robore ammixtum habet. At solani succus foris secus illitus, ulceratum cancrum mirifice mitigat. Ex eo autem linteolum molle duplicatum madefactum imponendum est, & supra ipsum quoq; lana tenera imponenda eodem succo imbuta, sed & ipse succus assidue his superfundendus est, ut ne hæc exarescant. Utendum est & medicamento ē pompholyge ad cancos ulceratos. Sed & hoc quod subiungam, ad cancerata ac maligna locorū dorum, scroti, sedis, mamillarumq; affectiones, & ad ani ac muliebrium locorū rimas & tubercula efficax est. Oleum rosaceū & hyoscyami, aut solani, aut semperuiuæ, aut umbilici ueneris, aut psyllij, aut uux acerbæ succum, in plumbeo mortario, cum plumbeo pistillo ad strigmentitiā compagem terito. Confert & cancri usti cinis cum cadmia lota inspersus, uel cum cerato adhibitus. Idem etiam gangrenis conducit. Aliud. Irionis semen cum melle ad emplastri formam terendo redactum adhibeto, & maligna ulcera in quacuncq; corporis parte cito ad cicatricem perducet. Idem facit & malicorium ustum tritum inspersum. Aliud ad cancerata & maligna. Testudinem terrestrem donec in oleo dulci urito, & cinerem ad alia cum butyro, ad cancos uero ulceratos cum oleo dulci ad emplastri formam subactū, splenio illinito ac imponito. Repurgat enim, & stringit, & ad cicatricem perducit. Et prohibet ne malum reuertatur. Adhibetur idem utiliter & gangrenis. Nec incommoda est Theriace Andromachica modico rosaceo diluta. Aeger porrò ptisanæ succo uberrime alatur, & lactis sero. Et ex oleribus malua, atriplice, blito, & cucurbita. Piscibus uero petrosilis, & uolucris omnibus præterquam palustribus.

De can.

De carbunculis. Ex eodem.

Cap. LVIII

Carbunculi à sanguine atrabiliario efferuente, & ad partem aliquam irruente generantur, & sunt sanè ulcera crustosa, plerūq; à pustula incipientia, aliquādo etiam citra hāc. Pruritus certè in principio in parte affecta adest, deinde modo una pustula, modo plures tenues, uelut milij grana, insurgunt, quibus ruptis similiter crustosum ulcus succedit. Quod si etiam citra pustulas cutis excoarctatur, semper tamen crustosum apparet ulcus, uelut ea quæ à cauterijs fiunt, crusta iam cinereum, iam nigrum colorem habente, & fundo adhærente, & uelut clauo affixa, comitante etiam noma depascente. At reliqua caro circumscissa uehementer inflātur, & nigra fit ac splēdida instar bituminis & picis. Talis autē est exquisitè atra bilis. Febris autē ægrotos longe uehementior quā igne sacro correptos inuadit. At uero carbunculi qui iuxta carnē consistunt cito abolētur. Qui uero in mēbranis aut neruis fiunt, diutius permanēt, et subiectos locos per cōsensum afficiunt. Nā qui caput occupant, ad collū aut ceruicē, aut pectus, aut brachia, aut sub alas, cōsensum distribuūt. Qui uero pudenda inuadūt, crura & inguina simul afficiūt. Aliquæ uero partes etiā ad suppurationē ueniūt, quæ uidelicet magis expositæ sunt iniuriæ. Dolores insuper accedūt longe maiores quā pro paruitatis ratio ē. Sepe etiā in repurgādo ulcere, mēbrana aut neruus putrefactus, medullæ speciē præ se ferens eximitur. Carbunculū igitur ubi primū eruperit, statim curare oportet, sanguine usq; ad animi deliquiū euacuato. Nisi em̄ uenæ sectionē quid prohibeat, à nullo auxilio maius emolumentū cōsequitur. Post sectionē uenam nō inconueniens est locū scarificare, uulnusculis profundioribus impactis, ob humoris crassitudinē. Deinde aluus eluenda est, tenuissimaq; uictus ratio cum quiete & tranquillitate imperanda. Ad locum uero nihil uehementer repellens aut refrigerans adhibendum est. hinc enim maius dispendiū quā cōpendiū sequetur. *Non tamen affluxus negligendus est, sed medica* menta adhibenda quæ cū moderata repulsione etiā discutunt. Tale autē est ex planta agine et lenticula cocta cataplasma, cui addita est panis clibano cocti, neq; nimis puri, neq; sordidi medulla. In ipso uero carbunculi ambitu emplastra imponantur ad ambusta descripta. Super ipsum uero ulcus fortiora pharmaca imponemus, quale est, Andronis, aut Pasionis, aut Polyidæ pastillus. & reliqui huiusmodi ad nomas parati, cum passo ad mellis compagem diluti. Carbunculo- rum autē crustas mirifice eximunt, & fluxionem ad locum sistunt, uerbenacę rectę folia cum adipe trita & apposita. Idem faciunt & cupressi folia ac tenera germina, & pilule teneræ cū polenta. Aliud. Gallinacē stercus siccū cum axungia subactū ipsi solum carbunculo imponito, & bene sperato. Aliud. Nitri & rutę pares portiones cum aceto adhibeto. Aliud. Fimi columbini, & seminis lini, æquales portiones cum melle imponito. Aliud. Silphiū, rutā & nitrum, æquis portionibus cum melle soli carbunculo imponito. Sæpe etiam erodētia aliqua suprà descripta ulceri imponimus, & per linamētā indimus. In ambitu uero carbunculi lenticulā coctā circūponimus. Aliud ad carbunculos mirabile. Liliorum radicē recentem & humidam ad emplastri formam tritam imponito, & brassicę folium ne exarescat superimponito, & admiraberis. Circūscarrificat enim & crustas eximit, repurgat, replet, ad cicatricē perducit, ut ne uestigium quidē eius appareat. Aliud Oribasij, minime contemnendū. Saponis partē unā, axungię tantundē, salis, cineris sarmentorū uitis, aut lignorū fici, singulorū dimidiā partem, præpara & adhibe, & forinsecus panē illine. Aliud siccū, ad carbunculos & nomas, Chalcitidis crudę, misyos crudi, atramētī sutorij, æris

æris usti, æquales portiones sub sole in aceto terito donec siccentur, & utere sicco. Misy uero non uratur, sed tantum torreatur. Siccum Oribasij, ad carbunculos, nomas, gāgrenas, ulcera antiqua & chironia. Et ad strumas ac podagras.

Spumæ argenti libram i. olei antiqui sesquilibram, auripigmenti unci. i. spumam argenti cum oleo coquito donec non inquinet, & ablatis ab igne auripigmentum adijcito, ac rursus coquito donec nigrescat. Deinde manibus refrigeratum subigito, & utitor, ad strumas quidē, tali quale est, ad alia uero cum oleo diluto, quo linamentis illini possit. Aliud Matlilientis. Quod suæ ciuitati cōposuit, quum in ipsa carbunculi sæuirent, & multos occiderent. Bouis armentarij limum siccum ac tritum seruato, usu uero experiente aqua madefactum soli carbunculo imponito, & linteum aqua humidum, aut cataplasma è lenticula superposito. Aliud. Chrysocollæ, nitri tosti, lapidis asij, auripigmenti, sandarachæ, misyos torrefacti, chalcitidis, aluminis scissi, diphrygis, singul. drach. iiii. Terito & in æreo uase seruato. Vfus uero tempore, cum specilli nucleo in ipsum carbunculi ulcus indito, & uiride subscriptum superimponito. Emplastrum uiride. Thuris, æruginis, singul. drach. i. squamæ æris, aluminis scissi, salis ammoniaci, singulorum obol. iiii. ceræ drach. viii. resinæ pinus siccæ drach. x. vi. olei lib. i. Arida ad solem in aceto terito, & reliqua liquata adijcito ac utitor. Aliud Asclepiadæ. Nitri torrefacti, succi cyrenensis, singul. drach. iiii. lasseris drach. iiii. s. ceræ, colophonis, olei, singulorum sesquiunciam. præpara & adhibe. Carbunculi humorem rellecat, & circūlitas partes scarificat. His autem scarificatis utere hoc quod mox describam: Nam post scarificationem carbunculos à uicinis partibus radicitus euellit. Mali punici acidi recentis ac maturi corticem, ex emptis interioribus in aceto coquito, & flaccidum factum tritum & super linteolum ad emplastri formā extensum adhibeto, assidueq; acetum superstillato ne exarescat. Idem etiā in pastillos formari potest, & in umbra siccat, qui deinde usu experiente aceto diluti adhibentur. Hoc ego frequenter in principio usus sanitatē restitui. Cæterū pudendorum carbunculos eodē modo curabis, quem in oculorū carbunculis retulimus. Confert & mel ammixta sapa coctū, & cum specilli nucleo sæpe præputio impositū. Aliud Oribasij ad carbunculos. Chalcitidis, atramenti sutorij, singul. drach. viii. spumæ nitri drach. i. cum aqua tere & utere. Probe facit & ouillum stercus torrefactū cum melle. Aliud. Ad carbunculos. nomas, putredines oris, suppuratas aures, & digitorum reducias. Aluminis scissi drach. viii. chalcitidis drach. vi. sandarachæ drach. iiii. malicorij, misyos, atramenti sutorij, nitri, omphacij sicci, singul. drach. ii. præpara & utere arido uel cum melle, & lenticulam coctam cum pane superimponere.

De erysipellate, hoc est, igne sacro, Galeni

Cap. LIX

Flaua bilis tenuior & acrior facta, unā cum sanguine ad aliquā corporis partē irruens, erysipelas efficit, quod aut exulceratur, aut sine ulcere existit. Si itaq; sanguis dominium habuerit, inflammatio ad erysipelatis naturā uergens exoritur. Si contra bilis dominatur, erysipelas ad inflammationem tendens appellatur. Quod si neuter humor excesserit, affectio inter erysipelas & inflammationem media uocatur. At uero erysipelatis tumor feruentior ac flauior quā inflammacionis percipitur, non tamen dolorem, neq; pulsum, neq; pressionem, neque tensionē inflammationi æqualem inducit. Sæpe enim per cutem tantū diffunditur, carnē nulla iniuria afficiens, atq; hoc est quod exacte Erysipelas auxiliatur. Grauiora uero sunt erysipelata circa caput, quare nisi efficacibus auxiliis opem feramus, partes tonsillarum per consensum afficiunt, inflāmantq; ac scit-focant.

foct. Ea igit uenæ sectione curabimus si sanguis redūdarit: Sin bilis, per medicamentū bilē flauā expurgās. Vtemur & infulis efficaciorib. Et quod influit repellamus, et feruorē refrigerabimus, p ea quē humectāt simulq; frigefaciūt. Sit aut terminus refrigerandi, mutatio coloris. At uero id quod non exactē erysipelas est, sed quodammodo ad inflammationis naturam uergit, liuidam cutem facit, si plus æquo refrigeretur. Et nisi medicus desiterit à refrigerando, etiā de nigrabit, præsertim si senile fuerit corpus quod curatur, ita ut erysipelata sic refrigerata, ne discussorijis quidē medicamentis discuti possint, sed induratum quēdam tumorem in parte relinquāt, proinde præstat ab humectantibus ac refrigerantibus ad discussoria progredi, postquā mutatus fuerit color, ante quā niger aut liuidus appareat. Sunt aut humectantia ac refrigerantia, citra manifestā adstrictionem erysipelatis cōmoda, solanum, semperuium, portulaca, umbilicus ueneris, psyllium, lenticula palustris, hyoscyamus, et glaucium: Et cerata ex frigida aqua præparata. Cera enim cū oleo optimo, præsertim rosaceo uel omphacino liquatur, & ceratum liquidum sit, quod frigefactum in mortario aqua frigida paulatim instillata quantum imbibere potest, cum pistillo teritur. Sit autem oleum duplum, aut quadruplū ceræ respectu. Si uero tenuis & albi ac pelliculi aceti modicum affuderis, medicamentum refrigeratorium magis efficiens, potest & succus aliquis herbarum relatarum ammisceri: pastilli quoq; ad erysipelata præparati, non affectis modō partibus, sed sanis quoq; uicinis adhibendi sunt, & assidue permutandi, citissime enim resiccantur ac uires amittunt, prioribus itaq; per spongas ex tepida aqua expressas elotis, recentes adhibeantur. Pastillus Andromachi. Quotior inquit ad erysipelata. Spumæ argēti lib. i. cerussæ lib. i. opij, sulphuris uiui, croci, singulorū quadrantē. Excipe passo et uter cum passo. Oribasius aut pastillus inqt, ad erysipelata admirādus ita præparatur. Spumæ argēti, cerussæ, croci, sulphuris uiui, opij, singulorum quadrantē, passo excipito. Alius. Acaciæ dra. viii. misyos dra. iiii. thuris drac. iiii. opij drach. ii. præpara & utere uelut dictum est. Ad ignes autem sacros aceto dilue. Quidam etiā aloës drach. ii. adiiciunt. Cæterum ad erysipelata faciei præsertim, hirundinis nidum tritum ac cribratum melle excipito, & cum penina illinito. cito enim discuties. At sedata inflammatione, priusquam pars liuescat, discussoria adhibenda sunt, & aqua calida affundenda, itēq; marina ac muria, Cataplasmatas etiā eadem ammisceantur. confert & brassica per se uel cū polenta adhibita, aut mandragoræ radix cum pane et aceto. Aut terra figularis cum coriandri succo. Aut ceratum rosaceum paulō ante descriptum cum calce. Quod si liuor aut duricies partem affectam præoccuparit, scarificatio profundior fiat, & marina aqua aut muria affundatur, deinde uero cataplasinata adhibeantur.

De Herpete. Ex eodem.

Cap. LX

Si flaua bilis citra alterius humoris mixturā secreta iuxta partem aliquam cōstiterit, Herpes appellatur affectio. Si quidem igitur crassa fuerit cōpage, & magis acris, omnem cutem usq; ad subiectam carnem exulcerat, & uocatur Herpes exedens. Si uero tenuior fuerit, & minus acris, superficiem solū uelut inurit. Atq; hæc species generis appellatiōem tulit, simpliciterq; ac citra appositionē, Herpes uocatur. Est enim adhuc tertia herpetis species quæ Miliaris appellatur, eo quod pustulas paruas & multas in superficie cutis excitat, milio similes. Oritur autem etiā ipse à bile, uerum minus acris & calida quā priores. Alij uero hunc pituitæ ad bilem flauam ammixture fieri putant, proinde herpetem

Yy

petem

petem curabimus recte, si praeuacuato uniuerso corpore, localia deinde medicamenta adhibuerimus. Qui uero cuti solidandae statim à principio intentus est, hanc quidem sanabit, uerum humorem affluentem non prohibebit, sed semper prioribus ulceribus solidatis, contigua cutis rursus uelut prior in superficie erodetur. Itaque in herpetibus erodentibus, sero lactis cum scammonia exhibito, totum corpus euacuabimus. In miliaribus uero pharmacum exhibebimus, quod bilem simul ac pituitam educit. At uero partibus affectis non eadem quae erysipelatis adhibentur. Tamen si enim refrigeratione uelut erysipelata opus habent, non tamen item humectatione indigent. His itaque medicamenta refrigerantia ac simul resiccantia cum adstrictione conueniunt, ita ut erodentibus quidem, & in superficie herentibus, mitissima adhibeamus. miliaribus uero magis disculforia. Quare neque lactucā, neque semperuiuū, neque quicquid aliud refrigerans ac humectans adhibebimus. Sed in principio facta purgatione, pampinos uitis, rubi quoque aut polygoni, aut platanis folia imponemus, postea uero his etiam lenticulā, & mel, & polentā miscbimus. Illitiones uero ad herpetas comode sunt, acacia cum aceto, platanis succus, glaucium passo dilutū. Ad pustulosum uero herpetem plumbi recrementum ē uino austero tritū illinitur, & folia betae in uino cocta imponunt. Aliud. Olei myrtei sexuncē, recrementū plumbi trientem cerā tritū. Recrementū dilue cū uino, & liquata cera excipe, & illine. Aliud ad herpetas uehemēter erodentes. Lanæ succidæ mollis tædæ obuolutæ & usæ dra. iij. malicorij ē punice malo dulci, spumæ argenti, singulorum drach. vi. ceræ, adipis caprini, singulorum sesquiunciam, olei myrtei, trientem aut quincuncem. Præpara & utere. Ad herpetem uero sub cute extantem, plumbi recrementū cum succo polygoni tritum illine. Aliud ad herpetas. Lanæ mollis succidæ tædæ obuolutæ & usæ dra. x. S. recrementū plumbi sesquiunciam, ceræ drach. x. x. v. adipis caprini depurati & frigida loti drach. x. x. v. olei myrtei quincuncem. præpara & utere. Aliud. ad herpetas pustulasque superficiarias in ligne medicamentum. Cornu caprinum ustum cum aceto tritum illinito. Cornu uero urendum super flamma detineo, exurgentesque bullas excutito, & postea in mortario terito. Idem præstat etiam cornu ouillum & præcipue arietinum. Potest idem cinis etiam cerato excipi.

Pastillus ad herpetas. Terræ cimoliæ, rubricæ sinopice, singulorum drach. iij. misyos torrefacti, aluminis rotundi, corticis thuris, singulorum drach. vi. terito ex aqua, & formato pastillos. Utere uero cum aceto aut uino myrteo. Alius pastillus. Misyos drach. vii. salis fossilis drachm. iij. gummi drachm. ii. Terito cum uino & formato pastillos, & utitor cum uino. Alius. Aluminis scissi, atramenti futorij, salis fossilij, singulorum drachm. ii. Excipe aceto & utere cum passo. Alius præclarus. Aluminis rotundi, chalcitidis, melanteriæ, foreos, singulorum drachmas duas, misyos, malicorij, acaciæ, singulorum drachm. iij. calcis uiuæ drachm. x. v. i. aceti sextar. i. Tere & forma pastillos, & utere cum aqua. Ego uero his omnibus fortioribus, & Andronio ac Musæ pastillo, & reliquis huiusmodi, ad affectiones diuturnas utor. Quum enim fortissimi sint ualde resiccant. quapropter in principio lenioribus utendum est. Est & hoc medicamentum ad diuturnas affectiones mirabile. Nitri, chalcitidis, atramenti futorij, misyos, calcis, acaciæ, partes æquales aceto excipe, & utere cum aqua. Ceratum ad herpetas excoriatos. Cerusæ, spumæ argenti, radicis anchusæ usæ singulorum drachm. ii. pollinis thuris, aluminis scissi, singulorum drach. i. ceræ drachm. x. v. i. adipis uituli drachm. centum. olei sexuncem, ouorum candidum duorum. Arida cum uino tere, & liquatis reliquis ammisce. Aliud ad excoriatos herpes

tas. Cerussæ, spumæ argenti, radicis anchusæ crematæ, singulorum drach. iiii. aluminis scissi, misyos torrefacti, singulorum drachm. i. resinæ pinus drachm. vi. ceræ trientem, olei myrtei lib. i. & trientem, uini heminam unam. Arida cum uino tere, donec fuerit consumptū, deinde cum liquatis cōmitte, & paratū medicamentum linteolo inductum adhibe. Conuenit quoq; Emplastrum ex hordeo oleo dilutum ad eosdem herpetas, foueatur item ac rigetur locus assidue per spongiam ex uino, uel si id non liceat, ex aqua expressam. Et humiditas tenui linteo extergatur, & postea relata medicamenta adhibeantur. Neq; interim squamæ ab ulceribus detrahantur donec sponte excidant aut discedant: Neque splenium durum imponatur. Si uero depascendo proserpentia fuerint ulcera, cataplasma ex lenticula cum melle adhibeto. At si pura & nuda fuerint, & nome sedata, spumam argenti aut plumbaginem, cum uino tritam impone.

Ad Epinyctidas, hoc est, pustulas noctu

erumpentes.

Cap. LXI

Epinyctides ulcuscula sunt sponte erumpētia, pustulosa, subrubra, quibus rūpis sanies subruentia effluit. Hæc interdū non ualde infestant, noctu uero maiorem dolorem excitāt quā pro ulceris magnitudine. His itaq; medetur brassea, uel solani, uel hyoscyami, uel rhamni folia, cum melle imposita, & plantago trita, et centaurium uiride, & uua passa cum ruta, & cucumeris satuari folia cum aqua, & sesamum cum aceto tritum. Egregie facit & calx cum oleo ad mellis compagem subacta, imposita, & laser cum aqua, desiccet enim absque mordacitate. Aut sulphuris uiui, & spumæ argenti pares portiones, cum aceto & oleo myrteo ad strigmentitiam formam tritas adhibe. Ego uero inquit Orbalius, oleum non admitto, et pro aceto potius cum uino tero. Lenticula item cocta, & emplastrum ex polline tritici, utiliter imponitur, postquam uero epinyctis excoxiata fuerit, emplastris liquidis utere, & caue ne acra, & acida, ac falsa adhibeas. Vitanda sunt item fomenta, balnea, & sol.

De Termintho.

Cap. LXII

Terminthus tuberculi species est. Incumbit autem ipsius pustula nigra superne ac inferne, qua rupta inferne desquamato similis apparet, hoc autem dissecto pus inuenitur. At uero curatio huius similis medelæ pustularum nocturnarum iam relatæ.

De papulis siue pustulis.

Cap. LXIII

Papulæ quibusdam exoriuntur similes his quæ à feruida aqua ambustis emergunt, non tamen multum dolorem inducentes. Quibus ruptis subflauī humoris copīa paulatim effluit, ad biduum aliquando ac triduum durans. Hæc foeminis quibus menstrua defecerunt, aut aliās non recte profluunt, sæpe in cruribus oriri solent. Infantibus uero aliquando in toto corpore. Verum uirararissime accidunt. Quomodo uero infantium ulcera curare oporteat, iam antea sermone quarto ostensum est. In foeminis autem menses oportune ciere oportet. Virorum uero corpora congruo medicamento purgare. Vtrisque uero alimenta aluum emollientia exhibebimus, & urinas proliciemus. Acraque ac falsa prohibebimus. Ipsas autem pustulas acu perforare oportet, & humorem excludere, & emplastrum è tritici polline adhibere. Euacuato uero humore, & non amplius effluente, id quod ex hordeo præparatur apponendum est.

Yy 2 Ad

Ad ambusta ab igne.

Cap. LXVIII

Corpora ab igne aut feruida aqua ambusta, moderate extergentibus pharmacis opus habent, citra manifestam calfactionem aut refrigerationem, protinus itaq; ad pustularum bullas prohibendas, terra quæcunq; occurrerit, modo leuis sit, in teneris carnibus cum aqua, in durioribus cum posca illinatur, præstat tamen terra cimolia, si haberi potest. Ouum item crudum molli lana exceptum refrigerat & siccat citra mordacitatem & thus cum aqua tritum, & betæ folia contusa & cocta ac cum uino imposita. Et alumen omne cum aqua etoul candido. Facit et hoc mirifice, Aeruginis & spumæ argenti pares portiones cum uino et oleo tritas, cum penna illine. A manu enim cōtactu prorsus abstinere oportet, et tenuē linteolū superimponere. Quod si bullæ emerferint, eas in principio ne rumpas, si uero durauerint, rumpe et ceratum impone, potest autem pastillus præparari ac in hunc usum seruari. Aluminis dra. iiii. thuris drach. ii. cum aqua terito, & pastillos formato, ac utitor cum posca. Alius. Cimolix sextantem, corticis thuris, misyos usti, singulorum drac. vi. rubricæ dra. iiii. cum aqua formato pastillos, & utere cum posca. Cæterum cunctari non oportet, sed statim terram quæcunq; ad manum fuerit cum aqua illinere, eamq; postea tepida posca ablueri, & quæ relata sunt adhibere, porro ad ambusta iam pustulosa, Rhoem et polentam aceto trita impone. Aut fel porci coctum. Aut hyosciami uiridis succum assidue illine, & bullæ marcescent. Ex folijs quoque hyosciami uiridibus pastillos forma, & in umbra exicca, & in hyemem referua, quos usu expetente aqua dilue. Aut calcem uiuam cerato liquido exceptam, & linteolū inductam impone. Aut myrrham uino tritam adhibe. Ex corticis utero & ulceratis, betæ folia in uino cocta ac trita illine. Aut ad ceratum rosaceum liquidum, betæ succum paulatim instilla, quantum imbibe potest. Sint autem olei partes tres, ceræ una, succi quantum satis est. Vtere & miraberis. Aliud, fimum columbinum panniculo lineo illigatū exurito, cineremq; cum uino tritum, aut cerato exceptum adhibeto. Aliud. Lupinorum madefactorum & coctorum, quales quotidie comeduntur, cortices in mortario tritos, unciæ pondere accipito, & cum ceræ sextante, ac olei quincunce colliquatis commiscito ac utitor. Sed & hoc ambusta cito ad cicatricem perducit. Cerussæ, spumæ argenti, hordei usti ac triti, singulorum unc. i. ceræ quadrantem, rosacei aut myrteï dodrantem. Hordeum ad ceratum liquidum ammisce, & postea spumam argenti ac cerussam in mortario cum uino tritas adijce.

Ad flagellatos.

Cap. LXIX

Pellem ouillam recens detractam & adhuc calentē flagellatis circunda, omninoq; intra unius diei ac noctis spacium sanabit. Confert & brassicæ succus affusus. Est et hæc irrigatio inflammationi arcendæ commodissima. Olei partes iiii. aceti partem i. furculorum anethi fasciculum i. Acetum et oleum assidue per anethi fasciculum agitata coquuntur, ad aceti consumptionem. Deinde adijcitur cera, quanta satis est ad strigmentitiā compagem, potest autem ex hac irrigatione, etiam solidius ceratum præparari. Sed & Sphærium ad irrigationem efficax est, & reliqua quæ sequenti Sermonē habentur emplastra diluta uelut ibi ostendimus. At uero aurigæ ad icūs flagrorum utuntur calcē trita cum ouis crudis soluta adiecto rosaceo cerato. Accipiunt autem calcis quadrantem, ceræ quadrantem, rosacei sextantem, oua cruda tria. Hoc medicamentum illinunt, & assidue renouant. Ad uibices uero flagellorum facit hoc, ceræ, terebinthinæ, spumæ argenti, buryri, thuris, mellis, æquales portiones.

nes, loco prius foto impone, & quotidie permuta. Aliud Calcis uiuæ lotæ, succi solani, olei rosacei, pares portiones committe, illine, & linteolum superimponere.

Ad desquamata.

Cap. LXVI

Desquamata appellantur, quando ex lapsu aut uiolenta aliqua offensâ, cutis auulsa est. Hæc ab inflammatione tutatur: Rhus ruber cum melle illitus, sidentidis folia trita, stratiotes herba in aquis nascens cum aceto. Vtere et cerato ad intertrigines subscripto, et cæteris huiusmodi.

Ad Intertrigines.

Cap. LXVII

Intertrigines ex calceamentorum attritu obortæ, dum dolorem excitant, pulmone suillo aut agnino calido appposito mitigantur, & ab inflammatione asseruantur. Item calceamento ueteri usto trito insperfo. Aut succida lana, aut mali punici satiui flore, singulis uistis tritis inspersis. Aut acacia cum aceto illita. His uero qui teneras carnes habent, emplastrum ex hordeo ad ambusta descriptum, et alia huiusmodi adhibeto. Sed & ad papularum eruptiones, intertriginesq; ac ambusta, efficacissimum est hoc. Recrementi plumbi quadrantem, ceræ trientem, adipis suilli recentis unc. i. olei myrtei lib. i. Ad cicatricem uero inducendam absq; adipe præpara. Vtere etiam emplastro è psyllij succo, quod sequenti Sermone habetur, ex spuma argenti, cerusa, et amylo paratum.

Ad contusa & fugillata.

Cap. LXVIII

Carne ab aliquo graui illapso contusa, & paruis in ea uenulis disparatis, sanguis per perussationem profunditur, qui sub cute collectus fugillatione appellatam efficit. Scopus igitur est curationis, ut sanguis sub cute contentus discutiat, & hoc cito antequam locus nigrescat. In principio aut aliquid ex adstringentibus ad discussoria ammiscēdū est, quæadmodū Sermone octauo ad faciei fugillationes docuimus. Tunica enim uenarum contusæ, opus habent ut densentur ac firmentur, ne noua materia attracta ad locum allabatur, postea uero solis discussorijs utemur. Sed & in principio scarificamus fugillata, atq; sic reliquam curationem facimus. Optime autem facit ad contusa, citrij mali pars interna cum oleo illita. Aut linteum oleo cicino imbutum imposito, & miraberis.

De ruptione.

Cap. LXIX

Ruptio non in fibrosis, sed carnosius musculorum partibus soluta continuitas existit, nunquam citra sanguinis effusionem cōtingens. Quæ à sinu differt, eo quod nullum osculum ad humorum effluxum uelut sinus habet, proinde & in hac discussorijs utemur, ad ea quæ in rupto corpore continentur discutienda. Ad hoc aut idonea sunt medicamenta lassitudinē eximentia. Acopa grecis appellata. Tale aut est quod ex populo nigra paratur, itemq; quod ex abiete, ac reliqua huiusmodi. Omnino uero ubi in profundioribus partibus ruptiones fuerint, acriora ac magis incidentia pharmaca adhibere oportet. Atq; ea de causa cucurbitæ quoq; adhiberi debent. Siquidem igitur statim totus sanguis effusus, fuerit discussus, facile caro diducta coalescit. Si uero diutius perseverauerit, et sordes subnutrita fuerit, ruptio de cætero coalescere non potest, labia solū inter se cōponūtur, ut ex leui occasione facile disparētur, & intermedius locus humore quodam repleatur, fiatq; quodam modo assidue sanguinis effusio, similis ei quæ ab initio contigit.

De Vulsione.

Cap. LXX

Vulsio fit fibris quibusdā distractis, quæ in membranis ac musculis continentur. Et sola mitigatione opus habet, ut doloris exors maneant. Neq; em fieri potest ut huiusmodi fibræ glutinētur, quæ è sinuū genere sint, uelut etiā ruptiones.

Yy 3 Est

Est & huius affectus similis uelut ruptionum praedictarum curatio, ex discoloris & citra molestiam siccantibus constans. Verum ad ruptiones ac uulsiões in profundo factas, in pectore uidelicet aut intestinis, Aristolochia rotunda utiliter potatur, & si quicquam aliud commoda existit. Similiter etiam centaurea magnae radix et succus, Item rheon, costus, bdelliū, singula cū aceto multo pota.

Ad luxatos articulos.

Cap. LXXI

Luxationes ex lubrica praesertim emotione factas, mitigat lana succida, aut spongia noua aceto & oleo imbuta ac imposita, ita ut quies imperetur, & deligationes fiant ad ossium fracturas fieri solitae, facit etiam ad easdem bulbus coctus cū melle, aut cerato liquido exceptus, & folia uiticis, et sal, ac nitrū assatum cū cerato, aut symphytū cū cerato, et urticae folia cū sale, et heliotropiū, scorpiūrum appellatum, & cinis sarmentorū cum axungia ueteri. Sed nihil praestantius est quā emplastrū quoddā apponere ex his quae ad ossium fracturas parantur, si eius copia detur.

Ad laxos articulos.

Cap. LXXII

Laxos articulos contrahit ac firmat acaciae succus aqua dilutus ac affusus. Et spinæ Aegyptiae fructus, rubi item ac myrti, & malicorij, ac foliorum quercus decoctū, & myrteum ac lentiscinum oleum assidue illitum. Et malicorium coctum & cerato myrteo exceptum, aut per se uino coctum tritū ac impositum.

Ad perniones.

Cap. LXXIII

A pernionibus praeseruat sal cū melle tritū, manibus ac pedibus assidue inde perfrictis. Aliud, non modo praeseruans, sed genitos etiā perniones curans. Criorum magnorū internā partem acidam, reiectis seminibus diligenter terito, & cum adipe suillo uetusto ad cerati compagem redigito, & ad hyemis initium quotidie illinēs ex eo digitos, utitor. Aliud Orisabij. Sulphur uiuum cū melle cocto imposito. Aliud, facit etiam ad omnes feruidas eruptiones. Myrrhentientē, aluminis liquidi sextantē, aceti quantū satis est, praepara et pernionibus non ulceratis, ac pruriginosis feruidis eruptionibus imposito. Aliud. Succu uuae acerbae lib. i, thuris dra. iiii, cerae dra. xvi, coquito simul ad succi ferme coemptionem, deinde in mortario subige ac utere. Aliud, ualde insigne ad reliquas quoque inflammationes commodum. Cerussae, spumae argenti, aluminis liquidi, singulorum lib. i, myrrhae, thuris, singulorum quadrantem, ouorū assatorum uitellos xvi. adipis suilli ueteris lib. i. Arida cum aceto terito in quo malicorij decoctum est, & ubi strigmentitiam compagem habuerint adipem adijcito, ac simul probe subigito, & in plumbeo uase seruato. Vbi uero postulat, rosaceo aut myrteo oleo diluito ac illinito. Aliud. Hyoscyami succus torreto, eodē die inflammationē ac dolorē sedat. Aliud. Alliū in oleo torreto, eoq; abiecto, & cera ad oleū addita, ceratū facito ac imposito. probe facit etiā amurca illita, & rhus coriarius. Ceterū irrigatiōes circum perniones cōueniunt. Radicis cyclamini decoctū item rhois coriarij, betae, ac lupinorū amarorū, marina aqua calida per se. Verū rapī decoctū reliquis oībus praestat. Aliud, ad ulceratos perniones efficacissimū. Ceratū rosaceū in magno rapo ad ollae similitudinē excauato, ad feruentem cinerē liquefacito, et adhibeto. Idē ceratū etiā in raphani radice liquefieri potest, faciunt & canceri fluuiatiles uesti melle aut cerato excepti. Aliud. Umbilicum ueneris & malicorium in uino coquito, & cerato rosaceo excipito. Aliud. Rutae, medullae taurinae, rosacei, aequas portiones unito. Hoc etiam ad ulcera antiqua facit, & articularum ossa denudata.

Aliud, perniones imminentes arcens. Atramēti futori, florum mali punice satui, singulorum drachm. iiii, aluminis scissi drach. iiii, myrrhae, thuris, singulorum

gulsorum drachm. II. ceræ drachm. IIII. adipis suilli drachm. VIIII. olei myrtel
quantum satis est. Aliud. Aluminis scilli drachm. x. spumæ argenti drach.
III. myrtæ drach. I. ouorum albumina duo. Vino & oleo myrteo excipe ad
utere. Aliud. Aluminis rotundi drach. IIII. calcis uiuæ drach. II. ceræ unc. I.
rosacei aut myrtel olei trientem, præpara ac utere. Idem & ad attritus facit.

Aliud. Spumæ argenti drachm. x. cerusæ drach. III. ceræ drach. XII. adipis
suilli recentis drach. xx. ouorum assatorum uitellos duos, pollinis thuris drac.
I. Spumam argenti, cerussam, & oua cum aceto terito, deinde ceratum adjicito,
ac præparatum seruat. Vfus autem tempore cum rosaceo dilutum adhibeto.

Aliud per niones ac cicatricem ducens. Confert etiam ad papularum eru-
ptiones, ex coriatis intertrigines, & desquamata. Ceræ, adipis suilli, singulo-
rum drach. VIII. spumæ argenti, corticis pinus, singulorum drach. xvi. man-
næ thuris drach. VIII. rosacei quantum satis est. Quidam plumbaginem pro ar-
genti spuma sumunt. Oribasij Hexapharmacum. Ad per niones ulceratos, olei
omphacini, taurini adipis, succi hyoscyami, singulorum lib. I. spumæ argenti se-
xuncem, colophonæ trientem, mellis sexuncem.

Ad digitorum pterygia siue reduuias.

Cap. LXXIII

Ferruginem cum aceto illine. Aut aluminis, sandarachæ, calcis uiuæ, diphy-
gis, æquales portiones impone, & linteolum uino imbutum ac mollem spongi-
am superimponere. Aliud. Squamæ æris, malicorij, caricarum leniter assata-
rum, æquales partes melle excipe, & loco prius ex spissamentorum adstringen-
tium decocto rigato impone. Et quod de pterygio exarescit depurga.

Aliud cito reliccans ac curans. Soreos usti, thuris, singulorum drachm. II.
æruginis rase drach. I. cum melle tere, & super ipsum pterygium impone, facit
& ad reliqua horum locorū ulcera maligna, nigredines et putredines. Oriba-
sij zopyrios ad pterygia. Aluminis rotundi acetabulū in fictili exurito, & ad tri-
tum acceti cyathum, hoc est, sextantem ammisceto, & mellis quadrantem, & hæc
simul pterygijs imponito. Aliud bonum, cimolice tostæ drach. VIII. pumicis
usti drach. IIII. æris usti, gallarum, singulorum drach. II. præpara & utere.

Aliud ad pterygia putrefacta, & ulcera pudendorum. Thuris drachmas
quatuor, squamæ æris drachm. II. æruginis rase drachmas IIII. Mellis quadran-
tem, terito ad solem donec flavescant, & loco ex uino prærigato impone, & lin-
teolum ex aqua expressum, ac spongiam superimponere. Ex huius usu magnū
successum habui. Aliud. Hoc per triduum citra mordacitatem sanat. Carica-
rum pinguium tostarum ut probe teri possint drachmas duas, misyos cyprij
drachmas duas, squamæ æris drachmas duas, mellis quantum satis est, præpa-
ra & utere, ac miraberis. Ego uero squamam æris per se tritam adhibui, & lin-
teolum è uino expressum superimposui. Oribasij ad pterygia, Gallarum, auri-
pigmenti, atramenti futorij, æquales portiones unito ac utitor. Aliud. Aeru-
ginis dra. IIII. mannæ siue pollinis thuris, sulphuris uiui, sing. dra. II. Vtere etiā
pastillo Muscæ uelut admirādo, linteūq; è uino expressum superimponere. Aliud
ad pterygia experimēto cōstās. Gallā nō perforatā cū carie ligni quercini trita
insperge.

Ad paronychias, id est, unguū abscessus.

Cap. LXXV

Ad paronychias incipientes priusq; suppurēt, siue in manu siue pedū digitis
fuerint lanā ex aqua frigida inbutā imponito, aut p linteolū ex aqua expressum
assidue refrigerato. Aliud, thus et gallā cū melle trita, simul aut seorsim imponi-
to. Aliud. folia myrti trita inspergito, aut ceratū myrtelū imponito. Aut sordes
aurium assidue illinito et sanabis. At si fuerint inflāmatę, panē aqua madefactū

cum rosaceo adhibeto; Aliud, Oliuæ folia tenera imponito. Aliud, Cadmiam tritam inspergito, Oportet aut carnem undiquaque ab ungue disparare, limentis conuulsis, è linteo interpositis, & probe adhibita medicamenta alligare, potest etiam Spodium simili modo inspergi. Aliud ad paronychias exulceratas, Aeruginis, spumæ argenti, sing. dra. iiii, sarcocollæ dra. i, terito & large inspergito, Aut farinā erui adhibeto. Carnē item eodē modo uelut dictū est disparato, et linteū ex uino expressum, itēq; spōgiā uino imbutā superimponito. Hoc ego sepe uti soleo. Aliud quo utor, Nitri, squamę eris, pumicis uli, sing. unc. i, cimoliæ quadrantē, Omnia cū aceto & modico melle terito, & pastillos formato, Vfus aut tempore aqua diluito, et adhibeto linteo exceptum. Vtored am pastillo insigni, quem Iridem uocant, cum uino diluto, qui sic præparatur. Aluminis liquidi drach. centū, croci, myrrhæ, singulorum drac. viii, Quidam etiam aloës drach. viii, adijciunt. Subigito ac formato pastillos, ac utitor cum uino, & linteum ex uino superliga, prodest et Musc pastillus ac reliqui eius generis, At uero depascendo iam proserpentes sistes, auripigmento usto trito ubertim insperfo, & linteo è uino expresso superimposito. Ego uero sandaracham & auripigmentum, æquis portionibus simul trita adhibeo. Et si cicatricem inducere oportet, eadem terebinthina liquida excipio ac adhibeo. Quod si suppurata fuerint paronychiæ, primum ipsas perforabis, & humorem exprimes, et deinde lenticulam cum melle impones, Aut rosas uirides, aut siccas aqua madafactas, tritas adhibebis.

Ad contusos ungues,

Cap. LXXVI

Myrti et mali puniceæ folia tenera impone. Aut felle tauri euacuato, in ipsam fellis uescam unguem indito, ac sinito donec perfecte sanetur. Aliud, Sal fossile cum aqua et oleo tritum illinito, Est enim efficacissimum.

Ad subcruentos ungues,

Cap. LXXVII

Picem siccam liquefacito, & cum farina mixtā apponito, præstat tamē subcruentatum unguem in medio perforare, ac cruorē subterlapsum exprimere. Si enim perstiterit, putrescet, & ulceris difficulter curabilis causam exhibebit.

Ad motos ungues,

Cap. LXXVIII

Ungues ex aliqua offensa motos, & pungitiuo dolore affectos, carice cum melle tritæ mitigant. Quod si dimidium unguis exciderit: Nitrum aut salem cum pari fellis uitulini mensura misce, adhibe, & sanabis.

Ad scabros ac leprosos ungues,

Cap. LXXIX

Adipem ouillum emollitum, & super linteum extensum adhibeto, ac tertia die soluito, & si mollem unguem reperiis, deradito, & eundem rursus imponito, & tertia die solutū similiter deradito. Atq; hoc tandiu facito, donec integra sanitas accedat. Aliud, thus tritum adipe ouillo excipe, ac utere uelut dictū est. Aliud ualde bonum. Alumen scissum anserino adipe excipe ac utere uelut dictū est. Aliud, ex cuius usu successum sentio, Mastichen chiam in aquam feruentem coniectam ac emollitam, ungui impone ac oblige, & tertia die solue, & derafo ungue rursus impone, atque hoc facito usq; ad perfectam restitutionem. Aliud, Hordei farinam cum pice ad emplastri formam coquito ac imponito, uelut dictū est. Aliud. Gummi drachmas sex, lachrymæ oleastri drachmas quatuor, atramenti sutorij drachmas tres: Gummi & lachrymam aceto diluito, & adiecto atramento sutorio in olla ad prunas ad coquendam coquito, & derafis unguibus apponito, & alligato, ac tertia die soluito, & ungue derafo rursus imponito, idēq; tandiu facito donec unguis excidat. Aliud.

Aliud. Auripigmentū colore aureo, & sandaracham, equis portionibus probe terito, & terebinthina ad emplastri formam excipito, et imposito, ubi prius per unū atq; alterū diem, farinā ordeaceam cum aceto et sylueltris cucumeris radice trita adhibueris. Tertia uero die similiter soluito, ac tandiu repetito, donec unguis excidat. Cauendū est autem ne locus oleo attingatur. Aliud. Sandarachæ, auripigmenti, chalcitidis, myrrhæ, thuris, singul. dra. ii. farinæ lolij dra. vi. terebinthina excipito & adhibeto. Aliud. aufei ens unguis citra exulcerationem. Bituminis drach. ii. sulphuris uiui, sandarachæ, auripigmenti, singul. drach. i. Excipe terebinthina & utere, ac per septimum diem solue, deafoq; ungue, rursus nouum impone, atq; ubi unguis exciderit, ceratum myrteū, cui aliquid eiusdem medicamenti admixtum est applica. Aliud. Calcem uiuam cum oleo, aut mastichen cum opobalsamo imposito. Postquam autem morbus occalluit, & præscripta medicamenta nihil proficiunt, ex coriatoria nunc referenda statim adhibeantur. Excoriatorium leprosi unguis, callos, uerrucas et clauos auferens. Cantharidas numero x. sulphuris uiui, chalcitidis, singulorum dra. i. alij depurgati nucleos i. x. omnia probe trita terebinthina excipito. Vfus autem tempore partes ungui uicinas miti aliquo medicamento munito, & excoriatorium hoc pelliculæ uesicæ bubulæ illitū adhibeto, & postridie soluito, bulasq; exortas rumpito, & si subiacentibus locis sordes inhæserint, panem cum aqua mulsā aut lenticulā cū melle illinito. Et deinde ulcera repurgata, cerato ex anserino adipe, thureq; ac cerato parato, curato. Aliud excoriatoriū. Nasturtij, sinapis, sulphuris uiui, nigellæ, cantharidum, atramenti sutorij, æquales portiones ex aceto probe tritas terebinthina excipito, et uelut diximus utitor. Aliud Oribasij leprosos unguis extersens: Propolis, ceræ, bituminis, singul. dra. ii. sulphuris uiui dra. i. præpara, & oleo ne inquinetur. Vfus autem expetente, calefactum unguibus imponitur. Aliud eiusdem. Atramentū sutorium & sulphur uiuum sufficiente uisco excipe, & corio inductum adhibe. Aliud. Picem liquidam, ceram, colophoniam, ammoniacum thymiam æqualiter misceto ac imposito. Aliud. Ceræ, colophonix, terebinthinæ, sulphuris uiui, staphidis agrestis, nitri, singulorum drach. ii. sandarachæ cantharidum, singulorum dra. i. cedrix quantum satis est.

Cap. LXXIX

Ad reparandos unguēs.

Myrrhæ drach. viii. aluminis scissi drach. iiii. panis hordeacei sicci drach. i. excipe melle et impone. Aliud, ad unguēs ægre orientes. Betæ agrestis semē cum aceto tritum imposito. Aliud, polium cum adipe uitulino & terebinthina tritum adhibeto.

Cap. LXXXI

De anulīs digitis impactis.

Anuli aliquando digitis impinguntur, quum circulus ipsorum angustior, uiolenter illorū partibus crassioribus fuerit adactus, atq; hoc tum maxime contingit, quum homo cibo ac potu distentus, prona ac pendula manu sopitus decubuerit. Ita enim manuum extremitates longe magis intumescunt, quam si erigantur. Aqua igitur & oleo, aut maluæ decocto, manus large perfundatur. Nam parca perfusio tumorem magis auget. Deinde anulus leuiter uersatus detrahatur. Quod si perfusio nihil effecerit, filum crassius contortum accipito, & alterum eius caput sub anulum ponito, & reliquum totum digito laxato, & circumligato, & postea caput fili anulo suppositum sursum trahito, filo enim attracto, anulus deorsum procedet. Quod si neque sic successerit, specilli paratorem latiorē sub anulum submitto, & anulū uirgū prope sigillum per spatulā incidito,

incidito, & filo lineo utrinque circumdato anulum attrahito, Et consequenter la-
nam uino et oleo imbutam mitigandi gratia adhibeto.

Ad Clauos.

Cap. LXXXII

Clauus rotundum est tuberculum, album, clauī capiti simile, plerumque in cal-
caneis ac plantis pedum enascens, et in gradiendo dolorem inducens, ad durio-
ris alicuius rei occursum. Sed et in summis manuum digitis saepissime oriri so-
let. Huius itaque tollendi gratia sectionem & uisionem recusamus, quoniam hae
partes nervosae sunt ac subtili sensu praeditae. Vtimur autem uisionis medicamentis
huiusmodi. Catharidū pectuscula x v. sulphuris uiui, chalcitidis crudae, ammi,
singul. obolos iii. Singul. seorsim terito, et pice liquida siue terebinthina ad em-
plastri formā excipito, atque utitor hoc modo. Caput clauī et circumsitum eius am-
bitū deradito, et spleniū inflammationi arcēda idoneū, glutinosum, in medio ex-
cisum, quantum clauī totius ambitus patet, adhibeto, et tunc spleniū ex relato me-
dicamento, super ipsum clauū, ad glutinosi spleniū caesurā imponito, et forinsecus
charta integito, ac rursus aliud linteolū custodiā gratia superligato, atque ita per
biduū aut triduū, egrum quietum dimittito, idemque sepe repetito, donec clauus
a subiecta carne prorsus discesserit. Clauo uero sublato deraditur planta, et rur-
sus adhibetur emplastrū, donec ulcus fuerit explanatū. Aliud. Derafo prius ac
repurgato loco sicut diximus, succū cyrenaicū, uel si is desit, lafer cū nitro ficus
pinguissime carne uel terebinthina excipito ac imponito. Aliud. Lupinos cru-
dos uastos melle excipe, & circumrafo ac depurgato clauo impone. Aut gallinae
um stercus ustum melle exceptum. Aut nigellam cum aceto tritam, eodem mo-
do adhibe. Aliud. Clauum circumcirca repurgato, & succum cyrenaicū pro
be tritum, aut lafer ubertim adhibeto, et deinde spleniū ē melle eodemque suc-
co illitum apponito. Hoc etiam ad strumas facit. Aliud. Repurgato clauo fa-
bam fresam, aut lomentum fabaceum aceto coctum apponito. Idem ad cicat-
ricem perducit. Aliud. Clauo repurgato atramentum futorium leuissime tri-
tum inpergit, & linteo alligato. Aliud, clauos ē manibus ac pedibus tollēs,
simum columbinum in acerrimo aceto ad cerati compagem coquito, & clauo
repurgato imponito. Et per biduum aut triduum funditus tollet. Aut circum-
rafo ac repurgato clauo, ex erodentibus medicamentis supra relatis aliquid ad-
hibeto. Aliud, clauos digitorum citra molestiam auferens, Mastichen nigrā
Aegyptiam in aceto coquito, atque ita calidam adhibeto.

Ad plantarum rimas.

Cap. LXXXIII

In plantis quoque rimae oriuntur, gradientes magis infestantes. Planta igitur
assidue scalpi debet, & haec medicamenta adhiberi, picem liquidam ammixta
cera, ita ut cera pars una sit, picis uero liquida duae, illinito. Aliud. Scillae
medullam in oleo coquito, & cum terebinthina tritam imponito, aut etiam ab-
iecta scilla, terebinthinam in oleo liquato ac utitor. Aliud. Cancrorum
fluuiatilium ustorum cinerem cum melle subactum impone, uel oleo dissolu-
tum rimis praescalpis instilla. Aliud. Malicorium aceto coctum per dies
quinque imponito, indeque purgatis calcem cum oleo adhibeto. Aliud. Cor-
nu caprini usti cinere liquida pice aut terebinthina excipito ac utitor. Aliud.
Amurcae in aeneo uase ad mellis compagem coctae cyathū unum, aceti cyathū
unum, squamae aeris, pollinis thuris, singulorum drachm. ii. lanae succidae tene-
rae manipulum unū. Lanam tæda obuolutam urito, ac reliquis aridis ammisce-
to. Amurcā uero cū aceto ad mellis cōpagē coquito, & illis adjicito. Vtere hoc
ad uulnera quidē cū uino dissoluto, ad plātarū uero ac pudendorū affectiōes cū
passo.

passo. Aliud ad pedum rimas, porcinum adipem sale in ueteratim calidum assidue instilla. Aliud, Spumam argenti, colophoniam, mel, oleum, & quis portionibus preparato. Hoc etiam ad reliqua caua ulcera facit. Aliud ad pedum rimas, quod labiorum quoque duriciam emollit, Ceruse dra. ii. spumae argenti dra. x. myrrhae dra. i. ouorum candida ii. Vino odorato paulatim instillato terito ac uitior. Mihi uero etiam oleum adijciendum uidetur, ut pinguis compages fiat. Et ualde probo commune illud quod e melle paratur, et mellis, cerae, olei, spumae argenti, & aequales portiones recipit. Nam hoc ad omnes pedum ac manuum exulcerationes facit, siue in uola, siue intra digitos fuerint, & praesertim si prope ungues extiterint. Ad calcaneorum praeterea intertrigines ex calceamentorum attritu obortus, & ad attritus ex longo decubitu factos, quales saepe in cubitis ac coxis uisuntur eorum qui diutino morbo laborauerunt. Hoc medicamento saepe prospere usus sum. Neque enim simile habet, praesertim ad os sacrum & femora ex longo decubitu attrita ac ulcerata. Aliud floridum, ad rimas. Calcis uiuae dra. x. cerussae dra. xx. cerae dra. xxx. adipis suilli recentis sepruncem, colophoniae dodrantem, succi seminis lini cyathum unum, olei dulcis quincuncem. Cerusam et calcem cum succo terito, & ad ceratum frige factum ammisceto, & loco prius repurgato adhibeto. Hoc praeter omnibus teneram plantam efficit. Ad reliqua uero ulcera ob faetorem improbat. Aliud. Amurcae, mellis despumati, singulorum dra. ii. aluminis phorimi drach. i. Hoc etiam gingiuas purgat ac firmat.

De crurum ac reliquarum partium uaricibus.

Cap. LXXXIII

Varices appellantur uenae dilatatae, quae aliquando circa testes, aliquando circa crura ampliantur. Sed qui in testibus fiunt, chirurgiam difficulter admittunt. Qui uero alibi consistunt, hoc modo curari solent: primum simplex sectio fit cutis uasi adiacentis, deinde uas ab ambientibus corpusculis separatum ceco uncino attrahitur, ac lineo funiculo superne deligatur, & non aliter quam in uenae sectione fieri solet uas inciditur, et euacuato sanguine quantum opus esse uidetur, superior pars constringitur, et postea totum quod ampliatum fuerat amputatur, peracto opere sectio polline thuris impletur, & splenio ac linteis imposito deligatur. Aeger autem quiescere iubetur, seruato ac cliui partis situ, ne si de cliuis iaceat, humores ad ipsam confluant, postea curationis ductus ad puris generationem dirigitur, & reliqua cura ulceribus communis adhibetur. Atque haec compendiarum ac securarum curatio est. Quidam uero uisionem malunt, & per latum digiti spatium cauteria uasis adhibent. Et ubi crusta exciderit, ulcusque incarnatum ac cicatrix inducta fuerit, locum roborant. Alij uarices incipientes talibus medicamentis prohibere conantur. Emplastrum citra molestiam resiccans, etiam si ulcera manantia in ipso uarice fuerint. Bituminis iudaici sesquibram, olei uetustissimi bessem, terebinthinae liquide septuncem, sulphuris uiui trientem.

Bitumen ad cicerum magnitudinem crassius contusum, in oleo donec liqueat coquito, deinde adiecta terebinthina simul coquito, donec non amplius in quinient, & sublato ab igne medicamento sulphur tritum inspergito, atque simul omnia in mortarium frigida aqua plenum inijcito, & probe subactis uitior.

De brachiorum ac crurum dracunculis. Leonida.

Cap. LXXXV

Qui appellantur dracunculi lumbricis similes sunt, & aliquando magni, aliquando parui reperiuntur, frequentius quidem in cruribus quandoque uero & in musculosis brachiorum partibus consistentes. Nascuntur autem hi in Aethiopia ac India in pueris praecipue, estque ipsorum generatio non dissimilis lumbricis latis uetris.

Sub

Sub cute enim mouentur nihil molestiae afferentes, uerum temporis progressu circa dracunculi extremitatem locus suppuratur, & cutis aperitur, ac dracunculi caput exeritur. Quod si dracunculus attrahatur, uehementem dolorem inducit, praesertim si nimia tractus uolentia fuerit ruptus. Nam quod relinquitur, molestissimos dolores infert, proinde ut ne recurrat animal, ualido filo brachium constringere oportet, & quotidie hoc moliri, ut dracunculus paulatim progrediens constrictione quidem intercludatur, nequaquam autem abruptatur. Locus item aqua mulsa, & oleo in quo absinthium aut abrotonum coctum est, aut alio quodam ex his quae ad alui lumbricos descripsimus, irrigandus est. Omnia tamen acrimia uitanda, propter periculum inflammationis, Cataplasmata quae laxatoria ac suppuratoria e farinis cum aqua mulsa & oleo preparata adhibeatur. Quod si dracunculus sponte progrediens facile extrahi poterit, nihil amplius faciendum est. Sin ad suppurationem uertetur, a cataplasmatibus, & aquae mulsa ac olei rigatione non est discedendum. Nos uero emplastrum e baccis lauri, post cataplasmatum ablationem, imponere solemus, facta uero suppuratione, cutis per longitudinem diffecetur, & dracunculus denudatus auferatur, & cutis linamentis inditis disparetur, & reliqua curatio suppuratoria adhibeatur, ita ut animali suppurato & extracto, ulcus incarnetur & ad cicatricem perducatur.

QVARTI DECIMI SERMONIS AETII FINIS.

INDEX EORVM QVAE IN DECIMO quinto Aetij Sermone habentur.

| | | | |
|--|------------|--|-------------|
| De tumoribus laxis. | Cap. i | De emplastro Anicero. | Cap. xvi |
| De inflatione. | Cap. ij | Emplastra ruptoria. | Cap. xvij |
| De tumoribus induratis. | Cap. iij | Emplastra discussoria & attractoria. | |
| Tendinum ac ligamentorum induratum curatio. | Cap. iij | Caput xviij | |
| De strumis. | Cap. v | Emplastrum Nechepsonis e cupresso. | |
| De bronchocela, hoc est, gutturis tumore. | Cap. vi | Caput xix | |
| De pustacei ac mellei humoris tumoribus. | Cap. vii | Apochymatis praeparatio. | Cap. xx |
| De steatomatibus, hoc est, tumoribus adiposis. | Cap. viij | Cerata utilissima. | Cap. xxj |
| De Ganglio. | Cap. ix | Heptapharmacum laxans, suppurans, incarnans. | Cap. xxij |
| De uasorum dilatatione. | Cap. x | Enneapharmacum. Hori mendesij. | |
| De cerijs, hoc est, fauis. | Cap. xi | Caput xxij | |
| Emplastra ad cruenta uulnera glutinanda, et ad multos usus comoda. | Cap. xij | Emplastrum philosophi. | Cap. xxv |
| Emplastra cephalica, et ad fracturas, et ad multa comoda. Et de iusto eorum usu. | Cap. xij | Oesypij praeparatio. | Cap. xxvi |
| Emplastra emollientia ac discussoria, ad multa comoda. | Cap. xiiij | Emplastrum Manus appellatum. | Cap. xxvij |
| De emplastro ex aspidibus. | Cap. xy | Emplastrum Bromii appellatum. | Cap. xxviii |
| | | Emplastrum ex ouis. | Cap. xxix |
| | | Parhygrum Galeni. | Cap. xxx |
| | | Emplastrum ex ouis, Oribasij. | Cap. xxxi |
| | | Parhygrum Oribasij. | Cap. xxxij |
| | | Emplastrum Rosaceum inscriptum. | Cap. xxxij |
| | | Emplastrum phycoryche appellatum. | Cap. xxxij |
| | | Emplastrum Sphaerium appellatum. | Cap. xxxij |

| | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| Emplastrum pentatheton. | Cap. xxxv | Ceratum ex sandyce, homo appella- | Cap. xliij |
| Emplastrum ex Ochra. | Cap. xxxvi | tum | Cap. xliij |
| Emplastrum telamonium. | Cap. xxxvij | Emplastrum ex allijs. | Cap. xliij |
| Pilarium ex recremento argenti. | Ca- | Emplastrum e scilla. | Cap. xlv |
| put xxxviij | | Emplastrum ex pompholyge, Hera- | Cap. xlv |
| Emplastrum ex pompholyge. | Ca. xxxix | Cappadocis. | Cap. xlv |
| Emplastrum rutaceum. | Cap. xl | Emplastrum nigrum Essentia appella- | Cap. xlvij. |
| Ceratum e perdicio. | Cap. xli | latum. | Cap. xlvij. |
| Ceratum e succo betæ. | Cap. xliij | | |

AETII MEDICI GRAECI CONTRA

CTAE EX VETERIBVS MEDICINAE TETRABLI, SIVE QVATERNIONIS QVARTI, Sermo tertius, & ex ordine Decimus quintus.

De tumoribus laxis itemq̃ duris, & de strumis, & emplastro-
rum multi usus compositione.

DE TVMORIBVS LAXIS. CAP. I



VE M A D M O D V M ab influxu bilioso erysipelas, hoc est, ignis facer, ita à pituitoso tumor laxis, quē oedema Graeci uocāt, generatur. Est aut̃ tumor hic citra dolorem, flatuosum spiritum continens, uelut à uaporoso humore prognatus. Solent etiā aliter tumores laxi fieri, circa pedes praecipue, in hydrope, ac tabe, & malo corporis habitur, qui si digitis prematur, cauus locus fit. Et hi in quibudā etiā faciem occupāt. Verū hi tumores accessio sunt aliarū affectionū, & nullā propriā ac praecipuā curā requirunt. Sufficit enī ipsis frictio, alia quādo per acetū ac oleum rosaceū permixta, aliquādo per oleū & salē, potest etiā sal ad acetū oleo rosaceo pmixtū adijci. At si ob pituitosi humoris influxū in parte aliqua laxis tumor consistit, sponsia posca imbuta ac imposita, & leui adstrictione alligata, quae ex infernis partibus initū sumat, & in supernas desinat, affectionē quādoq̃ sedauit. Oportet aut̃ sponsiā esse nouā, si uero talis nō adsit, expurganda est nitro uel spuma nitri, & lixiuio. Quod si neq̃ sic tumor deprimatur, parū aluminis ad poscā adijcies. Aptū est & Tarlicū Ellychniū, aut aliud molliissimum, eodem humore imbutū ac impositum. Cōfert & glaucium, & collyrium ex eo paratū. Sordes item lucernarū aqua mulsa dilutā utiliter adhibent. Caterū diuturnos tumores laxis oleo prellitos, & spōgia noua ex lixiuio superimposita uolētius cōstrictos sanabis. Discuit item ac cōpescit laxis tumores terra omnis illita, & praesertim quae in lentibus reperitur ad salē adhibita, uelut Sermone secundo retulimus. Itē isatis hortensis ac satīra.

De inflatione. Cap. II

Flatuosus spiritus aliquādo sub cute, aliquādo sub pelliculis ossa, aut musculos ambientibus, colligit, & inflationē parit. Aliquādo etiā circa uiscera uentrēq̃ ac intestina coaceruat. Si itaq̃ uiscera inflata fuerint, satis cōstat ex uitioso uictu multū esse obortū. In musculis aut̃ cōtingit praecedente plerūq̃ cōtusione. Suntq̃ huiusmodi musculorū affectiones curatu difficiles, quoniā in omnes ferme musculi

Zz partes

partes flatuosus spiritus dispergitur, cōstringitq̃ ac intercludit ab ambientibus pelliculis, et plurimis alijs corpusculis usq̃ ad cutē præteritis. Ad uētris ergo ac intestinorū et uiscerū inflatiōes, oleū tenue efficax est, in quo ruta aut cymīnū, aut apij semē, et alia attenuātia ac calefaciētia coctū est, si aut irriget, aut per clysterē infundat. Magna etiā cucūrbita circa umbilicū absq̃ scarificatiōe apposita, tam cito hominē a molestia liberat, ut admirabilis sit ea celeritas, & incātationi similis. At uero musculis ex cōtusione inflatis, ex calidorū et acriū usupartes exacerbat, et auctis inde inflamationib. musculi magis lædūt, ac dolores intenduntur. Mixtas itaq̃ facultates habere oportet ea quę inflatis musculis adhibentur, præsertim si cōtusio fuerit aliquātulū inflāmata. Quapropter in principio mitigatoria augēda sunt. In declinatiōe uero discussoria. Neq̃ repente ab alteris ad altera trāseundū est. Sed paulatim mitigatorijs detractis, discussoria augebimus. Mitigatoria uero in huiusmodi affectionib. sunt, sapa, & æsypus, modico oleo adiecto. Discussoria aut acetū, nitrū, spuma nitrī, elixiuū. Et in principio quidē solā sapa cū modico oleo, et aliquādo uīno adhibemus, ut ne omnino repellēdi uī careat, et hæc omnia succida lana excepta. Quę si nō adsit, æsypū reliquis quacūq̃ lana exceptis ammiscemus, præ omnib. uero curandū est ut hæc calida permaneāt, neq̃ sinant donec frigeant, forinsecus itaq̃ calida lana adhibeat, et ubi calorē eius æger amplius nō percipit, noua statim applicet. Mitigato aut ægroto, acetū ac nitrū ammiscemus, copia ipsorū paulatim aucta. At uero neglectas et antiquatas inflaciones, primū lixiuio fouebimus, deinde emplastrum quoddā molliens ac discutiens imponemus. Quale est hoc. Strigmenta feruētia excolato ut pura fiant et rursus in ollam mittito, et calcē uiuā uelut farinā triā infarcito, ut lutosa cōpages medicamēti euadat, & utitor. Hoc uero adhuc efficacius est pharmacū ex sycomorīs cōpositū. De tumorib. induratis. Cap. 111

Indurati tumores laxi opponuntur. Laxorum enim nota est ut appressis digitis cedant et cauus locus fiat. Durorum uero tumor pertinax est, & ad tactum renitens, et ad sensus difficultatē inclināt, ut tandē hi loci in quib. est, sensus exortescant, et ad ossis duriciā perueniant, et nullā omnino curationē admittant. Sed et pili in ipsis oriri soliti, minime nutriūt, et exacte glabri fiunt. Duri itaq̃ tumores aliquando statim ab initio cōsistunt ac augentur. Aliquando uero a medicis inducuntur, qui inflamationes ac erysipelata uehementē perfigerant ac adstrinxerunt, quā tamen transacto principio discussoria adhiberi debeant. At uero qui ex erysipelatis fiunt, cutis duriciā saltem præferūt. Qui uero ex inflamationibus succedunt, subiectas etiā carnes inuadunt, tanto profundius quanto inflamationes erysipelatis sunt profundiores. Inchoantibus ergo duricijs, et debilem aliquē sensum adhuc habentibus, medicamenta emollientia adhibebimus, quę simul moderate etiam discutiunt, et talia sanē sunt quę & molliendi ac diffundēdi uim habēt. Nā quę uehementē discutiūt, et sine molliētia statim euacuāt, manifeste quidē tumorē imminuūt, reliquias uero affectionis incurabiles efficiūt. Discussis em tenuiorib. humorib. qd̃ exacte terret ac solidū est p̃tinaciter restitat, quapropter in hūc usum medicamēta adhibēda sunt, quę molliēdi simulq̃ discutiēdi uires habēt. primū igit molliētib. utemur, deinde ad discussoria pcedemus, eaq̃ molliētib. paulatim miscebimus. Cōsiderādus tamen est & curandi corporis habitus, et affectionis status quantum processerit. Hæc uero si recte consideraueris, coniecturalem quidem, non tamen penitus arte carentem, peritiā acquires. prima enim die statim molliētia adhibebis, altera deinde aut tertia transacta, facile intelliges an augere aut remittere medicamēti uim oporteat, præstat autem tum ad hosufus, tum ad reliquos, si rectam

rectā curationem peragere uelimus, opposita medicamenta, ualidissima uideli-
cer ac mitissima, preparata adseruare, quo pro affectionū diuersitate diuersę mi-
xturę fieri possint. Ad duros itaq; tumores molliendos caprinus bubulusque a-
deps cōmodus est. At sicut taurinus ac hircinus ualidiores sunt, ita hœdinus ac
uitulinus imbecilliores, & suillus debilissimus. Sed his omnibus præstant ad di-
scutiendū, non aut molliēdum, leoninus, pantherinus, hyenæq; ac anseris. Gal-
linaceus aut inter suillum ac anserinum medius est. At inter medullas prima est
ceruina, deinde uitulina: Cæterum resinæ odoris nō acris, his medicamētis am-
mixtæ uiscositatem exhibent, nec tamen molliendi uim auferunt. Cōmodissi-
ma uero omniū resinarum est terebinthina, quæ chia appellatur, & laricis resi-
na, liquoris cōpage nihil ab illa differēs. Deinceps uero pinea & abietina. Ve-
rum sicciore, qualis est resina pinus arida, phylēma priuatim appellata, nimīū
siccant. Et propterea ad emollientium medicamentorū compositionem inuti-
les sunt, & terebinthina ac laricina eligendæ. Pix quoq; Brutia quum eiusdē fa-
cultatis sit, in eodē usus recipi potest, sed aridiore reprobamus, sicut etiā bitu-
men. Habet & mastiche chia uim emolliendi, Aegyptia uero mastiche nigra e-
molliit quidem, sed magis siccatur ac discutit. Thus insuper non expers est faculta-
tis molliendi, itemq; fœni græci semē, hoc enim coctū molliē potest, quanquā
thus quoq; in mollitorijs medicamētis paululum est coquendū. Eiusdē ordinis
sunt & balneorū strigmenta, butyrum, althææ decoctū. Media uero inter lenia
& ualidissima propolis est. Validissima aut appello, ammoniacum thymiana,
bellium, præsertim Scythicū resinofum, & colore nigricās: styracem maxime
pallidū qui calamites uocatur, flauū item ac pingue. Galbanum enim & opopa-
nax supra uim discussoriā, etiā molliūt. Verum galbanum molliendo, opopa-
nax discutiendo præstat. Atq; huiusmodi sanē mollientiū medicamentorū ma-
teria est. Tu uero libros adeptus medicamentarios, singulorum compositorum
uires ex simplicibus expendes, quo uarias pro maioris ac minoris ratione ipso-
rum differentias cognoscas, & corporum simul ac affectionū differentias cōsi-
deres, atq; ita fortia fortibus, & mitia debilibus adhibeas. Inter curandum aut af-
fecta pars oleo calido foueatur, & glutinosa medicamenta apposita antequam
sponte decidāt, ne remoueatur: Imō etiam si lauandus sit eger, omnino permit-
tenda sunt. A balneis tamē medicatis abstinentiā consulo, præsertim quę alumi-
nis, aut sulphuris, aut æris qualitatem ammixtā habent. Hæc enim huiusmodi
affectibus aduersantur. Et hæc profectō sufficere possent ingeniosis & in artis
operibus aliquatenus exercitatis uiris. Verum quum nō omnes tales sint, medi-
camenta quoq; usu & experimētis cognita explicare oportet, initio sumpto ab
his quæ summā molliendi uim obtinent, & paruis etiā inflammationibus com-
moda sunt, quæ aliqua duriciā participāt. Horum autē simplicissimum est par-
hygrum appellatū, ex ceræ, butyri, & colophonix æquis portionibus constans.
Deinde quod Mnasæe inscribitur, & reliqua eiusmodi. Item helladicum molli-
torium, & quod ex parua præparatur, & quod Lucio inscribitur ad anchilopas
& reliqua quæ paulo inferius in hoc Sermonē habentur.

Tendinum ac ligamentorum induratorum curatio. Cap. IIII

Tumorum equidē induratorum emolliitio ac discussio prædictis medicamē-
tis perficitur, quæ emollientia appellatur. Quum uero partes quædā natura ra-
tiores, quædā densiores sint, consequens est ut singula proprijs medicamentis
priuatim opus habeāt. Quapropter ad tendines ac ligamenta præstabilius effe-
iudico, ut mollientibus medicamentis aliquid adiungatur, quod incidēdi uires
habeat,

habeat, inter quæ præcipuū est acetum. Affecta itaq; parte cōmodis medicamē-
tis præmollita, huiusmodi fomentū sæpe habuit succellum. **Acerrimo** aceto ig-
nitum lapidē pyritē, si haberi potest, aut molarē ex quo molas faciūt, restinguo.
Deinde ad excipiēdum substrati lapidis calidū uaporem ab asperso aceto emer-
gentem, ligamentum siue tendinē induratum adhibere iubeo ac commoue-
re. Hinc enī mirifice opem sentit. Et postea rursus medicamentum mollito-
rium impono, & paucis interpositis diebus idem fomentū rursus repeto. Sæpe
enim in hac ligamenti aut tendinis admotione ac cōmotione, ita ab eleuato ua-
pore duricia resoluta est, ut res incantationi similis uideretur. In principio tamē
affectā partem non aqua, sed oleo plurimo quotidie large perfundo, accipio au-
tem oleum dulcissimum adstrictione penitus carens, in quo interdum foenum
græcum, & altheæ ac cucumeris syluestris radicē, uel alicuius cōsimilis coquo.
Vtōr præterea aceto etiā ad alias partes, quæ iam diu medicamenta alia exper-
tae sunt. Scio enī esse quādā medicamēta ex aceto parata, quæ post mollientiū
usum per integrum diem imponere soleo, deinde rursus molliētia adhibere, &
paucis interpositis diebus rursus ex aceto præparata imponere. uis enim aceti
per interualla locis iam præmollitis admota, crassos ac uiscosos humores incidit
ac dissoluit, & hinc tales affectiones nō leuiter iuuat. Verum si quis adeo forti-
ter discutientibus plus æquo usus fuerit, præsertim in principio, tenuiores qui-
dem humores discutiet, residuum uero ad lapideā naturam mutatū, loco impa-
ctum persistet, supra hoc quod nimius etiā eorum pharmacorum usus, neruorū
essentiā lædit. Quapropter neq; frequenter, neq; ab initio, neq; duobus conse-
quenter diebus, medicamentis cum aceto præparatis, ad ligamentorū ac tendi-
nū duricias utendū est. Lienis tamen partibus induratis, tutus & cōmodus ipso-
rum usus est. Et multi sanē indurato lienis tumori, ammoniacum thymiana cū
aceto subactū adhibēt, & hoc solum sæpe ad splenis indurati curationē sufficit.
Ego uero etiā carnosarum partiū musculis induratis, inter molliētia medica-
menta, ammoniacum cum aceto adhibere soleo, & summā eius commoditatē
deprehendo. At hoc etiā hic una tantum aut altera die adhibendum est, & de-
inde ad molliētia reuertendū. Et pluribus diebus interiectis rursus ad medica-
mentum ex aceto transeundum, siue ammoniacum id sit, siue aliud quoddam
emolliens cum aceto præparatum. Molliens autem esse oportet, quod cum ace-
to paratur. Siccantia enī primum quidē prodesse uidentur, sed residuum po-
stea incurabile efficiunt. Proinde inter emolliētia frequenter hoc cataplasma
te uti soleo. Altheæ radicem tritā ac angustissimo cribro excretā, adipe excipio
ac appono, est enim medicamentum ad huiusmodi affectiones efficax. Sit autē
adeps anserinus, si haberi poterit. Sin minus, gallinaceus. At si hic quoq; defue-
rit, fusillo utemur. Sed & maluæ agrestis ubiq; nascētis folia aliquo relato adipe
subacta utiliter apponūtur, quæ si moderate fuerint cocta, crudis erūt præstatio-
ra. Talia enī pharmaca locis iam præmollitis adhibita, citra mordacitatem ac
tutō discutunt.

De Strumis. Leonidæ.

Strumas appellāt græci choeradas, à porcis, in quorum gutture adnati qui-
dam tumores reperiuntur strumis similes. Alij à multiplici partu porcorum no-
mē desumptum putāt. Sunt autē strumæ carnes subcandidæ, facile augescētes,
in mēbrana cōtentæ, & in summa, glādulæ indurate, quæ in collo, sub alis, ac in
guinibus oriuntur, ubi glandulæ uasis substratæ sunt. Aliquando etiā, sed tamē
raro, ex carne eorundē locorum fiunt, quæ affinitate quādā ad strumarum natu-
ram uertitur, & materiæ accessione augetur. Differunt strumæ inter se, magni-
tudine, natura, loco, ortu, multitudine, & uasorum cōplicatione. Magnitudi-
ne, quia

ne, quia alia parua, alie mediae, alia magna, alia ingētes sunt. Natura, quoniā alique mansuetæ, alique malignæ cōperiuntur: Mansuetæ citra inflātionē, citra dolorē, moderatam duriciā habent. Neq; enim molles sunt uelut tubercula adiposa Steatomata appellata, neq; duræ, sicut tumores indurati, sed mediam quandā tactus proprietatē habent, et tumorē circumscriptū rotundū ac equalē. Malignæ uero strumæ inflātionē ac dolores pulsantes inducūt, & tumorē inaequalem præ se ferunt, in quo uasa prominent, & ad manuum contactum ac medicamentorum impositionē efferantur. Loco autē differunt, quoniā quædam in anteriore colli parte, quædā ab altera ipsius parte, quædā ab utraq; oriuntur. Quædā item statim sub cute superficiem habent, quædā circa magna ac nobilia uasa penitus insident. Ortū, quod quædam uelut eleuata, quædā insertæ oriuntur. Et eleuata quidem facile huc et illuc mouentur: Insertæ uero ad contactum renituntur. Multitudine, quia et una, & plures generantur. Vasorum complicatione. Quædam enim uenas ac arterias implicatas habent, quædam omnino nō habent, parua igitur strumæ facilius curantur quā magnæ, et mansuetæ citius quā inflāmatæ. At uero malignæ incurabiles sunt. Quum enim omnes huiusmodi strumæ canceratæ ac ualis refertæ sint, si eas per chirurgiam aggrediāris, sanguinis eruptionis periculū imminet, supra hoc quod penitus insidentes, rescindi non possunt. Vasa enim nobilia, uenas uidelicet iugulares & arterias carotidas appellatas, maligna struma uelut radices habet. Verū pro loci ratione superficialiæ facilius curantur quā profundæ, deinde & quæ in collo oriūtur facilius curantur quā reliquæ. Vocales tamen neruos in his diligenter uitare oportet. Multi enim strumas circa asperam arteriam secantes, uocalibus neruis simul recisis, hominē de cætero uoce priuarunt. Nam supra nerui recessionē, uocalia instrumēta denudata, et inter curandū perfrigerata, uocis actionē amiserūt, pro multitudine uero, certū est unā facilius quā plures curari posse. Sicut quantū ad ortū attinet, lōge citius curatur eleuata, quā inserta. Optima porro ac compendiosissima sanabiliū strumarū curatio fit per chirurgiam. Aegrū igitur prostratum decubere oportet. Sedens enim facile animi deliquiū incurret, postquā igitur decubuerit, crurib. inter se cōpositis caput a ministro detineat. Deinde cutis tumori incūbēs recta uel obliqua sectione incidat. Sectio em̄ trāuersa collo incōmoda est, quū uasa et nerui recta porrigant. Neq; uno impetu tota cutis crassitudo dissecet, nihil em̄ uiolēte fieri debet. Et in paruīs quidē tumorib. simplex sectio fiat, in maioribus autē ad myrti folij figurā cutim rescindēs, tum uasa paulatim denudata seponēs, quæ quum naturali carnē sint candidiora facile discernēs, postea sectionis labia hamulis distendēs, & pelliculas de struma tum manu, tū scalpello detrahes. Quod si inserta fuerit, attentione res peragenda est, ne per incuriā sanguinis eruptio fiat, atq; ea gratia unum tantū sectionis labium hamulis distendatur, et ita sensim a connexis corporib. per scalpellum separetur. Et ubi ex una parte cōnexa fuerint disperata, in altera idem fiat. Deinde tota basis diligenter, propter neruos et uasa substrata reseccatur. At in strumis circa alas ac inguina ortis, sectio tranuersa fit ob cutis reduplicationem, peracto opere si sanguis erumpat, medicamenta sanguinē sistentia suprā relata adhibeantur. Sin minus, sectio thuris polline expleatur, & linamēta indantur, & lana uino imbuta adalligetur, postridie permissis ligamentis, locus uino & oleo profundatur, & hoc usq; ad tertiā aut quartā diem fiat. Deinde soluitur, & suppuratio procuret, et curatio reliquis ulceribus cōmunis fiat. Ad repurgandum autē, et incarnandū, ac cicatricē inducendā, theriaca efficacissima est.

est. Cæterum inchoantes strumas, tum in pueris, tum his qui chirurgiam non admittunt, medicamentis dissoluere ac discutere conabimur, & sanè curatio ipsarum similis est ei quæ ad induratos tumores paulò ante retulimus. Primum enim mollire, postea discutere oportet. Emplastrum ad strumas. Strigmenta à palæstræ parietibus derafa ac probe subacta, super linteolo extendito ac imposito.

Aliud. Laser aut calcem uiuam cerato cyprino aut irino exceptam imposito. Aliud. Sulphuris & galbani æquales portiones resina excipito. Aut clibanii testam cum aceto terito, & uelut ceratū efficit. Aut corticem radicis mædragoræ cyprino aut irino cerato excipito. Hoc equidem efficacissimum est. Aliud. Strumas erodens: Sădarachā cum adipe caprino aut bubulo, aut calcem cum eodem imposito. Aut nasturtium cum cerato. Aliud. Succū cyrenaicū, aut si haberi non potest, laser cum melle attico ad cerati cōpagem illinito. Aliud rūpens strumas. Pueri cum aceto tritum strumas rūpit ac reliecat. Aliud. Semē nasturtij & lomentum aqua subigito, et quotidie bis imposito. Et post eruptionē eodem usque ad exactam sanitatē utitur. Aliud. Vrticæ semē cum uino tritū, rūpit, repurgat, incarnat, & clauicellæ inducit. Aliud. Grossos pserum caprifici cum axungia imposito. Omnis enim tumorē discutit. Aliud. Recrementum ferri cum oleo, aut bdellium cum melle, linteolo inducito, ac adhibeto. Et quinq; dieb. trāfactis soluit, & spōgijs locū foueto, cauēs ne oleo inquinet. Oportet aut bdellium ad prunas cum melle subactū optime distēdi, atq; ita applicari. Aliud. Psyllij, lomentū, seminis urticæ, pares portiones, pice liquida excipe ac utere. Aliud. Ostreorum testas uistas ac minutissime tritas inspergito, loco prius uino ex ore cōspuito. Atq; hoc frequenter facito. Emplastra etiam adhibeant, quæ paulò inferius describent. At quod ex achate lapide præparat, ad suppurandū, rumpendū, ac psanandū cōmodissimum est. Itē quod pardalis appellat, superius ad hydropicos relatū. Strumis insup laborātes uiperarum elu magnopere iuuant, quæ admodū de elephātiacis diximus. Itē si laser quotidie iuni ciceris magnitudine uorauerint. Aliū etiā facile solubile habere oportet, & tenui uictu uti, uomitūq; frequenter ciere, & pituitā per os detrahēre, ac caput reliecare. Cataplasmata quoq; incipiti adhibenda sunt, quæ mediocres pustulas excitare possunt, uelut est capparidis radix cum polenta, ac reliqua huiusmodi. Smegmatis itē ac puluillis eiusdem facultatis utendum est.

De Bronchocele, hoc est gutturis tumore.

Brochocele appellatur tumor in gutture oriens. Omnis enim tumor apud anti quos cele nuncupat. Nomen igitur commune est, sed species tumorū differūt. Quidā enim meliceris à melleo humore, quidā adiposus, quidā pultaceus, quidā cæcarius appellat. Aliquādo etiā ppter locale uasorum dilatationē orit, quomodo frequentissime ex partu cōtingit, quū in uehementissimis doloribus puerpera spiritum uiolenter detinuerit, cōstatq; uasorum huius loci dilatationem incurabilem esse, quemadmodū etiā tumorem in scirrhum induratū, malignūq; ac magnitudine ingentem. Verū reliqui omnes chirurgiæ ac medicamentis cedentes facile sanātur. Chirurgia uero præsentī tumori cōueniens fit, siue meliceris, siue adiposus, siue pultaceus tumor fuerit. At uero quæ gutturis tumores discutunt, sunt bdellium cum melle tritū, calx cum axungia, laser cum sulphure, lixiuū cum melle, stercus caninū cum aceto. Aliud. Calcem uiuā, ammoniacum, bdellium, & axungia aut terebinthina excipito ac imposito. Aliud Adamantū. Gallarum unc. i. lapidis pyritæ drach. ii. pyrethri drach. ii. nitri drach. i. silphij sesquidrachmā, sandarachæ drach. ii. terebinthinæ drachm. ii. ceræ, picis, singulorum drach.

Cap. vi

drach. tres, axungiae ueteris drachm. duas, aluminis liquidus unc. i. Arida est uino ac sapa terito, & liquabilia liquefacta ammisceto, ac utitor. Aliud. Spumae argenti, aeris usti, singulorum drachmas octo, olei antiqui drachm. centum, resinae pinus drachm. x. l. galbani, ammoniaci thymiamatis, singulorum unc. unam, aluminis scissilis, mannae thuris, singulorum drachm. iiii, oleum cum spuma argenti coquito, & medio cocturae tempore aes tritum inspergito, & bullire finito donec non amplius inquinent. Deinde liquabilia liquata adijcito, & ab igne sublati pollinem thuris ac alumen ammisceto, ac utitor. Aliud. Silphij, limi laginis, singulorum drachm. octo, calcis uiuae drachmas sedecim, sandarachae drach. x. ii, mellis quantum satis est, praepara ac utere. Ad laxos autem tumores qui sub mento oriuntur, iridem illyricam cum aqua tritam, adiecta modica rubrica, ter singulis diebus illinito. Est enim medicamentum insigne.

De pultacei ac mellei humoris tumoribus. Leonidae. Cap. vii

Atheroma est tumor concolor, citra dolorem, in tunica nervosa, humorem pulticulae similem, quae ex farina cocta fit, & athera graecis appellatur, continens. Aliquando autem una cum pultaceo humore, lapidosa quaedam duraque corpora scula, & alia tanquam sulphuris ramenta reperiuntur. Aliquando uelut manna gallinarum ossicula. Inuenimus etiam aliquando uelut pilos crassissimo humore complicatos. Philoxenus autem dicit se aliquando reperisse animalia in humore, culicibus aut muscis paruis similia. Est autem atheromatis tumor specie & figura oblongus, sublati que, & ad compressionem digitorum, ob humoris crassitudinem, tarde cedens, & amotis digitis tarde reuertens. Meliceris autem est pellicula nervosa tenui humore instar mellis referta, similiter citra dolorem consistens, differens ab Atheromate figura & humoris essentia. Nam & figura rotundior est, & humoris essentia tenuior. Et huius tumor magis extenuatur, & ad digitorum compressionem celerius cedit, & amotis digitis pariter celeritate reuertitur. Ceterum pro chirurgiae ratione nihil refert, siue pultaceus, siue melleus, siue feculentus humor, aut cuiuscunque essentiae fuerit contentus. Unus enim scopus propositus est, ut tunica siue pellicula humorem continens auferatur. Sed id considerandum est quod tumores quidam sunt eleuati, & ad motum ac contactum expositi, facile que curabiles. Quidam contra inserti, & ad motum non expositi, & in chirurgiae aggressionem summam diligentiam experientes, propter imminentes sanguinis eruptiones ac neruorum puncturas, plerique enim chirurgi ob imperitiam etiam neruos substratos cum huiusmodi tumoribus recidunt. Chirurgiam itaque aggressuri, agrum in sella locabimus. Et si paruus fuerit tumor, simplicem sectionem faciemus, uelut in strumis diximus. Si uero maior, ad myrtei folij figuram pro tumoris ratione curam incumbentem rescindemus. Sed neque hic uno impetu tota sectio fiat, ne pellicula humorem continens disseccetur, & humor euacuetur. Si enim euacuatus fuerit, & tumor conciderit, tunica difficulter excoriari ac curari poterit. Summa itaque diligetia pellicula paulatim excorianda est, nihilque de ipsa circa basim relinquendum, ne malum regeneret. Post ablata pellicula, labia sectionis committimus, & si plus a quo laxa fuerint, redundantem cutem refecamus, deinde futuris labia conectimus. Illud porro animaduersione dignum est, ut si in capite huiusmodi tumor fuerit, post ablata pelliculam, membranam os ambientem secemus, & caluariam diligenter deradamus. Peracto opere in paruis tumoribus, quum parua sectio fecerimus, nulla difficultas imminet, et statim post futura, splenium glutinatorum inflammationibus arcendis idoneum adhibemus. Qui uero adhuc cruenti sunt,

Zz 4 & glux

& glutinari nō possunt, in his ex maioribus interuallis futuras fieri oportet, ut oblonga sectionis figura fiat: deinde linamenta indere, & puri generationi su-
dere, quēadmodū superius de abscessib. docuimus. At uero ad eos qui chirurgiā
reculant, medicamētis tumorē discutientib. utemur. Emplastrū ad Meliceri-
das, passiarum uuarum uinaceis exemptis lib. i. cumini leuissime triti sexūcem,
nitri quadrātē. Omnia simul in mortario subacta adhibeto ac adalligato. Arsi-
tiones ex cōstrictione remittere oportet, cerato excipito, ex oleo sicyonio &
pauca masticha pręparato. Aliud ad meliceridas, & ceria, id est, fauos appela-
tos tumores, cōmodū: Squamā æris et pollinem parib. portionibus ad malag-
matis formā subigito ac adhibeto. Aliud ad meliceridas et steatomata. Cera,
terebinthinæ, squamæ æris, sing. sextantē, sulphuris uiui, nitri, sing. unc. i. radi-
cum siccarū cannabis syluestris dra. xxxv. Et si defuerint, Aristolochiæ tantū
dem, olei antiqui lib. i. Radices per triduū aquam adfectas et cōtusas in oleo co-
quito, donec torrescant. Deinde ipsis abiectis, cætera quæ liquari debēt liquata
ammisceto, et arida ex aceto trita adijcito, ac utitor. Aliud discussoriū ad Me-
liceridas. Salis ammoniaci, spumæ argenti, cerussæ, sing. lib. i. cera, terebinthi-
næ, galbanī, opopanacis, sing. unc. i. rubricæ sinopicæ sexuncem, aceti heminā,
olei antiqui lib. i. i. Spumam argenti, cerussam, et sal leuissime trita in oleo co-
quito, deinde rubricam aceto tritam adijcito, et liquabilia liquata affundito, om-
nib. q̄ simul subactis ac perfrigeratis opopanacē ac galbanū aceto dissoluta am-
misceto ac utitor. Aliud ex asellis paratū ad strumas, et meliceridas, quod eti-
am cicatricem inducit: Asellos sub hydrijs stabulantes ducētos, ostreorum uiso-
rum drach. i. i. i. rubricę sinopicæ drach. v. i. i. terebinthinæ lib. i. ostrea et rubri-
cam primum seorsim, deinde simul terito, et tum asellos adhuc uiuos adijcito,
ac simul terito, et postea cum terebinthina ad calidū cinerem lente coquito, do-
nec non amplius inquinet. Sublatumq̄ ab igne medicamentum in mortario
subigito, ac adhibeto, & quinta die exoluito, potest tamen locus subinde prolui
ac rigari aceto. De steatomatibus, hoc est, tumorib. adiposis Cap. viii

Steatoma est tumor præter naturam, adipem in se continens, mole conco-
lor, & tactu lenis, & in principio quidem pusillus, sed temporis progressu am-
pliatur, pleraq̄ uero steatomata basim habent ampliorem, raroq̄ contingit ut
basis angustior, & apex amplior reperiatur. Deffert à struma, tactus mollitudo-
ne, qua nota etiam à meliceride et atheromate discernitur. Curatur & hic per
chirurgiam, sectione pro tumoris magnitudine fiēte, simplici aut ad myrti-
folij similitudinē, atq̄ hic libere cutim incidimus. Non enim sicut in athero-
mate ac meliceride tunicæ sectionem formidamus. Nam pinguedo adiposa
etiam si secetur non effluet. Verum illud negligendum non est, quod in strumis
quoq̄ prædiximus: Si steatoma eleuatum fuerit, in circuitu et subter excoria-
ri oportere. In circuitu per scalpellum, subter uero digitis. Insertum uero in am-
bitu & subter incidendum esse, peracto opere uulneris labia futuris constrin-
gantur, ut melius glutinentur. Aut linamenta profunda indantur, et curatio ad
puris generationem adhibeatur. At uero si steatomata apicem amplum, & ba-
sim angustam habuerint, omissis superuacuis, tota à basi rescindemus. Hic e-
nim chirurgię modus expeditissimus est, et ulcus paruum ac planum fiet, & cu-
ratio compendio transigetur. Cæterū steatomata discutiuntur, floribus bupha-
thalmi cera et oleo antiquo exceptis. Idem facit et cyclamini radix axūgia uete-
ri excepta, possunt et emplastra ad meliceridas præscripta adhiberi, præsertim
quod ex sulphure & nitro paratur, & similia inferius referenda.

De

De ganglio. Philagrii.

Cap. Ix

Gangliū est nerui nodosa coactio ac tumor, ex plaga aut labore obortus, raro sponte proueniens, manuum iuncturas, ac talos frequentius occupans, rarius cubitum et caput. Fit & in alijs partibus. Quantum ad notas attinet, tumor est inæqualis, paruus, dum cōprimitur stupidum sensum exhibens. Differtq̃ a meliceride & atheromate tumoris inæqualitate & renifu, & quod non orbiculatim uelut illa transfertur, sed dextrorsum solū ac sinistrorsum pro nerui situ fluctatur. Cæterum a gangliorum chirurgia abstinemus, præsertim si in manib, fuerint ac pedibus, & medicamentis tantum curamus. Ad hanc rem ammoniacū iuxta ignē ad emplastri cōpagem emollitum imponitur, & lamina plūbea tumori equalis superponitur, et ne hinc & inde labet, arctis uinculis mediā cōstringitur. Transactis aliquot diebus ubi ganglium fuerit emollitū, nulla rei mentione ad egrum facta, statim dum adhuc calet locus, uincula tollimus, et pollicē dextrę manus ganglio immittimus, ac reliquos quatuor digitos ipsi parti iniectos cōprimimus, & ganglium cōfestim dissoluitur. Vtere etiā mollitorijs emplastris, præsertim eo quod ex psyllio pice, masticha nigra, stercore columbino, & malua syluestri preparatur. Vtere et Lucij malagmatis ad cōtractos articulos descriptis. Cōmodum est etiā hoc. Cerussæ, olei antiqui, resinæ pinus, sing. lib. i., ceræ sextantē, ammoniaci thymiamatis, galbani, sing. unc. i., Cerusam cum oleo coquito, donec nō amplius inquinet. Deinde ammoniacum tritum, postea resinā et cerā: Postremū galbanum præmollitū adijcito. Alij resinā quincuncē, cerā autē trientē coniiciunt.

De uasorum dilatatione.

Cap. x

Vasorum dilatatio, quā aneurysma græci uocāt, in qualibet corporis parte fit, sed in gutture frequētius, ubi tumorē branchocelā appellatum producit. Accidit sepiissime mulieribus in partu, propter uiolentā spiritus detentionē. Sed et in capite circa arteriarum locos et in reliquo corpore, ubi arterię uulnerātur. Si aut quādo imperiti medici uenā cubiti secturi, simul subiectā arteriam dissecāt. Oritur aut omnino uasorum dilatatio, aut dum sanguis et spiritus ex arterijs persultāt, aut dum oscula ipsarum aperiuntur, aut dum rumpuntur. Sanguis aut & spiritus paulatim excreti sub cute colliguntur. Notæ aneurysmatis sunt, tumor paruus aut magnus, cōcolor, citra dolorē, ad tactū mollis, spongiosam laxitatē præ se ferēs. Et ita ad digitorū compressionē cedens, ut propemodū euanescere uideatur, uerū amotis digitis citissime reuertēs, id quod in mēti aneurysmate et reliquis quæ sine uulnere fiunt, præcipue uidere datur. At ubi arteriæ uulnus præcessit, & deinde coalescēte cute uasorū dilatatio accessit, tumor nō similiter mollis occurrit. Sanguis enim copiosior spiritu est, qui in grumos coit, & tumorem extendit. Atq̃ hæc quidē sunt notæ. Quantū uero ad curationē attinet, sciēdū deplorata esse aneurysmata apud chirurgos, quę gutturi aut capiti accidunt. Simul enim cum aneurysmatis sectione, abundantissima sanguinis eruptio contingit, cū qua etiā uitalis spiritus simul erūpit, ut homo sæpe in medicorū manibus deficiat. At uero quod in cubiti cavitāte fit aneurysma, hoc modo per chirurgiā aggredimur. Primū arteriā superne ab ala ad cubitū per internā brachij partē delatā signamus: Deinde in eadē interna brachij parte simplicē sectionē, tribus aut quatuor digitis infra alam, per longitudinem facimus, ubi maxime ad tactū arteria occurrit, atq̃ ea paulatim denudata, deinceps incūbentia corpori scula sensim excoriamus ac separamus, et ipsam arteriā cæco uncino attractam, duob. fili uinculis probe adstringimus, mediāq̃ inter duo uincula dissecamus, et sectionē polline thuris explemus, ac linamētis inditis congruas deligationes adhibemus. Postea uero tumorē in cubiti cavitāte siue flexura securi secamus,

nihil

nihil amplius uerentes sanguinis eruptionem. Tunc grumis euacuatis, arteriā unde sanguis prodijt perquirimus, & repertam uncino attractam sicut priorē constringimus ac dissecamus, rursusq; thuris polline sectione expleta, puris generationem procuramus. Cæterum ad gutturis aneurysmata, emplastrū cū prelo inferius inter discussoria medicamenta describendū cōmode adhibetur.

De cerijs, hoc est fauis.

Cap. XI

Cerium tumor est ulceratus, incumbentem cutem perrodens, ita ut ex foraminibus melleus humor excernatur, quapropter tum ob foraminū figuram, tum propter excreti humoris speciem, ceriū, hoc est, fauis appellatur, frequēter aut in musculosis locis, in articulis, & plantis pedum oritur. Sæpe etiā sex tam colli uertebrā occupat, et aliquādo etiam costas inuadit. Si uero in capite generatur, primū reliquis partibus, deinde caluæ etiam putredinē transmittit. Proinde in principio subscriptis medicamentis curationē tentabimus. Quibus superatis partes corruptas præsertim in capite refecare oportet, deinde mēbrana caluæ ambiente dissecta, os caluæ deradere, tum ferreis cauterijs labia sectionis exurere, ita ut caluā ne attingamus, id quod etiā in alijs diuturnis affectionibus fieri debet. Postea medicamenta ad nomas descripta adhibenda sunt. Quale est siccum ex charta usta præparatū, & pastillus ē lana succida, ac reliqua huiusmodi. Lenticulam quoq; coctā, cum malicorio aut oliuæ folijs imponemus. Sedata aut nomas curatio reliquis ulceribus cōmunis fiat. At uero incipientibus fauis commoda hæc sunt. Sulphur & ordeï farinā aqua mulsā coctā imposito. Aut adipis suilli, terebinthinæ, & mellis pares portiones ad congruam cōpagem coctas adhibeto. At ubi aperti fuerint, sulphure uiuo cū pice liquida utitor. Aut erui farinā cum melle impone. Aut squamæ æris, pollinis thuris, passarum uuarum, pares portiones simul tritas adhibe. Ad ampliores aut fauos siccos probe tritas apponito. Ego uero lenticulā coctam, cum malicorio ac melle subactam imponere soleo, & si inflammatio adsit, modicū panis adijcō. Sedata uero inflammatione, malagma Helladicū, aut emplastrū melinum Serapionis, aut Passionis, aut Venus appellatum, adhibeo. Molliora aut adhibēda medicamēta esse oportet, propter molestias ex duris oboriētes: Si itaq; durius fuerit, cū oleo emolliendū erit.

Emplastra ad cruenta uulnera glutinanda, & ad multos usus commoda.

Cap. XII

Atractylis quam aliqui Androsēmon uocant, herba est aculeata, humorem sanguineū reddens, si folia eius cōprimantur. Hanc radicitus euulsam et in umbra siccata terito, & angustissimo cribro excernito, & de ea accipito trientem, colophoniam sesquilibram, olei dulcis trientē, æruginis sextantem, cerā bessem. Oleum cerā & colophoniam liquefacito & excolato, deinde æruginē, & postea herbā tritam ac cribratā adijcito, tum omnia simul in frigida aquā coniecta manibus subigito, & in eadem frigida per totā noctem finito, ac deinceps ad cruenta uulnera in quacūq; corporis parte reponito, siue in infantibus, siue in adultis fuerint. Facit & ad ulcera antiqua, sectiones, ictus, sugillata, & ex frigore dolores. Exterit crustas & cetera quæ in ulceribus difficulter repurgantur. Lepras itē ac uirilignes curat. Etenim fœmur cuiusdam ense dissectum, ita ut uulnus usq; ad inguē penitissime progrediretur, quum per quatuor menses æger decubisset, neque glutinationis initium appareret, hoc ego medicamento agglutinaui. Tibiam præterea alterius à poplite usque ad talum uulneratam, inflammatione prius mitigata, cum cataplasmate ex lomento passo, uino mulso, & rosaceo, intra paucos dies persanauit. Ego uero inquit Philagrius, cum lide emplastro

plastro antiquos sinus, nō inflammatos, & repurgatos, ac uīno mulso elotos, ad vires uidelicet excitandas, feliciter curauī. Illud uero constat fistularum sinuum p̄ ligamēta, à superiorib. partibus ad inferiores moderata constrictione ducenda esse, quo humores in cavitatibus delitescētes ad osculum ulceris exprimantur. Viride Andromachi hecatontodrachmō uocatū. Ammoniaci thymiamatis drach. viii. squamæ æris drach. xii. pollinisthuris drach. xvi. resing pinus dra. xii. adipis uituli dra. xiiii. terebinthinæ dra. viii. ceræ dra. xxx. olei dra. viii. Aceti quantū satis est. Hoc magna uulnera glutinat, sordida ulcera ex terget, crassaq̄ ipsorum labia deterit, sinus contrahit, discussoriā ac repulso riam uim habet. Et cum cerato linamentis illitum ac inditum caua ulcera incarnat. Viride quod Isis appellatur. A quibusdā Hermoni sacerdoti inscriptum. Hoc ad multos usus commodat, & ad omnia uulnera, præcipue capitis unā cū ossibus dissecatis. Sanat enim citra destructionem ac perforationem: facit etiam ad puncturas, aculeos infixos, hominum ac canum morsus. Ad uiperæ item ac scorpionis, draconisq̄ marini ac pastinacæ uenena. Et ad artuum fracturas cū uulnere. Citius enim ac securius callum obducit, facit ad fistulas omnes recentes, & antiquos ipsarum recessus, sinus, tubercula, parotidas, mammarumq̄ ac alarum abscessus, aut ut ne fiant, aut ut facti curentur, commodum saniei effluxum nobis procurantibus. Idem strumas aufert cum tunicis celerrime suppurans. fronti uero impositum fluxiones oculorum sistit. Liores delet, gangrenas obliterat, putredines repurgat. Et in summa efficax est medicamentum ad omnia. Ceræ drachm. centum, colophonix drachm. ducentas, alij centum, squamæ æris rubri, æruginis rasæ, aristolochiæ rotundæ, thuris, salis ammoniaci, ammoniaci thymiamatis, æris usti, singulorum drachmas. viii. aluminis usti drachm. vi. aloës, myrrhæ, galbani, singulorum drachmas xii. olei antiqui lib. i. uel sexuncem. Aceti quantum satis est. Atq̄ hoc quidem emplastrum absolute Isis appellatur. Verum Isis quæ Epigono inscribitur, etiam radicis dracunculi drac. viii. recipit: qua Galenus se uti dicit. Sola enim dracunculi radix per se trita ac probe trita ad puluilli formam, maligna ulcera curat. Metallica igitur cum aceto in mortario terito, & deinde reliqua trita ac cribrata adijcitur, & liquabilia liquata ad ipsa in mortarium affundito, subigito ac unito, & utitor aliquando puro, aliquando mixto ac dissoluto. Ad ulcera enim sordida adhibetur medicamenti pars una, cerati uero rosacei liquidi partes duæ. Verum ad ea quæ modica extersione opus habent, medicamenti pars una, cerati partibus tribus ammiscetur. Emplastrum Machæionis celebre, & ad multa commodū. Congruit ad relata omnia. Sed et recentia uulnera glutinat, & ab inflammatione tutatur, & præsertim quæ contusa sunt, facit & ad canis rabidi morsum spatiofiore loco impositum, & assidue permutatum, facit ad omnem nomen ac ulcera depascētia, et ad aurium ac pudendorum ulcera. In ossib. autē denudatis carnem auget. Cōpetit et nariū ulceribus. Diluitur autē rosaceo. Aristolochiæ rotundæ, galbani, æruginis rasæ, opopanax, iridis syllyricæ, ammoniaci thymiamatis, myrrhæ, singul. drach. viii. terebinthinæ, ceræ, olei omphacini, singulorum septuncem et uncia dimidiū. Olei dimidiū cū ærugine terito, et reliquū cū cera ac terebinthina cogito, opopanax autē cū aceto dissoluit, et simul subigito, oīa ac unito. Emplastrum Cephalicum ex herbis, sine perforatione: squamas disteparat, & ossa corrupta educit. Verum ossibus præralis adhibere oportet. Idem ad recētia uulnera facit, & nomas linamentis indita repurgat. Cum rosaceo uero cerato replet, una eius parte, ad duas cerati ammixta: facit et ad carcinomata ac putrida

ac putrida ulcera. Exterit lepras, furunculos dissoluit, strumas suppurat, et expurgat, conuenit podagricis, et tophaceas ipsorum duricias dissoluit. Anagallidis caeruleum florem habentis, papaueris corniculati, foliorum tenerorum hyoscyami, marrubij uiridis, singulorum drachm. LVI. squamæ aeris rubri drachmas XXXV. mannæ thuris drachmas XX. resinæ pinus sicca drachmas XVI. aloës drachmas VI. aluminis scissi, & rotundi, ammoniaci thymiamatis, salis ammoniaci, singulorum drachmas quatuor, ceræ drachm. centum, olei ueteris heminas duas siue uncias XXXIII. Aceti quantum satis est. Herbarum folia in pila leuiter tundito, ut succus non exprimatur, deinde in mortarium coniecta minutissime terito. Et in alio mortario, squamam, pollinem thuris, resinam pinus, alumen, aloën, salem, & ammoniacum thymiamatis, ad solem ad frigmentitiâ spissitudinem cum aceto terito, & ammixtis herbis omnia simul terito. Li quabilia deinde liquata frige facta, ac crasa adijcito, subigito simul ac uitior.

Emplastrum Hestia, id est, Vesta appellatum, quod etiam ex græci nominis *ἑστια* literarum calculo, drachmarum DXXVI. inscribitur, & ad Nechepsonem regem refertur. Conducit ad omne uulnere genus. Ad neruorum puncturas per se sufficit omnem, oculorū destillationem pro glutinamento appositū reprimat. Venenū uirus ei aculantū bestiarū exugit, ita ut emplastro adhærēs cōperiatur. Nomas item et fistulas ac ulcera maligna repurgat et ad cicatricē perducit. Narium ozenas sanat cum aceto, facit et ad strumas, & tumores induratos. Aut enim discutit ipsos, aut rumpit, ut admireris. Varices sanat, sagittas et aculeos extrahit. Spumæ argenti, ceræ, singulorum drachm. LXXXIII. terebinthinae dra. XVI. Aristolochiæ, propolis, galbani, singul. drac. XXX. æruginis dra. X. gallarum, radicis chamæleonis nigri, singul. dra. XXXIII. olei sextar. III. adipis uiculinæ dra. XLVIII. aceti dra. XXXIII. succi brassicæ dra. VIII. serapiadis triticularis dra. XVI. succi medullæ arundinū drac. XII. oleum, spumâ argenti, & adipē simul coquito donec probe uniantur. Deinde cerā, resinam, galbanum, propolim prius cū modica cera in mortario tusam adijcito, & ab igne ablatis aristolochiam, gallam, radicem chamæleonis addito. Aeruginē uero cum succis et aceto trita reliquis, ubi iam tepuerint, postremum ammisceto, omnia simul in mortarium cōiecta subigito ac manibus emollito. Et utere tanq̃ admittido. Aliud ad cruenta uulnera glutināda, purpura inscriptū. Spumæ argenti, olei dulcis, sing. lib. II. picis, ceræ, colophonæ, sing. unc. XVI. radicis symphyti minutissime trita ac cribrata sextantē, sanguinis draconis sextantē, aquæ marinæ unc. XX. oleum, spumâ argenti, et aquâ marinā simul cogito, donec non amplius inquinant. Deinde liquabilia liquefacta adijcito, et ab igne ablatis draconis sanguinē ac symphytū addito, et perfrigerata manib. subigito, ac in massam efformato. Cæterum sanguis draconis in India ex herba dracunculo appellata colligitur. Phoenicinum. Galeni. Spumæ argenti leuissime trita tres bras tres, adipis suilli insulsi antiqui libras duas, olei antiquissimi libras tres, chalcitidis crudæ trientem, Spumam argenti tritam ac cribratam, rursus cum chalcitide in moriario exquisitissime conteres. Deinde oleum in sole ammisceris, ut liquidum medicamentum permaneat. Tum adipem exemptis fibris in mortario tusum, quo facile liquecat, ad ignē liquefacito, et excolato donec purissimus euadat. Atq̃ eius ita preparati lib. II. in mortario diligenter cū cæteris permisceto. Deinde omnia simul in cacabum transfusa coquito, ac palmæ ligno agitato. Sufficiet autem tibi ramus unus magnus, ut crassiore eius parte ad agitationem spatulæ uice utaris. Adhærentes autem crassæ eius parti ramulos

utrinque exortos refecabis, et cortice detrahes, et in tenues partes concisos in medicamentum coniicies, ut ibi succus ipsorum excoquat. Hac uero segmenta palmę, tum demum iniicies, ubi medicamentum cerato simile compage habuerit. Si enim a principio inieceris, succus per decoctionem consumetur, quę ob uim adstrictorię permanere uolumus. Sed & ipsius spathę qua pharmacum uersa pars infima in coctura arefacta, refecanda ac abijcienda est, ac residua utendum, atque hoc sepe faciendum est, ubi fuerit resiccata. Vbi uero pharmacum non amplius inquinari, priusquam exarescat ab igne tollatur, & exemptis omnibus rami segmentis agitetur donec frigeat. Deinde in mortarium translatum, ac manibus subactum, in massam redigatur. Hoc ad cruenta uulnera, & ulcera ægre cicatricem accipientia utimur, & oleo dilutum in sinus fundimus. Conuenit partibus omnibus inflammatis et podagris, quo tempore dolores non uehementer urgent, et irrigationibus ac fomentis mitigantibus opus est, facit ad inguinum tumores, tubercula, ambusta, perniones, contusa, fracta, & omnes fluidas affectiones. At uero si chalcididis sexuncem inieceris, longe efficacius fiet ad ampla uulnera glutinanda, & ad cicatricem inducendam. Sed non ita inflammatis conueniet. In dissolutione uero pharmaco hanc proportionem seruabis, ut sit medicamentum paululum olei quantitatem excedat, præsertim æstatis tempore, ut sit medicamenti quidam dextans, olei uero dodrans. Emplastrum duplicis coloris. Aeris uisti quadrantem, aluminis scissi unc. i, colophonię, adipis suilli recentis, cerę, singulorum lib. i, aceti quantum satis est. Emplastrum ex aqua & oleo. Spumę argenti, olei sinceri, aque purę, singul. lib. ii. Argenti spumę cum oleo et aqua in mortario exquisitissime terito, deinde ad prunas assidue uersata coquito, donec non amplius inquinetur. Hoc moderate refrigerat, et ideo partibus ulceratis nihil influere sinis, et quod iam influxit, repellit. Desiccatur etiam ac discutitur et ulcera ad cicatricem perducit. Utimur eo ad mulierum, infantium, eunuchorum, ac cetera corpora, quę molles ac albas carnes habent. Efficatur autem adeo glutinosum, ut ne ablutum quidem detergi possit. Sed ulceribus cicatrice includendis præcipue commodum est, ut adhibitur multis diebus, adhæreat. Cuius facultatis est et parhygrum appellatum, et reliqua huiusmodi. Emplastrum ex uino & oleo. Spumę argenti lib. i. uini et olei, singulorum lib. iii. Spumę argenti in mortario sub caniculę ardore per dies quindecim cum uino antiquo dulci terito, tantum uini instillando, quantum exficari potest. Et post prædictos dies oleum ac uinum affundito, & coquito simul assidue agitando, donec non amplius inquinetur, & utitur. Hoc ego medicamentum oleo dilutum ad ulceratas affectiones adhibui, & sinus glutinaui. Et foemur diu induratum persanaui, & optimum etiam ad uulnera cruenta cognoui. Ad sinus uero & duricias solidum prout habet imposui. Emplastrum ex aceto et oleo. Spumę argenti lib. i. olei antiquissimi lib. iii, aceti albi acerrimi lib. iii. Ad lentum ignem assiduo uersatu coquito, obseruas ne in grumos coeant, et per in tegrum diem ebullire sinito, donec nigrescat ac splendeat medicamentum. Enitendum est autem ut reuera non inquinetur, facile enim imperitis imponitur. Nam in frigidam aquam diffusum, durissimum statim euadit. Sed postea digitis diutius subactum remollescit, languetque ac rursus inquinatur. Proinde non prius ab igne remouebis, donec coeptum habueris, non amplius inquinatur. Habet hoc summas exsiccandi vires, et ideo cruenta uulnera glutinat. Ulcera curatu difficilia, et fistulas incipientes sanat. Ego enim cum eo fistulam pueri a parotide exortam sanaui, quę semestris existens usque ad mandibulę articulationem progressa fuerat. Sed et mulieres & adolescentulos eodem curauimus et induratos musculos emolliuimus. Tribus autem diebus transactis soluere hoc

AA

oportet,

oportet, & nouum adhibere, idē rursus post triduum exoluere. Emplastrū Galeni fuluum, Harmonia appellatum, supra ad maligna ulcera descripsi-
mus. Emplastrū fuluum Piscatoris. Ad cruenta uulnera, sinus glutinat, infla-
mationes sedat, duricias ac strumas discutit, plurimo rosaceo dilutū caua ulcera
replet, fordida extergit, et ad cicatricē perducit. Spumæ argenti sesquiblib, ceræ
lib. ii, galbani, œsypi, terebinthinæ, propolis, pollinis thuris, rubricæ, singul. sex
tantē, olei lib. ii, aceti lib. iiii. Spumā argenti ad æstiuū solem cū aceto terito, quā-
tum imbibere potest. Deinde oleo ac reliquo aceto affusis simul coquito donec
nō amplius inquinēt, tū liquabilia liquata et excolata inijcitur, et postea ab igne
ablatis pollinē thuris, rubricæ, ac galbanū ex aceto tritū adjicito, oīa cū simul subi-
gito. Et demū frige facta ac erasa manibus mollito ac utitor. Hoc ad sinus gluti-
nandos efficacissimū est. Ita ut spongia ex uino expressa superimponat. Aliud
fuluū piscatoris, facit ad cruenta uulnera et cōcisos neruos. Itē ad antiqua egere
cipientia cicatricē ac fluida ulcera, probe etiā emollit, præsertim duricias circa
māmas exortas. Utimur eo & ad hominū & canū morsus. Egregie facit et ad
pasticarū marinarū, & draconū, et aliorū horrendorū piscium plagas. Et in
summa est cōpositio admirāda: Spumæ argenti, ceræ, singul. dra. centum, tere-
binthinæ, mannæ thuris, galbani, rubricæ sinopice, singul. dra. viii. olei lib. ii.
præpara sicut diximus, absq; tamen aceto. Aliud piscatoris celebre. Spumæ
argenti, ceræ, singul. dra. centū, terebinthinæ, myrrhæ, minij sinopici, æruginis
rasæ, squamæ aris, singul. dra. viii. aristolochiæ dra. viii. thuris drac. xxv. di-
phrygis drac. vi. ammoniaci thymiamatis, galbani, singul. dra. xii. olei lib. ii.
Aliud Tyrium. Ad ampla uulnera & quadrupedum morsus, furunculos di-
scutit aut rumpit, humorē ex crustis ductis extrahit, & ad cicatricē ducit, frō-
ti impositum oculorum fluxiones reprimat. Hoc post cocturā purpuræ tyriz
colorē habet, atq; hinc appellationē traxit. Spumæ argenti, lib. v. aris ustis, squa-
mæ aris, æruginis, galbani, singul. trientē, ceræ lib. ii. resinę pinus pinguis lib.
iii. olei lib. vi. Spumam argenti et oleū in mortario simul probe trita, in ollam
coniecta coquito, et assidue uersato donec mellis compagem acquirant. De in-
de adiecta ærugine et squama ebullire finito, & postea æs ustū addito, & simul
coquito donec bonus color euadat, et nō amplius inquinent: tunc ceram ac re-
sinā excolata adjicito, ac rursus coquito donec non inquinent, & postremū ab
igne ablatis galbanum ammisceto, manibusq; probe subigito ac utitor. Em-
plastrum ex anemona. Colophoniæ drach. lxxiiii. resinę pinus liquida,
ceræ singul. trientem, olei dodrantem, florum anemones recentium, exempto
nigro quod in eis reperitur, et recisis unguibus bessellem. Colophoniam cum o-
leo ad lignorum pini ignem coquito, et tæda cea spathula usq; ad solidam com-
pagem agitato, deinde resinam adjicito ac rursus coquito, donec non amplius
inquinent, & postea ceram addito, qua liquefacta medicamentum ab igne to-
lito, et ad flores in mortario tritas diffundito, manibusq; oleo illitis subigito. Est
enim glutinosum. Aquā autem uitare oportet, facit ad cruenta uulnera, et car-
nes cōtusas, ad maligna antiqua exuberantia ac ægre cicatricē admittentia ulce-
ra. Ad uenenū eiacularium bestiarū ictus. Ad tumidos, inflāmatos, dolentes ac
ægre mobiles articulos. Ad strumas, fistulas, gāglia, steatomata, furunculos, si-
nus, nomas, abscessus tū aliarum partiū, tum maxime thoracis. Ad eruptionem
sanguinis narium spleniū ex eodē stomacho imponitur, potest et ad frontē im-
poni. Et in summa, mollit, discutit, cōtrahit, siccatur, ac dolorē mitigat. Quod si cū
aceto preparare malueris hoc medicamētum, ita facito, flores anemones recillas
ungul.

unguibus purgatos, & ad solē siccatos, in uitreo uase seruato, & eorū postea bessem sumito, & aceti albi acerrimi heminas atticas tres affundito, ac per diem ac noctem macerato, deinde manibus subigito, paulatimq; omnem succum exprimito. Et colophoniam lucidissimam drach. xlii, resinam pinus liquide, ceram, olei, singulorum trientem, succi anemones heminas Atticas duas et dimidiam, accipito. Et colophoniam cum oleo ad tædæ lignorum ignem lentum coquito, tædacea q; spatula assidue agitato, donec solidius pharmacū euaserit. Deinde resinā paulatim adijcito, ne ebulliens extra ollam redundet, & rursus bullire finito, & ubi iam planē solidū uideris, cerā addito, ea q; liquata medicamentū ab igne ablatū spatula uersato, atq; ubi iam deferbuit, succū paulatim instillato, diligenter obseruando ne effuerescat. Facile enim ebullit, ut periculū sit ne superfundat. Postq; aut ita paulatim ammixtus fuerit, uarium purpureū ac suauem colorē pharmaco asfricat. Omni igitur succo iniecto ac unito, medicamentū in mortariū transferat, atq; frige factū manibus subigatur, donec totus succus secedat. Hoc ad eadē commodū est, ad quē illud prius recētū florū pharmacū cōducit. Nisi quod leuius est ac magis tēperatū, & ad canū morsus, ac uenenatorū ictus cōmodū. Idē rosaceo dilutū ad ani ac pudendorum ulcera cōducit, ubi remissiore medicamento opus habent.

Emplastra Cephalica, & ad fracturas, & ad multa com-
moda, & de iusto eorum usu. Cap. XIII.

Cephalica, hoc est, capitalia, emplastra dici solent, quæ uulneribus capitis adhibita, uim penetrandi in altū habent, squamasq; ac ramenta ossium disparata, non solum in capite, sed etiam reliquo corpore educunt ac extrahunt. Itaq; acrimoniam quandam ipsis insitam esse oportet, per quā ex profundo extrahunt ad superficiem externam, nō solum ossa, sed multo magis crassum uiscosum, aut omnino uitiosum humorem. Quæ uero ad fracturas hunt, exterioriā ac discussoriam uim habent. Quidā uero etiam adstringentia ipsis ammiscuerunt, ut quod ad affectas partes influit repellatur, & exterioriorū uis usq; ad profundū deducatur. Verum hoc nosse expedit, quod si adstringētia nō ad lanuginē minutissimā trita fuerint, atq; hoc cū aceto, damnum magis quā utilitatem afferent, si attractiōis fuerint ammixta. Sed & hoc scire oportet, quod inter emplastra ad fracturas præstantiora sunt, quæ capitalia inscribunt. Et propterea cū cerato præsertim rosaceo, incarnare solent, linamenti excepta ac indita. Eiusdē porro generis cū cephalicis est līs quoq; superius descriptū emplastrū, & quod Macharionī inscribitur, & Barbarū Heræ Cappadocis, quod aliqui Aphrū appellant, hoc. Emplastrum nigrū, ad insigniores præsertim capitis dissectiones, fistulas, sinus, fracturas citra inflammationē glutinandas, ad neruos, cartilagines, ac ossa cōcisa. Facit & ad ulcera profunda, sinusq; magnos glutinat. Adhibetur etiā cōmode abscessibus dissecis ad saniei educationem. Splenicis etiā ac hepaticis cōducit. Et est ad cruenta efficacissimū uulnera. Ad sanguinē reſcientes duobus corijs inducitur, quorū alterū pectori ac costis imponitur, alterū dorso. Sanguinē enim supra opinione consistit. Facit & ad hominū ac canū morsus. Et omnino inflammationes arceat. Ceram, picis, bituminis, resinam pinus, singul. lib. i. mannae thuris sexuncē, cerusam, atramenti futorij, singulorū trientē, opopanax sextantē, olei, aceti, singulorum lib. i. Cerā, bitumen, oleū, acetū, modico ex eo relicto, omnia simul in ollā nouā indito ac liquefacito, deinde picem & resinā probe cōtusa adijcito, & omnibus semitocotis, & ab igne remotis ac excolatis, atramentū futorij modico aceto residuo tritū inspergito, & ne effuerescat caueto, atq; iterū leniter coquito ac uersato. Vbi uero non amplius inquinat pharmacū, opopanax residuo aceto maceratur ac

dissolutū affundito. Et postea cerusam ac mannā probe trita inspergito, et paululum tepescacito ut uniantur, cauens ne opopanax aut manna cōburatur. Acq̃ ita medicamentū in mortariū diffundito, ac frigesieris inito, emollito, reponito, ac utitor. Hoc omnia uulneraria medicamēta superat, uelut experimēto constat. Est aut̃ hyeme per septem dies, æstate per quinq̃, aut re ita urgente per tres exoluendum. Nigrum insigne ad multa commodum Panalethes appellatū. Olei dulcis dodrantem, bituminis, ceræ, resinæ pinus siccæ, picis, singul. lib. i. spumę argenti, cerusæ, eruginis, singul. drach. x. ammoniaci thymiamatis, thuris, aloës, myrrhæ, singulorum drach. viii. opij, succi malorum mandragoræ, singulorum drach. vi. aluminis scissi, atramenti sutorij, chalcitidis, croci, singul. drach. iiii. acetū quantum satis est. Omnia spuma argenti usq̃ ad crocum probe ad strigmentitiam spissitudinem terito. Deinde oleum, & bitumen ad fabarum magnitudinem contusum, et ceram simul liquefacito, eisq̃ liquatis picem ac resinam adijcito. Et hæc liquata ac excolata rursus coquito, & trita adijcito, subigito ac utitor, facit hoc ad uulnera recentia, ad ensium, sagittarum ac lancearum puncturas, ad fracturas item ac contusiones, siue cum uulnere, siue sine uulnere fuerint. Vtere et ad neruos uulneratos, ad canum, luporum, urforum, leonum, aprorū morsus, facit et ad uenenum eiacularum et præferrim uiperarum ictus, loco prius scarificato, et inde medicamento impolito. Idem apponitur ad abscessus simplici sectione diductos, & sanie exclusa. Vulnera ac ulcera repurgat. Et quosdā uertebri ac talis fauciatos persanauit. Ego uero manū alicuius ense inter uulnam et radium uulneratam eo curauit. Confert & ad scrotum concisum, & ad hepatis ac splenis inflāmatōes ex febris obortas. Duobus item corijs illitum, ut alterum pectori, alterum dorso imponatur, sanguinis reiectionem sistit. Ad inflāmatōes autem irrigatiōis uice adhiberi potest, ita ut accipiat de eo quadrans, ceræ uero et resinæ frictæ ac picis, singul. sextans & olei lib. i. Hæc liquentur ac colentur, & cum medicamento, ac farina ordecæ quadrante cum aceto trito imponentur. Sic etiam flagellatis conducit.

Aegyptium Andromachi celebre, ad sinus maximos glutinandos, ad ossa carne nudata ac concisa, ad detortos ac luxatos articulos, ad abscessus, ad hominum quadrupedum ac reptilium bestiarum morsus, fronti impositum oculorum fluxiones sistit, maximas ac profundissimas ensium cæsuras triduo sanat. Eximiam discutiendi uim habet, ut etiam pus, nisi ualde multum fuerit, sine cutis perforatione discutiat. Membra quomodocunque indurata emollit, & maligna ulcera ad cicatricem perducit. Cere, spumę argenti, singulorum drachmas cxliiii. ammoniaci thymiamatis drachm. lxxii. terebinthinæ drachmas xxxii. lanæ succidæ ustæ drachmas xviii. aristolochiæ, thuris, squamæ æris, singulorum drachmas viii. squamæ ferri stomomatis drach. viii. myrrhæ drachmas iii. opopanax drachmas ii. olei cicini aut sicyonij uel antiqui lib. iii. Spumam argenti cum oleo ad compagem coquito. Deinde addita squama rursus bullire inito, donec nō inquinat. Tunc cerā primum, deinde ammoniacum tritum adijcito, & his liquatis terebinthinam addito. Et ab igne ablatis, thus tritū, et lanæ cinerem, inspergito. Et frigesacitū pharmacū manib. subigito, ac utitor aliquādo puro, aliquādo diluto. Panacea emplastrū, quod aliqui Theriū fratrum uocant, Heras Hygieā, id est, sanitatē appellat, facit ad nomas et omnia ulcera maligna. Coërcet enim nomas, neq̃ crustam inducens, neq̃ circūscissa corpora indurās, sed omne corruptū rumpēs ac tabefaciens, ut nihil differat ab uuis passis humectis. Sanguinis fluxū supprimit tū alibi, tum ex ha morrhoidib. erumpentem

erūpentē, sed et ipsas hemorrhoidas tabefacit ac cōsumit, prētereafistulas sanat,
et carbunculos, & ægilopas, et ulcera chironia appellata, & in summa totū egre
curabiliū ac diuturnorū genus, priuatim uero ad mammarū duricias, earun-
demq̃ caneros ac nomas conducit, facit et ad hydropicos splenicosq̃ ac articu-
lorum affectiones. Et ad uteri quidē affectiones oleo cyprino dilutum ac liqua-
tum inijcitur. Externis autē pręstat ita ut est imponere, uelut singula alia. Omni
uero ulceri impositū, etiam si ferum fuerit, statim ipsum mitius efficit, & dolores
itidem ac uigilias mitigat. At uero rosaceo dilutū, sinus magnos et fistulas glu-
tinat, prius elotos: Recentes autem sinus aqua multa eluere oportet, deinde ex-
terius medicamentū adhibere, et debitā ligationē facere. Ad fauos etiā inflam-
matus efficaci¹imū est. Verū Damocrates etiā ad canis rabiosi morsum, & ue-
nenum eiuculantiū bestiarū ictus, iam liuelescentes ac denigratos, & ad medica-
tas sagittas facere asserit. Spumę argenti, bituminis Iudaici, terrę ampelididis,
singul. drach. ducentas, thuris, propolis, singul. drach. L. aloës, polij, centaurij,
galbanij, aluminis scissi, singul. drach. x x v. chalcitidis, ustrę drach. x vi. chamę
pityos, symphyti, radicis chamæleonis nigri, marrubij, helenij, aristolochiæ, sin-
gulorum drach. x vi. gallarum, myrrhæ, iridis, singul. drach. x ii. terebinthinę
drach. x x v. mellis Attici unc. x x v. olei noui lib. viii. Spumam argenti, ter-
ram ampelididem, bitumen contusum, ad lentum ignem coquito, aliducq̃ uer-
sato, citissime enim exurit. Et ad strigmentī spissitudinē redactis chalcitidē in-
spergito, bullirēq̃ finito. Deinde alumen adijcito ac rursus coqto, donec nō am-
plius inquinet. In alio uero uase galbanū, propolim, et terebinthinā cū melle li-
quefacta habeto, et medicamentū ab igne amoto, hæc ammisceto, et his pbe uni-
tis arida trita adijcito, oīaq̃ simul subigito, et in uase pelle cooperto reponito, ac
utitor tanq̃ admirādo. Poteris etiā Archigenis nigro emplastro uti, qđ inter or-
thopnoica medicamenta sermōe octauo habet. Nigrū Icesij. Ad omne ulcus re-
cens ac uetus. Ad cōtusa, luxata, fracta, ad inflammationem et omnem dolorem.
Statim em̃ a dolore liberat, facit ad canū ac hominū morsus, ad furunculos & du-
ricias, præsertim mamarū, ad tubercula sedis, ad hydropē, et quę discuti oportet.
Est enim attractoriū ac glutinatoriū. Vlcera maligna, strumas, parotidas, per-
niones, panos, clauos, nigredines, impetigines, fistulas, et hæmorrhoidas inflā-
mas sanat, aculeos & infixā extrahit, facit et ad uenenatorum ictus, & qua-
drupedum morsus. Spumę argenti, bituminis, terrę ampelididis, singul. drach.
ducentas, propolis, cerę, singul. drach. L. terebinthinę, galbanij, aluminis scissi,
singul. drach. x x v. chalcitidis drach. viii. myrrhæ, iridis, gallarum, singulorū
drach. x ii. Mellis lib. iii. olei omphacini recentis lib. viii. coquitur uelut pana-
cæa, & spathula tædacea assidue agitatur, ne subsideat, facillime enim comburi
tur. Nigrum Asclepiadæ. Ad ossium fracturas optimum. Hoc usus sum ad
ossium fracturas, in quibus ossa disparata uelut innatabant, quę quum ceteri
auferenda iudicarent, ita præter opinionem detinuit, ut instar calli coaluerint.
Spumę argenti drach. ccl. bituminis drach. cc. cerę, picis, singulorum drach. x x x.
c. resinę pinus drachm. L. aluminis liquidij, propolis, singulorum drach. x x x.
ammoniaci thymiamatis drach. x x iii. æruginis drachm. x. olei drach. xl v.
Spumam argenti cum oleo coquito, donec non inquinet. Deinde ceram & bi-
tumen priuatim liquato, et picem adijcito, & omnia colata ad spumam argenti
ammisceto, postea ammoniacum tritum addito, et rursus ad bonam compagē
coquito. Deinde propolim ac resinam pinus adijcito, & ab igne ablatis alumen

& æruginē minutissime trita ammisceto, postremū medicamentū in aquā aceto permixtā diffundito, manib. subigito, ac utitor. Emplastrū Athena inscriptum. Cadiniæ dra. x. x. æris usti, malicorij, gallarū aristolochiæ lōgæ ac rotundæ, salis ammoniaci, squamæ æris, nitri, aluminis scissi, aluminis rotundi, iridis, misyos, atramenti futorij, chalcitidis, æruginis, aloës, myrrhæ, thuris, ammoniaci thymiamatis, galbani, sing. dra. x. x. x. ceræ, picis, sing. dra. c. uel ut alij habent c. c. colophonix dra. c. c. c. olei sexuncem. Hoc quidē modo apud Oribasiū habetur. Asclepiades aut habet aloës drac. x. ii. myrrhæ dra. x. ii. et ammoniaci thymiamatis dra. x. v. i. Arida ad solē æstiuū sufficientib. dieb. terito & ad ea postea liquabilia liquefacta adjicito ac unito, facit ad sinus, & maxima capitis uulnera citra inflammationē glutinat. Cerato liquido dilutū per linamenta inditur, ad punctos ac uulneratos neruōs, ad musculos concisos, ad capitis ulcera, ad fistulas et ulcerum cuniculosos recessus. Ossa corrupta citra perforationē educit, facit ad nomas, putredines, canceratas affectiones, inguinum, alarū, ac colligrēdines, et ad ulcera ægre recipientia cicatricem. Et omnino uires siccandi habet, quas laudes Asclepiades ipsi adscripsit. Nigrū ex salicibus, celebre & ad multa commodū, facit ad cruenta uulnera, ad resolutos articulos, ad fistulas, ad dore flaccidas carnes cōstringit, erysipelata et alias affectiones citra ossiū fracturam obortas sanat, pectori ac dorso adhibitū sanguinis reiectionē, tabidosq; ac pectorē suppuratos curat. Misyos, chalcitidis, æruginis, cerussæ, gallarū, aluminis scissi & rotundi, melanteriæ sing. sexuncē, malicorij sexuncem, atramenti futorij sexuncem, ceræ, resinæ pinus, picis, bituminis, foliorū salicis uiridiū, olei singul. lib. ii. olei rosacei trientē. Aceti sextarij dimidiū uel quantū satis est, folia salicis cū aceto ad tertias decoquito, deinde folijs cōtritīs ac humore expresso, primū æruginem, cerussam, & melanteriā leuissime trita, & deinde etiā reliqua trita ammisceto. Et postremū liquabilia liquata affundito, frigefacito, subigito, eradito, ac utitor. Aliud ē salicibus à Critone ad Herodotū relātū. Melanteriæ, gallarū, aluminis scissi & rotundi, singul. sexuncē, ceræ, bituminis, picis siccæ, resinæ pinus, foliorū salicis, singul. lib. ii. olei lib. ii. acetī sextarij dimidiū, præparata uelut dictū est. Aliud ē succo salicis, ex Oribasio. Hoc Magnus inquit, inuenit ad destillationes. Salicis folia uiridia ad solē terito, postea in ollam nouā cū sufficiente uino mittito, & apposito operculo ad lentū ignē coquito, & excolato, abiectisq; folijs expressis succū adseruato, postea uero sumito colophonigunc. x. x. iii. olei sextantē, succi lib. i. Et colophonigū percolatā cum oleo, ad lentum ignē coquito, donec in aquā diffusa et manib. subacta nō amplius inquit, Deinde ceræ unc. x. x. iii. ammisceto, eaq; liquata, ollaq; ab igne amota succū salicis adjicito. Vinum uidelicet in quo folia cocta sunt, paulatim instillando ut ne effuerescat, et rursus ad mitissimū ignē decoquito donec medicamentū rederit. Et deinde in mortariū transfusum eodē succo infuso, manibus diligētissime subigito. Emplastrum Cyzicenum appellatum, facit ad recentia ac uetera uulnera et ulcera cuniculosa. Duricias præsertim māmārū diffundit, attrahit, repurgat, replet, glutinat, cicatricē inducit, facit & ad cāceratas duricias ac fistulas, & ubi scalpellū admoueri nō potest, uelut in collo, collyriū ex hoc medicamento inditur. Idē minātes fieri abscessus mitigat, tubercula diffundit, ganglia et collectiones fastigiāt ac rumpit. Sagittas, & ossa, & aculeos, & infixā extrahit, crustas citra molestiā exterit. Verū in ulcerib. cuniculosis magnis splenis utendum est. Discutit etiā strumias, et ad uesicæ affectiones egregie facit, pectini impositū sanguinis eruptionē, uel ut alij habent, hæmorrhoidas suppressit, thoracē & dorso

& dorso adhibitum tabidis confert: Thuris, myrrhe, croci, iridis, bdellij, atramē
tisutorij, propolis, aloës, chalcitidis, misyos crudi, aluminis scissi et rotundi, radicis
panacis, malicorij, ammoniaci thymiamatis, uisci, opopanacis, æruginis, acacie
florū rosarum, sing. dra. vii. æris uisti dra. xxi. Alij pro ære, squamæ æris
tantundem adijciunt, aristolochiæ, gallarum, sing. dra. xvi. terebinthinæ dra.
cxl. cerae unc. xxxii. adipis uitulini unc. xxxii. Aceti aut uini antiqui
sextarium. Si itaq; pharmacū acre & discussorium habere malueris, acetum eli-
gito: sin adstringens ac repulsiuū, uinum accipito. Arida et quæ ad succorum
naturam accedunt cum uino aut aceto terito. Deinde ad cerā cum adipe liqua-
tam, ac excolatā, terebinthinā adijcito, simulq; ad cōpagem coquito, postea pro-
polim ac uiscum addito, et spatula uersato, et ad hæc dissoluta, arida antea trita
paulatim adijcito, ac fortiter agitato. Et postremū in mortariū trāsata manib. su-
bigito ac unito. Ego uero neq; acetū, neq; uinū adhibeo, sed arida omnia solū
cōtero et adijcio. Nā si uinum aut acetū aut aqua ammixta fuerit, ad cōpagem
nō peruenit. Emplastrū Moschionis. Ad uulnera recētia ac cōcisos neruos, et
dissectiōes cum cōtusione, facit et ad fracturas cum uulnere. Nā & uulnera sa-
nat, et ossibus callum obducit, cū debita deligatione impositū, facit & ad incho-
antem hydropē, et testes contusos. Arefacit etiā eminentias sedis. Curat rimas
butyro dilutū, & gutturis tumores sanat; dissoluit oēm duriciē, facit ad articulos
luxatos ac distortos. Callosas manuum ac pedū eminentias, quas clauos appel-
lamus, aufert citra exulcerationem. Et est omnino pharmacū ad multa commo-
dum, præparatur sic. Spumæ argenti, picis sicca, adipis uitulini, sing. unc. xx.
terebinthinæ, mannæ thuris, singulorum dextantem, ceræ quincuncem, ærugi-
nis, opopanacis, galbani, singulorum unc. i. picis liquidæ selibram, acetū succi sy-
comororum, olei cicini, uel sycionij, uel antiqui, singulorum heminā unam, id
est, libram i. Spumam argenti cum oleo coquito, & ubi ebullierit adipem adijci-
to, & assidue agitato, & ubi compagem acceperint, cerā, picem, ac resinam ad-
ijcito, & coquito donec non amplius inquinent. Deinde succum sycomororū,
et picem liquidam seorsim cocta, & ad compagem redacta ammisceto, & gal-
banū, ac æruginē, et mannā thuris inspergito, postremū opopanacē aceto disso-
lutum addito. Et ad ignem admota rursus coquito, donec nō amplius inquinēt.
Atq; ita præparatum medicamentū in uinum transerto, & per triduum finito,
postea uero manib. emollito, ac utitor. Oportet aut post impositum medicamē-
tum, fasciā uino imbuta exprimere, et circumdare. Cæterū quod statim subijciā
succum sycomororū nō habet. Est aut medicamentū ad ossium fracturas cōmo-
dū. Ad cruenta uulnera, ad sinus glutinādos, et præsertim capiti aptū. Spumæ ar-
gēti, adipis taurini, picis sicce, sing. unc. xx. uel ut alij habēt xvi. olei cicini aut
sycionij aut antiqui, dextantem, pollinis thuris, terebinthinæ, sing. bessē; ceræ
trientē, opopanacis, æruginis, galbani, sing. unc. i. uisci sex uncē. Spumā argen-
ti cum oleo et adipe ad bonā cōpagem coquito. Deinde cerā picē ac resinā ad-
ijcito, et mox ab igne tollito, atq; ubi paululū frigefacta fuerint, reliqua cū ace-
to trita paulatim adijcito, ne efferuescāt, et rursus ad prunas admota sensim co-
quito, donec non amplius inquinent. Et demum manibus emollito, ac utitor.
Emplastrum insigne, ingentes sinus ac fistulas sanās, aculeos & sagittas extra-
hens, inflammationes ac duricias dissoluens. Coxendicum item ac renum af-
fectionib. cōmodum est. Spumæ argenti dextantē, olei unc. xv. picis sicce, co-
lophonis, sing. unc. xvi. adipis taurini tantundem, misyos, iridis, calcis uiuæ,
singul. quadrantem, atramenti futorij sesquiunciam. Spumam argenti cum
AA 4 oleo

oleo ad bonam compagem coquito. Deinde liquabilibus liquatis ac excolatis adiectis, rursus paulatim coquito, donec non inquinetur. Et postea paululum frigefacta ad reliqua in mortario cum aceto trita ammisceto. Emplastrum theriaca appellatum, ex centauryo, quod laudat Oribasius, facit ad nervorum ac musculorum vulnera et puncturas. Ad ferarum & canis rabiosi morsus. Glutinat sinus antiquos, & ad cicatricem perducit, praecipue vero ad reptilium ictus facit. Genuum ulcera fluida et aegre curabilia sanat. Spumae argenti sex uncem, olei antiqui trientem, resinae pinus siccae drachm. xxii. ammoniaci thymiamatis, propolis, thuris, singul. drachm. xii. cerussae drachm. viii. aeruginis, squamae aeris, galbani, aristolochiae rotundae, centauryi, singulorum drachm. iiii. thuris, aloes, tridis, gallarum, chalcitidis, singulorum drachm. iiii. Spumam argenti cum oleo ad moderatam compagem coquito. Deinde squamam, aeruginem, cerussam, et chalcitidem adijcito, et ubi non amplius inquinant, propolim, ammoniacum ac galbanum in mortario prius dissoluta addito. Et ab igne ablatis ac aliquantulum frigefactis, reliqua arida minutissime trita ammisceto. Et iam plane frigefacta manibus emollito. Aliud ex dictamno. Cuius admiranda vis est. Ad nervos, musculos ac chartilagineas coctas. Ulcera quoque antiqua ac aegre curabilia sanat, ossa corrupta, aculeos, et infixa extrahit. Habet vim discussoriam, facit ad capitis dolores. Reprimit oculorum fluxiones. Est & malagma pleuritidis commodum hepaticis, cum emplastro ex siccis parato, facit ad omnium venenum ciculatum reptilium plagas. Spumae argenti drachm. c. colophoniae drachm. l. cere drachmas xxv. ammoniaci thymiamatis aristolochiae, singulorum drachmas xvi. mannae thuris, galbani, singulorum drachmas xii. aeris usti, aeruginis, dictamni, aloes, propolis, singulorum drachmas viii. diphrygis, squamae aeris, radicis gentianae, singulorum drachmas vi. olei antiqui lib. ii. Heras autem dictamni & aristolochiae, singulorum drachmas x. coniicit, ammoniaci vero solum drachmas xvi. In reliquis consentit. Hoc praeparatur uelut emplastrum Piscatoris, aut Tyrium, quae supra retulimus. Verum eius meminisse convenit, herbas non nisi ablato ab igne pharmaco, minutissime tritas immittendas esse. Sed & Democrates in ceteris similis, dictamni drachmas x. diphrygis vero viii. recipit, et ad mammarum, colli ac spinae ulcera convenire asserit quantumvis fuerint diuturna.

Emplastra emollientia ac discussoria, ad multa commoda.

Cap. xiiii

Emplastrum Nigrum Asclepiadis, Achillae inscriptum. Mammarum duricias, & testium inflammationes discutit. Hoc medicamentum discussoria uel omnibus alijs praestat, & ad multa commodum est. Locus autem prius ablendus est. Deinde medicamentum adhibendum. Spumae argenti libras sex, picis brutiae libras quatuor, bituminis, resinae pinus siccae, singulorum libras vi. terrae ampelidis lib. ii. cere lib. iiii. thuris seculibrā, aluminis scissi, aloes, myrrhae, singul. trientem, olei omphacini antiquissimi lib. viii. succi serapiadis lib. vi. aceti quantum satis est, praepara uelut panacaeam. Nigrum est lolio Heras, facit ad fistulas, alarumque ac inguinum abscessus, ut nihil abscindere opus sit per chirurgiam, sed tantum perforatione facta ac sanie exclusa, medicamentum imponere. Illinendum est autem duobus corijs, altero iuxta alterum locato, neque humor de splenis detergendus est. Imbibitur enim & fortius fit medicamentum, picis libras duas, resinae pinus siccae dodrantem, cere tyrrhenicae, cere pontice, singulorum quadrantem, Olei antiqui quincuncem, liquabi-

huius excolati lib.ii, postea coquito uelut dictum est. Emplastrum ex ptisana, scenigræci, seminis lini, ptisanæ, singulorum unc.i, meliloti, radicis altheæ, singulorum sextantem. Hæc probe mundata ac lota per biduum in aqua madefacito ac coquito, donec succum reddiderint. Et eius excolati lib.ii, sumito, et olei antiqui lib.iiii, ac simul coquito, donec oleum solum restiterit, & huic postea taurini adipis sexuncem ammisceto, colophonix tantundem, galbani unc.i, ceræ lib.i. Hoc ungento quopiam dissolutum, etiā laxandi uim habet.

Emplastrum ex psyllio, Spumæ argenti lib.iiii, olei dulcis lib.vii, ceræ lib.i, resina pinus lib.vii, succi psyllij lib.iii. Succum uero ita parabis, psyllij quadrantem in aquæ sextarijs quinque madefacies, deinde coques, et excolatum succum rursus cum oleo et spuma argenti ad bonam compagē decoques, & liquabilia liquata adijcies. Hoc ad omnes induratas inflammationes utiliter adhibetur. Aliud ē psyllio simplicius, inflammationibus, intertriginibus, papularum eruptionibus, tuberculis ac podagris cōmodū. Spumæ argenti, cerussæ, singul. sextantem, ceræ sexuncem, olei rosacei lib.i, succi psyllij lib.iii, præpara & utere crudo. Non enim coquitur. Aliud ē psyllio simplicius, Ad inflammationes podagricas in ipsa præsertim exacerbatione commodum, psyllij trictem in duobus aquæ sextarijs madefacito, ac coquito, & excolato succum, eiq; ceræ sexuncem, olei lib.i, ammisceto. Emplastrum ex Serapiade. Ad tubercula, papulas, & intertrigines. Spumæ argenti lib.i, olei lib.ii, succi serapiadis tritescularis lib.iii, Spumæ argenti cum oleo & succo ad bonā compagem decoque ac utere. Psittaciū, foliorum hyoscyami uiridium, colophonix, ceræ, adipis porcini, singul. sexuncem. Ad folia trita affundito liquefacta, ac utitor. Emplastrum ex Althea, Polletis, Corticem radicis altheæ herba uigente in pila contundito, deinde in aneum aut fictile uas trāslatum, uino albo ueteri odorato ac adstrigente respergito, ut solum humectetur. Deinde tegito ac per triduum finito. Quarta die rursus in pila tundito, & succum fortiter exprimito. Et accipito colophonix uncias xxiiii, ceræ trictem, olei, æruginis, singulorum sextantem, Succi heminas Atticas, ii, præparatur aut hoc modo, colophoniam oleo liquatam ac colatam, ad lentum lignorum pini ignem coquito, & tædacea spathula agitato, donec in aquam instillata solidior euadat, deinde ceram adijcito, eaq; liquefacta ollam ab igne tollito, & ubi frigefacta fuerint, succum paulatim affundito, ac caueto ne efferuescat, facile enim ebullit ut super effundatur, postquam autem conlitterit, rursus igni adhibeto, & ubi incaluerint, æruginem injicito, & ablata ab igne frigefacito, ac manibus subigito, ut probe uniantur, facit hoc ad noua & antiqua ulcera, ad ferarum ac canum morsus. Virus enim ab ulcere extrahit, panos & strumas aut discutit, aut suppurat, aut rumpit, aut materiam ad superficiem euocat, uelut in sugillatis, ac in uaporem diffundit. Sedat dolores, scabiem ac scabros ungues, lepramq; ac utiligines extemit, nec soluedum est in his ante septimum diem. Aculeos & infixos extrahit, podagricas inflammationes in ipsa exacerbatione mitigat, tumores articularum ac ganglionem sanat. Splenis duriciam mollit, caneros non ulceratos lenit, imminuetq; erosionem cōpescit, pello exceptum ac subditū menses ducit, peccuni impositū calculos pellit, urinæ difficultatem corrigit. Aluū suppressam laxat. Rosaceo dilutū plātarū rimas sanat, ulcera testium ac pudendorū repurgat et incarnat. Et si absq; æruginē præparet serpētia ulcera sistit. Ossū fracturis prodest irrigatio uice adhibitu, Dolores em̄ sedat, fit etiā ex florib; altheæ rosaceis

efficacissimum pharmacū hoc modo, flores illi resectis unguibus tunduntur & ad puluillū rediguntur. Et eius sumūt partes xii. colophonīae partes xxxvi. ceræ partes vi. olei partes ii. Oīa simul uelut dixi preparata manib. probe subigito ac utitor, priore cōmodius est, et dolores amplius mitīgat. Emplastrum ex semine lini, Polletis: facit ad pectoris affectiones, Neruolarum partium inflammationes discutit, ac dolorē mitīgat, facit ad exacerbationes podagricas, et contractos articulos relaxat. Seminis lini partes ii. farinæ ordeaceæ partes iii. colophonīae partes iii. ceræ partes iii. resinæ pinus liquidæ, uel cupressi, si haberi potest, partes ii. seminis thlaspios partem unam, florum chamæmeli, pilularum cupressi clausurarum, singulorum partem unam, olei partes duas. Ceram & colophoniam cum oleo ad prunas liquefacito, & allidue uersato, & ab igne ablatis cupressi pilulas tritas & cribratas adijcito, ac caueto ne effuerescant. Deinde farinam, semen lini, resinam liquidam addito, & rursus ad ignem adhibeto, & paulatim donec uniantur coquito, postea procul ab igne chamæmelum et thlaspim inspergito. Et tandem medicamentum in mortarium frigidum semiplenum coniectum diligenter manibus subigito. Emplastrum Elephantinum. De Elephantino Polles libro secundo. Id ego inquit, prius inueneram, sed postea longo usu ductus immutauī, & quum facilius meliusq; ac fortius cognouerim, in hunc secundum librum retuli. Dorycnij siue solani uescarij dextantem, radicis mandragoræ bessēm, radicis panacis sexuncem, colophonīae sextantē, resinæ pinus liquidæ trientem, opopanacis sextantem, ceræ, terebinthinæ, singul. lib. i. bdellij unc. xx. aceti lib. i. uel amplius. Quidam etiam am potamogitonis unc. xx. adijciunt. Verū descriptio non habet. Aliud Elephantinum, facit ad contractos articulos, mollit ac discutit, podagricorum callosas concretiones, et in ossium fracturis inductos callos dissoluit, panos, strumas, & quamlibet duriciam emollit. Quod si experiri libuerit, eboris aut cornu segmentum ex eo illinito, & ad dies triginta aut quadraginta alligatum finito, & deinde soluito. Et non reperis eboris aut cornu naturam, sed aliud quid, quod commode flecti possit, paratur autem sic. Corticis radicis dorycnij aut solani uescarij uiuentis siue in umbra siccati, corticis radicis mandragoræ, singulorum bessēm, radicis panacis sexuncem, opopanacis bessēm, potamogitonis uiridis, bdellij, resinæ pinus liquidæ, singulorum uncias xx. terebinthinæ lib. i. ceræ sextantem, aceti albi bessēm, Mandragoræ ac solani cortices uiuentes quidem, in pila tundito, et postea in mortario terito: siccos uero cum panacis radice terito ac cribrato, similiter etiam bdellium terito, ac potamogitonem, omniaq; simul in mortario mixta terito, aceto paulatim instillato. Et liquefactis quæ liquari debēt, excolatisq; ac ad probam cōpagem coctis, & ad trita ammixtis, medicamentū frigefactū manibus subigito, et in fictili uase aceto affuso seruato, et ne transpiret probe cooperito. Emplastrū ex herba sacra siue uerbenaca, Polletis. Verbenacæ rectæ in uigore cū radice euulsæ ac exsiccata, tuseq; ac cribratæ sexuncem, colophonīæ lib. i. ceræ trientem, olei sextantē. Liquabilia liquefacito, colato, et ad bonā cōpagem coquito, et adiecta uerbenaca subigito ac utitor, facit ad omnē capitis dolorē, ad hemicranē, ad oculorū fluxiones, ad dentium dolores extrā adhibitū. Ad scorpionū ictus. Ad neruofarū partiū inflammationes, et omnino impositum partes à fluxione tutatur. Emplastrum Geraanium, Polletis: facit ad laxatos ac crassos neruos resolutionis periculum expectantes. Ad oēs fluxiōes, tumidosq; ac inflammatos articulos, ad gāglia, streatomata, atheromata, strumas, panos, et quæcūq; molliri, attenuari, rūpi, ac extergi debent.

debent. Ramenta statuae aereae, ex assidua olei illitione sordidae ac aeruginosae lib. II, ceree lib. II, sandycis, sandarachae, terebinthinae, singulorum lib. I. Quod si statuae ramenta sicciora fuerint, terebinthinae lib. II, accipito, & cum his omnibus gruis pennas unito, Hoc modo, Gruis pennas omnes in ollam nouam conijcito ac operito argillaque oblinito, et in fornacem mittito. Eamque ubi tota exteriorius ignitam uideris extrahito, ac frigefieri sinito. Ea deinde aperta penas uilas eximito ac terito, & longo tempore antea paratos asservato, & medicamentum postea sic preparato. Cerae ac resinae liquatis ac excolatis, sandicem & sandaracham minutissime tritas adijcito, & uersato donec omnia fuerint probe mixta, & postea ab igne ablatis pennarum cinerem ammisceto, ac simul subigito, frigefacta autem aliquatenus medicamento statuae aeruginem cum modico aceto tritam adijcito, atque in mortario probe unito, subigito, ac utitor. Emplastrum ex buglossio, Polletis. Buglossum herbam cum radice euulsam, & in umbra siccata, terito ac cribrato, & sumito eius partes IIII, colophoniam, resinae pinus liquidae, cerae, singulorum partes VIII, olei partes V. Colophoniam cum oleo ad lentum ignem coquito, ac spatula agitato, ubi uero durior apparuerit, resinam liquida adijcito, ac rursus coquito, donec non amplius inquinat, & postea ceram adijcito. At ubi ab igne amoueris, cribratam herbam addito, et medicamentum in mortarium aqua semiplenum infundito, ac manibus subigito. Facit ad omnes inflammationes, strumas, parotidas, panos, plagas, collusiones. Ad antiqua & maligna ulcera, ad uulneratos nervos, sinus, nomas, fistulas. Repurgat, mollit, contrahit, attenuat, & quaedam discutit, quaedam rumpit, replet, et ad cicatricem perducit. Dolores ulcerum ueterum ac recentium statim sedat, & liuida abolet. Ego uero in buglossae defectu nycteridem herbam, ab aliquibus unguentum Helenes appellatam, ad coxendicum affectiones adhibui, & bene successit. Emplastrum ex achate lapide, Polletis. Lapides achates appellatos, leoninae pelli colore similes, in fornacem fabrillem mittito, & aggestis carbonibus ualde sufflato, & ubi ignitos lapides uideris forcipe extrahito, refrigeratosque terito ac arctissimo cribro excutito. Deinde accipito colophoniam drachmas XLVIII, resinae pinus, cerae, singulorum bessum, olei trientem, achatum lapidum ustorum quincuncem. Colophoniam cum oleo liquatam coquito donec non amplius inquinat, deinde ceram ac resinam prius liquata & excolata adijcito, & his unitis lapidum cinerem addito, ac rursus ad moderatam compagem coquito: postea medicamentum in frigidam aquam missum frigefieri sinito, & manibus subactum in massam cogito. Vt hoc ad scorpionum, uiperarum, & uenenum eiaculantium bestiarum ictus, facit ad tumores aegre concoctiles ac sanabiles, ad induratos tumores, ad liuida. Erit cem suppurandi uim habet: Strumas aut discutit, aut concoquit & rumpit. Erit autem efficacius ad strumas, si capparis folia uiridia, aut corticem eiusdem probe tritum, ad emplastrum calefactum ac remollitum ammiscueris. Emplastrum parhygrum, facit ad inflammationes ad duriciam quandam inclinantes. Adipis porcini a fibris depurati uncias XLIII, cerae uncias XXIII, spumae argenti, cerussae, singulorum sexuncem. Liquida cum aridis permisceto. Manebit quidem hoc pharmacum aliquandiu liquidius, sed postea ad bonam compagem perueniet. Emplastrum e buccinis. Hoc Xenocrates malleoli abscessum suppuratum iam discussit. Inflammationes autem induratas, praeteritum parotidas priusquam in pus transmutentur, mirifice dissoluit. Spumae argenti dra. CC, ceree dra. LII, olei antiqui lib. III, cerussae dra. VIII, terebinthinae dra. LII, bucci-

buccinorum ustorum dra. x. thuris drac. x. i. x. aque sextarium. Spumã argenti & cerussam minutissimè trita rursus cum aqua terito, & iterum cum oleo, & ex mortario in ollam translata lento igne coquito, assidueq; uersato ne subsideant, deinde ceram, & mox thus ac terebinthinam adijcito, & ad bonam compagem, non tamen multam duriciam coquito. Postremum cinerem buccinorum addito, & paululum feruere finito, & medicamentum ab igne tollito, & in mortariũ aqua humectũ effundito, & diu manibus subigito, ut glutinosum euadat: nam temporis progressu durius propter buccina efficitur. Emplastrum Dionysia appellatum. Inflammationes & abscessus mammarũ præsertim discutit: omnem enim humore per cæcos meatus diffundit. Sed & duricias ac parotidas dissoluit: Cere, terebinthinæ, spumæ nitrì, olei antiqui, singulorũ sex uncem, misyos crudi un. i. aquæ coactiliariorũ quantum sufficit, Spumam nitrì et misy cum aqua terito, & cum oleo coquito, deinde ceram, mox terebinthinam adijcito, & ebullire finito, donec non amplius inquinent, non tamen nimis solida euadant, & sublatum ab igne medicamentũ in mortarium aqua humectũ diffundito, manibus subigito, ac utitor. Hæc dionysia inter attractoria emplastra rectè descripta habetur, eaq; utaris uelut isthuc descripta est. Emplastrum è saponè, discussoriorum præcipuũ ad furunculos. Adipis porcini, picis, ceræ, saponis nigri, æquales portiones liquatas excolato ac utitor: discutit etiã hydrophas. Aliud, ad furunculos, parotidas & panos, olei antiqui, ceræ, saponis, nitrì, lixiũ, æquales portiones. Cerã cum oleo liquefacito, nitrũ uero cum lixiũ in mortario terito, & deinde saponẽ simul cõterito, & in ollam cõiecta paulatim coquito ad moderatã compagem, & utitor. Emplastrũ ex Heliotropio. Facit ad percussã, collisã, luxatã, uulsã, ruptã, stilorũ ac similiarum rerum puncturas, ad dolores in profundo. Nervos ab ictu aut frigore crassificados, aut aliter affectos curat, firmat, & dolore liberat. Viceribus antiquis, & uulnerib; recentibus confert. Aduersus medicatas sagittas loco affectio imponitur. Ad digitos confusos, etiamsi ossiculum collisum sit, ab inflammatione tutatur, & dolorẽ eximit. Maturat, suppurat, discutit, cõtrahit, glutinat, repurgat, incarnat, cavitates replet, & ad cicatricẽ perducit. Heliotropiũ herbam tria grana habentẽ, in autumno totam cum radice euulsam et in umbra siccata terito, ac cribrato, & eius accipito trientẽ, colophonix splendidissimẽ unc. x. l. viii. resinẽ pinus aut cupressi liquidã bessẽ, cerẽ bessẽ, olei trientẽ. Resinã, oleum, cerã, simul liquefacito: deinde herba adiecta ad lentũ ignem coquito, & tædacea spathula agitato, donec bonã compagẽ acquisierit medicamentũ, & in frigidã diffusum subigito ac utitor. Strumas & duricias suppurat, rumpit, siccatur, incarnat, ad cicatricem ducit, & dolorẽ sedat. Emplastrũ Mnaseæ, secundũ mollientium ordinis. Spumæ argenti, adipis porcini, olei, æquales partes simul decoque, donec non amplius inquinant, & si fortius medicamentũ efficere uolueris, adipẽ & oleum utrunq; uetus accipito: uetustiora em efficacius reddunt medicamentũ. Quod si magis emolliens esse uolueris, oleũ minues, & adipẽ augebis. Si uero magis discussoriũ, adipi detrahe, & oleo adde. Quidã cum oleo & adipe radicis altheæ cõtusæ sesquialibrã coquunt, donec torrefiat, eaq; abiecta, in oleo ac adipe colatis spumã argenti coquunt, sicut diximus. Atq; sic quidẽ Galenus. Mnaseas aut sic. Spumæ argenti, ceræ, passi, colophonix, olei axungix, sing. lib. i. oleũ et spumam argenti coquito, donec nõ inquinant, & cerã, colophonix, axungia, liquatas & excolatas adijcito, ac rursus ad bonã compagẽ coquito: deinde passum affundito, ac fortiter agitato. Et sublatum ab igne pharmacũ sub canis æstu info-

BB lato,

lato, & quotidie cum spathula uersato, donec ad debitā soliditatem perueniat. Emplastrū Helladicum mollitorium. Ammoniāci thymīamatis, spumae argenti, cerusae, olei antiqui, resinae pinus, cerae, sing. lib. i. thuris sex uncē, galbani sextantem, castorij lib. ii. propolis, opopanacis, ling. lib. i. aceti quantum satis est. Oleum, spumā argenti & cerussam simul coquito, & medio cocturae tempore ammoniacū tritum adijcito, & ebullire sinito, donec non amplius inquinat, deinde liquabilibus additis ac probe ammixtis, thus & castoriū minutissimē trita addito. Et postremū opopanacem aceto dissolutū affundito, & perfrigeratū pharmacū manibus subigito ac utitor. Discutit abscessus etiā in pus transmutatos. Aliud, emolliens ac discutiens abscessus, Spumae argenti sex uncē, cerussae sequiunciam, cerae trientē, ammoniaci thymīamatis sextantē, galbani, myrrhae, thuris, singulorū trientem, olei lib. i. oleum spumam argenti & cerussam coquito donec non amplius inquinat, deinde ammoniacū, mox ceram et thus ac galbanum adijcito, & ab igne ablatis myrrham addito, subigito ac utitor. Aliud. Discutiens abscessus, & iam ruptos expurgans ac sanans. Facit & ad capitis lentes. Colophonīae sex uncē, ammoniaci thymīamatis sextantē, mastiches un. i. cerae un. i. galbani scrup. iiii. opopanacis scrup. iiii. aeruginis scrup. iiii. resinae pinus lignosae, olei, singulorum trientem. Aliud ē tritici polline. Facit ad abscessus & furunculos, ad herniam aquosam & intestinorum, post chirurgiā inflammationibus sedatis. Cerae, pollinis tritici, resinae liquidā, singulorū sex uncem, ammoniaci thymīamatis quadrantem, olei trientem. Aceti aut uini quantum satis est. Pollinē pridie in aceto aut uino subiges. Sequēti die liquans his quae liquari debent, fermentatū pollinē probe subactū in mortario ammiscuis, & uteris. Aliud ē fermento. Saponis, sandarachae, singul. sextantē, sceni graeci un. i. resinae pinus lib. i. colophonīae, cerae singul. sex uncem, fermenti sex uncem. Fermentū aqua dilutū cum liquabilibus liquefactis miscuis, & terenda trita adijcias, omniaq; simul subiges, ac uteris. Hoc discutiendi ac rumpendi uim habet. Aliud ē Masticha. Colophonīae lib. i. cerae sex uncem, ammoniaci thymīamatis trientem, mastiches, galbani, terebinthinā, singul. sextantem, omnia liquefacito ac excolato, & in frigidā coiecta emollito ac utitor. Aliud trium specierum appellatū. Ceram, colophonīā, terebinthinā liquidā, paribus portionibus simul liquefacito, et in frigidā mittito, subigito ac utitor. Hoc sicut etiā quod proximē praecedit, ossa capitis denudata incarnat, & squamas citra molestiā disparat, & solū absq; alterius usu ad cicatricē perducit. Quod si mastichen pari portione adijcias, ad ossiū fracturas admirandū euadet. Emplastrū Iudaei. Colophonīae lib. i. mastiches un. i. olei trientē, omnia simul liquefacta in frigidam mittito, & post ruptos abscessus utitor, ita ut nihil reseces, neq; limum indas, sed solum medicamento cauitatem expleas. Ex eodem etiā emplastrum adhibeto, citissimē repurgat ac praeter ceteris incarnat. Postquā autem ulcus explanatū fuerit, ad cicatricem inducendam alio medicamento opus est. Nam hoc superuacua carnem efficeret. Emplastrū reipublicae praesidis. Resinae quae in uasculis ac lagunculis ligneis affertur, excolatē lib. i. cerae quadrantem, mastiches tantundem, olei à Martyreo uel aliunde allati sesquiunciam, oleū cum resina liquefacito, centaurijq; uiridis si haberi potest, sin minus, arido fasciculo agitato, & his excolatis reliqua ammisceto, ac manibus subigito. Quidam centaurij sicci un. i. adijciūt: inter liquandū uero & dum agitas, haec uerba insuurrato. Deus Abraam, deus Isaac, deus Iacob, huic pharmaco uires largiatur. Hoc sinus & fistulas glutinat, ægilopas siccatur. Et si centaurium receperit, duricias

cias ac strumas inchoantes emollit. Emplastrum Mutum appellatum. Ammoniaci thymiamatis, galbani, opopanax, singulorum unc. i. mastiches, ceræ, colophoniar, singulorum sexuncem, aquæ marinæ quantum satis est. Aliud. Hoc ad ossium fracturas inflammationibus sedatis facit. Optimè cicatricem inducit. Colophoniar, resinæ pinus, singulorum lib. i. ceræ sexuncem. Omnia in ollam feruidæ aquæ missa liquato ac excolato, deinde in frigidam transfusa emollito, & in massam cogito, ac utitor. Aliud, mirificè molliens. Facit ad stomachi duriciam ac frigidos affectus. Colophoniar puræ sextantem, ceræ albæ trientem, mastiches puræ unc. i. olei cyathū i. Omnia simul liquata ad probam compagem coquito. Emplastrū Pyxis inscriptum. Confert ad omnes inflammationes, præsertim pedum: egregiè enim emollit. Ceræ, colophoniar, singul. sexuncem, succi seminis lini trientem, adipis porcini sextantē, terebinthinæ quadrantē, & uncia dimidiū, olei omphacini dextantem, ammoniaci thymiamatis un. i. thuris quadrantē, lactis bubuli trientē, & uncia dimidiū, ouorū candida nouem. Ammoniacū & thus cum lacte, succo, & ouis terito, & reliquis liquefactis ammisceto. Aliud è melle, molli ac discutit. Spumæ argenti, olei, singul. libr. ii. colophoniar, ceræ, axungia, mellis, singul. unc. xx. spumā argenti cum oleo & axungia coquito, donec non amplius inquinant: deinde reliqua liquata adjicito, & ab igne ablatis mel affundito, & frigescit medicamentum manibus emollito. Melinum Serapionis vulnerarium, ad multa cōmodum. Omnes duricias dissoluit, abscessus discutit, humores per occultos meatus diffundit. Sinus glutinat, spicula, ossa corrupta & aculeos extrahit. Rosaceo dilutum caua ulcera replet. Sedat etiam inflāmata. Hoc præceptor Lucius utebatur, atq; ipsum dupliciter præparabat, modò glutinosum, modò solidius efficiens: collyria enim ex solidiore formabat, & filum innecebat, & sic ad usum paratos habebat, ac in sinus fistulosos indebat, filo foras propendente ad cōmodiorem extractionem: quæ enim sine filo induntur, quum duriora sint sæpe franguntur, & priuatim abscessus efficiunt. Spumæ argenti drach. c. iiii. colophoniar drach. lxxiii. ceræ drach. xlviii. ammoniaci thymiamatis dra. xxiiii. æruginis, myrrhæ, galbani, singul. drach. xx. olei ætate un. xv. hyeme xviii. spumam argenti cum oleo ad lentum ignem coquito, & ab igne ablatis æruginē inijcito, ac ne effervescat caueto, & rursus coquito donec non inquinant, & ad coronei mali colorē perueniant. Deinde ceram ac resinā liquefactas ac excolatas addito, & ubi parum ebullierint, ammoniacum leuissimè tritum & aqua aut aceto dilutū ammisceto, & mox galbanū tritum addito, & tandē ab igne amotis myrrhā inspergito. Melinū Pasionis Athanasia inscriptū. Ad ueteres sinus, etiam si usq; ad uacua perforati fuerint. Idem puerorū strumas recentes discutit. Facit & ad articulos distortos ac lances, sicut Heras & Galenus testantur. Spumæ argenti, resinæ pinus sicce, singulorum drach. c. ceræ drach. xii. s. Olei, uini ueteris odorati adstringentis, singulorum heminæ dimidiū. Spumam argenti cum uino ad solem æstiuum pluribus diebus terito, donec fuerit exiccata, & postea cum oleo ad lentum ignem coquito, donec non amplius inquinat. Postea ceram ac resinam adjicito, præparato, ac utitor. Emplastrum Venus appellatum, ad multa cōmodum. Omnem duriciam dissoluit, strumas discutit, spicula & aculos extrahit. Ad uenenū ei aculantū bestiarū morsus mirificè cōmodum. Fistulas & sinus glutinat. Podagricis per exacerbationū interualla utiliter imponitur, & coxendici diuturnæ medei, spumæ argenti un. xxv. ammoniaci thymiamatis dextantē, colo-

BB 2 pho-

phonie tin, xv i. æruginis, galbani, sing, sextantē, bdellij, opopanacis, sing, quadrantem, myrrhæ, aristolochiæ, sin, un, i, olei antiqui lib, ii. Oleum cum spuma argenti coquito, & in medio cocturæ tempore ærugine adijcito, & donec non inquinent bullire finito, deinde colophoniam liquatā & excolatā addito, & ab igne ablatis, aristolochiā ac myrrhā aceto trita, cum galbano, bdellio, ac opopanace ammisceto, & in mortariū transfusa subigito, unito ac utitor. Aliud emplastrum Venus appellatū. Facit ad eadem uelut præcedens, & est ad podagras per exacerbationū interualla ualde insigne. Olei antiqui lib, ii, spumæ argenti lib, ii, ammoniaci thymiamatis lib, i, ceræ un, x xii, colophonie dodrantē, galbani, æruginis, singul, quadrantem, resinæ pinus un, x vi, myrrhæ trientē, præpara uelut dictū est. Emplastrū Panacæa, emolliens ac discussoriū. Ceræ bellem, colophonie, terebinthine, sing, lib, i, ammoniaci thymiamatis sex uncem, galbani, opopanacis, pollinis thuris, olei, sing, un, i, uini quantū satis est. Emplastrum e rumice, ad multa commodum, abscessus discutit ac rumpit, strumas mollit, Cere, resine, adipis porcini, soliorū rumicis uiridium probē coctusorum, spumæ nitri, ammoniaci thymiamatis, sin, lib, i, præpara, & usus tempore cum oleo antiquo emolli ac utere. Emplastrū e perna. Omnem duriciā, strumas, ganglia, meliceridas, & reliqua huiusmodi dissoluit, sinus glutinat. Facit ad furunculos, abscessus, neruorū per cōsensum affectiones, confert pleuritis, coxendicumq; ac articularū affectionibus. Pinguedinis suillæ e perna antiquissima, spumæ argenti, sin, lib, ii, resinæ pinus lib, i, ammoniaci thymiamatis, quadrantem, galbani, thuris, euphorbij, sin, un, i, pinguedo uero de perna sic paranda est: Pernam suā antiquā in olla fictili cum aqua præsertim marina coquito, & eius iusculi excolati ac refrigerati pinguedinē concretā, tum superstantē, tum subsidentē accipito, & expurgatā ad medicamentū præparationē asservato. Cum hac itaq; liquata spumā argenti ab lentū ignem coquito, donec nō amplius inquinat, deinde ammoniacū adijcito tritum, & postea resinam excolatā, & thus minutissimē tritum: his uero unitis galbanum præmolitū addito, et sublato ab igne medicamento euphorbiū ammisceto, ac utitor. Emplastrū e perna, Galeni. Callosas instar tophorū concreciones dissoluit. Pinguedinis pernae suillæ præparate, uelut dictū est, lib, i, ammoniaci thymiamatis, casei bubuli aut caprini uetustissimi, adipis taurini, apochymatis, hoc est, resinæ cum cera ex nauijjs derafæ, sing, lib, i, medullæ ceruinæ bellem, cæsyi quadrantē, opopanacis unc, i, olei cyprini sexuncē, uini quantū satis est: cætera liquato ac excolato. Caseum uero cum uino terito ac liquefactis adijcito, præparato, & in mortariomanibus emollito. Emplastrum Mollitorium Lucij præceptoris, ad distortos articulos inscriptum. Facit ad abscessus profundos, neruos & articulos contractos. Prodest opisthotonicis neruorum per cōsensum affectionibus, eximit lassitudinē oleo cyprino aut irino, aut laurino dilutū. Item ad duricias diuturnas ac ægrè curabiles. Bdellij, adipis uitulini, ammoniaci thymiamatis, iridis Illyricæ, sin, dra, x vi, opopanacis dra, l, galbani, canchryos, styracis, thuris, sing, dra, v iii, piperis grana CLX, ceræ, terebinthinæ, singul, sexuncē, olei irini æstate quidem sextantē, hyeme uero quadrantē, uini quantū satis est. Ceram cum oleo liquefacito. & ammoniacū, bdellium, ac thus trita ammisceto. Et si thus ægrè teri possit, uino madefactū conterat: & his omnibus probē unitis terebinthinā ac styracē addito, deinde ab igne ablatis, iridē, canchry, & piper minutissimē trita adijcito, & postremū opopanacē uino dissolutū affundito, & probe subigito. Hoc medicamentū supremi ordinis est emollientiū: nec facile repetas

rias quod magis induratas partes molliat, ac duriciā discutiāt. Emplastrum ē
 psyllio, experimento cōstans. Strumas resiccat ac discutit, furunculos dissolvit,
 inguinū ac alarum abscessus etiam in pus transmutatos discutit, sinus glutinat,
 ganglia diffundit, clauos in manibus ac pedibus exterit, carbunculos sanat, ui-
 tiligines emendat. Radicis althææ tritæ cribratæ un. i. psyllij triti cribrati sextan-
 tem, stercoreis columbini minutissimē triti, axungia veteris purgatæ, singulorū
 quadrantem. Picis sicca lib. i. mastiches nigrae Aethiopicae quadrantem, aut si
 haberi non potest, Chia tantundē, quæ liquari possunt liquato, & ab igne amo-
 tis arida ammisceto, et frige factū medicamentū probē manibus subigito, atq;
 usus tempore chartæ aut corio inducito. Mollitorium ex ruta. Articulus ma-
 nus contractos mirificē emollit, Ceræ trientem, terebinthinæ sextantē, gal-
 bani, opopanax, cœsyi, castorij, sing. un. i. euphorbij trientem, rutæ sextantē.
 Liqueabilia liquefacto, & euphorbiū, castorium, singula seorsim trita, cum opo-
 panace ac rutæ folijs in mortario contritis simul subigito, & ad liquefacta am-
 misceto. Aliud emolliens. Strumas, parotidas, furunculos, panos ac melice-
 ridas dissolvit. Ladani mollis, bdellij Scythici resinosi, propolis recentis ac mol-
 lis, ammoniaci thymiamatis, terebinthinæ, æquales portiones præpara & ute-
 re. Aliud molliens ac discutiens. Facit ad strumas, parotidas, meliceridas,
 itemq; atheromata. Utimur eo etiā ad uasorum dilatationem. Spumæ argenti
 drach. c. colophonix, adipis caprini, singul. drach. lxx. ceræ, rubricæ, uisci,
 singul. drach. xl. lapidis pyritæ drach. xvi. picis drach. xiiii. calcis uiuæ
 marmoracæ drach. xxxii. galbani, ammoniaci thymiamatis, bdellij, singul.
 drach. xvi. cerussæ, aloës, myrrhae, bituminis, mannæ thuris, dictamni, singu-
 lorum drach. xii. olei antiqui lib. iii. spumæ argenti, oleum, cerussam, adipem,
 simul ad bonam compagem coquito; deinde ammoniacū et bdellium trita ad-
 jicio, & his liquatis primum uiscum, deinde lapidem pyriten, ac calcem, & cæ-
 tera sicca trita addito, & omnia unita, frige facta, manibus subigito, ac utitor.
 Aliud, abscessus ac strumas discutiens. Candidum canis simum terebinthina
 excipe, ac utere. Aliud. Sedat inflammata, strumas, hernias carnosas, &
 omnem duriciam emollit. Caricarum pinguium, nitri tosti, seminis nasturtij,
 singulorum æquales partes cum melle emplastri forma excipito, ac emollito.
 Emplastrum ē buglossō. Duricias dissolvit, Buglossi bessem, spumæ argenti
 quadrantem, ammoniaci thymiamatis sextantem, adipis porcini sexuncem.
 Olei antiqui tantundem. Emplastrum Persarum ē lapidibus, Tyrrhenicū &
 Pampathes appellatum. Vesicæ & rhenum calculos confringit impositum.
 Callos in manibus ac pedibus dissolvit: citra molestiam enim eos suppurat, &
 est post septimam tandem diem exoluendum: idem etiam in steatomatis, stru-
 mis, gutturis tumore, ganglijs, & similibus facit. Ad ægilopas & fistulas anti-
 quas, præsertim sedis, sub alis inguinum ac mammarū, uelut mysteriū diuinum
 habetur, in his autem quinta exoluendū est, & callus fistulæ derausus apparebit,
 nec desistendū est ab eius usu, donec callus penitus fuerit excisus. Facit & ad ul-
 cera maligna, & ad ungues manū ac pedum motos, ut à Deo missum putes.
 Ad herniam aquosam, hydropem, splenis tumore, corio pro tumoris magnitu-
 dine inducū imponitur. In hydrope sanè antè ab alis usq; ad inguina, po-
 sterius à ceruice usq; ad lumbos: omnem enim aquā uidebis diuino quodā my-
 sterio efferrī, eoq; uteris donec res melius habere uidebit. Ad anhelosos insu-
 per ac erecta ceruice spirantes, tabidos, & deploratos intus delitescentes absces-
 sus, pilulas cū modico melle ex eius pastillis feci, easq; uiris, mulieribus, pueris,

affundito, ac rursus ad cōpagem nō inquinantē coquito, ac mox galbanū præ-
mollitū addito, & ab igne ablatis, thuris mannā inspergito, unito, & frigefactū
medicamentū manibus subigito. Emplastrū discussoriū abscessū admiran-
dum, nulla enim ruptione abscessus facta, pus crassissimum in emplastro inue-
nitur, idq̃ detergendū est, ac medicamentū reparatum, rursus imponendū. Co-
lophonix lib. i. ceræ sesquiblibrā, olei hyeme cyathū i. æstate uero dimidiū. Ni-
tri berenicarij fului aut albi & friabilis sexuncē. Cætera liquefacito ac excola-
to, nitrum uero minutissimē tritum inspergito, & probē uersato, perfrigerataq̃
manibus emollito, & in massam cogito. Obseruandum est ne medicamentū in
aquam transfundamus: aliās enim nitrum abolebitur. Aliud. Picis sicca,
ceræ nouæ, sing. lib. ii. olei li. iiii. ad lentum ignem coquito, subigito, ac utitor.
Facit ad abscessus, strumas, fistulas, & alia huiusmodi. Aliud Oribasij. Ad
strumas, & alarum ac inguinum & colli tumores duos, Papaueris corniculati
folia cum axungia & propoli pingui terito, & imposito. Aliud ad strumas
& omnem duriciam. Verbenacæ rectæ foliorum uiridum drachm. xlii.
hyoscyami uiridis drach. c. xliiii. adipis porcini, resinæ pinus sicca drachm.
xli. picis drachm. xxi. Liqueabilia liquata ac excolata cum herbis tritis
committito. Aliud ē rumice. Foliorum rumicis, perdicij, senecionis,
resinæ pinus, singul. drachm. xlviii. foliorum hyoscyami, axungie antiquæ,
singul. drac. xcvi. galbani dra. viii. liqueabilia liquefacito ac cum herbis com-
mittito. Aliud ē rumice. Ad strumam & omnem duriciam, ad alarum ac
inguinum abscessus, ad ulcera maligna & fistulas, ad uteri strangulatus. Facit
& ad splenem induratū. Alij nucleos xv. ceræ drac. xcvi. olei drach. xcvi.
nitri Alexandrini drach. xlviii. æris usti, terebinthinæ singul. drac. xxi. iiii.
thuris drach. viii. foliorum rumicis in olla uel charta sub calenti cinere resicca-
torum drac. xlviii. Liquida cum aridis tritis committito, & in mortario sub-
igito. Alia uero in oleo fricta terantur. Aliud ē scolopendrio, philosophi.
Discutit abscessus, furunculos, & ad multa cōmodat. Colophonix lib. ii. ceræ
axungie recentis, sing. lib. i. resinæ pinus bessæ, olei sexuncem, scolopendrij
sextantem. Vini antiqui sextarios ii. pollinis tritici un. xiiii. tritici pollinem
cum uino coquito, deinde liquida affundito ac unito, & postremum scolopen-
drium addito, ac utitor. Quod si oleum reprobas, pro eo axungie sexuncem
accipito, & magis emolliet. At si oleum receperit, magis discutiet.

Cap. xv

De emplastro ex aspidibus.

Emplastrū ex aspidibus, strumas & aliās duricias discutit. Facit & ad poda-
gras per exacerbationū interualla adhibetū. Terebinthinæ, lapidis asij, bitumi-
nis, sing. dra. ccc. lx. spumę nitri, adipis uituli, cerę, baccarū lauri, ammoniaci
thymiamatis, sing. dra. ccc. xl. lapidis pyritæ, calcis uiuę, sing. dra. cxx. cinē
ris aspidum uiuarū ustarum dra. cxx. olei antiqui lib. ii. Oleū & ceram primā,
deinde bitumen tritū liquefacito, & ad hæc adipem, mox ammoniacū, & tere-
binthinam adijcito. Et his ab igne ablatis calcem, & lapidē asium ammisceto,
deinde baccas lauri & nitri spumā. Postremum aut aspidum cinerē frigefacto
medicamento inspergito, ut ne pereat, omniaq̃ simul subige ac utere. Cæterū
ad aspidū exustionē, ollam totā forinsecus argilla crassius oblinito, & ad solem
siccato. Et iniectis aspidibus ollam operito, & probē munito, duobus aut tribus
foraminibus relictis, ex quibus cognoscas ubi uapor purus exhalet. Hoc em-
plastrum oleo gleucino dilutum & illitum articulorum affectiones ac coxen-
dicum resolutiones curat, & cum laurino oleo illitum uutiligines albas exterit.

De emplastro Aniceto, Critonis.

Cap. xvi

Emplastrū Anicetum, id est, insuperabile appellatū, in multo nobis usu est. Attrahit, rumpit, expurgat, glutinat, pus per splenium educit. Collyrium ex eo in sinus inditur. Diffundit duricias, & cōtractis neruis opitulatur impositū cū tra irrigationē, ut ne perfrigerentur. Vngenti uicem explet dissolutum uelut ungentū ad lassitudines eximēdas paratū: sedat enim lassitudines in principijs morborū, & ex obscura causa obortas. Est & extremarū partium mollitorium, in magnis splenijs impositū. Glutinat etiā cruenta uulnera, post futurā, aut haemulos impositos, ita ut lintheum cōplicatum solo aceto imbutum splenio superponatur, æstate frigido, hyeme calido. Facit & ad plantarum offensas, putredinesq; ac digitorū affectiones, & ad fracturas cum uulneribus, & neq; in carnante, neq; cicatricē inducente alio utendū est, sed ipsi soli fidendū. Facit etiā ad hominum, canum ac ferarū morsus. Maxima uero eius promissio est, quod nō sinat fieri abscessus occultos in colo & membrana aluū ac intestina ambiente, si sanē non fuerint suppurati, aut si fuerint facti, quod eos attenuet, & ad intestina eorum ruptionē diuertat. Oportet autē splenium ad locū imponere, & hapsū lanæ aut lintheum superponere, aceto & oleo calido imbutū, & irrigare bis per diem. Ne solueris autē, nisi per tres aut quatuor dies. Deinde fomento ad uaporem adhibito, rursus impone. Appellationē accepit, ab admirandis ac multis operibus. Squamæ aris drac. l. viii. pyrethri, staphidis syluestris, grani cnidij, seminis sinapis, canchryos, stercoris columbini, aristolochiæ, tenuis, æruginis, misyos cyprij, seminis erucæ, cumini, sing. dra. x. vi. nitri, salis ammoniaci, sin. dra. x. x. ii. mannae thuris, baccharū lauri, iridis, sing. drac. c. x. x. aceti aceruini sextarios x. vi. caricarū decocti, cyathos v. Decoctum porrō caricarū sic paratur: Caricarum pinguium libr. v. in aquæ sextarijs vi. coquuntur ad tertias. Omnia itaq; confusa ac cribrata simul cum aceto terito sub caniculæ ferore. Vbi uero siccum & uiride euasit medicamentum, affundito caricarum decoctum ac cōmollito, & ablutum in æris rubri pyxide seruato. Vsu autem postulatante, medicamentū partem unam cum aceto ad strigmentitiā spissitudinē dilutam cum ceræ ac colophonix modico oleo liquefactarū partibus sex cōmittito, quod si durius efficere uolueris, ceræ & colophonix quatuor partes sumito. Sin mollius & magis dilutū, octo ammisceto. Idem & ad impetigines feras conuenire dicitur, si meracius adhibeatur. Aliud, discutiens abscessus. Cere, rebinthinæ, nitri, butyri, æquales portiones cōmittito. Aliud, ad abscessus. Verbenacā rectam cum nitro, sulphure, & resina liquida cōmittito ac utitor.

Emplastra ruptoria.

Cap. xvii

Emplastrū scalpelli usum explēs. Nitri li. iiii. propolis, fimi colubini, salis ammoniaci, æruginis, singul. sex uncē, aquæ marinæ aut muriæ sesquialib. olei antiqui lib. iiii. arida seorsim primū terito, deinde æruginē, nitrū, et sal, simul in mortario leuissimē cōterito, & mox affusa aqua rursus probē terito, & mox oleum quoq; ammisceto, ut strigmentitiā cōpages fiat, postea simul omnia in fictile ollā cōiecta lento igne ad aquæ cōsumptionē coquito. postremū propolim premolitā adijcito, & ablato ab igne medicamēto ac tepesacto, simū columbinū inspergito ac cōmisceto. et hoc lintheo illitū, fastigiato ac molliori abscessus loco imposito: sit autē splenij ex eo illitū minutū, & aliud amplū ipsi superponat, cui emplastrū ē succis, aut melle, aut melinū Serapionis, aut Mnafeæ, aut aliud mollitorium sit inducētū. Aliud perforās. Ceræ unc. x. vi. salis cōmunis, cerussæ, sin. dra. x. l. cineris sarmentorū uitis, harundinū græcarū uistarū, æruginis, nitri rubri,

rubri, sin. dra. x. Singulis seorsim tritis, deinde permixtis aquā affundito, & ad strigmentitiā spissitudinē conterito. Postea cerullā cū olei quincunce aliqua tenuis coquito, & deinde cerā addito, simulq; bullire finito, donec nō amplius inquināt, & ad reliqua trita ammisceto ac utitor. Aliud perforans arundines & aculeos, & quaecunq; infixā, ac in profundo herentia extrahēs, & ulcera glutinans. Bituminis, nitri, sing. dra. x. v. aristolochiae drac. xii, baccharum lauri dra. x. x. prapara & utere. Aliud. Fimi columbini, nitri, sing. dra. iiii, caricas numero vii. nitrum & fimū simul terito, & postea cū caricis cōtulis subigito, et linteo inducito, & si durius uidebitur, mel & axungia depuratā addito. Hoc eadē die dissipat ac rumpit. Oribasij ruptoriū. Picis liquide, picis sicce, propolis, portiones æquales unito & adhibeto: rumpit & ad cicatricē perducit. Aliud eiusdem, extrahit, rumpit, & glutinat. Ammoniaci thymiamatis, propolis, aluminis, singul. sextantem, thuris sesquidrachmā, galbanī, auripigmenti, sing. dra. i. Emplastrū ruptoriū. Succī ranunculi, auripigmenti, chalcitidis, lathyridis, squame aris rubri, uentriū cantharidū, sing. un. i. calcis uiuæ drac. ii, excipe cedria. Vfus tempore spleniū dimidij digiti latitudinē, & longitudine quanta uidebit, ex eo illinito ac imposito, & emplastrū ex succis emollitum superimposito. Sinatur aut ad horas iii, uel v. & caueat ne neruus, aut uena, aut arteria attingat, neue prius adhibeatur quā maturus fuerit abscessus, hoc etiam strumas rumpit. Aliud Oxynitru appellatū. Cerussę un. x. x. salis fossilis dra. vii. nitri quadrantē & semunciā, olei ueteris trientē, aceti heminā i. omnia simul coquito donec nō amplius inquinēt. Aliud sine molestia rumpēs. Cerae, nitri, singul. dodrantem & semunciā, fecis uini usta un. xiiii, auripigmenti dra. vii. olei antiqui lib. ii. liquabilia liquefacito, & ad arida trita ammisceto. Aliud ad strumas, ac omnem duriciā: aut enim discutit, aut mollit, & rumpit, purgatq; ac sanat. Succī potamogitonis, stratiotæ, ceparū acerrimarū, cerae, propolis, pollinis tritici, sing. un. x. v. fermenti acidī, serapiadis tritesticularis, singul. sexuncem, tragacanthæ, resinæ pinus, singul. quadrantem. Aliqui etiā horum sexuncē adijciunt, galbanī, opopanax, olei antiqui, singul. dodrantem. Tragacanthā in parte aliqua succorū madefacito, similiter opopanax, & galbanū seorsim madefacito ac terito, & his postea fermentū cum succis subadum ammisceto: postea oleo & resinæ liquatis & excolatis propolim emollitā adijcito, & ad hæc tritici pollinē inspergito & unito: postremū omnia in mortarium translata manib. probē subigito. Aliud, abscessus dissipans uel rumpēs. Vitru, specularis præsertim lapidis minutissimē tritū, & thus, æquis partibus cū aceto probē trita, penna illinito. Ruptoriū efficax. Bulbū Africanū, nasturtiū, nitru, fimū columbinū, ficus aceto præmaceratas, axungia depuratā, æquis portionib. omnia cū melle ad emplastri formā subigito, ac imposito pro partis ratione quā rumpi uoles. Aliud, discutiēdi ac extrahēdi uires habens. Ad strumas & gutturis tumorē mirū in modū cōmodum: olei ueteris li. iii. plumbi lib. ii. coquito simul donec nō amplius inquinēt, deinde terebinthinę, galbanī, singul. sexuncem, ammoniaci thymiamatis sextantem ammisceto ac utitor. Aliud Oribasij. Candidum canis stercus terebinthina excipe & impone.

Emplastra discussoria & attractoria.

Cap. xviii

Qui cōpositorū pharmacorū facultates descripserūt, quædā emplastra attractoria appellauerūt, sicut quædā discussoria: aliquib. uero testimoniū præbuerunt, utriusq; facultatis: sunt em̄ uicinæ inter se facultates, attractoria ex profundo, & discussoria attractorū, Nam quę attrahūt, omnino etiā discutiunt, & quę

discu-

discutiunt, etiam attrahunt. Et predominatur in discussorijs quidē medicamen-
tis facultas discussoria. In attractorijs uero attractoria: attractoria porro ex sim-
plicibus cōposita sunt, quæ uim habent humorum superfluitates ex profundo
ad cutem attrahendi. Discussoria autē ex his quæ uim habent discutiendi attra-
cta. Quo itaque emplastri forma fiat, alij spuma argenti miscetur, alij relina,
alij oleum, alij cera, alij pix: quum talia neq; discussoriam memorabilem, ne-
que attractoriā uim habeant, quemadmodū propolis, galbanum, calx, medul-
la, asiae petrae flos, spuma nitri, acetū, piper, sinapis, herba lanaria, sal cibaricus et
ammoniacus, & multa huiusmodi quæ in superiorib; Sermonibus de simplici-
bus cōmemorauimus. Cæterū aliqui adstringentia medicamenta attractorijs
ammiscuerunt, ueritū id quod fieri solet, in his quibus superflui sunt humores:
attrahunt enim aliquando plus quā cōuenit, ut ne solum ex parte quæ cura-
tur à profundo attractionem faciant, sed etiam ex omnibus circumscitis re-
latum est, attractoria & discussoria, & quæ magis quā oportet deergent om-
nia, fieri incarnantia per cerati ammixtionē. Ita ut his quæ fortia sunt, amplius,
quæ uero debilia, minus de cerato ammisceatur. Atq; hac ratione diuturna ul-
cera cicatricē respuentia, putrida & serpentina, per emplastra ex sale, ac reliqua
huiusmodi, cerato ammixto repurgantur, & cicatrice includuntur. At si me-
dicamento attractorio aut discussorio ammixtum fuerit aliquod adstringens,
eo pharmaco non est utendum ad incarnandum, eo quod facultas adstringen-
di, ad uulnera quidem glutinanda, & sinus, & ad ulcera cicatrice includenda,
utilis est, uerum inutilis ad incarnandum: cæterum emplastra attractoria ac
discussoria faciunt ad omnes panos ac inflammationes induratas, ad furuncu-
los, strumas, atheromata, hominum ferarumq; morsus, glutinant etiam sinus,
quibus asperi aut flaccidi ac marcidi calli insunt. Podagricis item ac arthriti-
cis in declinatione auxiliantur. Frigidos enim & crassos humores ab articu-
lis exungunt. Et si discussoria ac attractoria medicamenta in memoriam re-
uocaueris, tum suprà relata, tum describenda, facili fuerit eorum utilitatem ac
usum comperire. Emplastrum, ad omne panorum genus discutiendum
attrahendum, quod ab abscessu etiam in pus transmutato, citra cutis celsuram,
pus uelut per colum exugit. Desiccat etiam sinus forinsecus impositum effica-
cissimè. Radicum siccarum hyoscyami, & cucumeris syluestris, farinæ or-
dei, singulorum quincuncem. Terito & cribrato, ac hyoscyami succo aspergi-
to, & in pastillos cogito, eosq; in umbra quotidie uersando siccato, & uisus tem-
pore aqua diluito, ac crassius illinito. Ego uero inquit, etiam corticum radices
capparis drachm. ii. & succi sycamini drachm. i. si habere potui, adieci. Em-
plastrum attractorium album. Ad strumas ac parotidas & particulares ab-
scessus. Facit & ad fistulas ac ægilopas, ut citra sectionem liberet. Facit & ad
fluida ac ægrè curabilia, & ad hydropicos. Spumæ argenti, cerussæ, salis, sin-
gulorum drachmas Lxx. olei ueteris libras duas, singula seorsim trita cum
oleo in mortario subigito, tum in ollam coniecta, assiduè agitando coquito,
donec non amplius inquinent, & in mortarium translata frige factaq; probe
tundito, mollito, ac utitor. Aliud. Occultos abscessus discutiens, ac incar-
neo dilutum duricias dissoluens, uetera ac putrida ulcera repurgans ac incar-
nans. Cerussæ, ceræ, singulorum lib. ii. olei ueteris libras iii. atramenti suto-
rij, salis communis, singulorū sexuncem, nitri lib. i. Aceti quantum satis est, ce-
russam cum oleo ad bonam compagē coquito, deinde ceram adjicito, et hac li-
quata

quata ad arida trita in mortarium diffundito, & omnia probè subigito, unito, ac utitor. Aliud, attrahens, rumpens, ac cicatricem inducens. Picis siccae, picis liquidæ, propolis, æquales portiones committito ac utitor. Aliud attractorium, huic Philagrius testimonium præbet. Iridis, mannæ thuris, spumæ nitræ, pumicis, singul. drach. VIII, ammoniaci thymiamatis drach. x x v. galbani drach. v i, canchrysos dra. x i i, ceræ dra. c. olei libr. ii. æstate uero unc. x v. ceræ cum oleo liquatæ ac excolatæ, ammoniacū tritū adijcito, & eo liquato galbanū præmollitum addito, & ab igne ablata aridis minutissimè tritis ammisceto, ac simul cōmollito. Andromachi Melinum, abscessus profundos resorbet, & habet exactam ponderū proportionem. Facit ad strumas, gangliā, meliceridas, atheromata, panos, parotidas, furunculos. Perforat abscessus, fistularum callos atterit, sinus glutinat. Cerussæ, salis fossilis, olei antiqui, singul. libr. i. ceræ, colophonie, singulorum quincuncem, ammoniaci thymiamatis quadrantem, opopanax, galbani sing. unciam i. Sal tritum & cribratum ad minutissimum pulvillum redigito, deinde cum aqua marina præsertim probè subigito, & cerussam simul terito, deinde oleum affundito, & omnia probè unita ad bonā compagem coquito, & adiecto ammoniaco bullire finito, donec nō amplius inquinaent. Postremū liquabilia liquata cū galbano & opopanace madefactis ac præmollitis ammisceto. Aliud, ad strumas, gangrenas, antiqua & chironia ulcera. Spumæ argenti, olei antiqui, auripigmenti, sing. libr. i. Spumæ argenti cum oleo coquito, donec nō inquinat, & ab igne ablatis, auripigmentū cum oleo sextante tritum adijcito, & ebullire finito, donec medicamentū nigrescat, & postea in mortariū translato primū pistillo, deinde manib. us diligenter subigito ac utitor, ad strumas quidē ac duricias sincero & meraco. Ad podagras uero & ulcera cum oleo diluto, Facit & ad carbunculos. Aliud attractoriū Orisafij. Spumæ argenti, cerussæ, nitræ, ceræ colophonie, ammoniaci thymiamatis, singulorum trientē, olei ueteris lib. i i i. spumæ argenti, cerussam, nitrū, oleū, cum lixiuij ē cinere ficulneo libris duabus coquito, donec nō amplius inquinat, deinde ammoniacū tritū, postea cerā, mox colophoniam adijcito, Præstat tamen pro nitro spumæ nitræ inijcere. Aliud, ad strumas, gangliā, parotidas, mammariū abscessus, mirificè efficax: tumores enim dissolvit, et impactū humorem per ocultos meatus educit, sinus agglutināt, fistulas & agilopas citra sectionē curat. Cere, terebinthinæ, nitræ fulvi, olei ueteris sing. libr. i. aquæ heminā i. Andromachus pro aqua lixiuij ponit. Nitrū tenuissimè terito per se, & mox cū aqua, ut penitus diluat, & postea in fictili coquito, & coopertū per intervalla uersato, et post sedatum feruorē, liquabilia liquefacta affundito, assidueq; agitato donec non amplius inquinant, & in mortarium translata, frige facta probè emollito. Aliud quo Menecrates utebatur. Ad strumas ac mammariū duricias, peculiare auxiliū: tumores em̄ discutit, et ferè non rumpit, sed tenuissimas rimulas infert, per quas uelut per colum impactus humor excernitur. Sinus etiā glutinat, & ad cicatricē perducit. Ceræ, terebinthinæ, spumæ nitræ, galbani, resinæ pinus, olei antiqui, singul. libr. i. cineris quercini ac ficulnei, singulorum sextarium unum. Pendet autem cineris sextarius unc. x. Liquabilia liquata ac excolata coquito, deinde galbanum præmollitum adijcito, & ab igne ablatis cineres ammisceto, & probè subigito, & utitor, ita ut primum quinta die, postea tertia exoluas, donec tumor perforetur. Deinde uero quotidie soluas ac cures. Aliud attractorium ac discussorium efficax. Abscessuum humores citra ruptionē per cæcos meatus uelut excolat, ac diffundit. Olei antiqui unc. x x i i. ceræ albæ uncias x v. aphronitri albi quadrantem, terebinthinæ libram i. lixiuij ē cinere

cinere querneio aut ficulneo sextarium i. spumam nitri siue aphronitrum cum lixiuio per pistillum ad strigmentitiā compagem terito. Ceram uero cum oleo liquefacito, & terebinthinā ammisceto, & ab igne ablatis, assidue per uersatis ac frigefactis, spumā nitri ammisceto, subigito, ac residuū lixiuii paulatim adstil lato. Aliud Dionysia inscriptum, Herae Cappadocis, confert ad relatas affec tiones, & ad mammarū ac aliarum partium induratas inflammationes præci puum est. Ceræ, terebinthinæ, mannæ thuris, spumæ nitri albi, singul. libr. i. olei antiqui lib. ii. aquæ siue lixiuii coactiliorū sextarium i. misyos crudi se xtantem. Misy & spumam nitri cum dimidiā lixiuii parte terito. Ceræ uero cum oleo liquatæ terebinthinam adijcito, ac paulatim ad compagem coquito. Et ablatis ab igne, mannā thuris inspergito, & assidue agitando frigefacio, & ad reliqua prius trita ammisceto, residuum lixiuii paulatim instillando, do nec totum fuerit absumpsum. At ubi inflāmate discussa & dolore sublato, duricies aliqua restiterit, hoc medicamentū remouebis, & pro eo melinum, aut Venus inscriptum, aut aliud emolliens ac discutiens adhibebis. Aliud attra ctorium ac discussoriū longo usu cognitum, Colophonix lib. i. ceræ sesquiu nciā, nitri sex unc. i. Olei hyeme quidem cyathū i. estate uero dimidiū. Nitrum cum aqua, uel posca, uel aceto tritū, prout res postulat, cum liquabilibus liqua tis cōmisceto, ac manibus subigito, obseruando ne nimia aquæ copia ad nitrum affundatur, & in pistillum cogito. Facit hoc ad carbunculos, furunculos, stru mas, abscessus, fistulas, egilopas, Humorem per cæcos meatus citra ruptionem exugit, ut emplastro impactus uideatur. Emplastrum Piscatorium inscriptū. Nitri nnc. i. salis communis, cerussæ, singulorum drach. viii. propolis drach. x xiiii. galbani drach. viii. medullæ ceruinæ lib. i. olei ueteris lib. ii. aristolo chix unc. i. Erit autem medicamentum præstantius si pro oleo medulla sumatur, ut sint medullæ lib. iii. Aliud Piscatorium longo usu constans. Nitri drach. x viii. stercoris columbini, salis communis, cerussæ, singulorum drach. viii. Aristolochix rotundæ drach. x viii. propolis drach. x xiiii. galbani dra. x xiiii. medullæ taurinæ, olei antiqui, singulorum lib. iii. Cerussam, sal, ni trum, singula seorsim trita, ad emplastri cōpagem simul coquito, & postea pro polim ac galbanum adijcito, & ablatis ab igne, stercus columbinum & aristolo chiam ammisceto. Aliud. Ad strumas, & reliqua huiusmodi usu cogni tum. Ceræ libr. i. colophonix dextantem, auripigmenti, galbani, opopanax, myrrhæ, halcyonij, singul. unc. i. adarcæ sextantem, floris salis, misyos, singul. sesquiunc. i. atramenti sutorij, aluminis scissi, singul. sextantē, & scrup. vi. alu minis rotundi, aluminis liquidi, singul. un. i. & scrup. iii. sulphuris uiui sextan tem, & scrup. vi. nitri drach. x viii. salis communis drach. x li. terebinthinæ quadrantem, olei lib. i. aquæ marinæ lib. i. & sextantem. Colophoniam cum oleo dissoluito, deinde ceram, mox terebinthinam adijcito, & simul ebullire si nito, & ab igne ablata, ad arida prius seorsim, & postea simul cum aqua mari na trita ammisceto, subigito ac utitor. At uero ubi superficiem ignitam, & lo cum ruptum uideris, infra scriptum emplastrum adhibeto. Spumæ argegi, plumbaginis, singulorum lib. i. picis siccæ, galbani, chalcitidis crudæ, æruginis squamæ æris rubri, mannæ thuris, singulorum drach. x xii. salis assati, uisci, singulorum drach. l x xii. olei lib. ii. Spumam argenti, plumbaginem, chalcitidem, squamam, cum oleo coquito donec non inquinent, & ad compagem redacta fuerint. Deinde liquabilia ammisceto, simulq; paulatim bullire finito. Postea uiscum adijcito, & demum arida addito, ac frigefactum medicamentū manibus subigito, ac utitor usque ad sanationem.

Empla-

Emplastrum Nehepſonis, è cupreſſo.

Cap. XIX

Facit ad ſtrumas, tumorem gutturis, parotidas, omnem duriciam, & totum laxorum tumorum genus. Cupreſſi folia uirentia in uigore minutiffimè terito, uino inſperſo quod à uinaceis poſt primū uini collectionē exprimitur, efficitq; ſolidi ſtrigmenti craſſitudinē, ac locis affectis imponito: omnem enim tumorē diſcutit, & ſi ſtrumis impoſueris, tertiā die ſoluito, ſtrumasq; cōtractas, & uicinas ac incumbētes partes deſquamatas cōperies, eas itaq; digitis exprimito ac diſſoluito, & medicamentū ruruſus adhibeto, ac tertiā die ruruſus ſoluito, iterūq; ualidiſſimè exprimito, & tertio medicamentū adhibeto, ac ſimiliter exoluito. Intra ſeptem enim aut ſummū nouem dies ſtrumæ abolebuntur. Vere hoc auxilio uelut admirando, & tanquā naturalem quandā proprietatē habente, aduerſus hanc affectionē. Nam ſi aliquid ammiſcere, aut aliquo modo ipſum permutare uolueris, magis officies quā proficies. Facit & ad gutturis tumorē extra fauces prominentē, & eſt eodem penitus modo adhibendū cum digitorum preſſione, uelut diximus: contrahit enim ac diſcutit, ſiccātq; ac tumorē extirpat, & uafa materiā ad affectum locum aſſerentia conſtringit. Confidenter igitur eo utaris: promiſſionibus enim noſtris experimentū teſtimonium dabit. Emplaſtrū è Cappari, Oribaji. Plumbaginīs, olei antiqui, ſingul. libr. i. i. ſalis cōmunis libr. i. ceræ ſexuncem, reſinæ pinus trientem, ſquamæ æris, corticum radicis cappari, ſingulorū quadrantem, Ariſtolochię rotundæ ſextantem, pro polis tantundem, galbani unc. i. Squamam & plumbaginē tuſas ac cribratas, et ſal primum ſeorſim, deinde ſimul cum his tritum, cum oleo in mortario probè ſubigito, & in ollam coniecta coquito donec non amplius inquinent. Deinde ceram, reſinam, propolim, liquatas ac excolatas, & mox galbanum adiſcito, & ablatiſ ab igne ariſtolochiā ac cortices cappariſ tritas inſpergito, unito, frigefacito, emollito, ac utitor. Facit ad duricias, coxendicum affectiones, hemicranas, ac hydrocephalam in pueris aquoſam capitiſ affectionē: abraſis enim capitiſ capitiſ impoſitum humorem exugit, Glutinat etiam ſinus: aliqui etiam ſine cera præparant. Emplaſtrum ex Agarico, occultos abſceſſus & omnē humilitatem reſorbens. Ceræ, colophoniæ, picis, ſpumæ nītri, thuriſ, agarici, ſingulorum libr. i. terebinthina, uiſci quercini, ſingulorum ſexuncem, medullæ ceruinæ trientem, œſypi quadrantem, grani cnidij, pyrethri, galbani, ſingulorum ſextantem. Liquabilia liquato & excolato, & ab igne amotiſ uiſcum adiſcito, eoq; liquefacto, arida ammiſceto, ſubigito ac utitor.

Apochymatiſ præparatio, Oribaji.

Cap. XX

Picis aride libr. i. picis liquidæ, ceræ, ſingulorū trientem, reſinæ pinus ſexuncem. Omnia liquata & excolata in peluim aquę marinæ ſiue cōmunis plenam mitto, & manibus uelut paſtillum ſubigito ac utitor. Emplaſtrū eiufdem, ad colluſa mitiganda, irrigationiſ uicem ſupplens. Spumæ argenti libr. ii. ſtrigmentorum balnei excolatorum libr. vii. aquæ marinæ è pelago hauſtæ ſextarios ii. colophoniæ unc. xvi. ceræ ſextantem, ſquamæ æriſ quincuncem. Spumam argenti, ſquamam, ſtrigmenta, aquam marinam ſimul coquito, & arundinibus uirentibus agitato, donec non amplius inquinent. Deinde ceram ac reſinā ad iſcito, & ruruſus ad bonam compagem coquito, & irrigationiſ loco utitor. Ego uero etiam olei libr. ii. adiſcio. uerum inter emollientia emplaſtra Oribajiſ, hac ſerie reperitur. Strigmentorū libr. ii. s. aquæ marine, olei antiqui, ſpumę argenti, colophoniæ, ſing. libr. ii. ceræ libr. i. æriſ uſti, ammoniaci thymiamatiſ, ſingulorum ſextantem. Facit inquit ad duricias, & præparatur uelut dictum eſt.

CC

Cerata

Cerata utilissima.

Cap. XXI

Basilicum tetrapharmacum. Cerae, colophoniae, picis, adipis taurini, æquales portiones. Macedonicum. Cerae, colophoniae, picis, adipis taurini, thuris, æquales portiones. Liquabilibus liquatis & ab igne amotis, thus inspergito ac infarcito. Macedonicum Azanitæ, ad multa commodum & insignne. Picis siccae unciam unam, cerae quadrantem, adipis suilli antiqui & expurgati sex uncem, adipis taurini, cespiti, singulorum quadrantem, resinæ pinus siue piceæ quincuncem. Liquefacito ac utitor. Facit ad omnia maligna, ad gangrenas, fistulas, uulnera recentia, ambusta, perfrigefacta, uelut acopon lassitudinem eximendæ destinatum. Est & pessus mollitorius. Conuenit etiam ad uteri ulcera, panos, parotidas. Et ubi caua fuerint ulcera, maiori eius copia urendum est. Vbi uero propè cicatrix inducta fuerit, pauciore. Aduersatur huic pharmacum oleum, quare hoc uitabis. Maxime autem facit in his quibus plaga circa neruos aut musculos est.

Heptapharmacum laxans, suppurans, incarnans. Cap. XXII

Cerussæ besselæ, spumæ argenti trientem, cerae, picis, colophoniae, adipis taurini, thuris, singulorum sextantem. Liquabilia liquata cum aridis unito, acq̃ uisus tempore medicamenti quidem ac cerae sing. unc. i. olei uero rosacei trientem accipito ac utitor. Quod si laxandi uim intendere uolueris, oleum irinum aut sicyonium, aut glucinum sit, & maiore copia sumatur.

Enneapharmacum, Hori Mendesij. Cap. XXIII

Hoc suppurat & laxat, præcipue neruis per consensum affectis. Ex eodẽ sit & pessus siue pessariũ ad sedis affectiones comodum. Adipis anserini, uitulini, butyri, medullæ ceruinæ, cerae, terebinthinæ, olei rosacei, cicini, mellis, singulorum portiones æquas liquefacito, unito ac utitor.

Emplastrum Philosophi. Cap. XXIV

Facit ad calcitratus, uulneraq̃ tumida. Rumpit, pus educit, cicatricẽ inducit. Hyoscyami perdicij, & sideritidis folia recentia, æquis portionibus cõterito, & panem siliginẽ tufum ac cribratũ, unius herbę portione adijcito, omnia simul cũ axungia subigito, & ad emplastri formã redigito, & utitor uelut admirado.

Oesypi præparatio. Cap. XXV

Huius quidem optimam præparationẽ in secundo libro descripsimus: ex lanis enim succidis paratur, uerum ubi illud haberi non potest, accipe hoc quod ita parari solet. Meliloti trientem, cardamomi, hyssopi herbæ, singulorũ sextantem, lanæ succidæ ex alis ouium sumptæ trientem, colophoniam, cerae, resinæ pinus, singulorũ sextantem. Olei dulcis lib. ii. aquæ sextarios iiii. meliloti cardamomum, lanam, & hyssopũ, per triduum aqua macerato, deinde ad tertias coquito, & excolato. Postea liquabilia liquato ac excolato, & succum ac oleũ amisceto, & omnia simul ad succi consumptionem ebullire finito.

Emplastrum Manus appellatum. Cap. XXVI

Hoc emplastrum à quinque rerum speciebus quas recipit, Manus appellatur. Colophoniam lib. v. cerae lib. iiii. resinæ pinus lib. iiii. adipis taurini lib. i. butyri lib. i. liquefacito ac utitor.

Emplastrum Bromium appellatum. Cap. XXVII

Fœni græci, seminis lini, succi althææ, singulo. libr. i. simul ad succi consumptionem coquito. Et colophoniam, resinæ pinus, singulorum quadrantem, cerae sex uncem, galbani trientem, liquefacito & amisceto ac utitor. Aliud optimum. Seminis lini, althææ, fœni græci, singulorũ trientem, in duobus aquæ sextariis.

xarijs macerato, & de expresso succo sumito lib. i. ceræ lib. i. resinæ pinus, colophonix, singulorum sexuncem, galbani sextantem, opopanacis un. i. præpara & utere.

Emplastrum ex ouis.

Cap. xxviii

Spumæ argenti, cerussæ, singulorum trientem, cadmiæ sextantem, ceræ libram i. rosacei lib. ii. ouorū candida x. metallica cum aqua ac uino terito, deinde cum ouorū candidis subigito, & liquabilibus liquatis ammisceto, unito, ac utitor.

Parhygrum Galeni.

Cap. xxix

Spumæ argenti, cerussæ, singulor. lib. i. olei purissimi, aquæ, singul. libr. ii. Ego uero inquit, sape olei quidem lib. i. adipis uero anserini sexuncem ammisceto, aut si is desit gallinacei, aut hoc quoque deficiente, suillum recentem accipio. Omnia simul ad prunas fumum non edentes citra solidam compagem coquantur, & in cocturæ sine aliquando etiam amyli sexuncem adjicio. Si itaque adipem receperit hoc medicamentum, maiorem mitigandi uim acquirit, & dolores ex uulnere inflammato obortos sedat. Sed ad cicatricem inducendā inutile est. At uero aquam addere frigiditatem satis constat.

Emplastrum ex ouis, Oribasij.

Cap. xxx

Ceræ unc. i. spumæ argenti, cerussæ, amyli, singulorum sextantem, oua numero iiii. rosacei lib. i. oua in præparatione postremum addantur.

Parhygrum Oribasij.

Cap. xxxi

Facit hoc ad spontanea ulcera in corporibus delicatis. Adipis suilli recentis deuncem, ceræ sexuncē, cerussæ, spumæ argenti, sing. un. x. v. liquida cum aridis cōmittito. Facit & ad ulcera serpentina. Et cum rosaceo dilutum uuluarū ac sedis affectionibus medetur, & malignas faciei pustulas curat.

Emplastrum Rosaceum inscriptum.

Cap. xxxii

Hoc mammarum duriciis discutit, & est ad sedis affectiones efficacissimum, si cum rosaceo aut myrteo oleo diluatur. Spumæ argenti, cerussæ, adipis suilli recentis, singulorum sexuncem, olei ueteris sesquilibram, myrrhæ drach. iiii. ouorum crudorum uitellos duos. Reliquis ad bonam compagem coctis ac frigefactis, oua cum uino albo trita ammisceto, & utitor hoc medicamento aliquando sincero, aliquando diluto.

Emplastrum phycotiche appellatum.

Cap. xxxiii

Ad omnia ulcera & præcipuè in sede cōmodum est hoc emplastrū. Croci unc. i. cerussæ, spumæ argenti, medullæ ceruinæ, adipis anserini, ceræ, singulorum sexuncē, rosacei un. xxxvi. ouorū candida xxx. uini quantū satis est.

Emplastrum Sphærian appellatum.

Cap. xxxiiii

Hoc irrigationis uicē supplet. Facit ad desquamata, ex coriata, intertrigines, ambusta, ad flagellatos, ad tibias collisas. Spumæ argenti, cerussæ, calcis uiuæ, singulorum quadrantem, ceræ sesquinciā, nitri unc. i. olei rosacei uncia i. Aridis minutissimè tritis liquida ammisceto, & sphæria, hoc est, pilulas formato. Vsu uero expetente olei sexuncem, rosacei quadrantem, ceræ sextantem, ad prunas liquefacito, & medicamenti sextantem adjicito, spathulaque agitato, & ubi frigefactum fuerit medicamentum, cum aquæ dodrante contundito.

Emplastrum pentatheton.

Cap. xxxv

Ceræ, picis, colophonix, adipis taurini, calcis uiuæ, æquales portiones. Liquabilia liquato, & calcem adjicito. Vsu autem tempore olei sexuncem, ceræ sextantem, olei sicyonij quadrantem, liquefacito uelut proximè dictum est, & medicamenti sextantem adjicito. Facit ad uibices flagellorum, ad cutem excoctam, & ad collisa, ac cætera huiusmodi.

CC 2 Empla-

Emplastrum ex ochra.

Cap. xxxvi

Easde cum prædictis uires habet etiã hoc, Ochrae lib. i. i. cretae, cerae, singul. lib. i. colophoniae, picis, resinae pinus, sing. libr. i. spumae argenti, terebinthinae, singulorũ bessẽm, olei lib. ii. arida cũ uino terito, et liquabilia liquata ammisceto, & in massas efformato. Vsu uero postulante, cerae lib. i. olei ueteris lib. ii. liquefacito & excolato, & medicamenti lib. i. ammisceto, & uino adstillato contundito.

Emplastrum Telamonium.

Cap. xxxvii

Hoc carbunculis medetur, Dilutum sinus siccatur, & cicatricẽ inducit. Spumae argenti, calcis uitrae, cerae, resinae pinus, singulorũ dodrantẽ, cerussae un. x. v. olei sesquilibra. Spumam argenti cum oleo ad compagem coquito: deinde ceram ac resinã adjicito. Postea calcem & cerussam minutissimẽ trita ammisceto, ac utitor. Et ad carbunculos quidem linteo inductũ imponitur. Ad reliqua uero, rosaceo aut myrteo oleo ad strigimentitiam compagem dilutum adhibetur.

Pilarium ex recremento argenti.

Cap. xxxviii

Recrementi argenti sexuncẽ, cere, adipis taurini, singulorũ quincuncem, colophoniae trientẽ, picis, olei, singulorũ sextantẽ. Argenti recrementũ uino aut foeni graeci succo teritur. Quod si non possit haberi argenti recrementũ, plumbaginẽ pro eo accipimus. Facit ad detquamata ac excoriata, & his similia.

Emplastrum ex Pompholyge.

Cap. xxxix

Hoc longo usu constat eunuchorũ, mulierum, puerorum, ac aliorum molliũ corporũ ulceribus conuenire, ad cicatricẽ citra dolorem inducendã, & ad cancerata ulcera turò adhibetur. Cerussae, spumae argenti, pompholygis, singulorũ sextantẽ, cadmiae trientẽ, medullae ceruinæ quadrantẽ, cerae, olei rosacei, singul. lib. i. olei myrtei sexuncẽ. Metallica trita ac cribrata, & cum uino subacta, liquidibus liquatis ammisceto, ac utitor. Aliud Archigenis & Oribasij. Pompholygis, cerussae, spumae argenti, singulorum un. i. ladani sextantem, acaciae trientem, cerae quadrantem, olei myrtei bessẽm, ouorum assatorũ uitellos i. x. Vini quod satis est. Aliud Oribasij. Spumae argenti, cerussae, singulorum sextantem, pompholygis un. i. croci un. i. cerae un. i. adipis anserini quadrantem, ouorum assatorum uitellos iiii. Rosacei, uini, quod satis est.

Emplastrum rutaceum.

Cap. xli

Hoc ad fistulas scabras facit. Cadmiae, spumae argenti, recrementi argenti, sulphuris uiui, singulorum sextantem, aluminis scissi, rutae uiridis, singul. un. i. cerae bessẽm, olei myrtei lib. ii. uini quantum satis est.

Ceratum e Perdicio.

Cap. xlii

Facit ad sinus. Foliorum perdicij lib. ii. cerae, colophoniae, olei, singul. libr. i. Herbam exactissimẽ terito, & liquida ammisceto, & in mortario unito. Hoc in aliquibus ob nimiam uim repellendi, uicinos locos inflamat, & materiam eò colligit. Quod ubi contigerit, ad locum quidem inflammatum, idem medicamentum imposito. uerum ad sinus osculum emplastrũ e lolo, aut quod Venus inscribitur, aut quoddam attractorium adhibeto.

Ceratum e succo betae.

Cap. xliii

Facit ad uulnera inflammata, ad achoras capitis ulcuscula, & ad ambusta. Cerae libram unam, olei sesquilibram, liquato ac excolato, & ab igne ablatis, betae succum quantum imbiberẽ possunt affundito, & in mortario subigito. Praestat autem paulatim succum cerato instillare. Aliud e succo plantaginis, ad inflammationes & sinus. Cere li. i. olei lib. ii. s. succi plantaginis quantum satis est. Ceratum liquefactũ & in frigidam aquam diffusum, aqua saepe permutata probe

probe lauatur, & postea in mortario pistillo tundit, ac subinde plantaginis succus paulatim instillatur, quantum eius imbibiri potest. Ceratum Myrteum, Ad oculorum inflammationē, & cicatricem inducendam, ad intertrigines ac scabiosas affectiones comodum. Ceræ lib. i. olei myrtei li. ii. plumbi usti sex uncem, cerussæ, spumæ argenti, syrici, singulorum unc. i. Vini quantum satis est ad conterendum. Melinum cicatrices inducens. Chalcitidis crudæ sex uncem, cadmiæ quadrantem, ceræ lib. i. olei myrtei lib. i. uini quod satis est.

Ceratum ex sandyce, Homo appellatum. Cap. XLIII

Hoc ulcera diuturna ac maligna, & in tibijs oborta, solum per se adhibitum ad cicatricem perducit. Sandycis lib. i. olei dulcis lib. ii. coquito donec non amplius inquinant, & utere confidenter.

Emplastrum ex alijs. Cap. XLIII

Hoc uim attractoriā habet. Facit ad omnem duriciā, abscessus, furunculos, strumas, inguinū tumores, fistulas, impetigines humidas, mammæ induratas. Ceræ lib. ii. colophonix sex uncem, medullæ ceruinæ tantundem, nitri albi bessem, allia uiginti, olei lib. i. iii. Allia depurgata in oleo coquito donec torrefiant, deinde ad oleum excolatum liquabilia adijcito, & postea nitrum tritum adijcito ac utitor. Nos uero ita præparamus: Ceræ, colophonix, olei, singulorum quincuncem, nitri sex uncem, medullæ ceruinæ sextantem, alliorum nucleos xxx. præpara & utere, præsertim ad fistulas: humorem enim attrahit, quem quotidie crebro detergere oportet. Hoc solum citra alterius opem extrahit, incarnat, & cicatricem inducit. Aliud Oribasij. Ad pustulas, intertrigines, ambusta ab igne, perñiones non exulceratos, ad bullas nondum apertas, ad cutis tibijs excoriationem, ad ulcera antiqua & proserpentia sub cute. Recrementi plumbi trientem aut quadrantem ad ceratum ammisceto, quod habet ceræ bessem aut dextantem, adipis suilli recentis, olei myrtei, singulorum sextantem, aut quadrantem. Quod si cicatrix inducenda est, absque adipe præparetur.

Emplastrum è scilla. Asclepiadæ. Cap. XLV

Hoc ad fistulas, sinus, nomas & putredines facit. Vlcera eminentias contrahit, ad fistulas angusta oscula habentes collyriū ex eo formatum inditur. Si uero lata ac ampla fuerint oscula rosaceo dilutum adhibetur, eloto prius sinu siue fistula cum posca aut uino mulso, iniectum, locusq; emplastro munitur ac deligatur: hoc enim modo incarnat, ac replet fistulosa capitis ulcera. Conuenit & nomis, si membrana nō fuerit denudata. Idem sincerū ad capitis fracturas adhibetur, & ad anhelosos ac orthopnoicos amplis splenijs inductū pectori imponitur: conuenitq; omnino ubi ad superficiē materias attrahere uolumus. Scillæ repurgate quincuncem, squamæ æris, iridis, singulorum quadrantem, myrrhæ dra. x. viii. ammoniaci thymiamatis dra. x. ii. galbani, picis liquidæ, styracis, æruginis, resinæ pinus siccæ, aristolochiæ, singulorū sex uncem, ceræ un. xx. terebinthinæ trientem, olei ueteris lib. i. i. acci acerrimi sextarios ix. aut quod satis est. Scillam ad solem æstiuum tundito, & acetum paulatim instillato, quantum satis ad exacte terendam. In alio autem mortario squamam æris & æruginem cum aceto diutissime terito, & arida trita ac cribrata adijcito. Postea ammoniacum, styracem, myrrham, galbanū addito, & instillato aceto simul probe conterito, deinde liquabilia liquefacta, iride ac aristolochia inspersis, frige facta & ad reliqua ammisceto, subigito, ac utitor. Ad fistulas quidem & ossa corrupta, collyria ex eo formata indens, uerum ad ulcera repurganda sumito, media

camentī trientem, ceræ sextantem, rosacei quadrantem, & pro repurgationis ratione aliquid de medicamēto detrahito, & cerato adijcito, donec cicatrix inducatur, ita ut postremū quum iam absolunda est cicatrix, medicamenti unj. olei rosacei aut myrtei dodrantem, & ceræ trientem commisceas.

Emplastrum ē pompholyge, Heræ Cappadocis.

Cap. XLVI

Hoc ad sedandos dolores ac inflāationes facit, præcipuē ad ulcera maligna ac cancerata, antiqua q̄ ac cicatricem non recipientia. Facit & ad ambusta ab igne. Rosaceo aut myrteo oleo dilutum cicatricem inducit, & butyro dilutum incarnat. At cum rosaceo ad omnes sedis affectiones cōmodum est. Cadmæ botryitidis lotē dra. viii. pompholygis lotē dra. vii. plumbi usti & loti dra. ix. thuris dra. iiii. cerussæ lotē drach. ix. spumæ argenti lotē drach. viii. ceræ albæ drach. c. terebinthinæ chiæ drach. vii. olei myrtei drach. CLXX. Arida trita & cribrata, in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo, cum uini sextarijs iiii. terito: cæterum in uino hoc, infra scripta polentæ modo contusa, per diem ac noctē præmaduisse oportet. Iridis, meliloti, aristolochiæ, capitulorū papaueris, seminis hyoscyami albi, sing. dra. viii. cum hoc itaq̄ uino excolato, metallica sicut diximus sunt conterenda, usq̄ ad mellis cōpagem, & deinde oleum myrteum adijciendū, quo illitionis spissitudo fiat. Postea uero omnia in ollam nouam coniecta lento igne ad emplastri formam, & terebinthina adiecta medicamentum ab igne tollito, ac frigefacito, subigito, & utitor.

Emplastrum Nigrum essentia appellatum.

Cap. XLVII

Facit hoc ad duricias, ad articulos, & costas fractas, ganglia, strumas, & tumores dissoluit, Tibiarum ulcera chironia & fistulas curat. Facit ad morsus ferarum. Aquæ inter cutem molem delet. Clauos sanat, aculeos extrahit. Splenicis, podagricis, hepaticis prodest. Spumæ argenti, cerussæ, æruginis rasæ, lingulorum quadrantem, squamæ æris sextantē, thuris masculi sextantem & semunciam, bituminis Iudaici bessem, terebinthinæ quadrantem, ceræ flauæ, picis aridæ, singulorum libr. iiii. olei antiqui lib. i. lapidis gagatæ, lapidis asij, aluminis scissi, magnetis uiui, myrobalanorum, singulorum quadrantem. Spumam argenti, cerussam, squamam, æruginem, bitumen, & thus, omniaq̄ arida terito, & in mortario aceto paulatim instillato, ac strigmentitiam spissitudinem terito, deinde ceram, picem, oleum ac reliqua liquabilia liquata ammiscero, unito ac utitor.

DECIMIQUINTI SERMONIS AETII FINIS.

INDEX CAPITVM DECIMISEXTI

Aëtij Sermonis.

| | | |
|--|-----------|---|
| D euteri situ, magnitudine, ac forma. | Caput i | Notæ futuræ uirginum purgationis. |
| Quæ intra prægnantis uterum nascuntur. | Cap. ij | Cap. v |
| De secundæ generatione. | Cap. iij | Quando semē appareat, & cōceptus tempus adueniat. |
| Menstruæ mulierum purgationis ratio. | Cap. iiii | Cap. vi |
| | | Fœcundarum mulierum dinotio. |
| | | Cap. vii |
| | | Quomodo cognoscantur quæ cōcepte. |

| | | | |
|---|---------------|--|--------------|
| ceperunt. | Cap. viij | tiones. | Cap. xxxviij |
| Notæ foetus masculi ac foeminae. C. ix | | De mammarum abscessu. | Ca. xxxix |
| De pica. Cap. x | (bus. Cap. xi | De mammarum fistulis. | Cap. xl |
| De tumoribus pedum in prægnanti- | | De mammarum nomis. | Cap. xli |
| Cura prægnantibus adhibenda. C. xij | | De exedentibus mammartū ulcerib. | Cap. xliij |
| Notæ partus secundum naturam fu- | Cap. xliij | De cancris mammartū. | Cap. xliij |
| turi. | Cap. xliij | Qui cancri curatu faciles, & qui diffici | |
| Parientibus facienda. | Cap. xliij | Cancrī chirurgiā. C. xlv (les. C. xliij) | |
| Cura circa ægrè parientes adhiben- | Cap. xv | Cancrī curatio post amputationē & | |
| da. | | inustionem. | Cap. xlv |
| Quomodo opē ferre oportet his quæ | Cap. xvi | Cancrorum curatio citra chirurgiā. | Cap. xlvij |
| non tutò concipiunt. | Cap. xvij | Canceratorum tumorum non ulcera | Cap. xlvij |
| Pessī sterilitatē inducentes. | Cap. xvij | torum curatio. | Cap. xlvij |
| Foetum corruptentia. | Cap. xvij | Cancrī ulcerati curatio. | Cap. xlix |
| Signa futurum abortum præceden- | Cap. xix | De mammis induratis. | Cap. l |
| tia. | Cap. xx | De menstruis suppressis. | Cap. li |
| Quomodo abrupti foetus eiectioni | Cap. xxi | Mulieribus quæ non purgantur acci- | Cap. liij |
| opitulemur. | Ca. xxij | dentia. | Cap. liij |
| De his quæ bimestres aut trimestres | | Curatio earum quæ ob nimiam cali- | Cap. liij |
| foetus abortiunt. | Ca. xxij | ditatem non purgantur. | Cap. liij |
| Pariendi difficultatis causæ. | Cap. xxij | Frigidæ temperaturæ dinotio ac cura | Cap. liij |
| De foetus extractione ac exectione. | Cap. xxij | tio. | Cap. liij |
| Cap. xxij | Cap. xxij | Pessī menses educentes. | Cap. lv |
| De secundæ educatione. | Cap. xxij | Curatio earum quæ præ pinguedine | Cap. lvi |
| Cura post foetus exectionem. | Cap. xxv | non concipiunt. | Cap. lvi |
| Causæ sterilitatis, itemq; curatio in ui- | | Curatio earum quæ ob plenitudinem | Cap. lvij |
| ro ac muliere. Notæ item conce- | Cap. xxvi | non purgantur. | Cap. lvij |
| ptionis. | Cap. xxvi | Curatio earum quæ ob maciem non | Cap. lvij |
| Frigidioris uteri signa ac curatio. | Cap. xxvij | purgantur. | Cap. lvij |
| put xxvij | (put xxvij | Curatio earū quæ ob uitiosos humo- | Cap. lix |
| Calidioris uteri signa ac curatio. | Ca. xxix. | res non purgantur. | Cap. lix |
| Humidioris uteri curatio. | Cap. xxx | Curatio earum quibus sanguis ad na- | Cap. lx |
| Siccioris uteri curatio. | Cap. xxx | res uel sedem defertur. | Cap. lx |
| Diuersarum affectionū ob quas mu- | | Curatio earum quæ ob nimium ocium | Cap. lxi |
| lieres non concipiunt curatio. | Cap. xxxi | non purgantur. | Cap. lxi |
| put xxxi | | Curatio earum quæ ob aliquam ute- | Cap. lxij |
| Potiones, pessī, & suffitus ad conce- | Cap. xxxij | ri affectionē nō purgant. | Cap. lxij |
| ptionem. | Cap. xxxij | De mensium stillicidio. | Cap. lxij |
| De lactis defectu. | Cap. xxxij | De nimia mensiū purgatione. c. lxij | Cap. lxv |
| Nelac in mammis coeat in grumos. | Cap. xxxij | De fluxu muliebri. | Cap. lxv |
| Cap. xxxij | | Curatio rubri uteri fluxus. | Cap. lxvi |
| De coagulato in mammis lacte, & ijs- | Cap. xxxv | Albi fluxus curatio. | Cap. lxviij |
| dem turgentibus ob lactis redun- | | De uteri strangulatione. | Cap. lxviij |
| dantiam. | Cap. xxxv | Pessī ad uteri strangulationē idonei. | Cap. lxix |
| De uitiatō lacte mammas lædente. | Cap. xxxvi | Cap. lxix | (Cap. lxx |
| Ad mammas inflammatas. C. xxxvij | | Vnctiones ad uteri suffocationem. | |
| Ad induratas mammartū inflamma- | | | |

| | | | |
|---|---------------|---|------------|
| Varia auxilia ad uteri strangulationem. | Cap. lxxi | De hernia aquosa mulierum. | Cap. c |
| De seminis fluxu. | Cap. lxxij | De hernia inguinis mulierum. | Cap. ci |
| De uteri debilitate. | Cap. lxxiij | De hernia uaricosa. | Cap. cij |
| De furore uterino. | Cap. lxxiij | De Nymphæ sectione. | Cap. ciij |
| De uteri resolutione. | Cap. lxxv | De cauda. | Cap. ciij |
| De uteri prolapsu. | Cap. lxxvi | De thymis, & uerrucis tum alijs, tum formicarijs uteri. | Cap. cv |
| De reclinacione, auersione ac recur- su uteri. | Cap. lxxvij | De condylomatis. | Cap. cvi |
| De uteri inflatione. | Cap. lxxvij | De rimis ac fissuris uteri. | Cap. cvij |
| De uteri hydrope. | Cap. lxxix | De tuberculis uteri miliaceis. | Cap. cvij |
| De mola uteri. | Cap. lxxx | De scabris uteri pustulis. | Cap. cix |
| De tumore uteri laxo. | Cap. lxxx i | De alarum pudendi muliebris absces- su. | Cap. cx |
| De satyriasi. | Cap. lxxxij | Ad umbilicum prolapsu. | Cap. cx i |
| De uteri inflammatione. | Cap. lxxxij | Ad rugas ventris, rimasq; ac nigre- dines à partu exortas. | Cap. cxij |
| De utero in scirrhio tumorem indura- to. | Cap. lxxxiiij | Præparationes ungentorum siccoru, moschatorum. Item conditoru, œnanthariorum ac suffumigioru uariorum. | Cap. cxij |
| De uteri abscessu. | Cap. lxxxv | Olei falca præparatio preciosa. | Cap. cxij |
| Abscessus oris uteri chirurgia. | Cap. lxxxvi | Olei siue ungenti foliati, ac spicati præ- paratio. | Cap. cxv |
| Abscessus uteri inter intestina & pe- ritonæum membranam rupti cura- tio. | Cap. lxxxvij | Oenantharioru præparatiões. | Cap. cxvi |
| De uteri exulceratione. | Cap. lxxxvij | Absinthati siue rhodabsinthati præpa- ratio salubris. | Cap. cxvij |
| Ulcera uteri carbunculosoru cura- tio. | Cap. lxxxix | Conditi purgatorij præparatio. | Cap. cxv |
| Ad sordida uteri ulcera. | Cap. xc | Rhodomeli præparatio. | Cap. cxix |
| Ad humorē à muliebri pudendo pro- fluentem. | Cap. xci | Mustati præparatio. | Cap. cxx |
| Ad uteri nomas. | Cap. xcij | Gari præparatio pro abstemijs. | Cap. cxx i |
| Quæ ad cicatricem ducunt. | Cap. xcij | Suffumigij moschati præparatio. | Cap. cxxij |
| De cancri uteri. | Cap. xciiij | Myrrhatio ad cadaueris cōseruatio- nem. | Cap. cxxij |
| De uteri obturatione. | Cap. xc v | | AETII |
| De utero non perforato. | Cap. xcvi | | |
| De hæmorrhoidibus uteri. | Cap. xcviij | | |
| De calculo uteri. | Cap. xcviij | | |
| De calculo uesicæ muliebris. | Cap. xcix | | |

AETII MEDICI GRAECI CONTRA

CTAE EX VETERIBVS MEDICINAE, TETRABL

BLI, SIVE QVATERNIONIS QVARTI,

Sermo Quartus, & ex ordine Decimus sextus.

De conceptus ac partus ratione, & de affectionibus muliebris uteri praesertim & mammarum. Item de ungentorum pretiosorum, & potionum ac suffumigiorum praeparatione.

DE VTERI SITV MAGNITVDINE AC forma.

Caput I



TERVS Graecis Metra, hoc est, Matrix appellatur, quod ex ipso omnia animantia, uelut à matre oriuntur. Vocatur eisdem hystera, quod posterior situ sit omnibus uisceribus. Situs est enim uterus intra peritonaeum membranam aluum & intestina omnia circumcirca amplectentem, inter uesicam ac rectum intestinū. Atq; huic quidē semē toti incumbit: uesicā uero iuxta umbilicū, ubi fundum habet, ut plurimum supereminet. Iuxta partē autem ad pudendū tendentē ipsa uesica uterū excedit collo. Magnitudo eius non in omnibus eadem est. Multo enim minor est uterus eius quae praegrans non est: maior autē praegrans. Eius uero quae nunquā praegrans fuit, longē ad huc minor uterus existit. Et iuxta aetate minimus est his quae ad uenerem expectandā tempus nondū attigerunt. Nam & aliās semper minor est his quae Venere non utuntur. Longitudo itaq; in moderatē se habentibus mulieribus, à fundo circa umbilicū, usq; ad pudendū, est per unq; undecim digitorū. Latitudine uero ad utruq; latus per cornua sua extenditur. Quantum uero ad figurā attinet, totū quidē reliquū corpus, & maxime fundū uesicae simile est. In quantū uero exortus papillares ad lumbos nutātes habet ab utroq; fundi latere productos, uesicae similis non est: appellantur autē hi exortus cornua, & primum sursum uergunt, postea deorsum tendunt, & paulatim angustiores fiunt, ut postremae partes uenis similes sint. Haec itaq; angustae cornuū partes sinuosis flexibus ad testes inferuntur, qui à lateribus uteri siti sunt, singuli ab utraq; fundi parte prope cornua: & per hos sinuosos cornuū flexus, in congressu uiri uterus tēte à testibus attrahit. Sunt autem testes mulierum parui, neque sicut in uiris rotundi & oblongi, ac tenera carne praediti, sed lati ac glandulosi & pelliculosi. Appendet porro uterus uesicae & intestino recto, per fibrosa quadam interstitia. Appendet & ossi sacro, per robusta quadā ligamenta nervosa ac musculosa. Sunt & ligamenta ac appendices quae in ipsum uterū inferuntur, partim quidem texentia & perplicantia ipsum uteri corpus, quorum non exigua pars sunt nervi à spinali medulla orientes. Partim uero incrementi ac nutrimenti ipsius uteri, item quae foetus gratia facta, uelut sunt arteriae & uenae. A uena enim caua quae per spinam à gibba hepatis parte fertur, & ab arteria magnā quae illi incumbens simul defertur, duae uenae & duae arteriae exoriuntur, utrinque sanē uena & arteria: atque haec quatuor uasa ad uterum delata, ante-

quanti

quàm in ipsum inferuntur ramulos ad testes extendunt, & postea in ipsum uteri corpus deferunt, ipsumque intertexunt, & per ea menstruus sanguis in utero deriuatur. Sunt autem & alię uenę ac arterię utrinque utero insertę, partim ad testes, partim ad ceruicę tendentes. At uero ipsum uteri corpus ex duabus tunicis constat, & externa quidem neuosior est, interna uero uenosior. Et externa quidē simplex & una est, interna uero duplex, ut si excoriare uolueris, duobus uteri esse uidebuntur, sub una & eadem tunica siti. Ceterum collum uteri musculosum, ex dura ac cartilaginosa carne factum est, et semper durius seipso euadit, & progressu temporis cartilagosum, adeo ut quę sæpius pepererunt, aut iam aniculę sunt, his multum durum ac cartilagosum collum sit, ut gutturi summo simile existat. Est et in collo uteri foramen, per quod & menses deferunt, et mulier masculi semen suscipit, exitque per ipsum etiam foetus: incredibile enim dictum est quantum hic meatus pro tempore amplitudinē euariat. Nam reliquo tempore toto specilli extremum, aut paulo crassius quiddam suscipit. Prægnante uero muliere ita clauditur, ut nihil suscipere possit. At ubi foetus ab utero exoluitur, dolores partus ipsum quàm plurimum extendunt, & quod mirum auditu est, animal totum per ipsum transit. Finit autem collum ac desinit in muliebrenum siue pudendum. Longitudo porro pudendi in mulieribus ætate perfectis sex ferè digitorum mensura est. In partu tamen & concubitu breuius efficitur, collo nimirum uteri se extendente. Est & in puellari ætate pudendum delicatius ac mollius. In aniculis uero & his quę sæpius pepererunt, callosius euadit, & cartilagini simile; ex crebro enim congressus attritu, & partium ex euntium collisione callefcit. Sed & mensium delatione indurefcit, non aliter quàm ob plurimum & acrem humorē influentē ulcera callosa ac fistulosa fiunt. At uero imminente mensium tempore uterus crassefcit ac intumescit, aliàs tenuior ac contractior existens. Crassior item est in his quę sæpius pepererunt. Tenuior autem in his quę nondum prægnantes fuerunt. Idem etiam primis à conceptu diebus crassefcit. Vbi uero foetus adoleuit, ac iam pariendi tempus adest, tenuissimus euadit. Attenuat autem uelut uesicę flatu repletę solent, crassitudine in longitudinē abeunte. Atque hæc uenę de situ, figura, ac magnitudine uteri dictum sit.

Quę intra prægnantis uterum nascuntur.

Imprægnationis tempore primū Secunda utero adnascens, & totū foetū ambiens generat, deinde alię duę pelliculę, altera farciminalis à farciminis similitudine appellata, eminentibus foetus partibus duplicata incumbens. Altera agnina à teneritudine uocata, quę totum foetum ambit ac complectitur.

De secundę generatione.

Secunda hoc modo generatur. Singula uenarum ac arteriarum oscula, quę intra uterum perueniunt, in extremitatibus suis nodosas quasdam eminentias hæc morrhoidibus anī similes habent, quas aliqui cotyledonas, hoc est, acetabula appellant. Atque hæc in mulieribus sunt minores, quàm quę in uaccis, capris, ac ceruis, atque alijs talibus animalibus reperiuntur. Sed & in brutis ueneris similes. Tales igitur eminentiæ in uteri sinu ubi mulier conceptura est apertę aut desinentibus. Et quanquā etiam reliquo toto purgationis tempore apertę sint, tamen non cōcipit mulier. Non enim potest semē in utero manere, quum influentis sanguinis multitudine eluatur. Quando uero cessant menses, & quum incipiunt, aperta sunt uasa, & purgatio lunaris neque multa, neque uatim

uatim effunditur, ut semen ob uteri asperitatem facile adhæreat, & ab allabentis sanguinis paucitate abunde alatur: priusquã enim fluere cœperint menses, mulier non conceperit, quod & semen careat alimento, & unde adhærere possit non habeat: levis enim tunc uterus est ob uasorum conclusionẽ, ut inde semen tanquã color a leui pariete elabatur. Nam qui parietes illituri sunt, eos primũ exasperant, deinde colores inducunt, Proinde semen uiri iniectum, & in utero detentum, acetabilis dextri uel sinistri sinus impingitur, cõtrahitq; se ipsum uterus, ac semen undiq; complectitur. Secundã itaq; generatio ab osculis in uterum apertis initium sumit, ita ut ab unoquoq; osculo uas generetur, ab osculo arterig, arteria, a uenę osculo uena, atq; hæc uasa distinguit ac cõnectit membrana. Et hoc modo Secunda generatur. At uero hæc uasa per secundã dispersa rursus inter se cõeunt, & in duos ueluti stipites desinunt, binasq; uenas ac binas arterias perficiunt, quæ ad ipsum fœtum se ingerunt circa umbilicum. Nil enim aliud est umbilicus quã quatuor hæc uasa, in medio sui uragum, hoc est, lotij ductorem appellatum habentia. Hic uero est principium pellicule farciminalis, perforatusq; est ad fundum uelicæ ipsius fœtus, ut per ipsum locum fœtus excernatur, & in pellicula farciminali colligatur. Tum uero ex duabus uenis una tantum efficitur, quæ per umbilicum delata, sinæ parti hepatis ipsius fœtus inseritur, uenæq; caua appellatur. Et per hanc ad fœtum alimentum sanguis ab utero deriuatur. Postquam enim hepar ipsius fœtus sanguinem allatum susceperit, in omnes corporis partes distribuit. Similiter etiam duæ arterig in unam coalescunt, quæ circa uelicam firmatur, & magnæ arteriæ inseritur, quæ spinæ eiusdem fœtus adhæret. Et per hanc uitalis spiritus ex uteri arteriis ad fœtum distribuitur. Porro partus tempore instante, quum magnus perfectusq; infans uterum undique distenderit, Secunda pro infantis mole angusta efficitur, neq; iam sanguis ab utero allatus alimentum sufficiens exhibet. Quapropter concitatus infans exilit, & ambientes pelliculas dirumpit, atque ita arcana quadã ratione uteri hostium aperitur ac fœtus progreditur. Et hæc quidem de fœtus generatione breuiter, & quã lucidissimẽ id fieri potuit explicauimus. At si quis diligentius speculari hæc uoluerit, caprã aut uaccam, uel ceruam disseccare poterit, ossa pubis remouendo, & cutem apte refecando. Et uteri cum uicinis partibus unionem apertẽ uidebit.

Menstruæ mulierum purgationis ratio.

Cap. IIII

Circa quartumdecimum annum menses in fœminis apparere incipiunt, quo tempore & pubescunt, & mammae ipsis intumescunt. Non tamen omnibus eodem tempore, eademq; mensura, & per totidem dies prodeunt. Sed plerisq; plus minus duarum heminarũ mensura, quatuor dierum spacio, interpositis uiginti duobus diebus, aut summum triginta, singulis mensibus deferuntur. Nec ante trigessimũ quintum, nec serius quã quinquagesimo anno desinunt. Rarissimẽ enim ad sexagesimum annum menstruæ purgationes perueniunt. Citissimẽ uero in pinguibus corporibus deficiunt. Cæterum sanguinis qui profluit copia paulatim usque ad ætatis uigorem augefcit. Deinde aliquamdiu æqualitatem seruans, paululum penitus crescit aut minuitur. At ubi ad finem tendit, paulatim rursus minuitur, donec in totum desinat. Vt autem ordinem seruent aut excedant, & ut multitudine uel paucitate delinquãt, in ætate situm est, ac anni tempore, itemq; uictus ratione, & peculiaribus mulierum studiis, Huc faciunt & ciborum qualitates, & morbi accedentes.

Notæ

Notæ futuræ uirginum purgationis.

Cap. v

Virginibus futuram purgationem prælagiunt mammarum pruritus, lumborum, pectinis, & capitis dolor, bilis aut pituitæ uomitus. Quum hæc circa decimum quartum annum apparuerint, Medicum cōiectare oportet, quomodo purgationem maturet, & per leniores decoctiones sanguinis delationem adiuet.

Quando semen appareat, & conceptus tempus adueniat.

Cap. vi

Semen quoque circa decimum quartum annum, & plerisque in ipso pubertatis tempore apparet, uerum ad generationem aptum efficitur, anno plerumque decimo octauo aut uigesimo. Et statim sanè ubi semen comparuerit, coeundi desiderio flagrare incipiunt.

Fœcundarum mulierum dinotio, Sorani.

Cap. vii

A decimoquinto, ætatis anno ferè usque ad quadragessimum, mulieres ad concipiendum idoneæ sunt, quæ neque uiragines, neque corporis habitu densæ aut duro præditæ sunt, neque cōtrā humecto ac languido, neque alui fluxione assidue laborant. Sed & recta ratione ac læta mente funguntur, & lumbos habent largos, & uentrem amplum. Et quibus menses non impediuntur, & quæ uteri affectionibus non infestantur. Cæterū conceptura sit an non mulier, hoc modo deprehendi aiunt. Infernas partes uestimentis contectas resina suffiunt, ita ut intra pudendum uapor recipiatur. Et si quidem odor per corpus ad os & nares transeat, fœcunditatis signum iudicant. Sin minus, sterilitatis. Alia item decorticata, & lanè inuoluta, mulier dormiendi tempore sibi ipsi uelut pessum siue tali formam subdat, Et ex odore an ad os peruenerit aut non, fœcunditatem aut sterilitatem iudicet.

Quomodo cognoscantur quæ conceperunt.

Cap. viii

Mulierem concepisse argumento primum est, si ab obstetrice interrogata respondeat, se post concubitum uiri semen non effudisse, & in ipso coitus opere horrorem quendam percepisse, & moderato dolore circa pudendum ac umbilicum uexari. Et ad hæc si pudendi sinus & os arida sint. Et uteri osculum non durum, nec inflammatum, sed interius ac exterius oclusum fuerit, & aliquid quantulum sursum progressum. Et si Veneris appetentia languerit, & menses consueto tempore non apparuerint. Si uenæ pectoris uirere, & mammae intumescere inceperint, & progressu temporis lachauerint. Si cavitates orarum subpallidæ fiant. Si nigræ maculæ in facie & aliquibus lentigines oriantur. Si colli pars anterior calidior, ceruix uero frigidior appareat. Si circa secundum mensem præter cōsuetudinem salsa aut acida appetat. Quibusdam etiam os nimio humore madescit, & ad agendum torpor adest, & aspectus languidus ac planè effœminatus efficitur, & color ad albedinem ac pallorem mutatur, prægresso plerumque rubore si fœminæ uiriliores fuerint. Circa consueta item purgationis menstruæ tempora aggrauantur prægnantes, & mammae intumescunt, lumbi difficulter moventur, uelica rubens ac ignitum locum cum dolore excernit, et suppressorum mensium calor sinum ac ceruicem uteri accendit.

Notæ fœtus masculi ac fœminæ.

Cap. ix

Hippocrates & alij quidam maris notam esse dixerunt, si prægnans sic bene colorata, & ad motum facilis, & si dextra mamma amplior, & præsertim papilla sit. Contrà uero pallidus color, sinistraque mamma ac papilla tumidior, fœmella in-

la, indicium est. Sed & in masculi conceptu dextrae partis uasa, uenae ac arteriae, magis intumescunt, praesertim sub lingua. At in foemellae conceptu contrarium apparet. A iunt etiam papillas in foeminae conceptu deorsum nutare; in masculi uero, sursum tendere: Sed & lac praegnantis aquae instillatum, si foetus foemella sit, diuelli ac detrahi: Si uero masculus, in superficie persistere. Certissimum uero minime fallax masculi foetus signum est, si praegnans dextrae manus pulsuum ualidiorem, uelociorem, maioremque ac duriorem habuerit: Et uice uersa in foemella.

De pica, Galeni.

Cap. x

Circa secundum mensem affectio quaedam praegnantibus accidit, quae a pica auicula nomen accepit. Alij tamen ab hederæ similitudine, quae cittos Graecis uocatur, hanc affectionem cittam Graecis appellatam esse sentiunt, nam sicut illa uarijs plantis prout occurrunt se implicare solet: ita mulieres ex pica laborantes, uaria edulia appetunt, atque ea contraria, quae tum uoluptatē, tum insauitatem gustanti exhibent. Accidit autem ferè circa quadragesimum diem à conceptu. Et est stomachi languor cum nausea & auersione ciborum, bilis ac pituitae uomitū inducens. Consequuntur assidue expuitiones oris, uentris morbus, ac anxietates. Atque haec omnia ob humoris sanguinei praesertim redundantiam fiunt: qui enim per uteri uasa singulis mensibus excerni solebat, à foetu suppressus, sursum uergit, & stomachū precipue, uelut subtiliore sensu praeditū intestat: pro uarietate autem uisiosi humoris, uaria ac peregrina edulia appetunt, quaedam falsa, aliquae acida, aliquae terram, aut testas, aut extinctos carbones. Et sepe usque ad quartū mensem haec affectio durat: in principio enim modicus sanguis ad foetus alimoniam distribuitur. Postea uero crescente foetu plus alimentū attrahitur. Itaque tum denuo uisioso humore partim per uomitū euacuato, partim ad uterum alendi foetus gratia delato, relata accidentia remittunt. In quibus igitur multus sanguis collectus uidetur, his modicus cibus competit, & exercitia mulieribus conuenientia, quae redundantem discutere possunt. Profunt & fatigationes ac peregrinationes: quae uero citra laborem uiuere consueuerunt, haec praegnantes agere ferunt repentinos aut laboriosiores motus. Quarum uero stomachus ab acri, acido uel aut falso humore mordetur, haec ad excitandum uomitum tepidam aquam comode bibent, ut humor affligens reuomatur. Abstineant autem à dulcibus obsonijs, & uinum suluum, odoratum, antiqum, et subadstringens bibant. Sit autem potus moderatus ne alimenta uentriculo innatent. Confert etiam ante cibum oliuas muria conditas cum pane mollia exhibere. Aut quinque uel septem amygdalas amaras. Aut polentā succo cotoneorum aut puniceorum malorum respersam. Aut seridem siue intubum. Aut asparagū palustrem, aut sisarum. Ex auibus deligendae sunt, quae neque pingues, neque uirosae sunt. Conueniunt etiam pedes ac rostra & uentriculi porcorum, & herinacei marini recentes. Post cibum uero uuae passae, mala punica ac pira exhibeantur. Sint tamen omnia quantitate moderata, at quae cibos auersantur, obsoniorum uarietate ac iucunditate illectentur. His autem quae terram comedunt, nihil ita prodest, uelut amyllum recens pro terra oblatum. Ceterum medicamenta contra picam comoda sunt, portulacae cremor, & ipsa in cibo sumpta, cum cumeris semen decoctum, & ex aqua potum. Polygoni decoctum potum, similiter etiam anethi. Et rhei pontici ac spicae nardi cremor. Item intubi succus, uel ipsa herba cruda aut cocta assidue comesta. At si crassius est quod euomunt, & ob uiscositatem difficulter excernitur, fassamenta & raphanos ex ace-

DD

to mul-

to mulso edant, omni studio adhibito, ut infestus humor citra molestiā ac conuulsionem educatur. Forinsecus autem adhibita languido stomacho cōferunt hæc, ænanthe, balaustium, rosa, cithyni, myrtus, sinynij coma, scœniculi semen, cum uino cataplasmatiss modo adhibita, addita etiā galla, aut cumino, aut absinthio, Palmularum item carnes uino coctas aut maceratas, tritas pro emplastro imponere prodest. Aut mala cotonea cum posca trita, rosaceo uel nardino cerato excepta, addito croco, Aut lanam succidam, aut linteolum uino & oleo, aut aceto & oleo, uel rosaceo & aceto, aut nardino & uino imbuo, & stomacho adhibeto. Morsus enim & stomachi puncturas mitigant. Præterea calidam aquam, non tamen seruidam assidue absorbere, & sensim assidue obambulare, & præcordia molli lana integere, fovere ac inungere, & ante cibum infernas partes pro uiribus exercere, hæc omnia ad sanitatem assequendam mirifice faciunt.

De tumoribus pedum in prægnantibus.

Cap. XI

Pedū tumores in prægnantibus, rosaceo & aceto, & sale aliquando addito, perfricato. Prodest & terrā cimoliā cum aceto illinere, aut alumen scissum cum uino. Bonum est & citriorū malorū decocto pedes lauare. Et anthyllim aceto maceratam obligare, & brassicæ folia per latum distenta imponere ac obligare.

Cura prægnantibus adhibenda. Aspasie.

Cap. XII

Prægnantes quæ recens conceperunt, à timore, tristitia, ac omni fortitudo perturbatione asseruandæ sunt. Prohibendæ etiam gestationes in curribus, & uiolenta exercitia, ac spiritus detentiones, & coxendicum ictus. Neque uero permittendum est, ut graue onus eleuet, aut saltet, aut duris sellis insideat. Sed nec acris edulia nec flatuosa, nec clysteres acutos, nec cibi aut potus inopiā aut superfluitatē concedemus. Sanguinis etiam effluxio siue e naribus, siue ab hæmorrhoidibus, aut alio quocumque loco, prægnantibus periculum inducit. Quapropter alimentis utendū est moderatis, & stomacho cōmodis, leuicæ gestatione, leni deambulatione, molli frictione, & lanificij exercitio. At circa octauum mensem qui omnium molestissimus est, alimentū cōtrahendū est, & motus uehementiores præscribendi. Et si aluus suppressa fuerit, ob intestini recti angustias ab utero illatas, edulia exhibeantur uentri subducendo apta, uelut est pitisanæ succus, rumex coctus, malua, lactuca. Ceterū mense nono relaxandi corporis gratia, balneo frequenter utendū est, & omni modo prospiciendū, ut paritura futuros partus dolores fortiter ferre possit.

Notæ partus secundum naturam futurū.

Cap. XIII

Parituris pectinis ac superioris uentris grauitas, pudendiq; ardor adest. Et uterus ad pudendū procumbit, ut obstetrici facile sit per cōtactum tentare. Os quoque uteri disparatū ac dilatatū est, & ad tactum leue ac humectū percipitur. Partu autē instante, superior uenter contrahitur, & inguina ac pubes intumescunt, & assidua mingendi cupiditas adest. Deinde plurimus humor prodit, plerisque etiam sanguis tenuioribus secundæ uasis ruptis.

Parientibus faciendū.

Cap. XIII

Quæ præparare oportet, & quomodo secundum naturā parientibus consulendum sit, superuacuum fuerit scripto prodere, quā ex longo usu nō modo obstetrices, sed reliquæ quoque mulieres ista sciant. De hoc tamen uelut necessario admonēbimus, quod parientes spiritum detinere oportet, & ad inferiores partes propulsare, non uelut imperitæ aliquæ faciunt in gutture congregare. Inde enim

nem repertum, sinistro brachio alligatum. Sardonius quoque lapis prodest superiori uentri appensus, donec dolores partus instant, & tunc ablatus. Lapis item in uulua, aut corde, aut intestinis ceruarū repertus pro amuleto gestetur: est enim ad retinendos foetus efficacissimus. Iisdem uiribus praeditus est lapis qui trunco arboris pro cunei more impingi solet.

Pariendi difficultatis causae.

Cap. XXII

Pariendi difficultas varijs de causis contingit: aut enim eo quod puerpera animo aut corpore, aut utrisque simul imbecilla est, aut ob uteri paruitatem, aut propter meatus angustiam. Quaecumque autem propter etatem staturae breuioris sunt, haec ferè uterū reliquis corporis partibus correspondentē habent. Potest & difficultas pariendi contingere: aut ob ceruicis uteri obliquitatem: aut ob carnem eidem ceruici uel osculo eius adnatam: aut ob eiusdem loci inflammationem, uel abscessum, uel duriciam: aut quod tunicam ambientem solidiorē foetus perrumpere non potest: aut quod humor in utero collectus ante debitū tempus excretus est, & iuxta partus tempus sine humore ac sicci manent loci, quando maximè opus est hoc humore, ut qui facilem transitū foetui exhibeat: aut quod puerpera uel si cae calculo laborat, qui dum uteri collum comprimit difficultatem pariendi inducit: aut ob praegnantis carnositatem siue pinguitudinem. Sed & ossa pubis nimium conferta, pariendi difficultatem faciunt, dum in partu dilatarī non possunt: neque enim uelut in uiris, ita in mulieribus ossa pubis alternatim cōseruntur, sed fortī copula cōnectuntur. Contingit item pariendi difficultas ob nimiam lumborum cauitatem uterum comprimentem: aut ob excrementorum copiam, in intestino recto aut uesica detentam. Aliqua etiam prouecta aetate debilitate aegre pariunt. Aliae quod primū parere incipiunt, anguntur, & propter imperitiā corpus apte praeparare ignorāt, aut quod per aetatem nondum uiriles sunt, nec uires uigoris adepraesunt, sed adhuc puellae pueriliter agunt. Difficilis praeterea fit partus quum foetus totus, aut pars magnitudine excellit: sepe enim caput, uel thorax, uel uenter, plus aequo augetur: aut quum debiliior est foetus, & saltibus ac motibus suis matrem adiuuare non potest: aut quum biceps est aut tripes: aut quum gemini prodeunt, & repente uterque simul collo uteri illabitur: aut quum foetus interiit, & parturienti nihil auxilij praebet: aut quū mortuus intumescit, & praeter naturam iacet: situs enim prodeuntis foetus naturalis est, ut recta in caput, manibus ad utrumque foemur extentis prodeat. Praeter naturam uero caput in dextrā uel sinistram uteri partem declinat: aut altera, aut utraque manus exeritur, & crura intus inter se diducuntur. Reliquis tamen figuris minus suspecta est ea quae in pedes contingit, praecipue si manibus super utroque foemore extentis prodeat. Foetus uero qui altero pede prodeunt, altero intus detento, aut duplicati alicui uuluae parti innitunt, directione indigent, sicut & qui manus expansas habent. Caeterū qui obliqui prodeunt, minus improbandi sunt, & hoc tripliciter contingere potest: aut enim in alterutrum latus, aut in uentrem prodeunt. Sed tutius est in latus progredi: ita enim obstetricis manui locus datur, ut in caput aut pedes nascentem dirigat. At qui duplicati prodeunt, in pessimā figuram illapsi sunt, maximè si in coxarū uertebras deferant. Tripliciter autem duplicari solent: nam uel capite & cruribus, uel uentre, uel coxarū uertebris, osculo uteri incumbunt, uerū praestat uentrem incumbere, eo enim a nobis dissecto, & interaneis exceptis, cōsidente corpusculo facilis est figurae transmutatio. Difficilis item fit partus, si secunda aut propter crassitudinem non abruptitur, aut propter tenuitatem antequam oportet diuellitur. Porro ab externis causis pariendi difficultas oboritur,

DD 4 uelut

uelut si anni tempus frigidum & hyemale meatus cōstrinxerit, aut calidum & aestiuum exoluerit, Hæc omnia de muliere ægrè pariente medicū percurrari ex obstetrice oportet, nec temerè ad chirurgiā progredi. Neq; uero obstetrici permittendū est ut uterum diutius dilaniet. Si ergo ob lumborum cavitatē pariendi difficultas contigerit, puerpera in sella, prona flexis genibus collocetur, ut uulua delabens ceruicē rectā extendat: eodē modo sistantur etiā pingues ac carnosæ, si uero propter aliquam angustia, aut stuporē, aut coarctationē, opem ferre oportet laxationi per infusus calidos, & suffusiones, ita ut etiā aer domus calefiat, & per infusiones oleorum, tum tactu, tum potentia calidorum, itemq; per illitiones ac cataplasmata eiusdē generis. Adhibenda quoq; sunt laxamenta à balneis, si non febris aut aliud quid prohibuerit, & ex gestatione lectica in loco calidiore. Quidam etiam concussiones fortes in his adhibuerunt. At uero eam quæ ob exolutionē imbecilla est ad partum corroborare oportet condensationibus ac maximè cōstringentibus, & firmitatē inducentibus: qualia sunt respirationes ac infussiones ex myrto aut pampinis uitis, aut malis punicis, aut rosifis. Et odoramenta cum aceto, & ungenta ex uino & oleo rosaceo frigidis: si uero propter figuram præter naturam ipsius foetus, partus difficultas adest, ad naturalem situm reducendus est, quantum eius fieri potest. Et si pedem aut manum protulit, ne attrahatur per membrum: magis enim impingitur, aut luxatur, aut etiam abruptitur. Verum per digitos humero aut coxæ foetus admotos, promissa pars ad conuenientē locum introducatur. Si uero unā cum coarctatione, totius foetus figura mala fuerit, prius ab osculo uteri in subline eleuetur, & postea rursus ad osculum rectā dirigatur, fiantq; omnia placidè, leniter, ac citra cōpressionem, oleo assidue locis affuso: hoc enim ex salute tum foetus, tum parientis fuerit, & uterus ita quoq; illatus manet. At si uteri osculum clausum permanferit. Pinguibus medicamentis emolliatur ac relaxetur. Quod si uero calculus affuerit, eum extra uesicæ collum per catheterem propellemus, & si uesica lotio plena fuerit, eodem catheteris instrumento lotium educemus, si uero intestinum rectum excrementis plenum fuerit, per clysterem eluamus. At si ob inflammationem, abscessum, ulcus, tumorem laxum, aut duriciam, aut simile quiddam mulier parere nequeat, singulis pro affectionum ratione succurremus. Si uero ob carnem collo uteri adnatam, aut ob tunicam aliquam innatam solidiorem, partiendi difficultas eueniat, uelut in non perforatis mulieribus accidit, quicquid impedimento fuerit rescetur. Et si solidior fuerit, membrana foetum ambiens quā ut abrupti possit, discindatur. Quibus uero humor in tunicis contentus ante debitum tempus effluxit, ita ut loci sint resiccati, eis albumina ouorum cum maluæ aut fœni graci decocto excolato, aut cum ptisanæ cremore tepido infundantur. At si uteri paruitas in causa fuerit, loca pinguedine aliqua inungantur, ac foueantur, & os uteri digitis dilatetur, & foetus uiolenter extrahatur. Si uero non successerit, dissecetur. Quod tum maximè faciendum est, ubi foetus fuerit magnus, aut mortuus. Mortuum autem cognoscemus, ex eo quod ad tactum frigidus occurrit, & motu caret. At si gemini aut tergemini fuerint, ac collum uteri obsederint, reliqui ad fundum uteri repellantur, & is qui magis paratus uidebitur prius educatur. Si uero ob capitis, aut thoracis, aut uentris magnitudinem, partus difficilis fiat, omnino necessarium est foetum secare. Porro tempus collocandi puerperam in sellam, est quum uteri osculo aperto, digitis occurrerit ac prominuerit id quod prærumpi solet.

De fœ

De foetus extractione ac exsectione. Philumeni. Cap. XXIII

Medicum ante exsectionis aggressionem spectare oportet, resoluta sit ne mulier aut non. Et an seruari possit, uel sit deplorata. Et seruari quidem potentem aggre-
dientur, deplorata uero relinquet. Quae igitur lethaliter affectae sunt, lethar-
gico sopore premuntur, & resolutae sunt, ac difficulter reuocari possunt. Et ad
maximas inclamationes reuocate, debiliter respondentes rursus deferuntur in
soporem. Quaedam etiam per conuulsionem contrahuntur, aut neruis tremu-
lae fiunt. Et pulsus fortiter tumidus, uerum obscurus ac debilis deprehendi-
tur. At uero seruandae, nihil tale patiuntur. Mulier itaque supina in lecto de-
cumbat capite decliui, eleuatis cruribus, teneaturque utrinque a peritis ac robu-
stis mulieribus. Ac primum duae aut tres buccellae panis uino imbutae offerantur
ad arcendum animi deliquium. Et in ipso opere assidue facies uino resperga-
tur. Chirurgus autem difficultatis causam per instrumentum pudendum didu-
cens conspicatus, thymus ne sit, an callosa eminentia, aut aliquid ex his quae re-
tulimus, quicquid id fuerit uolsella arreptum scalpro amputabit, uelut postea
docebimus. Si uero tunica uteri os obstruxerit, eam quoque resecat, sicut inte-
rius de non perforatis mulieribus trademus. Si uero pelliculae foetum ambien-
tis soliditas obliterit, eam uolsella extentam cultro aculeato incidemus, & in-
cisam digitis dilatabimus, & locum idoneum ad foetus egressionem parabimus.
At si caput foetus locum obstruxerit, in pedes uertatur, atque ita educatur. Quod
si ita impactum fuerit, ut nullo modo retrudi possit, uncinus attractorius ocu-
lo, aut ori, aut mento infigatur, & ita infans extrahatur, hoc modo ut instru-
mentum tractorium in dextra manu teneatur, uncinus uero ipsius digitis oc-
cultatus per sinistram manum leniter cointroducatur, & in aliquo ex dictis lo-
cis figatur, & deinde alterum instrumentum ex altera parte oppositum simili-
ter immittatur ac infigatur, ut aequales & ad neutram partem declinans attra-
ctio fiat, eaque tutior, ne forte unum instrumentum in attrahendo elabatur, ac
foetum dimittat. Atque ita aequaliter non solum in directum, sed etiam ad obli-
qua trahatur, & digitus pinguedine aliqua illitus, intra uteri os, & impactum cor-
pus immittat, & circumcirca ducatur. Dimidio autem foetu extracto, attractorium
instrumentum ad superiores partes transferatur ac infigatur. At uero si caput,
uel natura, uel hydrocephala affectione aquosa, magis tumidum impactum fue-
rit, scalpro incidendum est, atque ita euacuatum ac contractum extrahendum.
Quod si nec sic prodierit, caluam contundere oportet, & ossa digitis eximere,
si uero ossa minuerint, per forcipem dentarium aut ossarium auferre, ac tum-
demum instrumentum attractorium infigere, ac foetum extrahere. at si capite progres-
so, circa thoracem coarctatio fiat, itidem scalpro loci circa clauiculas dissecant usque
ad uacua, ut humore euacuato, moles thoracis consolidat. si uero minus uenter in-
flatus fuerit, mortuo foetu aut hydropico existente, eadem methodo utentes uentrem
dissecabimus, ac intestina eximemus, si uero manus protensa fuerit, ab hume-
ro resecat: oportet autem linteo obuolutum ut ne elabatur, aliquantulum extrahere,
quo sic humeri articulus exeat, & tunc diductis pudendi labijs resectionem face-
re, & postea sinistram manum immittere, ac caput dirigere, & ita foetum educere: idem
faciendum est etiam ubi ambae manus fuerint protense, similiter etiam pedes proten-
sos reliquo corpore non consequente, ab inguibus rescare oportet. At si dupli-
catus foetus occurrerit, & dirigi non poterit, si caput magis expositum fuerit, ossa
eius coteremus cute non dissecta, deinde alicui eius parti attractorium instrumen-
tum infigemus ac attrahemus, & cruribus directis educemus. Sed si crura ma-
gis

gis exposita fuerint, coxæ articulum resecabimus, et ita coxas transgrediemur, ut caput fiat contritioni facile paratū. Si uero duplicatio pertinacior fuerit pedibus magis expositis, caput circa coarticulationē ad uertebra amputetur, deinde transgresso thorace pedes attrahantur. Si uero reliquis partibus ablatis, caput recurrēs detineat, sinistra manus oleo illita in uteri profunditatē immittat, & caput requiratur, & per digitos ad uteri os deuoluatur, & unum aut duo attractoria instrumenta infigantur. Ceterum loci ad infigendum instrumentum idonei, in capite sunt oculi, aurium meatus, os, menti pars inferna. In thorace axillæ, clauiculæ, præcordia, pectus, uerterbarum articuli, iugulum. In cruribus ossa pubis, foemineum pudendum, at uero si osculum uteri ob inflammationē fuerit conclusum, nihil uiolenter agendum est, sed infusionibus pinguibus largē utendum, in sessionibusq; ac irrigationibus & cataplasmatis, quo inflammatione aliquatenus sedata, & osculo dilatato, foetus uelut dictū est educatur. Vbi uero integram foetus sectionem fecerimus, omnes eius partes componantur, diligenterq; obseruemus ne aliqua desit, aut interius clam nobis relinquatur. Deinde Secunda protinus educatur.

De Secundæ educatione. Philumeni.

Cap. xxxiii

Si Secunda, quæ etiā lóculus appellatur, & Secunda quidem dicitur, quod uelut secundum domiciliū ac receptaculū sit ab utero, & uelut foetus indumentum, si Secunda inquam, detinetur, interdum uteri os clausum, interdum apertum reperitur, & aliquando inflammatū, aliquando citra inflammationem. Et modo uteri fundo coniuncta secunda reperit, modo seiuncta, si ergo os uulue apertum, & secunda seiuncta reperitur, circa aliquam uteri partem instar pilæ conuoluta, facilis est educatio. Sinistram enim manum calidam & pinguefactam in profundum immittere oportet, & arreptam secundam extrahere. Si uero uteri fundo connexa fuerit, similiter quidem manum immitemus, uerū apprehensam secundam nō statim rectā attrahemus, propter prolapsus uulue timorem, sed sensim nulla uiolentiā adhibita primum in obliquum placidē duccimus, hac & illac obuertentes. Deinde aliquando ualidius attrahemus. Si enim obedit & a concretiōe exoluitur, At si uteri os clausum fuerit, perfusionibus pinguibus utemur, & per sinistræ manus digitos leniter aperire, ac paulatim dilatare conabimur. Et si nō successerit, superiorē uentrem ex cruda ordeacea farina aqua calida ac oleo subacta integere oportet, rursusq; locos perfundere, pinguiatq; fomenta adhibere. Et si uires non fuerint debiles, etiā sternutatorijs utendum est, ex castorio ac pipere præparatis, & potionibus menses cientibus, de quibus postea agemus. Atq; hæc omnia prima ac secunda die facienda sunt. Suffitibus insuper utemur per aromata ex olla, qualia sunt calia, nardus, iunci odorati flos, artemisia, iris, sabina, dictamnium, pulegium, & huiusmodi, ita ut olla sellæ supponatur, cui mulier insideat undique uestimentis connecta. Postea uero tentabimus, & si uteri osculum apertum inuenierimus, manum immitemus, & sicut dictum est, secundam educere conabimur. Si uero neq; sic educata fuerit, perturbari non oportet: intra paucos enim dies putrefacta, & in saniem dissoluta excidet. Quandoquidē uero ob graueolentiā caput replet & obturat, ac stomachum subuertit, odoramenta assidue suffiantur conuenientia, & ad hunc usum probata sunt, cardamomum, carica, bdellium, sabina, thus, styrax, lapis gagates, onyx aromaticus, ladanum. Eisdem quoq; castorij ac pulegij sing. dra. i. ex aqua mulsa bibenda detur. Conueniunt etiā leniora menses ducentia, artemisiæ decoctum, & baccarū lauri, cum uino mulso.

Pellā

Pessi etiam subditi ad hoc faciunt, myrrha & cyclaminus ungento excepta. Facit item ovis & caprae secunda arefacta, trita, e uino pota. Aut cum ungento subdita. Aut pro amuleto gestata. Alius pessus. Carnium uuarum passarum, cumini, resinae, terebinthinae, spumae nitri, singul, drach, x. excipe melle ac subde. Idem possunt & infussiones in artemisia, baccarum lauri, anethi ac chamameli decoctis.

Cura post foetus exectionem, Aspasiae.

Cap. xxv

Postquam secunda siue statim ab educto foetu, siue postea educta fuerit, neque quicquam superuacuum in utero relictum, crura componantur ut partes distractae conueniant. Et si loci satis purgati uidebunt, maluae aut foenigraci decocto eluantur, & oleo calido perfundantur. Eodemque lumbi ac pubes perfundantur, molliq; lana oleo calido imbuta integantur. Et alimenta forbilia offerantur, & aque potus uietur. At si purgationes non suffecerint, infussiones ex foeni graeci, artemisiae, althaeae, pulegij decoctis adhibebimus. Pulegij item ac foeni graeci decoctum propinabimus. Si uero purgationes nimium processerint, irrigationes moderate adstringentes, ac infussiones consimiles adhibeantur, & uenter longa fascia uinciatur, & cibi adstringentes offerantur. Si uero inflammatio superuenerit, inflammationi succurrendum est. Et si copiosa sanguinis eruptio, etiam ipsi medendum est, cum his quae postea referemus. Si nihil horum acciderit, uteri collum ac osculum, & pudendum pinguitudine aliqua inungantur ac foueantur.

Causae sterilitatis itemque curatio in uiro ac muliere. Nota item conceptionis.

Cap. xxvi

Sterilitas aut uiri, aut mulieris, aut utriusque ratione contingit. Et ex uiro quidem est, quum semen eius uel feruidum & uelut torrefactum, uel frigidum, tenue, aquosum, languidumque fuerit, quale est decrepitorum. Vel crassius quam oportet emittitur. Aut quum uiri semispadones sunt, & penem breuissimum habent, ut semen in uuluae profunditate eiaculari non possint. Quod etiam aliquando ob nimiam obesitatem contingit: tales enim praenimia aqualiculi mole, semen ad uteri recessus non eiulantur. At uero mulier non concipit, si uterum habet uel calidum & igneum, uel frigidum & humidum, uel squalidum ac siccum, uel carnosum & pinguem, uel excarnem ac gracilem, aut debilem, aut angustum, aut breuem. Aut quod uasa eius clausa sunt & obstructa, aut per cicatricem inductam excacata. Aut quod membranae osculum uteri obturantes, nullum foramen relinquunt. Aut quod uteri ceruix obliqua est. Aut quod osculum nimis angustum uel amplum. Aut quod alia aliqua affectio ex inferius recensendis uuluae impedit. Sed et inuiti coitus inanes ac steriles sunt. Amor enim genituram conciliat, & propterea foeminae amantes crebro pariunt. Aetas etiam uel iunior uel prouectior conceptionem impedit. Quapropter primum pubescentes a Venere prohibendae sunt, ita ut uir quidem trigessimum annum, mulier uero decimum octauum attingat. maximè uero inepta mulieris forma sterilitatis occasio est: foecunda enim mulier habere debet proceritatem corporis moderatam, lumbos et superiorē uentrem latos, nates eminentes, pectus angustum, mammas amplas: tales enim mulieres foecundae, his autem oppositae steriliores sunt. Potest & praeter enumeratas causas, aliqua magis recondita esse. Verum tot ferme sunt quae noscuntur. Viri itaque qui ob deprauatam uictus rationem semen corrumpunt, ad magis compositum ac salubriorem uictum conuersi, seminis foecunditatem acquirunt. At qui alienis foeminis delectati propriam

prijs uxoribus non cōueniunt, seruata temperantia generabunt. Qui uero seminis profluuiū laborant, curati fecundi fiunt. At qui genitura meatus occatos habent, uelut quidam quibus calculi execti sunt, eos pro deploratis habebimus. Sed neq; semispadones ac nimis angustis meatibus præditi, semen excernunt. At uero ubi uir & mulier bene se habent, neq; atas, neq; corporis habitus, neq; aliqua uteri affectio obstat, tali uictus ratione utemur, ut neq; nimio labore, tum uirum, tum mulierem defatigemus, neq; prorsus ociosos esse sinamus. Hoc enim superfluitatibus corpus replet. Illud sanguinē siccāt, & purgationes consumit. Balneis utant neq; assiduīs, neq; copiosis. Cibus ac potus concocti faciles, & quos uenter superare potest sumant. Hoc uero uelut maximū negligendum non est, ut nec uir nec mulier pinguem habitū acquirant. Tales enim inepti sunt ad pueros gignēdos: nam neq; pudenda inter se adaptare possunt, & uiri parū seminis emittunt, & mulieribus menses pauci feruntur, quum maxima alimentī pars in pinguedinē transeat. Ceterum quomodo pingues se gerere debeant, Sermone quarto de carnū subuersione diximus. Cōuenit & cibus ac potus uenerē stimulantē ac semē generantē assumere, atq; tales sunt qui calfaciunt & inflant. Vinū igitur aquæ præferendū est. Et ex oleribus prædest horminū, eruca, & irio, ac similia. A ruta uero menta q; ac calaminta penitus abstinentū est: menta enim semen quidē multum, sed debile ac languidū gignit. Ruta uero corrumpit. Illud autē obseruandū est, lunari purgatione appetente oportunissimū concipiendū tempus esse. Tunc ergo mulieri ex uberiore alimento aliquid detrahendū est, & cibus moderatus, attenuans, ac boni succi exhibendus. Omnibus tamen alimentis ammiscenda sunt quæ purgationē irritare possunt, uelut sunt olera odorata & acra, scandix, crethimon, sceniculū, gingidiū, apiū, smyrniū, asparagus palustris, & similia: spes est enim probē purgatam priusquā uterus refrigeretur concepturā esse: quod si à cōcubitu conceptionis notæ apparuerint, spes rata erit. Cōceptionis notæ sunt, si uteri os clauditur ac siccū est, & à pudendo recedit. Imò peritiores scēminæ post semen immissum, uterum moueri percipiunt: mouetur enim ad genituræ complexum. Quibusdā præcordia exiliunt, alijs oris uentris dolor ac exolutio cum uoluptate quadā accidit. Est & hoc non exiguū indicium, si mulier urinę stillicidio uexatur, quod præcipuē patiuntur, quæ primum concipiunt, & quæ menstruas purgationes integrē nō exegerunt, quanquam idem etiam alijs usq; ad septimū diem aliquatenus accidit. Post septimū autem obscura quædam picæ signa oriuntur, acidorum ac salforum desiderium, uertigines, pallor, somni longiores. Eodem etiam tempore menses citra molestiā detinentur. Mas autem uelocius ac uelocius in dextera parte magis mouetur: Foemella debilius & tardius, atq; in sinistra. Atq; hæcenus de præseruatione dictum sit. Nunc quomodo singulæ affectiones conceptionem impediētes curandæ sint, dicetur.

Frigidioris uteri signa ac curatio.

Cap. xxvii

Si mulier ob uteri frigiditatē non concipit, exercitijs omniq; fomentorū genere calorem reuocet: neq; incōmodum fuerit castoriū, cuminum, anisum, pulegium, & alia huiusmodi bibere, & singulis piper ammiscere. Vtilius tamen hoc medicamēto purgabitur. Epithymi, euphorbij, piperis, dauci, petroselinī, singulorū æquales portiones bibat, sit autē totum drach. ii. hoc & aluum ducat, & uulnam calefacit, ut multis prius nō purgatis hinc menses eruperint. Quod si purgatio per inferna non suffecerit, uomitus quoq; prouocetur origani aut thymi decocto ante & post cibum, omni studio adhibito ut pituita euacuetur.

A uomī,

A uomitu uero castoriũ & prædicta semina bibat. Vteri uero fomēta fiunt per suffitus & uapores, arundine ollæ operculo perforato inserta, ita ut uapor intra pudendum excipiat. fiunt etiā per affusiones aquæ calidæ, in qua decocta est artemisia, saluia, ruta, cuminũ, pulegium, cyperus, acorum. Possunt & hæc lingua pectini imponi cataplasmatibus modo. Confert & polyarchiũ epithema, & quod Amythaoni inscribitur, & reliqua huiusmodi. Pecten item ac coxæ irino & amaracino ac cyprino oleo perfricentur. Et pessus ex myrrha, ruta, galbano & castorio paratus uulvæ subdatur. Possunt etiā aliquando ualidiora ammisceri, uelut est piper, sal, fel bubulum. Validum est elaterium, sed minime molestum. Fiant quoq; ex aqua mulla, aut marina per se, uel aceto ammixto fomenta. Prædicta tamē medicamenta molli lana excepta adhibeantur, ut ne corpus mordeant, & exulcerationē faciant: neq; difficile est ipsorum quantitatem metiri: pro affectionū enim magnitudine ac diuturnitate, medicamenta sunt augenda aut minuenda, mora item longioris aut breuioris temporis trahenda in ipsorum usu. Cæterū uterorum frigiditatē ex mensibus suppressis coniectamus. Neq; enim præ nimia crassitudine cōmodē deferunt. Sed & stupidus sensus circa pectinē, lumbos, ac crura percipitur. Aliquæ etiā penitus crurū impotentes sunt. Quod si prorsus perfrigerata fuerint, ne uenerem quidem appetunt, & uteri osculū contrahunt. Atq; hæc de uteri frigiditate sufficiunt.

Calidioris uteri signa & curatio.

Cap. XXVIII

Vterorū caliditas ex reliqui corporis caliditate coniectatur, & ex mensium paucitate cum dolore prodeuntium, ita ut pudenda mulieris exulcerent. Sed & quæ prodeunt nigriora sunt, & ob nimiam puncturā nullū ordinē seruant. Sequitur etiā ad hanc temperaturā insignis salacitas, & totius corporis siccitas. His itaq; cōueniunt humectantia ac frigefacientia, qualia sunt ex oleribus quidam lactuca, malua, blitum, cucumis, cucurbita, pepo, atriplex, & portulaca. Item alij conuulsi cibi. Vinum uero tenue sit, & album, ac aquosius. Somnus autem longior, & aquarū dulcium balnea. Ad uesciā uero, & summum uentrem ac lumbos, frigefacientia adhibenda sunt, uelut est solani aut umbilici ueneris succus, rosaceo ammixto lana exceptus. Idē & in pudendū cōmodē subditur. Mercurialis itē lumbis ac pectini imposita, utero calidiori prodest. Spuma quoque argenti & cerussa cū aqua trita. Horū autē omnium quantitatem recte metieris, si semper singula multum posse arbitratus, perfrigerationis excessum caueris.

Humidioris uteri curatio.

Cap. XXIX

Quæ ob uteri humiditatem non cōcipiunt, eas sicciore diæta uti cōuenit, multumq; exerceri ac fricari, & euacuationis ac auersionis gratia aliquando post cibū, aliquando ieiunas uomere, & moderato cibi usu reliccari, & carnes assatas potius uigentiū ætate animalium, ac pisces duriores comedere, & uinū potēs meracum quidē, sed parcius bibere. Sicca etiā fomēta crebro: balnea uero raro adhibenda sunt. Cæterū qui statim à principio resiccantia ac adstringentia uterō adhibent, non parū lædunt: cohibita enim materia ad principales partes decurrit. uerum ubi totum corpus purgatū fuerit, tutius deinde utero adstringentia corroborantia adhibent. Quale est lentisci decoctum, & myrti, ac rosarum, & rubi tenerorū uirgultorum, & polygoni fœminæ decoctum: mas enim graminis magis similis est, flore puniceo, folijs rutæ similibus, semine intra folia pusillo. Poterit tamē etiā huius decoctū ieiunæ cōmodē in potum dari. Ad nimiam quoq; uteri humiditatem huiusmodi potiones cōueniunt. Myrti baccas, aut malicorū punici dulcis, cū uino terito ac exhibeto: aut auellanas nuces uistas cum

EE uind

uino tritas propinato. Hoc aut epithemate utendū est. Psylliū tusum, & palmarum carne cū aqua malsa trita exceptū apponito. Aut mala cotonea similiter palmulis ex cepta adhibeto. Siccioris uteri curatio. Cap. xxx

Mulieri quæ ob uteri siccitatē nō concipit, humidiora alimenta exhibenda sunt, & reliqua uictus ratio humidior consuetuenda. Toto enim corpore humectato, uterus quoque eadem qualitate participabit.

Diuerfarum affectionum ob quas mulieres non concipiunt curatio. Cap. xxxi

Si propter humorum crassitudinē mulier non concipit, humorē considerare oportet, & mordentē sero lactis purgare, heminis quinque paulatim exhibitis. Cibos item boni succi offerre, & uomitū per interualla ciere. Pituitosos autē & aquosos humores, laboribus & exudationibus, ac uomitibus crebris euacuare oportet. Quandoquidē uero etiā flatus in utero existentes, conceptionē impediunt, & flatus ab imperfecta cōcoctione fiunt, primū quidē parcius cibis exhibendus est, deinde danda quæ flatus expellūt, uelut est ruta, cuminū, anethū, ac reliqua familiaria semina, & pleraque aromata, quæ etiā subdi possunt, præsertim ruta cū melle ac modico nitro. Possunt ex iisdem etiam fomenta parari, & cataplasmata ac cerata, ad pubē imponenda. A leguminibus autem & edulj dulcibus ac flatuosis omnibus abstinendū est. Si uero cōclusi fuerint uteri, odoratis perfusionibus, & mollitorijs ex adipe anserino paratis aperiendi sunt. A mollioribus tamen infestationibus ac perfusionibus incipiendum est, ex malua, semine lini, ac feno græco, & oleo, & aliquando melle paratis. Deinde ad ualidiora transeundum, artemisiā, conyzam, calaminthā, pulegium, amaracū & chamæmelum. Atque his adiciendū est irinum ac cyprinū oleum, ac mel, myrrha uero troglodytica, terebinthina, nitū, casia, caricarū carnes, unguentū amaracini, & huiusmodi subdantur. At uero his quæ ob uteri os nimium hians non cōcipiunt, conueniunt uictus, et fomenta, ac medicamenta sicciora ac adstringentia. Talia sunt gallarum decoctum, cytini, lentiscus, rubi radix, myrtus & eiusmodi. Vteros uero distortos mollientibus fomentis dirigere ac corrigere oportet: fomenta enim ad hoc maxime faciunt, & pessos mollitorios subdere. Quin & specillo & digito correctio eorum facienda est. Maxime uero pulegij & artemisiæ decoctū, & castorium ē posca potum, utero distorto conferunt. macorum adhibitionē, quæ conceptionē prohibent, mulier non cōcipiat, eius pharmaci facultas consideretur, nunquid humoris attractione semen eluerit, aut flatuum multitudine idem eiecerit, aut per adstrictionē os uteri obturauerit ac seminis accessum interceperit. Et deinde singulis affectionibus succurratur, perfusionibus ac infestationibus congruis. Hæ uero maxime utiles fuerint, si osculum & acetabula uteri fuerint adstricta. Pinguia etiam cuncta ac fomenta adhibenda sunt, & quæ humiditates attrahere possunt. Ceterum medicamenta sterilitatē inducentia, quum uasa uteri excauant, incurabilem plerumque affectionem faciunt. Et tamen non statim omnes uires adimunt: quædam enim potiones cæcitatem curabilem inducunt, cui si protinus subuenias mederi possis. Quemadmodū enim lethalia uenena uomitu, aut clysteri, aut medicamento cōgruo exoluuntur, temporis uero progressu nullo modo corrigi possunt, sic & quæ ualidam sterilitatē inducunt, aliquando depellere datur, si statim opem feras, si uero diutius perseverauerint, incurabilia euadunt. Porro ulcera & inflammationes uteri quomodo curare oporteat, item carnis ex crescentias, thymosque

mosq; ac tunicas auferre, singula suis locis ex ordine dicentur. Superuacuum est enim eadem saepe dicere. At uero si nulla re infesta, nec in utero, nec in reliquo corpore apparente, incertum fuerit cur mulier non concipiat, alinino lacte ipsam purgabimus, cibisq; boni succi alemus, & fomentis suffusionibusq; odoratis, & pellis subditis, uteri os aperientibus, & sanguinem attrahentibus, utemur, ueneremq; per duos aut tres menses prohibebimus.

Potiones, pessi, & suffitus ad conceptionem. Cap. xxxii

Mercurialis cum castorio, item absinthium, tribus aut quatuor diebus consueto mensium tempore in potu exhibeto. Est & haec potio ad conceptum efficax. Salis ammoniaci dra. ii. saluiae, cumini, sing. dra. i. omnia simul per triduum menstruis desinentibus cum uino praebeto. Alia. Nigellae, salis ammoniaci, singul. dra. i. cyperi dra. vi. simul terito & in quatuor partes diuidito, & unam singulis diebus cum uino bibendam dato, menstruis desinentibus, & postea cum uiro congregiatur. Sed & uirum strenuam operam nauare oportet, interimq; a uenere abstinuisse, & boni succi cibis nutritum esse. Pessi uero subscripti conueniunt, praesertim si ex humorum mucositate infœcundae fuerint, poterisq; ex his, congruum singulis affectionibus medicamentum eligere. Pessus Asclepiadae, utero purgando idoneus. Cyperi, nitri, aluminis scissi, myrrhae, thuris, croci, spumae nitri, mellis, aequales portiones cum modico pipere tritas melle excipe, & pessum inde tenui linteo aut lana pura inuolutum ac rosaceo imbutum, mulieri prius elotae subade. Vtere etiam elotione purgatoria admiranda supra ad bimestrem aut trimestrem foetum abortientes descripta, ex colocynthide & oleo irino. Alius pessus purgatorius. Succus cyclamini, medullae colocynthidis, nitri rubri, mercurialis, singul. drac. i. i. i. myrrhae dra. ii. omnia seminis lini decocto excipe, & utere post menses purgatos uelut dictum est. Alius. Medullae colocynthidis, myrrhae, nitri, cumini Aethiopici, singulo, unc. i. excipe carne caricarum, & utere post menstruum purgationem. Alius. Anisi cardamomi, nitri, aristolochiae, pulegii, foeni graeci, carnis caricarum pinguium, singul. drach. ii. arida terito & cribrato. Carnes autem caricarum passo subigito, eisq; arida excipito, & in cornea pyxide seruato. Deinde usu expetente columbini oui magnitudine accipito, & irino oleo madefactum ad uteri osculum subdito. Huiusmodi pessi mucosos humores educunt. Sufficiente uero purgatione facta, infestationes adhibeantur. At uero quoniam non ea solum quae uterum purgant conceptioni conferunt, sed alia etiam medicamenta ad parandam foecunditatem descripta sunt, ea etiam iuxta ueterum traditionem subiungemus. Pessus ad conceptionem idoneus. Coaguli leporis partes ii. aluminis scissi partem i. melle excipito, & pessum formato, ac utitor ubi prius uterus per praedicta fuerit purgatus. Alius. Seminis satyrii, mellis singulorum sexunciae in pessum efformato: aut uellicae felis dorcadis aut hirci euacuato, & ex uiscoso intus reperto pessum formato, & paululum ante congressum subdito, aut penem ex eo illinito. Aut purpuram ueram hircino felle imbutam, mulieris umbilico per septem dies imposito, & deinde crescente luna uiro cogrediatur. Alius. Dorcadis, haedi, leporis coagulum, & fel. cum sanguine & adipe agnino, & medulla ceruina, post purgationem subdito. Nardini etiam ac rosacei olei aliquid addito. Alius, quo Asclepiades in nobilibus foeminis utebatur. Myrrhae drac. i. i. i. iridis, stercoreis leporis, sing. drach. ii. cum aqua in collyria efformato ac subdito mensibus desinentibus. Et postea cum uiro misceatur. Alius. Aluminis scissi, rhois rubri, sing. drac. ii. myrrhae drach. i. croci obol. ii. terito ac melle excipito. Vfu autem

EE 2 postu-

postulante, medicamenti gallæ parvæ quantitatem accipito, & hoc molli lana exceptum ac rosaceo imbutum, post mensium declinationem subdito, & per triduum finito, donec purgatio fuerit perfecta. Tertia vero die mulier lauet, & locis rosaceo illitis cum viro concumbat. Alius. Leonis, aut ursi, aut hyænæ, aut taurini fellis uesticam euacuato, & in ipsam olei rosacei, nardini, irini, mellis, æquales portiones indito, omniaque simul ad calidum cinerem unita seruato, ac utitor post mensium purgationem ante concubitum. Alius. Fel piscis perse uel cum melle subdatur. Aut uerbenacæ rectæ succus cum butyro, delinente lunari purgatione supponatur. Alius lenissimus. Radicis altheæ purgatæ ac lotæ quadrantem contundito, & in olei sextario torreto. Deinde abieciis radicibus, adipis coturnicis sexuncem, ceræ sextantem ammisceto. Ego uero trientem ceræ ammisceto, & similiter in pello subdo. Amuletum naturale. Ossa quæ in corde cerui reperiuntur, sinistro brachia adalligata, arcana quadam naturæ uel conceptionem iuuare creduntur. Suffumigium ad conceptum efficac. Bitumen, pilos leporis, rutam aridam, simul terito, & cum cerâ præmollita in pastillos formato, & super stercore bubulo suffito. Aliud obstetricis. Sandaracham tritam cum cupressi ramentis, sufficienti cerâ in pastillos cogito, eosque super bubulo stercore statim post mensium purgationem quatuor diebus suffito. Aliud eiusdem. Caprini cornu ramenta oleo conspersa perfectis mensibus suffito, et locis adhuc calentibus mulier cum viro concubatur. Ad mares generandos. Si uir dextro pede fascia candida uincto cum muliere coeat, marem ut ferunt generabit. Si uero sinistram pedem colorata fascia ligarit, foemellam. Tradunt etiam satyrii ac serapiadis radicem solidiorem salaces facere & masculis generandis prodesse, flaccidiorem uero contrarium efficere.

De lactis defectu.

Cap. xxxiii

Hæc affectio infantibus magis quam mulieribus grauis est. Quapropter Sermone quarto ubi de pueris tractauimus, conuenientem curationem tradidimus. facit autem naturaliter lapis galactites pro amuleto adalligatus, & aqua dissolutus ac potatus.

Ne lac in mammis coeat in grumos.

Cap. xxxiiii

Vt ne lac in mammis puerperarum in grumos coeat, ab adultis ac peritis mulieribus leniter exugatur, & mammae cyprino oleo, cum ouo & croco illinantur. Aut foeni græci succum, aut cumini decoctum cum modico croco oblinuntur.

Aliud. Ceræ unc. i. portulacæ sesquiunciam, cum oleo sesamino illine, ac utere uelut probato. Lac etiam instar casei coagulari in mammis prohibet cerâ alba in pilulas redacta, & quotidie magnitudine trium erui granorum exhibita. Cæterum Soranus mammæ assidue dolentes, neque a mulieribus, neque ab infantibus exugi oportere affirmat, & suctione plus materiæ attrahi asserit. Probat etiam facit terra cimolia cum aceto aut aqua, & oleo rosaceo imposita. Et candidi marmoris aut candidorum lapidum ramenta similiter adhibita. At si amplior fuerit plenitudo, & ob id mulier grauetur ac doleat: lentes aqua marina aut muria coquito, & cum decocto quidem mammæ abluito, ipsas autem lentes contusas imponito. Confert item apium & mentam, & fel bubulum præsertim illinere aut imponere. Aliud. Fucum tinctorium terito, & cerato excipito, & adhibeto ac singulis diebus bis permutato. Sit autem fuci triens, ceræ de quadrans, olei myrteî dextans. Aliud. Pollinis thuris drach. x. ceræ de xtantem, pumicis un. x. x. olei rosacei unc. x. x. utere eodem modo. Aliud. Lapi.

Lapidis alij, ceræ, singulorum sextantem, olei rosacei, aut cicini bessem, præpara ac utere bis in die permutando. Lac enim abolet, & inflammationes sedat. Quod si alius lapis defuerit, pyrites succedat pro ipso. Præstat & aqua marina aut muria assidue fouere.

De coagulato in mammis lacte, & iisdem turgentibus ob lactis redundantiam.

Cap. xxxv

Ad hæc uitia in principio leniter reprimentibus utendum est, uelut est spongia pura posca imbuta, & palmulæ cum pane & posca trita, deinde uincire ac moderatè cōstringere oportet. quod si lac restinguere malueris, alumē & pŷllium cum aceto & coriandri succo: aut lapidē pyriten cum rosaceo & aceto adhibero. Ad coagulationē uero lactis priuatim turfures in aceto coctos cum ruta decocto imposito, quum primū lac gignere incipiunt. Idem facit menta polentæ ammixta. & iuglans cum ruta ac melle, & ricini folia trita. & cuminū priuatim, uel cum polenta. & capita papaueris cocta cum melle. & crocus cum lacte, & muria fomentum. & apium uiride impositum, quod etiam grumos lactis dissoluit. Utendum & ceratis ad grumos descriptis.

De uitio lactis mammas lædente.

Cap. xxxvi

Lac uitiatū aliquando mammarū uasa exulcerat: quemadmodū itaq; in reliquis partibus uitiatū humoris peculiare distillationes efficiunt: salsa enim lachryma oculū mordet, & acres excrementū superfluitates intestina erodunt. Ita & lac in mammis uitiatū, scabiem, panos & papularū eruptiones producit. Ulcera ergo hic enata, simili modo iisdemq; remedijs, quibus cætera totius corporis ulcera curantur. Ipsi tamen lactis uitiationi primū succurrendū est, cuius improbos colores, subalbidū, nigricantē, flauū, subfuluū, aut uiridē, hac arte deprehendemus. Tenuia ac candidissima linteorū frusta eo lacte imbuta in umbra siccabimus, & in his postea quantum lac à natiuo colore discessit speculabimur. At uero uirosū ne sit, aut aliās foetidū: ex olfactu cognoscemus, sicut falsedinē, amaritudinē, acorem, insipiditatē, gustu dinoscimus: tenuitatē uero ac crassiciem, lubricitatē item ac lentorē ex ungue probabimus: si enim gutta eius ungui instillata non decurret, nec uelut mel aut gluten adhærebit, lac bonū esse iudicamus. Aliqui pilo probitatē lactis experiuntur. nam si pilus lacte madens suspendat, & lac delabatur, aut unæ parti guttula adhæret, lac reprobandū est: Si uero totum pilum circumfudet optimū esse confitentur. Alij lac per coagulū concretū digitis exprimūt: deinde seri ac casei mensuras expendunt. Postquā igitur cuiusq; lactis uitium cognouerimus, recta uictus ratione id corrigemus; purgationesq; prorsus recusabimus, præsertim si nutrices semper eo uitio laborare nouerimus. quamdiu lactauerint. Priuatim itaq; eas quæ salso humore abundant, balneis & uini diluti potione curamus. Deinde copiam lactis uino mulso & aceto mulso reuocamus, et in cibo exhibemus lac ex alijs animalibus probatissimum, quod forma & similitudine humani lactis speciem refert. Est autem omnino rectæ diætæ eo amplius innitendum, quod scimus hoc uitium solo alimento bono non difficulter curari posse. Neq; negligenda est hæc curandi ratio. Sepe enim infantes eiusmodi lacte corrupti ad ultimam perniciem deueniunt. Ad panos & scabiem mammarum, myrrham cum oleo sampŷchini tritam, uelut maximum remedium illinito. Ad coërcendas autem uirginum ac reliquarum mammas, æruginem ferri cum oleo omphacino aut uirgino subactam adhibeto. Aut cicuta semen cum folijs tritum illinito.

EE 3 Ad

Ad mammas inflammatas. Philumeni.

Cap. xxxvii

Sesamum tritum butyro ammixto moderatè tepefactum, quotidie bis imposito. At si inflammatio perseverauerit, medullæ panis aqua madefactæ ac tri-
 tæ partes i. i. perdicij herbæ seorsim tustæ partē i. cerati liquidū partem unā & di-
 midiam simul subigito, & bis in die adhibeto. Idem etiam post eruptionē ab-
 scessus usq; ad perfectā sanitatem conuenit. Vtere etiā hoc uelut probatissimo.
 Foliorū hyoscyami recentium, ceræ, colophonix, adipis porcini recentis, olei,
 æquales portiones, liquabilia liquefacito, & folijs tritis ammisceto. Pharmaz-
 cum Iuniadæ, ad omnes inflāmationes, præsertim mammarū. Olei antiqui
 lib. i. i. ceræ quadrantē, colophonix, adipis suilli, singulorum sesquilibrā, spu-
 mæ argenti lib. i. pollinis tritici, seminis lini, cerussæ, singulorū sex uncem, thu-
 ris sesquiunciā. Aliud eiusdem. Spumæ argenti, cerussæ, sing. dra. vi. thur-
 ris sesquiunciā, ceræ, colophonix, singulorū sex uncem, adipis gallinacei lib. i.
 pollinis ordeacei sesquiunciā, succi seminis lini dextantem, olei cōmunis trien-
 tem, Spumam argenti, cerussam, & thus cum modico succo terito, deinde cum
 residuo succo pollinem ordeaceum subigito, & ita per duas aut tres horas fini-
 to, postea omnia ammisceto, & cerato excipito. Aliud ad inflāmationes
 plurimum prurientes, ac rubicundas, Cerussæ, spumæ argenti, mellis, butyri,
 ceræ, adipis gallinacei, singulorum sex uncem, thuris sextantem, rosacei unc. i.
 Spumam argenti & cerussam cum rosaceo coquito, & reliquo liquefacta adij-
 cito, & unitis mel addito, & ab igne amotis thus ammisceto ac utitor. Aliud
 ad inflāmationes, quo utor. Tenerorum solani foliorum quantum satis
 esse uidebitur coquito & terito, & mellis sex uncem ammisceto. Postea uero
 emplastri parhygri, ceræ, singulorum sex uncem accipito, olei unc. i. omniaq;
 simul unita reliquis ammisceto, & loco prius eloto apponito. Hoc mammarū
 inflāmationes per exudationes plurimas discutit. Vtere & medicamento ex se-
 ride ad sedis affectiones præparato, & alijs huiusmodi. Facit hoc & ad igneas
 mammarū inflāmationes. Cere, colophonix, olei, sing. li. i. foliorū papaueris
 cornuti quadrantē: liquata folijs tritis ammisceto. Tradunt & leporis coagulū
 cum aqua tritū ac illitū, omnibus tumorib. mammarū, & affectionib. ob lacūs
 redundantia obortis prodesse. Ad profundas mammarū duricias. Sphon-
 dylitū herbā, & asphodeli radices uino coctas imponito: aut terrę intestina cum
 malis cotoneis: aut caneros fluuiales cum ouo adhibeto. hoc & lac extinguit.

Ad induratas mammarū inflāmationes. Philumeni. Ca. xxxviii

Semen lini, aut scœnigraci, aceto mulso coctum imponito: aut sesamum illo-
 tum modicè tostum cum melle terito, & calidum apponito: aut stercus caninū
 album terebinthina exceptum adhibeto. Aliud optimū. Spumæ argenti
 lib. i. i. strigmentorū balnei in quo uiri solum lauantur lib. i. i. i. colophonix, ce-
 ræ, singulorum bessēm, squamæ æris sextantem & semunciam. Aquæ marinæ
 aut murix lib. i. i. squamā aqua marinā sufficientibus diebus terito, & adiecta ar-
 genti spuma ac strigmentis, ad probam cōpagem coquito, deinde ceram & co-
 lophonix liquefactas adijcito, & ablatum ab igne medicamentum frigesacito,
 manibus subigito ac utitor, inter coquendū aut cum arundinis radice uersato,
 donec non amplius inquinat. Facit & ad collisā, fractā, ulcera antiqua, cōdylo-
 mata, oleo dilutū & adhibitū. Vtere etiā emplastro dyonyfia, superiori Sermo
 ne descripto, quod habet terebinthinā, mannā thuris, spumā nitri, oleum anti-
 quum, cerā, singula ponderib. isthic adscriptis, Nec minus cōuenit piscatoris.

De manu

De mammarum abscessu.

Cap. XXXIX

Inflammatione & duricia perseverantibus, & ad abscessum progredientibus, spe discutiendi sublata, maturantibus auxiliabimur, nos tamen mammarum inflammationes iam in pus transmutatas, per dionysiam emplastrum supra relatum frequenter discussimus: totus enim humor ab ipso per occultos meatus transpirat, & duricies evanescit. Probè facit & fuluum piscatoris, citra acetum paratum. Et nigrum Asclepiadae. Quae omnia si parum profecerint, chirurgia opus erit. Reliqua igitur mammae partes tuto inciduntur, si putrida corpora reperiuntur. Verum locus circa papillam lunari sectione exactè incidendus est, ut per sectionem quidem abscessus profunditas denudetur, sed papilla conseruetur, in naribus quidem formae gratia, in foeminis uero praeter formam, ut ne lactandi facultas intercipiatur. Peracta chirurgia linamenta sectioni indantur, & omni modo obseruetur ne plaga linamentis nimium obturetur: huic enim saepe fistula inducitur. Postea tertia die suppurationi studendum est, deinde his quae repurgare possunt, postea resiccantibus ac glutinantibus. Bene autem facit ad haec emplastrum fuluum piscatoris, citra acetum paratum. Et fuluum Galeni ad maligna ulcera supra praescriptum. Est autem his spongia ex uino expressa superponenda. Prodest etiam nigrum e lolio praeparatum. Euacuat enim & glutinat. Magistriani ad mammarum abscessus. Intestina terrae cum polenta terito & imposito.

De mammarum fistulis. Leonidae.

Cap. XL

Aliquando rupto abscessu si mamma non fuerit rectè curata, fistula consequitur, & sanè fistulae isthic oborta plerumque in carnem desinunt, rarissime ad os, nisi diutius durauerint. Has itaque congruis primùm medicamentis curare conabimur, quale est quod ex lolio praeparatur. Sed & hoc emplastrum peculiariter prodest, quod & in mammarum abscessibus atque omni tuberculorum genere, pus per occultos meatus educit, & propè incidendos abscessus discutit, & foris impostum fistulas efficacissime desiccant, papillam tamen semper ab eo medicamento adseruare oportet. Spumae argenti, olei, singul. lib. i. aquae sex uncem, ammoniaci thymiamatis, pyrethri, singulorum sex uncem, resinae pinus trientem, colophonae unc. i. spumam argenti, oleum, & aquam simul ad prunas coquito, donec non amplius inquinent. Deinde ammoniacum cribratum inspergito, eoque soluto resinas adijcito, & ablato ab igne pharmaco pyrethrum addito, subigito ac emollito, & imposito, lana sicca superposita, ita ut papillam uelut diximus non contingat. At si perseverarit fistula, nucleo specilli attollatur ac incidatur, quatenus in profundum specillum fuerit progressum, & quicquid duri ac callosi inest amputetur. Et facta incisione emplastrum adhibeatur repurgans, deinde resiccans & ad cicatricem perducens.

De mammarum nomis.

Cap. XLI

Nomae mammarum perfusionibus ac cataplasmatibus curantur ad reliquas nomas descriptis. Verum ad muliebrum mammarum ac pudendorum nomas ac putredines, & alia huiusmodi facit hoc medicamentum. Rhoeis coriarii lib. i. pilularum cupressi recentium tantundem, gallae omphacitidis sesquialtera, uini austeri lib. xx. Haec solida per triduum macerato, deinde cum uino ad dimidias coquito, & cupressi ramo uersato. Postea ad horam quiescere finito, ac deinde excolato, & rursus ad mellis compagem coquito. Atque ita paratum pharmacum intra se uitreo seruat. Vsu uero expetente, si extersione opus fuerit melli ammisecto, si uero uim obducendi meatus augere uolueris, lac adijcito.

De exedentibus mammarum ulceribus.

Cap. XLII

Phagedænicum & exedens ulcus à cancerato differt, eo quod circumscritas partes non ita duras, neque uenas uaricosas habet, neque ita ad fundum pertrat. Sed & omnis phagedæna medicamentis cedit. Maligna uero & efferata ulcera medicamentis magis exacerbantur. Ad exedentia itaque ulcera compendiarum curam adhibere oportet, callosorum uidelicet labiorum excisionem, ita ut eadem labia ignitis cauterijs inurantur. Nam sic & sanguinis eruptionem coërcēbimus, & tutiorem medicationem peragemus. Postea uero medicamenta ad mammarum putrefactiones commoda adhibeantur, infra ad cancos descripta.

De cancris mammarū. Archigenis & Leonidæ.

Cap. XLIII

Cancerati tumores circa mammas frequentissimè generantur, & mulieres magis quàm uiros inuadunt, & ex illis eas quæ amplas ac carnosas mammas habent. Veteres autem ulcus canceratū, malignū ac ferum appellabant, & cancerati sanè appellatio à cancro animante transumpta est: sunt enim ea animalia aspera & dura, & si quid forcipibus suis ceperint, haud faciliè auelluntur. his itaq; canceratus tumor similis est. Nam & prominet, & ad tactum renititur, & difficulter tractabilis est. Maleficum autem & ferum ulcus à feris ac malignis animalibus cognominatur. Est enim proteruum, & curatione efferatur, & manuum tractatione exacerbatur. Duæ uero sunt supremæ cancrorum differentiae. Quidam enim sine ulcere, quidam cum ulcere consistunt. Qui sine ulcere sunt ab omnibus ferme ueteribus Occulti appellantur. Philoxenus tamen cancrum occultū priuatim nominauit, qui in utero ac intestinis esset. Cancro itaq; non ulcerato in mamma existente, tumor apparet ingens, ad tactum renitens, inæqualis, instar feræ sæuus, penitissimè pertinaciter insertus, radices longè lateq; extendens, & uenis circumscritus uelut illigatus, quas circum circa uaricosas habet, colore cinericius ad ruborē uergens, & aliquando subliuiscens, & uidentibus quidem mollis apparet, tangentibus autem durissimus est, ut uisus hac parte non sit credendum: dolorem autem inducit pungentem latè se extendentem, ut sæpe per consensum, glandularū malignas inflammationes sub alis excitet. Pertingunt etiam dolores usq; ad clauiculam & scapulas. At uero exulceratus cancer assiduè erodit, & ad profundum perfodit, nec fisci potest, & sanienem emittit omni ferarum ueneno deteriore, copia & odore abominabilem. Ad sunt & huic dolores pungentes. Atque hic præcipuè medicamentis ac manuum tractatione exacerbatur.

Qui cancri curatu faciles, & qui difficiles.

Cap. XLIII

Cancros in pectore obortos omnino deploratos esse scito, quemadmodum & eos qui in capite, collo, humeris, sub alis, & in inguinibus generantur: sunt enim & hi incurabiles. Nam præterquā quod perfectè tolli non possunt, sanguinis eruptionis timor incumbit, ne ex ea æger inter manus pereat. Eos uero qui papillæ summitatem occupant, affectæ partis amputatione faciliè curaueris.

Cancrī chirurgiā. Leonidæ.

Cap. XLV

Ego quidem in cancris in pectore obortis chirurgiā uti soleo, quæ sic fit. Aegram supinam decumbere facio. Deinde supra cancrum partem mammarum nam incido, & incisam cauterijs inuro, donec crusta ducta sanguinis eruptio sistatur. Mox iterum incido & profundū mammarum dissecō, ac rursus partes incisas uro, sæpeq; idem repeto, & secans, & sistendi sanguinis gratia inurens. Ita enim sanguinis eruptionis periculum euitatur: post amputationē uero integrè per-

peractam, rursus partes omnes ad resiccationē usq; inuro. Et primæ quidē inu-
siones sistendī sanguinis gratia fiūt. Postremæ uero ad omnes morbi reliquias
abolēdas. Sæpe uero etiā citra inuisionē opus perfeci, ubi induratus tumor can-
cri generationē minans in mamma fuit: tali enim affectioni amputatio usq; ad
sanam partē sufficit, quā nullum hic periculū eruptionis sanguinis imminet.

Cancrī curatio post amputationem & inuisionē.

Cap. XLVI

Post amputationē si inuisionē facta non est, linamenta ulceri indemus, deinde
suppurationi studebimus, & deinceps ad reliquā curationē resiccatoriā progre-
diemur. Si uero post chirurgiā locos inuiderimus, aliquando solo cataplasmate
ex plantagine, aut polygono, aut sesamo trito utimur. Aliquādo etiā panis me-
dullam alicui ex prædictis ammiscemus, & supra cataplasma linteū aqua ma-
defactum adhibemus. Citra dolorē uero crustas aufert lac melli ammixtū ac il-
litum. Continendæ aut sunt ægrotes in domo calida: omnis enim frigiditas ipsis
infesta est, præcipuē quo tempore ulcera repurgantur: tunc enim maximē con-
uulsionis periculū imminet. Secunda uero aut tertia die exolutō medicamen-
to, tepida aqua locum perfundimus, et lenticulam coctā cum modico melle im-
ponimus: mellis enim uim exacerbandi formidamus, deinde folijs uitis aut la-
ctucæ foris impositis deligamentū adhibemus. Neque ab horum usu discedi-
mus donec crustæ exciderint, postea linamenta indimus, atq; in his tum acria,
tum pingua medicamenta uitamus. Vtraque enim malum renouant. Qua-
propter soleo muliebri aut asinino lacti rosaceum ammiscere, & ex eo made-
facta linamenta indere, & pro linamenti conseruatione linteum lene ac sim-
plex eodem lacte imbutum forinsecus obligare. Nam plurium linteorum o-
nus graue est in hac affectione. Et suppurationis quidem tempore rosarum an-
plius sit: dum uero repurgamus, lac excellere debet. Quod si res urgeat, meli-
lorum cum rosaceo & aqua aut lacte muliebri cataplasmati exterius adhiben-
do ammiscetur. Cerata enim & nimis elaborata cataplasmata, huiusmodi af-
fectionibus sunt aduersa. At si arido aliquo opus fuerit spodium pompholy-
gis probè lotum ac siccātū, aut cadmiā ter ustam & rosaceo extinctā, & postea
probè lotam ac resiccātā inspergito. Toto uero curationis tempore à uino &
cibis ægrè concoctilibus, & frigidæ potu abstinendum est. At dum ulcus ad ci-
carricem ducitur, diligenter studebimus ut rotius corporis firmus reddatur ha-
bitus, & ut bono succo impleatur, id quod bonis alimentis, exercitijs, gestatio-
nibus, ac reliquis eiusmodi corpus resicientibus facere oportet.

Cancrorum curatio citra chirurgiam.

Cap. XLVII

Primum uelut sæpe diximus, ante cuiusque maligni ulceris curationem, to-
tum corpus curare oportet, deinde localia auxilia adhibere. Alius itaq; conue-
nientibus alimentis, & aloë, uel picra ex aloë preparato pharmaco soluatur, &
quæ uenenis resistunt assiduè exhibeantur, uelut est theriaca, mithridaticū an-
tidorum, & quod ex sanguinibus constat. Ex simplicioribus autem anseris aut
anatis recens iugulata sanguis calidus in potu detur. Aut trifolij bitumen olen-
tis cochleare I, aut II, cum aquæ cyathis III, aut seminis rutæ unc. I, aut pulegij
ueteris drachmam I, cum maluæ decocto. Prodest etiā cancrorum fluuiatili-
um decoctum cum lacte asinino per dies quinque exhibitum, ita ut per toti-
dem dies etiā ipsi cancri comedantur: talis enim periodus septeno circuitu
peracta, mammarum canculos placidissimos efficit, ut deinceps per simplicium
epithematum usum pristina sanitas restituatur.

Cancr-

Canceratorum tumorum non ulceratorum curatio.

Cap. XLVIII

Tumoribus canceratis non ulceratis panem cum modico symphyto imposito, exigua quantitate, ut ne grauet. In exacerbationibus autem rosas, melilotum, semen papaueris, omnia cum passo paululum trita coquito, & cum uittellis ouorum subacta imposito: aut altheae folia cocta per se, uel pani ammixta imposito. Est & hoc in exacerbationibus, efficax, plantaginis, capitum papaueris una cum seminibus, psyllij, & aequales portiones accipito, & reliqua quidem terito ac cribrato. Psyllium uero passo cretico maceratum, cum palmulis pinguibus subactum, aridis ammisceto, & parum adipis anserini adijcito. Hoc medicamentum secum adhibetur calefactum. Si uero frigidum potius malum postulauerit, omnia praedicta palmularum carne & modico pane madefacto excipito, ac frigida imposito. Prodest & irionis semen cum cespito & aqua multa calidum impositum. Fraxini item arboris folia mollia, aqua cocta, & trita, per se calida imposita, malignorum ulcerum dolores mitigant, & assiduus ipsorum usus mirifice ipsa discutiet. Ego uero eorundem foliorum decocto huiusmodi locos fouere soleo. Arbor ipsa sterilis est, & ad materiam idonea. Postea uero cataplasmae plantagine rursus imponatur. Item Icesij emplastrum, aut nigrum panacea inscriptum ad contactum molissimum, aut aliud quoddam huiusmodi adhibeatur, nisi obstiterit ulcus.

Canceri ulcerati curatio.

Cap. XLIX

Ulceratis canceris lenissima epithemata imponantur, quorum uelut fundamentum, inquit Archigenes, hoc est: Spumae argenti, adipis porcini recentis, cerae albae, sing. lib. i. olei boni unc. xvi. uittellos ouorum assatorum xii. Spumam argenti cum pauca terito, deinde olei parum affundito, & uittellos ammisceto. Adipem uero exemptis in mortario terito, & cum cera liquefacto ac excollato. Et his frige factis residuum olei paulatim affundito, & omnia simul in mortario probe subigito, postremumque reliqua trita ammisceto. Hoc medicamentum usus tempore rosaceo dissoluit, & molli lana excepto pro linamento utitur. Et si dolor aberit ab ulcere, etiam iridis, myrrhae, aristolochiae, sing. dra. iiii. adijcito. Idem etiam non ulceratis canceris adhibitum utile conperies. Aliud, ulceratis canceris blandè hoc medetur, & non ulceratos egregie mitigat. Cerae tyrrhenicae, terebinthinae, adipis taurini, medullae cerui, aut uittuli recentis, olei cicini & rosacei recentis, adipis anserini recentis, mellis optimi, thuris diphrygis, singulorum partem unam, cespiti triplum. Sine thure tamen mitius est, & ulceribus commodius. Verum cum thure magis discutit ac maturat, & non ulceratis magis commodat. Et si absque thure praeparabis, diphryges cum uino teres. Si cum thure, utrumque diphryges uidelicet ac thus aridum, liquatis reliquis adijcies, & deinde addito melle securè adhibebis. Aliud Theodori ad maligna. Spodij cyprij loti & resicati, plumbi usi & loti, succi rosarum singulorum drachmas quatuor, praepara & utere cum rosaceo. Hoc quidem magis mitigatorium est. At uero multa & depascens putrefactio fuerit, ultra quam credas efficax est hoc ad totum malum extirpandum. Rhois coriarij sextarios duodecim, pilularum cupressi libram unam, gallarum omphacitidum, cassiae, singulorum sex uncem. Omnia simul contusa in uini Adriani, id est, adstringentis, odorati & antiqui sextarijs uiginti, per triduum macerato, & deinde ad tertias coquito, ac cupressi spathula uersato. Posteaque omnibus probe expressis ac reiectis, succum rursus ad mellis compa-

compagem coquito, ac uitreo uase seruato. Hoc medicamentò ad nomas sine ro utendum est, modico uino aliquando addito, si crassius uisum fuerit, uerum si affectio in muliebri pudendo fuerit, exactè diluendum est. Sed et alinino aut muliebri lacte dilutum mitigatorium est, & reliquas item nomas citra inflammationem curat. Aures diu purulentas, gingiuasq; madore flaccidas relinquit. Ulcera curatur difficilia, & aegrè cicatricem admittentia sanat, si moderatè adhibeatur, ac pro ratione diluatur: quomodo enim ipsi mitia resisterint, cui se- ra & agrestia cedunt? Ceterum hoc animaduersione dignum est, ut ne ulcera ad cicatricè perducantur priusquàm omnis duricia fuerit resoluta, modo lina- mentis maturantibus, modò splenijs adhibitis, quale est Icesij melinum, aut Se- rapionis, aut panacea. Ego uero declinationis tempore saepe usus sum theria- ca, lacte & rosaceo diluta, & in molli lana ulceri indita. Eandem etiam ex pas- so bibendam præbeo. Ad huiusmodi enim affectiones efficacissima est, licet quoq; reliqua antidota ad reptiliū ictus, & uenenosas potiones parata his itaq; confidenter utere, ac irrisores contemne, qui mali naturā minime intelligunt.

De mammis induratis, Leonida.

Cap. L

In alijs equidem corporis partibus prius ostendimus, induratum tumorem sine dolore esse. At in mammis non ex affectionis natura, sed detractæ papil- læ grauitate dolorem inducit. Si itaque tota mamma indurata fuerit, atque ita scirrhi tumor induratus thoraci annexus, ut citra periculum à sanis partibus amputari non possit, chirurgiam nequaquam attentabimus. Si uero summities mammarum solum indurata fuerit, aut ultra dimidium affectio non occupauit, summities amputanda est citra inuersionem: neque enim in scirrhi tumore in- durato, uelut in cancro, sanguinis eruptionem uereri oportet. Post amputatio- nem uero linamenta indemus, & reliquā ulcerum curationem adhibebimus.

De mensuris suppressis, Rufi & Aspa-

sia.

Cap. LI

Mulieres aliquas menstrua purgatione omnino carere, uel naturale est, uel præter naturam. Naturale est, si mulier nulla inde molestia uel totius corpo- ris, uel uteri afficitur. Proinde quantum ad ætatem attinet, infra decimum- quartum annum, aut ultra quinquagesimum purgationes menstruæ nō fiunt. Sed & steriles, & prægnantes, cantrices item ac saltatrices naturaliter non pur- gantur. Quicquid enim in eis superfluum est, nimia exercitiij uehementia con- sumit. Et in summa: Mulieres calidioris temperaturæ, & fortibus exercitijs u- tentes, & agrestes, parum purgantur. Quando igitur mulier plus iusto cali- da fuerit, siue ob naturalem temperaturam, siue ob exercitiiorum excessum, men- struis purgationibus carebit. Ex multo enim calore corpora sicca euadunt, & calida temperatura cibos optimè cōcoquens, nihil superflui in toto corpore re- linquit. Est autem talis mulier omnino uirilīs, coloris fuscī, corporis probè com- pacti, neruis robustis, uenosa, lumbos & nates ampliores habens, pectore ac humeris latioribus, mammis solidis, uoce graui, fortior item ac hirsutior. Talis enim aut omnino non, aut modicè purgatur. Aliquando uero etiā menses uel ob nimiam pinguedinem, uel ob gracilitatem supprimi solent. Pingues enim magis exangues reliquis sunt, minimasq; uenulas habent, & sanguis qui in ip- sis est paucissimus ferè in pinguedinem transit. Atque huius rei ex eo indicium est, quod tales minime omnium concipiunt. Et si aliquando cōceperint, foetus graciles ac ualde imbecilles pariunt. Quomodo ergo purgabuntur, quæ neque sanguinem, neque uenas amplas habent? At uero graciliores ob diuturnam aliquam

aliquam ægritudinē attenuatæ, nihil penitus superflui sanguinis habet. Siftuntur præterea menses eis quibus sanguis crassius aut uiscosus est, & quibus ad alios locos deferri, uelut per nares aut sedem. Quin & ex thorace sanguinē reieciunt, & quibus ex uenæ sectione multus sanguis euacuatus est, menses supprimunt. Sed & reliqua excretionū genera sæpe faciunt ut menses intercipiantur. Velut est multus sudor, assidui uomitus, alui profluuiā, sanici copia, alibi prodiens, pustularū omne genus per cutē erumpens. Siftunt item menses morbi acuti ac magni, & alimenta uel infra uel supra modum ingesta: modicū enim alimentū statim transpirat: multū uero meatus obturat, & excretionē intercipit. Ad hos itaq; scopos etiam curandi ratio digerenda est. Quæ enim ob plenitudinem non purgantur, uenæ sectione curantur. Cibi porro crassi ac pituitosi purgationibus aduersant, uerum acres sanguinē fluidū efficiunt. Quæ propter uina crassa & noua, aquas frigidas & crudas, labores nimios, ocium item sublestum uitare oportet. Atq; hæc uictus ratio ad totū corpus pertinet. Quantum uero ad ipsum uterum, conclusiones, ceruicis eiusdem distortionēs, durities, inflammationes, macies, resolutiones, perfrigerationes, distentiones, atq; aliæ huiusmodi affectiones cōsiderandæ sunt. Et insuper attendendum an aliquid uteri os obturans, sanguinis exitū impediāt. Callositates enim isthic exortæ, aut carnis ex crescentiæ, aut pinguedinis copia, sæpe purgationē prohibent. Aliquibus etiā statim à principio pellicula quædā circa collum aut osculū uteri adnascitur, quemadmodū his accidit quæ imperforatæ appellantur. Et tales curari non possunt, nisi pellicula illa locum obturans perforetur aut rescetur. Aliis quibus etiam ulcerū cicatrices, oscula uasorū in utero excreuerunt, quæ penitus incurabiles sunt. Quibusdam post abortum uteri os exulceratur, ac deinceps ad cicatricē perducitur, atq; sic obturatio superuenit, quæ tum alias uulvæ transpirationes impedit, tum sanguinis excretionem prohibet. Quin & curæ assidue, & immodicus timor, ac mœror ingens, menses supprimunt.

Mulieribus quæ non purgantur accidentia.

Cap. LII

Mulieribus quæ non purgantur cōuero more, sanguinis reiectionis ac syderationis periculū imminet. Nam suppressis mensibus molesta accidentia consequuntur. Totius corporis grauitas, nausæ, fastidia, horridi quidā discursus uelut in his quæ cōceperunt. Non tamen ita sicut his quæ cōceperunt uteri osculum clauditur: illis enim occlusio adest cum quadā duriciā. Dolores insuper circa lumbos, fœmora, collum, sinciput, & oculorū radices adsunt. Febres item assidue cōcomitantur, & urinæ nigræ sunt cum rubicundo quodā seroso ac fauloso humore. Difficultatē item ac stillicidium urinæ patiuntur. Et quædam in melancholicū atræ bilis morbum, aut insaniam delabuntur. Cutis superficiem dolent, & inflammationes ac ignes sacros diuersimodē sustinent.

Curatio earum quæ ob nimiam caliditatem non purgantur.

Cap. LIII

Præstaret equidem ad integram sanitatis conseruationē, uictus rationē præscribere, à qua mulieris corpus ita resiccaretur, ut menstrua purgatione non haberet opus. Verum hoc conceptioni penitus aduersaretur. Non enim concipiunt quæ non purgantur. Proinde cōceptus errat, & eo quod omnes ferè mulieres temerē uictitāt, purgationes sunt necesse. Et propterea curationē cōscribere cōuenit, per quam menses suppressi euocant. calidiores itaq; mulieres & quæ plurimū excercētur, quā maxime humectare oportet, aquarū dulcium balneis, ubiorem humidiorēq; cibo ac potu. quales sunt pulsantæ ac alitæ fortificationes

bitiones, & quæ ex lacte præparantur. Et ex oleribus lactuca, cucurbita, & eiusmodi. E' carnibus agni, hœdi, ac porcelli recentes, cicures præsertim & fœmelæ. E' piscibus qui teneras carnes habent. Ex auibus teneriores. Ex fructibus ficus recētes, uuæ maturæ, pepones, cucumeres, E' potibus uinum tenue, album, dilutum, non uetus.

Frigidæ temperaturæ dinotio ac curatio.

Cap. LIIII *

Frigidioris temperaturæ fœminas, tum ex his quæ dicta sunt cognoscemus, tum quod somnolētiore & ad motum pigriores sunt, & coloris albi siue plumbei, uenis subnigricantibus, urina aquosa, pituitam etiā assiduē excreant, & aliquando pituitosos humores euomunt. Harum itaq; curationem oppositam esse oportet ei quam ad calidiores retulimus. Plurimos enim labores imperabimus, & edulia calidiora exhibebimus. Vinum item fuluum, odoratum, uetus, ac minime dulce. Confert etiā uinum aqua marina dilutum. Medicamenta uero eligenda sunt quæ calore suo sanguinem dissolunt. Velut est thymi, pulegij, calamithes, dictamni, abrotoni, iridis, radicum asphodeli, corticum radices mori, mercurialis, casia, carpesij, floris iunci odorati, spicæ nardi ac celticæ, acori, mei, phu, sabina, asari, ac similitum decoctum. Hæc enim singula in uino albo ueteri coquantur, & uinum ipsum merum excolatum calidum à balneo ieiunis bibendum datur. Atq; ita menses cientur his quæ frigidam temperaturam habent. Probe facit & succus cyrenaicus erui quantitate potus. Aut opopanacis unc. i. Aut sagapeni tantundem. Aut myrrha magnitudine fabæ, Aut castorij drach. i. Aut nigella pota, et subliter. Idem possunt etiā seminum nobis familiarium decocta, uelut cumini, fœniculi, petroselinij, laueris, dauci, amij, cicerum. Est & hoc efficacissimum atq; acerrimum. Pulegij, artemisias, rutæ, saluas, anethi, singulorum manipulum unum, piperis grana uiginti, aquæ sextarios duos, piper contusum & herbis amixtum per noctem aqua maceratur. Mane uero ad dimidias coquitur, & ad excolatum mellis quantum satis est adijcitur, indeq; cyathi duo ieiunæ exhibentur. Ipsa uero sensim inambulare iubeatur, & lectica gestetur. Tempora autem ad talia medicamenta accipienda cōmoda sunt, alterum appropinquante iam purgationis tempore. Alterum ut post unctionem fo mentaq; ac balneum statim bibat, ita ut in calidum adhuc & solutum corpus ille labens medicamentum, uires suas efficacius declaret. At uero si quis omnia auxilia in hunc usum commoda recensere uelit, ei multo ocio opus fuerit. Sufficere tamen possunt relata. Si uero nullum ex his menses euocauerit, alius modus potentior exquiretur. Ego etenim cum hæc medicamenta frustra adhibuissem, mulierem solutiuum pharmacum bibere iussi, atq; ea accepto euphorbio cum petroselino, per aluū purgata, & deinde menstruum excretio successit. Quod si redundans humor atræ bilis magis fuerit, epithymi drach. v. exhibeto, cum aceti mulsi diluti hemina, pauco sale adiecto. Fece enim sanguiniseducta, pars subtilior deinceps facilius sequetur. Plerisq; etiā uomitus profuit. Vomāt autem accepto prius thymi aut origani, aut hyssopi decocto. Deinde post uomitum centaurij aut absinthij cremorem potant. Quin & pessis subdititijs uerus irritandus est, ut per uictum quidem, sanguis calidus ac tenuis reddatur: per pessos uero excretio prouocetur. Fortiores tamen euitabimus, quales sunt qui ex elaterio, cantharidibus, cyclamino, felle bubulo, & ueratro fiunt. Periculum enim est, ne ex eiusmodi medicamentorum uehementia, inflammationes, ulcera ac febres exoriantur.

FF Pessi

Pessimenses educentes.

Mittora proinde in pessis adhibere oportet, uelut est ruta, bacca lauri, artemisia, conyza tenuia folia habēs, pulegium, mercurialis. Hæc singula cum oleo irino subdantur. Quod si ualidioribus opus erit, myrrhæ drachmam unam, aluminis scissilis drachmas duas, cum uino terito, & rosaceo ammixto subdito.

Aut terebinthinam cum myrrha, melle, & croco efformato. Hoc autem ualidius est, pelecini semen cum myrrha & melle. Aut bdellium, uel galbanum, uel styrax, cum absinthio & lupinorum decocto. Aut caricas pingues granulis exemptis, cum thure & nitro, singulis fabæ magnitudine subdito.

Vterus item calido quodam oleo siue ungento perfundatur, uelut est sulciatum, cyprinum, irinum, sampsuchinum, laurinum, amaracinum, narcissinum. At si diu etiam suffitus per styracem, galbanum ac thus fiant. Probe facit etiam lapis gagates. Suffumigium probatissimum. Radicis aristolochiæ, radicis alphodeli, resinæ siccæ, sandarachæ, atractylidis agrestis, stercoris uulturis, bdellii, fabiæ, cardamomi, artemisiæ, singulorum drach. unam, ossium piscium salis forum minutissime tritorum drachmas tres, nigellæ, styracis, singulorum drachmas quatuor, pastillos cum aqua formato, & usus tempore super bubulo stercore, bis in die, mane ac uesperis suffito. Præcipue uero odoratis fomentis uteremur, amaraco uidelicet, serpillio, pulegio, calamintha, cypero, iride, chamæmelo, costo, aniso, ac similibus in aqua coctis. Sit autem fomenti usus talis. Olla operculo perforato operiatur, arundo que foramini inferatur, & undique oblinatur. Et mulier sedens excepta intra pudendum arundine fomentum admittat. Alius uero fomenti modus est, ut mulier in aliquo ex rebus decocto usque ad umbilicum insideat, & deinde calida aqua dulci abluatur, & postea pessos prædictos subdat. Pessus optimus menses educens. Carpos balsami, caryophyllorum, olei amaracini aut fusini, singulorum drachmas octo, passerum uuarum pinguium exemptis uinaceis libram unam, carnes palmularum duodecim, salis communis drachmas sedecim, mellis cochlearia tria, ele forma ac utere post balneum, aut fomentum. Cataplasmata in super adhibemus ex cruda ordeacea farina, artemisia, amaraco, iride, aut alio quodam odoratis ammixto. Liquor autem cataplasmati ammiscendus sit, uinum odoratum, mel, amaracinum, irinum, anethinum oleum. Postea lanam quoque oleo aliquo ex prædictis imbutam superponemus. Bonum est etiam bdellium cum styrace ac thure tritum, cum uino & ungento quodam relato, imo uentri ac lumbis illinere. Epithema ad sanguinem menstruum euocandum. Elaterij, myrrhæ, galbani, farinæ ordeacæ, singulorum drach. quatuor, foliorum rutæ recentium drach. ii, fellis taurini quantum satis est. Reliquis omnibus minutilime tritis & unitis fel ammisceto, & lumbis ac imo uentri imposito. Ducit hoc menses, & sedis hæmorrhoidas prouocat. Vtere etiam alijs epithematis sermone tertio conscriptis. Philosophi ad menses educendos. Cancrum fluuiatulem in uinum coniectum suffocato. Deinde uinum id meracum, calefacto, ac totum bibendum dato, et ubi satis sanguinis purgatum uidebitur cancerum suffocatum comedendum dato. Glās subdititiæ menses educens, facit ad uteri struagulationes diuturnos. Fellis taurini, succi absinthij, et comæ eiusdem, radicis struthij, myrrhæ, singulorum drachmas quatuor, castorij, opobalsami, singulorum drachmam unam, succi cyclamini drachmas decem. Omnia artemisiæ succo excipito, et glandes paruas subdititiæ formato, probe facit et sex uini antiqui apij succo excepta ac subdita. Aut lilij radix tosta subdita. Aut nigella, aut scellamum, aut

aut rutæ semen & fœnum græcum butyro ac melle exceptum ac subditum.

Pessus eadem die plerumq; sanguinem ducens. Folia artemisiæ & nîtrum pari portione oleo irino aut rosaceo excipito, & post balneum subdito.

Curatio earum quæ præ pinguedine non concipiunt. Cap. LVI

Pinguiiores mulieres uictu attenuante curabimus. Dîctum est autem in secundo ac quarto sermone de his alimentorum facultatibus, et quomodo macies sit reparanda. Non tamen interim fomenta & potiones prætermittantur. Si enim materia infra declinabit, haud ægre euacuabitur, & corpus gracilius reddetur. & quanquam purgatio per inferiorem aluum non sit ualde tuta, ut quæ corpus tabefaciat, mulieri tamen ita habenti hæc quoq; adhibenda est. Sæpe enim sola purgantis medicamenti potio ad menses educendos sufficit. Ex purgatorijs itaque acerrima & pinguibus maxime idonea sunt, granum cnidium, scammonia, & cortex radicis tithymalli myrsinitæ. Singulis autem petroselinum, aut daucum, aut apium, aut anisum, iucunditatis gratia & ad sanguinem attenuandum, ammiscere oportet. Pessos quoq; ualidiores his adhibebimus, uelut pul pam colocynthidis, nigellâ, myrrhâ, simul cum uino dulci trita ac subdita. Aut nîtrû cû cyclamino, felle bubulo, ac melle. Aut caricarû carnes cû nîtro, melle, & ruta. Fomenta ite ac epithemata ad frigidiores tēperaturas relata huc trāserant.

Curatio earum quæ ob plenitudinem nō purgantur. Cap. LVII

Quæ propter plenitudinem non purgantur, congruo menstruorum tempore magis grauantur, dolores circa lumbos ac inum uentrem percipiunt, flatuq; replentur, ad quem distentiones ac horrores totius corporis consequuntur. Sed præcipue insigni uenarum tumore dinoscuntur. Atque hæc quidem copiosa sanguinis missione sanantur. Cubiti itaque ac tali uenas secare oportet. Deinde euacuato sanguine cætera facere supra relata, potiones uidelicet ac fomenta adhibere. Postquam autem menses fluere inceperint, mulieri quies imperanda est, & in lecto eadem detinenda. Ac prima die à balneis ac cibis abstinendum, proxima uero pitisanæ succus cum aceto præparatus in cibo exhibeatur. Deinde olera ad hunc usum idonea. Tertia autem die lauanda est, & consueta uictus ratio repetenda.

Curatio earum quæ ob maciem non purgantur.

Cap. LVIII

Quæcumq; ob maciem gracilitatemq; non purgantur, siue id ex morbo, siue alta ratione contigerit, eas primum reficere oportet, & corpori carnem congruo exercitio, moderatoq; labore ac uberioribus exercitijs reparare. Vbi enim carnosæ factæ fuerint, maxima spes est menses sponte erupturos esse. At si hoc nō contigerit, potionibus ac pessis prouocentur.

Curatio earum quæ ob uitiatos humores non purgantur.

Cap. LIX

Biliosos ac pituitosos humores, & quicunque alij sanguini ammixti mensium purgationem impediunt, totius habitus uitiatione cognoscemus, ac reliquis notis sæpe à nobis relatis, & aliquando ex his quæ circa uterum contingere solent. Pauci enim menses qui deferuntur, si biliosi fuerint, uuluum mordent ac rodunt, & coloris sunt abunde fului. Si uero pituitosi, segnius prodeunt, crassi sunt, albique ac subfrigidi, & stuporem inducunt. Quum igitur huiusmodi signa apparuerint, præstantissimum est totum corpus congruis medicamentis purgare. Deinde muliebres locos colluere ac fouere. Cibus autem dulces ac boni succi exhibere, & in potu uinum mulsam dare. Exhibeatur etiam lac asinum

FF 2 nînum

ninum cum melle. Et aqua in qua pulegium ebullit cum uino dulci propinetur. Hæc & menses prouocat, & nullam superfluitatem in sanguine relinquit. Cibis insuper ac potibus semper aliquid odoratum ammisceatur. Ex oleribus Crethmum, gingidium, & daucum, singula ad flacciditatem cocta, & foeniculi eligemus. Neque interim pessi negligantur, qui quales esse debeant partim relatum est, partim proxime dicitur. Si enim biliosa ducere uolueris, elaterium cum carica pingui, Aut cyclaminum cum uino subdes. Pituitam uero subdita trahit folia anemones, iris cum melle, loliacea farina lolio prius paululum tosto, cum modico pipere & melle, colocynthis cum carica. Aquositate autem euocat porrum cum melle. Post pessos uero mulier in aqua calida desideat, & unguento rosaceo aut cerato, aut adipe gallinaceo uteri os inungat.

Curatio earum quibus sanguis ad nares
uel sedem defertur.

Cap. LX

In his à quacunque parte fluxerit sanguis reprimendus est, & ad uterum congruis auxilijs reuocandus, ne forte inde propulsus ad principalem ac nobilem aliquam partem uertatur. Itaque & sudoribus, & uomitu, & alijs excretionibus corpus euacuetur. Verum hoc sciendum est, non multum male affici eas quæ ob tales causas non purgantur: Sicut neque quæ ob maciem, aut laborum excessum. Concipere tamen nequeunt, quum uteri purgationes defecerunt.

Curatio earum quæ ob nimium otium
non purgantur.

Cap. LXI

Certum est eas quæ ob nimium otium non purgantur laboribus destinandas esse. Labores autem mulieribus congruentes deambulationes sunt, & gestationes aliquanto uehementiores. De cætero uero uelut frigida ac pituitosa curentur, & omnino contraria iuxta Hippocratem, dentur his quæ sanguinis delationem impediunt. Et si ex aqua frigida cruda pota sit offensa, alia optimam perquiremus, quæ uino albo ac tenui permiscebimus. Cibos itæ pro frigidis calidos pro crassis attenuantes, pro siccis humidos exhibebimus, & reliqua iuxta rationem.

Curatio earum quæ ob aliquam uteri affectionem
nem non purgantur.

Cap. LXII

Si corpus bene se habuerit, uictusque ratio purgationi congrua fuerit, & tamen mulier non purgatur, considerandum est an uterus aliqua affectione laetetur. Id quod si fuerit, nullum medicamentum omnino adhibeatur, neque aliqua potio menses ducens detur, ut ne attractio ad uterum sanguine, dum loci laxari non possunt, dolores molesti uelut in partu ingruant. Primum itaque affectio curetur, quæ suppressorum mensium causa est. Deinde sanguis prouocetur. Quomodo uero uteri affectiones curandæ sint, postea ex ordine referemus.

De mensium stillicidio.

Cap. LXIII

Mensium stillicidium uocatur, quum grauissimo dolore intimas partes uexate sanguis stillatim prodit. Aliqui enim morbi uteri affectionibus uesicæ similes sunt. Nam & in illa aliquando urina suppressa, aliquando stillatim prodit, et quoadque difficulter mingitur. Quinque uero sunt stillicidii causæ speciei diuersæ: Meatus angustia diuersimode contingens, uirium debilitas, sanguinis multitudo, sanguis pituitosus, & sanguis seculentus. His singulis quoties impedimento fuerint succurrendum est, ita ut multitudinem euacuemus, crassitudinem attenuemus, vires firmemus, & meatus dilatemus. Angustiae tamen causam inquirere oportet, eamque auferre. Causis enim sublati libera purgatio consequitur. Quomodo uero singulis causis occurrendum sit, partim de mensibus suppressis diximus, partim deinceps referetur.

ur, ubi de uteri morbis agemus. Nunc aut explicare instituimus quomodo gra-
ues dolores lenire oportet. Exacerbatione itaq; instante mulier in domicilio lo-
cetur, moderate tepidò, nò tamen obscuro. Et manuum ac pedũ extremitates sa-
scijs deligentur, neq; ullus pessus irritatorius interim adhibeatur. Aquę potus ui-
tetur, & omnino ab acerbis potionibus ac cibis præcipue flatuosis abstinendum
est. Imus autem uenter & scœmora uarijs calefactorijs foveatur, ita ut aliquando
lana succida uino & rosaceo calido imbuta imponatur, aliquãdo uelica oleo ca-
lido semiplena adhibeatur, aliquando uasa uaporatoria lenticulata admoueant.
Quod si dolor perstiterit, & uires ferre poterint, cubiti uena secetur, & sanguis
pro uirium ratione auferatur, & deinde rursus eadem fomenta repetantur. Et si
neque sic successerit, cataplasma è semine lini, pane, & aqua mulsa paratum ad-
hibebimus, cui aliquando terebinthinã liquatã ammiscemus. Vtemur & in-
fessionibus ex althææ, seminis lini, scœni græci, anethi, rutæ, ac artemisię decoctis,
& spongijs ex iisdem expressis pudendum fovebimus. Rutam item tritam ac
melle exceptam & panno lineo inductam pubi ac pectini imponemus. Aliquã-
do eodem cataplasmate etiam pudendum integemus. Prodest & per uteri fuso-
rium instrumentum infra scriptũ liquorem infundere. Rutam & scœnum græcũ
in oleo coquito, & ad hoc excolatum butyri, terebinthinæ, celsypĩ, quantum ad
cerati liquidioris formam satis est ammisceto. Idem etiam in sedem ad trium uel
quatuor cyathorum mensuram inijci potest. Aliud consimile infusum. Oe-
sypĩ drachm. I I I I. cerebella anserum duorum, adipis anserini, phasiani, gallina-
cei singulorum unc. I. ceræ quadrantem. Misce ac utere uelut priore. Pessĩ præ-
terea Libanus & enneapharmacus ac alijs consimiles subdantur, qui inferius ad
uteri inflammationes & induratos tumores describentur. Adhibenda sunt & e-
pithemata, primum tetrapharmacum, bromium, & quod ex succis constat. de-
inde polyarchium, & quod ex meliloto, & quod è seminibus paratur, prout u-
sus postulauerit. Si uero adhuc malum non quieuerit, sed aut per certos circui-
tus, aut incerto ordine uexauerit, ad ualidiora pergendum est auxilia. Et cucur-
bitæ pectini ac inguinibus apponendæ. Primum quidem tres aut quatuor citra
scarificationem. Deinde si affectio durauerit, etiã scarificabimus, & moderatam
sanguinis quantitatem euacuabimus. Conferunt & hirudines post cucurbitas
admotæ, nihil minus quàm cucurbitæ attrahentes. Deinde epithemata ac dro-
paces adhibeantur quàm cutim rubificatiã, & loci molliter assidue cũ oleo ac sale cõ-
fricent. Exercitiũ præterea temperatũ imperabimus, ac gestationẽ deambulatio-
ni præferemus. Postremũ balnea naturalia adhibebimus, & marina aqua frigida
iugiter abluemus.

De nimia mensiũ purgatione. Cap. L X I I I I

Nimix mensiũ purgationes mulieribus fiunt, aliquãdo sanguine copiosiore
& per plures dies prodeunte, id quod rarius, & in uehementioribus mõiũ fieri
solet. Aliquando post partũ, plurimo sanguine scœiũ insequente. Sape uero post
abortus cõtingunt, & repentinũ quãdoq; periculũ inducunt. Primũ itaq; cõside-
randa est erũpentis sanguinis multitudo, & delationis modus. Amplioribus em
uasis ruptis aut apertis, magna sanguinis copia confertim profluit, à minoribus
uero uice uersa. Ab erosione uero paulatim & cũ maximo dolore prodit. Sequit̃
aut ad redundãtes sanguinis eruptiones decoloratio, ac coloris uitatiõ, aliquan-
do cũ febre, quãdoq; citra febrẽ, appetitus pstratus, difficilis cõcoctio. Sape etiã
pedũ ac totius corporis tumores, & omnia quæ ad nimĩũ hemorrhoidũ fluxũ cõ-
sequi diximus. Artus ergo & extremas partes primũ cõstringere oportet, ab alis
& inguinib; exordio factò, & poscã nò frigidã sed tepidã ppinare, & eadẽ posca

FF 3 locos

locos perfundere, & multā lanā uino & oleo rosaceo, aut mellino, aut myrteo imbutam imponere. Nā spongiæ ex posca expressæ uterum ac uesicā perfrigerāt, & damnum amplius quā cōmoditatem afferunt. Imperandum est autem unus aut alterius diei ieiunium. Quod si tolerare nequeant, panis micas ē posca exhibebimus, aut alicam lotam, aut oryzam ex posca, aut ouum sorbile molle factum. Dabimus item in potu balaustium ex posca, aut hypocysthidis aut acaciæ succum. Aut lycium, aut terrā samiam stellam appellatā, aut uuæ acerbæ succum siccum. Prodest & sesamum posca macerare, atq; ita molle factum edendum præbere. Potest idem etiā cōteri, ac in potu dari. Exhibebimus & rhei pontici decoctum, aut idem tritum potioni inspergemus. Aut loti ramenta, & eorundem decoctū. Aut corallorum drach. ii. Aut pæoniæ grana rubra x. ii. At uero sponsia noua liquida pice imbuta, & in olla exusta, cum aceto aut posca subdita mirifice auxiliatur. Nam & his quæ in uterum subiiciuntur ac induntur uti debemus. Noui inquit Galenus, per quatuor aliquando dies sanguinem ab utero manasse, & ad nullum auxilium celsisse, & tandem à nobis plantaginis succo suppressum esse. Quātitas autem eius injiciendi sit cyathi mensura. Hoc itaq; optimum est medicamentū ad sanguinis eruptionem ex erosione obortam, cui aliquādo fortius aliquod ammiscere soleo, aliās aliud, pro affectionis respectu. Si igitur uas unde sanguis profluit magnū & amplū fuerit, austeris medicamentis opus erit, balaustio, acacia, hypocysthide, succo uuæ acerbæ, gallis, malicorio, & similibus. Si uero paruum, id quod facile cognoscemus ex modico sanguine citra dolorem prodeunte, conferent aloë, manna thuris, cortex pinus, terra lemnia sigillata, spinæ ægyptiæ fructus, crocus, lapis hæmatites, & reliqua huiusmodi cum succo plantaginis, aut uino nigro austero, aut senecionis succo subdita & injecta. At si ab erosione sanguis profluxerit, plerunq; uelut diximus non confertim, sed modicus ac paulatim defertur. Et propterea Andronis, aut Passionis, aut Polyidæ, aut Musæ pastillo, aut eo qui ex charta paratur, utendum est. Omnes enim tales quum nomen sistant, erosionem curant, ac sanguinis eruptionem reprimunt. Sunt autem quodam liquore ex relatis diluendi. Pelli uero ad sanguinis ab utero eruptionem faciunt huiusmodi. Aluminis scissi, acaciæ, medullæ gallarum, pollinis thuris, singulorum drachm. i. Hæc plantaginis succo teruntur, & uitelli ouorum assatorum quatuor ipsis ammiscuntur. Vnus autem tempore pello lanæ excipiantur, qui rosaceo tinctus subditur. Sunt quæ pelli omnes penitus usq; ad uteri os immittendi. Est autem pessus lana carpta ac conuoluta ad digiti figuram, qua medicamenta excipiuntur. Alius. Mellis mellæ gallarum, & thuris, pares portiones aqua subactas subdito. Aut ē polygoni trito pessum formato. Ipsas præterea in hoc decocto assidue insidere iubetur. Capitulorum iunci acuti, foliorum myrti, rosarum, rhamni, uirgultorum rubi, æquales portiones in aqua coquito pro infessu. Alius Pessus. Cytinorum, foliorum cupressi, oleæ, rubi, singulorum æquas partes efformato. Forinsecus autem imposita prosunt epithemata ac cataplasmata ex palmulis ac malis coneis, quæ adsumunt balaustium, acaciā, hypocysthidem, alumen, & similia. Conferunt & emplastra glutinatoria, quale est fuluum Galeni, & Iceli, & quod ē salicibus paratur: Et Harmonia, & Pallas siue Athena inscriptum, si lumbis ac pectini imponantur. Tauri item glutinum aceto maceratur donec dissoluatur, deinde ualido panniculo inductum lumbis agglutinatur, & efficaciter prodest. Sed & cucurbitæ leues ac magnæ ad mammas utilissime affiguntur. De

De fluxu muliebri. Archigenis.

Cap. LXV

Fluxus muliebris est uteri destillatio diuturna, à menstrui sanguinis eruptione differens, eo quod in illa sincerus sanguis prodit: Hic uero fluxus corruptus apparet, & aliquādo ruber est, uelut sanguinis sanies: Aliquādo albus, uelut pituita succus, à pituitoso uidelicet sanguine. Interdum pallidus, ubi bilis amara redūdarit: Interdum aquosus, à serosorum humorū superfluitate. Qui itaq; exquisitū colorem præ se fert aliquem, is redundantem humorem facile indicat. Si uero obscurum colorem habet, causam eius ita perscrutabimur. Linteum eo inquit natum arefactum simplici aqua eluimus, & inde à maculæ colore redundantis humoris notionem capiemus. Hic uero fluxus plerumq; citra dolorem prodit. Aliquando tamen ulcere exulcerato etiā cum dolore promanat. Si itaq; aliqua pars doluerit, & humor profluens planè cruentus fuerit, partis alicuius in utero ruptionem aut erosionem indicat, id quod maxime in collo uteri contingere solet, & potest hoc digiti immisione percipi. Inferre uero solet hic fluxus debilitatem, coloris uitiationem, appetitus subuersionem, inenarrabilem tristitiam, pedum tumorem. Et in aliquibus perpetua destillatio perseverat. In aliquibus per interualla quædam redit. Et ætate quidem uigentes, rubra ferè fluxio infestat: Declinante uero ætate, alba. Et utraque sanè fluxio si suæ ætati acciderit, facile curatur, si aliena, difficulter. In omni uero defluxu os aperitur ipsius uteri & uelut relaxatur. Quibusdam etiam uterus ipse procidit, ut usque ad muliebrem pudendum progrediatur.

Curatio rubri uteri fluxus:

Cap. LXVI

Mulieri rubro fluxu uexata primū sanguinem euacuabimus per uenę sectionem. Hec enim nō solum materiā ad uterū confluentem diuertit, sed detentionem etiā ac cōstrictionem tutā efficit. Multa enim sequeretur incōmoda, si sanguinis uel cuiuscunq; defluxus lationem localibus auxilijs reprimeremus. Nam aliquæ inde in hydropem, aliquæ in neruorum affectiones, aut oris uentris, aut capitis uexationes collapsæ sunt. Proinde si nihil obstiterit, hoc est, si non ualde magna fuerint obstacula, sanguis mittatur, præsertim si ætas uenę sectionem nō prohibet, & sanè paulò ante dictum est iuniores ferè rubro fluxu uexari. Detractio uero sanguinis uelut in his qui sanguinē reiiciunt partiatur, ut paulatim reuulsio fiat. Et dilata uenæ cubiti sectione, à fronte, aut naribus, aut scapulis sanguinem auferemus. At uero lumbis ac fœmoribus detrita ac mollia lintea imponantur, frigidis succis imbuta. Locetur autem mulier coxis accliuibus, cruraq; extendat ac inter se compliceat ad uteri partes contrahendas. Quod si copiose sanguis feratur, coxæ, pecten, & lumbi spongijs posca madefactis integantur. Si uero modice destillet, lana succida uino & rosaceo imbuta adhibeatur. Et extremæ partes deligentur, atque hæc non solum in principio fiant, sed etiam post circuitus ante exacerbationem, & in ipsa exacerbatione. Vratur ægra etiā infessionibus, ex myrti, rubi, malicorij, & similibus decoctis, in quibus sæpe aceto affuso usque ad umbilicum immergatur. Adhibeat & infusiones adstringentes ac moderate frigefacientes, uelut est plantaginis succus, polygoni, stratiotæ, malorum cotoneorum, ac mespilorum. Sed & sideritidis herbæ aut parthenij succus eximie confert. Hæc autem singula cum rosaceo aut myrteo oleo infundantur. Vinum item dulce in mali punici cortice calfactum, utilissime tepidum infunditur. Efficacissime uero fluxum compescit spongiæ pice liquida imbutæ ac ustæ cinis subditus, item que leporis piluisti. Solemus & linteum alumine madefactum ac resiccatum similiter adhibere.

FF 4 Alsinu

Alininū aut lac, si eius copia fuerit, praesertim alinae per pascua pratorū nutritae, omnibus succis praestat, ubi fluxus cū dolore defertur. Cōfert & stercoris eiusdē alinae succus, & alicae aut ptisanae succus: Et rosaceum uel per se, uel cū lacte infusum. Ceterū pelli ad rubrum fluxū iisdem faciunt, qui ad sanguinis eruptiones sunt relati, sunt autem in aliquo ex praedictis succis madefaciendi. Facit & lycium, acacia, hypocythidis succus, singula lacte bubulo aut sapa diluta. Aut galla cum thure & rosaceo. Aut spodium pōpholygis cum rosis & passo. Aut ouitesta usta cū myrto sicca & passo. Aut cinerem sarmentorū linteolo illigatum, & aliquo praedicto succo tinctū subdito. Aut senecionem herbā tritā subdito, & bibendā dato. Galla itē usta, & modo uino, modo aceto extincta, ac in pessum efformata subiicitur. Ablatis aut his, pedes adstringentibus decoctis moderate frigidis aut tepidis abluantur. Et ex relatis succis aliquis utero infundatur. In debilibus tamen ac delicatioribus sceminis mitiora adhibebimus. Aliquibus em oculi culti uteri meatus a uehementioribus medicamentis adeo cōstringunt, ut ulcus aut duricia oboriatur, & cōcipiendi facultas tollatur. Venti quoque ac lumbis refrigerantia ac adstringentia adhibeantur, uelut est portulaca, perdicū, solanū, hyoscyamus, per se & cum polenta acetoque ac palmulis. Aut ordeacea farina cū palmulis, malis cotoneis, ac mespilis. Cerata item ex iisdem praeparata pectini ac lumbis imponantur, Cōferunt & cucurbitae dorso & sub alis affixae. Et quaecumque portiones sanguinem reiectantibus cōgruunt his quoque cōmodae sunt. Velut est ex simplicibus rheon ponticum, terra samia stella siue aster appellata, terra lemnia sigillum uocata, cum plātaginis aut polygoni succo, & reliqua tum simplicia, tū cōposita, suo loco relata. Sit porro & uniuersa uictus ratio adstrictoria, quae aliquatenus crassefaciat, & potus aqua. Quod si uires collabantur, uinum crassius exhibeatur. At si fluxus multitudo reprimatur, paucus autem adhuc feratur, pro refrigerantibus ac adstringentibus, media inter haec adhibeantur, ut ne fluxu repente suppresso, inflammatio aliqua oboriatur. Utendum est & emplastris ad cruenta uulnera idoneis, uelut est quod ē salice paratur, & quod Icesium appellatur, & alia huiusmodi.

Albi fluxus curatio.

Cap. LXVII

Si fluxus albus, aut serosus, ac saniosus, aut liuidus infestat, in principio quidem resistendum non est, ut aliena a corpore excernantur. Post principium uero oleo fusino totum corpus large illinatur. Gestationes aut & uocis exercitationes, frictiones item ac deambulationes, non in hac solum fluxus specie, sed etiam in alijs conueniunt. Ipsi uero locis moderate adstringentia adhibeantur, quae simul extergendi uires habent. Et sanies profluens assidue calida aqua eluatur, & lana detergeatur, ne ab humore transeunte ulcus excitetur. Rosaceum item aut myrteum, aut melinum oleum illinatur. Aqua etiam pura nihil adstringens habens ammixtum, in principio praesertim adhibeatur ob influentis humoris acrimoniam: Et ob eandem causam etiam alicae ac oryzae succus infundatur. Facit & foeni graeci decoctum plurimo oleo fusino ammixto. Sulinum em oleum tum huic, tum alijs succis utiliter ammiscetur. Atque hi quidem succi efficaciores erunt, si quid acacie, aut hypocythidis, aut de alio quopiam ad rubrum fluxum relato, fuerit ammixtum. Possumus etiam pro fusino oleo lentiscinum aut oenanthinum adhibere. Stercus insuper caprinū cum myrrha, thure, & aloē, rosaceo & aceto addito commode subditur, ita ut his ablatis loci uino nigro austero abluantur. Vbi uero quae profluunt foetida sunt, post relato rum usum tetrapharmacū rosaceo dilutum adhibebimus, & per certa intervalla uicissim

uicissim tum prædicta auxilia, tum tetrapharmacū applicabimus. Si uero fluxus sordidus fuerit, & dolorem intulerit, uitellos ouorū assatos cū modico croco et rosaceo subdemus. Aut malū cotoneum assatū eodem modo. Et lenticulę decoctū cum plātaginis succo infundemus. At si quæ pfluunt sordida quidē fuerint, & feci similia, dolorē tamen nō intulerint, infusa ad dysenterīā idonea imitemur. Vbi autē loci purgati fuerint, adstringētibus elotionib. cōfidenter utemur. Locis uero induratis asininū lac cum rosaceo aut susino oleo infundemus, & in pello subdemus. Et si asininū defuerit caprinū succedat. Lac uero præstat quod ab aīali per prata pascēte emulget. Aliquādo etiā amyllum ad crassitudinē cōparandā, lacti ammiscemus. Pelli insup. ijdem, cataplasmataq. ac emplastra eadē quæ ad rubrum fluxū retulimus huc transferant. Præcipuā uero fiduciā in recta uictus ratione habere oportet. Nec quātitatis solum, sed etiā qualitatis eduliorū ratio habenda est. Sitq. alimentī materia talis quæ & crassefaciat ac uīres corroboret. Quales sunt sorbitiones ē tritico ac lacte paratæ, nō aquosæ ac dilutæ, sed probe cōpactæ, quæ pro occasione etiā ex passo cretico parent. Carnes uero eligendæ sunt siccandī ui præditæ, uelut aues montanæ, & ferarum animantium.

Ceterū ubi fluxus cessauerit, à ueloci ambulatione, à multis pectinis ac lumborū frictionibus, ab acrimia esu, à calfacientibus, à flatuosis, & ab his quæ urinā proleciāt, diu abstinendum est, & balneis raro utendum, neq. uēter mouendus est, neq. spiritus retinendus. Hęc em̄ omnia malū reuocāt. Partes autē superiores sensim ac leniter exerceant, ac perfricent. Inseffiones fiat in aqua nō adeo frigida. E' pellis autē subdititijs elaboratiores ac medicamentosi uident. Verum post inseffiones rosaceum lana exceptum subdatur, & in ipso curationis tempore agrotæ bibant ea quæ ad sanguinis per sputum reiectionem retulimus. Faciunt & prœonię grana pallida x v. assidue pota. Aut corallorum drachm. i. ē uīno nigro. Aut uinacea trita cum uīno. Aut leporis siue hœdi coagulum erui magnitudine in posca dilutum, Aut corticis loti arboris decoctum. Aliud Aspasīæ. Ad mulieres quæ sinum pudendi ualde humectum habent, ut ex eo nō concipiant. Gallas per octo dies aqua macerato, deinde lanā purā ac mollē in aqua illa siue cremore gallarum tingito, & non exprimito, sed siccatū finito, & lanā ita subdendam dato. Ex hoc mulier uelut uirgo reddetur, & hoc sæpe repetat. Aliud. Semen rumicis acuti cum pauca aqua subigito. Aut si uiride fuerit, per se terito, & subdendum exhibeto, & fiet pudendum uelut uirginis adstrictum.

De uteri strangulatione.

Cap. LXVIII

Vteri strāgulatione ab utero quidem inferne oriū. Verum supernæ partes & principales præsertim, per cōsensum afficiuntur. Nā ad cor per arterias: Ad cerebrum per spinā mēbranas ac neruos: Ad hepar per uenas affectio trāsit, uideitq. uterus uelut ad supernas partes ascendisse. Cōsequitur affectus accedēte exacerbatione, mentis lāguor, pigricia ad agendum, debilitas crurum, pallor faciei, tristis aspectus. Insistēte uero strāgulatione, sopor grauis ac pfundus, mentis ac sensus aspectus. Insistēte uero strāgulatione, sopor grauis ac pfundus, mentis ac sensus apprehensio, cū uocis interceptiōe. Pulsus autē paruī ac debiles fiūt, & aliquādo penitus interceptiūt. Quibusdā autē neq. respiratio sensibilis pmanet. Aliquę uero alijs actionib. integris manentibus, magnā respirationē ex hac affectione habent. Et hinc manifestū est quod nō circa cor et stomachū cōpressio, aut morasus, aut pfrigeratio, à partis ascensu fit, sed circa partes respirationis, & pulmonē hoc cōtingit. Quapropter neq. animi deliquiū his uehemēs est, quū cor affectio nis exors pmaferit. Neq. em̄ fieri potest ut animi deliquiū citra cordis cōsensum ingruat. Ceterū affectiōis differentia, pro causæ efficientis differentia ac magnitudinē

tudine sunt. Et sanè quidā experiri uolentes an aliqua adhuc supersit respiratio, lanā carptā naribus admovent, atq; inde ex lanæ motu colligunt, an aliqua inspiratio aut expiratio restet. Alij poculum aqua plenum ad os uentris ponunt, & considerāt an aliquo motu aqua agitetur. Et profectō utriq; ignorāt, aliquando sublata penitus oris ac narium respiratione, superesse adhuc eam quæ in toto corpore ab arterijs perficitur. Id quod etiam in reptilibus uenenatis contingere uidemus. Hæc enim per totam hyemem mortuis similitima in cavernis latitant, per arterias tantum totius corporis respirātia. Sic etiam in uteri stragulatione fieri potest, ut toto corpore frigefacto, oris ac narium respiratio intercideret, supersit autem ea quæ ab arterijs fit. Sed & oris ac narium respiratio adeo parua esse potest ut sensum lateat. Profundissimo itaq; sopore corripiuntur huiusmodi mulieres, uoce, sensu, ac motu interceptis. Stomachi etiā dolore uexant, & saliuā uomunt, si in stomacho aut capite humiditas sita est. Deinde uero exolutis causis corpus firmari incipit, & malæ rubescunt, & oculi post multā grauitatem attollunt. Et ubi iam malum agrā relicturū est, humiditas quædā ex locis muliebribus excurrēs tactu percipitur, & intestina murmurāt, & ipse uterus paulatim laxat. Atq; sic exurgens ægra intellectū ac sensum recipit. Accidit hæc affectio omni quidē tēpore, sed hyeme præcipuè ac autūno, iunioribus præsertim, salacibus, ac sterilibus, maxime si per medicamenta steriles fuerint. Oritur autem uel utero perfrigerato dum menses prodeunt, uel propter abortum, uel sanguinis eruptione ab utero, ab aliquo repente suppressa. Atque hic morbus ubi inuadere assueuerit, comitialis modo diuturnus & per circuitum repetens efficitur, & tutus quidem apparet, singulis tamen accessionibus præceps periculum affert, ut non eadem solum die, sed intra paucas horas interimat. Et pulsus quidem primum densiores fiunt, & inordinate mouentur, deinde etiam penitus intercipiuntur, & exiguua quædam humiditas cutis superficiem irrorat. Similiter & respiratio primum obscuratur, postea penitus intercedit. Est autē hic morbus flatuosa perfrigeratio, non inflammatio, uelut Soranus putat. Semen enim in utero paulatim coaceruatum, aut alia quædam materia insita ac putrefacta, perfrigeratur, & ad cerebrum ac cor frigiditatem transmittit, atque hæc partes principales frigefactæ relata accidentia inferunt. Et ego sanè mulierem uidi in hunc morbum collapsam, dum ab obstetrice laxantia ac odorata auxilia adhiberentur, & pendendi sinus digitis penitus confricaretur, tum ex auxiliorum admotorum caliditate, tum ex digitorum contrectatione, se contraxisse cum dolore quodam uoluptate permixto, deinde excreto multo crasso uiscosoq; semine, protinus à molestijs ac afflictionibus liberatam esse. Neque mirum uideri debet uel ex nimia humorum mole tanta accidentia consequi. Si enim paucissima ueneri quantitas, & tam exiguum uirus reptilium per angustissimum foramen eiectū, mala longe sæuiora inducit, non absurdum dictū est, semen corruptū aut mensurum sanguinem suppressum ac detentum, talia inuehere accidentia. Sed & ex canum rabie facilis huius rei coniectura est. Tāta enim inde humorum fit alteratio, ut si eorū canum saliuā solū corpus humanū cōtigerit, cōfestim rabiem insum fieri, uitioso humore uelut diximus in eo collecto: Sed sæpe etiam ex uentris repletionē utero affectionem transmitti. Et aliquando hepatis aut splenis causa, uasa ex quibus uterus dependet retrahi. Quum ergo uterus ex seipso laborat, pro seminis uel menstrui sanguinis coaceruati quantitate, ac qualitate, alia aliās accidentia consequuntur. Si enim causa efficiens frigefaciendi uires habuerit, ita uniuersum

uniuersum corpus perfrigerabitur, ut respirationis ac pulsuum sensus penitus a-
boleatur. Si uero humores affligentes crassi aut acres fuerint, cōuulsio subseque-
tur, quemadmodū atræ bilis humores animi tristitia comitat. At animi deliquia
exacerbationum uehementia, & maxima perfrigeratio, & oris uentris afflictio
inducit. Aegra itaq; ceruice ac scapulis acclius collocei, scemoribus ac inguinibus
decliuius. Et in ipsis exacerbationibus extreme partes deligentur, & pedes
ac crura fricentur. Naribus autem odorata admoueantur, uelut est galbanum,
aut castorium, aut sagapenum, singula ex aceto trita, ac naribus illita. Aut ace-
tum acerrimum in quo pulegium, calaminthe, thymus, origanum, conyza te-
nuis, & alia huiusmodi acria decocta sunt, calefactum naribus adhibeatur. Hæc
enim crassos uapores cerebri incidere & attenuare possunt, ac simul frigidita-
tem depellere, & inspirata thoracem ac pulmonem expurgant, & stomachum
corroborant. Excitentur etiam sternutationes, castorio, pipere, struthio,
naribus per specillum admoto. Os autem ægræ aperiatur, ac medius digitus
ad uomitum proliciendum intromittatur. Nares item castorio, bitumine, gal-
bano, sulphure suffiantur, aut funiculo lucernario recens extincto, aut pennis
ustis, aut soleis antiquis, aut ceparum aut alliorum corticibus, aut capillis ipsius
proprijs exustis. Aut cornu caprino incenso, aut pice ad prunas liquecente,
cedria que ac ueratro: Aut pane recens incenso, & similibus. Quidam etiam
matulam urinariam inueteratam, & pannos sulphuratos incensos naribus ad-
mouent. Sinapi item tritum cum aceto, & gagates lapis aqua tinctus & in-
census, ac oleo extinctus, naribus adhibeatur. Aut rutam uiridem manibus
contritam suffito. Vterum uero inferne per pudendum odoratis suffito, flora-
ce uidelicet ac sandalis, & aloë, ac similibus. Illinantur etiam intra pudendum
ea quæ laxandi, calfaciendi, ac flatu dissoluendi uires habent, qualis est pessus
Enneapharmacus appellatus, & ceteri eiusmodi ad uteri duricias inferius de-
scripti, amaracino, gleucino, irino, cyprino, aut capnisto oleo diluti adiecia
etiam ruta aut cumini portione. Atque hæc digitis excepta obstetrix usque
ad uteri os immittet, ac leniter & diu confricabit, ut hinc irritatus crassus hu-
mor qui in utero hæret, prouocetur ac calefactus excernatur. In ipsum quo-
que uterum per uteri futorium clysterem, amaracinum aut gleucinum aut fo-
liatum unguentum injiciatur. Et in sedem glandes indantur, ex ruta, cumino,
nitro & melle cum aliquo ex relatis ungentis & butyro præparata. Est & cu-
cubita primum inguinibus ac scemoribus, deinde utrinque circa umbilicum,
cum plurima flamma citra scarificationem affigenda. Et super hæc omnia mu-
lier magnis uociferationibus excitetur ac uocetur. Inseffiones quoque paren-
tur in decoctis baccarum ac foliorum lauri, pulegij, calaminthes, marrubij, arte-
misie, conyzae, fabinae, centaurea, dictamni, sampsuchi, sceni graeci, althea, cha-
mæmeli, aristolochia, iridis, serpylli. Inseffionum uero tempore cerebri cura
non relinquatur, sed rosaceo & aceto caput irrigetur, & in aceto prius serpylla-
rum, sphondylium, ruta, bacca lauri, interdum & castorium coquatur. Et na-
ribus prædicta odoramenta assidue adhibeantur, præsertim castorium cum a-
ceto. Præcordia item fascijs uinciantur, & distentis manibus os uteri com-
primatur. At ubi exacerbatio instat, ægra ad uomitum cogatur. Omnes enim
uomitum leuantur, sed præcipue quæ cibo grauantur. Tertia uero die cucu-
bitæ cum scarificatione pectini ac lumbis affigantur, deinde loci scarificati sale
cōspargantur. Et ubi ab huiusmodi auxilijs discesserimus, ad castorij potionē tra-
sibimus, quod assidue potū sepe penitus ab hoc morbo liberat. Dandū est æquidie
drachmæ

drachmæ pondere, aliquando cum aqua mulsa, aliquando cum artemisîæ decocto, bituminis quoque scrupulus utiliter ei ammiscetur. Nec parum iisdem confert acetum scillinum assidue potum. Atque hæc curatio in morbi exacerbationibus adhibetur. Vbi uero diuturnus factus fuerit, plerumque à uenæ sectione initium facimus, præsertim si menstruæ purgationes fuerint detentæ. Deinde ad alui euacuationem progredimur. Achiera quidem ex colocynthide omnium efficacissima est: Mulieribus tamen & uteri affectionibus magis conuenit hiera ex aloë picra, hoc est, amara appellata, quæ habet aloës drachmas centum, asari, croci, cinamomi, mastiches, spicæ nardi, xylobalsami, singulorum drachm. VI. Hoc medicamentum aridum seruari debet. Vfus uero tempore ad integram alui duccionem, drach. quatuor, ex eo cum aquæ mulsæ cyathis sex propinentur. At si partitam purgationem maluerimus, drach. II. tantum ex tribus aquæ mulsæ cyathis exhibebimus. Ita enim stomachum firmat, uires reparat, ac morbum depellit. Neque post adeptam sanitatem medicamenti usus statim deferendus est, sed quantitas solum paulatim imminuenda. Peracta euacuatione, cucurbitæ inanes quidem, sed cum plurima flamma affigendæ sunt, & uiolenter detrahendæ. Aliquando etiam scarificatio fit, & scarificati loci sale consperguntur, deinde cum cyprino cerato ad cicatricem perducuntur. Deinde emplastrum siue epithema emolliens pectini adhibeatur quod è seminibus præparatur, supra inter splenis auxilia descriptum, primum cum cerato dilutum, postea cerato paulatim detracto, ipsum solum per se imponatur, donec pustulæ uelut uari in cutis superficie excitentur: Quæ postquam emplastro albo, aut alio quopiam ad ambusta destituito, fuerint sanatæ, iam locus est sinapismis & dropacismis acopisq; appellatis, ex euphorbio, pyrethro, adarce ac piperis paratis. Multum uero conferet ad medicamenta etiam recta uiuendi ratio, per deambulationes matutinas, gestationesq; in curru, uel naui, uel iumento. A motu uero gestationis prodest uociferatio, & lectio clara, modulata ac concinna. Item unctio, frictio, & exercitatio per congrua intervalla repetita. Balneum autem raro, & non nisi sordis detergendæ gratia adhibeatur, & tamen bis aut ter per totam curationem, ad morbum expellendum admitti potest. Postremum uero confugium est ad balnea naturalia, tum calida, tum frigida. Recuperata tandem sanitate mulier non omnino negligatur, sed præseruationis gratia per certa intervalla, suspectis præsertim temporibus, inflectiones supra relatæ adhibeantur, & saluæ, pulegii, mercurialis, fœni græci decoctis, loci eluantur. Et pessi calefacientes & emollientes post elotiones subdantur. Philosophus uero inquit: Ad mulierem ex uteri strangulatu collapsam, plurimis remedijs frustra tentatis, duos staminum gloriosos in oleum anethinum seruens coniecimus: Et alterum probe expressum calidissimum loco adhibuimus, & antequam frigeret, alterum pro eo subiecimus, hocq; uicissim tam diu repetiuius, donec mulier citra dolorē exurgeret. Sed & ceratum ex araneis interdum umbilico imposuimus. Aliud, Ad uteri strangulatus ac dolores. Testudinis terrestris hepar tritum in pello subdito.

Pessi ad uteri strangulationem idonei.

Cap. LXIX

Pessi ad strangulatum uteri idonei tales sunt. Adipis anserini sexuncem, mastiches, adipis phasiani, styracis, singulorum quadrantem, ceræ quadrantem. Vngenti nardini, spicæ nardi, croci, singulorum unciam unam, crocus cum uino odorato ueteri teratur, sitq; uinum adstrictionis omnis exors. Alius. Ceræ sexuncem, ammoniaci, mastiches, singulorum unciam unam, opobalsami, olei irini, singulorum quadrantem. Alius, Styracis sextantem, ceræ albæ doquantem, cassiæ,

castæ, spicæ nardî, amomî, croci, mastiches, singulorum drach. i. adipis porcini, terebinthinæ, singulorum sexuncem. Thuris sesquiciam, adipis anseris & phasianî, singulorum quadrantem, opobalsami, olei liliorum, amaracini, cyprini, nardini, irini, singulorū unc. i. Quod si ualidiorem facere malueris, cardamomi drach. quatuor adijce, & seminis rutæ tantundem. Oportet autem aëris constitutionis respectu, ea quæ calefaciunt detrahere uel addere.

Vnctiones ad uteri suffocationem. Philagrii.

Cap. LXX

Vnctiones post balnea præseruationis gratia tales adhibeantur. Olei dulcis lib. i. seminis uiticis, rutæ, contusorum singulorum quadrantem, casia tritæ quadrantem. Omnia simul misceto, & sub canis æstu per dies quadraginta insolato. Quod si pro temporis anni, aut regionis, aut temperaturæ calidioris siue frigidioris ratione, unctiois uim intendere uel minuere uolueris, addito ac detractito ex medicamentis quantum ex re esse iudicaueris. At si unctio præparata non fuerit, irino ungento rutam, aut casiam, aut amomum, aut quicquid ex his quæ supra dicta sunt ammisceto, ac utitor. Possunt & citra balneum hæ unctioes peccini ac lumbis illini. Efficaciores autem euadēt, si adarcen ustum uel crudum, aut pyrethrum, aut piper tritum, aut oleum laurinum, aut cicinum, & reliqua eiusmodi addideris, ita ut unctio crassior fiat. Alia unctio ad eandem uteri strangulationem. Terebinthinæ, olei laurini, singulorum sexuncem, olei irini, anethini, singulorum lib. i. seminis cannabis, adarcæ, singulorum sextantē, piperis, saluæ, calaminthæ, singulorum unc. i. Pyrethri sextantem, nigellæ, casia, singulorum unc. i. Arida tenuissime trita liquabilibus liquatis ammisceto, unito, ac adseruato. Vfus autem tēpore aliquo oleo calido diluito, pecciniq; ac lumbis illinito. Suffumigium uteri. Stercoris canini albi, & sabina, æquales portiones suffito. Et si torsiones successerint, morbi uexationes quiescent.

Varia auxilia ad uteri strangulationem. Philagrii. Cap. LXXI

Mulieres ad uteri strangulatum procliues, diospolitico pharmaco assidue uti debent, & eo quod ex tribus piperis generibus constat, & quod ex calamintha appellationem habet. Singulis autem ammiscenda sunt quæ semen minuunt ac abolent, qualia sunt uiticis, rutæ, cannabis semina, nymphaeæ radix, ac reliqua huiusmodi, quæ in uenereorum tractatu retulimus. Castorij quoq; drach. i. assidue potent, modico aniso adiecto. At uero si prægnantibus respiratio intercepta fuerit, foris quidem ad corporis temperiem emendandam, auxilia adhibenda sunt, uerum potiones, & quæ in uterum funduntur aut subduntur penitus uitare oportet, sicut etiam clysteres & sanguinis missionem. Ex omnibus enim his abortus periculum imminet. Cæterum meminisse oportet, ut his quæ neq; contractionem, neq; declinationem uteri patiuntur, pro humiditatis aut siccitatis ratione medicamenta idonea exhibeantur, & ualidiora: Sicut his quæ rarum ac molle corpus habent imbecilliora, & rursus oppositis fortiora. Idemq; iunioribus simpliciora, ætate prouectioribus efficaciora. Et his quidem quæ totius corporis distentionem à flatu uentoso percipiunt, flatus leuantia exhibenda sunt. Quæ uero grauitatem perceptant, incidentia ac attenuantia. His autem quæ humorum acrimonia uexantur, laxantia ac pingua. At si declinatio, aut contractio, aut inflammatio circa uterum fuerit, omnia imbecilliora offerantur. Fortiora enim morbum exacerbant, et seminis excretionem prohibent. Et contra quæ pro curandi corporis ratione moderata sunt, tum ipsi affectioni medentur, tum seminis excretionem adiuuant.

GG De

De seminis fluxu. Sorani.

Cap. LXXII

Mulieres non aliter quàm uiri è seminis fluxu laborant. Est autem hæc affectio seminis citra concitationem ac tensionem ueneream profluuium, ad quod uteri laxatio ac debilitas, & totius corporis tabefactio consequitur. A toto enim corpore materia paulatim ad uterum confluit, atque isthic modice uelut in oculis lachryma mutatur. Et sæpe contingit ut affectio hæc diuturna fiat. Quæ propter recentem adhuc reprimere ac sedare conabimur, per ea quæ sensim adstringunt, uelut est rosa, myrtus, rubus, lentiscus, & huiusmodi. Pectiniq; ac in guinibus acaciâ, hypocythidem, & similia cum uino austero imponemus. Cætera item ac cataplasmata è palmulis, malis cotoneis, ac myrti baccis adhibebimus. Laminam quoq; plumbeam latam ac tenuem lumbis alligare oportet, & stratum nō sit delicatum, sed potius asperum. Vomitus à ieiuniis quidem fiat, à cibo tamen admitti quoq; potest. Præterea partes supernæ exerceantur ac diu cōfricentur. Et cauendum ne affectæ partes inungantur aut calefiant. In potu detur solani radix arefacta, aut uitiçis, aut rutæ, aut cannabis semen ex aqua, singula drachmæ pondere. Cibi uitandi sunt exoluti ac forbiles, & ad seminis generationem, ac uenerem excitandam idonei. Vescatur aut solidioribus edulis, & auiculis assatis utatur, ac uinum fuluū bibat. Et omnia uitet quæ ad uenerem irritare possunt, ita ut neq; picturas, neq; signa formosa spectet, neq; de concubitu uerba faciat. Sed tetrica uiuendi ratione, lectionibusq; ac colloquijs seueris utatur. Perseuerate uero affectione, exercitia, sudorum prolestationes, frictions, & frigida balnea abhibeantur. Et rosaceum assidue pectini ac lumbis illinatur. Si uero aliquādo ob acriorem constitutionem ac qualitatem irritans ac quodammodo mordens sensum, semen ipsis prodit, contrarijs cibis ac potibus utatur, balneis item ac lactis potu, & fructibus, & aquæ potu, ac similibus. Trāsferantur etiam huc quæ ad seminis profluuium in uiris, & ad seminis in somno effusionem supra relata sunt.

De uteri debilitate. Sorani.

Cap. LXXIII

Quemadmodum aliæ corporis partes, ita etiam uterus aliquādo debilitatur. Consequitur ad hanc affectionem, fastidium ueneris, flatus uentosi excernuntur, menses exuberant, & singulis mensibus bis aut ter inordinate deferuntur, nigri & aquosi. Neq; semen uiri iniectum diutius detinetur, sed à concubitu defluit, aliquibus statim, quibusdam post aliquot dies. Quædam abortum faciunt, aliæ quæ non abortientes gracilem ac imbecillem foetum generant. Menstruorum uero tempore pectinis, lumborum, ac crurum grauitas adest, & stomachus male habet, & hinc uaporibus ad caput eleuatis aliquando deliria succedunt, similesq; sunt harum uexationes his quæ ab utero strangulantur. Quandoq; etiam uelut atra bile percitæ desipiunt, ac furore aguntur. Oritur hoc malum ex asiduo partu ac uteri distentione, præsertim ubi foetus insignis fuerit magnitudinis. Curatio earum facienda est, per ea quæ firmandi ac debiles partes corroborandi uires habent. Inseffiones itaq; adstringentes ad tactum tepidæ, & uteri elotiones conueniunt. Et rosaceum oleum tepidum, aut narcissinum, aut melinum, aut fusinum, & huiusmodi, pectini ac lumbis illinantur. Et mulier per congruos motus assidue exerceatur, & alimentis utatur paucis quidem, sed quæ cum leui quadam adstrictione carnis copiam generant. Vinum autem fuluum adstringens parcissime poter. Est enim sitis huic affectioni commoda. Omnem uero lactis esum, & obsonia è caseo parata uitare oportet, uniuerfas item purgationes atq; alui ductiones recusare.

De

De furore uterino. Eiusdem.

Cap. LXXIII

Furor uterinus est uteri intemperies, ad affectionis cōsensum cerebrum trahēs, ad quā rabiosum delirium cōsequitur. Differt ab uteri strāgulatione primū causa, neq; enim hic uterus sursum tractus principalē aliquam partē ad affectionis cōsensum ducit, aut cōpressionē, aut morsum, aut uaporem. Sed eodem loco permanens per medullā spinalem, aut alias sibi insertas propagines, uitiosam qualitatem quācūq; tādem ad cerebrum mittit. Deinde etiā signis ab uteri strāgulatione differt. Aegrotæ enī minime in hac sicut in illa affectione mutæ ac sine sensu decūbunt, sed potius garrulæ, iracundæ ac inquietæ fiunt. Differt etiā a furore nō per cōsensum, sed primario cerebrū imperitē. Harum enī amentia tota in uere uersa, et nihil aliud imaginātur aut loquunt, quā de coitu, pruriensq; pudendum habent, eiusq; attactu mirū in modum delectant. Accidit hæc affectio tēperatura calidis, ætate uigentibus, uirginibusq; ac castitatē seruātibus, & quæ optimis edulijs uescunt, & in delicijs ac animi uoluptate uersant, præcipue si aliās libidini ac ueneri adfuetæ fuerint. Nihil enī aliud est hæc affectio quā ardor & feruor uteri, ad cerebrū & totū corpus distributus. Proinde quæ suprà ad calidā uteri intēperiem relata sunt utero adhibenda, huc trāserant. Irrigationes autē capitis, & alia auxilia furori cōgrua Sermonē sexto retulimus. Peculiariter autē huc facit pastillus Trigonus, cū æquis portionib; crocomagmatis ac cypheos aromatici. Facit & hydrososati potus. Et hoc medicamētū. Smyrni, croci, spicæ nardi, singul. unc. i. excipe diacodio aut hydrososato, & drac. ii. pōdus ieiunis exhibe cū coriandri decocto. Quod si ob corrupti seminis redūdantiā affectio cōtigerit, nitrū & cardamomū cerato excipito, ac pudēdis subdito. Saluæ enī simile quid elici, & affectio sedat. Ruta uero cū castorio in myrteo cerato supposita, genitura siue semē cōtrahit, et furorē mitigat. Sed et diacodiū aceto aut solani succo amixto subditū ardorē extinguit.

De uteri resolutione. Eiusdē. Cap. LXXV

Vterus sæpe etiā ob alias causas, sed maxime ppter frequentes abortus resolutionē. Cōsequitur ueneris odiū, oris uteri frigefactio, eiusdēq; plenus, pinguis, & uelut infartus habitus, ceruicis itē laxitas ac stupiditas. Sæpe etiā menses supprimunt, aut ægre pdeunt. In congressu uiri uel nihil omnino seminis in uterū immittitur, uel iniectum uelut ex inanīmato loco statim effluit. Aliquando etiam urina & sterco importune prodit. Curatio autem similis est ei quā de menstruorum stillicidio diximus, facit & assiduus castorij potus, & pessorum calefactionum, elotionumq; ac unctionum adhibitio.

De uteri prolapsu. Eiusdem.

Cap. LXXVI

Prolabi uterum dicimus, quū ita evertitur ut foras promineat. Neq; enī totus a suis appendicibus exolutus, uelut imperiti putat, excidit. Nā si ita procideret restitui nō posset. Quod autem procidit struthocāmeli ouo simile est, iuxta maioris ac minoris differentiā, prout uiolenta eversio cōtingit. Sunt autem prolapsus causæ multæ. Ab alto enim delapsa mulier & in coxas delata, diruptis pelliculis ac ligamentis quæ uterum cōtinent ac uicinis partibus cōnectunt, hoc malo corripitur. Corripitur & ob uiolentā secundæ extractionem, quod præcipue in abortibus cōtingit. Præterea inartificiosa foetus extractio, aut nimia spiritus detentio, aut immēsi oneris eleuatio, aut plaga, uteri prolapsum inducit. Sæpe etiā ob humoris plurimi ac lentī defluxū, & ob partuum frequentia, appendices ex quibus uterus dependet, laxatū ac solūm. Quin & ob uehemētes animi affectus, uelut si liberorū amissio, aut hostiū incursus nunciet, aut ob periculosam navigationem, aut eiusmodi quandā causam, mulieres toto corpore exolui solent, ita ut

GG 2 uterus

uterus simul prolabat. Aliquādo etiā citra ullā eiusmodi causam partes debilitā-
tur, ut prop̄ pellicularū ac musculorū uterū sustinentiū resolutionē, hęc affectio
cōtingat, quod inclinata etate maxime fieri solet. In principio itaq; plurimus san-
guis erūpit, deinde cōsequitur dolor p̄cordiorū, lumborū, imi uentris, ac puden-
dorū, & periculū est ne p̄frigeratis locis cōuulsio inferat. Vbi uero ipis progressu
affectio inualefcit, & loci callosi facti fuerint, neq; cōuulsionis periculū imminet,
neq; dolor infestat. Quū ergo adhuc recens est affectio conari oportet ut uulua
ipsa cōtrahat. In principio em̄ facile dirigit, & recte locata pmanet, præcipue in
uigoris etate. Nā in etate profectionibus contrahitur quidem, sed ex leui occa-
sione rursus prolabit. Si itaq; durū stercus in recto intestino esse suspicaberis, per
clysterem euacuabis. Similiterq; si in uesica lotium collectū fuerit, per fistulā uelū
cæ adaptatā euocabis. Cōtingit em̄ plerūq; ut illarum superfluitatū detenti. ne,
uterus inter utriūq; rectum inquā intestinum ac uesicā situs, cōprimatur ac coar-
ctetur, & impediatur ne repelli, & ad propriū situm reduci possit. His aut̄ per-
actis agra supinā collocabimus, coxis altioribus, reflexis poplitibus, ac cruribus
disparatis. Deinde prolapsam uteri partem oleo tepido, aut butyro, uel betæ, ma-
luæ, altheæ, foeni græci, seminis lini, aut similiū decocto fouebimus; & lanā cō-
uolutā figura ac crassitudine muliebri pudendo correspondentem accipiemus,
eāq; linteolo inuoluemus, & acaciæ aut hypocisthidis succo uino diluto intina-
gemus, ac utero apponemus, & citra uiolentiā totum quod prolapsum est repri-
memus, donec tota moles intra sinum recipiatur. Postea lanā in pudendū sub-
demus, & alium lanæ hapsum uino adstringente imbutum superponemus, atq;
totum peñinem spongij ex posca expressis integemus, & mulierem reclinabi-
mus crura extensa ac coaptata habentem, ita ut alterum alteri incumbat. Tutius
tamen fuerit per fasciā ad genua usq; cōstringere. Aliqui uterum recens prola-
psum cucurbitæ domesticæ ac betæ decocto, cum urina graueolenti, aut acri
aceto, aut re aliqua foetida proliunt. At uero si prolapsus uterus temporis pro-
gressu intumuerit, plurimoq; humore refertus fuerit, ut præ tumore reduci non
possit, betarum decocto ipsum rigamus, deinde acetum affundimus, & salem te-
nuissimum inspergimus, & postea sedato tumore, eodem decocto perfusum re-
trudimus. Deinde cucurbitas umbilico & utriq; lateri cum plurima flāma affigi-
mus, & odorata assidue naribus admouemus. Tertia uero die lana adhuc intra
pudendi sinum existēte, mulier in uino nigro austero aliquatenus tepefacto, aut
in myrti, lentisci, rubi, ac malicorij decocto insideat. Et post infessionem rursus
supina coxis altioribus locetur, & sublata ex pudendo priore lana, alia rursus eo-
dem medicamento imbuta subdatur. Cataplasmata uero forinsecus imponantur
ad imum uentrem, ex palmulis, polenta, lenticula ac malicorio, cum aceto muls-
so. Atq; hæc rursus tertia die fiant, usq; ad perfectā curationem. Porro uteri
crebro prolabentes posca abluantur, in eademq; mulier diutius insideat. Dein-
de omnia relata fiant. Sape uero ob locorum sensus subtilitatem, reiecto aceto
terrā nigram quā in lentibus reperimus aqua diluimus, & ex ea partem affectā
plurimum fouemus, ac postea eadem medendi forma utimur. At uero si ute-
rus ob humorum lentorem difficulter repellitur, uini fecem ustam, aut nitrum li-
xiū permixtum obluimus, & cum decocto aliquo adstringente, aut cum præ-
dicta terra aqua diluta fouemus. Deinde plūbi cremorem oleo myrteo aut me-
lino ammixto, parti prolapsæ illinimus ac in sinum pudendi retrudemus. Loci
insuper interni, agra undiq; circumfecta rebus foetidis suffiantur. Naribus
autem odoratissima quæq; admoueantur. Et cibi boni succi, & uina odorata re-
nuia

nuia offerantur . Ferunt torpedinis coriū recens detractū, parti prolapsæ obuo-
lutū, ipsam repellere. Atq; idē posse pastinacæ marinæ aculeū cū hyoscyamī suc-
co illitū. Illud autē obseruandū est ne alius nimīū subducatur. Exoluuntur em̄ la-
xanturq; uicing partes, & uterus recidit. Si uero pars prolapsa tēporis progressu
per negligentia cōputruerit, & ex assidua urinæ irrigatione & adherentibus sor-
dibus exulcerata fuerit, auferatur citra ullius periculi formidinē. Narrāt em̄ totū
uterum putrefactū aliquādo ablatum esse, & mulierē nihilominus superuixisse.

De reclinatōe, auersione ac recurſu

uteri. Aspasia.

Cap. LXXVII

Suppressis mensibus necesse est uenas & arterias ad uterum tendentes reple-
ri. Nam sanguis usq; ad uasorum oscula accurrit quidem, uerum intra uterum
prodire nō potest, aut eo quod nimia crassitudine osculis impingitur, & grumo-
sus sit. Aut quod ipsa oscula clausa sunt, & transitum impediunt, ita ut uenæ hu-
more refertæ extendantur, & uicinos uteri appendices humectent, quorum ex-
tensione uterus retrahitur. Si itaq; ex utraq; parte æqualis retractio fiat, reclina-
tio, aut reuulsio siue recurſus uteri æqualis contingit. Si uero in alteram partem
maior retractio fiat, alterum ē uisceribus his in causa est, splen uidelicet aut he-
par, quorum uenæ superfluo sanguine extenæ à suis partibus uterum retra-
hunt, hepaticæ uenæ ē dextris, splenicæ ē sinistris, prout alteræ magis fuerint re-
pletæ. In utram uero partem uterus declinauerit, digitorum admotione, & si-
gnis insequentibus cognoscemus. Si enim in obliquum declinauerit, propina
qui fœmoris distentio, dolor, perfrigeratio, impedimentum, & torpor indicio
erit. Aliquando uero etiam eiusdem arefactio, & ad innitendum ac ambulan-
dum impotentia consequitur. Si uero retro aut infra inclinatur, torpor ac difficilis
utriusq; cruris motus sequitur, sæpe etiam motus penitus intercipitur, & ingens
uexat dolor. Alius etiam supprimitur, neque clysterem admittit, nisi genibus
innitatur agra. Flatus item retinentur, & dolores inter sedendum acuntur,
præsertim si uersus anum reclinatio contigerit. At si ad pubem uergit, imus
uenter ac pectus extenditur, & dolores ibidem percipiuntur, aliquando etiam
urina supprimitur. Quomocunq; igitur uterus retractus ac inclinatus fuerit,
eodem modo uelut inflammationes in exacerbationibus curare oportet. In
remissionibus autem & declinationibus, magis emollientibus utendum est.
Perseuerante uero affectione, his quæ ex alto attrahere, & corporis habitum
mutare possunt. At uero auersionem uersus anum ita curabimus. Primum
obstetrici imperabimus ut digito in anum immisso uterum propellat. Deinde
glandem ano subdat quatuor digitorum longitudine, ex galbano & cera para-
tam, cuius extremitati filum extractionis gratia sit annexum. Aut castorium
aqua dilutum & lana exceptum similiter subdatur. Aut bitumen aridum, aut
pix liquida. Postridie uero irinum aut fusinum oleum tepidum, in uterum &
intestina infundatur. Et loci aromatum, aut marrubij, aut conyzæ decoctio fo-
ueantur, & ex eodem uterus eluatur. Postea ceratum rosaceum adhibeatur. Si
uero in obliquum retractio inclinatur, primum eadem fomenta adhibeantur. De-
inde obstetrix specillo cum digito subimisso, uteri collum dirigat. Aegra ue-
ro in contrarium parti affectæ latus, aut supina decumbat. Pessis insuper mola-
rentibus aperientibusq; utemur, & ex prædictis oleis aliquod infundemus, &
pectini lanam uino & rosaceo imbutam, Aut succum seminis lini cerato exce-
ptum imponemus. Et castorium cum aniso, aut cumino, aut nigella, aut pæoniæ
radice, aut smyrnij, aut dauci semine, aut aristolochia, aut gentiana, aut helenio,

GG 3 ex

ex aceto mulso propinabimus. Eadem etiam ad repentinos uteri dolores facti
unt, non singula solum per se, sed etiam simul coniuncta. Mulier autem accliu
capite decumbat, & si compositus recte uterus rursus retrahatur, foetida statim
naribus admoveantur, & sternutationes prouocentur. Et si urina supprimatur,
fistula uesicae ad hoc destinata proluciat. Et si ab his exacerbatio fuerit exoluta,
quiescendum est. Ceterum pro afflictionis magnitudine, si aegram adole
scens & sanguineam nacti fuerimus, considerabimus an cubiti uena sit secan
da. Deinde menses prouocantia propinabimus, & pessis mitioribus utemur.

De uteri inflatione.

Cap. LXXVIII

Vterus aliquando ex partu perfrigeratus flatu impletur, osculo ipsius conclu
so, aut grumo sanguinis in ipso impacto. Flatus autem ipse quandoque in uteri
cavitate concluditur, quandoque in corporis ipsius uteri angustijs continetur.

Consequitur pectinis ac imi uentris tumor, uelut in hydropo tympanite, cum
dolore pungituo, perpungente usque ad septum transversum, & stomachum, &
nihilominus utrinque in lateribus extento, & saepe ad alterum, saepe ad utrumque
inguen se extendente. Umbilicum item lumbosque ac pectinem idem infestat, &
caput quoque per consensum afficit. Quandoque uero flatus per muliebrem puden
dum erumpit, ut aegre id percipiant. Si itaque flatus in uteri cavitate fuerit con
clusus, strepitus ac sonitus quidam in corporis flexu auditur, qualis in intestinis
contingit, quae torminibus uexantur: Et ad digitorum pulsationem sonus tym
pani redditur. Si uero intra uteri angustias continetur, dolores uehementiores
ac curatu difficiliore infestant. Huiusmodi autem affectiones fame, ac olei dila
tis calidi irrigatione, in quo ruta et anethum decocta sunt, curantur. Et nisi aetas,
regio, & anni tempus obstiterint, uena secetur. Infectionesque in ruta, pulegij, cala
minthes, marrubij, thymi, artemisiae, altheae, ac caricarum decoctis fiant. Et corpus
per hiera Rufi, & Archigenis ex colocynthide euacuetur. In exacerbationibus
autem uulua his collatur, quae laxandi ac flatus discutiendi vires habent, quale
est oleum gleucinum, & pessus eiusdem facultatis plurimo oleo dilutus, & per
uteri fuforium clysterem immixtus. Cataplasmata etiam leuia ex caricis, hyssopo,
ruta ac nitro imponantur. At uero si flatus ob impactos grumos fuerit
conclusus, postquam aegra in aliqua ex relatis infectionibus diutius confedit, ob
stetrix digitum illitum in pudendi sinum immittat, & grumum sensim dissoluat
ac educat. Perseuerante uero inflatione, in exacerbatione efficaciora adhi
beantur, interpositoque temporis spacio, illitionibus calidioribus, crurumque ac as
fectorum locorum frictionibus utemur. Et lumbis ac pectini dropacem adhibe
bimus. Aut rubefactorium est sinapi & caricis. Aut farinam ordeaceam cum ca
ricis, ruta, hyssopo, & melle coctam. Aut epithema ex seminibus, aut ex baccis
lauri. Aut polyarchium cerato cyprino exceptum. Aut postea etiam per se so
lum. Pessi quoque eiusdem facultatis subdantur, ex terebinthina, galbano, iris
de, ruta, & aescylo. Et qui ex pulegij, nitri, mellis, fellis taurini, aequis portio
bus paratur. Maxime autem conuenit hic. Caricarum pinguium probe contusa
rum ut granula non percipiantur drachmam unam, cumini drachmas duas,
spumae nitri albae drachmam unam. Verum ad acrimoniam obtundendam, pes
sum hunc in lac prius immergere oportet. Cucurbitae quoque affigantur, & uio
lenter detrahantur. Aliquando etiam scarificatio fiat. Utendumque est omnibus
quae ex alto materiam attrahere possunt, & balnearum naturalium aquis pri
mum calidis, deinde frigidis ut corpus ad tolerandam frigiditatem sensim alia
ciatur, & affectae partes paulatim firmentur. Alimenta quoque attenuantia ac fla
tus

tus discutitētia exhibeant. Et medicamētū diospoliticū, ac ex calamintha cōstans aliquādo exhibeāt. At uero auxilia amplius medicata, & aromatū suffitus, tanq̃ capiti noxtos reprobamus. Sed & epithemata adstringentia, qualia sunt quæ ex palmulis ac malis cotoneis parantur, & similia, ad hāc affectionem inepta sunt.

De uteri hydropē.

Cap. LXXIX

Quum menses longo tempore fuerint suppressi, & imprægnatio impedita, sepe humoris copia in uterum cōfluit, & aliquando corpuscula quædam uesicæ fellis similima in ipso generantur, in quibus humor colligitur. Sequitur affectio nem hanc, tumor circa imum uentrem amplius, laxus, flatuosus, & murmura uelut in intestinis, in ambulando grauitas, & spirandi difficultas, alui recrementa graueolentia sunt, & menses ac cōceptus impediūtur, & quæ prodeunt nullo ordine seruato deferuntur. Vbi uero uiolenter excernuntur, ruptis aliquando paruis illis corpusculis, quæ uesicis similia diximus, uiscosa quædā ac aquosa erumpunt. In quibus itaq; humorē in utero collectum ex proprijs signis cognoueris, decubitu quieto, mox uomitu ac ualidis elotionibus utendum est. Proinde corticis radicis tithymali myrtei sicci drac. ii. per se, uel cum radicis panacæ obolo propinabis. Et in uterum infundes quæ mucosos humores attrahūt, qualia sunt, grani cnidij grana decem, cum oleo irino et narcissino oleo, cum modico melle per chmas duas, cum irino aut cyprino aut narcissino oleo, cum modico melle per uteri fusorium clysterem infundito. Verum ante has elotiones, cardamomum cum sale, aceto mulso, thymo, pulegio, calamintha, aut simili quopiam bibendum dabimus. Deinde humorum copia per aluum excreta, prædictæ elotiones infundantur. Aut pessi eiusdem facultatis subdantur. Et postea sinus pudendi aqua marina proluatur, primum sola, deinde addito aceto, & aliquo ex prædictis in ipsa cocto. Elotione peracta ac locis probe deterfis, pudendo ac scemoribus oleum cyprinum illinatur. Medicamenta uero iisdem conuenientia hæc sunt.

Pulegij drachmam unam, cum modico pipere. Aut gentianæ uel origani drachmas duas, cum semine dauici uel symyrii, cum uino mulso, aut aqua mulsa in potu dentur. Salis præterea communis loco alimentis inspergatur hoc. Hysopi trientem, pulegij quadrantem, origani, cumini, singulorum sextantem, seminis ammiij, spicæ nardi, singulorum unciam unam, salis tosti quadrantem. Trita misce ac utere. Sed & pudendi sinus resina, myrrha, & amomo suffiatur. Pessis autem huiusmodi utendum est. Nitri, colocynthidis, singulorum quadrantem. Melle excipe, & pessum inde paratū oleo cyprino tinctum subde. Alius. Cumini & nitri æquales portiones melle excipe. Potest & uiolæ albæ semen addi. Alius. Colocynthidis quadrantē, salis unc. i. pinguiū caricarū carne excipe, ut sit iuglādis magnitudo, & inde pessū paratū subde. Humorē em̃ foetidum attrahit, ac mirifice prodest. Idem sedi inditus, stercoris & humorū ac flatuū copiam elicit, & uterum leuat. Alius. Comæ absinthij, ammoniaci thymiamatis, singulorū drach. i. æris usti, nitri, singulorū drac. iiii. melle excepta subdito. Hoc autem placidissime & citra omnē dolorē attrahit. Cicutæ semen, aristolochiā, cumini, salem, carne caricarū excipe & subde. Cæterum ad aquæ receptacula, eas uidelicet uesicas quas in utero generari diximus, fomentis utemur ex aromatibus, quæ menses eliciūt, & pessis sanguinē trahētib. Ex quorū numero hic est. Cneori, quod est grani cnidij radix, aut illo nō p̃sente, chameleg, elaterij, casie, singulorū drach. iiii. aluminis scissi, misyos, sandarachæ, myrrhæ, costi, croci, singulorū drach. iiii. melle excipito, atq; aluo pridie euacuata per clysterē, pessum inde paratū subdito, integrāq; diem ac noctem finito. Et si semel parū eduxerit,

GG 4 rursus

rursus subdito. Si uero mordacitatē induxerit, centaurij decocto tepido sinus pu-
dendi foueatur ac eluatur. Et mitigandi gratia pessus mollitorius subdat. Aut cicuta
semē cū aristolochia, cumino, sale, ac caricis, uelut paulo ante diximus subijciat.
Mitissimū uero omniū ad huiusmodi pelliceas & aqua refertas uesticas, est mera
curialis masculae semen, cū modica myrrha, sale, ac melle, lana exceptū, & multis
diebus subditum. Post harum autē educationem, exercitijs, sudoris prouocatio-
ne, & ualidis totius corporis, & praecipuē imi uentris frictionibus utendum est.

De mola uteri.

Cap. LXXX

Quae mola appellatur tumor est uteri induratus, aliquādo praegressa inflāma-
tione succedēs, aliquādo post locale ulcus, cui caro superexcreuit. A motus autē
difficultate & grauitate, mola nomen accepit. Cōsequitur hunc tumorē, detra-
ctio partium superincumbentiū, gracilitas, coloris uitatio, & appetitus prostrā-
tus. Et primum sanē cōceptus suspitionem de se praebet. Nam & menses suppri-
muntur, & māmā intumescunt, & stomachus subuerit, & lumbi grauant, uenae
terq; attollitur, uerum tēporis progressu discernitur. Molam em̄ dolor punctio-
nis sensum inferēs subsequitur. Nec in ea motus ullus, uelut in utero cōceptu per-
cipitur. Quin & postea toto corpore imminuto, ac uentre ampliato, hydrops
imaginem praese fert. Discernitur tamen ab illo per tumoris duriciā, & quod tu-
mor hic ad digitorum appressionē ac pulsationem nō cedit, neq; tympani sonū,
uelut in hydrope edit. Et quod neq; ad manus cōtactum ulla fluctuatio percipi-
tur. Aliquādo tamen temporis progressu hepar perfrigeratur, et hydrops super-
uenit. Quidā uero tradunt in quibusdā mulieribus carunculas ad iuglandis nū-
cis magnitudinē per pudendum excretas esse, aliquando singulis mensibus, ali-
quando bimēstres aut trimēstres. Hanc affectionem alij uelut incurabilem peni-
tus reliquerunt. Alij incipientem tantum curari posse cōfidunt, negligenda ta-
men nō est, sed omnia quae cōuenire uidebuntur facienda. Cataplasmata igitur
laxandi uiribus praedita, fomenta, elōtiones mitigatorias, pessos mollitorios, ad
duricias infrā descriptos, infessiones eiusdem facultatis, & cerata ex althea & o-
leo cyprino parata adhibebimus. Et malagma ex succis, & quod Mnaseae inscri-
bitur imponemus. Deinde cucurbitas cum scarificatione apponemus, & alimē-
ta boni succi offeremus. Atq; haec quidem in ipsis exacerbationibus adhibere
oportet. In interuallis autem corpus reficiendum est per ea quae id praestant, ge-
stationem uidelicet, deambulationem, balnea, & cibos conuenientes ac uini po-
tum. Partibus item affectis dropaces adhibebimus, & nitro ac sale inspersis eas-
dem insolabimus. Et per medicamentum ex sinapi ac caricis rubificabimus.
Epithematis insuper mollitorijs ex seminibus, ex baccis lauri, & polyarchio, ac
similibus utemur. Suffitum etiam uaporis aquae marinae aut muriāe adhibebi-
mus, aut decocti foliorum ac baccarum lauri, pulegij, thymi, hyssopi, saluiae,
marrubij, artemisiae, centaureae, dictamnij, scordij, polij. olla autem opera-
culo perforato arundine inserta sellae supponatur, atque inde per arundinem
uapor intra pudendum recipiatur. Pessi item subdantur ex oesypo, butyro, adia-
pe anserino, medulla aut cerebro ceruino, melle, caricis pinguibus, uuis pale-
sis, cum oleo antiquo cyprino, irino, sampuchino, amaracino, susino.
Perseuerante uero malo, acrium eduliorum esus assumatur, & innatio-
nes aquarum calidarum, & aquae marinae. Et ab acceptis raphanis uomen-
dum. Pessos tamen & infessiones acriores uitare oportet, ne loci ex assiduo
eorum usu exulcerentur. His autem transactis saepe plurima atri ac grumo-
si sanguinis copiā repente excernitur, & affectio dissoluitur. Philosophus uero
detentis

detentis inquit, uxoris amici cuiusdā mensibus, arbitrabar primū ipsam cōcepisse. Postea aucto amplius tumore, hydropem suspectū habui, quia totū corpus ac pedes tumescere uidebā. At ubi tandem id affectiōis genus esse deprehēdi, quod alij laterem, alij molā uocāt, rutā & anethum in uīno ueteri fuluo odorato coxi; & abiectis herbis, uīnum calidum bibendum dedi, & feruē aquae loco exhibui; statimq; mulier excreta sanguinis copia salutem adeptā est.

De tumore uteri laxo. Sorani.

Cap. LXXXI

Vteri tumor laxus pallidus ac albus est, ad tactū mollis, & digitorū cōpressiōni cedens, seq; rursus paulatim attollens, & cutis uentris manu apprehensa facile attrahit. Loci itaq; oleo cōmuni calido, aut irino, aut cyprino rigent, & pessi subdantur, ac reliqua auxilia adhibeantur, quae suprà de uteri inflatione retulimus.

De Satyriasi. Eiusdem.

Cap. LXXXII

Mulieribus quoq; satyriasis & tētigo accidit, qualē uiris fieri suprà retulimus. Cōsequitur ad hāc ingens pudendorū pruritus cū dolore, ita ut mulier locis assidue manus admoueat. Atq; ideo intolēabili ueneris desiderio cōtabescit, & saluti humoris effluentis acrimoniā ac mordacitatē percipit. Et loci utero uicini inflantur. Illud uero ardens cōeundi desiderii sauiorem reddit affectiōē. Quum enim partes affectae distentae sint, & semen excerni nō possit, quoniā meatus per inflammationē obturantur: maior materiā copia frustra ad locū attrahitur. Statim igitur a principio uena ipsis secāda est, & alimentum cōtrahendum: Et pubis ac lumbis illinenda quae leniter refrigerāt ac cōtrahunt. Caput aceto & rosaceo irrigetur. Et in potu aqua tepida exhibeatur. Cibi uero sint forbiles, omnis prorsus status ac uenerē cōcitationis exortes. Duobus uero a uenē sectione diebus, cucurbitae cum scarificatione affigantur. Reliqua uero curatio eadem sit cum ea quam ad inflammationē uteri mox referemus.

De uteri inflammatione. Philumeni.

Cap. LXXXIII

Vteri inflammatio ob multas causas cōtingit, Nā & ex plaga, & mensium superpressionē, & abortu, ulceratione, nimio coitu, selē durioris infessu, lōga ac intenta ambulatione, frigiditateq; ac flatuositate oboritur. Indicāt hanc muliebriū locorum, pubis, imi uentris, ac lumborū dolores ardentē. Et si digitus in os uteri submitatur, occurrat ad cōtactum durū, clausum, feruens ac retractū, praesertim si in ipso, aut in collo fuerit inflammatio. Nā ubi cauitas aut fundum uteri inflammatur, imi uentris dolor ostendit, ut ne cōtactum quidem foris admittat; Et plerūq; uterus ad inflāmatum locū retrahitur, atq; hanc ob causam os & collū eius auertitur. Differt autē ab ea quā suprà uteri retractionem appellauimus, quia in inflammationē febris est acuta, & ardor intensus. Si uero posterior ipsius pars inflāmata fuerit, dolor circa spinā magis heret, & cōpresso intestino recto stercora detinentur. Anteriore autē parte inflāmata, urinae difficultas aut stillicidium consequitur ex cōpressa uesica, praesertim si dolor pectinem affligit. At ubi obliquos laterum locos inflammatio occuparit, inguina distenduntur, & crura grauantur ac aegre mouentur. Inualecente uero inflammatione, febres accedunt, dolor capitis, stomachi afflictio per consensum, imi uentris tumor, ardor, distensio, grauitas coxarum, lumborum, praecordiorum, inguinum, scemorum, horrores discurrentiarum, pedum torpor, genium perfrigeratio, extremarum partium exudatio, pulsus parui, ac densi animi deliquium, exolutio. In augmento uero etiam singultus dolor tendinis, colli, maxillarum, sincipitis, oculorum praesertim in fundo. Urinaeque ac stercorum recrementa supprimuntur. Et inflammationē adhuc magis aucta, febres auget, delirant, dentibus frendunt. In principio

cipio itaq; curationem aggressi, ægrota in domicilio obscuro & moderate tepido collocabimus, quietem imperantes, & omni crurum motu interdicentes. Deinde artus manuum cōrectatione demulcebimus, & pedum ac manuum iuncturas fouebimus, irrigabimusq; ac lana pura integemus. Aluum autem eluimus & molli infuso euacuabimus. In potum uero & ad oris collutionem, aquā calidā & ptisanā succū dabimus. At si uehementior inflāmatio fuerit, & neq; ætas, neq; habitus, neq; anni tempus obstitit, neq; inflāmatio post abortū, aut nimīā sanguinis euacuationem superuenit: Cubiti uena secetur, & sanguis pro uirium ratione detrahatur, licetq; in secunda die uenam incidere, in tertia uero detractiōem repetere. Deinde alica ex aqua mulsā, aut pane loto, aut ouo sorbili, ægra alternis alatur, omnibus his moderate exhibitis seruēte inflāmatōne lana succida uino & oleo, aut aceto & rosaceo imbuta, imo uentri ac pubi imponatur. Aut palmulæ uino coctæ. Aut mala cydonia in posca cocta, cerato melino aut rosaceo ammixta. Cataplasma uero imponatur sic paratum, Melilotum in passo coquito ac terito, & uitellos ouorum assatorum addito, & cum rosaceo, aut melino, aut crocino imposito. Aut palmulas uino diluto seruēfactas, cum polentæ farina, & aliquo ex prædictis ungentis terito ac imposito. Cæterum ad inflāmationes erysipelatas igneo ardore cognobilis, utendum est cataplasmatibus ex polentā, & intubo, perdicio, umbilico ueneris, sedo, polygono, pampinis uitis, portulaca, plantagine, & similibus præparatis. Et lana aliquo harum herbarum succo, cum rosaceo aut melino oleo imbuta, in pudendum subdatur. Quod si cataplasmatum onus loci non tolerent, aqua rosaceo ammixto ex modicis intervallis affundatur. In exacerbationis declinatione totum corpus inungatur, & ægra in aqua tepida usq; ad lumbos insidere iubeatur. Deinde pelli subdantur ex aliquo ungento leniter adstringente parati, rosaceo uidelicet, melino, lentiscino, ac œnanthino, adiectis ouorum uittellis crudis siue assatis, & croco. Potest & ex prædictis succis aliquis ammisceri. Caput præterea rosaceo cum modico aceto irrigetur. Mitigata uero inflāmatione, mulier in aqua oleo ammixto insideat, & pessos ex narcissino aut fusino ungento paratos subdat. Et lanam oleo calido imbutam pectini ac lumbis adhibeat. Interdum & cucurbitæ lumbis affigantur, & tumore magno exstentē, etiam scarificatio fiat. Postquam autem inflāmatio declinare incœperit, ad ea deueniemus quæ laxare ac discutere possunt. Proinde in fœni graci, althææ, seminis lini. Interdum etiam pulegij, marrubij, saluix, artemisix decoctis, ægra insideat. Et ad imum uentrem ac pubem, farinam ordeaceam cum fœno græco & lini semine, in aqua mulsā coctam, imponat. Aut caricarum decoctum adhibeat. Quæ uero cataplasmatum grauitatem ac calorem ferre non possunt, in aqua tepida insideant, & rosaceo locos illinant, ac pessos subdant moderate refrigerantes, ex adipe gallinaceo, rosaceo, ac uino præparatos. At his quæ calorem ferunt, ceratum nardinum adhibeat, & infusiones iniiciantur ac pelli subdantur, ex œsypo, butyro, medulla ceruina, adipe anserino, ungento fusino, & cera tyrrhenica, ubi uero curatio processerit, tenuis uictus & ciborum parsimonia tollat, & manifesta iam facta declinatione balneū ac uinū cōcedi possunt, & cibi reficiētes exhiberi. Malagmataq; adhiberi, uelut est qd ex mesiloto parat, & quod ad Mnaseā, & quod ad Serapionē refertur. Pelli porro ad sedandos inflāmationū dolores uteri tales sunt, Fœnū græcū madefacito, & prima ac secūda aqua diffusa, cū tertia pura ac dulci coquito ac excolato, et ad decoctū adipē anserinū uel gallinacē recētem addito, & ad prunas liquari finito. Erubi
frigefacta

frigefacta fuerint, cōcretum adipē tollito ac seruato, atq; usus tempore spathula in manu subactum pello excipito, ac subdito. Alius dolores sedās. Papaueris capita passo coquito, & flaccida facta exprimito, & ad decoctū excolatū medullā ceruinā liquatā ammisceto, ac utitor: Si ceruina medulla defuerit, vitulinā accipito. Alius. Fœni græci aridi triti ac cribrati drach. II II I. in passo cretico aut lapa coquito. Et terebinthinā, adipis anseris, singulorū drach. II II I. rosacei sesqui uncia accipito, & omnia simul liquefacito, & fœni græci decocto ammixta pello excipito, ac subdenda dato. Alius pessus soporifer, dolorē mitigās, & oēm duriciā molliēs. Triā papaueris capita magnitudine mediocriā in quatuor passi cyathis per biduū macerato. Deinde coquito donec capita flaccescāt, & passum ad tertias redigat, postea expressis & reiectis capitib. passū excolato, & galbani, myrrhæ troglodyticæ, thuris, opij, singul. sesquidrachmā, casie drac. III. accipito & singula seorsim primū, deinde simul probe terito, & capitulorū papaueris decoctū paulatim adstillato, donec oīa ad mellis cōpagem redigant. Tū cœlypi, medullæ ceruinæ, adipis anserini, singul. dra. II II I. oīa simul colliquata ammisceto ac adseruato. Vfus autē tēpore medicamentū hoc rosaceo dilutū pello excipe ac subde. Oēm eī dolorē et uehementes inflānationes statim mitigat, uterī strāgulationi medet, duricias molliet, & somnū cōciliat. Alius pessus somnū inducēs, ualēs ad inflānationes. Musci quē etiā hypnō dicūt, in aqua seruēfacti, expressi ac triti, panis aqua mulsā macerati ac cōtusi, emplastri basilici, emplastri ex succis, ungenti nardini, adipis gallinacæ, æquales partes liquefacito ac utitor. Facit ad urinariū meatū ac uterū inflāmatū, & ad uterī declinatōes. Ego uero pro pāne fermētū purissimū nō omnino acidū sine sale, in aqua mulsā macero ac utor.

Pessus aureus appellatus. Ad inflānationes & uterī retractiones siue declinatōes. Ouorū assatorū uitellos sex, medullæ ceruinæ dra. II II I. croci dra. II. cœlypi drac. II. ceræ albæ, terebinthinā, adipis anserini, singul. drac. I. Croctū cū modico uīno dulci terito, & oua trita adijcito, & liquabilia liquefacta ammisceto ac adseruato. Vfus autem tempore medicamentū oleo nardino dilutum pello excipito ac subdito. Alius pessus. Ceræ tyrrhenicæ drach. XX II II I. adipis anserini, porcini, terebinthinæ, singulorum drachm. sex, decocti capitiū papaueris drach. quatuor, rosacei quantum satis est, aut irini, si calfactione ac discussione opus est. Alius. Adipis anserini trientem, cerati rosacei aut fusini sextantem, uitellorum ouorum assatorum, croci, singulorum unc. I. myrrhæ drac. II II I. opij obolos duos, aut pro opio, capitiū papaueris decoctum. Alius. Ceræ tyrrhenicæ, medullæ ceruinæ, singulorum drachmas centum, adipis anserini, terebinthinæ, singulorum trientem, croci obolos quatuor, opij obolos duos, ouī assati uitellum unum, olei fusini, aut telini ex fœno græco parati, quantum satis est. Pessus Enneapharmacus appellatus, ad inflānationes. Adipē anserinū, & bubulum, cerā albā, terebinthinā, butyrum, medullā ceruinā, mel, oleum rosaceum, & cicinum. Omnia recentia æquis portionibus liquefacito. Pessus ad feruentiores inflānationes. Emplastrum ex succis cum rosaceo liquatum succo plantaginis ammisceto, & pessum formato. Si uero plantago defuerit, fenecionis aut intubi succum accipito. At si plurimum excanduerit & ad erysipelatis naturam tenderit inflāmatio, solani folia tenera cum lacte mulieris supponito. Alius pessus ad inflānationes. Lilij flores tritos cerato rosaceo liquido excipito, & medullam ceruinā ac adipem anserinum adijcito.

Alius. Ex semine lini, fœno græco & althæa, succum crassissimum parato, & crocum illi ammisceto. Deinde adipem anserinum liquefactū addito, unito,

ac

ac utilior. Caterum butyrum, medullam, & adipem, omnia recentia ad pessica deligenda sunt. Antiqua enim dum liquantur nidiorosa fiunt, ac calidiora euadunt, & inflammationes exacuunt. At uero nec in distentionibus, neque in inflammationibus uteri, menses prouocandi sunt. Loci enim magis distenduntur, & quum ob inflammationem conclusi sint, sanguinis transitum impediunt. Quia & tetrapharmacum ad uteri inflammationes comode subditur, aut infunditur rosaceo dilutum. At si inflammationi ulcus coniunctum fuerit, ceratū rosaceū ex cera alba cum tertia adipis anserini parte preparatū, albumine oui quātum eius capere potest ammixto, infundito. Sedata demū inflammatione, menses prouocent.

De utero in scirrhi tumorem indurato. Sorani. Cap. LXXXIII

Induratur uterus aliquādo derepente nullo praedicio facto, plerumque uero inflammatione praegressa, quae neque soluta est, neque in abscessum transmutata. Est autem huius indurationis in scirrhi tumorem species, ea duricia quae in uteri ceruice ut plurimum consistit, & tumorem quidem similiter habet, sed minus renitentem, & cum moderato dolore. At uero ubi in scirrhum induratus tumor uteri fundum occupat, tumor uehemens & tactui renitens occurrit, cum grauitate ac aegro motu, non solum crurum, sed totius corporis: & sequecitur ad omnes uitae functiones. Quod si non recto ductu tractentur, consequitur uitiatum corporis habitus, decolor & ad similitudinem hydropis. Duriciae itaque circa os & collum uteri consistentes facile curantur, circa fundum uero difficulter.

In principio itaque si nihil obstiterit, neque aetas, aut uires prohibuerint, sanguinis mediocrem copiam a cubiti uena secta detrahemus, aut per Hieram Archigenis purgabimus. Inseccionibusque utemur ex foeni graeci, seminis lini, pulegii, artemisiae, foliorum sambuci, radices & foliorum cucumeris syluestris, decoctis. Et aromatum uapore fomenta faciemus. Et uterum oleo susino, narcissino, irino, gleucino, adipe anserino, gallinaceo, suillo recenti, aliquo ungento ammixto: Item lacte bubulo aut caprino cum adipe anserino colluemus. Cataplasma quoque imo uentri apponemus, e caricis, hyssopo, nitro, & absinthio. Et cucurbitas cum scarificatione affigemus. Malagmate item polyarchio utemur, & eo quod e seminibus constat, & quod ex baccis lauri paratur, de quibus paulo post agemus. Pessi uero mitigatorii & aperientes subdantur. Facit & is quae infra ad uteri condylomata describemus, e lycio ac oesypo paratus, & quem supra retulimus e tribus papaueris capitibus constans. Cui similis est hic. Duo papaueris capita passo per triduum macerato, deinde ad tertias coquito, & expressis capitibus, ad decoctum excolatum adijcito, galbani drach. i. casiae, succi mandragorae, singulorum drach. tres, myrrhae, thuris, singulorum drach. i. Et postea medullae ceruinae, oesypi, adipis anserini, singulorum simul liquefactorum drach. tres, ammisceto, ac in plumbeo uase seruato. Vsu uero postulante ex hoc medicamento oliuae magnitudinem rosaceo diluito, et bis aut ter quotidie tepidum subdito. Bene facit & tetrapharmacum, heptapharmacum, enneapharmacum, emplastrum Azanitae, & emplastrum ex succis. Omnia oleo susino aut cyprino diluta. Pessus Libanus appellatus mollitorius. Cerae albae quadrantem, olei nardini, gleucini, susini, medullae ceruinae, adipis anserini, singulorum sextantem, oesypi, butyri, nitri, singulorum drachm. iiii. Aliqui oui affati uitellum addunt.

Alius pessus Titianus uocatus. Cerae sexuncem, colophoniae sesquiumciam, adipis taurini trientem, picis, terebinthinae, singulorum quadrantem, medullae ceruinae, ammoniaci thymiamatis, singulorum unc. i. Ammoniacum aqua dissoluatur. Alius pessus mollitorius, Cerae albae, ungenti nardini, singulorum quadrantem,

quadrantem olei irini, gleucini, cyprini, adipis urfi, pinguedinis porci, singulo-
rum sextantem, butyri, medullæ ceruinæ, œsypi, terebinthinæ, sing. trientem.
Alius pessus ad duricias, Ceræ albæ, terebinthinæ, medullæ ceruinæ, adipis
gallinacæ, anserini, butyri, ungenti nardini, fusini, myrrhæ, æquales portiones
excipe melle ac utere. Si fusinum oleum siue ungentum non fuerit ad manū,
telinum pro ipso succedat, pessus aureus uocatus, mollitorius, Ceræ trientem,
medullæ ceruinæ, adipis anserini, singulorum unciam unam, œsypi drac. II. I.
croci drachm. I. myrrhæ, galbani, singulorum drach. I. olei fusini quantum satis
est. Alius, ad omnes diuturnas uteri affectiones. Myrrhæ drachm. I. bdelli
drach. II. spicæ nardi, croci, singul. drach. III. casia, ladani, sing. dra. II. meliloti
drac. VII. I. carniū palmularū decem, uini dulcis cyathum, olei fusini, rosacei,
cyprini, singul. trientem. Aridis cum uino dulci tritis olea ammisceto, & molli
igne coctis utitor. Ad imum uero uentrem epithemata uelut diximus imponā
tur, polyarchium, ē seminibus, ex baccis lauri, ex meliloto. Bene facit ad durici-
as ac uteri inflationes & hoc. Resinæ pinus lib. III. ceræ unc. XX. apochymatis,
fermenti acidi, singulorum lib. I. galbani quadrantem, ammoniaci thymiamat-
tis, opopanax, sing. sextantem, muria acerrimæ quantum satis est. Opopanax
& ammoniacū in muria coquito, et fermentū adijcito ac aliquatenus dissoluito.
Deinde liquabilia liquata ammisceto, et spathula donec frigesiant agitato. Et in
mortariū translata probe subigito ac utitor. Aliud Epithema ē micis panis,
laxandi ac diffundendi uim habens, faciens ad omnes duricias quocunq; loco
fuerint, & inflammationes duriores discutiens. Radicis althææ, carniū palmu-
larum quæ Nicolai appellantur, singul. lib. II. fœnigræci: seminis lini, singulo-
rum lib. I. chamæmali, meliloti, singul. sexuncem, uini antiqui adstringētis sex-
tar. VII. I. spumæ argenti, cerussæ, colophonæ, singul. lib. II. ceræ, terebinthinæ,
singul. lib. I. olei antiqui lib. V. panis siliginei sicci contusi ac cribrati lib. V. Her-
bæ in uino macerata coquātur, & succus exprimatur. Et in hoc succo panis ma-
defcat, postmodum uero spuma argenti & cerussa cum teruntur, & oleo affuso co-
quuntur, donec nō amplius inquinēt. Et ad hæc liquabilia liquata adijciuntur. Et
sublato ab igne medicamento panis præmadefactus commollitur, ac paulatim
reliquis ammiscetur, & per spathulā agitando unitur. Hoc itaq; modo ad duri-
cias stomachi, alui profluuiū, ac dysenteria principiū, præparari solet, ad quas
omnes affectiones secure adhibetur. Verum ad uteri ac cæterorum locorū du-
ricias, uisceribus exceptis, ad prædicta hæc addimus, Aeruginis, floris salis, thu-
ris, singul. sexuncem, iridis, aristolochiæ, singul. quadrantem, terebinthinæ lib.
I. Et terebinthina quidem reliquis liquabilibus ammiscetur. Arida uero trita ac
cribrata insperguntur, medicamento ab igne ablato. Et postremū panis mada-
factus adijcitur, & omnia probe per spathulam agitata uniuntur, frigefacta ue-
ro in mortario primū pistillo, deinde manibus subiguntur. Pessus ad uteri du-
ricias, Ceræ, resinæ pinus, picis, terebinthinæ, butyri, olei rosacei, irini, nardini,
mellis, singulorum lib. I. nitri sextantem & semūciam. Alius pessus, mollien-
do efficax, Ceræ, olei fusini, rosacei, adipis anserini, singulorum lib. I. iridis, te-
rebinthinæ, adipis leonini, ursini, singulorum sexuncem, medullæ ceruinæ tri-
entem. Habet hic pessus ex toto libras VI. & trientem. Pessus ex Archigenis
scriptis, facit ad duriciam, debilitatē, maciemq; uteri, præ omnibus quos ego
nouī efficacissime, & ad omnes ferme uteri affectiones, et ad neruos affectos cō-
modissimus est. Et est acopon quoq; insigne. Olei irini, fusini, cyprini, ceræ, sin-
gulorum lib. I. mellis Attici quincuncem, ungenti foliati, nardini, singulorum

H H trientem

trientem adipis anserini quadrantem, medullæ cervinæ, oesypi, sing. sextantē, terebinthinæ sesquiunciam, Oesypum et medullā cum melle subigito. Deinde ceram cum oleis liquefacito, & postea terebinthinam, et adipem, & consequenter preciosa ungenta, nardinū ac foliatū addito. Et in mortariū translata probe unito. Hoc si usq; ad exactā curationem uteris, magnā laudem cōsequeris. Sed & post adeptā sanitatem aliquāto tēpore postea maioris securitatis gratia adhiberi potest. Ego uero etiā pro malagmate forinsecus impono, et ad prædicta ammisceo thuris, ceræ, ammoniaci thymiamatis, myrrhæ, floris iunci odorati sing. dra. viii. picis dra. xvi. galbani, opopanacis sing. drac. iiii. thus, galbanū, opopanacem, uino odorato adstringente terito, & ad oesypū et medullā ac mel adijcito, et omnia simul rursus terito, deinde cerā cum præciosis ungentis liquato, & ammoniacū tritum resināq; ac reliqua ammisceito. Et ablato ab igne medicamento ac frigefacto, myrrhā & florem iunci odorati inspergito, unito ac utitor. Epithema oribasi ē baccis lauri, facit ad duricias. Ceræ resinæ pinus, picis, nitri, baccarum lauri, adipis taurini, ammoniaci thymiamatis, æquales portiones. Ammoniacū & nitrum & baccas lauri, sing. seorsim terito ac cribrato, & reliqs liquatis ammisceito. Ego uero inquit Oribasius, dimidiū nitri accipio.

De Vteri abscessu. Archigenis.

Cap. LXXXV

Abscessus in utero uelut in cæteris corporis partib. præcedente inflāmatione generatur, primū igitur inflāmationis notæ apparebūt. Deinde circa puris generationē dolores augētur, febresq; cū horrore, plerūq; ad uesperā ingruūt, tumor attollitur, dolor punctorius adest, aliquādo urina, aliquādo stercoris recrementa supprimūtur, aut utraq; simul. Dolor autē localis affectū locū indicabit, proinde si discuti nō potest, citius suppurationi auxiliū ferendū est. Itaq; semen lini, foenū græcum, farinam ordeī, caricas coctas, altheæ radicē, terebinthinam, in cataplasmate imponemus. Aliquando etiam columbinum stercus cū oleo et melle adhibebimus. Hæc autem cataplasmata imo uentri ac lumbis imponantur. Et pudendi sinus per spongiā assidue foueatur, & uapores per arundinē operculo ollæ perforato insertā intra pudendū recipiantur. Infectionesq; frequentes fiāt, decoctis in aqua his quæ uim attractoriā habent, uelut est pulegiū, marrubiū, laurus, saluā, artemisia, dictamnus, centaurea. Quod si dolor uehementius infestauerit, papaueris capita in aqua coquantur, & contusa cataplasmatibus ammisceātur. Caricæ itē crudę in mortario cū resina pinus, terebinthina, ac modico nitro trite imponā, pellis autē utemur ex terebinthina, myrrha, oesypo, ac butyro paratis. Verū optimus ad uteri abscessus sic præparat. Carnis caricarum pinguium, adipis anserini, olei irini, singul. drach. ii. terebinthinę drach. i. rutæ drac. iiii. myrrhæ, iridis, nitri, singul. obol. ii. possunt etiam pro caricis uuæ passę ammisceri. Excipiuntur lana in pessum, quī oleo irino aut cyprino tepido tinctus subditur. Est & ad hūc usum efficacissima compositio Cyphoides appellata, & supra ad hepatis abscessum descripta. Itemq; Enneapharmacum ad duricias paratum. Et Malagma polyarchium, & alia huiusmodi, oleo fusino aut telino diluta, & pessa in uterum subdita. Imus item uenter ac pecten assidue prædictis decoctis foueatur. At uero rupto abscessu, si pus ad uescam fuerit delatum, & cum urina excernitur, lactis potu utendum est, & cucumeris semē propinandum. Et cataplasmata prædicta adhibenda, cerataq; emollientia ac odorata. Si uero ad intestinum rectum progreditur, & cum stercore, uel per se egeritur, lentium & malicorij decoctum per clysterem infundemus. Si uero in pudendi sinum erumpit, & purum est pus, rosaceum, aut tetrapharmacum cum butyro

butyro recēti ac rosaceo infundatur. Et loci rosarū aut lentium decocto, aut ptisanæ succo eluatur. Sin tenuis & foetida destillat sanies, uelut à noma et ulcere depascente, magis adstringens sit quod infunditur, uelut est baccarū myrti, palmarum, lentium, & malicorij decoctum: Quod si post humorum excretionē inflammatio perseverauerit, perseverandum quoq; est in cataplasmatibus et infellionibus supra relatis. At si inæqualia fuerint quæ prodeunt, fomenta et infelliones ex aqua mulsæ fiant, in qua absinthiū, marrubium, eruum cētauriū, aut lentes sunt decoctæ. Loci uero ptisanæ succo eluantur, addito melle et rosaceo. Vteri uero os etanus cerato rosaceo aut butyro inungatur, cui spodij, aut stibij, aut plūb aginis, aut spumæ argenti aliquid, cum muliebri lacte sit ammixtum, facit et plumbi succus. Si uero profluens humor foetidissimus fuerit, uino mulso pudendi sinus eluatur, et in eo usq; ad exactam curationem perseverandum est.

Abscessus oris uteri chirurgia.

Cap. LXXXVI

Si circa osculum uteri abscessus cōstiterit, ut sub chirurgiam duci possit, non prompte ad sectionem festinandum est, sed perfecta affectione, et inflammatio ne plurimum aucta, & partibus puri incumbētib; attenuatus. Atq; tum mulier locetur in sella supina, ut crura habeat ad uentrem contracta, & fœmora inter se disparata. Et cubiti ipsius poplitibus subijciantur, & idoneis uinculis ad ceruicem religentur. Et hoc ad claram lucem fiat. assideatq; è dextris chirurgus & per dioptram instrumentum, pro ætate commodum ad pudendi diductionem speculetur, & per specillum sinus muliebris profunditatem dimetiatur, ut ne maior dioptræ tibia uterum comprimatur. Et si reperta fuerit tibia eius sinu maior, lanæ conuolutæ labijs siue alis pudendi imponantur, ut in ipsis dioptra firmetur, oportet autem tibiam immittere, cochlea ad supernam partem uergēte, & dioptram quidam a chirurgo teneri, cochleam uero per ministrum circūuerti, ut diductis tibiæ plicis sinus distendatur, postquam autem occurrerit abscessus ad tactum lenis, & tenuis, apex eius scalpello uel acicula dissecetur, & excreto pure limniscus linamentum tenerrimum rosaceo tinctum in sectionē indatur, aut potius extra sectionem in muliebrem sinum citra impulsionē. Extra uero pudendi labia ad pectinem et lumbos lanæ succidæ aut puræ oleo imbutæ imponantur, tertia deinde die ægra in aqua & oleo calidis insideat, aut in maluræ decocto. Et deterfione facta, limniscus tetrapharmaco per se, aut cum melle illitus, in sectionis fissuram leniter indatur. Sit autem tetrapharmacum butyro aut rosaceo dilutum. Cataplasmata autem forinsecus imponantur, donec abscessus ab inflammatione liberi ac puri fiant. Si uero difficulter repurgetur, per auricularem clysterem iridis decocto eluantur. Et per emplastrum ex cadmia, aut ex ladano paratum, aut id quod ex ordeo usto constat, singulis rosaceo dilutis, ad cicatricem perducantur. Quod si intra uteri os abscessus fuerit, chirurgiam reprobamus, et curationem paulo ante relata adhibemus.

Abscessus uteri inter intestina & peritonæum

membranam ruptæ curatio.

Cap. LXXXVII

Eruptionē inter intestina, et peritonæū membranā aluū ac intestina ambientem, indicat tumor circa illas partes magis hærens. Si uero intra uterū rumpitur abscessus, dolor quiescit, & os uteri ad tactū lenius occurrit. Eruptio itaq; ad superficiē tendēs adiuuanda est, et cutis postq; satis fuerit attenuata specillo in summo apice dissecanda, quaparte effluxū cōmodiorē fore speramus. At si sanguinis eruptiois tumor est, pro specillo siue scalpello, cauteriū eminetiori loco adhibebimus, & ita pus educemus, plurimum enim ad totam curationem cauterium

HH 2

confert

confert, post excretum autem et probe expressum humorem, ægra collocetur ut residuum commodè ex cerni possit, & sectio aqua mulla eluatur, et postea bis quotidie ac semel in nocte spongijs foueatur. Interdum et in aqua calida ægra infideat, & uterus oleo cyprino calido eluatur. Reliqua uero curatio cæteris ulceribus similis fiat. Alimenta autem exhibeantur boni succi & quæ non facile dissilantur, uelut est lac cum amylo, alica, oryza, pedes porcini in alica aut ptisana ad flacciditatem cocti, auiculæ & pisces boni succi. Et nisi febris obstiterit, uinum etiam dulce antiquum concedemus. Balnea autem et alimenta quæ exulcerationes exacerbant uidentur.

De uteri exulceratione. Archigenis.

Cap. LXXXVIII

Vlceratur uterus sæpe ex fluxione erodente, aut ab acris medicamentis, aut ex abscessibus ruptis, aut ob partus difficultatem, aut foetus extractionem, aut eiusdem corruptionem. Aegrotæ uero in affecta parte dolorem punctoriū perceptant, & ex interuallis foetidi ac saniosi humores ab ulcere sordido prodeunt, & consequuntur etiam alia utero affecto peculiaria accidentia, uelut est capitis ac præsertim sincipitis dolor. Ligamentorum item ac radices oculorum dolor, qui ad manus usque ac digitos se extendit, & reliqua supra de inflammatione relata. Vlcus itaque expositum, per dioptræ usum deprehenditur. In profundo uero reconditum, humores qui excernuntur indicant. Non autem aliter huiusmodi ulcera curantur, quam in fissionibus, irrigationibus, cataplasmatibusque ac pessis supra relatis, priuatim tamē commodū est hoc medicamentū. Crocus optimus cum muliebri lacte teritur, & cerato excipitur, ex cera tyrrhenica, & rosaceo aut fusino oleo, cum anserino adipe parato, & in pessō subditur. Hoc autem adhuc efficacius est, et ad dolores magis congruū, quod sequitur, papaueris capita decem in passo diluto, per triduum macerantur, deinde donec flaccida fiant coquuntur, & postea expressa teruntur, cum seminis aut foliorū rosarū dra. v. croci dra. iiii, ammixto etiā inter terendū ipso decocto. Deinde ceratum ex ceræ sextante, & rosacei aut narcissini olei sextante ad ea affunditur, et medicamentū in stānea pyxide seruatur. Vsu uero expetente, rosaceo, aut narcissino oleo dilutum, et in pessum exceptum subditur: facit et pessus supra relatus, ex croco, rosaceo, adipe anserino, & medulla ceruina paratus, talia enim dolores mitigant, & ulcera sanant. Philosophi medicamentum. Ad mulieris pudendum exulceratum, & ob acrum humorum influxum pruriginosum, plumbaginis sextantem, glaucij unc. i. cum succo hyoscyami terito, et olei myrtei aut rosacei quantum satis est ammisceto, utereque uel manu illinens, uel in passo subdens.

Vlcerum uteri carbunculiformium curatio.

Cap. LXXXIX

Carbunculosis uteri ulceribus priuatim profunt lētes, & oleæ folia, sine melle. Lupini in uino austero cocti, Infessiones in eorundem lupinorum decocto.

Ad sordida uteri ulcera. Archigenis.

Cap. XC

Ad sordida uteri ulcera emplastro Aegyptio utendum est, citra eruginē preparato. omnia enim mordacia, quemadmodū et crustas inducētia, utero aduersa sunt. Vtemur etiā eo quod ex melle, terebinthina, rosaceo aut fusino oleo & butyro constat, quibus aliqui etiam crocum addunt. Ad ulcera repurganda efficacax est & iris illyrica cum melle imposita. & Aristolochiæ decoctum per se, uel cum melle infusum. Pessus optimus ad sordida ulcera repurganda, terebinthinæ drach. iiii, adipis anserini drach. vii, myrrhæ drach. i, croci drac. iiii, medullæ bubulæ, cœsypii, singulorum drach. ii, mellis, olei cyprini, aut irini, singulorum dra. xvi, thuris, radices panacæ, iridis, sing. drach. ii, cyperi dra. iiii

Ad

Ad humorem à muliebri pudendo profluentem.

Cap. xci

Ordei usti, amyli, thuris, sing. unc. i. aluminis scissi dra. iiii. Minutissime terito ac cribrato, & alinino lacte diluito, ac in pudēdi sinum per uteri fuforium clysterē infundito. Quod si ulcus dolorē intulerit, tale medicamētum adhibeatur. Rosarū siccarum tritarū, capitum papaueris paululū torrefactorū, sing. dra. iiii. croci, styracis, sing. dra. ii. farinē fœnigræci, œnanthes, sing. dra. iiii. thuris dra. ii. omnia cum passo cretico ac oleo rosaceo paulatim affusis, ad mellis compagem conterendo redigito, & in pessum excepta calida subdito.

Ad uteri nomas. Aspasie.

Cap. xcii

Nomæ uero & ulcera depascentia ac efferata, equino aut asinino lacte recēs multo eluantur. Et in utriusq; penuria, quodcunq; haberi potest recens, coctū accipiatur. Duabus autem lactis heminis mellis hemina dimidia addenda est, & quatuor iridis drachmæ inspergendæ, & tale infusum calidum sepe singulis diebus infundendum. Idem facit aqua mulsā, in qua absinthium, aut calamus aromaticus, aut leucanthemum uel chamæmelum, aut bupthalmum decoctum est. Et ubi quod infusum est excretum fuerit, loci protinus maluæ decocto eluatur. Deinde pessus subdatur ex farinæ erui, iridis, singul. dra. duabus, cum melle subactis, & pessō exceptis. Alius pessus. Melilotū in uino aquæ marinæ experte coctum terito, & melle ammixto subdito. Alius, farinam lentium cum melle subdito. Alius, oleæ folia cum uino trita, & melle ammixto subdito.

Alius. Vuarum passarum carnes tritas cum melle subdito. Alius. Hedere aureū florem habētis folia in uino cocta cū melle indito. Asclepiadæ medicamētū in puluilli forma. Ad uteri nomas præcipuū. Lupinos amarostritos ac cribratos seruato, & usus tēpore sine ullo liquore subdito, uel melli amisceto. Alius pessus optimus. Hedere aureū florē habentis fasciculū, in umbra paululū siccatū in uas fictile conijcito, idq; undiq; oblinito, ac torreto, et eo cinere utitor.

Alius ad humida ulcera. Aristolochiæ lōge tritæ dra. vi. rubricę sinopicæ hepatis colorē referētis dra. viii. misce, & cū melle ad cerati crassitudinē redige et panniculo attrito excepta deliga, et sub prunis exure. Et ubi optime affata fuerint, tere ac utere. Aut panniculum deligatum in ollam mitte, ac probe opertam & oblitam in ignē pone, donec medicamētum ad carbonis speciem fuerit exustum, & deinde tritum serua. Vsu uero expetente ad nomas subde, et breui cōtrahentur. Hoc usq; ad inductam cicatricem idoneum est. Alius. Seminis tamaricis partem unam, nitri rubri tantundem, terito ac cribrato, & simul mixtis aridis utitor, aut rosaceum ammisceto. Vbi uero nomæ fuerint cohibitæ, adhibeantur ea quæ paulo ante ad ulcera repurganda relata sunt.

Quæ ad cicatricem ducunt. Asclepiadæ.

Cap. xciii

Postquam ulcera fuerint repurgata utendum est his quæ ad cicatricem perducunt, primum mitioribus, postea efficacioribus. Ceratum cicatricem inducens. Cera albæ quadrantem, rosacei optimi dodrantem, ad prunas liquefacto, et quadrantenus refrigerato. Deinde in mortarium conijcito, ac lacte muliebri, aut asinino, aut caprino recēs multo affuso, cum pistillo subigito, donec totum inalbefcat. Deinde diffuso priore lacte, nouum infundito ac rursus subigito, & croci ad dra. i. ammisceto. Quod si magis mitigatoriū facere uolueris, rosacei olei septuncem, adipis anserini, & medullæ eiusdem, sing. unc. i. accipito, potes & pro rosaceo, melinum aut susinum ammiscere. Medicamentum ex ordeo ad uteri ulcera. Ordei usti ac triti, spumæ argenti lotæ, cerussæ lotæ, singulorum lib. i. adipis anserini lib. iiii. adipis capræ recentis lib. iiii. olei myrtei

HH 3 libras

libras II, mellis despumati bessem, terebinthinæ quadrantem siue triëtem. Hoc etiam ad ardores & ulcera pudendorum facit. Nec minus utendū est his quæ ad sedis affectiones, ex pompholyge & plumbo usto præparantur. Itemq; eo quod ex cadmia, & quod ex ladano præparatur, singulis myrteo aut rosaceo oleo dilutis.

De cancris uteri. Archigenis

Cap. xciiii

Câceratorū uterī tumorū aliqui ulcerati sunt, aliqui nō ulcerati, quēadmodū de mammis suprà diximus. Itaq; in non exulceratis tumor circa os uteri reperit̃ durus, ad tactum renitens, inæqualis, eminēs, colore seculentus, ruber aut subliuidus, uehementes dolores inducens, circa inguina, summū uentrem, pectinem, ac lumbos, qui ad manuum contactum, & medicamentorum uarietatem exacerbantur. Si uero ulceratus est cancer, supra dolores duriciasq; ac tumorē, ulcera corrofa & inæqualia uidentur, plerumq; fordida, eminentia, albicantia. Quæ uero pura putantur, seculenta, liuida, rubicūda, & cruenta apparent. Excernitur autem ab ipsis sanies tenuis, aquosa, nigra, aut fulua graueolens. Aliquando et sanguis defertur, & alia signa adfunt suprà de uteri inflammatione relata. Proinde affectio quidem hæc incurabilis est, uelut etiā Hippocrates pronunciavit, mitigari tamen ac leniri potest, in sessionibus in scœnigræci ac malug decocto, & cataplasmatibus similibus. In exacerbationibus autem ualde mitigat malua, aut althea in aqua mulsā ad flacciditatem cocta, et cum modico rosaceo trita ac imposita. Et cataplasma ē caricis, meliloto, ac ruta paratum. Et quod ex palmulis paratur in passo coctis, ouorum uitellis ac polenta ammixtis. Aut papaueris capita trita & cribrata, cū polygoni aut intubi aut coriandri succo. Aut solani folia tenera cum lacte muliebri imposita. Aut solanū cerato rosaceo exceptum, frigida aqua paulatim cerato instillata. Aut maluæ folia cum lacte muliebri trita, & rosaceo cerato excepta. Atq; hæc omnia in dolorū uexationibus sunt adhibēda, postea uero ceratū imponatur ex rosaceo, aut myrteo, aut melino, aut œnanthino cum palmulis in passo coctis, facit et cataplasma ex ouis, et quod ex ordeo paraf, quib. etiam ad ambusta utimur, peculiariter aut conuenit id quod ex fece uasorū æreorū in quibus aqua coquitur, paratur. Hęc enim sex assata teritur minutissime, & cerato rosaceo excipitur. Et hæc quidē forinsecus. Intrinsecus aut mitigat locos, ubi ulcerati fuerint, lac muliebre aut asininū infusum, & plātaginis succus tepidus. Si uero cruētati fuerint, polygoni succus cum modico thure. Idem faciūt etiā pessi ex croco, & lacte muliebri, succoq; papaueris ac œsypo præparati. Omnibus aut præstat etiā ad sedis affectiones hoc. Spumæ argēti lotæ sex uncē, thuris masculi, œsypi, adipis porcini recētis, butyri recētis, ceræ tyrrhenicę, sing. sextantē, rosacei trientē. Seruatur hoc medicamētū pyxide plūbea, et arefactū rosaceo diluitur. Ego uero inquit Archigenes, spumam argēti cū seridis succi hemina diluo, & ubi mellis spissitudinē habet liquatis alijs ammisceo, utere etiā medicamētis ad sedis affectiones prescriptis, optimū est et id quod suprà ad māmārū nomas descripsimus, ex uino. Rhoē coriario, pilulis cupressi ac galla præparatū, quod muliebri aut asinino lacte dilutū adhibetur. Philosophi medicamētū ad caneros uteri. Cancros fluuiatiles tres aut quinque, impari numero, sub prunis exurito, et cū oleo cyprino tritos per pennam illinito.

De uteri obturatione.

Cap. xc v

Obturbatio circa os aut collū uteri fit, aut propter ulcerationē pregressam, aut ob inflammationē induratā, per quā loci adeo angustifit, ut semē nō amplius admittant, uel admissum nō retineāt, ob callosam enim duriciā uterus cōtrahi nō potest.

potest. Aliquando semē admissum, et intra angustissimū os contentū foetus cau-
sa est. Verū hæc conceptio prægnanti mortis causam inducit, quū ob nimias lo-
corū angustias foetus prodire nō possit. Insestiones itaq; ex oleo et aqua & sceni
græci decocto adhibeantur, et per cerata, ac pessos emolliētes ex æsypo, terebin-
thina, ac nitro præparatos laxentur. At uero si loci ad tactū molles fuerint, spon-
giam siccā funiculo appenso intra locorū angustias dilatādī gratia indemus. Et
si ea exciderit, aliam crassiorē immitemus. Et ea de causā plures ac diuersas spō-
gias siccas paratas habere oportet, et postea tale medicamētū spōgiæ illinimus.
Sandarachæ, aluminis scissi, sing. dra. i. auripigmenti dra. iiii. omnia simul con-
trita melle excipito, & spōgiæ indendē illinito. Quod si sublata spōgia locus
nō satis apertus uidebitur, inflammatioq; oborta fuerit, subiectū medicamētū
spōgiæ illinatur. Iridis dra. ii. adipis anserini, terebinthing, thuris, olei irini, ce-
re, sing. dra. ii. Iridem primum, deinde thus minutissime terito ac cribrato, et te-
rebinthinam, adipem, ceram, cum oleo liquato, ac omnia simul unito. Vbi ue-
ro inflammatio quieuerit, & locus apertus fuerit, ceratū ex oleo rosaceo et adi-
pe anserino paratum spōgiæ illinatur, in quo usq; ad inductā cicatricem per-
sistendum est, ut locus paulatim consolidetur.

De utero non perforatō.

Cap. xcvi

Quædā à natiuitate uterū non perforatū habet, & hoc trifariā cōtingit. Qui-
busdā enim in ipsius pudēdi alis siue labijs, mēbrana aut caro obturās enascitur.
Alijs in ipso pudēdi sinu idē cōtingit. Alijs circa ipsum uteri osculū eadē obtura-
tio fit. Quibus itaq; in pudēdi labijs membrana excreuit, eas curaturi supi-
nas pro more reflexis ac diductis crurib. locabimus, & operientē mēbranā spe-
cillo dissecabimus, donec figura pudēdi ad naturalē dimēsiōnē deueniat, postea
linamētis cōuulsis sectionē replebimus ac deligabimus, et curationē suppurato-
riā p cataplasmata aliquot dieb. adhibebimus. Deinde linamētis cerato rosaceo
ligdo imbutis utemur. At si post sectionē pudēdi alas carnosas partib. propinqs
unitas esse senserimus, utriusq; excoriābimus, et p linamēta dilatabimus, eodēq;
curatiōis modo utemur. Mulier uero supina puluinar intra scēpora habēs, usq;
ad cicatricē inductā permaneat. Si uero pudēdi quidē figura externa aperta est,
in sinu uero caro innata locū obstruit, ut angustū foramē relinquat, muliere eo
dem modo collocata, stilū in uterū cervicē maioris tutelæ gratia immitemus, ne
per errorē altiorē sectionē faciamus atq; ita infra signatū per stilum locū dissecā-
bimus, per specillū latū, donec sinus secūdū naturā habere uideat. Deinde labia
dissectæ carnis per uolsellā distēta ad quadrāgularē figuram circuncidemus. Et
erectā mulierē diductis crurib. statuemus, ut humor in utero collectus cōmode
profluat. Quod ubi sufficienter factum fuerit, agram ad priorem decubitus for-
mam reducemus, & linamētum uīno & oleo imbutum in sectionem indemus,
habeat aut hoc filum alligatum, quo facile extrahi possit, & loco probe deliga-
to quietem inperabimus. Sequentibus uero diebus locus cum aqua mullā elua-
tur, & pharmacum suppuratorium linamento intorto illitum indatur. Et ubi ci-
catrīx inducenda est, canalis ex stanno indatur ac alligetur, donec locus fuerit
consolidatus. Quod si partes rursus inter se coierint, ac rursus uteri os clauda-
tur, spōgiam siccam indito, donec callus fuerit obductus. Si uero membra-
na ipsum uteri os obstruxerit, mulier in eodē situ locata, dioptra immissa sinus
dilatur, & membrana per uolsellam arrepta ac extenta intorqueatur, ut to-
ta simul colligatur, & lato specillo amputetur, & medicamentum siccum
floridum inspergatur, & linamentum tortum alligato filo indatur, & eadem

HH 4 curatio

curatio fiat. Quod si quid de membrana relictū fuerit, florido aut pfaro appellato medicamento consumatur. Repurgatis aut locis hoc pharmaco linamenta tingito: Cere, terebinthinæ, adipis anserinæ, sing. dra. ii. iridis, thuris, sing. dra. i. croci dra. iiii. olei irini dra. xvi. Iridē, crocū, & thus cū passō terito, et liquabilia liquata ammisceto. Dioptra uero assidue immittēda est, ac cauendū ne caro superexcreseat, quæ tali medicamento reprimatur. Squamæ æris, æruginis, corticis thuris sing. dra. ii. terito, unito ac utitor. Aut æruginē, & squamā cum plumbi succo subige & adhibe. Sed nec spongiæ siccæ usus omittatur, donec labijs callus obducatur. Stanneus item canalis immittatur.

De Hæmorrhoidibus uteri. Aspasia.

Cap. xcvi

Hæmorrhoides quandoque in osculo uteri, quandoque in collo, & aliquando in ipso utero, & aliquando, licet raro, in pudendo cōtingunt. Atque hæc etiam tactu melius tamē per dioptramprehenduntur, & eadē accidentia inducunt, quæ reliquæ in sede ortæ inducere solent. Et præterea sterilitatem ac lumborū gravitatem tēpore purgatiōis inducunt. Varicofas itaque ac malignas dimittere oportet, reliquæ uero nō aliter curentur, quā quæ in sede sunt, duris quidem ac modicū sanguinem fundentib. neque ualis annexis, statim amputatis. His uero quæ multū sanguinis emittunt, circa fundum circumcirca scarificatis, & uolsella eleuatis, ac funiculo constrictis, & postea paulatim resectis, atque hoc facto floridū medicamentum siccum inspergatur. At uero si citra chirurgiam malueris hæmorrhoidas resiccare ac exæcare, huiusmodi sicca apponito. Spodium & rosas siccas terito & inspergito. Aut acaciam uino austero tritam. Aut terram lemniam sigillum appellatam, cum aceto illinito. Aliud, Stibij bessē, rosarum siccarum, pollinis thuris, singulorum sextantem, cytinorū unc. i. Aliud, Balaustiorum torrefactorum sex uncem, malicorij quadrantem, florum rosarū, spodij, singulorum drach. ii. Aliud ad hæmorrhoidas efficacius. Succiman- dragoræ, aluminis rotundi, acaciæ, singulorum drach. ii. cum uino terito, & in pastillos efformato, eosque uino dilutos illinito. Aliud, Succicicutæ, succi hyoscyami, aluminis scissi, rubricæ sinopicæ, singulorum drach. ii. sandicis drach. i. cum uino terito et excipito. Et usus tempore uino item diluito. Aliud, diaphrygis drach. vi. cerussæ, spumæ argenti, plumbi usti & loti, succi hypocythidis, singulorum drach. iiii. Excipe succo cicutæ, & cum uino adhibe. Vtere etiam medicamentis ad hæmorrhoidas sedis relatis, & præsertim eo quod Hippocrati inscribitur. Et potiones exhibeto ad sanguinis reiectionem descriptas. Infusiones quoque in decoctis adstringentibus adhibeto.

De calculo uteri.

Cap. xcvi

Calculi aliquando tofacei in ipso utero generantur, quos si extrahere uolueris aluū prius per clysterē stercoreis eductoriū euacuato. Deinde fœnigræci ac malug decocto, rosaceo amixto, uterū eluito & muliere supina disparais cruribus, locata duos lōgiore sinistræ manus digitos in ani foramē immittito, dextra uero superiorem uentrem cōprimito, calculumque extrorsum cogito ac propellito, simul per digitos in anum missos deducens ac extrahens. At uero tofaceam substantiam extra in uterico collo, aut osculo agnatam, muliere rite locata, et locis per dioptram dilatatis, scalpello resicare oportet, & florido medicamento sicco insperfo curare.

De calculo uesicæ muliebri.

Cap. xcix

In uesica muliebri raro oriuntur calculi, latiore enim & rectiore urinae meatum habent. Atque huius extractionem si forte innatus fuerit ita facias. Mulier supina coxis declinibus ac cruribus reclinatis locetur, quo facto duos lōgiore res sin

sinistræ manus digitos in pudendū mittito. Dextra uero uesicā superne cōprimito, et calculū uersus uesicā collū expellito, & ut extra musculū uesicæ collum adstringentē prodeat cogito, & tunc paululū supra pudendi alas, quo loco calculus occurrit, sectionē facito, & per calculariū forcipem extrahito. postea uero sectionē manna thuris repleto, & lanam purā oleo calido imbutā uentri ac lūbis imposito ac deligato, et quotidie bis aut ter, et nocte semel exoluīto, et oleo calido perfundito, tertia die aridis medicamētis lenib. et incarnantib. usq; ad perfectam incarnationē uulnus explemus, et per emplastrum ex aceto et oleo paratum cicatricē inducimus. Optime aut huiusmodi locos et omne cauiū ulcus incarnat hoc. Mannæ thuris sextantem, colophonīæ minutissime tritæ unc. i. Ex hoc arido totam uulneris cavitatem expleto.

De hernia aquosa mulierū. Aspasīæ.

Cap. c

Hernia aquosa circa pudendi alas cōsistit, inflationi similis, debili ac molli tumore. Et aliquando alterā tantum, quādoq; utrāq; partem occupat, ad contactū fluctuationes apparentiā quandā exhibens: primū itaq; dicussoria adhibeātur, supra ad hernias in uiris aquosas relata, præsertim in uirginib. At si parū successerit, muliere rite locata sectionē rectā tumori congruā faciemus. Dissecta autē cute subiectas tunicas paulatim excoriato, et uolsella arreptas distendito, et mēbranam humorē continentē dissecato. Excreto humore sectionē membranæ ad myrteī folij figuram facito, & labijs sectionis duabus aut tribus futuris adductis suppurantia medicamenta adhibeto. Vtere & olei irrigatione, ac reliqua curatione, ad aquosas uirorum hernias suprā tradita.

De Hernia inguinis mulierum.

Cap. ci

Fiunt et mulieribus herniæ inguinis, circa dextrum maxime pudendi sinū. prominet his tumor durus immurmurans, ac premens, præcipue ubi mulieres crura dilatauerint, aut supinæ decubuerint. Et has quoq; congruis deligamētis ac medicamētis curare oportet, uelut dictum est in hernia uirorū intestinali ac inguināli. At si hæc parū profecerint, ad chirurgiā ueniendū est. Mulier itaq; supina declinibus cruribus locetur, & rupulso intestino locus circa inguen, oblique secetur, & tunicae cuti subiectæ sensim excorientur, atq; ita laxata peritonæi mēbranæ pars attrahatur ac extendatur, & intestinum diligēter repellatur, & quod superfluū est de peritoneo deligetur, ac consuatur, & tunc quod supra futuram extat superuacuum refecetur. Deinde labia sectionis cutis duabus aut tribus futuris adducantur, & linamenta indātur, lanaq; succida uino et oleo imbuta imponatur, & deligamenta cōgrua fiant, postea medicamēta suppurantia et repurgandi ac incarnandi uim habentia. Irrigationes itē ac cataplasmata adhibeantur, donec inflāmatio quiescat. Et inde ad cicatricē inducentia progressus fiat.

De Hernia uaricosa. Aspasīæ

Cap. cii

Hernia quoq; siue ramex uaricosus in pudendi alis nasci solet, & est uenarū ampliatio, similis uaricibus in cruribus fieri solitis. proinde in huius curatione sectionem rectam in superficie pro uasis figura facias, deinde tunicas uasi adherentes sensim excoriato, & denudatum uas cæca uolsella eleuato, & duobus uinculis altero superne, altero inferne deligato. Deinde uenam secato, uelut in uenæ sectione ad sanguinem auferendum fieri solet, & detracto sanguine, medium uasis inter duo uincula superuacuum amputato. Atq; hoc sanē omnibus uasis in uaricum formam transgressis commune est. Deinde linamentis sectioni inditis, spongiā aceto aut posca imbutam adhibeto. Et deinceps ad puris generationem, ac reliquam uelut ulceris curationem progreditor.

De

De Nymphæ sectione.

Cap. ciii

Nympha substantia quædam est musculosa, aut pelliculosa, supra alarū pudē di cōmissurā sita quo loco urinaris est meatus. Hęc in aliquib. mulieribus ad tantā magnitudinē augetur, ut deformitatē ac pudorē inducat. Quin & a uesti-mentorū contactu assiduo arrigitur, et ad uenerē ac coitū proritat. Quapropter Aegyptiis uisum est, ut anteq̃ exuberet, amputetur, tūc præcipue quū nobiles uirgines sunt elocandæ. Amputandī uero modū hunc tradunt. Virgini in sella locatæ retro assideat adolescēs robustus, qui brachia sua poplitibus uirginis subiiciat, cruraq̃ eius ac totū corpus regat. Et tum chirurgus ante ipsam stās, forcipe amplioris nymphæ corripiat, et per sinistrā manū distendat, per dextrā uero prope forcipis dētes refecet. Mēsurā autē refectionis eandē quā in columellæ sectione seruare oportet, ut ne funditus ipsam refecemus, sed superuacua tantū pars amputetur, proinde prope dētes forcipis nymphā refecandā esse diximus, quoniam quum pelliculosa sit plurimū extenditur, et nisi quis diligenter obseruet, facile ultra quā oportet amputationē faciet, atq̃ hinc carūculæ decrementū, rhœada græci uocāt, consequitur, peracta chirurgia, spongia ex uino adstrin- gente aut aqua frigida expressa uulnus detergeatur, & manna thuris insperga- tur, et linamentū posca madefactū indatur. Et spongia ex posca expressa super- deligetur. Post septimam uero, cadmiā minutissime trita per se, aut cū rosarum floribus insperge. Aut siccum ex lapide phrygio paratum, & ad pudendorum fissuras descriptum. Aut cinerem ossium palmularum insperge.

De cauda.

Cap. ciiii

In quibusdam mulierib. carnosā quædam substantia ab uteri osculo exoritur et muliebri pudendum replet. Aliquando etiā extra progreditur instar caudæ, undæ etiam nomē habet. Mulier itaq̃ uelut in nymphæ amputatione dictum est locetur, & prominens caruncula forcipe extendatur, & tota ex basi refece- tur, post chirurgiam curatio uelut in nymphæ peragatur.

De thymis, & uerrucis tū alijs, tū formicarijs uteri, Philumeni. Ca. cv

Thymus aut in alis pudendi, aut in ipso pudendo, aut in uteri osculo, aut col- lo generatur. Et est aspera quædam eminentia thymi cacumini similis, in quibusdam mitis, in alijs maligna, rubra, cruenta, præcipue post concubitum aut deambulationes, & sanē moro maturo assimilatur, uisūq̃prehenditur, ali- quādo sine ulla arte, aliquando dioptra immissa, oblata. Huiusmodi igitur emi- nentias in principio curabimus, quemadmodum de reliquis thymis ac uerrucis diximus. Verum ubi diutius perseuerāt, chirurgiam adhibemus. Muliere itaq̃ recte locata, eminentiam uolsella extentim, totam funditus refecamus, deinde curationem cruentis uulneribus aptam facimus. Thymos autem in abdito re- conditos, quum chirurgiæ subijci non possint, medicamentis curabimus, supra ad totius corporis thymos et uerrucas formicarias relatis. Ad uerrucas autem formicarias pudendorum summē confert hoc: Capræ iugulatæ recens oculos compungito, et humorem inde profluentem assidue illinito, et intra sex die- rum spaciū formicariæ uerrucæ extirpabuntur. Sed & bubulum stercus ca- lidum illitum, formicarias in muliebri natura uerrucas sanat. Aliud, quod ego in uxore mea expertus sum, et ipsas radicitus tollit: origani festucam ad lu- cernam accendito, & formicariæ uerrucæ admoвето, ut non inde incendatur, sed fumum solum suscipiat. Et hoc ter singulis diebus facito. Aliud ad: pudendi ac sedis thymos. Soleas ueteramentarias, & cucurbitam siccam exurito si- gillatim, & minutissime trita paribus portionibus permisceto, & locis uino prius

prius clotis inspergito. Experientia hoc cognitum est. Caterum malignorum thymorū sectionē, ob eruptiōis sanguinis periculū reprobare oportet. Nō malignos autē tutō refecamus. Neq; enim hic sanguinis eruptionis timor est. Cauē dum tamē est ne uterus a scalpri acie laedatur, quod facile uitare est, si thymus distentus prope uolsellae dentes amputetur, sicut in nymphae sectione diximus.

Refecione uero facta, ad desiccandos locos pharmacū quoddā sanguinē si- stens adhibebimus. Humectatio enim causa est ut thymi regeneretur, sicut etiā pinguiū medicamentorū usus proinde per totā curationem, laxatiā ac pinguiā sunt fugienda, post chirurgiam protinus galla trita, aut alumen scissum, cum pa- ri thuris pondere admoueantur. Deinde medicamento florido, ex stomomate ferri aut rosarum flore, & cytinis siccis parato utemur. Nam haec contrahunt et quadantenus repurgant, & ulcera ad cicatricem ducunt.

De Condylomatibus, Aspalia.

Cap. CVI

Condyloma estrugosa eminentia, Ruge enim circa os uteri existentes, dum inflammantur, attolluntur et indurantur, tumoremq; ac crassitudinem quandā in locis efficiunt. praecipue uero dum menses prodeunt, & post partus attollun- tur, & per tactū facile cognoscuntur. Ad has igitur fomētā adstringētia, & eius- dem facultatis pessi subdantur, quae omnia supra ad sedis cōdylomata sunt rela- ta, facit et pessus ē malicorio et butyro preparatus, et qui ex lycio indico ac cōsy- po paratur.

De rimis ac fissuris uteri.

Cap. CVII

Rimae circa os uteri ex uiolentis partibus, ob magnitudinē capitis infantis fiūt. Sed & ex acrimū humorū influxu locos rāpente ac corrodeute fieri solent. Et primum quidē latent, dolore a partu adhuc recēte, postea uero paulatim ad sen- sum perueniunt. Nā et ad manū contactū, et in coitu dolores excitātur, quan- do sanē ex affricu cruētantur, deprehēduntur autē dilatato sinu, fissurae enim cir- ca uteri osculum per ambitū uisuntur. In harum itaq; curatiōe chirurgiā & om- nia mordacia pharmaca reprobare oportet, talia enim inflāmationes ac cōuul- siones inducūt, et infessionibus simpliciorib; ac pessis uti, et medicamētis ad se- dis rimas descriptis, praecipue eo quod ē pompholyge, stibio, et plūbo usto para- tur. Quod si callosae fuerint, medicamento ex charta usta utendū est plurimo ro- faceo diluto. callos enim exterit, et ulcera repurgat. Si uero nimīa eius acrimo- niam nō ferunt, iridē illyricam terebinthina exceptā inde, postq; autē cicatrix ul- ceribus inducta est, cōuenit id quod ex cadmia cōstat, aut quoddā sedi destina- tum, uelut est quod ex spuma argēti lota praeparatur, paulo ante ad caneros ute- ri a nobis relatū. Aut hoc quod ad rimas sedis, et muliebriū locorum cōdyloma- ta praeparatur. Stibij, acaciae, sing. dra. VI, passo excipe ac utere. Saepē et hoc uti- mur. Aloēs, opij, sing. dra. xvi, stibij dra. vi, myrrhae dra. iiii, thuris, æruginis, sing. dra. ii, uino excipe et utere cū passo. Aliud cito cōferēs. Stibij, acaciae, plūbi usti, et loti sing. dra. xvi, spodij pompholygis lotae dra. viii, fructus ericæ, alu- minis scissi, atramenti futuri, thuris, myrrhae, opij, sing. dra. viii, cū uino terito uelut collyriū, ac pastillos formato, et cū passo dilutis utitor. Aliud ad oēs pudē- dorum muliebriū ac sedis affectiones. Sistit etiā hæmorrhoidas. Spumæ argēti lotae, cerussae lotae plūbi usti et loti, sing. dra. xxv, stibij loti dra. ix. pompholy- gis lotae dra. viii, cadmiæ lotae drac. v. Hæc omnia primum seorsim, deinde si- mul terito, et uini ac olei myrtei sing. lib. i, paulatim adstillato, ac probe terito, et unita in plumbea pyxide seruato, et uelut optimo medicamento utitor. Nos ue- ro inquit Archigenes, ceræ tyrrhenicæ lib. i, et adipis anserini tantudem adijci- mus. Quidam etiā plumbaginis dra. xx, addunt.

De

De tuberculis uteri miliaribus.

Cap. CVIII

Aliquando in collo aut osculo uteri, aut in ipso pudendo, miliares quaedam emi-
nentie nascuntur, ad tactum quidem occurrentes, uerum certius ad dioptram
parentes. Solentque ex coitus affricu, tum menses, tum conceptionem impedire.
In his aluus primum purganda est. Deinde linteolo locus detergendus, & glās
ex carne caricarum pinguium ac alumine scisso subdenda. Aut pessus ex alu-
mine et felle. Aut medicamenta ad concoquenda ac discutienda tubercula com-
moda illinenda. Elotiones quoque ex aqua mulsa, & aliquo aromatum deco-
cto adhibeantur.

De scabris uteri pustulis.

Cap. CIX

In pudendo & uteri osculo scabrae pustulae oriri solent, furfuraceas squamas reij-
cientes, pruritusque inducentes, et calidae aquae affusione gaudentes. In his aluus ali-
nino lacte purgetur. Vomitus a coena fiat. In balneo exudatio fiat, & in calida
inseffus. Et loci uino calido cum nitro eluantur, & post uinum aqua calida in-
fundatur. Et licium indicum, aut amurca, aut butyrum cum sulphure, aut cera-
tum myrteum cum spuma argenti. Aut alumen rotundum cum melle. Aut
malicorium cum myrrha et melle illinatur. Squamas autem et furfures exterit,
cyclamini radix cum melle illita. Ceterum in cibis omnia acrida, salsa, & aci-
da cauenda sunt.

De alarum pudendi muliebris abscessu.

Cap. CX

Si in muliebris pudendi alis siue labijs abscessus ortus fuerit, & uersus se-
dem declinauerit, sectione eius uitare oportet. Nam ex eorum locorum sec-
sione, quum rugosi sint, facile fistula generatur. Si uero sursum ad urinarum mea-
tum uergit, tuto secare licet.

Ad Umbilicum prolapsum.

Cap. CXI

Ammoniacum thymiana cum modico cumino ex uino tritum apponi-
to ac deligato. Aut bupthalmum cum succo mori tritum imposito. Aliud.
Bituminis drachm. XII. carnium caricarum pinguium, tantundem, primum
seorsim deinde simul trita imposito.

Ad rugas uentris, rimasque ac nigredines
a partu exortas.

Cap. CXII

Adiantum & spumam nitri albam exactissime trita inspergito, & uenter non
corrugabitur. Hoc & in balneo, & extra balneum utendum est. Aliud. Nar-
cissi bulbos cortice detracto concidito, & in umbra siccato, & de his sumito dra-
VIII. radices struthij contusae, farinae ptisanæ, farinae fabarum, maxime Aegy-
ptiarum, singulorum dra. X. radices bryoniae, radices ari, radices cucumeris sylue-
stris, costis, singulorum trientem, terito & cribrato, ac uetri per erui farinam de-
terfo inspergito, & rursus affricando detergito. Nam & rugas & rimas gene-
rari non sinit, & genitas tollit. Maculas etiam ac nigredines in quavis corporis
superficie exterit. In puerperis igitur uentrem oleo antea probe confricato, &
postea chartam medicamento conspersam adhibeto, & fascia deligato, ac post
quartum diem exoluito. Deinde totum corpus in balneo detergito, & omnes
nigredines ac rugas abolebis. Aliud, ad uentres a partu nigrefactos. Ostreo-
rum ustorum partem I. farinae fabarum, maxime Aegyptiarum, partes. II. mi-
sce ac utere in balneo. Aliud. Nigellae, nitri, æquas portiones ad strigmen-
titiam spissitudinem cum aqua terito. Aliud. Scillae uiscae drach. VIII. cornu
cerui uiscae, aluminis scissi, salis cappadocici, myrrhae stactes, nigellae, singulorum
drach. II. farinae ordei drach. XIIII. Vfus tempore melle excipito, & panniculo
detrice.

detrito infartum uentri adhibeto, & per dies septem finito. Octaua uero abluito, ac rursus apponito, & totidem diebus finito. Smegma faciei ac reliqui corporis. Granorum ricini, bulborū narcissi decorticatōrū ac resiccatorū, sing. drach. vii. similaginis, dra. iiii. thuris drac. ii. ouorum albumina ii. misce ac utere. Smegma aliud efficax. Floris iunci odorati, iridis, sing. dra. ii. mastiches dra. i. terito & pisanæ succo excipito, ac pastillos formato, quos usus tempore aqua dilutos illinito, ex per interuallum frigida abluito. Aliud smegma, ad corporis rugas, Rufi. Caricarū pinguium, radicis bryoniæ, farinæ erui, testarum sepiæ uistarum, singulorū æquales portiones. Terenda terito, & ad caricas in mortario contusas ammisceto. Hoc in balneo utendum est. Aliud. Vitem albam farinæ erui ammisceto ac utitor. Smegma, ad defricandas nigredines multo usu cognitum, thuris sesquiunciā, cerullæ lotæ, spumæ argenti lotæ, amyli, scobis marmoris præconesij, mastiches, spumæ nitri albæ, testarum sepiæ, sing. unc. i. saponis gallici unc. xii. ouorum albumina x. omnia sapone excipe, & utere in quacuncq; corporis parte. Smegma admirandū. Cutis superficie exierit & illustrat. Farinæ sceni græci, amyli, tragacanthæ, singulorum trientē, terræ samiae quæ Stella uocatur, ammoniaci thymiamatis, singulorum quadrantē, mastiches, medullæ ceruinæ recentis, singulorū trientem. Tragacantham lacte macerato, & reliqua minutissimè trita ammisceto, ac pastillos formato, eosq; in umbra exsiccatō. Vtere etiam smegmatis Sermone octauo relatis, ubi habentur etiam ea quæ ad alarum ac oris foetorem conferunt.

Preparationes ungentorum siccorum, moschatorum. Item conditorum, cenanthariorum, ac suffumigiorum uariorū.

Cap. cxiii

Xeromyrū, hoc est, ungentū siccum, Beredrias appellatum. Arnabo, amomi, spicæ nardi, singulorū quadrantem, folij malabathri, styracis, singulorū quadrantem, croci, caryophyllorū, singulorum sesquiunciā, opobalsami sexuncē, rosarum uiridium unc. x. x v. misce. Xeromyrū moschatum. Folij malabathri, casia, croci, styracis, arnabonis, amomi, spicæ nardi, singulorū sesquiunciam caryophyllorū drach. iiii. moschi scrup. iiii. opobalsami unc. i. olei indicici aut similis quadrantem, rosarum siccarum sextantem, aut uiridium trientem.

Compositio Arabica. Masuaphij, caryophyllorū, costi, singulorum sextantem, spicæ, folij, rosarum, sing. scrup. xii. amomi, styracis, singul. unc. i. gummi sextantem, arida terito ac cribrato, gummi uero madefacito, & ad styracem in mortario tritum arida ammisceto, & cum gummi pilulas rotundas ad ciceris madidi magnitudinem formato, easq; acu perforato, ac filum trajecito, & arefactas de collo suspendendas præbeto. Xeromyron rosatum. Rosarum aridarum libr. i. costi, folij, caryophyllorum, hypni, cassami odorati, unguium aromaticorum, styracis, singulorum sextantem. Aliud. Folij, rosarum siccarum, amomi, costi, caryophyllorum, spicæ nardi, arnabo, croci, singulorū unc. i. hypni, styracis, opobalsami, singul. drac. iiii. Aliud. Rosarum libras tres, hypni lib. i. styracis flauī & pinguis, unguium aromaticorum, singulorum unciam i. Xeromyron leucophyllon appellatum. Cuius usus ad collum & axillas est. Terræ samiae libram i. styracis, folij, opobalsami, singulorum sextantem. Styracem cum opobalsamo subigito, folium uero terito ac cribrato. Et ad omnia simul in mortario probè permixta, succi rosarum quantum factis est adijcito ac utitor. Hygromyron, hoc est, liquidum ungentū, quo mulieres ad aures utuntur, folij, spicæ nardi, masuaphij, mastiches, caryophyllorū,

II

singul

singulorum unc. i. scrup. xii. styracis pinguis, opobalsami, singulorum sextantem, croci scrup. vi. moschi scrup. i. olei salca electi trientem.

Olei salca præparatio pretiosa.

Cap. cxiiii

Olei omphacini sextar. x. x. iridis illyricæ lib. i. amomi sexuncem, aspalathi, hypni, sing. lib. i. cassami aromatici li. ii. caryophyllorū, folij, carpobalsami, singulorum lib. i. xylocassiae quincuncem, casie trientem, costi, styracis pinguis, croci, sing. unc. i. myrrhæ, arnabo, singulorum quadrantem, spicæ nardi trientem, omnia in aqua coquito. Modus autem præparandi habetur Sermone primo, ubi etiam aliam olei salca descriptionē, & ungēti nardini præparationē habes.

Hygromyri præparatio. Olei salca lib. ii. opobalsami lib. i. spicæ nardi, folij, singulorū trientem, carpobalsami, arnabo, amomi, ambræ, ligni aloës, singulo, sextantem, mastiches, moschi, sing. scrup. vi. quod si caphuræ copia fuerit, sextantem ex ea addito. Hoc ad axillas utuntur, & in aures cum auriculario specillo indunt. Leucophylli siue xeromyri albi præparatio. Lapidis specularis lib. i. folij, spicæ nardi, caryophyllorū, singulorum scrup. vi. succini scrup. xii. moschi liliquas vi.

Olei siue ungenti foliati ac spicati præparatio.

Cap. cxv

Opobalsami lib. i. styracis, amomi, singulorū quadrantem, cassiæ trientē, lilia x. x. simul terito ac utitor, & si crassius fuerit, cum oleo salca diluito. Alia foliati descriptio. Cera lib. i. nardini olei cyziceni lib. iii. picis brutiæ quincuncem, ladanī unc. i. styracis pinguis quadrantem, costi, cassiæ, singulorū sextantem, cardamomi, folij, sing. unc. i. spicæ nardi semunciam, croci, uini Aminæ, singul. unc. i. opobalsami quadrantem. Foliati præparatio ex Oribasio. Cassiæ sexuncem, folij quadrantem, amomi, ladanī, singul. unc. i. piperis grana quadraginta, myrrhæ troglodyticæ unc. i. ungenti nardini libr. i. Arida terito & tenuissimo cribro excutito. Deinde nardinū addito, ac rursus probe terito, & ut nigrius reddatur medicamentum iuglandium cortices ustos ac tritos ammisceto, & opobalsami cochlearia iii. insillato, ac utitor. Facit etiā eximie ad resolutiones. Spicati præparatio. Amomi sextantē, myrrhæ troglodyticæ, costi, sing. unc. i. folij, cassiæ, ungenti foliati aut salca singulorū quadrantem, spicæ nardi unc. i. spicæ celticæ trientem, ungenti nardini sexuncem, ceræ albæ quantum satis est, & ut compages liquidior fiat, opobalsami quadrantem addito.

Oenanthariorum præparationes.

Cap. cxvi

Costi sextantem, cassiæ, carpobalsami, spicæ nardi, sing. unc. i. amomi quincuncem, nardi celticæ trientem, ungenti spicati & foliati, aut salca, singulorum quadrantem. Cera albæ quantum satis est, & ut compages liquidior euadat, opobalsami quadrantem ammisceto. Alia oenantharij descriptio. Costi, sextantem, cassiæ, carpobalsami, masuaphij, myrrhæ sing. unc. i. amomi quincuncem, spicæ nardi, styracis, singulorum trientem, caryophyllorum sesquiunciam, opobalsami sexuncem, lilia x. l. uini adstringentis odorati sextar. xii. salis capadocici sextantem. Folia liliiorum croceo ipsorum ac unguibus demptis probe detergito, & in sindone pura inuoluta per diem ac noctem in umbra siccatro, donec marcescant. deinde ad myrrham in mortario cum uino subactā arida trita ammisceto, & pariter cum uino subigito. Et his postea styracem in minutissimas partes contusum addito, & omnia opobalsamo affuso unito. deinde lilia quoque ammisceto, & omnia in uitreum uas transfusa cōcutito, & uino postea in idem uas infuso rursus concutito, & uas ipsum moscho aut hypno diligenter obturato, deligato, luto oblitato, & per dies quadraginta insolato.

Abstin.

Abinthati siue rhodabinthati præparatio salu-
bris.

Cap. CXVII

Spicæ nardi scrupul. II, folij, amomi, singulorum scrupul. I, mastiches scrupu-
los III, rosarum siccarum scrupul. V, mellis sextarium I, uini sextar. III, aut ut
alij habent quinque. Quidam pro amomo costum adijciunt. Aliud.
Rosarum resectis unguibus, & in sindone per diem ac noctem reficcatarum
lib. I, mellis optimi sextarium I, uini antiqui sextarios VI, Rosas in uino ad dies
quindecim macerato, & quotidie uas ipsum ad solem exponito. Deinde uino
excolato, spicæ nardi scrupul. II, & folij aut casia scrupul. I, ammisceto. Sint au-
tem hæc prius cum uino trita. Postea uero mel adijcito, unito, ac utitor.
Aliud rosatum. Rosarum exemptis unguibus in umbra siccatarum lib. I, ui-
ni antiqui ac splendidi sextar. V, mellis sextar. I, Rosas in uino per diem ac no-
ctem macerato, deinde ad uinum excolato, mel adijcito, & post triduum ex-
hibeto. Quidam mastiches scrupul. VI, addunt, & ita aluum mollit.

Conditi purgatorii præparatio.

Cap. CXVIII

Hoc condito ad pituitosos hyemis tempore uteris. Mellis sextarium unum,
uini sextarios V, piperis grana XLVI, styracis calamitæ scrupul. III, Stryacem
ad prunas cum modico melle diluito, deinde in mortario cum pipere probè te-
rito, & mel paulatim adstillato, ac postea uinum ammisceto. Eius uero memi-
nisse operæ precium est, quod mel nisi ualde purum fuerit, non permittit ut po-
tio ex ipso præparata desideat ac pura & clara fiat. Proinde despumandum est
mel ac purum faciendum: si enim despumatum fuerit, potio eadem die deside-
bit ac pura euadet. Alia abinthati præparatio. Spicæ nardi scrupulos V,
croci siliquas III, abinthij drach. I, mastiches scrupul. VII, mellis sextarios III,
uini sextar. XXIII. Alia conditi præparatio. Piperis scrupulos VI, spicæ
nardi scrupul. I, croci si libuerit, siliquam I, uini sextar. V, mellis sextariū unum.
Mastichati ac cuminati præparatio. Cumini scrupul. XII, mastiches ses-
quiunciam, uini sextar. V, mellis sextarium unum. Anisati præparatio.
Anisi scrupul. VIII, spicæ nardi scrupul. VII, uini sextar. V, mellis sextarium I.
Citratæ præparatio. Corticis citri electi, uel foliorum eiusdem bessæ, uini se-
xtarios VIII, mellis sextar. I, corticem aut folia in uino per dies septem mace-
rato, deinde uino excolato mel ammisceto. Apiati præparatio. Seminis
apij scrupul. XII, seminis rutæ scrupul. VI, mellis sextar. I, uini sextar. III, aut V,
pro abstemijs uini loco, aquam accipito.

Rhodomeli præparatio.

Cap. CXIX

Succi malorum cotoneorū, dempto cortice & granis siue medulla expressi
sextar. II, succi rosarum sextar. I, aquæ ad tertias decoctæ sextar. III, mellis ses-
qui sextarium. Succum malorum suo tempore exprimito ac excolato, eiq; mel
ammisceto, & ad rosarum tempus seruato. In uere autem cum aqua ad tertias
decocta, & rosarum succo, asseruatum cum melle malorum succum unito,
ac utitor.

Mustati præparatio.

Cap. CXX

Similaginis sextar. XVI, olei omphacini sextar. V, piperis quincuncem, folij
malabathri, caryophyllorū, sing. unc. I, musti dulcissimi sextar. III, mellis lib. II,
ex his omnibus uelut placentulæ paruatæ efformantur.

Gari præparatio pro abstemijs.

Cap. CXXI

Aquæ sextar. XXXI, salis sextar. II, cicerum nigrorum siccorum sextar. III,
amanitarum lib. II, caricas quinquaginta, præparato, excolato ac seruato.

II 2 Suffu-

Suffumigij moschati preparatio.

Cap. CXXII

Rosarum uiridium lib. VI. mellis Attici excolati lib. III. & quadrantem, folij sexuncem, amomi trientem, caryophyllorū sextantem, spicæ nardi trientem, costi bessēm, unguium aromaticorum unc. I. carpobalsami trientem, asari sextantem, aloës unc. I. calami indici sexuncē, nuces indicas tres, sandalorum scrupulos xvi. ambrae unc. I. styracis pinguis lib. III. quidā pro styrace, ladani pinguis, & staetes myrrhæ sing. lib. I. aut ut alij habent, dextantem accipiunt, croci unc. I. mastiches quadrantem, moschi scrup. IIII. Ad arida trita ac cribrata, ladani, styracem, staeten myrrham, & mel in mortario ammisceto, deinde ambra liquefactam adijcito. Postea moschum aqua calida dissoluito, & partem eius addito, & partem ad pastillorum efformationem seruato, deinde manibus omnia probè subigito, ac cum moseho efformato. Suffumigium regium. Styracis calamitæ lib. I. ligni aloës sexuncem, ambrae unc. I. moschi scrup. IIII. quidam ita preparant, styracis calamitæ lib. I. ligni aloës trientem, ambrae unc. I. moschi scrupul. IIII. & addunt succi rosarum quantum satis est. Suffumigium moschatum, Theopompi. Styracis pinguis dextantem, caryophyllorum, costi, rosarum siccarum, folij, mastiches, singul. unc. I. moschi siliquas quatuor. Ego uero inquit, moschi scrupulos III. & balsami quantum satis est adijcio. Aliud suffumigium moschatum. Folij, costi, rosarum siccarum, hypni, spicæ nardi, singul. unc. I. croci, unguium aromaticorum, caryophyllorum, amomi, cassiæ, singul. scrupul. xii. carpobalsami, bdellij, singul. scrup. xii. styracis scrupulos xx. moschi scrupulos III. Rhodomelitis, hoc est, mellis roseæ quantum satis est. Suffumigium Moschatum in ecclesia usurpatum. Costi libras IIII. & dimidiā, caryophyllorum libr. I. x. folij sesquilibram, spicæ nardi tantundem, cassami unc. xiiii. styracis liquidī lib. xvi. aspri lib. III. croci dextantem, moschi, ambrae, singulorum sextantem. Cæterum princeps Orientis sic preparat. Costi quadrantem, spicæ nardi unc. I. folij unc. I. caryophyllorum sesquiunciam, cassami semunciam, aspri sextantem, styracis liquidī electi quincuncem, croci scrupul. II. moschi, ambrae, singul. scrupul. II. Suffumigium bonum rosatum. Foliorum rosarum aridorum, costi, mastiches, singulorum sexuncem, spicæ nardi, amomi, opobalsami, singulorum sesquiunciam, croci, myrrhæ, singul. unc. I. styracis dextantem. Vini odorati antiqui, & mellis, quantum satis est. Suffumigij ungentarij preparatio. Costi sesquilibram, elenij, rosarum siccarum, nigellæ, singulorum libr. I. carpobalsami, aspalathi, singulorum libr. II. myrrhæ sesquilibram, tari, hoc est, ligni aloës, ladani, singulorum libr. IIII. amomi libr. I. mastiches bessēm, ligni caryophyllorum sexuncem, foliorum scylmatis, hypni, singulorum libr. xii. myrrhæ staetes libras v. bdellij libras II. unguium aromaticorum, croci, singulorum trientem. Suffumigium ungentarium insigne. Costi sesquilibram, cassami libr. I. ligni caryophyllorum, foliorum scylmatis, spicæ nardi, singulorum sexuncem, corticis aspalathi, rosarum siccarum, singulorum quadrantem, mastiches chiæ, bdellij, singulorum sextantem, ladani lib. III. staetes nigrae libr. vi. croci scrupulos vi. ego uero inquit, pro staete nigra, albæ libr. II. & styracis libras IIII. ammiscō. Suffumigium ualde amabile. Costi unc. xix. caryophyllorum trientem, ladani lib. I. spicæ nardi, folij, singulorum sexuncem, styracis lib. III. aspri unc. xvi. croci sexuncem, moschi bessēm, mellis quincuncem. Suffumigium dominæ Romulæ. Styracis calamitæ lib. II. costi, staetes albæ, singulorum sexuncem, caryophyllorum, tari, singulorum sextantem, spicæ nardi

nardi sextantem & semunciam, croci trientem, ambræ drach. II. succini un-
ciam unam, moschi scrupul. III. uel quantum accipere uolueris. Suffumi-
gium rosatum, Embularchi. Cassia, myrrhæ, bdellij, arnabo, calami indici,
succini, carpobalsami, ladani pinguis, hypni, folij, singulorum quadrantem, ca-
ryophyllorum, unguium aromaticorū magnorum, mastiches, singulorū trien-
tem, croci sextantem, spicæ nardi, opobalsami, singulorum sexuncem, rosarum
ficcarum, styracis, singul. lib. I. rosarum uiridium lib. II. uini odorati ueteris, &
mellis Attici, singulorum quantum satis est. Suffumigium Pamphili Epi-
scopi. Folij, caryophyllorum, hypni, ladani pinguis, singulorum sextantem
& semunciam, calami indici, spicæ nardi, unguium aromaticorum magnorū,
bdellij, carpobalsami, croci, cassiæ, singulorum quadrantem, amomi, mastiches,
singulorum quincuncem, costi sesquunciam, arnabo tantundem, succini un-
ciam unam, opobalsami quadrantem, styracis pinguis libr. III. rosarum uiri-
dium resectis unguibus lib. VI. uini mulsi quantum satis est. Sit autem mel ele-
ctum, & uinum antiquum odoratum, ex quibus uinum mulsum parari debet.

Myrrhatio ad cadaueris conseruatio-
nem.

Cap. cxxxiii

Aloës, myrrhæ, gummi, singulo, lib. I. sarcocollæ lib. II. acaciæ sesquilibram;
thuris sexuncem, opobalsami quadrantem.

DECIMISEXTI AC VLTIMI SERMONIS AETII
FINIS, IANO CORNARIO MEDL-
co Physico Interprete.

PONDERA IN AETIO VSVRPATA.

| | | |
|-----------------------|---------|--------------|
| Libra | } habet | uncias XII. |
| Deunx | | unc. XI. |
| Dextans | | unc. X. |
| Dodrans | | unc. IX. |
| Bes | | unc. VIII. |
| Septunx | | unc. VII. |
| Sexunx | | unc. VI. |
| Quincunx | | unc. V. |
| Triens | | unc. IIII. |
| Quadrans | | unc. III. |
| Sextans | | unc. II. |
| Vncia | | drach. VIII. |
| Semuncia uel semissis | | drach. IIII. |

Reliqua pondera ac mensuræ iuxta Pauli traditionem
usurpata sunt.

II 3 DE PON

DE PONDERIBVS AC MENSVR

RIS, EX PAVLO AEGINETA, IANO

CORNARIO Medico Physico

Interprete,



ONDVS, GRAVITATIS MENSVR IV-
dicatur: Mensura autem, uasculi capacitate. Vascu-
lum uero, tum arida, tum liquida quantitatē men-
sura existit. Quare tres omnino dimensae quantita-
tis sunt differentiae: una quidē ponderis: altera uero
rerum aridarū, utpote quae uelut in aggerem accu-
mulantur: tertia autem liquidorum. Ceterū quum
penē infinita pondera ac mensurae, tum pro loco-
rum, tum pro eorum qui eis utuntur consuetudine,
existant: de his saltem quae omnibus maximē familiaria sunt, nobis sermo erit.

DE PONDERVM AC MENSVR-
rum notis.

ERVVM quum quidam non integris literis, sed per notas
haec ipsa pondera ac mensuras significant, praestiterit fortal-
sis & nos in hac parte ueteres imitari, atque primum chara-
cteres ipsos declarare. Primum igitur litera χ ubi α lite-
ram habuerit incumbentem, Chalcum, id est, Aereum, signi-
ficat: hoc modo, χ . Si uero \circ ipsi χ incubuerit, Choa, id
est, Congium, demonstrat: sic χ . Si α Choenicem, χ . Si ν Chemam χ .
K uero litera, si incumbens ϵ habeat, & linea recta inferiorem ipsius apicem
per obliquū fecerit, Ceratium, id est, Siliquā, significat: hoc modo χ . Quod si
 ν ipsi α incubat, Cyathū significat, sic χ . Si uero \circ Cotylā, id est, Hemi-
nam, χ . Porro linea circumflexa, quam nihil aliud circūstat, & quae omnino
per obliquū ponitur, Obolum denotat, \sim . Si uero duae sunt lineae, quas nihil
circumstat, duos obolos signant, \sim . Qui Gramma, hoc est, scrupulū, faciunt,
quod per literā γ quae ϵ adiectū habet denotatur, recta amplius linea ipsam
 ϵ secante, hoc modo χ . Duae autem lineae iuxta alteram extremitatē conser-
tae, angulumque constituentes, ad similitudinem duorum apicum, qui in ipsius
K literae pictura, ad rectam lineam adscribuntur, Drachmam significant, quae
& Holca cognominatur: hoc modo χ . Proprie autem Holca per λ literam
notatur, \circ litera medium eius occupante: hoc modo χ . Quod si α lite-
ra ad λ apponatur, Libra significatur, λ . Aliqui tamen alteram ipsius λ
lineam per obliquum alia linea secantes, Libram denotant: sic χ . At uero li-
tera γ intra angulum suum \circ literam habens, Vnciam significat, ϕ . M au-
tem iuxta medium ipsius ν habens, Minam denotat, μ . Si uero ν habeat, My-
strum, μ . Si ϵ Medimnum, μ . Si \circ Modium, μ . Porro τ literam ϵ
complectens, & ν incumbens habens, Tryblium significat, τ . ϵ autem
supra se ϵ habens, Xesten, id est, Sextarium, designat, ϵ . Si uero \circ habeat
supra scriptum, Oxybaphum, id est, Acetabulum, ϵ . Aliqui tamē Xesten
per

per ξ denotant, recta linea dissectum, hoc modo, ξ . H autem incum-
bens μ habens, Hemina indicat, μ . K uero cum ξ connexum incum-
bente ipsis litera μ , Ceramium signat, $\mu\xi$.

DE PONDERIBVS.

| | | |
|-----------------------|--------------|------|
| MNA Attica & Aegyptia | habet Vncias | XVI |
| Mna Romana | Vncias | XX |
| Libra | Vncias | XII |
| Vncia | Drachmas | VIII |
| Drachma | Scrupulos | III |
| Scrupulus | Obolos | II |
| Obolus | Siliquas | III |
| Siliqua | Aereos | II |

duasq; tertij partes: ita ut obolus
aereos octo complectatur.

DE MENSVRIS LIQVIDORVM.

ITALICVM Ceramium habet Choas VIII
Chus siue Congius Sextarios VI
Sextarius Cotulas II. quæ & Tryblia appellantur.
Cotula autem siue Trybium, Magna Mystra III. Acetabula uero IIII
Magnum enim mystrum continet Acetabulum I, & Drachmas VI
Acetabulum uero Sesquicyathum habet.
Cyathus Chemas paruas, aut Mystra parua II habet.

Quod si uelis liquidorum iuxta pondus scire dimensionem: multæ enim
rerum liquidarum differentiæ iuxta lancis momentum existunt: id ipsum ex
olei, uini, & mellis exemplo docebimus. Mel igitur uino grauius est quarta am-
pliusq; decima parte, quod ferè totum tertiâ eius partem facit: habet enim ea-
dem mellis ad uinû mensura totum uini pondus, accedente insuper tertiâ eius
ponderis parte. Ad oleum autem mel dimensum, dimidiâ eius parte pondero
sius existit: habet enim totum olei pondus, atq; insuper dimidiâ eius ponderis
partem. Vinum uero nona parte oleum excedit: habet enim pondus ipsius to-
tum, ampliusq; nonam eius ponderis partem. Quæ res ut magis euidens & ma-
nifesta fiat, omnium mensurarû pondus sigillatim subiicimus, uelut in tabella
depictû: ita ut manifestè constet, quod per pondera quæ singulis mensuris sub-
iecta sunt, Oleum, Vinum, & Mel, ex ordine demonstrantur.

Ceramium Italicum habet

| Olei | Vini | Mellis |
|--------------|----------------------------|------------------------|
| libras LXXII | libras LXXX | libras CVIII |
| | Chus siue Congius habet | |
| libras IX | libras X | libras XIIII & dimidiâ |
| | Sextarius habet | |
| uncias XVIII | uncias XX | uncias XXVII |
| | Cotula siue Hemina habet | |
| uncias IX | uncias X | uncias XIIII & dimidiâ |
| | Magnum mystrum habet | |
| uncias III | uncias IIII scrupulos VIII | uncias IIII, & dimidiâ |
| | | Aceta |

Acetabulum habet

drachmas XVIII uncias II scrupulos XII uncias III scrupulos IX
Cyathus habetdrachmas XII sesquuncia scrupulos IIII. uncias II drachmas II
Paruum mystrum habet

drachmas VI scrupulos XX drachmas IX

Oribasius autem iuxta Adamantium, Sextarium Italicum uini quidem iuxta mensuram Vncias uiginti quatuor habere ait: iuxta pondus uero Libram unam, Vncias octo. Sextarium autem mellis Librarum duarum & dimidia pondus habere tradit.

DE MENSVRIS ARIDORVM.

AEGYPTIA Artaba continet Modios III

Modius Aegyptius & Italicus habet Choenices VIII

Choenix, Sextarios II

Sextarius habet Semisextarios II, qui & heminae appellantur.

Hemina autem habet Cyathos VIII

Atticus Medimnus continet Hemiecta XII

Hemiectum autem seu Semodius, Choenices IIII, quo fit ut Medimnus habeat Modios VI, choenices XLVIII, sextarios XCVI.

Cæterum pondus harum mensurarum non facile est proferre, quod immensa diuersitas rerum aridarum iuxta lancis inclinationem existat.

FINIS EORVM QVAE PAVLVVS AEGINETA DE
ponderibus & mensuris tradidit, Interprete IANO
CORNARIO Medico Physico.

QVATVOR AETII TETRABI-

BLON, ID EST, SERMONVM XVI. INDEX, IN QVO

præter cætera ad Medicinam spectantia, Simplicium nomen-
claturæ tam græcè quàm latinè indicantur, iuxta

Alphabeti ordinem.

A

| | | |
|---|---|--|
| A Blacandi infantes tem- pus. 186. & quæ post balactationem uictus ratio sit habenda Ibidem | Acharistos antidotus 727 | Aegrotantes quomodo doleant, nullo forissecus accedente quod dolorem ipsis inducat 249 |
| Abortientes bimestres aut trime- stres fetus quomodo meden- da 870 | Achoreis infantum quomodo cu- rentur 185 | Aegilops uirtus 9 |
| Abortum futurum signa præce- denia 869 | Achorum descriptio & curatio. 313. 314. 315 | Aegilops quid, eiusq; cura 368. |
| Abrotoni facultas, & abrotoni usti 8 | Achoribus quæ cicatricem indu- cant 315 | Aegros quibus uiribus 9 |
| Abcessuum signa indicatoria. 320 | Achrides quali uirtute 13 | Aegyptiæ terræ usus 71 |
| Abcessus intestinorum ortus & remedia 540 | Acidus sapor qualis 2.3 | Aegyptium Andromachi empla- strum 832 |
| Abcessus palpebrarum cura 367 | Acne, id est, faciei uari, quomodo sanande 408 | Aegyptium pharmacum ad om- nes aurium dolores 319 |
| Abcessuum sedis medicinæ. 760 | Aconiti energia 10. 707 | Aequinoctium uernum quando. 167 |
| Abcessuum generalis curatio. 779 | Aconitum, uis syluestris 311 | Aequinoctium autumnale quan- do Ibid. |
| Abstinendum quale 15 | Acopa quæ dicantur 156 | Aeræ facultas 9 |
| Abstinendum quod præstantius. 109 | Acopa podagrica diuersa & inde. 669. | Aeris sapor qualis 84 |
| Abstinendum uariorum descri- ptio 143 | Acori facultas 10 | Aeris qualitatis notio & differen- tiæ. 165. & deinceps |
| Abstinendum oleorum præpa- ratio. 927 | Acri sapor qui 2.6 | Aeris squamæ efficacia 81 |
| Acacia unde fiat 10 | Acrium saporum natura 6 | Aeris uis qualitatis 83. 771 |
| Acaciæ facultas 9 | Acrochordon quid, & unde ei no- men inditum, eius quæ curatio. 755. 756 | Aeruginis aeris qualitas 772 |
| Acacia quæ optima 108 | Acron agrigentinus quomodo æ rem transmutauerit pestis tem- pore 246 | Aeruginis rase usus 81 |
| Acalyphes uirtus 9 | Aste qualibus uiribus 10 | Aeruginis uermiculatæ facultas. Ibidem |
| Acambæ Aegyptiæ proprium 10 | Acutorum morbus terminus deci- ma quarta dies 214 | Aëtis lapidis energia 77 |
| Acanthæ leuces uis 10 | Acutorum morborum prædictio- nes non esse tutas 222 | Aëtis præstigatoris opinionem ne incurreret fugit 85 |
| Acanthi uirtus 10 | Adamamis efficacia 308 | Aethyopas à natiuitate frontem circumcidere, ne oculorum flu- xione infestentur 372 |
| Accipitrum quale fel 91 | Adarces cuius facultatis 78 | Affectiōis principium & gene- rationem posse esse ex diuersis partibus 275 |
| Acerbitas sincera ubi 3 | Adiantum facultas 9 | Agarici proprietates 141 |
| Acerbus sapor qualis 1. 2. 3. 4. 5 | Adeps uulpinus qualis 158 | Agaricum quod præstantius. 108 |
| Acerborum & dulcium natura. 5 | Adipis uirtus medica 100. 101 | Agerati lapidis efficacia 76 |
| Aceti facultas 4. 5. 52. 125 | Adipis animalium conditio 100 | Ageraton cuius facultatis 9 |
| Acetum ab uinæ immaturæ succo quo differat 4 | Adstrictionis actio 3 | Aglaidæ liquidum collyrium. 378 |
| Aceti mulsi præparatio. 193. 265 | Adstringentium medicamentorum qualitas 2 | Agninæ carnis qualitas 94 |
| Acetum mulsum qualis facultatis. 117. 122 | Adstringentia simplicia quæ 115 | Agnini pulmonis uis medica 101 |
| Acetorum mulsum purgatorio- rum uariæ compositiones. 144. 145 | Aeger seruandus quatuor morbi tempora superat 212 | Agnos seu uitex 8 |
| Aceti purgatorij descriptio. 144 | Aegris incurabilibus neque occa- sionem neque auxilia commo- dare 233 | Agrostis qualibus uiribus 8 |
| Acharista collyria 384 | | Aizoi uires quæ 9 |

KK Alaban-

AETII INDEX.

| | | | | |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Alabandicus lapis qualis | 78 | Amomi electio | 109 | 84. usq; 108 |
| Alabandici lapidis uis | 308 | Amnium seu Ammi | 11 | Ananialum quæ presaga sint & |
| Albi collyrij compositio & præ- | | Ammodites quale animal, & qua | | uenenum prodant |
| stantia | 385 | lis eius morsus | 697 | Animi deliquij remedia |
| Albuginibus puerorum quæ cura | | Ammoniaci qualitas. | 12. 773 | Animi deliquium in balneo quo- |
| conueniat | 183 | Ammoniacum quod melius. | 109 | modo curandum |
| Albuginum oculorum remedia ua- | | Ampelitis terre qualitas | 73 | Animo linquentibus remedia. 247 |
| ria | 348. 349. 350 | Ampelos leuce qua facultate sit | | & deinceps usq; 252 |
| Albuginum tincturæ | 351 | prædita | 11 | Animo linqui quosdā propter cru- |
| Alcibiadiū, aliās onochilos | 9 | Ampeloprasii uirtus | 11 | dorum humorum multitudine |
| Alcyoniorū species & uires | 78 | Amphemerina febris quæ, & cur | | 246 |
| Alcenum oleum quod | 362 | sic dicta | 238 | Animo linquentes ob fluxū bilem. |
| Alexandrinæ terræ usus | 71 | Amphibena quale animalculū, et | | 248 |
| Algæ conditio qualis | 65 | quod à scythala chalcidica diffē- | | Anisati preparatio |
| Alicæ qualitas | 117. 118. 120 | rat, eiusq; noxa & cura | 699 | Anisi facultas |
| Alimentorum ratio | 5 | Anureæ facultas | 11 | Anserinus adeps qualis |
| Alimentorum quæ sint facultates. | | Amyli temperamentum | 65 | Anserum carnis qualitas |
| 116. usq; 125 | | Amylum cur dictum | ibidem | item ouorum |
| Alisma quali uirtute | 19 | Amyli qualitas | 111 | Antidotes, uide Glandularum. |
| Alisj propria conditio quæ | 60 | Amygdalorum uires | 12 | Antidoti ex canceris fluuiatibus |
| Aloë quæ præstantior | 108 | Amygdalinum oleum | 21 | compositio |
| Aloës qualitas | 10. 773 | Anagallidis utriusq; qualitas | 12 | Antidoti ex nucibus compositio. |
| Aloës uis medicamentaria | 138 | Anchusæ specierum facultas | 8 | 258 |
| Aloëdaria Oribasij | 236 | Ancyloglossorū remedia. 426. 60- | | Antidoti podagricæ. 677. & inde |
| Aloëdarium purgantium uarie | | rumq; affectio duplex | ibidem | Antidoti mithridaticæ compositio |
| compositiones | 146. 149 | Ancylofis quid, & cura eius | 361 | & usus |
| Alopecia qualis affectio, undeque | | Andrachnes facultas | 12 | Antidoti pæoniæ cōpositio |
| generetur, & eius cura | 305 | Andromachi compositio ad den- | | Antidotus aromatica optima Gal |
| Alphos quid et unde dictus, eiusq; | | tes molares, quæ eadē hora do- | | li |
| cura. 745. & quō differat à le- | | lores sedat | 423 | Antidotus ex duobus piperis gene- |
| Alfines facultas. 11. (præ. 748 | | Androsimon qua uirtute | 15 | ribus |
| Alibæ qualitas | 20 | Anemones qualitas | 12 | Antidotus Athanasia |
| Alui animalium qualitas | 96 | Anethi facultas | 12 | Antidotus Esaræ qualis |
| Alui adstrictionis remedia | 493. | Anethinum oleum | 23 | Antidotus Hadriani |
| Alui fluxione labo- | (495. 508 | Ancursina quid | 136. 825 | Antidotus Acharistos |
| rantis remedia | 528 | Aneurysma quomodo fiat & cu- | | Antidotus theriacæ cōtra uenena |
| Aluminis species & efficacie | 83. | retur | 825 | quæ simplicia recipiat, et quo- |
| 772 | (nunt. 171 | Aneurysmatis quæ sint indicia. ib. | | modo conficiatur. 715. eiusq; u- |
| Aluminosa balnea quibus conue- | | Anginæ species & causæ, reme- | | Antidotus Hadriani |
| Allyson quibus uiribus | 11. 139 | diatq; | 438. 439. 440. 441 | Antimonius, collyrium |
| Abyssus cur dicta syderitis hera- | | Anginæ medicinæ | 80. 92. 93. | Annulus digito impactus quomodo |
| clea | 269 | 108. 133. 159. 378 | | detrahatur |
| Amaracinum oleum | 25 | Anelosis medicina. 74. 101. 151. | | Aparines uires |
| Amaranti uires | 11 | Anfistulas quomo- | (160. 454 | Apes & uespas fugantia |
| Amarorum natura | 6 | do curare oporteat | 761 | Aphronitri energia |
| Amarus sapor qui | 2. 6 | Anicetum emplastrum | 848 | Aphtha quid |
| Amazonum pastillus | 489 | Animalia uenenata quibus artibus | | Aphthorum remedia |
| Ambigua morbi quomodo inuesti- | | tollantur | 687 | Apiati preparatio |
| ganda | 214 | Animalium quis usus in medicinis | | Apij qualitas |
| Ambrosiæ qualitas | 11 | 84. & inde | (dantur. 85 | Apochyma quid |
| Ambusorum ab igne medela. 73. | | Animalium morbi unde deprehen- | | Apochymatis preparatio |
| 81. 93. 808 | | Animalium per singulas suas par- | | Apogei uenti qui. 367. (num. 119 |
| Amomi facultas | 18 | tes qualitas describitur, pagina | | Apollonij memphytæ medicamen- |
| | | | | Apollon- |

AETII INDEX.

| | | |
|--|--|---|
| Apollonij naturale ad polypos me- dicamentum 324 | Artion, quod & Bumion 17 | tes quæ 179 |
| Apollonij liquida compositio. 378 | Arturi occasus, ortusq; 167. 168 | Asari facultas 14 |
| Apomeli quid 231 | Ardor æstuosus quomodo curan- dus 296 | Ascarides quid, quõq; curetur. 539 |
| Apomeliis preparatio et uis. 264 | Arenæ ingestiois modus 133 | Ascentes hydrops quid, eiusq; causæ Ascite hydropis cura. 587 (586) |
| Apophlegmatismorum pituitam per os detrahentium descriptio 303 | Argentum quid, & eius cura. 341 | Asclepius siue Aesculapius passil- Asellorum millepe- (lus. 792) |
| Apoplexia quid et qualis affectio, eiusq; cura 290. 291 | Argenti scoria 83 | dum usus. 300. 310. 318 |
| Apoplexia quo differat à paraly- si 291 | Argenti spumæ uis 81. 712 | Aselli marini usus 107 |
| Appetitus perditæ remedia 498 | Argenti uiui proprium 712 | Asie petreæ flos flaccidas carnes consumit 112 |
| Appetitus caninus qualis, eiusq; species & cura 500. 501 | Aridorum collyriorum compositio tio 874 | Asinorum lac quale 85. 87 |
| Appetitus uitiosi medicina 502 | Aridum Danai 375 | Asinorum domesticorum & sylue strium caro qualis 94 |
| Aqua qualitatis experts 2 | Arietine carnis qualitas 94 | Aspalathi qualitas 14 |
| Aquosus sapor ibidem | Aristolochia triplex, & qualis. 13 | Aspalathus quõ probetur 109 |
| Aqua nihil humidius 5 | Aristolochie clematidis seminis e- nergia 141 | Asparagus siue aspharagus 14 |
| Aquam concoctioni maximè resi- stere 121 | Armeniæ usus medicus 139 | Asperæ arterie si qua infixa, aut illapsa fuerim, quomodo reuo- ces 443 |
| Aque frigide noxa & remedia. 712 | Armenij pictorū facultas. 79. 349 | Asperæ arteriæ descriptio & affe- ctus eius remedia ibidem |
| Aqua quõ per fossas ducenda. 169 | Armutheus lapis 79 | Asphaltion cur trifolij dictum. 64 |
| Aqua quomodo emendetur. ibid. | Arnoglossi qualitas 14 | Asphaltiti maris aqua qualis 6 |
| sine Aqua alimentum concoqui non posse. 170 | Aromaticum collyrium 391. 395 | Asphaltus, bitumen 80 |
| Aque lixiuij usus 170 | Aron quali uirtute 14 | Asphodeli facultas 15 |
| Aqua ducentia remedia 141. 592 | Artemisia uires 14 | Aspersorum faciei ratio 172 |
| Aquarum albularum potus utili- tas 629 | Arundo sepiaria 34 | Aspis acutias 379 |
| Aquarum dulcium iuxta tempera- turam uis 170 | Arquatus morbus quid, & eius re- media 582. 583 | Aspritudo palpebrarum unde o- riatur, quomodo à densitate differat, & curetur 372 |
| Aquam horrentium affectio et cu- ra 287 | Arsenicum, auripigmentum 80 | Asij lapidis & floris eius uis 76 |
| Aque mulse usus 122. 123. 124 | Arteriarum sectio quõ fiat 136 | Astaphys quali ui 14 |
| Aquarum potabiliū differentie et note. 168. 169. & quibus com- moda et incommoda sit. ibidem | Arteriarum sanguinis sistendi me- dicamentum ibidem | Astaphys agria qualis 15 |
| Aquaticorū animalū alimentū 97 | Arteriarum sectionis ratio 371 | Aster siue stella samia, terre samie Aster atticus. 14. (Species. 73) |
| Aquile ortus & occasus. 167. 168 | Arteriace confectiones 445 | Aster Asclepiade 387 |
| Aquilarum fel quale 91 | Articularis morbus, uide Artibri- tis & Podagra | Aster Magni collyrium 387 |
| Arabica compositio 925 | Articulorum incuruatorum quæ sit causa 647 | Aster samius, collyrium 384 |
| Araci facultas 14 | Articulari morbo qualis perustio conueniat 652 | Asthmatici qui dicantur, & unde fiat, quomodoq; curentur 454 |
| Aranearū telæ ad quid utiles. 103 | Articulorum distortorum mala- gnata 664 | Athanasia antidotus 726 |
| Arborum fructus ferè omnis pri- ma generatione acerbi sunt gu- stu 5 | Articulos laxos & luxatos quo- modo cures 810 | Athanasia collyrium 387 |
| Arbuti, eiusq; fructus qualitas. 40 | Arthritis quid, & quomodo disse- rat à podagra, ac eius causæ. 654. cur in quibusdā paruis, in quibusdā magnis morbus, et a- lijs diu, alijs paruo tempore du- ret. 646. uide Podagra. & Articularis | Atheromatum curatio 368 |
| Arceutos qualis 14 | Artis circa hominis corpus uersan- tis duæ primæ ac maximæ par- | Atramenti sutorij uis 83 |
| Archigenes quõ suum præceptorē Agathinum delirio liberarit. 172 | | Atramenti sutorij qualitas 771 |
| | | Atræ bilis generatio, unde 276 |
| | | Atræ bilis quõ cognoscatur 219 |
| | | Atram bilem quæ ducant 279 |
| | | Atræ bile laborantium cura 660 |
| | | Atræ bile stomachū infestatum ha- bentibus quõ medendum 480 |

AETII INDEX.

| | | | | |
|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| Atractylis qua ui | 15 | Balnearum usus in morbis oculo- | Buprestis qualis & quomodo af- | |
| Atraphaxis qualis | 15 | Balsami facultas. 16 | ficiat hominem | 705 |
| Atriplicis uirtus | 15 | Barbā nigrefaciens pharmacum. | Bubonium, aliās aster atticus | 14 |
| Attenuate partes quō sanāde. 190 | | Barbari emplastri usus. 76. (309) | Bubule carnes quales | 94 |
| Attenuatoria alimenta quae, & | | Basiliscus et eius plaga qualis. 699 | Bubulum fel quale | 90 |
| quibus conueniant | 116 | Basilicum tetrapharmacum | Bubulum lac quale | 85 |
| Attenuatoriorū et crassifacientū | | Basi liquida | Bubuli stercoreis qualitas | 93 |
| media quae | 118 | Batrachij specierum uires | Buccelle purgatorie compositio. | |
| Atractoria emplastra. 249. et inde | | Batos seu Rubus | | (106) |
| Atractoria simplicia quae | 115 | Bdellij dignotio | Buccinorum testae ad quid utiles. | 17 |
| Auditus difficultatis cura. 316. 317 | | Bdellij energia | Buglossi qualitas | 17 |
| Auellana nux | 26 | Bdellij utriusq; natura | Bulbi proprietates | 17 |
| Auenae proprietates | 17 | Befsa, ruta syluestris | Bulbus ueniūtorius | ibidem |
| Augustus, collyrium | 887 | Bere drias unguentum | Bulmus quid | 252 |
| Auum quae optime | 117. 118 | Berenices thymiana | Bu imos unde oriatur, et eius re- | |
| Aurea faciei circumlitio | 40 | Beta stomacho quā incommoda | media | 484 |
| Aureum Hygieni collyrium | 894 | Beta uis. 62 | Bunij facultas | 17 |
| Auricula muris, asine | 11. 50 | Betonica uirtus | Buphthalmi flores & actio | 17 |
| Aures quae purgent | 159 | Bilis effusio quid, eius causae & | Butyri qualitas | 90 |
| Aurium dolorum origo, item di- | | remedia | | |
| uersitas & curatio | 515. 516 | Bilem atram euacuantia | | |
| Aurium infanūm doloribus quo | | inde. 147. & inde | | |
| modo medendum | 183 | Bilem flauam quae expurgēt. 138. | | |
| Aurū doloris in febribus curatio. | | & inde. 147. & inde | | |
| Auris suppurata curatio 256. (255) | | Bilis expurgatio quomodo consi- | | |
| Aurium elutiones quibus fiant. 318 | | deranda & facienda | | |
| Aurū sordes quō expurgāde. 316 | | Bilis influxu laborantes quomodo | | |
| Aurum sonitus causa & remedia | | medendi | | |
| ibidem | | Bithynus pastillus | | |
| Aurū inflammationū medele. 317 | | Bituminis electio | | |
| Auris mcatūs ulcerum cura. ibid. | | Bituminis qualitas | | |
| Aurū foetores, itē superexcrecen- | | Bituminosa balnea quibus conue- | | |
| tes in aurū ulcerib. carnes, tum | | niunt | | |
| uermes aurium sanantia | 319 | Bliti qualitas | | |
| Auribus humectis absq; ulceratio- | | Bola collyrium | | |
| ne remedia | 318 | Bola liquida | | |
| Auribus sanguine fluemibus, aut | | Bolus Armeniae cuius facultatis. | | |
| quibus calculi aut aliud quid il- | | Boni succi quae sint. 119 | | |
| lupsum fuerit, medele. 319. 320 | | Borealiū ueniorū qualitas | | |
| Aurū afflictionib. extra meatum. | | Brassicae facultas | | |
| Auricularis cōpositio ad | (320) | Brassica quō preparanda ut aut | | |
| dolores magnos, et pus albū. 319 | | aluum subducatur aut sistat. 123. | | |
| Auribus purulentis & graecolen- | | Brathy qualis. 17 | | |
| tibus, item Aurū diuturnis ul- | | Brion qualis | | |
| cerationibus remedia ibidem | | Bryon thalassion | | |
| Auripigmenti qualitas. 80. 712. 771 | | Brionia, ampelos leuce | | |
| Austerum quale | 2. 4. 5 | Britannicae qualitas | | |
| Austrorum ueniorū qualitas. 167 | | Bromium emplastrum | | |
| | | Bromus qualis | | |
| B | | Bronchocele quid, & eius medi- | | |
| Balanos myrsepsica qualis | 15 | camina | | |
| Baulausium quid & uis | 16 | Bubastica ulcera in pueris | | |
| Balnearum ratio | 170. 171 | eorumq; remedia | | |
| Balnearū ingressus qualis sit | 171 | | | |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| C | |
| Cachexia quid, eiusq; indicia, | |
| ac cura, et in quos morbos tran- | |
| seat | 585 |
| Cadmiae energia | 81. 772 |
| Calami aromatici praestantia quō | |
| difcernenda | 109 |
| Calamus aromaticus | 84 |
| Calamus phragmites | ibidem |
| Calaminthae qualitas | 33 |
| Calis uirtus medica quae | 63. 63. |
| Calculi palpebrarum cura | 567 |
| Calculi uescicae muliebris cura. | |
| | (nat. 612) |
| Calculus excretis quae dieta conue- | |
| Calculi ne nascantur, aut renascan- | |
| tur, dieta praeseruatiua | 605 |
| Calculus uescicae remedia | 606 |
| Calculus uescicae & renum reme- | |
| dia. 607. 610. 611 | |
| Calculos uescicae atterentia medica- | |
| menta | 607 |
| Calculorū qui nec atteri nec exceri | |
| ni possunt medicamina | 612 |
| Calculos rhenum ac uescicae euac- | |
| uantia | 162 |
| Calculosorū rhenum causa & re- | |
| media | 602. 608 |
| Calfacientia alimenta | 174 |
| Calfacientia moderatē, item pri- | |
| mo, secundo, tertio & quor- | |
| to ordine, quae sint. 100. 111 | |
| Calidi temperamenti nota | 159 |

AETII INDEX.

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------|
| Calidorū tēperamentorum corre- | Capillorū corruptio unde proue- | Cardamomi uis 35 | (478 |
| ctiois modus 204 | niat 305 | Cardiacorum dinotio & remedia | |
| Calidi et sicci, itē calidi et humidi | Capillorū defluuium qualis affe- | Cardui facultas 60 | |
| tēperamēti notae quae sint. 199 | ctio, & quō curetur. 307. uide | Cares quomodo serū parent 88 | |
| Caligo oculi quid, eiusq; cura. 340 | etiam de Pilorum defluuiio | Caricarū uirtus 14. 15. 61. 62. 120 | |
| Callyonimi fel quale 51 | Caprae ortus occasusq; 167 | Caries lignorum qualis 58 | |
| Callositas palpebrarūq; uid eiusq; | Caprae cornu quale 102 | Carnē durā habentia quib. cōue- | |
| cura 352 | Caprinae carnis temperamētū. 94 | niat, & quō preparāda 123 | |
| Calor duplex 4 | Caprini sanguinis usus in meden- | Carnes quadrupedū qua parte bo- | |
| Caluariae circūcisionis ratio. 372 | do 85 | ni succi sint, & quā mali 120 | |
| Caluities unde proueniat 305 | Caprini seui usus 100 | Carnis in magno oculi angulo de- | |
| Camelinæ carnis qualitas 94 | Caprini stercoris conditio 93 | cremētū quomō fiat 370 | |
| Camelinū lac quale 85 | Caprinum fel quale 90 | Carnis in oculi angulo excrecen- | |
| Cancani radix qualis 44 | Caprinum lac quale 85 | tis medicamentum 360 | |
| Cancri mānārū quomodo curan- | Caprarum simū praestantia 177 | Carnis animalū praestantia quomo- | |
| di 884 | Caput per nares quae purget. 159 | do exploranda 117 | |
| Cancri qui facile et qui agrē cu- | 302. 303. | Carnium qualitas 94 | |
| rentur ibidem | Caput resiccantium medicamen- | Carniū iuxta cocturā qualitatem | |
| Cancri chirurgia ibid. | torum compositio 304 | mutari 95 | |
| Cancri post amputationē & in- | Capitis dinotio 199 | Carnium salarū differentia 100 | |
| uisionē curatio 885 | Capitis dolori in febribus quomo- | Carnositas quomodo liquāda aut | |
| Cancrorū citra chirurgiam sana- | do medendum 253 | subuertenda sit 189 | |
| tio 885 | Caput ledentia alimenta 125 | Caro animalū quomō dijudicāda | |
| Cancri ulcerati medicinae 886 | Capitis dolorib. omnibus quae me- | Caroi proprietas 35 | (56 |
| Cāceratorū tumorū nō tamen ul- | deantur uaria 301. 302 | Caros quid, et quō à lethargo dif- | |
| ceratorū remedia ibidem. | Capitis dolorū distinctiones 296 | ferat, eiusq; curatio 272 | |
| Cancrorū fluuiatiliū usus 105 | Capitis doloris ex ardore aut cali- | Carpasi succus qualis efficacie. | |
| Cācerata ulcera oculorū quae di- | ditate oborti, aut in febribus, siue | Carpesij uis 44 | (708 |
| cātur, & quibus accidunt 345 | ex ebrietate aut meri potu, cura | Carpia, quae tubercula 47 | |
| quomodoq; curentur ibid. | tio 297 | Carya, nux arbor 35 | |
| Cāceratorū tumorū medicami- | Capitis perfrigerati cura 298 | Caseorum qualitas 89 | |
| nae 802 | Capitis dolori à stomacho, aut ob- | Caseorū usus in medicamētis 90 | |
| Candidi nardini coll. 396 | plagam remedia ibidem | Casie uirtus 35 | |
| Canes rabiosi quō curetur 289 | Capiti quae ex natura dolorē ad- | Casie dinotio 109 | |
| Caniculae ortus occasusq; 167. | ferant ibidem | Casij siccum collyrium 378 | |
| 168. | Capitis pustularum diuersarum re- | Castaneae quales 20 | |
| (usus. 106 | media 313. 314 | Castoriū, id est, testes castoris 106 | |
| Canis fluuiatilis testiculorum | Capitis scabritiei remedia 315 | quibus sit uirib. prae diū. ibidē | |
| Canis terrestris catuli utilitas ib. | Capitis ulcuscula parua, dēsa & | Castratio propter elephantiasim | |
| Canū tēperatura, et rabies 287 | rubicunda quae curent 315 | 17. 32 | |
| Canē rabiosorū signa quae ibi. | Capitis totius illitionum modus et | Catalepsis quid, eiusq; cura 272 | |
| Canina cōuulsio, eiusq; remedi- | ratio 373 | Cataplasmatum uariorum cōpo- | |
| um 159. 172 | Capitum ex animalibus uis medi- | sitiones 147. 175 | |
| Canine cōuulsiois curatio. 293 | ca 102 | Cataplasmatum usus 174. 174 | |
| Canina insania qualis 280 | Carabi seu locustae usus 106 | Catarrhi remedia 448 | |
| Canini stercoris qualitas 92 | Carbunculi palpebrarū 343. & | Catheter, instrumentū quo urina | |
| Canities ne eueniat 309 | quomō curetur. ibidem. & 344 | prolicetur 294 | |
| Cāthariū haustus remedia. 704 | Carcinades, qualia animalcula. 98 | Catocha qd, & quō curetur 272 | |
| Cantharidum usus 105 | Cardamines herbae proprietates & | Causus febris cur dicta 220 | |
| Capniae lapis, qualis 78 | ex ea sinapismus qualis 640 | Causos quō differat ab exquisita | |
| Capnion, fumaria qualis 34 | Cardamines energia 177 | tertiana. 231. itē quō differat | |
| Capparidis facultas 34 | Cardami uirtus 35 | à cōimente putrida, tū quae sint | |
| Capillos quae tingāt et nigresci- | Cardamomū quod optimū 109 | eius notae & remedia. ibidem | |
| ant. 308. fuluos faciant 309 | | KK 3 Caulalis | |

AETII INDEX.

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|
| Caucalis qualitas | 44 | Chalcos asustum | 83 | Cisthus siue Ladanum | ibidem |
| Cauda muliebris resectio | 922 | Chalcitis qualis. | 81.82.83.771 | Citreamalus & citreum | 49 |
| Cedri utriusq; facultas | 36 | Chamaecle qualis | 10 | Citta pregnantium quid, unde di- | |
| Cedrie uirtus | ibidem | Chamaedryos qualitas | 65 | cla, quur et quando mulierib. | |
| Cedrolei uis | ibidem | Chamelea efficacia. | 65.141 | accidat, tum quommededa. | 865 |
| Cedrides, fructus cedri | 36 | Chamaeleuces temperamentu. | 66 | Clauus quid & cur sic dictus, e- | |
| Cele uocatur omnis tumor | 822 | Chamaelonis facultas. ib. | 710 | iusq; remedia | 756 |
| Cenchrias quale animal, et quam | | Chamameli qualitas | 13 | Clematis qualitas | 347.13.f. |
| noxius eius morsus | 697 | Chamamelinum oleu. | ibid. & 23 | Cleonis spodiaceum | 388 |
| Cechrites & eius plaga qualis, tu | | Chamaepitys energia. | 66.141 | Cleopatrae reginae smegma. | 408 |
| quor eius curatio | 698 | Characias quid, & eius usus. | 63 | Cleopatrae pastilli ad deflunium | |
| Cenchros, milium | 36 | Charitilagineorum piscium qua- | | capillorum | 307 |
| Centaurea maioris uirtus | 36 | litas | 100 | Clidion pharnacum | 468 |
| Centaurea minoris facultas. | 37 | Chelidonij utriusq; facultas. | 66 | Cnici qualitas | 39 |
| Ceparum qualitas | 42 | Chersydri serpentis malitia. | 700 | Cnici seminis efficacia | 141 |
| Cephalaea quid, et qualis affectio, | | Chexanaxe epibema, quale. | 157 | Cnici syluestris natura | 15 |
| eiusq; uarietatis dinotio, tum | | Chiaca collyria | 31 | Cnide, quae urtica | 9 |
| cura | 299. 300. 301 | Chiae terre efficacia | 73 | Cnidij cocci facultas | 39 |
| Cephalicorum emplastrorum co- | | Choera dolethron, quale | 51 | Cnipas quid perimat | 73 |
| positio & usus | 831 | Chiliodynami uirtus | 56 | Coaguli qualitas | 90 |
| Cephalicorum medicamentorum | | Cholera quid, cause eius & re- | | Coaguli diuersa efficacia in la- | |
| siccioru ad repurgandu & in- | | media | 492 | ete | 712 |
| carmandum coactio | 782 | Chondrilla, species seridis | 58 | Cocali facultas | 44 |
| Cephalus piscis qualis | 98 | Chrysocolla | 84 | Cocci cnidij, item tinctorij facul- | |
| Cera quae praestantior | 109 | Chrysocetri energia | 78 | tas | 39 |
| Cerae facultas | 38.81.772 | Cibi quando febricitantibus por- | | Coccynelea qualitas | 39 |
| Cerebri animalium qualitas. | 95.97 | rigendi | 229 | Cochlea terrestis usus | 107 |
| Ceratorum diuersorum compo- | | Ciborium qui optimi. | 116.117 | Cochlea mucus quid, quosq; colli- | |
| sitiones | 856 | Ciborum uarietas utanda. | ibid. | gendus, & ad quae utilis. | 107 |
| Cerata podagrica | 667 | Ciborum qualitates | 116 | Coeliaci qui dicantur | 559 |
| Cerati rosacei usus | 22 | Ciborium quid | 38 | Celiaca affectio quae proprie di- | |
| Cerasti qualitas | 37 | Cicada ad quid commoda | 108 | catur, qualisq; sit, & eius re- | |
| Ceratia, Ceratonia | ibidem | Cicatricem quae simplicia indu- | | media | 532 |
| Cerastes & eius plaga qualis & | | cant | 115 | Coitus ratio, item comoda et inco- | |
| quae remedia | 698 | Cicatricibus in albandis reme- | | moda | 131.132 |
| Cerealeum seminum qualitas | 117 | dia | 743 | Coitus mala | 285.287 |
| Cerebri inflammationis affectio | | Cicatricibus nigris ex ulcerib. re- | | Coitus potentie indicia. | 204 |
| & cura | 290 | lictis remedia | 744 | Coitus impotentia quomodo sa- | |
| Cerebri erysipelas, eiusq; curatio | | Cicatrice uulnerib. inducenda. | 517 | netur. | 634 |
| ibidem | | Cicerbitae uis | 60 | Colicoru affectionis cause uariae | |
| Cerebri duae facultates | 328 | Cicerculae quales | 45 | & remedia uaria. 514. hsq; 528 | |
| Cerebri temperaturarum dimo- | | Ciceris natura | 29 | Colis resoluti curatio | 294 |
| tio | 200.201 | Cichorij uirtus | 58 | Colliquatio quid, & quomodo ei | |
| Cerebri membrana glutinata. | 299 | Cici, arbor | 21 | medendum | 240.536 |
| Cerebrum palmæ. | 65 | Cicis, id est, galla qualis | 38 | Colla, qualis uirtutis | 40 |
| Cerium quid, eiusq; cura | 826 | Cicinum oleum | 21 | Collyriorum aridorum descri- | |
| Ceruinae carnis qualitas | 94 | Cicis arboris fructus qualis | 38 | ptiones. | 374.375.376 |
| Ceruinaru cornu uis medica. | 101 | Ciente efficacia | 44.708 | Collyriorum liquidorum compo- | |
| Cerussa qualitas. | 84.711.772 | Cimices prohibentia | 702 | sitiones. | 377. & inde |
| Cestri uirtus | 37 | Cimoliae terre facultas | 73 | Collyrium siccum Castij. | 378 |
| Chalbana seu galbanum | 65 | Cineris in genere uis | 63.772 | Collyria ex croco & ex succis di- | |
| Chalcanthus, qualis | 83 | Cissos, hedera | 39 | uersa | 380 |
| Chalcu anthos | 84 | Cisthus siue Cistharus | 88 | Collyria monohemera | 382 |

AETII INDEX.

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|----|
| Contusorum medela | 809 | Cōmorforū à rabioso cane affe- | ueniat | 124 | | |
| Coquere bis aliquid, quomodo cō- | | ctio & cura | 287.288.289 | Corax pastillus | 791 | |
| Collyrium monomelum. ibidem | | Cōplexio, uide Temperamentum | | Cordis animalū qualitas | 96 | |
| Collyriorum sistentium descri- | | Compositis medicamentis quan- | | Cordis mortificationem quæ de- | | |
| ptio. 382. & inde | | do utendum | 142 | nunciant | 209 | |
| Collyriorū leniū cōpositio. | 384 | Compositorum medicamentorum | | Cordis temperaturæ quomodo di- | | |
| Collyriorū cygni, libianorū, spo- | | quæ causæ. | 770 | noscat | 202.203 | |
| diacori & tephricorum ratio | | Conceptionem impediendum di- | | Cordis tremor, qualis affectio. 458 | | |
| & cōpositio | 385.386.387 | uersarum affectionum cura- | | Coriandri efficacia. | 40.708 | |
| Collyria ex rosīs uiridis & al- | | tio | 878.879. & 891 | Corianū seu corion, quale | 40 | |
| bis | 389 | Conceptus tempus homini, quod | | Coria animalium ad quid condu- | | |
| Collyria diasmyrna & chiacā di- | | sit | 864 | cant | 102 | |
| ctā, ibidem & | 390 | Conceptus indicia. | 854.875 | Corij fomentatio quō fiat | 133 | |
| Collyria ad aspritudinem & ex- | | Cōcipiente muliere quæ in utero | | Corion, qualis affectio | 313 | |
| tersoria | 391 | eius nascantur | 862 | Corniformē oculi tunicā ex qua | | |
| Collyrium pressum | 393 | Concipientibus egre aut non se- | | tuor cōstare corpusculis. | 342 | |
| Collyria enstacta, id est, instillati- | | cure, quō auxiliandū | 867 | Cornuū ex animalib. uis medica | | |
| tia appellata | 395 | Conchiliorum testarum quali- | | Coronæ ortus, occasusq;. | 168 (101 | |
| Collyria ex cornu cerui | 395 | tas | 772 | Coronopodij usus | 40 | |
| Collyria nardina & theodotia: | | Concoctio quid | 502 | Corpora ex quibus causis indu- | | |
| Colocasi qualitas. | 396 | Concoctionis auxilia. | 503 & de- | rentur | 114 | |
| Colocynthidis energia. | 39.140 | inceps | | Corporum quæ sit præstatiſſima | | |
| Coloris consideratio | 7 | Concoctionis signa semper esse bo- | | constitutio | 189 | |
| Colubas quibus edere liceat. | 117 | na | 210 | Corpus odorū reddentia. | 404 | |
| Colubini sanguinis utilitas. | 84 | Cōcoctoria simplicia quæ | 113 | Corroboratiua simplicia quæ. | 113 | |
| Colubini stercoreis qualitas. | 93 | Concoctu facilia aut difficilia quæ | | Corrodentia simplicia quæ. | 114 | |
| Columelle affectæ ablatio quomo- | | sint | 121 | Corrosiua medicamenta | 796 | |
| do fiat | 431 | Conditorum uariorum præpara- | | Corruptu facilia aut difficilia ali- | | |
| Colymbades qua uirtute | 20 | tio | 925.927 | menta | 123 | |
| Colymbadum oliuarum muria ad | | Conditorum ad statuam bilem, ad | | Corydalis ad quid utilis | 106 | |
| quid utilis | 100 | pituitosos, ad melancholicos | | Costi dignotio & species | 109 | |
| Coma quid, eiusq; cura | 272 | descriptio | 143 | Costi facultas | 40 | |
| Comarus arbutus | 40 | Condyloma uteri quid, & quæ | | Cotyledonis qualitas | 40 | |
| Comes uicæ, collyrium | 382 | eius medela | 923 | Crambes utriusq; facultas | 41 | |
| Comitialiū auxilia uaria | 283 | Cōdylomatū medela. | 754.755 | Crapula quid, eiusq; remedia. | 508 | |
| Comitalis ex stomacho primario | | Coni fructus qualis | 44 | Crapulæ quæ cura cōueniat. | 197 | |
| affecta aut ex aliqua parte, | | Conia stacte, qualis | 40 | Craſsarū partiū simplicia quæ. | 113 | |
| quomodo curentur | 284 | Conij summa frigiditas | 44 | Craſſefacientium & attenuantiū | | |
| Comitilib. puerorū & senum | | Coniæ utriusq; facultas | 40 | quæ sint media | 118 | |
| quæ cura cōueniat | ibidem | Constitutio corporis optima quæ | | Craſſi succi alimenta quæ | 117 | |
| Comitialium qui curabiles & qui | | 180 | (ta. 186 | Craſſo uictu qui uti possim citra | | |
| incurabiles | ibidem | Constitutionis optimæ quæ no- | | discrimen | 116 | |
| Comitiale morbi quæ arguat. | 282 | Constitutiones corporis uitiose | | Craſſi succi alimenta quæ sint. | 117 | |
| Comitiales collabētes quibus ex- | | duplices | 197 | Cretæ usus | 73 | |
| citentur | ibidem | Cōuulſio cur comitalē morbū se- | | Cretmon, quale | 41 | |
| Comitalis morbi differentia tres | | quatur. | 281. et quō curetur. | 282 | Crimmon quid. | 42 |
| 281. item cura | 282 | Cōuulſionis caninæ curatio. | 293 | Crini facultas | 42 | |
| Comitalis morbi puerorum reme- | | Cōuulſionū aut distentionū ori- | | Crithe, ordeum | 41 | |
| dium | 18 | ginis dinotio & nomina, tum | | Croci uis | 43 | |
| Comitalis morbi præseruatiua | | cura | 295 | Croci exploratio | 109 | |
| 286 | | Conuulſionum in febribus cura | | Crocodilij qualitas. | 42 (798 | |
| Commigummi | 40 | 261. & unde causentur. ibide | | Crocomagmatis præparatio. | 110 | |
| Commorſos à cane rabioso quo- | | Continens febris quæ | 226 | Crocomagmatis ad capitis dola- | | |
| modo deprēdas sanatos esse. | 289 | Contusio unde fiat | 249 | res præparatio | 101 | |

AETII INDEX.

| | | | | | |
|---|-------------|---|---------------|---|---------------|
| Crommion, cepa | 42 | Dauci species & facultates | 19 | Diaphanes, lapis specularis | 80 |
| Crototon, arboris fructus. | 21, 38 | Dauci sylvestris uis | 44 | Diaphyryna collyria | 389 |
| Crudi humores quales sint. | 193 | Decameron unguentum | 671 | Diellanni qualitas. | 19 (213) |
| Crudi humoris generatiua quæ sint | 118 | Declinatio morbi quid | 210 | Dies iudicatorij boni aut mali quæ notio | 222 |
| Cruditæ quid, & unde, eiusq; re media | 502, & inde | Declinationis totius morbi cogni tio | 211 | Dies prima morbi quæ dicatur si ue principium | 210 |
| Cruditæ quò curanda | 197 | Declinatio quorundā morborum nō potest cognosci. ibidem | | Dicbus singulis differentias aëris fieri | 106 |
| Cruris aut alterius cuiusdā mem bri resolutio | 295 | Defluuiū capillorum, qualis affe ctio, & unde generetur, eiusq; cura | 307 | Dionis collyrium | 342 |
| Crustā inducētia. 790. & inde | | Defluuij pilorum species & cu ra | 331, 366, 367 | Dionysia emplastrum. 841. et 852 | |
| Crustam inurentia | 793 | Deglutitionis resolutæ cura. | 294 | Dionysus collyrium | 390 |
| Crustaminati preparatio | 264 | Deglutiti metalli aut talis cuius piam rei remedia | 549 | Diospolitici pharmaci cōpositio duplex | 505 |
| Cucumis sylvestris | 59 | Delicatum collyrium | 388 | Diphrygis conditio | 80, 772 |
| Cucumeris sylvestris energia. | 141 | Deliquis animi, uide Animo ling Delphici ortus & occasus. | 167 | Dipsacos, qualis. | 19 (lia. 696) |
| Cucumerum facultas | 59 | Delirij cause et medela. 285. (168) | | Dipsas quid, ac eius morsus auxi Discussoria simplicia quæ | 115 |
| Cucurbitæ uis | 39, 174 | Delirij et sanuitatis differētia ib. Dendromalache qualis | 48 | Discutiencia quæ | 299, 322 |
| Cucurbitularū quis usus | 136 | Defantia cutē simplicia quæ. | 114 | Discussorium emplastrorum cō positio | 849, 850 |
| Culicum iclus curatio | 700 | Densitas & aspritudo palpebra rum differunt | 352 | Distentionum. uide Cōuulsionum | |
| Cuminati preparatio | 927 | Dentes duabus cōtrarijs affectio nibus esse obnoxios | 415 | Distichiasis quid | 362 |
| Cupholithos lapis | 82 | Dentium affectionib. remedia. 414 | | Diuites in plenitudinis morbis pe ius curari quā pauperes. | 173 |
| Cupressi uirtus | 43 | Dentium ex caliditate, frigidita te, humiditateque affectionum remedia | 418, 419, 420 | Diuitum peruersum iudiciū. ibid. | |
| Curari recte morbū nō posse citra eius prænotionem | 209 | Dentium a siccitate: item calidita te & humiditate simul affe ctorum medicina | 422 | Duritie in artubus cura | 675 |
| Currus collyria | 392, 393 | Dentium erosoriū curatio | 423 | Dolichs quales | 19 |
| Cutem quæ densent | 224 | Dentes quō lima atterendi | 421 | Dolere quō possint ægroti, nulla forinsecus accedēte quod dolorē causetur | 249 |
| Cutis densatæ curatio, & unde densetur cutis | 195 | Dens ut citra dolorē & absq; fr ro extrahatur | 424 | Dolor quid | 249 |
| Cyamos, faba | 42 | Dentū denigratorū, liuentiū & rarefactorū smeigmata | 425 | Dolorum iuxta situm cause & differentie | 249, 250 |
| Cyani efficacia | 81 | Dentitio puerorū quō inuadā, & quando incipiat | 183 | Dorcadias herba, alio nomine Ma seium | 323 |
| Cyclami qualitas | 43, 141 | Desquamata quæ dicantur, & quomodo curentur | 809 | Dorycnion quale | 19, 707 |
| Cydonati preparatio | 264 | Destillationis remedia | 448 | Dracones quales & ubi, & quæ ab eis noxa | 700 |
| Cygni pullus ad quid utilis. | 106 | Diabete quid & eius cura | 599 | Draconis marini usus | 104 |
| Cygni seu cygnaria collyria quæ dicantur. 385. & qualia. | 387 | Diacepton collyrium | 394 | Draconis marini plaga mede. | 700 |
| Cygnus regime, collyrium. | 387 | Diacodion cōpositio. 240. & u sus | 262 | Dracontij qualitas & usus. 14. 19 | |
| Cymini facultas | 43 | Diacodion, nō cōsequenter exhi bendū, & cur | 275 | Dracontij sanguis | 376 |
| Cynoglossæ facultas | 45 | Diaria febris quæ et quō fiat. 222 | | Dracunculid quid, & quō auferra tur. 815. 816 | (rid. 175) |
| Cynos orchis | 52 | Diarrum februm tractatio. 222 | | Dropacis usus & cōpositio uia lis, quomodoq; curentur. | 698 |
| Cyparissi usus | 43 | Dauci qualitas | 60 | Dryos qualitas | 19 |
| Cyperiperi facultas | 44 | Dulce ulcus, quod aliās Melictris dicitur | 188 | Dryos qualitas | 19 |
| Cyperiperi radicis exploratio | 110 | Dulcis sapor qui | 24, 5, 6 | Dulcium | |
| Cyprimum oleum | 25 | | | | |
| Cyphi duplex | 729, 730 | | | | |
| Cypheos confectio | 723 | | | | |
| Cyri archiatri Edesse pastillus ad ozanas | 323 | | | | |
| Cyriacus pastillus | 791 | | | | |
| Cytinus quid, et eius facultas. | 16 | | | | |
| Cytisi uis | 44 | | | | |

D Amasonij facultas

Daphnes facultas

Dauci qualitas

AETII INDEX.

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-------------|--|----------------------|
| Dulcium & acerborū natura | 5 | Emplastica quæ dicantur | 2 | Essentia, emplastrum | 837. 858 |
| Dulcis uocata compositio | 489 | Emplastrum ex asspitibus | 847 | Ebrietas, emplastrum | 837 |
| Dulcia sitim inducere. | 124 | Emplastrorum uariorū præparatio et coctura, tum quæ in ipsa conijciuntur | 770 | Euacuare per serū quomodo deccat | 88 |
| Dulcium usus quis in cibis & potibus. | 117 | Emplastrorū diuersorum & plurimorum, uarij; usus descriptio. 826. usq; 858 | 295 | Euacuatione qui opus habent, neque tamen euacuantia serunt, quomodo sanandi | 248 |
| Duricies quibus de causis corporibus accidat | 114 | Emprosthonius quid | 295 | Euacuationis quæ sit mensura. | 134 |
| Dysenteria ortus & curatio. | 541. 544. & 549. et inde usq; 557 | Encanthus quid, curatio; ipsius. | 360 | Euacuationum localium tractatio | 158. & deinceps |
| Dysstros, mensis Martius | 167 | Encanum quid, & eius curatio | 340 | Euphorbij energia | 141 |
| Dysuria in febribus curatio | 257 | Emneapharmacum | 854 | Euphorbium quod melius | 109 |
| Dysuria quid & eius medicamentum | 617 | Emneapharmacus pessus | 911 | Eutonum collyrium | 392 |
| Dysuria in febribus remedia. | 618. | Ephemerī efficacia | 707 | Exacerbatio quid | 210 |
| E | | | | | |
| Ebeni facultas | 20 | Ephestias emplastrum | 77 | Exacerbatiois particularis et uersalis quatuor temporum, id est, principij, augmenti, uigoris ac declinationis signa | 211 |
| Ebifcus qualis | 20 | Ephialtie usus | 18 | Excedentia medicamenta | 796 |
| Ebrietatem quæ arceant | 297 | Epicauma oculi quid, eius curatio | 340 | Exercitata omnia in exercitatis meliora | 117 |
| Ebrietatem quæ restringant. ibid. | 284 | Epinyctides quid & quomodo medende | 807 | Exercitatio quid, eiusq; usus | 128 |
| Ebrietas, epithema | 10 | Epithemata quæ post euacuatos corporis humores pro glutino | (sunt. 591) | Exercitationum species | 129 |
| Ebuli facultas | 100 | Epithematū purgatoriorū cōpositiones uariæ. | 157. 158 | Exhalationum terræ ratio | 166 |
| Echini marini usus | 331 | Epithematū ad capitis dolorem compositio | 302 | Experientia certitudo | 7 |
| Estropij qui dicantur | 743 | Epithymbros flos eiusq; facultas. | 139 | Exterforia quæ sint | 114. 349 |
| Exemata quæ pustule, et quæ eorum remedia | 382 | Epithymi facultas. 29. 139. | 167 | Extergentia alimenta | 122 |
| Edessenum collyrium | 116 | Equi ortus in cælo | 94 | Extremæ partes animalū quæ dicantur, earumq; facultas | 95 |
| Educlorum quæ optima | 218. 219 | Equine carnis qualitas | 85 | Extrematū ulcera ac callos quomodo sanes | 789 |
| Edysari uirtus. | 33 | Equinum lac quale | 33 | Exulcerantia simplicia | 115 |
| Egestionum notæ ac indicationes. | 140 | Equiseti facultas | 131 | Euchrum collyrium | 380 |
| Elæa & elæon quali facultate sint | 20 | Equitationis modus & usus | 378 | Eupatorij uis | 30 |
| Elaphobosci facultas | 28 | Erafstrati panchrestos liquida compositio | 29 | Euphorbij qualitas | 30 |
| Elate, palmæ germen | 65 | Erebinthi qualitas | 384 | Euzomon quali uirtute | 30 |
| Elaterij temperamentum | 29 | Ericerum acharistū, collyriū. | 31 | F | |
| Elaterij facultas | 109 | Ericera etiam alia | 249 | Fabæ facultas | 42. 43 |
| Electri uis medica | 78 | Erigeron quali ui | 30 | Facies ne à sole aut uento exuratur quomodo illinenda | 401 |
| Elenium siue Helenium | 28 | Erosio unde fiat | 30 | Faciei rugæ & nigredo quomodo præcauantur aut tollantur. | 402 |
| Eleliphacos qualis | 29 | Erpylos siue Herpylos | 30 | Faciem nitidā reddentia smegeta. | 402. 403 |
| Elebori qualitas | 109 | Erucæ uis | 705 | Faciei lentigines, maculas solares & uaros sanantia | 405 |
| Elebori utriusq; dinotio | 104 | Erucæ pinus potata qualem dolorem inferat | 52 | Faciei ficosi tumoribus quomodo fagi facultas. | 20. (mede. aris. 408 |
| Elephantiasis quid, et cur sic dicta. | 730. eius remedia. 731. usq; 739 | Erui efficacia | 30 | Farinæ crassioris usus | 42 |
| Elephantinum emplastrum | 839 | Eringij qualitas | 239 | Farris præparatio | 545 |
| Elxines facultas | 29 | Erysimi qualitas | 230 | Farclufinum quod | ibidem |
| Elymos qualis | 29 | Erysipelas quis morbus | 30 | Fatuitas quid | 285 |
| Emerocallis, uel Hemerocallis. | 31 | Erysipelatis ortus & species quot earumq; medicamina. | 804. 805 | Fatuitatis origo & cura | 285 |
| Eminentiarum represtia simplicia quæ. | 114 | Erysipelas cerebri | 30 | Fatuitas quo differat à delirio. ib. | |
| Eminentij corpore tumetibus illitiones | 734 | Erythrodani uirtus | 723 | KK 5 F400- | |
| Emollientium emplastrorū compositio & usus. | 836. & inde | Esfra antidoti confectio | | | |
| Empetri seu Epipetri uires | 29 | | | | |

AETII INDEX.

| | | | | | |
|---|---------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|
| Fauonij flatus quando | 168 | Flatui in uentre quæ causæ | 510 | Frigida contentiosa quæ dicatur. | |
| Fauus quid, eiusq; cura | 313. 826 | Flatuiosa, & flatus expertia quæ. | 259 f. | | |
| Febris quid | 210 | Flaua bile infistori uelut | 122 | Frigide lotio quibus conueniat et | |
| Febris continens quæ sit, et quibus | | & medicamina | 657 | quando | 171 |
| peculiaris. 226. | (227) | Flauâ bilē uomentib. remedia. 482 | | Frigide potus intempestius quæ | |
| Febris continens diffreniæ tres | | Flori collyrii quo usus est in Dru | | incommoda ferat | 228 |
| Febris epiala quæ & cur sic dicta | | si matre | 389 | Frigidi temperamenti notæ | 198 |
| Febris lipyria quæ. 239. | (238) | Floriditas faciei quid significet. | | Frigidi & humidi temperamenti, | |
| Febris tertiana quibus familiarior | | Flos aris qualis. 771. | (209) | uem frigidi & siccī nota. 199 | |
| 233 | | Fluuij qui optimi | 168 | Frigiditas aquosa quibus insit. 113 | |
| Febris tertianæ rigor quo differat | | Fluuialis aqua qualis | ibid. | Frigiditates qualiter curandæ. 195 | |
| à quartanæ rigore ibidem | | Fluxibus humorum permixtis effe | | Frigiditas quæ morborū causa. ib. | |
| Febris tertianæ exquisita dinotio | | etorum auxilia | 661 | Frigidum densare meatus | 269 |
| & quæ ita nomenitur. ibidem | | Fluxu tenui laborantiū cura. 660 | | Fronis excoriationis usus | 372 |
| Febris tertiana extenta, ite tertiana | | Fluxus muliebris quid, & unde | | Frucluum escariorum quale sit nu | |
| dupla quæ dicatur. ibidem | | proueniat | 895 | trimenium | 61 |
| Febris tertianæ exquisita & spu | | Fluxus rubri medele | ibid. | Frucluum generationis et saporis | |
| ria generatio et curatio, item | | Fluxus albi cura | ibidem | ratio | 3 |
| semtertianæ | 234 | Fluxiones capitis ressecantiū me | | Fucus quid & eius uis | 65. 84 |
| Februm diuisio | 222 | dicamenorum descriptio. 304 | | Fuliginis qualitas | 46 |
| Febrū genera & causæ descript un | | Fecundarū mulierū dinotio. 864 | | Fuligo cœspi quomodo paritur, et | |
| tur, tum diætæ et remedia. 222 | | Fœmina frigide tēperaturæ unde | | quis eius usus | 54 |
| usq; 250 | | discernatur, et quō curetur. 889 | | Fuliginem lachrymarum quomo | |
| Februm cognitio & curatio. 208 | | Fœmorum inetrigrinū cura | 185 | do colligere liceat | 46 |
| Febris putrida in quibus maximè | | Fœni graci facultas | 63. 85. 113 | Fuligo ex pice quomodo preparare | |
| locis generetur, et quas ob cau | | Fœni graci oleum | 24 | Fuligo ex resina. 57 | (tur. 55) |
| Febrū putridarū septem (sas. 229 | | Fœniculi efficacia | 48 | Fuligo styracis qualis | 61 |
| iudicationes | 230 | Fœtori oris remedia | 413 | Fumaria uel fumus terræ | 34 |
| Febris heclicæ descriptio. 243. & | | Fœtū quæ corruptam. 868 (864 | | Fungerum proprietates | 50. 710 |
| curatio | 244 | Fœtus masculi aut fœmina indicia | | Fures quomodo deprehendas | 77 |
| Febris quartanæ dinotio. 235. qui | | Fœtus abruptus in utero si deti | | Fur furū usus in cataplasmat. 175 | |
| buiq; familiaris, et quod homi | | neatur, quomodo eijciendus. 870 | | Fur fures capitis, qualis affectio, | |
| nem nō plus quā semel capiat. | | Fœtus extractio & extractio quo | | & unde proueniat, ac quomo | |
| ibidem, item curatio | 236 | modo faciendæ | 873 | do curetur | 311. 312 |
| Febris ardens quibus notis differat | | Fœtus exectione facta quæ cura | | | |
| ab exquisita tertiana & conti | | tionibus conueniant | 875 | | |
| nente putrida | 231 | Foliati olei preparatio | 27. 526 | | |
| Febris quotidianæ dinotio. 238. ite | | Fomēti usus in merbis oculorū. 335 | | | |
| curatio ibidem | | Fomemorum usus & ratio | 173 | | |
| Fellis, id est, flauæ bilis cōditio. 90 | | Fomemorum uaporariorum spe | | | |
| Feras quæ fugent | 688 | cies | 132. 133 | | |
| Fermēti qualitas | 30. 57 | Fossulæ oculorū quæ dicantur, ea | | | |
| Fermēti usus in cataplasmate. 174 | | rumq; curatio | 341 | | |
| Ferulæ efficacia | 51 | Fontana aqua qualis | 168 | | |
| Ficus cōstitutio & alimentum. 61 | | Friccio corporis quō fieri debeat. | | | |
| Ficus quid, & cur sic uocati, eo | | Friccionū species quæ. 129. | (128) | | |
| rumq; medicina | 756. 814 | Friccionum uariorum usus | 196 | | |
| Ficuū usus in cataplasmatibus. 175 | | Frige facientia alimenta | 124 | | |
| Figuline teste usus | 77 | Frige facientū moderatē, primo, | | | |
| Filicis cōstitutio qualis | 56 | secundo, tertio & quarto ordi | | | |
| Fistularū ani curatio quō fiat. 761 | | ne, enumeratio | 111. 112 | | |
| Fistularum in uulneribus medica | | Frigida quando exhibenda egro | | | |
| mina | 798. usq; 808 | lis | 228 | | |
| Flagellatorum curatio | 808 | Frigida quomodo frangatur | 232 | | |

| | |
|-------------------------------------|---------|
| G | |
| Gagatis lapidis uirtus | 76 |
| Gagatis lapidis dignotio | 110 |
| Galahtides, id est, tithymalli | 63 |
| Galahtes lapis qualis | 74. 75 |
| Galbani qualitas | 65. 773 |
| Galbani exploratio | 110 |
| Galemi pharmaci ex pice Brutia | |
| compositio | 288 |
| Galerita ad quid utilis | 105 |
| Galla omphacitis qualis | 38 |
| Gallas dropacis species | 176 |
| Galli pinguedo qualis | 3 |
| Gallinarū esus qualis cōueniat. 117 | |
| Gallinarum fel quale | 91 |
| Gallinaceum semum quale | 101 |
| Gallinaceum stercus quale | 58 |
| Gallinarum oua qualia | 97 |
| Ganglia quid | 103 |
| Ganglia oculorū quō curanda. 368 | |
| Gall- | |

AETII INDEX.

| | | | | | |
|--|---------------|--|---------------|--|---------------|
| Ganglium quid, quo differat à meliceride et atheromate, tū quo- modo curetur | 825 | Gramas in puerorū oculis quo- modo cures | 351 | ratio | 234 |
| Gāgræna quid, quō in sphacelum abeat, & quæ eius cura. | 801 | Graminis facultas | 8 | Hepatis tēperaturam unde liceat dijudicare | 203, 204 |
| Gari uis medicamentaria | 100 | Grando oculi quid & quomodo sananda | 367 | Hepatis debilitas, affectiones, & indicia & remedia | 559 |
| Gari preparatio p abstemijs. | 927 | Grandinis generatio | 166 | Hepatici qui dicantur. ibidem | |
| Garorum purgatiuorū diuersæ cō- positiones | 145, 146 | Grani cnidij facultas eiusq; ele- ctio | 140 | Hepatis oppilatio unde proueniat & quomodo curetur | 561 |
| Geniste efficacia | 60 | Grani cnidij usus | 39 | Hepatis inflāmatio, & quomodo cognoscatur, hepar ne an muscu- li eius inflāmati sint | 562 |
| Genianæ facultas | 17 | Grani tinctorij qualitas. ibidem | | Hepatis abscessus remedia | 564 |
| Geodes lapis qualis | 77 | Gruum caro qualis | 96 | Hepaticorum remedia | 565 |
| Geranium emplastrum | 839 | Gryali collyrium | 392 | Hepatis exulcerati remedia. in cirrhū indurati | 567 |
| Gestatio, qualis sit exercitatio, e- iusq; usus & species | 130 | Gummi, quæ uirtute | 40 | Hepatis & sima & gibba quæ purgent | 161 |
| Gigarta qualia | 18 | Gurgulionis affectionibus reme- dia | 429 | Heptapharmacum | 854 |
| Gingidij uirtus | 18 | Gustus & odoratus cōspiratio. 7 | | Hepsema, siracum, sapa, idem | 4 |
| Gingiuarum inflāmatarum cru- entarumq; remedia | 415 | Gutturis tumoris medicamina. 822 | | Heraclij lapidis facultas | 77 |
| Gingiuarū excrecentiū, putrefe- ctū, tumentiū, corrosariū, ulcero- sarum, inflāmatarū ac fistulosa- rum meclele. | 416, 417, 418 | Gypsi efficacia | 80 | Herbe sabinæ facultas | 17 |
| Gladioli uirtus | 51 | Gypsi poti remedia | 711 | Herbe lanarie efficacia | 60 |
| Glās unguentaria qualis | 15 | H | | Herinacei marini caro qualis. | 100 |
| Glandis quercine uirtus | 20 | H Adriani antidotus | 727 | Herinacei marini usus | 104 |
| Glandium optime quæ | 20 | Hematitis lapidis facultas | 74 | Herinacei item terrestres. ibidem | |
| Glandium subditiuorū cōpositio- & usus | 165 | Hæmorrhoides sedis quid, unde di- cantur et oriantur, quomōq; sa- nentur | 757 | Hermolaus parvus et Hermolaus magnus, collyria | 384 |
| Glandule carnis quales | 95 | Hæmorrhoidas sæpe soluere mor- bum | 210 | Hermoneis emplastrum uiride. | 827 |
| Glandularum inguinis inflamma- tionis cura | 777 | Hæmorrhos & hæmorrhoids qua- lia & quā uenenata anima- lia, corū morsus cura. 696, 697 | | Hernia aquosa quid & quō gene- retur, ac curetur. | 766, 767 |
| Glandularū situs, affectio, & cura | (442) | Halica. uide Alicia | | Hernie mēstruorū cura. 768, 769 | |
| Glasti facultas. | 332 | Halacacabi qualitas | 65 | Hernie inguinis ibidem | |
| Glaucedo quid. | 332 | Halimon siue Halmyris | 10 | Hernia aquosa mulierib. ubi acci- dat, qualis sit, & quō medēdū ei | 921 |
| Glaucedo dupliciter dicitur, & quæ curari, aut secus possit. | 356 | Harmala, ruta syluestris | 50 | Hernie inguinis muliebris medicamina | ibidem |
| Glauci oculi ut nigri fiant | 351 | Harmation collyrium | 392, 393 | Hernie uaricose in mulieris pu- dendis curatio | ibidem |
| Glaucij uis | 18 | Hebetudo oculorū quid, & ipsi- us cura | 354 | Herpes quid & quot eius species item quæ curato | 805 |
| Glechon, quale | 18 | Hecatonarchium collyrium. | 382 | Hieræ Ruffi præstantia | 286 |
| Gleucini olei preparatio | 669 | Hectica febris quæ et qualis quot- quæ eius generat | 222, 243 | Hierarum uariarū iuxta suos au- tores cōpositio. | 150, 151, 152 |
| Gleuos ad quid conferat. | 18 | Hedere proprietat | 39 | Hieracitis lapidis energia | 77 |
| Gluten piscium quomodo dijudi- candum | 109 | Hedychroi confectio | 713 | Hippocāporū marinorū usus. | 105 |
| Glutini quod præstanti. | 109 | Hedysmon, menta | 31 | Hippocrates quō aërem purgarit Athenis tempore pestis. | 246 |
| Glutini facultas | 40 | Helcysma, quid & quale | 83 | Hippofelini potentia | 60 |
| Glutitionis resolutæ cura | 294 | Helenium siue Elenium | 28 | Hippuris quæ uirtute | 33 |
| Glycyrrhizon quale | 18 | Heliada collyrium | 393 | Hirci adeps qualis | 3 |
| Glycyfides qualitas | 18 | Helitis quid & qualis | 81 | Hircinæ carnis qualitas | 94 |
| Gnaphalij qualitas | 18 | Helonij qualitas | 109 | Hircinæ medulla qualitas | 102 |
| Gobius piscis qualis | 99 | Hemerocalles qualis | 31 | Hircini sanguinis uirtus. | 85, 609 |
| Gongylis qualis | 18 | Hemicrania, qualis affectio, et un- de oriatur, eiusq; dinotio ac cu- ratio | 300, 301, 302 | | |
| Grati, illes quomodo nutriendi. | 189 | Hemirritei, id est, semitertianæ cu- ratio | | | |

Hircinum

AETII INDEX.

| | | | | |
|--|---------------|----------------------------------|----------|--|
| Hircinum seuum quale | 101 | Hyadū ortus occasusq; | 167. 168 | Et cura. 559. uide Hepatis |
| Hirudinum deuoratarū noxa quæ | 709 | Hyæna tota costā quid proficiat. | 103 | Ignis sacer, erysipelas |
| Hirundines quando apparere incipiant | 168 | Hyæne fel quale | 91 | Illeis qualitas |
| Hirundinum usus medicus | 108 | Hyæne pellis usus | 102 | Ilitiones ad tumores corporis par |
| Hispidi pueri quō curandi | 186 | Hyæne uirtus | 108 | tes |
| Hædi sanguis ad quid conferat | 85 | Hyæne uirtus | 108 | Ilitiones oculorum uariæ |
| Hædinum seuum quale | 101 | Hyæne uirtus | 108 | Ilitiones præseruativæ aduersus |
| Hædorum carnis qualitas | 94 | Hyæne uirtus | 108 | feras |
| Hædorum ortus et occasus | 168 | Hyæne uirtus | 108 | Ilitionum stomatarum confectio |
| Holofœeni constitutio | 62 | Hyæne uirtus | 108 | nes |
| Hominis etati cuiq; quid exercitij conueniat | 186 | Hyæne uirtus | 108 | Ilitionum omnium stomatarum |
| Homo, ceratum | 957 | Hyæne uirtus | 108 | us doctrina summaria |
| Humanum stercus quale | 92 | Hyæne uirtus | 108 | Imber et uentus quādo simul fiāt. |
| Humeflantia alimenta | 125 | Hyæne uirtus | 108 | 166 |
| Humeflantia secundi ordinis enumeratio | 113 | Hyæne uirtus | 108 | Imbrum generatio |
| Humeflationum ratio | 173 | Hyæne uirtus | 108 | Impetiginis equorum utilitas. |
| Humeflationis et irrigationis differentia ibidem | 173 | Hyæne uirtus | 108 | Impetiginosis corporis tumoribus |
| Humidissimos, diutissime uiuere. | 205 | Hyæne uirtus | 108 | remedia |
| Humide temperatura præstantia. ibidem | 159. 303 | Hyæne uirtus | 108 | Incubus quid, eiusq; curatio |
| Humiditatem ex ore quæ trahant. | 159. 303 | Hyæne uirtus | 108 | Indarium collyrium |
| Humor melancholicus, frigidus et siccus | 277 | Hyæne uirtus | 108 | Indicum regum collyrium |
| Humoris, atrabiliarij, biliosi, crudi, frigidi generatiua quæ sint. | 118 | Hyæne uirtus | 108 | Indici lapidis energia |
| Humorē euacuantiā, et post euacuatos humores adhibenda magis legnata et epithemata | 591 | Hyæne uirtus | 108 | Indurantiā simplicia quæ |
| Humores cur non excidant extra uasa in febribus continuis. | 229 | Hyæne uirtus | 108 | Infantes sterientes quomodo mendendi |
| Humoribus euacuatis quæ cura conueniat | 595 | Hyæne uirtus | 108 | Infantium uox intercepta quomodo restituatur ibidem |
| Humorum in podagricis dinotio. | 647. 648. 649 | Hyæne uirtus | 108 | Infantium dentitio, inflammationes oculorum, albugines, curium inflammationes, et sira |
| Humorum in uentris amplitudine et in uentris tunicis sitorum differentia | 202 | Hyæne uirtus | 108 | sis quomodo curentur |
| Humorum omnium in corpore equaliter redundantium purgatorij compositio | 148 | Hyæne uirtus | 108 | Infantes quādo ablactandi. 186. et quomodo post ablactationē præscendi ibidem |
| Humorum permixtorum curatio. | 661. 662 | Hyæne uirtus | 108 | Infantis recens nati sanitas quomodo cognoscatur, item eius educatio qualis sit |
| Humorum à capite in uentrem destillantium remedia | 494 | Hyæne uirtus | 108 | Infantibus spinas aut festucas deuoratas quomodo eximas. 184 |
| Hyacinthi temperamentum | 64 | Hyæne uirtus | 108 | Infantium steruationes et grauedines, tusses, profluuiā, aluius suppressa ac pustulæ quomodo curanda ibidem et 189 |
| | | Hyæne uirtus | 108 | Inflammata triplicem sanationem habent |
| | | Hyæne uirtus | 108 | Inflammatio cerebri |
| | | Hyæne uirtus | 108 | Inflammationis cuiuscunq; remedia |
| | | Hyæne uirtus | 108 | Inflammationis oculorum cura. |
| | | Hyæne uirtus | 108 | 332. 333 |
| | | Hyæne uirtus | 108 | Inflammationibus incipientibus, quomodo uena sectio debeat fieri |
| | | Hyæne uirtus | 108 | 134 |
| | | Hyæne uirtus | 108 | Inflam- |

A E T I I I N D E X.

CHR4

AETII INDEX.

| | | | | |
|---|---------|--|---|---------|
| cura ipsius | 730.731 | xta morbi uarietate curationes | retur & curetur | 539 |
| Leontopetali qualitas | 54 | 580.581.582 | Lumbricos educuntia | 163.165 |
| Leomopo. ij. uirtus | 45 | Lienteria quid, & quomodo cu- randa | Luna secundum mensem quatuor differetias in aere operatur. | 166 |
| Lens stagnorum seu palustris cu- ius qualitas | 65 | 557 | Lupi piscis qualitas | 98 |
| Lentes qua facilitate | 64 | dele | Lupini qualitas | 31 |
| Lenticule costura qualis | 124 | 819 | Lupinus erraticus | 32 |
| Lentiginibus faciei medentia. | 405 | Lignorum cariei aut putredinis usus | Lupini stercoreis qualitas | 92 |
| Lentisici temperamentum | 62 | Lignos facultas. | 46. | 260 |
| Lentiscinum oleum | 12 | Ligustici usus | 46 | 810 |
| Lepidij qualitas | 45.177 | Ligustri qualitas | 44 | 47 |
| Lepi duplex, & qualis | 81 | Lilij temperamentum | 42 | 9 |
| Leporis capitis uis medica | 101 | Liliaceum oleum | 23 | 554 |
| Leporina carnis qualitas | 94 | Limniscorum usus | 263 | 45 |
| Leporini coaguli praestantia | 90 | Linguae asperitas quomodo curan- da sit | 254 | 78 |
| Lepus marinus qualis & quam uenenatus | 705 | Lingua principium & finis inte- rancorum est | 255 | 167 |
| Lepra quo differat ab alphi, leu- ce, scabie & impetigine sylue- stri | 748 | Linguae inflammatae, desquamatae & tumoris remedia | 427 | 47 |
| Lepra remedia plurima. | 748.749 | Linguae resolutae curatio | 293 | 47 |
| Lepra generatio | 748 | Lini seminis uis | 46 | 358 |
| Leithargus unde causetur. 269. que habeat accidentia, & quod cu- randus | 270 | Linoxostis qualis | 74 | 408 |
| Leithargus et caros quomodo dif- ferant | 272 | Lini seminis oleum | 21 | 311.366 |
| Leucaeamha facultas | 10 | Lipothymia qd. eiusq; cause. | 250 | 70 |
| Leucaemhi facultas | 139 | & quod differat a syncope. ibid. | | 100 |
| Leuce, populus alba | 46 | Lippitudinis in febribus curatio. | | 101 |
| Leuce quid, & unde ac cur sic di- cti, eiusq; medela | 746 | Lippitudinis species & curatio | 365 | 78 |
| Leuce quomodo differat a lepra et ab alphi | 748 | Lipyrria febris que | 239 | 77.591 |
| Leucographis lapis | 72.75 | Liquefieri quid | 70 | 189 |
| Leucophyllon unguentum | 925 | Liquidorum collyriorum descriptio nes | 377. & inde | 47 |
| Leucoij uirtus | 45 | Liri spumae qualitas | 80.81 | 110 |
| Libanoti qualitas | 46 | Lixiuij facultas | 40 | 47 |
| Libanoti fuligo qualis | 46 | Lobi quales | 19 | 591 |
| Libanotidis temperamentum | 46 | Loculus, uide Secunde | | 49 |
| Libidinis extinctae prouocameta. | | Locustae usus in medicina | 106 | 58 |
| Librae in suas partes diui- sio | 634 | Localium euacuationum tractatio. | | 49 |
| Lbyana collyria que dicantur. 385. & qualia. | 387 | Lolij uirtus. | 158. et inde | 49 |
| Lichen seu muscus petrarum | 45 | Lonchitis ad quid conducat | 47 | 49 |
| Lichen morbus, sui nominis herba curatur | 45 | Lopima, castaneae | 30 | 49 |
| Lienis affectionum cognitio | 569 | Loquentium difficulter affectio du- plex, ite que remedia ipsis con- ueniant | 426 | 49 |
| Lienis animalium qualitas | 56 | Loti arboris qualitas | 47 | 49 |
| Lienis interperierum cura. | 571. | Loti herbae facultas | 47 | 49 |
| inflationis. 572. & inde | | Luccernarum oleum | 20 | 49 |
| Lienosorum usus et dicta, tum in | | Lucij malagma ad articulos distor- tos | 664 | 49 |
| | | Lumborum doloris curatio | 257 | 49 |
| | | Lumbricorum generatio, diuersitas & remedia | 536 | 49 |
| | | Lumbricus latus quid, unde gene- dit | | 49 |

AETII INDEX.

| | | | | |
|--|---|----------|--|------------------|
| Mammarum inflammationum in- duratarum medicina. ibidem | Meiradicum usus | 50 | Menstruis quæ non purgantur | |
| Mammarum abscessuum, fistularum, ulcerum depascentium ac can- croum cura. 883. 884 | Melamphylli facultas | 10 | quib. accideb. obnoxie fini. 888 | |
| Mammarum induratarum medela. 887 | Melan quale | 81 | Menses ducentia remedia | 886 |
| Mandragora uis | Melacholia generatio et uarietas, indiciaq; | 276. 277 | Menses quibus mulieribus non flu- unt, uel ob plenitudinem, uel ma- ciem, uel uitiatos humores, uel ob sanguinis ad naves aut sedem dela- tionem: uel ob nimium otium aut aliquam uteri affectionem, reme- dia | 890. 891 |
| Mana quid, et quomodo differat a thure | Melacholia species quot. 277. eius quæ sit cura ib. et 278. 279. 280 | 151 | Mensium stillicidij medicina. | 891 |
| Manus emplastrum | Melacholici qui dicantur | 151 | Mensium nimie purgationi quod subueniendum | 893 |
| Man zizanion, colocation. | Melacholici cur plures cibos ap- petant. etc | 277 | Menses quæ ducant in potu sum- pta | 162 |
| Marasmius quid. | Melacholicus sanguis nunc crebrius tantum, an totum corpus occupa- rit quod cognoscas | 278 | Mensium fluxu morbum sepe su- isse solutum | 220 |
| Marathi facultas | Melanteria qualis | 81 | Menstruæ mulierum purgationis ratio | 863 |
| Marciaton unguentum | Melantheria exploratio | 110 | Menstruæ purgationis in uirgi- nibus indicia ibidem | |
| Mare mortuum | Melantherij qualitas | 48 | Mensura quomodo iudicetur. | 938 |
| Marrubij uires | Melantherij noxa | 712 | Mensurarum liquidorum descri- ptio | 931 |
| Masculo gignendo quid agendum. 880 | Meleæ armeniaca proprietates. | 49 | Mensurarum notæ | 930 |
| Mastichati preparatio | Meleæ persicæ qualitas | 49 | Metiende quantitatatis differentias esse tres | ibidem |
| Mastiche duplex et qualis. | Meliceridum remedia | 368 | Mentis facultas | 51 |
| Mastiche, lentisci resina | Meliceris qualis affectio, et cur sic dicta | 313 | Menti papulas manantes quomo- do cures | 409 |
| Mastiche, resinarum præparatio. | Meliceridis puerorum cura | 185 | Menti scabrie medela | 405 |
| Mastichinum oleum | Meliloti uires | 48 | Mercurij herbae usus | 53 |
| Mastiphij confectio | Melines qualitas | 29 | Mercurialis quali uirtute | 47 |
| Matrix, uide Vterus | Melinum oleum | 22 | Mergi uentriculus ad quid uti- lis | 102 |
| Maza quid. | Meliosophyllon, quale | 49 | Merula piscis qualis | 98 |
| Maturitas fructuum ex solis calidi- tate. 4. | Meliites lapis qualis | 74 | Mespili natura | 49 |
| Meconis natura | Mellis facultas | 48. 770 | Metalli aliusque similis rei deglu- titionis remedia | 549 |
| Meconis ceratidis qualitas | Mellis emollientis preparatio. | 145 | Metallica quæ dicantur, et quæ eorum uirtus | 78. et inde |
| Meconium quid. | Mellis rosacei compositio. | 144. | Metopium oleum | 29 |
| Media quæ sint in quatuor qua- litatibus 110. 113 | Mellis in Heraclea Ponti nati pro- prietates | 707 | Metasyncritica quæ dicantur. | 622 |
| Medica siue citrea malus qualis | Melli quod addimatur extensoria uis | 48 | Metasyncritica curatio | 178 |
| Medicamentorum quæ sint qualita- tes ex uirtute simplicium. 116. et inde. (methodus. 142 | Melli quod addimatur extensoria uis | 48 | Metra cur uterum dicatur | 861 |
| Medicamentorum purgantium componendi | Mellis in Heraclea Ponti nati pro- prietates | 707 | Miliaris, species herpetis quid, et quomodo medenda. | 805. 806 |
| Medicamenti ex papaueris capiti- bus preparatio et usus. | Melli quod addimatur extensoria uis | 48 | Milij constitutio | 36 |
| Medicamentorum electio, quæ trahit quæ sint præstatorum. 108. et inde. | Mellis in Heraclea Ponti nati pro- prietates | 707 | Milphosis quid, et unde dicta | 331. 332. et 366 |
| Medicamentorum qualitatibus inde ordines quatuor | Melli quod addimatur extensoria uis | 48 | Miltos, id est, rubrica | 72 |
| Medicamentorum diuisio, et qua- litates | Mellis in Heraclea Ponti nati pro- prietates | 707 | Minthe, quæ menta | 51 |
| Medicina practica due partes ma- ximæ quæ | Melli quod addimatur extensoria uis | 48 | Miscen- | |
| Medicæ, naturæ operum esse gna- rum debere | Mellis in Heraclea Ponti nati pro- prietates | 707 | | |
| Medulle usus ex animalibus | Melli quod addimatur extensoria uis | 48 | | |
| Medullarum differentia efficaciaq; | Mellis in Heraclea Ponti nati pro- prietates | 707 | | |
| Medullarum quæ optima | Melli quod addimatur extensoria uis | 48 | | |
| Megaleum oleum | Mellis in Heraclea Ponti nati pro- prietates | 707 | | |

AETII INDEX.

Nucis

A E T I I I N D E X.

| | | | |
|----------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| Nucis arboris qualitas | 35 | Oculorū resolutio, & ipsius cura | 854 |
| Nucis pineæ uis | 44 | tio. 356. item quæ curabilis et | Ocsypi preparatio, et usus. 93. 94 |
| Nuclei pinei quales | 181. | quæ non | Oleæ qualitas |
| Nucum oleum | 21 | ibidem | 20 |
| Nux auellana | 36 | Oculorum macies, expressio & | Olei uirtus & quid proprie. ibid. |
| Nux iuglans seu regia | 35 | cōfusio quid, quomodoq; curē | Olei purgatorii cōpositio |
| Nux parua, auellana | 36 | tur | 158 |
| Nux pontica, auellana | ibid. | Oculi albis innata quomodo tollē | Oleorum salca, foliati, & spicati |
| Nux pinea seu picea | 55 | da | preparatio |
| Nutricis electio & uisus, tū ex- | 359. 160 | Oculorū quæ sit natura | 926 |
| ercitia | 181 | Oculi singula partes quot & qui | Oleum alenum |
| Nutrientia multum & item parū | 359. | bus affectionib. infestetur. ibi. | 362 |
| quæ sint | 119 | Oculi humores tres | Oleorum diuersorū preparatio- |
| Nympha quid, & eius sectio. | 922 | ibidem | nes & qualitates describuntur |
| Nymphæ qualis actio | 51 | Oculorū perturbationis cura. | pagina 21. & deinceps. |
| | | Oculorū inflamationis medela. ibi. | Oleum amaracinum |
| | | Ocularium morborum curæ ua- | 25 |
| | | riæ. 332. 333. 334. 335. 336 | Oleum amygdalinum |
| | | Oculorum frigide intemperiei cu- | 21 |
| | | ratio | Oleum anethinum |
| | | 336 | 23 |
| | | Oculorum inflationis, tumoris, et | Oleum chamæmelinum |
| | | tumoris indurati cura. | 23 |
| | | 337 | Oleum cicinum |
| | | Oculorū ulcera, & ulcerationes | 21 |
| | | ab igne, itē si qua oculis illa- | Oleum cyprinum |
| | | pse fuerint quō curada. | 25 |
| | | 338 | Oleum fœpi græci |
| | | Oculis infixa quomodo extrahan- | 24 |
| | | tur | Oleum foliatum quomō fiat |
| | | 339 | 27 |
| | | Oculorū sugillatio, punctura & | Oleum lase dictum |
| | | wulnere profundiora quomo- | 24 |
| | | do curentur | Oleum irinum |
| | | ibidem | 26 |
| | | Oculi humor ouiformis quomodo | Oleum malabathrinum |
| | | exiccandus | 27 |
| | | 340 | Oleum laurinum |
| | | Oculi prolapsus, item ulcerationū | 21 |
| | | superficialium, nubecula, cali- | Oleum lentiscinum |
| | | ginis, epicaumatis & encau- | 22 |
| | | matis curatio | Oleum liliaceum seu lirinon |
| | | 340 | 23 |
| | | Oculorū argemum, fossula, cōca- | Oleum lini seminis |
| | | ua ulcera, tum suppuratio & | 21 |
| | | unguis quō sananda | Oleum mastichinum |
| | | 341 | 25 |
| | | Oculi pustularum origo, dinotio, | Oleum megaleum |
| | | curaq; | 25 |
| | | 342 | Oleum melinum |
| | | Oculorū nomē quō curadē. | 22 |
| | | 344 | Oleum mendesium |
| | | Ocymi basilici cōstitutio | 24 |
| | | 66 | Oleum metopium |
| | | Odoramentorum uariorum com- | Oleum myrobalaninum |
| | | positio | 21 |
| | | 925 | Oleum myrteum |
| | | Odoratus & gustus cōspiratio. | 24 |
| | | 7 | Oleum narcissinum |
| | | Odoratus oblesionis medela. | 24 |
| | | 326 | Oleum nardinum Cyzicenū |
| | | Odorum corpus reddentia, & o- | Olei nardini preparatio |
| | | dorem corporis scetentem tol- | 26, 27 |
| | | lentia | Oleum nucum |
| | | 404 | 21 |
| | | Oenanthariorum uariorum con- | Oleum oenanthinum |
| | | fectio | 22 |
| | | 926 | Oleum populi nigræ |
| | | Oenanthe quid. | 21 |
| | | 22 | Oleum raphaninum |
| | | Oenanthinum oleum | 22 |
| | | 22 | Oleum rosaceum |
| | | Oenos, uinum | 20 |
| | | 51 | Oleum sabinum |
| | | | Oleum salcas |
| | | | 27 |
| | | | Olei sampsuchini preparatio |
| | | | 194. 571 |
| | | | Oleum sesaninum |
| | | | 23 |
| | | | Oleum sicyonium |
| | | | 25 |
| | | | Oleum styracinum |
| | | | ibidem |
| | | | Olei suffumigabilis preparatio. |
| | | | 28 |
| | | | Oleum susinum |
| | | | 28 |
| | | | Oleum telinum |
| | | | 24 |
| | | | Oleum uiolatum |
| | | | 24 |
| | | | Olerum nullū esse boni succi. |
| | | | 120 |
| | | | LL Oliuariū |

A E T I I I N D E X.

| | | |
|--|---|---|
| Oliuarum ejus qualis 117. 118. 119. | Ocium quantum obstitit sanitati. | Palpebrarum ganglia, atheromata, fletomatata, melicerides, uarices & reliqua mala quomodo cures |
| Oliuarum purgatoriarum compositionis 146. | Oua animalium qualia. 97. item uis medica ibidem | Palpebrarum abscessus & calculi cura 367 |
| Oliuarum salutarum uirtus 123. | Oui candidum quale | Palumbi sanguis ad quid conferat. |
| Olympionici collyrium 384. | Ouorum iuxta cocturam quae meliora & quae deteriora 97 | Pampathes emplastrum 845 |
| Omotribes oleum 20. | Ouille carnis temperamentum. 94 | Pamphili Episcopi suffumigium 93 |
| Omphacii & acetii differentia 4. | Ouille pellis usus 102 | Panacea emplastrum 844 |
| Omphacinum oleum 20. | Ouille stercoreis qualitas 93 | Panacis radicem & succi exploratio. 110. |
| Omphacomeliis preparatio 263. | Onullum fel quale 90 | Panax Herculeus 58 |
| Omphacocarpos, quae Aparine. 13 | Onullum lac quale 85 | Pancratii temperamentum 53 |
| Onochilos, Anchuse species 9. | Oxallidis efficacia 283 | Panchrestion suluum collyrium. 394 |
| Onoclea, Anchuse species 6. | Oxos, acetum 52 | Panchrestos Erasistrati, cur sic appellata 319. 378 |
| Operis huius institutum 7. 8. | Oxygala quale 89 | Pani circa quam oculi partem proueniant 343 |
| Ophiasis qualis affectio & unde proveniat, quomodoque curetur 305 | Oxygala etni casei utilitas. 89. 50 | Panicum quale 29 |
| Ophitis lapidis energia 77 | Oxylapathi uirtus 45 | Panis usus in cataplasmate 174 |
| Opiobolares collyrium 392 | Oxylipes panes 225 | Panum ordaceorum qualitas. 42 |
| Opiobotonos quid 58. 59 | Oxyporum medicamentum 226 | Papaueris qualitas 49 |
| Opos qualis 25 | Oxyporum polyetes 506 | Papaueris cornui uis 709 |
| Opopanax qualis 53. 773 | Oxyporij ad inflationes preparatio 280 | Papaueris succi uis 409 |
| Opogon fructus qui 61 bis | Oxyporiorum purgatoriorum compositio 785 | Papaueris Thebani proprietates. 49 |
| Orchestra unguentum 671 | Oxyporiorum purgatoriorum positiones 146 | Papularum ortus & cura 807 |
| Orchis cynos qualis 52 | Oxyphancos qualis 62 | Papularum menti eruptionibus manantibus quomodo medendum 409 |
| Orchis altera ibidem | Oxenarum ortus & cura. 321. 322. 323. 324. | Papulis ex sudore aut feruore auxilia 743 |
| Ordei facultas 41 | P Accianum collyrium 895 | Papulis ulcerosis crurum medicamenta. 744. uide Pusfule 49 |
| Ordeoli tuberculi sedes 343 | Pacci asclepiadeum 390 | Paralytici affectio & cura 291 |
| Ordeoli oculorum cura 368 | Paderotis uires 10 | Paralytis quomodo ab apoplexia seu syderatione differt 291 |
| Ordeum uersorum qualitas. 167 | Paoniae facultas 18 | Pardaliansches uires 10 |
| Origani uires 52 | Paoniae antidoti compositio 785 | Pardalis emplastrum 590 |
| Orionis ortus 167. 168 | Paoniae radicis uis. 284. 285 | Paresis serpens qualis 699 |
| Oris fectori remedia 413 | Palati remedia 427 | Parienti difficultatis causa 870 |
| Oris illitionum, quae stomatica dicuntur, descriptiones & usus 432 | Paliuri facultas 53 | Parientibus aegre quomodo succurrendum 867 |
| Oris inflammationum remedia. 431 | Palmae temperamentum 65 | Paronychiarum medela 811 |
| Orobancha temperamentum 52 | Palpebrarum morborum omnigenarum differentiae & curationes 352 | Parotidis affectio & cura 320 |
| Orobi facultas ibidem | Palpebrarum futura quomodo fiat tam sursum quam deorsum. 362. 363 | Paroxysmus quid 211. 222 |
| Orophe Siris, crocodilias 601 | Palpebrae eversio qualis & eius curatio 364 | Paroxysmi quatuor esse tempora. 211. 222 |
| Orthopnoici qui, & unde fiant, ac quomodo curentur 454 | Palpebrarum concretio & contrafectio quomodo sananda 361 | Paro- |
| Oryza actio 52 | Palpebrarum pediculus & pilis quomodo medendum. ibidem | |
| Oscula uasorum aperientia simplicia quae sint 114. | Palpebrae pilorum ordo duplex et multiplex ibidem | |
| Ossium lasitudo quae 191 | Palpebrarum aspritudines unde fiant et quomodo curentur. 352 | |
| Ossium uisum usus quis 102 | | |
| Ostracitis lapidis uires 77 | | |
| Ostracodermorum qualitas 99 | | |
| Ostreorum testarum usus 107 | | |
| Ostrydis uirtus 52 | | |

AETII INDEX.

| | | |
|--|---|---|
| Paroxysmi particularis ac uniuersalis, id est, principij, augmenti, uigoris, et declinationis signa. 211 | Perca piscis qualis 99 | Phoenix collyrium 139 |
| Parthenij proprietates 29. 139 | Perdicium quali ui 29 | Phoenix niger, collyrium 305 |
| Patientes quomodo in enixu se gerere debeant 866 | Perdicum esus quomodo conueniat 117 | Phoenicium, ephemeris 284 |
| Partus instantis indicia 866 | Perdicum quale fel 9 | Phoeniciorum compositiones. 579 |
| Paspalum, medicamentum sic cum 791 | Perfusionis usus et ratio 173 | Phosphorus collyrium 380 |
| Pastilli ex acacijs et ueratri compositio 653 | Peripneumonicorum affectio et remedia 469 | Phrenitis quid, quotque eius differentiae, et quomodo curanda 268 |
| Pastilli flauibilem purgantem compositio 148 | Peristecoris qualitas 53 | Phrygius lapis qualis 76 |
| Pastillorum ad hemerantias et omnes capitis dolores compositio 302 | Periscyphismus quid, et eius ratio 372 | Phu qualis efficaciae 65 |
| Pastillorum scilliticorum praeparatio 713 | Peritonaeon quid 565 | Phuca pisces quales 99 |
| Pastillorum theriacorum praeparatio 714 | Pernionum medicinae 810 | Phycos, ficus 83. 84 |
| Pastillus Cyri archiatri Edeffe ad oxenias 323 | Persea foliorum facultas 54 | Physcia pinus 57 |
| Pastinaca, daucus 19 | Pes cornicis quali uirtute 40 | Phycotiche emplastrum 855 |
| Pastinaca uirtus 60 | Pestis futurae signa 246 | Phycos qualis 65 |
| Pastinaca caro qualis 100 | Pestilentes morbi qui dicantur, et unde generentur, tum quomodo cauere liceat. 245. 246 | Pica pregnantium quid, unde dicta, cur et quando mulieribus accidat 865 |
| Pastinaca marinae uulneris remedia 700 | Petri Archiatri collyrium 393 | Picae quomodo medendae, ibidem |
| Patos quae sordes 58. 91 | Petroselinum quale 54 | Picationis usus et compositio. 175 |
| Paulina antidotus Aristarchi. 468 | Peucedani uires 54 | Picis efficaciae, scilicet, et quomodo ex ea fuligo praeparetur. ibidem |
| Peaonis caro qualis 96 | Phaci, id est, lentes 64 | Picra ex aceto mulso Oribasij. 729 |
| Pectus purgantia 160 | Phacos palustris qualis 65 | Picris qualis et cur sic dicta 58 |
| Pedicularis morbi generatio et curatio 312. 313 | Phagi uirtus 20 | Pili palpebrarum uarij, et cuius si ne renascantur, medicamentum 361. 363 |
| Pediculorum in palpebris origo et curatio 361 | Phalangosis quid, et quomodo curatur 361 | Pilorum agglutinatoria 362 |
| Pediculorum capitis et totius corporis remedia 313 | Pharmacia uehementiora quae. 189 | Pilos quae nigros, aut fuluos, aut albos faciant 308. 309 |
| Pediculos omnis generis circa corporis superficiem deuantia 162 | Pharmaci ex pice Brutia Galeni compositio 288 | Pili ut crispi fiant 309 |
| Pegani uirtus 54 | Pharmaci ex tribus piperis generibus compositio 505 | Pilos quae corrumpant, quae extirpent, et quae attenuent. 310. 311 |
| Pelagiae patritiae sapo 403 | Pharmacum qui biberunt, et non purgantur, quomodo curandi 152 | Pilos corrumpentia, triplicia sunt 310 |
| Pelaria collyria 381. 382 | Pharmacitis terrae uis 75 | Pilorum in palpebris destituij species et curae 366. 367 |
| Pelecinus qualis 31 | Phasclorum facultas 19. 65 | Pilos pulchros et densos quid faciat in pueris 308 |
| Pellium animalium qualis usus. 102 | Phasganij qualitas 51 | Pilularum ex fimo caprarum praestantia 177 |
| Pentameron unguentum 671 | Phasimorum caro qualis. 96. oua qualia 97 | Pilorum ustorum usus 102 |
| Pentaphilli facultas 53 | Phenijs, pharmacum 551 | Pinguedinis animalium usus et differentia 100 |
| Pentatheton emplastrum 855 | Philadelphus pastillus 553 | Pinguedinum qualitates et differentiae 2 |
| Pentorobos, alias paeonia 18 | Philanthropi qualitas 13. 52 | Pinguedo et seu quomodo differant 100 |
| Peplij usus 53 | Phileterij efficaciae 56 | Pinguis sapor qui 2 |
| Peplij uirtus quae sit 138 | Philius praeses quo medicamentum curatus 72 | |
| Peponis facultas 53 | Philotimus quomodo melancholicum se caput non habere putantem curauerit 276 | |
| | Phlomos qualis 65 | |
| | Phlogini linamenti compositio. 374 | |
| | Phoenix palma 65 | |

AETII INDEX,

| | | | | |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------------|------------------------------------|----------|
| Pini corticis usus | 55 | Podagrica unguenta & acopa di | & quomodo curetur | 368 |
| Piperis differētia & efficacia. | 53 | uersa | Prasi efficacia | 56 |
| Piri uires & pirorum | 13 | Podagricæ antidoti. 677. & inde | Prasion qua ui | 56 |
| Pira syluestria, qualitas | 13 | Podagricorū qui lauandi et quo- | Prasoides, qualis | 29 |
| Piscatoria emplastra | 852 | modo | Priapismus quid, et eius cura. 630 | |
| Pisces molles qui, eorūq; usus. | 99 | Podagricorum humorum dimo- | Principis orientis suffumigium | 528 |
| Pisces saxatiles | 98 | tio | Principium morbi quid, & trisa- | |
| Piscium descriptio. 97. usq; 100 | | Podagricorum præseruatiua, diæ | riam dici | 210. 211 |
| Piscium optimi qui | 117. 118 | t. & medicamina | Procidentiariū sedis remedia. 759 | |
| Piscium silforum qualitas. ibidē | | 667. 669 | Procidētis sedis perustio quan- | |
| Piscium pinguedinis usus | 101 | Polemonij uires | do fiat | 760 |
| Pistacie facultas | 55 | Potentæ ordacæ uis | Procyonis ortus | 167 |
| Pituita laborantium cura | 658 | Polij qualitas | Prolapsus oculi qualis | 340 |
| Pituitam per os à capite ducenti- | | Polyarchiorum compositio | Prophete doctoris antidotus. 723 | |
| um descriptio | 303 | 526. 527 | Propolis qualis | 56 |
| Pituitam ducentia quæ sint. | 139 | Polygoni temperamentum. | Proteus collyrium | 304 |
| & inde | 148 | Polypodij facultas | Pruinæ generatio | 166 |
| Pityrides quale | 55 | Polypodites uinum | Pruna Hispanica qualis | 188 |
| Placitis stypteria | 83 | Polypus qualis affectio, eiusq; cau- | Prunorum facultas | 59 |
| Plaga capitis quō curanda | 298 | sa & cura. 321. 322. 323. 324 | Pruritus omnis genus curan- | |
| Plagæ scolopendræ, araneæ, tetra- | | Pomorum fructus qui optimi. 117 | dorum remedia | 739 |
| gnathi & phalangij medica- | | Pompholygis constitutio. 82. 772 | Pseudobuniij facultas | 17 |
| mentum | 691 | Pompholygis exploratio | Pseudodictamni qualitas | 19 |
| Plantaginis qualitas | 14 | Ponderum descriptio | Psychotrophi facultas | 37 |
| Plantarum rimis utilia | 814 | Ponderum notæ | Psidracibus pustulis quæ auxili- | |
| Platani qualitas | 55 | Pondus quomō dijudicetur. | entur | 743 |
| Platyoria quid | 332 | Populi albæ qualitas | Psilothra quæ dicantur, eorumq; | |
| Pleiadum ortus occasusq; | 167 | Populi nigre facultas | compositio | 310 |
| Plenitudinis dimotio unde sum- | | Populi nigre oleum | Psilothrum, ampelos leuce | 11 |
| tur | 133 | Porcinarum carnū qualitas. 188 | Psilothrum ex herinaceo terre | |
| Pleuritis qualis affectio & cura | | Porcini pulmonis uis medica. 101 | stri quomodo fiat | 109 |
| 472. & inde | | Porri efficacia | Psoricum quomodo fiat, & eius | |
| Pleuritis quæ uidetur et tamen nō | | Porri capitati succus quid effici- | condito | 84 |
| est, quomodo dinoscenda & | | at | Psyllij efficacia | 66. 760 |
| curanda | 475 | Porri syluestris facultas | Psymmitium cuius uirtutis | 84 |
| Plintitis stypteria | 83 | Porriginis affectio, origo, & cu- | Pteleæ temperamentum | 56 |
| Plumbaginis qualitas | 82. 771 | ratio | Pterios facultas | 56 |
| Plumbi usus | 82. 772 | Portulacæ uirtus | Pterygium quid, curatioq; eius | |
| Plumbi siccus quomodo fiat. | 654 | Poscarum aluum purgantium cō- | 359. 160 | |
| Plumbum quomodo augeat. | 82 | positio | Pterygiorum medele | 811 |
| Pluuia aqua qualis | 168 | Potamogeton qualis | Ptilosis quid | 331. 366 |
| Pluuiarum generatio | 166 | Potionum iucundariū & commo- | Ptsaue ordacæ uirtus | 41 |
| Pluuia cur aliquando post uentū, | | dari in febr. cōpositio. 261 | Ptolemæi psoricum collyr. | 394 |
| aliquando ante fiat ibidem | | Potus intempestiu- sumptus sitim | Pubes puerorū quomodo dimissi- | |
| Podagra quid, & quo differat ab | | auget | me maneat impubis | 43 |
| arthritide, eiusq; cura. | 645 | Præcoci quid | Pudendorum inflammationes, no- | |
| Podagra cur aliquibus magnus | | Prædicere mortem in acutis mor- | mæ, carbunculi, interna in uri- | |
| morbis aliquibus paruis exi- | | bis non decet | næ meatu ulcera, quomodo sa- | |
| stat, item alijs diu alijs breui | | Prægnantes quomodo se gerere de- | nes | 764 |
| tempore duret | 647 | beant | Pudendorum thymi, rimæ & ul- | |
| Podagricorum accidentium quæ | | Prægnantis utero quæ innascan- | cera quō curanda. | 762. 763 |
| sint rationes | 647 | tur | Pumicis qualitas | 77. 772 |
| Podagrica cerata | 667 | Præputiolum seu ordacolum quid | Puct | |

AETII INDEX.

| | | | | |
|---|--------------------|--|---|------------------------------------|
| Puer febriens ut exudet | 184 | Scriptio & medela. 313. 314 | Renale unguentum | 609 |
| Pueri quomodo in literis & disciplinis exercendi, & qua aetate. | 186 | Pustularum diuersi generis remedia | Renibus & lapide laborantibus corporis constitutione gracili existerent remedia | 606 |
| Puerorum comitialium cura | 284 | Puteana aqua qualis | Renum inflammationis medicinalia | 614 |
| Puerorum uictus ratio iuxta aetatem | 186 | Putrefactio quid | Renum duriciei & suppuracionis medicina | 615. 616 |
| Pulegij uires | 18. 139 | Putrida febris quae | Renis purgancia | 161 |
| Pulices necantia | 702 | Pyrethri temperamentum | Renum calculosorum affectio, & causa & remedia | 602. 603 |
| Pulmonem purgantia | 160 | Pyri qualitas | Renum in animalibus qualitas. | 95 |
| Pulmonis qualitas | 101 | Pyriaton uel pyriephton lac quod | Renum cruentam urinam excrementum debilitas & remedia. | 601. 602 |
| Pulmonis uis medica | 101 | Pyriepton lac | Repellentia quae sint | 299. 321 |
| Pulmonis animalium qualitas. | 96 | Pyrites lapis qualis | Reprimencia emunctas simplicia quae sint | 114 |
| Pulmonis uenarum rupturam unde cognoscantur | 459 | Pyxacanthos qualis | Resinae qualitas | 773 |
| Pulmonis temperatura dinotio. | 201 | Pyxis emplastrum | Resinorum facultates | 56 |
| Puls farinae crassioris | 42 | Qualitatem medicamentorum ordines quatuor | Resinae quomodo urantur. ibid. | ibidem |
| Pulsuum signa | 214 | Quantitatis dimittenda tres differentias esse | Resinae fulgo qualis | ibidem |
| Pulvillorum ad ozenas compositionem | 322 | Quartana, uide Febris | Resolutio seu paralysis quomodo differat ab apoplexia. 291. | eiusque affectio & curatio. ibidem |
| Pulvillorum inspersilium caput densantium compositio | 303 | Quercus qualitas | Respiracionis signum | 209 |
| Pulvillorum pilos attenuantium compositio | 311 | Quid canis et balneo comune, pro uerbum unde ortum | Reuulsionis modus | 209 |
| Pulvis Theodosij, caput rescicans | 304 | Quinquefolij qualitas | Rha cuius temperamenti | 57 |
| Pupille dilatatio quid & curatio ipsius | 357 | Quotidiana febris, uide Febris. | Rhamni temperamentum | 57 |
| Pupille tabes quid, et unde, eiusque chirurgia | 358 | Rabies canum unde causetur. | Rhepomicum quale | 57 |
| Purgandi rationes. 137. & inde | | Rabioforum canum indicia. ibidem | Rhinarium collyrium | 393 |
| Purgantia medicamenta componendi methodus. 142. & inde | | Radicis dulcis usus | Rhinema collyrium | 393 |
| Purgationi inhabiles | 178 | Ramex uaricosus quid, ubi oritur mulieribus, & quomodo curetur. 921. uide etiam Hernia | Rhoa qualis | 58 |
| Purgatoria omnia stomachum infestare, praeter aloem | 138 | Ranarum usus | Rhodabsintati preparatio | 927 |
| Purgatio ob quinque causas nihil proficit in uentre | 152 | Ranæ palustris attractus quid mali inferat | Rhododaphnes proprietates | 51 |
| Purgationis excessus quomodo mendendum | 152. 153. 157. 158 | Ranunculi species quali ui | Rhodomeli preparatio | 927 |
| Purgationi nihil efficienti quomodo succurrendum | 152 | Ranunculi sub lingua remedia. | Rhoeas quid Graecis | 370 |
| Purgationis aut uenae sectionis impatientes quomodo curandi | 654 | Raphani qualitas | Rhocadis uires | 49 |
| Purgationis usus in morbis oculorum | 334 | Raphani uomitorij preparatio. | Rhoidarij preparatio | 87 |
| Purgatiua medicamenta articulis morbis conuenientia. | 676 | Recidiua signa | Rhois facultas | 58 |
| Purpurorum testa ad quid utiles | 108 | Reduntiarum medela | Rhypos qualis sordes | 58 |
| Pustularum ortus & cura | 807 | Regium medicamentum | Ricinus, arboris fructus | 38 |
| Pustularum in febris curatio | 259 | Regium suffumigium | Ricininum oleum | 21. 38 |
| Pustularum capitis diuersarum descriptio & medela. 313. 314 | | Remissio morbi quid, eamque dupliciter | Ridiculum medicamentum | 443 |
| | | Renale emplastrum | Rimarum in pudendis medicinalia | 762. 763 |
| | | | Rimis plantarum quomodo medicinalis | 814 |
| | | | Robur hominis omne debilius reddi in coitus usu | 131 |
| | | | Robur hominis quid | ibidem |

A E T I I I N D E X.

| | | | | |
|---|-------------|--|--|------------------|
| Romule suffumigium | 528 | Salis dodecath ei cōpositio. ibidem | auxilia | 462. 463. & inde |
| Roris generatio | 166 | Salis theriaci quomodo conficiatur | Sanguinem meientium per circuitum, remedia | 602 |
| Rosæ qualitates | 7 | Salisamentorum ex animalib. qualitas | Sanguinis hircini efficacia. | 609 |
| Rosarum facultas | 57 | Salisamentorum ex animalib. qualitas | Sanguinis ex uestica erumpentis auxilia | 623 |
| Rosacci ccrati usus | 22 | Salisamentorum natura | Sanguinem meientium cura. ibidem | |
| Rosacci mellis compositio | 144 | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | Sanguinis abundantis causa egrotantium auxilia. | 650. 652 |
| Rosaceum emplastrum | 855 | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | Sanguinis testudinis marina præparatio & usus | 697 |
| Rosaceum oleum | 22 | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | Sanguinis taurini proprietates. | 712 |
| Rosati flauam bilem ducentis descriptio | 143 | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | Sanguinis erumpentis cura. | 798 |
| Rosatum pituitam & atram bilem trahens | 144 | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | & deinceps | |
| Rosatum xememyron | 925 | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | Sanguisugarum usus qualis. | 137 |
| Rosatorum præparatio. | 527. 528 | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | Sanitatem esse duplicem | 179 |
| Rubeta quid, ac quotuplex, & lesionis ab ea quæ sit cura. | 700 | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | Sapa quid | 22 |
| Rubi qualitas. | 16 | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | Sapa, hepsema, si xem, idem | 4 |
| Rubie tinctorum facultas | 30 | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | Saponis Cōstantini, fluxiones resiccantis compositio | 304 |
| Rubificantiæ quæ sine | 177 | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | Saponis Andreæ comitis ad eadem compositio | ibidem |
| Rubricæ facultas | 72. 73. 772 | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | Sapores obscuri quomodo deprehendendi | 2 |
| Rubrica Sinopica | 73 | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | Saporum alteratio | 4 |
| Rumicis qualitas | 45 | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | Saporum proprietates | 8 |
| Ruptio quid, & quo à sinu differratur, eiusq; medela | 809 | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | Saprotres xylon, id est, caries lignorum | 158 |
| Ruptoria emplastra | 848 | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | Sapphiri energia | 78 |
| Ruptura unde fiat | 249 | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | Sarcites hydrops quid, eiusq; causa & remedia | 586. 587 |
| Rutæ temperamentum | 54. 116 | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | Sarcocolla quid & qualis | 58 |
| Rutæ sylvestris facultas | 50 | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | Sardoniæ herbæ efficacia mirabilis | 708 |
| Rutæ sylvestris noxa | 712 | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | Saturciæ uis | 32 |
| S | | | | |
| Sabinum oleum | 20 | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | Satyriasis quid, cur sic uocata, ipsiusq; curatio. | 630. 730. 731 |
| Sacræ herbæ proprietates | 53 | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | Satyrii facultas | 58 |
| Sagapeni qualitas | 773 | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | Scammonia uirtus, & qualitas | 138 |
| Sagapenum quale & quid | 58 | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | Scandicis conditio | 59 |
| Salamandra quale animalculum, & quæ ab ea homini mala obueniant | 705 | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | Scarificationis quis usus. | 136. 137 |
| Salcas oleum | 27 | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | Scarus piscis qualis | 98 |
| Salca olei compositio | 526 | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | Schirus, lentiscus | 62 |
| Salicis uirtus | 33 | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | Schistos lapis qualis | 74 |
| Salisfomentatio quomodo fiat | 133 | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | Scille uis | 59 |
| Salis generum differentia | 6 | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | Seinci ad quid conducant. | 108 |
| Salis morsus qualis | 165 | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | Seiceni flos qualis | 62 |
| Salis specierum differentia & facultates | 79 | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | Schoenos lea qualis | 60 |
| Salis ulti usus | ibidem | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | Scorodij qualitas | 60. 141 |
| Salis floris qualitas | ibidem | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | Scoriae conditio qualis | 60 |
| Salis spume efficacia | ibidem | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | Scorodon quale sit | Scorpij |
| Salis purgatorij compositio quadruplex | 149 | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | | |
| Salis qualitas | 772 | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | | |
| Sales Iamblichij | 507 | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | | |
| Sales Poletis | ibidem | Salisuræ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ | | |

AETII INDEX.

| | | | |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------|
| Scorpij marini fel quale | 51 | bus & quas ob causas contin- | cultas traditur, pigina 8. & |
| Scorpionis marini plage medela. | | git. 632. eiusq; cura. 633 | deinceps, & pagina 110. ac |
| 700 | | Semperuiui facultas | 9 |
| Scorpionis plage opem ferentia. | | Senecionis uirtus | 31 |
| 693 | | Senecta ex morbo quæ dicatur. | |
| Scorpium sputo iciumi hominis oc- | | 244 | |
| cisum | 92.f. | Senecta naturalis quid | 187 |
| Scribentes turpia, peiores quam | | Senum uictus ratio | 187 |
| qui perpetrarint | 84 | Senum comitialium cura | 284 |
| Scroti scabiosi & pruriginosi, tum | | Sepiæ usus medicamentarius | 108 |
| inflammati medela. 764. 765 | | Seps quale animalculum, et quam | |
| Scutulare collyrium | 381. 382 | nocuus eius ictus, tum quæ cu | |
| Scybelites unum quod | 507 | ra | 697 |
| Scylacium collyrium | 391 | Septica quæ Græcis dicantur | 36 |
| Scytala Chalcidica qualis | 699 | Serum lactis quale, & quomodo | |
| Secantia alimenta | 122 | preparandum | 88 |
| Secundæ cur sic uocata, & hæ in | | Serum lactis quomodo uentre sub | |
| utero detenta quomodo eij- | | ducat | 123 |
| ciantur | 874 | Serpilli proprietates | 30 |
| Secundarum generatio | 862 | Sesami conditio qualis | 52 |
| Securidacæ qualitas | 31 | Sesaminum oleum | 22 |
| Sectio arteriarum, uide Arteriari | | Seseli quale | 59 |
| Sectio uenæ, uide Venæ | | Scrapias qualis | 52 |
| Sedis affectionum causæ | 751 | Seris qualis | 58 |
| Sedis inflammationum medela. 752 | | Seridis nomine quæ herbæ ueniant | |
| Sedis fissuris & tuberculis quæ re- | | 118 | |
| media conueniant | 753 | Seueri album collyrium | 382 |
| Sedis omnium malis auxiliatiua. | | Seuū quomodo differat à pingue- | |
| ibidem 754. 755. usq; 761 | | dine | 100 |
| Sedem infantium procidentem quo | | Seui ex animalibus usus | 100 |
| modo cures | 185 | Siccantia alimenta | 125 |
| Sedis infusionum ratio et differen- | | Siccantia citra mordacitatē, item | |
| tia | 163 | simpliciter et secundum qua- | |
| Sedis thymis, uerrucis fornicarijs, | | tuor ordines quæ sint. 112. 113 | |
| clauis, ficibus, hæmorrhoidi- | | Sicci medicamenti ad scabros ocu- | |
| bis, procidentijs, abscessibus, | | lorum angulos cōpositio. 365 | |
| ulceribus proserpentibus & | | Sicci temperamenti notæ | 198 |
| depascentibus & fistulis quæ | | Siccitas corpora animalium citò | |
| medicæ sint adhibendæ. 755 | | ad senectam producit | 205 |
| usq; 761 | | Sicya quali potentia | 59 |
| Selachia quæ græcis dicantur. 100 | | Sicyos agrios qualis | 59 |
| Selini temperamentum | 58 | Sicyonium oleum | 25 |
| Selinus terre uirtus | 73 | Sideritis Heraclea | 11 |
| Semen prouocantia simplicia. 116 | | Sideritis qualis | 59 |
| Semen quæ inhibeant ibidem. | | Sigilli lemmij usus | 72 |
| Semen qua etate appareat, & qua | | Sigillum Coracium | 792 |
| ad generationē aptū fiat. 864 | | Signa bona & mala quæ sint. 209 | |
| Seminis fluxus quid, mulieribus et | | Silique lobi | 19 |
| uiris æquæ communis, ac quo- | | Siliquæ facultas | 37 |
| modo medearis | 902 | Silphij proprietates. 59 | (100) |
| Seminis profluuium quid, & eius | | Silurorum muria quibus conferat | |
| remedia | 631 | Similaginis qualitas | 117. 118 |
| Seminis profluuium in somno qui | | Simplicium medicamentorum fa- | |
| | | | 548 |
| | | | LL 4 |
| | | | Sordes |

A E T I I I N D E X.

| | | | | | |
|--|-----------------|--|----------------|--|-------------|
| Sordis balnearum usus | 18 | Stella samina, terræ samie species | 73 | Strumarum inter se differentie. | 820 |
| Sordis in ouium lanis immutritæ usus | 93 | Stellarum ortus et significatio. | 167 | Struthij facultas | 60 |
| Sordium qualitas | 58 | Stercoris diuersorum animalium qualitas | 52.93 | Struthocamelorum caro qualis. | 97 |
| Sori qualis facultatis. | 81.82.771 | Stercus exigentia. | 10.143.150.162 | Struthocamelorum oua qualis alimentum | 97 |
| Soporis grauis curatio | 254 | Sterilitatem foeminae quæ inducatur | 867 | Strychni facultas | 65 |
| Sparti qualitas | 60 | Sterilitatis et in uiro et muliere cause et remedia | 875 | Stupescientia medicamenta. | 657. |
| Spathiuos et eius morsus qualis quomodoque curetur | 699 | Sternutationem quæ moueatur. | 328 | Post horum usum qualibus augmentis sit utendum. | ibidem |
| Sphacelus quid, quæque eius medicamina | 801 | Sternutationis usus et ratio. | 327 | Stryax qui melior | 110 |
| Sphæron emplastrum | 855 | Sternutationes redundantes quomodo sedande | 328 | Styracis efficacia | 61.142 |
| Spinifer quid | 513.539 | Stertentibus pueris quomodo auxiliandum | 182 | Styracium oleum | 25 |
| Sphragidis lenitie facultas | 72 | Stibij facultas | 83 | Stryperia, alumen | 83 |
| Spiceæ ortus | 167 | Stibium ornandis palpebris. | 375. | Subsidentia urinae alba non semper bona | 215 |
| Spiceæ nardi facultas | 51 | Stibium | 376 | Subsidentiarum urinae signa | 217 |
| Spicati olei compositio | 926 | Stibium Alexandri regis | 370 | Substantiam simplicem et incommixtam inuenire impossibile. | 70 |
| Spinae albe uires | 10 | Stibia alia | 370.371 | Subtercus hydrops quomodo curetur. | 595.596.597 |
| Spinae Aegyptiae qualitas | 10 | Stillicidium urinae quid, et eius remedium | 617 | Succi boni aut mali qui | 119.120 |
| Spinae deuoratae ac tonsillis infusa quod excerni possint. | 443 | Stoechalidis temperamentum. | 60.301 | Succini uirtus | 78 |
| Splanchnon, qualis | 17 | Stomachus, id est, gula | 254 | Succus Cyrenaeus qualis | 52 |
| Splenis affectionum cognitio. | 569 | Stomachi adstrictionis remedia | 473 | Succus Medicus | 52 |
| Splenis intemperierum remedia | 571 | Stomachi imbecillitas, supinitas et subuersio quomodo curetur. | 486 | Succus siriacus | ibidem |
| Splenis inflationis. | 572 | Stomachi exusti remedia | 483 | Sudor, et ex eo pharmacum | 91 |
| Splenis indurati. | 573 | Stomachi dissoluti, item inflammationis remedia | 495 | Sudores excludentia | 163 |
| Splenecorum usio et dieta, tum iuxta affectionis uarietatem curationes | 580.581.582 | Stomachi exulcerati medicamentum | 497 | Sudores quomodo sedentur | 157 |
| Spodiaca collyria unde dicantur, et quæ sit | 385.388. | Stomachi si qui conuellantur, committalis modo, cura. | 498 | Sudorum significationes | 220 |
| Spodiaceum coll. | Demosthenis.388 | Stomacho atrabile grauato remedia | 480 | Suffusiones ad tussim | 453 |
| Spongiae uirtus medica | 83.172 | Stomacho commodantia aut incommo- | 121.122 | Suffusio oculorum quid, et eius indicia ac species tum cura. | 357 |
| Spongiarum lapillorum facultas | 77 | Stomachici qui dicantur | 559 | Suffragatio quid | 339 |
| Splenem euacuante | 161 | Stomaticarum illitionum confessiones | 432.433 | Suffragationum sub oculis curationes | 400 |
| Spumæ argenti qualitas | 771 | Stomomatis ferri facultas | 81 | Suffragatorum medela | 809 |
| Sputi hominis uis | 91.f. | Strangulati quod reuocentur. | 442 | Sulla pinguedo qualis | 100 |
| Sputorum signa | 221 (771.) | Strangulorum auxilia | 712 | Suille carnis praestantia | 54 |
| Squamæ aris uirtus | 81.142. | Stranguria quid et quomodo curanda | 617 | Suillum fel quale | 85 |
| Squamæ ferri usus ibidem | 108 | Stratiotæ collyrium | 595 | Suillum lac quale | 85 |
| Squatinae marinae usus | 81 | Strobili uirtus | 44 | Suillus talus ad quid conducatur. | 102 |
| Squamae stomomatis ferri | 60 | Strumæ quid, eorum ortus et medicamina | 820.821 | Suis pinguedo qualis | 2 |
| Stactæ quid et qualis | 110 | | | Sulphuris conductio | 80.772 |
| Stactæ myrrha quæ bona | 168 | | | | Sulphur- |
| Staphis quæ et Astaphis | 61 | | | | |
| Staphyles usus | 346.347 | | | | |
| Staphylomata quid, eorumque differentie et curatio | 19 | | | | |
| Staphylinus, daucus | 60 | | | | |
| Staphylinus quali ui | 824 | | | | |
| Steatoma quid, eiusque cura | 368 | | | | |
| Steatomatum remedia | | | | | |

AETII INDEX.

| | | | | | |
|---|----------|--|-------------|---|---------|
| Sulphurentia balnea quibus conueniant | 171 | Temperamentorum corporis humane dinotio. 198. & deinceps | 371 | Testamentum aurifabri collyrium | 397 |
| Supercilij resolutionis cura | 293 | Temperamentorum omnium correctio et medela. 204. 205. 206 | 276 | Testamentum collyrium ibidem | |
| Supercilij denudatis quomodo pilos inducas | 308 | Temperaturæ alterationis ratio diuersa | 371 | Testes animalium qualis temperamenti, quique esu optimi. 55. 57 | |
| Supercilij ornandis remedia. 400 | | Tempora inuere an liceat | 371 | Testium temperamenti indicia. 204 | |
| Superfluitatibus quæ redundant, & quæ careant | 119 | Temporū quatuor anni, singulorum tres esse differentias | 168 | Testiculus canis qualis | 52 |
| Suppuratoria simplicia quæ | 113 | Temporum musculis quæ cataplasmata, agglutinatoria illitio- nes conueniant | 373 | Testiculorum castoris usus | 106 |
| Suppuratorum affectio & dinotio, curaque | 466 | Tendinum induratoriū medela. 819 | 543 | Testiculorum canis fluuiatilis usus ibidem | |
| Surditatis curatio | 316. 317 | Tenesmus quid & eius cura | 543 | Testudinis fel quæ | 91 |
| Susinum oleum | 23 | Tenuiū partium simplicia quæ | 113 | Tetania conuulsio quos non inuadat | 298 |
| Sycæ, qualis constitutionis | 61 | Tephra, id est, cinis | 63 | Tetanus quid 295. unde proueniat & quomodo curetur, ibidem, & 296 | |
| Sycosis qualis affectio, eiusque cura | 84. 352 | Tephrica collyria unde dicta & qualia sint | 385. 387 | Tetragnathus quid, eiusque ictus medela | 691 |
| Sycamina qualia | 50 | Tephron collyrium | 388 | Tetrastachyum basilicum | 854 |
| Sycomoræ qualia | 50. 62 | Terebinthi efficacia | 62 | Tetrastachyum medicamen | 101 |
| Syderon quid & qualis affectio, eiusque cura | 290. 291 | Terminthus quid, quomodoque mendendus | 807 | Tetrastachyi compositio | 679 |
| Syderationis præseruatina | 286 | Terra quid, eiusque qualitas | 70 | Tetulon quale | 62 |
| Syderon quomodo differat à resolutione, eiusque affectio & cura | 291 | Terra differentie quæ sint | 70 | Thalassorum Hermophili, collyrium | 394 |
| Syderum ortus et significatio. 167 | | Terra quomodo lauanda | 71 | Thapsia facultas | 31. 773 |
| Syluestria satius fortiora | 41 | Terra agrorum quis usus in medicamentis | ibidem | Thetion sulphur | 80 |
| Syluestrium animalium caro qualis | 96 | Terra lemmia seu sigillata | 72 | Theodoretos antidotus triplex. 718. 720 | |
| Symphitum petraeum | 62 | Terra samia | 73 | Theodotium magnum | 397 |
| Synerotis collyrium | 389 | Terra selinusia & chia | ibidem | Theodotium Seueri | ibidem |
| Syncope quid | 274 | Terra cimolia | 73 | Theodotium nardinum coll. | 396 |
| Syncope et lipothymia quo differant | 250 | Terra Ampelitis siue Pharmacitis | ibidem | Theodotium Placianum | 397 |
| Synoptici sudores | ibidem | Terra Cretica seu Creta | 73 | Theophilum collyrium | 391 |
| Synochos febris quæ | 226 | Terra uske uis | ibidem & 74 | Theribinthina resina | 57 |
| Syriaci lapidis uis | 75 | Terra exhalationum seu uaporum ratio | 166 | Theriacæ confectio, usus & probatio. 715. 716. 717 | |
| Syricum, Cerussa | 84 | Terra quæ in emplastra commiscetur | 772 | Theriacæ exhibitionis modus quis | 717 |
| Syricum collyrium | 388. | Terra intestina ad quæ conferantur | 103 | Theriacæ ex uiperis Andromachi compositio | 713 |
| T | | Tertiana, uide Febris | 77 | Theriacæ Oribasij, qua Marcus Imp. est usus, compositio | 726 |
| T Abes siue tabida febris quæ dicitur | 244 | Testarum chibani usus | 77 | Theriacæ eiusdem alia | 727 |
| Tamarix | 50 | Testa intertorum naturam esse ex contrarijs facultatibus compositam | 123 | Thermus satius | 31. |
| Tauri adeps qualis | 2 | Testæ ouorum ad quid cōducant | 97 | Thermus syluestris | 32 |
| Taurinæ carnis qualitas | 94 | Testa intertorum piscium qualitas. | 99 | Thlapi quali uirtute | 32 |
| Taurinæ medullæ qualitas | 101 | | | Thryallis, uerbasci species | 65 |
| Taurinum fel quale | 91 | | | Thridacis qualitas | 32 |
| Taurinus adeps medullæque qualis. | 101 | | | Thronus Marcellius pastillus. 554 | |
| Taxi efficacia quæ | 908 | | | Thuris ficulitas | 46. 773 |
| Tecolubos qualis | 75 | | | Thuris dijudicatio | 110 |
| Telamonium emplastrum | 856 | | | Thuris cortex qui melior. ibidem | |
| Telis, id est, fenum graecum | 63 | | | Thyites lapis qualis | 75 |
| Telinum oleum | 24 | | | Thylacitidis facultas | 49 |
| Tellinorum usus medicus | 108 | | | LL 5 Thymus | |

AETII INDEX.

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Thymus niger, elictorus | 32 | Tumorum pultacci ac mellei hu- | Vena sectionis iteratio quomodo |
| Thymi proprietates | 32. 141 | moris curatio | fiat & quando |
| Thymi pudendorum quomodo san- | 762 | Tumorum adiposorum medela | 135. 136 |
| Thymi sedis quid, unde dicti, & | 755 | Tumorum canceratorum medi- | Venarum pulmonis ruptura un- |
| quae eorum cura | 755 | camina | de cognoscantur |
| Titanus, id est, calx | 63. 83 | Tumorum durorum, item crudo- | 459 |
| Tithymalli uirtus | 140 | rum & inconcoctilium medi- | Venarum apertio & corrosio un- |
| Tithymallorum efficacia | 63 | camenta | de proueniat |
| Titianus pessus | 912 | Tumorum laxorum medela. | 459 |
| Toforum in artubus quae sit causa | 647 | Tumorum durorum, item crudo- | Venas eleuatas & incuruas ex |
| podagricis | 675 | rum & inconcoctilium medi- | membris fluxione inflatis au- |
| Toforum in artubus cura | 675 | camenta | ferendas |
| Tonētorū substitutorū ratio. | 165 | Tumorum laxorum medela. | 652 |
| Tōsillarum inflammationum re- | 434 | Turdi pisces quales | Venenata animalia quibus artib. |
| media | 434 | Turturis sanguinis usus | tollas. 687. eorū morib. quo- |
| Tonfillarum ulcera qualia, quo- | 435 | Turturis marini plagae auxilia. | modo medearis |
| modo fiant & curentur. | 435 | 700 | ibidem |
| Tonsillis infixas stinas quomodo | 443 | Turturum esus qualis fiet | Venenata animalia quae fugēt & |
| educas | 443 | Tusis causae & remedia. | quae occidant |
| Tonforis emplastrum | 590 | & inde | 688 |
| Torminum intestinorum ortus et | 541. & 544. 549. & inde | Tympanites hydrops quid, cuiusq; | Venenatorum animalium quae leta |
| cura. | 541. & 544. 549. & inde | causae & remedia | liter corrumpant |
| usq; | 557 | 586. 587 | 702 |
| Torpedinis qualis caro | 100 | Tyrhenicum emplastrum. | Venenosum pharmacum ne ledat |
| Torpedinis usus | 107 | 845 | praeseruatua |
| Torpor. uide Lethargus. | | V | 702 |
| Toxicum unde dictum, & quae | 710 | Vaporum ratio | Venum qui sumpserint quomo- |
| eius uis | 710 | Vaporum terrae ratio | do cognoscendi |
| Tragacanthae dignotio | 110 | Vaporariorum fementorum usus et | 703 |
| Tragacanthus, qualis | 64 | modus | Veneni omnis curationes com- |
| Tragorigani facultas | 52. 139 | Vari circa quam oculi partem o- | nes |
| Transcuntia tarde quae sint | 123 | riantur | ibidem |
| Tremorum in febrib. curatio. | 260 | Varos faciei tollentia | Venenatorum plagis omnib. com- |
| Tribuli efficacia | 64 | 405 | munia remedia |
| Trichiastis quid | 331 | Varices quid, & quomodo curen- | 689 |
| Trichiastis quid & quomodo cu- | 351 | tur | Venter quinq; de causis purgato- |
| randa | 351 | Varices palpebrarum | rio accepto nihil excremit |
| Trifolij facultas | 47. 64 | 368 | 152 |
| Trifolium pro satyrio | 58 | Vasculi mensuratio | Ventris suppressionū, plurimorū |
| Trigla piscis qualis | 98 | 930 | malorum esse causam, quaeq; ca- |
| Triphyllon, trifolium | 64 | Vasorum dilatatio ubi, et quomō | sint, & eorum cura. |
| Triuici facultas | 56 | fiat, & quomō curanda. | 163 |
| Triticæ farinae usus in catapla- | 175 | 825 | Ventrem subducentia |
| smatis | 175 | Vasorum oscula quae simplicia a- | 213 |
| Trixago qualis naturae | 65 | periant | Ventrem suppressoria. |
| Trychny facultas | 64 | 114 | 124 |
| Tubera qualia sint | 64 | Vasorum sectionis usus | Ventris temperaturae dimotio |
| Tumores pedum grauidarū quo- | 866 | Venam in anno saepe incidere, in- | 201. 202 |
| modo curandi | 866 | commodum & cur | Veni cur aliquando post, aliquā |
| Tumores faciei ficosos quomodo | 408 | 334 | do ante pluuia ueniant. |
| cures | 408 | Vena sectionis aut purgationis | 166 |
| Tumoris gutturis medela | 822 | & impatientes quō curandi. | Veni apogei qui |
| | | 654 | ibidem |
| | | Vena sectionis usus in febrib. | Ventorū iuxta situs qualitas. |
| | | 227 | 167 |
| | | Vena sectioni quod corpus a- | Ventorum generatio, numerus et |
| | | ptum | nomina |
| | | ibidem | 166 |
| | | Vena sectioni quae obstitit. ibidē | Ventus & imber quomodo simul |
| | | 334 | fiant |
| | | Vena sectio quibus conueniat, & | Venus, emplastrum |
| | | cur fiat, quaeq; in ea sint con- | 843. 844 |
| | | sideranda. | Venerem emortua quomodo ex- |
| | | 133. 134 | cites |
| | | Vena quales secanda, & quo mo- | Veneri quae naturae ac diatae com- |
| | | do | modiores. item quod tempus |
| | | 134. 135 | 132 |
| | | Vena sectionis quae magnitudo, | Veneris herba uires |
| | | figura, & quod tēpus sint. | 204 |
| | | 135 | Veneris signa |
| | | | Vetrari |

A E T I I I N D E X.

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|
| Veratri qualitas | 29 | Vinaceorum facultas | 18 | Vlceribus cicatricem inducentia. | |
| Veratri nigri uirtus | 139 | Vini uis | 51 | 733.784.785 | |
| Veratru quomodo et quando qui- | | Vinorum qualitas iuxta colorem. | | Vlcera que citra mordacitatē ex- | |
| busq; dandum, & quibus non, | | 124.125 | | siccant | 786 |
| quidq; facere possit, ac quæ pro- | | Vinum cur acefcat | 4 | Vlceribus medicamentorum adhi- | |
| bati sint notæ | 154 | Vina quomodo assant | 117.118 | bendorum ratio | ibidem |
| Veratri purgandi ratio, eiusq; ex- | | Vina qualia senibus cōueniāt. | 182 | Vlcerum ligamenti ratio. | 786.787 |
| hibendi differentia | 155.156 | Vini bilem & pituitam purgantis | | Vlceribus malignis qualia empla- | |
| Veratri cremor, decoctum, ramentum | | preparatio | 142 | stra conueniant | 787 |
| et cat. qualia | 155 | Vinum quod melancholicis auxi- | | Vlcerum post cicatricē obductam | |
| Veratro purgandis quæ sit dia- | | lietur quō componatur. ibidem | | rursus ruptorum cura | 789 |
| ta prescribenda | ibidem | Vini potus usus in morbis oculorū | | Vlcerum uermes ac nomas ac pu- | |
| Verbsci species & facultas | 65 | 333.334 | | treddines quomodo sanes | 789 |
| Verbenica usus | 53 | Vinum polypodites | 143 | Vlcrose lassitudinis causa et cura | |
| Verberu uibices seu notæ quomo- | | Vinu multum stercus exigēs. ibid. | | Vlmi qualitas. | 56 (192) |
| do curandæ | 407 | Vinum multum flauum, itē quod | | Vlrophoni efficacia | 710 |
| Vermes; ulcerum quid curet | 34 | atram bilem, item quod pitui- | | Vmbilici puerorum procidentia | |
| Verruca, & uerruca formicaria | | tam expurget | ibidem | causa & cura | 185 |
| quid & unde uocata | 755 | Vinum scybelites quod | 507 | Vmbilici ueneris uirtus | 40 |
| Verrucarum, tum uerrucarum for- | | Vindemiatoris ortus | 167 | Vnguenta odorata quibus conmo- | |
| micariarum remedia | 756 | Viola qualitas | 33 | dent, eorumq; ratio | 28 |
| Vertigo unde oriatur, & quomo- | | Viola albæ energia | 142 | Vngueta recalcfactoria post stupe- | |
| do curanda | 272 | Violatum oleum | 24 | factiuorum medicamentorū u- | |
| Vesica bilis susceptrix | 90 | Viperæ usus & qualitas | 104 | sum adhibenda qualia | 657 |
| Vesicæ collum ubi situm | 294 | Viperarum adeps qualis | 101 | Vngueta purgatorij cōpositio. | 158 |
| Vesicæ doloris in febrib. curatio. | | Viperarū capitū usus medicus. | 101 | Vnguentorū siacorū moschatorum | |
| 257 | | Viperarū esus et preparatio in ele- | | ac uariorū preparatio | 925 |
| Vesicæ calculorū remedia | 606 | phantiasi | 733 | Vnguentorum quæ cocturam susti- | |
| Vesicæ calculis et citam renum si- | | Viridis iaspidis usus | 498 | neant, & quæ non | 772 |
| mul | 607.610.611 | Viscerum animalium qualitas. | 95 | Vnguis oculi quid, ipsiusq; cura. | |
| Vesicæ calculos atterentia medica- | | Visci uis & constitutio | 32 | 359.160 | |
| menta | 607 | Viscum optimum quod | 109 | Vnguium abscissionum medela. | 812 |
| Vesicæ inflammatio, qualis affectio | | Vitex siue Agnos | 8 | Vnguū contusorū, suberuentorū, | |
| & cura | 611.612 | Vitis albæ uires | 11 | motorū, scabrorū ac leproforū | |
| Vesicæ sanguinis fluoris auxilia. | | Vitis nigre facultas | ibidem. f. | Vnguibus reparan- | (cura. 812) |
| 623 | | Vitiliginum origo, & curatio. | | dis quid conueniat | 813 |
| Vesicæ tubercula quomodo ad ma- | | 745.746 | | Vnguū ex animalib. quis usus | 102 |
| turitatē producenda | 624 | Vitulinarum carnis qualitas | 94 | Vocalis instrumenti resolutio quo- | |
| Vesicæ ulcerū curatio. ibid. & in. | | Vitulinum seuum quale | 101 | modo curetur | 293 |
| Vesica laborantium dieta | 628 | Vitri uis medica | 77 | Vociferatio quid, eiusq; usus | 129 |
| Vesicæ fluxionis auxilia | 630 | Vitri leuissimē triti usus | 369 | Vocis suppressæ et asperæ, aut rau- | |
| Vesicæ resolute curatio | 294 | Vlcerationis circa os sacrum, item | | cæ & cat. 445. & inde | |
| Vesicæ scabiose medicamēta. | 619 | circa scrotum & anum, in fe- | | Volucrorū animalū caro qualis | 96 |
| Vesicæ paralyti dissolutæ auxilia. | | bribus curatio | 258 | Volucrum animalium partes quo- | |
| 620 | | Vlcerum sedis proserpentū et de- | | modo differant | 96 |
| Vesicam quæ purgent | 161 | passentium medicina | 761 | Volulus quid, eiusq; generatio et | |
| Vespas & apes fugantia | 690 | Vlcerum, & caurum ulcerū cu- | | remedia | 512 |
| Vibicum a uerbere illatarum re- | | randorum ratio | 780.781 | Vomentes ægrē quō iuuandi | 204 |
| media | 407 | Vlcerum suppurandorum, repur- | | Vomitus ratio & usus insignis, | |
| Vicius ratio cuiq; ætati | 186.187 | gandorum ac incarnandorum | | item quibus conueniat et qui- | |
| Vigiliarum in febribus remedia. | | medicamenta | 781 | bus non | 153 |
| 253 | | Vlcerum carne excrecentium re- | | Vomitum quæ iuuent, quæq; se- | |
| Vigoris totius morbi cognitio. | 211 | media | 782 | dent | 153.154.157 |
| | | | | Vomi- | |

AETII INDEX.

| | | |
|---|--|---|
| Vomitoria qualia debeant esse. 153 | Vitro pregnantis quæ & quo ordine innascantur 862 | suræ quomodo curentur. 923 |
| Vomitum prænotio & significatio 219 | Vteri frigidioris signa & medicinæ 876 | Vitrum euacuantiæ 162 |
| Vomitus cataplasmata & epithemata 491 | Vteri calidioris indicia & curatio 877 | Vuæ temperamentum 61 |
| Vranium collyrium 388 | Vteri humidioris ac siccioris medelæ 877. 878 | Vuæ immaturæ succus quo differat ab aceto 4 |
| Vrenia medicamina 796 | Vteri strangulationis remedia 897. & inde usq; 901 | Vuæ passæ qualitas 14 |
| Vrinarum qualitas 91 | Vteri suffocationis auxilia. 901 | Vuum reponendarum ratio. 61 |
| Vrina an bibenda 91 | Vteri debilitatis sanatio 902 | Vulcania quid. 373 |
| Vrina notæ 128. 129 | Vteri scaror, resolutio & prolapsus quomodo medeantur. 903 | Vulnere cruentorum remedia 774 |
| Vrinæ proliciendæ qualis glans præparetur 162 | Vteri reclinacionis, auersionis, & recursus medicamentâ. 905 | Vulnibus cruentis glutinandis accommoda emplastra 826 |
| Vrinâ cientiæ remedia. 592. 607 | Vteri inflatio & hydrops quomodo curentur 906. 907 | Vulpes quem usum in medicamentis præstent 102 |
| Vrinarum signa. 214. 216. et inde | Vteri tumoris laxi & inflammationis pharmaca 909 | Vulpini pulmonis vis medica. 101 |
| Vrina naturalis et optima quæ tã in sanis quàm ægris 215 | Vteri in tumorem indurati medicamina 912 | Vulpinus adeps qualis 158 |
| Vrinæ subsidentia alba non semper bona ibidem | Vteri abscessuum vriorum medelæ 914. 915 | Vulso quomodo fiat & curetur 809 |
| Vrinæ subsidentiarum signa 217 | Vteri exulceratio, ulcera carbunculosa & sordida, quomodo curentur 916 | X |
| Vrinarum oleosarum differentiæ & significationes ibidem | Vteri humor profluus & nome quomodo medenda 917 | X Anthij qualitas 58 |
| Vrinæ difficultas quid, & eius remedia 617 | Vteri cancri obturationisq; medelæ 918 | Xeromyron ad capitis fluxionem 804 |
| Vrinæ difficultas in febribus auxilia 618 | Vterus non perforatus tripliciter contingit, & quomodo curetur 919 | Xiphion quale 58 |
| Vrinæ suppressio quid. 618. eius medicinæ 618. 620 | Vteri hæmorrhoidum & calculorum medicinæ 920 | Xylocolla dignotio 109 |
| Vrinam in somno emittentium auxilia 621 | Vteri thymorum, uerrucarum, & uerrucarum fornicariorum medelæ 922 | Xyster collyrium 891. 892 |
| Vrinæ mucosæ, capillis aut lanis similis, medicamenta 630 | Vteri cõdylomata, rugæq; ac sif- | Z |
| Vrsinum fel quale 90 | | Z Arinaca, bolus Armenicus 74 |
| Vrsinum seuum quale 101 | | Zarnacha idem ibidem |
| Vrtice vires 9 | | Zea quid 30 |
| Vsta quomodo mutant qualitatem suam 71 | | Zigir, species Cassiæ 109 |
| Vstoria simplicia quæ 115 | | Zingiberis uirtus 80 |
| Vteri animalium qualitas 96 | | Zygis serpylli species 30 |
| Vteri situs, magnitudo & forma 861 | | Zyma, id est, fermentum, quale 30 |
| | | Zythi qualitas 30 |
| | | Zoili nardinum collyrium 393 |
| | | Zoili Nicarium, coll. 396 |

FINIS INDICIS,

Mendas ob uitiosam exemplaris descriptionem, et operarum incuriam admissas, castigaturus obseruet, duorum numerorum priore paginam, posteriore ipsius uersum denotari: sin unicus tantum fuerit numerus, eiusdem prænotate pagine signatum uersum indicare. Ceterum si qua alia occurrerint errata non annotata hic, leuis momenti, et notatu indigna fuisse existima. Vale bene.

Pagina 5. uersu 41. diutius coctū. 11. 6. Sideritum heracleā. 12. 3. uiscosiorū. 15. 5. aluum. 21. androsomon. 19. 16. calidus. 35. acrius. 46. Amplius autem. 20. 8. Lopima. 21. 10. illitu. 24. 22. inodoratū. 28. 34. Utile pro Vnde. 29. 20. autem. ibidem. 22. Et 23. Perdicū. 31. 29. Lacer. 33. 11. herniā. 35. 2. Et aceto mulso. 39. Pontica pro Punicā. 38. 29. assumere. 40. 13. citra. 20. salutarem. 42. 3. in ipso. 44. 9. calculosis. 20. impositū. 45. 31. Leontopodiū. 47. 20. Lyciā. 42. coeliacis. 52. 22. Lacer. 26. oxychoenos. 53. 8. consp. 54. 27. secandi. 56. 11. crassiorum. 14. habet. 57. 34. Rhamnus. 62. 34. oxychoenos. 27. 26. misyos. 76. 27. Caua. 78. 6. succinum. 81. 4. pharmacū euadit. 40. suassu. 82. 2. plurimū. 84. 38. perperant. 87. 42. ueru. 88. 35. infestat, et in. 91. 13. ipsum oportet. 93. 3. sed et ali. 44. 11. adseruato. 36. peioris succi. 45. crassissimi. 96. 37. peiores. 97. 47. nam et hi. 98. 43. si quis uentrē. 104. 2. uirū. 104. 25. uniuersa. 106. 42. inflammationes induratas. 107. 5. iusculi. 9. subma cosos. 109. 22. elige. 23. coloris. 36. xylocollā. 110. 19. mollior. 113. ult. affuse. 114. 22. sucus. 121. 4. pastinaca. 31. sepiē. 121. 4. Aqua mulsa. 15. austerū. 48. charilagmei. 130. 36. gestatio. 131. 29. uisi sunt. 132. 28. ac cupiditates 136. 41. hic incidūt. 137. 7. accipiātur. 8. fuligine. 46. loco ponēda sunt. 138. 23. potius. 139. 17. habēt. 140. 2. mu cosa. 37. anū. 40. manuū. 141. ult. que. 142. 14. quinq. 146. 37. Oxyporia. 147. 36. mastiches. 41. ad arida. 148. 33. agarici. 150. 5. exacerbationū. 41. opoponacis. 151. 30. ex epistola ad Marsum. 153. 13. bibendā. 155. 11. Assue faciant. 156. 34. sternutatorio. 157. 1. Aliquando. 16. cera. 159. 46. angustas. 160. 23. quū. 161. 1. rotundos. 33. anā si. 47. feculentus. 162. 20. cyclaminū. 25. Vitādus. 165. 36. uenenosam. 166. 24. XII. 170. 17. mollire. 35. alumē. 36. duritie. 171. 36. tam. Deinde. 172. 17. faciei. 173. 3. illinēdi. 174. quicuerit per repulsoria et cat. partibus. 22. amplectens. 175. 23. si. 176. 1. Gallas. 5. galbani. 9. sexuncē. 180. 35. umbilicus. 40. depurgare. 48. pro more. 182. 41. affidue. 183. 13. uero. 39. Musc. 195. 19. usu. 34. Acaciam. 187. 7. senectā. 36. enim uiuo urinā ciente opus habent, eo quod. 189. 15. quod calid. 31. sceatur. 195. 4. inungito. 37. colore albidiorē. 197. 34. eodem modo tract. 199. Capilli. 203. 2. Et sanē. 203. 36. corporis. 207. col. 2. 38. qui ob crud. 212. pertransit. 213. 28. indicatiua. 25. indicat. 214. 41. sang. 48. quicquid est pr. 221. 47. alternis. 223. 3. signū diariarū febr. 35. gentis. 225. pyrorū aut maloriū. 218. 36. stomachus sine gula. 230. 12. qui in hac. 231. 4. elotorū. 10. intestina. 34. alternis. 232. 36. ciēte. 40. lubricitatē. 233. 18. uita. 235. cis. 236. 38. uacuū. 237. 32. humores. 238. 5. experietur. 43. autē. 239. 34. Cyprini. 240. 6. ammixtū. 241. 10. biliosis. 41. Quū. 242. adhibētur. 243. 31. ardētes. 245. 31. inquinato. 247. 12. taliū. 248. 22. si uero ubi iam. 249. 27. guū. 38. ipsam. 41. colicis. 250. 17. sic. 31. uiride. 48. et os uētris. 251. 15. manuū. 37. sensū. 252. 17. uersati. 23. inflammationū. 46. ueteri. 253. 1. euacuationē. 19. aurē. 20. inuitatur. 35. infestauerint 256. 42. signū. 257. 32. aceti. 259. 43. amiscatur. 260. 7. originē. 23. pessimē. 47. alternis. 262. 42. mel rosa. 264. 34. pyrorū. 265. 4. de spumati. 267. penul. suturē. 270. 27. lethargicos. 271. 29. Admouēt. 272. 39. hoc illis. 44. ef fecit. 45. suppressa. 273. 39. his. 274. 23. prædictorū. 275. 17. ambiētis. 27. syluestris. 44. Vini. 277. 41. Quidā. 279. 29. cōueniūt. 281. 33. aut per. 286. 5. sola. 287. 37. generoso. 294. 18. anū. 295. 32. prijs. 296. 26. olei. 297. 27. uero in nō. 298. 10. accidāt ex. 11. malignitās. 22. petāt. 41. cōcarnationis. 299. 10. ea quē. 304. 1. ærē. 305. 35. Un becilliora. 306. 17. eplastrū. 307. 1. cū rigido. 310. 42. pilus. 313. 29. pumicis tosti. 312. 35. sint. 318. 38. 40. pure. 320. 2. gallā. 323. 3. æris. 326. 20. et hē dū. 21. excolūt. 44. diurnus. 333. 1. plenās. 39. habere adstrictionē. 41. præci. 334. 30. Euacuato. 32. Fomēta. 335. 31. particulæ mori. 35. Cibi. 336. 32. cōsequenter. 337. 46. si ferūt. 339. 7. oculi. 43. candidū. 341. 18. insit. 343. 14. oculus. 37. locis. 344. 20. carbūculis. 354. 2. inflammationis. 39. tunc nō tard. 346. 39. ad staphylomata. 347. 8. quū. 348. 12. illinātur collyria tenera. 19. decora sunt, si fuerint parti cō. 27. agnoscitur. 349. 8. cogitū. 351. 24. Cucumeris. 352. 15. eminentiā. 353. 13. collyria. 354. 22. colligiq. 365. 16. ac. 25. anus. 357. 21. ueteri. 32. qui. 358. 24. collyrij. 359. 32. pharmacis. 360. 47. scabici. 361. 34. quū. 362. 46. Sinē 363. 14. lintea. 35. illata. 364. 36. exciderint. 365. 22. subaridus. 48. madesiat. 366. 41. corrosos. 368. 9. nitro. 371. 15. cōtingere. 373. 2. utumur. 375. 32. dramē. 376. 18. celebre. 380. frustra. 377. 19. Faciūt et. 378. 3. spumē. 25. Et unita. 381. 19. Hecatonarchia. 384. 14. Aegypto. 385. 6. tragacanthā. 40. lenib. 386. 22. facimus. 31. prædicto. 33. thām albā ac lucid. 46. iudicatū. 387. præparatā. 395. 46. uero. 405. 9. destillantē. 21. refrigeratūq. ac erasam 407. 41. 42. lixiuio coactilioriorū. 753. 39. uelut. 762. 35. soluito. 763. 35. tractatur. 765. 32. deligabimus. 767. 40. psittaciū. 776. 10. robustiora. 28. affundito. 777. 20. integræ. 32. quam. 778. 14. appellatū. 780. 3. quod ad Orib. 26. tato. 782. 35. deraso. 783. 8. deprimat, parce ad. 785. 27. colore. 28. numeratur. 791. 10. a uetustis. 793. 13. succo. 19. tubercula. 795. 1. pilis leporis constans. 816. 12. hibeantur. 819. 14. sed terebinthina. 41. quod ex perna. 821. disparata. 822. 27. Aluum etiā. 867. 11. plerisq. gutturis tumor. 873. 2. aggreffionē. 893. 38. motibus.

EXCVSVM BASILEAE, IMPEN-
SIS HIER. FROBENII, ET NIC. EP^U
SCOPII, MENSE SEPTEMBRI,
M. D. XLII.

Chartarum series

^a a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z.
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z.
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo
Pp Qq Rr Ss Tt Vv Xx Yy Zz. AA BB CC DD
EE FF GG HH II KK LL.

Omnes terniones præter II duernionē, & KK LL quaterniones.

